Catálogo de plantas e fungos do Brasil

Volume 1

Rafaela Campostrini Forzza (org)
et al.

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

FORZZA, RC., org., *et al.* INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. *Catálogo de plantas e fungos do Brasil* [online]. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio: Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010. 871 p. Vol. 1. ISBN 978-85-8874-242-0. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

CATÁLOGO DE PLANTAS E FUNGOS DO BRASIL

VOLUME 1

JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

CATÁLOGO DE PLANTAS E FUNGOS DO BRASIL

VOLUME 1

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Luis Inácio Lula da Silva
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Izabella Mônica Vieira Teixeira
MINISTRA

José Machado
SECRETÁRIO-EXECUTIVO

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Liszt Vieira
PRESIDENTE

JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Rua Jardim Botânico 1008
Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ
22460-180

CIP BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE – SINDICATO NACIONAL DE EDITORES DE LIVROS
P714 CATÁLOGO DE PLANTAS E FUNGOS DO BRASIL

C355
v.1
Catálogo de plantas e fungos do Brasil, volume 1 / [organização Rafaela Campostrini Forzza... et al.]. -
Rio de Janeiro : Andrea Jakobsson Estúdio : Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010.
2.v. : il.

Inclui bibliografia
ISBN 978-85-88742-42-0
1. Botânica – Brasil – Catálogos. 2. Plantas – Brasil – Catálogos. 3. Fungos – Brasil – Catálogos. I. Forzza, Rafaela Campostrini, 1972-.
10-3934. CDD: 581.981
CDU: 582(81)
11.08.10 11.08.10 020773

Realização

CNCFLORA
Centro Nacional de Conservação da Flora

1808 JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

CATÁLOGO DE PLANTAS E FUNGOS DO BRASIL

VOLUME 1

JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Andrea Jakobsson Estúdio

© JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 2010.

CATÁLOGO DE PLANTAS E FUNGOS DO BRASIL

COMITÊ ORGANIZADOR DO PROJETO LISTA DO BRASIL
Rafaela Campostrini Forzza, Paula Moraes Leitman, Andrea Costa, Aníbal Alves de Carvalho Jr., Ariane Luna Peixoto, Bruno Machado Teles Walter, Carlos Bicudo, Daniela Zappi, Denise Pinheiro da Costa, Eduardo Lleras, Gustavo Martinelli, Haroldo Cavalcante de Lima, Jefferson Prado, João Renato Stehmann, José Fernando A. Baumgratz, José Rubens Pirani, Lana da Silva Sylvestre, Leonor Costa Maia, Lucia G. Lohmann, Luciano Paganucci, Marcos Silveira, Marcus Nadruz, Maria Cândida Henrique Mamede, Maria Nazaré C. Bastos, Marli Pires Morim, Maria Regina Barbosa, Mariângela Menezes, Mike Hopkins, Ricardo Secco, Taciana Cavalcanti, Vinícius Castro Souza

EDITORES DO CATÁLOGO
Rafaela C. Forzza, José Fernando A. Baumgratz, Carlos Eduardo M. Bicudo, Aníbal A. Carvalho Jr., Andrea Costa, Denise P. Costa, Mike Hopkins, Paula M. Leitman, Lucia G. Lohmann, Leonor Costa Maia, Gustavo Martinelli, Mariângela Menezes, Marli P. Morim, Marcus A. Nadruz Coelho, Ariane L. Peixoto, José Rubens Pirani, Jefferson Prado, Luciano P. Queiroz, Vinícius C. Souza, João Renato Stehmann, Lana S. Sylvestre, Bruno M. T. Walter & Daniela Zappi

ILUSTRAÇÕES
Ana Lucia Souza: págs. 12/13 e 42; Carmen Zocchio Fidalgo: pág. 43; Emiko Naruto: pág. 568; Malena Barretto: pág. 570 e colofão dos volumes 1 e 2; Maria Alice de Rezende: págs. 61, 452, 522 e 879; Paulo Ormindo: capa, págs. 6, 13, 15, 17, 21, 78 e 877; Renato de Carvalho Moraes: capa, págs. 1, 3, 4, 5, 7, 14, 16, 18, 19, 69, 90, 91, 873, 875 e 876; Fungo pág. 93 e Algas págs. 49 e 262 reproduzidos de Martius, C.P.F. et al. 1833, *Flora brasiliensis pars prior*; Gimnosperma: pág. 75 reproduzida de Martius, C.P.F. et al. 1895, *Flora brasiliensis 4(1)*.

PRODUÇÃO EDITORIAL
Andrea Jakobsson Estúdio Editorial
Projeto Gráfico Erika Martins
Assistente editorial Renata Arouca
Editoração eletrônica Marcelo Botelho
Revisão e padronização Rachel Valença
Impressão e acabamento Gráfica Santa Marta



PREFÁCIO

Parabenizo a todos os botânicos que contribuíram para completar o presente catálogo.
O Brasil é o país que provavelmente possui a maior flora do mundo, portanto, a produção de uma lista completa dessa flora é uma extensa tarefa. Os coordenadores mobilizaram uma grande equipe de pessoas para compilar a lista, e é ótimo ver que este projeto, diferentemente do que se observa em outros países, foi coordenado no Brasil. Isto demonstra o alto nível e a capacidade da comunidade botânica brasileira que se desenvolveu rapidamente nas últimas décadas. Este catálogo, por ter sido preparado na sua maioria por especialistas dos grupos estudados, mostra quais espécies são correntemente aceitas pelos botânicos envolvidos. As espécies foram padronizadas por meio da citação de materiais-*voucher*, a maioria dos quais foi coletada por brasileiros e está alojada em herbários do Brasil. A informação a respeito da distribuição geográfica de cada espécie será extremamente útil para fins de conservação, e é interessante notar o número expressivo de espécies endêmicas do Brasil. Este catálogo certamente será utilizado por estudantes de diversas áreas envolvendo botânica, ecologia e outras, e tenho certeza de que a sua existência estimulará futuras pesquisas a respeito de plantas brasileiras e que a sua versão *on-line* o manterá atualizado. O desafio agora é conservar os muitos ecossistemas diferentes nos quais estas espécies ocorrem, para manter a diversidade botânica do país.

Congratulations to the many botanists who have put together this checklist. Brazil probably has the largest flora of any country in the world and so it is no mean task to produce such a comprehensive checklist of all known plants and fungi. The coordinators have mobilized a team of many people to compile this work, but it is good to see that this project, unlike the checklist of species of many other countries, was generated and coordinated in Brazil. This demonstrates the high level and the skills of the Brazilian botanical community that have developed so rapidly over the past few decades. Because this catalogue has been prepared largely by specialists in the various plant families it is accurate and shows which species the botanists involved accept. Most species are standardised through the citation of a voucher specimen the majority of which have also been collected by Brazilians and housed in Brazilian herbaria. The information on the geographic distribution of each species will be invaluable for conservation. It is interesting to note the large number of endemic species that exist in Brazil. This catalogue will be of great use to many users of plants and especially for conservation. I am sure that the existence of this catalogue will stimulate much further research on Brazilian plants and the existence of it on line will enable it to be kept up-to-date. The challenge now is preserve the many different ecosystems in which these species occur and to maintain the botanical diversity of Brazil.

Professor Sir Ghillean Prance FRS



APRESENTAÇÃO

O lançamento da edição impressa do Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil – apelidada de "Lista do Brasil" pelos próprios autores – representa um extraordinário marco no estudo da biodiversidade brasileira, sob vários aspectos. Primeiramente, tem um incrível significado histórico, pois constitui a primeira iniciativa de se rever e compilar os dados da flora nacional após 106 anos da publicação da monumental obra *Flora brasiliensis*, editada por Karl Friedrich von Martius e colaboradores, que contou com a participação de vários naturalistas da época.

O significado científico da Lista do Brasil também é notável, uma vez que todas as estimativas feitas até o presente sugerem que ocorrem, no território brasileiro, mais espécies de plantas do que em qualquer outro país do Globo. A presente edição da Lista do Brasil, hoje com cerca de 41.000 espécies validadas e com tendência de forte crescimento em função da existência de grandes porções do território nacional ainda inexploradas, confirma que neste país ocorre a maior diversidade florística do planeta. A presente publicação deve ser vista como o início, e não o fim, de um longo processo para sistematizar o conhecimento da vegetação brasileira. Esta é uma obra que deverá ser continuamente atualizada nos próximos anos e décadas, conforme o conhecimento sobre a flora nacional seja incrementado, com a descrição de novas espécies e a incorporação de novos dados sobre distribuição geográfica e demografia das plantas.

O lançamento deste livro tem também outro forte significado, relacionado com o amadurecimento científico brasileiro. Grandes objetivos, a princípio intangíveis devido ao gigantismo das tarefas, podem ser alcançados quando há atuação coordenada, colaborativa e sistêmica. O sucesso na elaboração deste imenso catálogo da flora nacional deve-se em grande parte à exemplar capacidade de articulação da comunidade de botânicos, que permitiu a unificação dos esforços e do conhecimento de mais de 400 especialistas trabalhando em rede. A formação deste "grande cérebro" foi o segredo para que o país de maior diversidade florística do mundo produzisse, em um espaço de tempo relativamente curto, sua lista nacional da flora.

O título de campeão mundial em diversidade de plantas, confirmado com a publicação desta obra, não deve somente nos encher de orgulho. De fato, este prêmio nos foi auferido graciosamente pela Natureza. Para permanecermos indefinidamente com o título, precisamos ter a responsabilidade e o compromisso de conservar e usar de forma racional os habitats, os ecossistemas e os biomas que abrigam este gigantesco patrimônio representado por nossos recursos genéticos vegetais. A publicação da primeira edição da Lista do Brasil é um imenso passo nesta direção, afinal, para conservar e usar racionalmente é preciso, antes de tudo, conhecer.

Rogério Gribel
DIRETOR DE PESQUISAS CIENTÍFICAS
JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

AGRADECIMENTOS

Aos inúmeros naturalistas e botânicos que contribuíram, por meio de suas coletas e pesquisas, para o aumento do conhecimento relativo à biodiversidade brasileira. Do mesmo modo, aos curadores de coleções e às suas instituições que salvaguardam e disponibilizam esses registros, possibilitando assim a compilação desta lista.

A realização deste Catálogo foi possível graças ao apoio de várias instituições e pesquisadores que enviaram seus dados, muitos ainda inéditos, para compor a base inicial do sistema. A estes agradecemos a confiança em nós depositada.

Ao Ministério do Meio Ambiente, Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade (PROBIO II) e ao Global Environmental Fund (GEF) que, através do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFLORA), financiaram o projeto e a publicação desse Catálogo.

A todas as agências financiadoras, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundações de Amparo de Pesquisa Estaduais (FAPE), que subsidiam as pesquisas dos botânicos que participaram desse projeto. Ao Bentham & Moxon Trust pelo apoio para a visita de Rafaela C. Forzza ao Royal Botanic Gardens, Kew (Inglaterra) para finalizar a redação e editoração do presente trabalho.



AUTORES E INSTITUIÇÕES

Adriana de Mello Gugliotta – Instituto de Botânica
Adriana Guglieri – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Adriana Lobão – Universidade Federal do Espírito Santo
Adriana Mayumi Yano-Melo – Universidade Federal do Vale do São Francisco
Alain Chautems – Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Alessandra dos Santos – Instituto de Botânica
Alessandro Rapini – Universidade Estadual de Feira de Santana
Alexa Araujo de Oliveira Paes Coelho – Universidade do Estado da Bahia
Alexandre Indriunas – Instituto de Botânica
Alexandre Quinet – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Alexandre Salino – Universidade Federal de Minas Gerais
Allan Carlos Pscheidt – Instituto de Botânica
Allyne Christina Gomes Silva – Universidade Federal de Pernambuco
Ana Claudia Araújo – Royal Botanic Gardens, Kew
Ana Flora de Novaes Pereira – Universidade Federal de Pernambuco
Ana Luiza Andrade Côrtes – Universidade Estadual de Feira de Santana
Ana Maria Giulietti – Universidade Estadual de Feira de Santana
Ana M.G.A. Tozzi – Universidade Estadual de Campinas
Ana Odete Santos Vieira – Universidade Estadual de Londrina
Ana Paula Fortuna Perez – Universidade Estadual de Campinas
Ana Zanin – Universidade Federal de Santa Catarina
Anderson Alves-Araujo – Universidade Federal de Pernambuco
Anderson Ferreira Pinto Machado – Universidade Estadual de Feira de Santana
Andrea Costa – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Museu Nacional
Andréa de Araújo – Universidade Estadual do Maranhão
Andrea Onofre Araujo – Universidade Federal do ABC
Andrea Pereira Luizi Ponzo – Universidade Federal de Juiz de Fora
Andréa Pozetti Spina – Universidade Estadual de Campinas
André Gil – Universidade Estadual de Campinas
Andreia Silva Flores – Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia de Roraima
Andre Luiz C. M de A. Santiago – Universidade Federal Rural de Pernambuco – UAST
André Luiz Gaglioti – Instituto de Botânica
Andre Marcio Araujo Amorim – Universidade Estadual de Santa Cruz
André O. Simões – Universidade de São Paulo
Andrew Henderson – New York Botanical Garden
Angela Borges Martins – Universidade Estadual de Campinas
Angela Lucia Bagnatori Sartori – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Angela M.S.F. Vaz – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Angelo Schneider – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Aníbal Alves de Carvalho Jr. – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Anna Carolina Mendonça Pereira – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Museu Nacional
Anna Luiza Ilkiu-Borges – Museu Paraense Emilio Goeldi
Antônio Elielson S. Rocha – Museu Paraense Emilio Goeldi
Ariane Luna Peixoto – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Aristônio Magalhães Teles – Universidade Federal de Goiás
Arline Souza de Oliveira – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Museu Nacional
Armando Carlos Cervi – Universidade Federal do Paraná
Augusto César Pessôa Santiago – Universidade Federal de Pernambuco
Benjamin M. Torke – New York Botanical Garden
Benoit Loeuille – Universidade de São Paulo
Bente B. Klitgaard – Royal Botanic Gardens, Kew
Berenice Chiavegatto – Universidade Federal de Juiz de Fora
Beryl Simpson – University of Texas
Bruno Machado Teles Walter – Embrapa/Cenargen
Bruno Tomio Goto – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Bruno Wallnöfer – Naturhistorisches Museum
Caetano Troncoso Oliveira – Universidade Federal de Minas Gerais
Carla Gabriela Vargas Ramos – Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, IP/JBRJ
Carlos Alonso Maya Lastra – Universidad del Quindío
Carlos Eduardo de Mattos Bicudo – Instituto de Botânica
Carlos Wallace Nascimento Moura – Universidade Estadual de Feira de Santana
Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli – Instituto de Botânica
Carmen Sílvia Zickel – Universidade Federal Rural de Pernambuco
Carolyn Proença – Universidade de Brasília
Cássia Mônica Sakuragui – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Cecilia C. Xifreda – Universidad Nacional de La Plata
Cecilia Ezcurra – Universidad Nacional del Comahue
Charlotte Taylor – Missouri Botanical Garden
Cíntia Kameyama – Instituto de Botânica
Cíntia Luiza da Silva Luz – Universidade de São Paulo
Clarice Loguercio Leite – Universidade Federal de Santa Catarina
Clarisse Odebrecht – Universidade Federal do Rio Grande
Claudenir Simões Caires – Universidade de Brasília
Cláudia Elena Carneiro – Universidade Estadual de Feira de Santana
Cláudia Petean Bove – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Museu Nacional
Claudine M. Mynssen – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Cláudio Augusto Mondin – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Claudio Nicoletti de Fraga – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Clenia Pessoa – Universidade Federal de Viçosa
Cyl Farney Catarino de Sá – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Cynthia Sothers – Royal Botanic Gardens, Kew
Daniela Sampaio – Universidade Presbiteriana Mackenzie

Daniela Santos Carneiro-Torres – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Daniela Zappi – Royal Botanic Gardens, Kew
Daniele Monteiro – Universidade Federal de Juiz de Fora
Dartanhã J. Soares – Embrapa / Algodão
Debora Medeiros – Universidade Federal do Rio de Janeiro - Museu Nacional
Denise Monte Braz – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Denise Pinheiro da Costa – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Dieter Wasshausen – Smithsonian Institution
Domingos B.O.S. Cardoso – Universidade Estadual de Feira de Santana
Dora Ann L. Canhos – Centro de Referência em Informação Ambiental
Douglas C. Daly – New York Botanical Garden
Eduardo B. Almeida Jr. – Universidade Federal Rural de Pernambuco
Eduardo da Silva Leal – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Eduardo Lleras – Embrapa/SCT
Efigênia de Melo – Universidade Estadual de Feira de Santana
Eimear Nic Lughadha – Royal Botanic Gardens, Kew
Eliana Ramos – Instituto Agronômico de Campinas
Eliane de Lima Jacques – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Élide P. Santos – Universidade Federal do Paraná
Elisandro Ricardo Drechsler-Santos – Universidade Federal de Pernambuco
Elisete Araújo da Anunciação – Instituto de Botânica
Elizabeth Woodgyer – Royal Botanic Gardens, Kew
Elnatan Bezerra de Souza – Universidade Estadual Vale do Acaraú
Elsa Cabral – Instituto de Botánica del Nordeste
Elsie Franklin Guimarães – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Élvia Rodrigues de Souza – Universidade Estadual de Feira de Santana
Emerson de Paula Lima – Universidade Federal de Pernambuco
Enide Eskinazi-Leça – Universidade Federal de Pernambuco
Enrique Forero – Universidad Nacional de Colombia
Eric Koiti Okiyama Hattori – Universidade Federal de Uberlândia
Erika Medeiros – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Erika Ramos Martins – Instituto de Botânica
Evelin Andrade Manoel – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Eve Lucas – Royal Botanic Gardens, Kew
Fabiana Luiza Ranzato Filardi – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Fabián A. Michelangeli – New York Botanical Garden
Fabiane Nepomuceno Costa – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Fábio de Barros – Instituto de Botânica
Fabíola Feres – Universidade Estadual de Campinas
Fátima Otavina de Souza-Buturi – Instituto de Botânica
Fatima Regina Gonçalves Salimena – Universidade Federal de Juiz de Fora
Felipe Bastos – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Felipe Fajardo Villela Antolin Barberena – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Fernando Bittencourt de Matos – Centro de Pesquisas do Cacau
Fernando Régis Di Maio – Universidade Estácio de Sá
Fernando Rivadavia
Fiorella Mazine – Universidade Federal de São Carlos
Flávia C.P. Garcia – Universidade Federal de Viçosa
Flávio França – Universidade Estadual de Feira de Santana
Franklin Vinhos – Instituto de Botânica
Gabriela Hoff Silveira – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Genise V. Somner – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Gerleni Esteves – Instituto de Botânica
Gerson Oliveira Romão – Universidade de São Paulo – Esalq
Ghillean T. Prance – Royal Botanic Gardens, Kew
Gisela Pelissari – Instituto de Botânica
Gisela Sancho – Universidad Nacional de La Plata
Gisele Oliveira Silva – Instituto de Botânica
Gislayne Cristina Palmeira Borges – Universidade Federal de Pernambuco
Gladstone Alves da Silva – Universidade Federal de Pernambuco
Gracineide Almeida – Universidade do Estado da Bahia
Greta Aline Dettke – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Gustavo Heiden – Universidade de São Paulo
Gustavo Martinelli – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Gwilym P. Lewis – Royal Botanic Gardens, Kew
Haroldo Cavalcante de Lima – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Heimo Rainer – University of Vienna
Helen Maria Pontes Sotão – Museu Paraense Emílio Goeldi
Herison Medeiros de Oliveira – Universidade Federal do Acre
Hilda M. Longhi-Wagner – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Hiltje Maas-van de Kamer – Nationaal Herbarium Nederland
Inês Cordeiro – Instituto de Botânica
Ingrid Koch – Universidade Federal de São Carlos
Iuri Goulart Baseia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Iva Carneiro Leão Barros – Universidade Federal de Pernambuco
Ivanilza Moreira de Andrade – Universidade Federal do Piauí
Jadergudson Pereira – Universidade Estadual de Santa Cruz
Jefferson Prado – Instituto de Botânica
Jimi Nakajima – Universidade Federal de Uberlândia
João Batista Baitello – Instituto Florestal de São Paulo
João Bernardo de Azevedo Bringel Jr. – Jardim Botânico de Brasília
João Luiz Mazza Aranha Filho – Universidade Estadual de Campinas
João Marcelo Alvarenga Braga – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
João Paulo Santos Condack – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Museu Nacional
João Renato Stehmann – Universidade Federal de Minas Gerais
João Ricardo Vieira Iganci – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Joel Campos de Paula – Universidade Estadual do Rio de Janeiro
Jomar Gomes Jardim – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Jorge Pedro Pereira Carauta – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Museu Nacional
Josafá Carlos de Siqueira – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

José Alves Siqueira Filho – Universidade Federal do Vale do São Francisco
José de Ribamar de Sousa Rocha – Universidade Federal do Piauí
José Eduardo Lahoz da Silva Ribeiro – Universidade Estadual de Londrina
José Eduardo Meireles – Duke University
José Fernando A. Baumgratz – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
José Floriano Pastore – Universidade Estadual de Feira de Santana
Jose F. M. Valls – Embrapa/Cenargen
José Iranildo Miranda de Melo – Universidade Estadual da Paraíba
José Luis Bezerra – Universidade Estadual de Santa Cruz
José Maria Cardiel – Universidad Autónoma de Madrid
José Martins Fernandes – Universidade Federal de Viçosa
José Rubens Pirani – Universidade de São Paulo
Juan Tun Garrido – Universidad Autónoma de Yucatán
Jucicleide Cabral de Lima – Universidade Federal de Pernambuco
Juliana de Paula Souza – Universidade de São Paulo – Esalq
Juliana dos Santos Guedes – Instituto de Botânica
Juliana G. Rando – Universidade de São Paulo
Juliana Lovo – Universidade de São Paulo
Juliana Silva dos Santos – Universidade Federal Rural de Pernambuco
Juliana Souza Marques – Instituto Agronômico de Pernambuco
Juliano M. Baltazar – Universidade Federal de Pernambuco
Julie H. A. Dutilh – Universidade Estadual de Campinas
Julio Antonio Lombardi – Universidade Estadual Paulista - Rio Claro
Karina Fidanza Rodrigues Bernardo – Universidade Estadual de Campinas
Kátia Cavalcanti Porto – Universidade Federal de Pernambuco
Kikyo Yamamoto – Universidade Estadual de Campinas
Laise de Holanda Cavalcanti Andrade – Universidade Federal de Pernambuco
Lana da Silva Sylvestre – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Lara Regina Parra – Universidade de São Paulo
Larissa Cavalheiro da Silva – Universidade Federal do Mato Grosso
Larissa Trierveiler Pereira – Universidade Federal de Pernambuco
Larry Noblick – Montgomery Botanical Garden
Laura Cristina Pires Lima – Universidade Estadual de Feira de Santana
Leandro Giacomin – Universidade Federal de Minas Gerais
Leandro Jorge Telles Cardoso – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Leila Carvalho da Costa – Universidade de Brasília
Leila Macias – Universidade Federal de Pelotas
Leonor Costa Maia – Universidade Federal de Pernambuco
Leticia Ribes de Lima – Universidade Federal de São Carlos
Lidyanne Yuriko Saleme Aona – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Ligia Queiroz Matias – Universidade Federal do Ceará
Lilian Auler Mentz – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Lilian Eggers – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Lívia Echternacht – Universidade de São Paulo
Lívia Godinho Temponi – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Luana S. B. Calazans – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Lucas Almeida Vicente de Barros – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio
Lúcia G. Lohmann – Universidade de São Paulo
Luciana H. Yoshino Kamino – Universidade Federal de Minas Gerais
Luciano Paganucci de Queiroz – Universidade Estadual de Feira de Santana
Lúcia Rossi – Instituto de Botânica
Luci Senna Valle – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Museu Nacional
Luisa Senna – Instituto Federal da Bahia
Luis Carlos Bernacci – Instituto Agronômico de Campinas
Luís Fernando Paiva Lima – Universidade da Região da Campanha
Luís Fernando Pascholati Gusmão – Universidade Estadual de Feira de Santana
Luiza Sumiko Kinoshita – Universidade Estadual de Campinas
Luiz José Soares Pinto – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Museu Nacional
Mara Angelina Galvão Magenta – Universidade Santa Cecília
Mara Lisiane Tissot-Squalli – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
Mara Rejane Ritter – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Marccus Alves – Universidade Federal de Pernambuco
Marcela Eugenia da Silva Cáceres – Universidade Federal de Sergipe
Marcelo Aluísio Sulzbacher – Universidade Federal de Santa Maria
Marcelo Dias Machado Vianna Filho – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Museu Nacional
Marcelo Monge – Universidade Estadual de Campinas
Marcelo Reginato – City University of New York
Marcelo Souza – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Marcelo Trovo – Universidade de São Paulo
Márcia Carla Ribeiro da Silva – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Marcia Creed – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Márcia Vignoli-Silva – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Marcos Honorato da Silva – Universidade Federal de Pernambuco
Marcos José da Silva – Universidade Estadual de Campinas
Marcos Sobral – Universidade Federal de São João del Rei
Marcus Alberto Nadruz Coelho – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Maria Alice Neves – Universidade Federal da Paraíba
Maria Angélica Kieling-Rúbio – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Maria Beatriz de Barros Barreto – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Maria Beatriz Rossi Caruzo – Instituto de Botânica
Maria Bernadete Costa-e-Silva – Instituto Agronômico de Pernambuco
Maria Candida Henrique Mamede – Instituto de Botânica
Maria Carolina de Abreu – Universidade Federal Rural de Pernambuco
Maria da Conceição Valente – Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Maria da Glória Gonçalves da Silva Cunha – Universidade Federal de Pernambuco
Maria das Graças Lapa Wanderley – Instituto de Botânica
Maria de Fátima Agra – Universidade Federal da Paraíba
Maria de Fátima de Oliveira Carvalho – Universidade Federal Rural de Pernambuco
Maria de Fátima Freitas – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Maria de Lourdes Abruzzi A de Oliveira – Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul
Maria de Lourdes Soares – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Maria do Carmo Estanislau do Amaral – Universidade Estadual de Campinas
Maria do Carmo Mendes Marques – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Maria do Céo R. Pessoa – Universidade Federal da Paraíba
Maria do Socorro Pereira – Universidade Federal de Campina Grande
Maria Fernanda Calió – Universidade de São Paulo
Maria Iracema Bezerra Loiola – Universidade Federal do Ceará
Maria Leonor D'El Rei Souza – Universidade Federal de Santa Catarina
Maria Luiza Silveira de Carvalho – Universidade Estadual de Feira de Santana
María Mercedes Arbo – Instituto de Botánica del Nordeste
Maria Mulgura – Instituto Darwinion
Mariana Machado Saavedra – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
María Natividad Sánchez de Stapf – Smithsonian Tropical Research Institute
Mariângela Menezes – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Museu Nacional
Maria Regina Barbosa – Universidade Federal da Paraíba
Maria Salete Marchioretto – Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Maria Silvia Ferrucci – Instituto de Botánica del Nordeste
Maria Teresa Menezes Széchy – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Marilene Felipe Santiago – Universidade Federal de Pernambuco
Marília Cristina Duarte – Instituto de Botânica
Marina Capelari – Instituto de Botânica
Marina Vaz Stefano – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Marisa Campos Santana – Universidade Federal de Santa Catarina
Marli Bergesh – Universidade Federal do Rio Grande
Marli Pires Morim – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Marlon Machado – Universidade Estadual de Feira de Santana
Marta Camargo de Assis – Embrapa
Marta Dias Moraes – Universidade Federal do Acre
Massimiliano Dematteis – Instituto de Botánica del Nordeste
Massimo G. Bovini – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Maurício Takashi Coutinho Watanabe – Universidade de São Paulo
Maximilian Weigend – Institut für Biologie – Systematische Botanik und Pflanzengeographie, Freie Universität
Melanie Diniz – Instituto de Botânica
Michaele Alvim Milward de Azevedo – Universidade Federal do Espírito Santo
Michael Nee – New York Botanical Garden
Micheline Carvalho-Silva – Universidade de Brasília
Michel João Ferreira Barros – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Mikael Péric Freitas – Universidade de São Paulo
Mike Hopkins – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Milton Groppo – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
Mizué Kirizawa – Instituto de Botânica
Mutue Toyota Fujii – Instituto de Botânica
Nádia Chukr – Parque Municipal Teresa Maia
Nadia Roque – Universidade Federal da Bahia
Nancy Hensold – Field Museum
Nara Furtado de Oliveira Mota – Universidade Federal de Minas Gerais
Narcísio Costa Bigio – Universidade Federal de Rondônia
Nataly O'Leary – Instituto Darwinion
Nathália de Paiva Krauss Silva – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Nathan P. Smith – New York Botanical Garden
Neusa Taroda Ranga – Universidade Estadual Paulista – São José do Rio Preto
Nigel Taylor – Royal Botanic Gardens, Kew
Nilda Marquete – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Norma Catarina Bueno – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Paula Leitman – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Paul E. Berry – University of Michigan
Paul Hiepko – Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem
Paul Maas – Nationaal Herbarium Nederland
Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Camara – Universidade de Brasília
Paulo G. Windisch Universidade – Federal do Rio Grande do Sul
Paulo José F. Guimarães – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Paulo Labiak – Universidade Federal do Paraná
Paulo Takeo Sano – Universidade de São Paulo
Pedro Acevedo Rodríguez – Smithsonian Institution
Pedro Bond Schwartsburd – Instituto de Botânica
Pedro Fiaschi – Universidade de São Paulo
Pedro Germano Filho – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Pedro Luís Rodrigues de Moraes – Universidade Estadual de Feira de Santana
Pedro L. Viana – Universidade Federal de Minas Gerais
Peter W. Fritsch – California Academy of Sciences
Polyana Noronha Soares – Universidade Federal de Uberlândia
Priscila P.A. Ferreira – Instituto de Botânica
Rafaela Campostrini Forzza – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Rafael Augusto Xavier Borges – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Rafael Barbosa Pinto – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio
Rafael Trevisan – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Raquel Fernandes Monteiro – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Raquel Ludtke – Universidade Federal de Pelotas
Raul Gutierrez – Arizona State University
Raymond Harley – Royal Botanic Gardens, Kew

Regina Célia de Oliveira – Universidade de Brasília
Regina C. V. Martins da Silva – Embrapa/Cpatu
Regina Helena Potsch Andreata – Universidade Santa Úrsula
Regina T. Shirasuna – Instituto de Botânica
Regina Y. Hirai – Instituto de Botânica
Renata Moura de Liro – Universidade Federal da Bahia
Renata Sebastiani – Instituto de Botânica
Renato de Mello-Silva – Universidade de São Paulo
Renato Goldenberg – Universidade Federal do Paraná
Renée H. Fortunato – Instituto de Recursos Biológicos Cirn-Inta
Reyjane Patricia Oliveira – Universidade Estadual de Feira de Santana
Ricarda G. Riina – Real Jardín Botánico, Madrid
Ricardo Couto – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Ricardo Kriebel – New York Botanical Garden
Ricardo Secco – Museu Paraense Emilio Goeldi
Rita Baltazar de Lima – Universidade Federal da Paraíba
Roberta Gomes Chacon – Jardim Botânico de Brasília
Roberto Manuel Salas – Instituto de Botánica del Nordeste
Robson Daumas Ribeiro † – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Rodrigo Augusto Camargo – Universidade Estadual de Campinas
Rodrigo Augusto Santinelo Pereira – Universidade de São Paulo
Rodrigo Duno De Stefano – Centro de Investigación Cinetífica de Yucatán
Rodrigo Schütz Rodrigues – Universidade Federal de Roraima
Ronaldo Marquete – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Rosa Mara Borges da Silveira – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Rosana Conrado Lopes – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rosana Romero – Universidade Federal de Uberlândia
Rosângela Simão-Bianchini – Instituto de Botânica
Roseli B. Torres – Instituto Agronômico de Campinas
Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi – Universidade do Estado de Santa Catarina – CAV
Rubens Luiz Gayoso Coelho – Universidade Estadual de Campinas
Rubens Teixeira de Queiroz – Universidade Estadual de Campinas
Samir Khader – Universidade Estácio de Sá
Sandra Maria Alves-da-Silva – Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul
Scott A. Mori – New York Botanical Garden
Sérgio Romaniuc Neto – Instituto de Botânica
Sheila R. Profice – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Shirley Graham – Missouri Botanical Garden
Sidnei de Souza – Centro de Referência em Informação Ambiental
Silvana Aparecida Pires de Godoy – Universidade de São Paulo
Silvana C. Ferreira – Universidade Estadual de Feira de Santana
Silvia Maia Pita Beauclair Guimarães – Instituto de Botânica
Silvia T. S. Miotto – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Simon Mayo – Royal Botanic Gardens, Kew
Sonia Maria Barreto Pereira – Universidade Federal Rural de Pernambuco
Sonia Marisa Hefler – Universidade Federal do Rio Grande
Taciana Barbosa Cavalcanti – Embrapa/Cenargen
Tânia Maria de Moura – Universidade Estadual de Campinas
Tania Regina dos Santos Silva – Universidade Estadual de Feira de Santana
Tarciso S. Filgueiras – Universidade Estadual de Campinas
Tatiana B. Gibertoni – Universidade Federal de Pernambuco
Tatiana Tavares Carrijo – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Thaisa Vilar – Universidade de Brasília
Thais Elias Almeida – Universidade Federal de Minas Gerais
Thais Scotti do Canto Dorow – Universidade Federal de Santa Maria
Thamis Meurer – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Toby Pennington – Royal Botanic Garden Edinburgh
Vagner Gularte Cortez – Universidade Federal do Paraná
Valéria Cassano – Universidade Estadual do Rio de Janeiro
Valquíria F. Dutra – Universidade Federal de Viçosa
Vera Lúcia Gomes Klein – Universidade Federal de Goiás
Vera Regina Werner – Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul
Veronica Thode – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Victor Steinmann – Instituto de Ecología, A.C.
Vidal F. Mansano – Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Vinícius Antonio de Oliveira Dittrich – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Vinícius Castro Souza – Universidade de São Paulo – Esalq
Vinícius Trettel Rodrigues – Universidade Braz Cubas
Vitor Fernandes Oliveira de Miranda – Universidade Estadual Paulista – Jaboticabal
Viviane Renata Scalon – Universidade Federal de Ouro Preto
Volker Bittrich – Universidade Estadual de Campinas
Wayt Thomas – New York Botanical Garden
William Rodrigues – Universidade Federal do Paraná
Xavier Cornejo – New York Botanical Garden



ÍNDICE

VOLUME 1

PREFÁCIO 5
APRESENTAÇÃO 6
AGRADECIMENTOS 7

INTRODUÇÃO 19

1. SÍNTESE DA DIVERSIDADE BRASILEIRA 21
2. OS FUNGOS DO BRASIL 43
3. AS ALGAS DO BRASIL 49
4. AS BRIÓFITAS DO BRASIL 61
5. AS SAMAMBAIAS E LICÓFITAS DO BRASIL 69
6. AS GIMNOSPERMAS DO BRASIL 75
7. AS ANGIOSPERMAS DO BRASIL 78

LISTA DE ESPÉCIES 91

FUNGOS *LATO SENSU* 93

HYPHOCHYTRIOMYCOTA 93
Hyphochytriales 93

LABYRINTHULOMYCOTA 93
Thraustochytriales 93

MYXOMYCOTA 94
Ceratiomyxales 94
Echinosteliales 94
Liceales 94
Physarales 96
Stemonitales 100
Trichiales 102

OOMYCOTA 104
Albuginales 104
Haptoglossales 104
Incertae sedis 104
Leptomitales 105
Olpidiopsidales 105
Peronosporales 105
Pythiales 106
Rhipidiales 110
Rozellopsidales 110
Saprolegniales 110

PLASMODIOPHOROMYCOTA 113
Plasmodiophorales 113

FUNGOS *STRICTO SENSU* 113

ASCOMYCOTA 113
Anamórficos 113
Arthoniales 140
Candelariales 142
Capnodiales 142
Diaporthales 142
Dothideales 142
Erysiphales 143
Helotiales 143
Hypocreales 144
Incertae sedis 144
Lecanorales 146
Meliolales 149
Ostropales 149
Peltigerales 156

Pertusariales 156
Pezizales 157
Phyllachorales 157
Pleosporales 158
Pyrenulales 158
Rhytismatales 159
Teloschistales 159
Verrucariales 160
Xylariales 160

BASIDIOMYCOTA 168
Agaricales 168
Atheliales 180
Auriculariales 181
Boletales 182
Cantharellales 185
Corticiales 186
Dacrymycetales 187
Doassansiales 187
Geastrales 187
Gloeophyllales 188
Gomphales 188
Hymenochaetales 189
Hysterangiales 194
Phallales 195
Polyporales 196
Pucciniales 210
Russulales 242
Thelephorales 244
Trechisporales 244
Tremellales 245
Urocystidiales 245

BLASTOCLADIOMYCOTA 245
Blastocladiales 245

CHYTRIDIOMYCOTA 246
Chytridiales 246
Incertae sedis 249
Lobulomycetales 249
Monoblepharidales 249
Rhizophydiales 250
Spizellomycetales 251

GLOMEROMYCOTA 251
Archaeosporales 251
Diversisporales 252
Glomerales 255
Paraglomerales 257

ZYGOMYCOTA 257
Dimargaritales 257
Entomophthorales 257
Mortierellales 257
Mucorales 258
Zoopagales 261



ALGAS 262

BACILLARIOPHYCEAE 262
Charophyceae 310
Chlorophyceae 335
Chrysophyceae 352
Cryptophyceae 354
Cyanophyceae 356
Dictyochophyceae 366
Dinophyceae 366
Euglenophyceae 383
Phaeophyceae 404
Prasinophyceae 409
Prymnesiophyceae 409
Raphidophyceae 415
Rhodophyceae 416
Synurophyceae 436
Ulvophyceae 438
Xanthophyceae 448

BRIÓFITAS 452

ANTÓCEROS 452
Anthocerotaceae 452
Dendrocerotaceae 452
Notothyladaceae 452

HEPÁTICAS 453
Acrobolbaceae 453
Adelanthaceae 453
Aneuraceae 453
Arnelliaceae 454
Aytoniaceae 454
Balantiopsidaceae 454
Calypogeiaceae 454
Cephaloziaceae 455
Cephaloziellaceae 455
Chonecoleaceae 456
Corsiniaceae 456
Fossombroniaceae 456
Frullaniaceae 456
Geocalycaceae 458
Gymnomitriaceae 459
Herbertaceae 459
Jungermanniaceae 459
Lejeuneaceae 460
Lepicoleaceae 471
Lepidoziaceae 471
Lunulariaceae 473
Marchantiaceae 473
Metzgeriaceae 474
Monocleaceae 475
Oxymitraceae 475
Pallaviciniaceae 475
Pelliaceae 475
Plagiochilaceae 475
Pleuroziaceae 477
Porellaceae 477
Radulaceae 477
Ricciaceae 478
Scapaniaceae 479

Sphaerocarpaceae 479
Targioniaceae 479
Trichocoleaceae 479

MUSGOS 480
Adelotheciaceae 480
Amblystegiaceae 480
Andreaeaceae 480
Anomodontaceae 480
Archidiaceae 480
Aulacomniaceae 481
Bartramiaceae 481
Brachytheciaceae 482
Bruchiaceae 483
Bryaceae 483
Calymperaceae 486
Campyliaceae 488
Catagoniaceae 488
Cryphaeaceae 488
Daltoniaceae 489
Dicranaceae 489
Diphysciaceae 492
Ditrichaceae 492
Entodontaceae 492
Ephemeraceae 493
Erpodiaceae 493
Eustichiaceae 494
Fabroniaceae 494
Fissidentaceae 494
Fontinalaceae 497
Funariaceae 497
Grimmiaceae 497
Hedwigiaceae 498
Helicophyllaceae 498
Hookeriaceae 498
Hydropogonaceae 498
Hypnaceae 499
Hypopterygiaceae 500
Lembophyllaceae 500
Leskeaceae 500
Leucobryaceae 501
Leucodontaceae 501
Leucomiaceae 501
Meteoriaceae 501
Mniaceae 502
Myriniaceae 503
Neckeraceae 503
Orthodontiaceae 504
Orthotrichaceae 504
Phyllodrepaniaceae 506
Phyllogoniaceae 506
Pilotrichaceae 506
Plagiotheciaceae 508
Polytrichaceae 508
Pottiaceae 509
Prionodontaceae 512
Pterigynandraceae 512
Pterobryaceae 512
Ptychomitriaceae 513
Ptychomniaceae 513
Racopilaceae 513
Rhabdoweisiaceae 513
Rhachitheciaceae 513
Rhacocarpaceae 514
Rhizogoniaceae 514
Rigodiaceae 514
Rutenbergiaceae 514
Seligeriaceae 514
Sematophyllaceae 515
Sphagnaceae 517
Splachnaceae 520
Splachnobryaceae 520
Stereophyllaceae 520
Symphyodontaceae 520
Thuidiaceae 521

SAMAMBAIAS E LICÓFITAS 522

Anemiaceae 522
Aspleniaceae 525
Blechnaceae 527
Culcitaceae 529
Cyatheaceae 529
Dennstaedtiaceae 530
Dicksoniaceae 531
Dryopteridaceae 531
Equisetaceae 537
Gleicheniaceae 537
Hymenophyllaceae 538
Isoetaceae 541
Lindsaeaceae 541
Lomariopsidaceae 542
Lycopodiaceae 543
Lygodiaceae 545
Marattiaceae 545
Marsileaceae 546
Metaxyaceae 546
Oleandraceae 546
Ophioglossaceae 546
Osmundaceae 547
Plagiogyriaceae 547
Polypodiaceae 547
Psilotaceae 552
Pteridaceae 552
Saccolomataceae 559
Salviniaceae 559
Schizaeaceae 560
Selaginellaceae 560
Tectariaceae 562
Thelypteridaceae 562
Woodsiaceae 566

GIMNOSPERMAS 568

Araucariaceae 568
Ephedraceae 568
Gnetaceae 568
Pinaceae 568
Podocarpaceae 569
Zamiaceae 569



ANGIOSPERMAS 570

Acanthaceae 570
Achariaceae 585
Achatocarpaceae 585
Adoxaceae 585
Agavaceae 586
Aizoaceae 586
Alismataceae 586
Alliaceae 588
Alstroemeriaceae 588
Amaranthaceae 590
Amaryllidaceae 596
Anacardiaceae 599
Anisophylleaceae 602
Annonaceae 602
Apiaceae 614
Apocynaceae 617
Apodanthaceae 644
Aquifoliaceae 644
Araceae 646
Araliaceae 662
Arecaceae 665
Aristolochiaceae 675
Asteraceae 678
Balanophoraceae 750
Basellaceae 750
Bataceae 750
Begoniaceae 751
Berberidaceae 758
Bignoniaceae 758
Bixaceae 772
Bonnetiaceae 773
Boraginaceae 773
Brassicaceae 777
Bromeliaceae 778
Brunelliaceae 816
Burmanniaceae 817
Burseraceae 818
Cabombaceae 821
Cactaceae 822
Calceolariaceae 832
Calyceraceae 832
Campanulaceae 833
Canellaceae 835
Cannabaceae 835
Cannaceae 836
Capparaceae 836
Cardiopteridaceae 838
Caricaceae 839
Caryocaraceae 839
Caryophyllaceae 840
Celastraceae 842
Ceratophyllaceae 847
Chloranthaceae 847
Chrysobalanaceae 847
Cistaceae 857
Clethraceae 857
Clusiaceae 857
Combretaceae 864
Commelinaceae 867

VOLUME 2

Connaraceae 879
Convolvulaceae 882
Costaceae 895
Crassulaceae 896
Cucurbitaceae 896
Cunoniaceae 901
Cyclanthaceae 902
Cymodoceaceae 903
Cyperaceae 903
Cyrillaceae 922
Dichapetalaceae 923
Dilleniaceae 923
Dioscoreaceae 926
Droseraceae 930
Ebenaceae 931
Elaeocarpaceae 932
Elatinacae 934
Ericaceae 934
Eriocaulaceae 938
Erythroxylaceae 959
Escalloniaceae 962
Euphorbiaceae 963
Euphroniaceae 989
Fabaceae 989
Gelsemiaceae 1102
Gentianaceae 1102
Geraniaceae 1107
Gesneriaceae 1107
Goodeniaceae 1114
Goupiaceae 1114
Griseliniaceae 1114
Gunneraceae 1114
Haemodoraceae 1115
Haloragaceae 1115
Heliconiaceae 1115
Hernandiaceae 1116
Humiriaceae 1117
Hydnoraceae 1118
Hydrocharitaceae 1119
Hydroleaceae 1119
Hypericaceae 1120
Hypoxidaceae 1121
Icacinaceae 1121
Iridaceae 1122
Ixonanthaceae 1128
Juncaceae 1128
Juncaginaceae 1129
Krameriaceae 1129
Lacistemataceae 1129
Lamiaceae 1130
Lauraceae 1146
Laxmanniaceae 1159
Lecythidaceae 1159
Lentibulariaceae 1163
Limnocharitaceae 1166
Linaceae 1166
Linderniaceae 1167
Loasaceae 1167
Loganiaceae 1168
Loranthaceae 1172
Lythraceae 1177

Magnoliaceae 1183
Malpighiaceae 1183
Malvaceae 1201
Marantaceae 1227
Marcgraviaceae 1234
Martyniaceae 1235
Mayacaceae 1236
Melastomataceae 1236
Meliaceae 1278
Menispermaceae 1281
Menyanthaceae 1285
Molluginaceae 1286
Monimiaceae 1286
Moraceae 1287
Muntingiaceae 1295
Musaceae 1295
Myoporaceae 1295
Myristicaceae 1295
Myrsinaceae 1297
Myrtaceae 1301
Nyctaginaceae 1330
Nymphaeaceae 1332
Ochnaceae 1333
Olacaceae 1339
Oleaceae 1341
Onagraceae 1342
Opiliaceae 1344
Orchidaceae 1344
Orobanchaceae 1426
Oxalidaceae 1428
Passifloraceae 1432
Pentaphylacaceae 1436
Peraceae 1437
Peridiscaceae 1438
Phyllanthaceae 1438
Phytolaccaceae 1442
Picramniaceae 1443
Picrodendraceae 1444
Piperaceae 1444
Pittosporaceae 1460
Plantaginaceae 1460
Plumbaginaceae 1464
Poaceae 1464
Podostemaceae 1520
Polygalaceae 1523
Polygonaceae 1531
Pontederiaceae 1534
Portulacaceae 1535
Potamogetonaceae 1536
Proteaceae 1536
Putranjivaceae 1537
Quiinaceae 1538
Quillajaceae 1539
Ranunculaceae 1539
Rapateaceae 1539
Rhabdodendraceae 1541
Rhamnaceae 1541
Rhizophoraceae 1543
Rosaceae 1543
Rubiaceae 1545
Ruppiaceae 1591
Rutaceae 1591
Sabiaceae 1599
Salicaceae 1600
Santalaceae 1603
Sapindaceae 1606
Sapotaceae 1621
Sarraceniaceae 1629
Schlegeliaceae 1629
Schoepfiaceae 1629
Scrophulariaceae 1629
Simaroubaceae 1630
Siparunaceae 1631
Smilacaceae 1632
Solanaceae 1633
Sphenocleaceae 1649
Staphyleaceae 1649
Stemonuraceae 1649
Strelitziaceae 1649
Styracaceae 1649
Surianaceae 1650
Symplocaceae 1650
Taccaceae 1651
Tetrameristaceae 1652
Theaceae 1652
Theophrastaceae 1652
Thismiaceae 1652
Thurniaceae 1653
Thymelaeaceae 1653
Trigoniaceae 1654
Triuridaceae 1655
Tropaeolaceae 1655
Turneraceae 1655
Typhaceae 1661
Ulmaceae 1661
Urticaceae 1662
Valerianaceae 1666
Velloziaceae 1666
Verbenaceae 1672
Violaceae 1683
Vitaceae 1685
Vivianiaceae 1687
Vochysiaceae 1687
Winteraceae 1693
Xyridaceae 1693
Zingiberaceae 1699
Zygophyllaceae 1699





INTRODUÇÃO

SÍNTESE DA DIVERSIDADE BRASILEIRA

Rafaela C. Forzza, José Fernando A. Baumgratz, Carlos Eduardo M. Bicudo, Dora Ann L. Canhos, Aníbal A. Carvalho Jr., Andrea Costa, Denise P. Costa, Mike Hopkins, Paula M. Leitman, Lucia G. Lohmann, Eimear Nic Lughadha, Leonor Costa Maia, Gustavo Martinelli, Mariângela Menezes, Marli P. Morim, Marcus A. Nadruz Coelho, Ariane L. Peixoto, José Rubens Pirani, Jefferson Prado, Luciano P. Queiroz, Sidnei de Souza, Vinícius C. Souza, João Renato Stehmann, Lana S. Sylvestre, Bruno M. T. Walter & Daniela Zappi

INTRODUÇÃO

O interesse em estimar a riqueza da flora mundial começou em meados do século XVIII, quando Linnaeus (1753) previu que, no planeta, haveria por volta de 10 mil espécies de plantas. Sem dúvida ele ficaria surpreso se soubesse que, 250 anos mais tarde, ainda há muitas sendo descobertas e que mais de 2.600 espécies novas foram descritas em 2009 (International Plant Names Index 2009). Também ficaria intrigado e talvez desapontado ao descobrir que, apesar de ter legado uma base sólida de conhecimento da flora, publicando cerca de 6.000 binômios (Jarvis 2007), não existe ainda uma lista completa das espécies conhecidas para a ciência.

A necessidade de obter uma lista foi reconhecida há muito tempo por aqueles que estudam a diversidade de plantas (ex. Hooker 1893). Devido à falta de informações sólidas e às dificuldades históricas de compilação, as estimativas sobre o número de espécies de fungos e plantas variaram muito até o início do século XXI, tanto no que se refere às espécies já publicadas como também às estimativas totais (espécies descritas somadas às espécies por descrever). Entre as tentativas contemporâneas de calcular a diversidade mundial, principalmente nos trópicos, destaca-se o trabalho de Prance (1977), que estimou cerca de 150.000 espécies de plantas e fungos para a América tropical. Posteriormente, Wilson (1988) produziu e editou um trabalho clássico, no qual números sobre a diversidade biológica mundial foram compilados e as discussões sobre as agressões humanas à biodiversidade ganharam mais corpo fora do meio acadêmico. No final da década de 1980, a necessidade de priorizar áreas para conservação levou à criação do conceito de *hotspots*, que define regiões com alta riqueza em espécies e endemismos, sujeitas a um alto grau de ameaça (Myers 1988, Mittermeier et al. 1998). Na mesma década, considerando que um número pequeno de países, principalmente aqueles tropicais, concentra uma grande proporção da biodiversidade mundial, foi criado o conceito de "país megadiverso", em que o Brasil, a Colômbia, o México, a República Democrática do Congo (antigo Zaire), Madagascar e a Indonésia foram os primeiros expoentes (Mittermeier 1988). Esse conceito vem promovendo a conservação dentro das diferentes realidades de cada governo e 17 países são considerados megadiversos (Mittermeier et al. 1997).

O Brasil possui uma área de 8.514.877 km^2, cuja maior parte se encontra entre o trópico de Capricórnio e a linha do Equador (5º16'N – 33º45'S, 34º47'W –73º59'W). Quanto à altitude, há desde terras no nível do mar, basicamente na costa atlântica do país, até outras atingindo 3.014 m, no Pico da Neblina, norte do estado do Amazonas. O Brasil apresenta seis grandes Domínios Fitogeográficos (Veloso et al. 1991): a Amazônia (que ocupa 49,29% do território), o Cerrado (23,92%), a Mata Atlântica (13,04%), a Caatinga (9,92%), o Pampa (2,07%) e o Pantanal (1,76%) (IBGE 2010). Apenas a Caatinga é exclusivamente brasileira, ao passo que a Mata Atlântica tem cerca de 95% de sua área (Stehmann et al. 2009) em

território nacional e o Cerrado a sua quase totalidade, possuindo extensões marginais, porém contínuas, no nordeste do Paraguai e leste da Bolívia (Ab'Saber 1983). Mesmo considerando a Caatinga, com seus 844.453 km^2 de clima semiárido, não existem verdadeiros desertos ou semidesertos no território brasileiro. Dentro de cada Domínio Fitogeográfico, há uma grande variedade de tipos de vegetação, fitofisionomias, hábitats e micro-hábitats que são ocupados por uma ampla diversidade tanto de plantas e fungos como de animais.

Considerada a maior obra florística realizada na região neotropical (Daly & Prance 1989), a *Flora brasiliensis*[1] (1840-1906) conta com descrições de 22.767 espécies de plantas terrestres. Destas 19.629 tinham, na época, ocorrência confirmada para o Brasil (Urban 1906), enquanto 3.138 espécies eram conhecidas apenas em áreas limítrofes, mas foram incluídas nos tratamentos taxonômicos, como é o caso, por exemplo, de *Lygodium micans* J.W. Sturm, anotada como *Verisimiliter etiam in Brasilia septentrionalis*. Em alguns casos, o autor elaborou um tratamento completo para as espécies da América do Sul (ex. Engler 1874).

No decorrer de mais de 100 anos, houve um aumento considerável do conhecimento da flora, com muitas espécies de plantas descritas e novos registros assinalados para o Brasil. Entretanto, não surgiram outras tentativas com abrangência semelhante à da *Flora brasiliensis*, ou mesmo listas consistentes e publicadas sintetizando as espécies brasileiras.

Muitos foram os autores que tentaram estimar a biodiversidade ocorrente no território brasileiro. Lewinsohn & Prado (2002), compilando estimativas de outros autores, projetaram um número entre 63.114 e 70.014 espécies de plantas e fungos, das quais 44.315 a 49.515 seriam plantas terrestres (angiospermas, gimnospermas, samambaias, licófitas e briófitas). Segundo Shepherd (2005), o número de plantas terrestres no país poderia atingir quase 55.000 espécies (descritas e não descritas), considerando angiospermas com 50.000, gimnospermas com 16, pteridófitas com 1.400 e briófitas com 3.125 espécies. O intervalo de fanerógamas já registradas foi estimado por Shepherd (2005) entre 40.000 – 45.000, o que representaria algo em torno de 16 – 20% da flora mundial. Heywood & Davis (1997) sugeriram a ocorrência de aproximadamente 56.000 plantas vasculares no Brasil (angiospermas, gimnospermas, samambaias e licófitas), estimativa também utilizada por Giulietti et al. (2005).

O presente catálogo teve como objetivo registrar o conhecimento atual das espécies de fungos e plantas do Brasil, listando os nomes aceitos e a sua ocorrência em termos de Região, estado e Domínios Fitogeográficos, acompanhados de *vouchers* ou referências bibliográficas.

HISTÓRICO E METODOLOGIA

O Brasil, como país signatário da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), assumiu uma série de compromissos perante a comunidade internacional. Dentre eles, está a Estratégia Global para Conservação de Plantas (GSPC), adaptada da Conferência das Partes da CDB em abril de 2002, que tem por objetivo facilitar o consenso e a sinergia nos níveis global, regional e local, a fim de impulsionar o conhecimento e a conservação das plantas. Das 16 metas estabelecidas pela GSPC, a primeira é a elaboração de uma lista amplamente acessível das espécies conhecidas de plantas de cada país. Para atingir essa meta, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) foi designado em 2008, pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), para coordenar a realização do catálogo aqui apresentado.

O início do projeto "Lista de espécies da flora do Brasil" deu-se com uma reunião realizada no JBRJ, em 18 e 19 de setembro de 2008, que contou com a participação de 17 taxonomistas de diferentes instituições de todo o Brasil, além de um especialista em sistemas de informação. Nessa reunião foi proposta a inclusão não só de plantas vasculares como também de briófitas, algas e fungos, e indicaram-se os membros do comitê organizador e os coordenadores de cada grupo taxonômico. As prioridades da lista em termos dos dados a serem preenchidos foram discutidas a partir dos campos mínimos do *species2000*, adaptados para a realidade do Brasil.

Para o desenvolvimento de um sistema de informação que viabilizasse o gerenciamento, a atualização colaborativa e a geração do catálogo aqui apresentado, estabeleceu-se uma parceria com o Centro de Referência em Informação Ambiental (CRIA), que já havia desenvolvido o protótipo da *Flora brasiliensis* revisitada. Além dessa experiência, outras iniciativas também foram estudadas como o *species2000*, *i-Plants* e *World Checklist of Selected Plants Families* do Royal Botanic Gardens, Kew, para se chegar a um desenho final do sistema.

1 Martius et al. (1833) na *pars previa* descrevem 80 algas, 177 liquens e 79 hepáticas e antóceros.

Foi definido que os trabalhos seriam realizados em duas etapas: a primeira consistiria na análise, harmonização e importação de listas estaduais e regionais ou de um determinado grupo de organismos, bem como de tratamentos taxonômicos já existentes. A segunda etapa seria a revisão e atualização da informação sobre cada táxon, diretamente pelos especialistas e exclusivamente via internet.

As principais obras utilizadas para compor a base de dados inicial foram Barbosa et al. (2006), Cáceres (2007), Daly & Silveira (2009), Gradstein & Costa (2003), Hennen et al. (2005), Mendonça et al. (2008), Oliveira et al. (2007), Procopiak et al. (2006), Queiroz et al. (2006) e Stehmann et al. (2009). A lista de táxons presentes na *Flora brasiliensis revisitada* (2009) também foi cedida pelos respectivos autores para uso neste catálogo. Além disso, por meio de uma parceria firmada entre o JBRJ e o Kew foi possível incluir no sistema todos os nomes de espécies referidas para o Brasil que constam no *World Checklist of Selected Plant Families* (2009) e a lista padronizada de autores de nomes botânicos, inicialmente criada por Brummitt & Powell (1992) e disponível através do sítio do The International Plant Names Index/IPNI (Authors of Plant Names 2009). Em alguns grupos também foram incluídas listas ainda não publicadas, mas cedidas por especialistas. Para um maior detalhamento desse processo em cada grupo, ver a metodologia para compilação dos dados dos capítulos 2 a 7.

Cada lista recebida possuía conteúdo, estruturas e formatos diferentes (MS-Excel, MS-Word ou em formato texto). Para cada uma delas foi desenvolvido um programa para interpretar os campos e formatos, convertê-los para o padrão do novo sistema e integrar os dados no banco de dados hierárquico em PostgreSQL.

Uma vez terminada a fase de importação de dados, uma interface *web* foi disponibilizada para que os especialistas pudessem fazer a atualização e revisão de cada táxon. Cada colaborador teve acesso a uma determinada parte da árvore taxonômica (i.e., acesso às listas dos grupos taxonômicos em diferentes níveis hierárquicos, como família e gênero) por meio de fornecimento de identificação e senha. Ferramentas de auxílio no preenchimento de cada campo do banco de dados, assim como relatórios de verificação automática de erros e estatísticas foram implementados. A linguagem de programação utilizada foi Perl em ambiente Linux. Foi dada especial atenção à agilidade e clareza das telas, uma vez que o sistema seria utilizado por centenas de pesquisadores simultaneamente. Como a rede de colaboradores conta com especialistas do Brasil e do exterior, as telas foram disponibilizadas em inglês e português. Ferramentas de controle de usuários, atribuição de autoria e correções globais de erros foram também desenvolvidas para a coordenação do projeto. Módulos de exportação da informação em planilhas e geração de relatórios em RTF (Rich Text Format) foram implementados para facilitar a edição deste catálogo.

Durante o ano de 2009, 413 taxonomistas completaram, adicionaram e validaram fichas organizadas de maneira hierárquica em uma base de dados única e de acesso restrito *on-line* (fig. 1). O sistema foi aberto ao grupo de especialistas no dia 7 de abril de 2009, com cerca de 90 mil nomes para serem avaliados, além da possibilidade de haver novas inclusões, e foi fechado em 31 de dezembro de 2009. Durante esse período foram avaliados 78.723 nomes. Após o encerramento desse processo, a lista de nomes aceitos foi revisada pelo corpo editorial deste catálogo e uma interface de acesso público foi criada para permitir a busca e recuperação da informação registrada pelos pesquisadores no banco de dados. A versão 2010 da

Figura 1
Ficha de espécie utilizada no sistema *on-line*.

lista foi disponibilizada no *website* http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010 a partir de 21 de maio de 2010, integrada a uma base cartográfica, permitindo assim a geração dinâmica de mapas de distribuição das espécies. Preconiza-se que, após a publicação deste catálogo, a lista deverá ser atualizada na forma *on-line*, com novas versões anuais.

ORGANIZAÇÃO DO CATÁLOGO

Este catálogo foi organizado de acordo com os grandes grupos de organismos tradicionalmente estudados pelos botânicos, a saber:

Fungos. A lista das espécies de fungos está subdividida em dois grupos, fungos *lato sensu* e fungos *stricto sensu*. Abaixo dessa subdivisão as espécies estão organizadas alfabeticamente em filos, ordens e gêneros (ex. Fungos *stricto sensu*, Ascomycota, Arthoniales, *Arthonia* Ach., *Arthonia bossalis* Nyl.). Sob cada ordem aparecem listados os autores do tratamento.

Algas. Para as algas são reconhecidas 17 classes (incluindo procarióticas e eucarióticas), contendo os gêneros e espécies em ordem alfabética (ex. Charophyceae, *Chara* L., *Chara compressa* Kunth). Sob cada classe aparecem listados os autores do tratamento.

Briófitas. As briófitas estão organizadas em três divisões: Anthocerotophyta (antóceros), Marchantiophyta (hepáticas) e Bryophyta (musgos). Dentro das divisões, as famílias, gêneros e espécies estão organizados em ordem alfabética [ex. Antóceros, Dendrocerotaceae, *Dendroceros* Nees, *Dendroceros crispus* (Sw.) Nees]. Sob cada divisão aparecem listados os autores do tratamento.

Plantas vasculares. As plantas vasculares encontram-se organizadas em grandes grupos (samambaias e licófitas, gimnospermas e angiospermas) em ordem alfabética de família, gênero e espécie [ex. Dennstaedtiaceae, *Hypolepsis* Bernh., *Hypolepsis repens* (L.) C. Presl]. Sob cada família aparecem listados os autores do tratamento. Dependendo da coordenação e da organização taxonômica, algumas famílias possuem divisão de autoria por gênero, e o conjunto de todos os autores, precedidos pelo coordenador, aparece no início da família.

Para maiores esclarecimentos sobre a classificação utilizada em cada um desses grandes grupos, consultar a metodologia de compilação dos dados nos capítulos 2 a 7.

Informação dos sumários. No início de cada nível hierárquico (filo, divisão, classe, ordem, família e gênero) é sumarizado o número de espécies no Brasil, com o total de endemismos entre parênteses, seguidos de táxons infraespecíficos organizados da mesma maneira.

Nomes aceitos e sinônimos. Neste catálogo são apresentados apenas os nomes aceitos e de ocorrência registrada no Brasil. Não foi possível citar a vasta bibliografia utilizada para documentar a circunscrição das espécies utilizada nas listas individuais. Esta se encontra dispersa sob as fichas tanto de gêneros como de espécies incluídas no *website* http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010. Os autores de famílias (em plantas vasculares) ou de ordens, classes e divisões (em fungos, algas e briófitas) foram os responsáveis pela inclusão dessas bibliografias (artigos científicos, revisões taxonômicas, floras, monografias e teses), atribuindo, dessa forma, crédito aos autores dos tratamentos utilizados. Sinônimos e nomes erroneamente citados para o país, que ampliariam sobremaneira este catálogo, podem ser encontrados no conteúdo disponível do *website* supracitado.

Referências bibliográficas x *vouchers* (espécimes-testemunho). As listas de fungos e algas foram organizadas com base em referências publicadas, portanto a citação de *vouchers* (materiais de herbário) ocorre apenas ocasionalmente. Para as listas de briófitas, samambaias e licófitas, gimnospermas e angiospermas, preferiu-se o uso de *vouchers* por várias razões: a citação de espécimes é uma prática corrente e universal entre os taxonomistas de plantas vasculares e de briófitas; o espécime citado no catálogo pode constituir o primeiro registro de um táxon nunca antes referido para o Brasil; ao contrário das referências bibliográficas, os espécimes oferecem a possibilidade de se conferir o conceito de espécie do taxonomista que listou o nome para o Brasil; e a possibilidade de ligação com catálogos *on-line* atualmente disponíveis facilitando a futura disponibilização de imagens das espécies tratadas. Por uma questão de uniformização, foi considerado apenas o coletor principal e seu número de coleta.



Figura 2
Mapa dos Domínios Fitogeográficos do Brasil, segundo o IBGE (2010).

Na ausência deste, foi incluído o número de registro de herbário quando possível[2]. Coletores adicionais e a expressão 'et al.' foram retirados no processo de editoração. As referências citadas no contexto das listas estão apresentadas de forma completa, não havendo necessidade de compilar uma bibliografia.

Distribuição dos táxons. Os táxons foram classificados como nativos/subespontâneos, sendo o termo "subespontâneo" utilizado de modo a abranger os sentidos de "naturalizado", "adventício" e "invasor", conforme Spellerberg & Sawyer (1999). Não foram incluídos no catálogo táxons exóticos encontrados apenas em cultivo. Os táxons também foram classificados como endêmicos ou não do Brasil. As espécies, subespécies e variedades ainda desprovidas desse tipo de informação aparecem como "endêmica (?)", e esses registros, por ainda serem imprecisos, foram excluídos das análises apresentadas neste capítulo e nos subsequentes. Em relação à distribuição dos táxons no Brasil, foram indicadas as regiões políticas (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) e as respectivas unidades da Federação. Em alguns casos de táxons com distribuição pouco conhecida ou duvidosa foi possível sugerir a região política de ocorrência, sem incluir a unidade da Federação em questão.

Adicionalmente, é apresentado o Domínio Fitogeográfico onde cada táxon efetivamente ocorre. No caso de informação ainda não disponível, a espécie aparece como "Domínio desconhecido". No tratamento das algas, os táxons foram classificados também como marinhos ou epicontinentais, e somente neste último caso é informado o Domínio. Os grandes Domínios Fitogeográficos brasileiros (segundo Veloso et al. 1991, fig. 2) não se referem às fitofisionomias ou hábitats nos quais as espécies ocorrem. Por exemplo, uma espécie encontrada em mata de galeria dentro da área do Cerrado é listada como ocorrendo no Domínio do Cerrado; uma espécie que ocorra em campos altimontanos sobre os afloramentos rochosos costeiros está listada como ocorrendo no Domínio da Mata Atlântica. Infelizmente, o método de compilação de dados usado ainda não permite um maior refinamento com relação a certos ambientes ricos em endemismos, como, por exemplo, os campos rupestres da Chapada Diamantina, na Bahia, que foram considerados como pertencentes ao Domínio da Caatinga.

2 A numeração dos espécimes de herbário não é um padrão adotado internacionalmente, sendo que muitos espécimes antigos (ex. tipos) não possuem número de coletor nem número de herbário.

A DIVERSIDADE DAS PLANTAS E FUNGOS DO BRASIL

Como resultado deste trabalho foi documentado para o Brasil um total de 40.989 espécies de plantas e fungos, das quais 18.932 (46,2%) são endêmicas do país (tab. 1). As angiospermas são o grupo com maior número de espécies, detendo 76% da diversidade total amostrada. Em termos de endemismo, destacaram-se as angiospermas e as samambaias e licófitas, sendo que as algas apresentaram a menor taxa de endemicidade (tab. 1).

GRUPO	TOTAL DE ESPÉCIES	TOTAL DE ENDÊMICAS	% ENDEMICIDADE
Fungos	3.608	523	14,5
Algas	3.496	52	1,5
Briófitas	1.521	275	18,1
Samambaias e licófitas	1.176	450	38,3
Gimnospermas	26	2	7,7
Angiospermas	31.162	17.630	56,6
Total	40.989	18.932	46,2

Tabela 1
Total de espécies nativas e subespontâneas de plantas e fungos, total de espécies endêmicas e taxa de endemicidade no Brasil.

Em termos gerais, o total registrado neste catálogo excede o citado na obra mais completa anteriormente apresentada, a *Flora brasiliensis* (Martius et al. 1833, Urban 1906). Por outro lado, situa-se significativamente abaixo da maior parte das estimativas mais recentes[3].

Registros atuais e estimativas prévias

Como era de se esperar, passados mais de cem anos de desenvolvimento da pesquisa em botânica, desde o término da publicação da *Flora brasiliensis*, uma comparação com os números apresentados por Martius et al. (1833) e Urban (1906) mostra um acréscimo marcante em todos os grupos. Na *Flora brasiliensis*, menos de 5% do número de fungos e algas e apenas 17,6% do número de espécies de briófitas foram descritos, enquanto o número de samambaias e licófitas atinge 49% e o de gimnospermas 42,3%. Nas angiospermas o aumento foi menor, quando comparado com os grupos mencionados anteriormente, com mais da metade do número de espécies descritas (60,5%) naquela obra (tab. 2). De fato, esses dados mostram que o número de espécies documentadas para a flora do país desde a conclusão da *Flora brasiliensis* é maior do que o previsto por Linnaeus (1753) para a flora mundial. Logicamente, esta comparação é apenas numérica, pois os táxons sofreram diversas mudanças nomenclaturais e de circunscrição ao longo do tempo.

Devemos destacar que o número total de espécies do catálogo (40.989) atinge apenas 58% a 67% das estimativas recentemente publicadas para plantas e fungos brasileiros (tab. 2), que variam entre 61.710 e 70.208 (Lewinsohn & Prado 2005).

Analisando os grupos individualmente, principalmente fungos, algas e briófitas, é possível observar que os resultados aqui registrados se encontram abaixo dos intervalos das estimativas publicadas previamente (tab. 2). O exemplo mais extremo está nos fungos, onde as 3.608 espécies correspondem a apenas 24-27% do montante sugerido por Lewinsohn & Prado (2005). Da mesma maneira, as 3.496 espécies de algas representam 60-83% das estimativas de Lewinsohn & Prado (2005). Para as briófitas, as estimativas variavam ainda mais (1.660-3.200 espécies), sendo que o total de 1.521 espécies registradas ficou apenas um pouco abaixo do valor estimado por Costa (2009), que representa o limite inferior da estimativa encontrada.

Por outro lado, os resultados sobre as plantas vasculares são mais próximos dos valores publicados previamente. As estimativas de 1.200-1.400 espécies de samambaias e licófitas foram consistentemente citadas por vários trabalhos, e o resultado de 1.176 espécies ficou ligeiramente abaixo do limite

3 As diversas estimativas existentes na bibliografia, tanto para o Brasil como para o mundo, foram compiladas numa série de tabelas apresentadas no apêndice deste capítulo.

inferior estimado (84-98% das estimativas de Prado 1998, Shepherd 2005, Lewinsohn & Prado 2005, MMA 1998). A riqueza de gimnospermas, anteriormente estimada em 14-16 espécies (Shepherd 2005), passou a 26, das quais três são espécies subespontâneas de *Pinus*. As angiospermas (31.162 espécies) contribuíram com o maior número de espécies do catálogo, estando ligeiramente acima da estimativa prévia mais baixa publicada, mas muito aquém das estimativas recentes que giravam em torno de 40.000-45.000 espécies, um intervalo frequente na bibliografia. Dessa maneira, o resultado obtido para as angiospermas representa entre 69% (Shepherd 2005, Lewinsohn & Prado 2005 e outros) e 103,9% (Thorne 1973 *apud* Shepherd 2005) dos totais indicados em estimativas anteriormente publicadas.

	todos os grupos	fungos	algas	plantas*	plantas terrestres	briófitas	plantas vasculares	samambaias e licófitas	plantas com sementes	gimnospermas	angiospermas
FLORA BRASILIENSIS	19.958	177	80	19.781	19.701	268	19.433	576	18.857	11	18.846
ESTIMATIVAS PRÉVIAS MAIS BAIXAS PARA O BRASIL	61.710	13.503	4.180	47.195	43.015	1.660	41.215	1.200	35.664	14	30.000
ESTIMATIVAS PRÉVIAS MAIS ALTAS PARA O BRASIL	70.208	14.923	5.770	55.285	49.515	3.200	56.000	1.400	45.015	16	45.000
CATÁLOGO 2010	40.989	3.608	3.496	37.381	33.885	1.521	32.364	1.176	31.188	26	31.162
% DO NÚMERO DE ESPÉCIES REPRESENTADAS NA FLORA BRASILIENSIS	48,7	4,9	2,3	52,9	58,1	17,6	60	49	60,5	42,3	60,5

Tabela 2
Síntese das estimativas de espécies registradas para o Brasil confrontadas com o número de espécies registradas na *Flora brasiliensis* (Martius et al. 1833, Urban 1906) e com o presente catálogo.
* O termo no presente sentido refere-se à soma de algas e plantas terrestres.

Representatividade da flora brasileira no contexto global

Uma vez que os números totais de espécies de plantas e fungos registrados no Brasil são mais baixos do que os anteriormente previstos pela maioria dos autores, é de grande importância reavaliar a contribuição do país para a diversidade desses grupos no mundo. Cabe destacar, no entanto, que a maioria dos países provavelmente deverá reavaliar as suas estimativas do mesmo modo que foi feito no Brasil. As análises realizadas aqui possuem um viés determinado por estimativas mundiais que consideravam o número anterior (exagerado) para o Brasil, que agora está sendo corrigido.

Baseados em estimativas mundiais relativamente moderadas, combinando plantas e fungos, Lewinsohn & Prado (2005) chegaram a um intervalo de 414.066-429.966 espécies, das quais o subtotal brasileiro (63.456-73.956 espécies) representaria entre 15 e 17% da diversidade mundial. Porém alguns autores, como Giulietti et al. (2005) e Shepherd (2005), nas suas estimativas de espécies descritas e esperadas, sugeriram taxas de até 19-20% da flora mundial.

O número de espécies registrado no presente catálogo sugere uma porcentagem mundial de plantas e fungos do Brasil entre 9,5 e 9,9%, portanto menor do que as estimativas vigentes (tab. 3). Essa porcentagem é ainda mais baixa no caso de fungos e algas (cerca de 5% e 4,7-8,7%, respectivamente). Esses números mais baixos podem ser compreendidos pela soma de dois fatores: um deles é que o número de espécies conhecidas é de fato menor do que as estimativas publicadas recentemente; o outro é que o número de algas e fungos está realmente subestimado. No caso das listas de algas e fungos,

devemos acrescentar que muitos desses organismos, em grande parte microscópicos e pouquíssimo estudados, possuem ainda muitos problemas de coleta, análise e delimitação taxonômica (vide capítulos 2 e 3), dispondo de metodologias distintas e por vezes não compatíveis com aquelas utilizadas na taxonomia e catalogação das plantas terrestres. A inclusão de dados ainda não aferidos (vide capítulos 2 e 3, metodologia) e a realização de um maior número de coletas e estudos certamente irá aumentar o número desses organismos registrados no Brasil.

	todos os grupos	fungos	algas	plantas terrestres	briófitas	plantas vasculares	samambaias e licófitas	plantas com sementes	gimnospermas	angiospermas
ESTIMATIVAS PRÉVIAS MAIS BAIXAS PARA O MUNDO	414.066	70.000	400.00	264.460	13.370	250.000	9.000	223.000	806	240.000
ESTIMATIVAS PRÉVIAS MAIS ALTAS PARA O MUNDO	429.966	74.331	73.829	379.599	18.000	366.229	12.838	422.127	1.391	421.968
CATÁLOGO 2010 - % ESTIMATIVAS PRÉVIAS MAIS BAIXAS	9,9	5,2	8,7	12,8	11,4	12,9	13,1	14	3,2	13,0
CATÁLOGO 2010 - % ESTIMATIVAS PRÉVIAS MAIS ALTAS	9,5	4,9	4,7	8,9	8,5	8,8	9,2	7,4	1,9	7,4

Tabela 3
Estimativas mundiais baseadas em dados publicados para fungos e plantas, comparadas com o presente catálogo.

Já no caso das plantas terrestres em geral, as espécies brasileiras perfazem entre 8,8 e 12,8% do total mundial. As proporções dos grupos individuais são geralmente semelhantes, variando entre 8,5 e 11,4% para as briófitas, 9,2 a 13,1% para samambaias e licófitas e entre 7,4 a 13% para as angiospermas. A única exceção encontrada foram as gimnospermas, um grupo com maior diversidade em regiões frias e temperadas, no qual as espécies brasileiras contribuem com apenas 1,9 a 3,2% do total mundial.
As dimensões da lacuna de conhecimento de certos grupos de organismos ficam ainda mais claras quando comparamos os números obtidos para o Brasil, no presente catálogo, com as estimativas que levam em conta espécies ainda não descritas (tab. 4). Os fungos registrados até agora no Brasil, por exemplo, poderiam representar somente 0,2 e 3% da micota mundial, enquanto as algas registradas representariam entre 0,9 e 20,6% desse grupo no mundo. Admitindo-se os extremos mais arrebatados de estimativas para angiospermas no planeta (750.000, segundo Groombridge 1992), o número de espécies desse grupo registradas no Brasil representaria apenas 4,2% do total. Nossa estimativa não leva em conta o número de espécies ainda não descritas. Por exemplo, foram descritas 2.875 novas espécies de angiospermas para o Brasil entre 1990 e 2006 (Sobral & Stehmann 2009), perfazendo cerca de 8% das espécies descritas no mundo. Considerando que a maioria dos grupos apresentados neste catálogo contribuem com cerca de 10% da flora mundial, é de se esperar que o número de espécies novas descritas acompanhe taxas semelhantes.

Pode ser que essas estimativas mundiais sejam muito artificiais, baseadas em expectativas irreais sobre a existência de espécies que nunca serão confirmadas ou talvez careçam de validação dos nomes, como o que se fez neste catálogo. Talvez estejamos ainda longe de conhecer a nossa flora, ou mesmo a do planeta.

	FUNGOS	ALGAS	BRIÓFITAS	SAMAMBAIAS E LICÓFITAS	GIMNOSPERMAS	ANGIOSPERMAS
Estimativas mundiais mais altas	1.600.000	400.000	23.000	13.600	750	750.000
Estimativas mundiais mais baixas	120.000	17.000	14.000	10.000	600	240.000
Catálogo 2010 % estimativas mundiais mais alta	0,2	0,9	6,6	8,6	3,5	4,2
Catálogo 2010 % estimativas mundiais mais baixas	3	20,6	10,9	11,8	4,3	13

Tabela 4
Estimativas mundiais baseadas em dados esperados para fungos e plantas, comparadas com o presente catálogo.

Diversidade e endemismo nos países megadiversos

Os números encontrados demonstram que a riqueza de plantas e fungos do Brasil representa uma proporção importante da diversidade mundial, mas é necessário analisá-los no contexto daqueles existentes para outros países, especialmente os considerados megadiversos (Mittermeier 1988, Mittermeier et al. 1997) ou que apresentam altos níveis de endemismo.

Infelizmente ainda não será possível uma comparação direta entre o conhecimento a respeito de todos os organismos registrados neste catálogo, pois este, no caso das algas, fungos e briófitas, ainda não está disponível no padrão da maioria dos países megadiversos. Podemos, no entanto, efetuar comparações utilizando os dados já acessíveis para as plantas vasculares. De fato, a maioria dos endemismos registrados no presente catálogo está concentrada neste grupo, refletindo a contribuição das angiospermas, com 17.630 espécies endêmicas (56,6%), enquanto o endemismo nos outros grupos (e.g. 1,5% nas algas e 18,1% nas briófitas) é muito menor (tab.1).

A tabela 5 mostra que, apesar de o número de espécies registradas no Brasil ter ficado abaixo daquilo que foi previamente estimado, o país ainda inclui dentro de seu território o maior número de espécies de plantas vasculares do mundo (32.364), estando 9% a 10% acima do número de espécies indicado para a China e para a Indonésia, os dois mais próximos em megadiversidade. Sete dos países megadiversos possuem menos da metade das espécies de plantas vasculares registradas para o Brasil (tab. 5).

Os resultados do presente catálogo demonstram que o Brasil continua à frente, não somente nos totais de plantas vasculares, mas também em números absolutos de espécies endêmicas.

A tabela 6 apresenta os países megadiversos no contexto de outros países com alta taxa de endemismo de plantas vasculares. O Brasil detém o maior número de espécies de plantas vasculares endêmicas (18.082), o que representa 27% a mais que a Austrália e 29% a mais do que a China. No geral, porém, a taxa de endemismo brasileira (56%) é a oitava maior do planeta, sendo ultrapassada por algumas floras de países insulares, a saber: Austrália e Papua Nova Guiné (ambas com 91%), Nova Caledônia (88%), Nova Zelândia (81%), Madagascar (74%) e Polinésia Francesa (58%). A África do Sul (65%) é o único exemplo continental diretamente comparável ao Brasil, englobando um bioma extremamente biodiverso (Fynbos) que constitui a Região Florística do Cabo, que detém o mais elevado grau de endemismo de plantas no mundo (somente nessa província há 9.086 espécies de plantas vasculares, das quais 6.226 são endêmicas, com uma taxa de endemismo de 68,5% (Goldblatt et al. 2005). Os megadiversos China e Indonésia, com números totais de espécies mais próximos aos do Brasil, possuem taxas de endemismo menores, de 47%.

PAÍS	ÁREA(KM²)	TOTAL DE ESPÉCIES	ESPÉCIES ENDÊMICAS	TAXA DE ENDEMISMO %
Brasil	8.514.880	32.364	18.082	56
China	9.598.088	29.650	14.013	47
Indonésia	1.904.570	29.375	13.750	47
México	1.964.380	25.036	11.250	45
Colômbia	1.141.750	24.500	10.500	43
África do Sul	1.219.090	20.407	13.265	65
Estados Unidos	9.632.030	18.737	4.036	22
Peru	1.285.220	18.055	5.676	31
Índia	3.287.260	17.832	6.113	34
Equador	283.560	17.517	4.179	24
Venezuela	912.050	15.820	2.964	19
Austrália	7.741.220	15.638	14.182	91
Malásia	329.740	15.250	3.600	24
Papua Nova Guiné	462.840	14.522	13.250	91
República Dem. Congo	2.344.860	11.004	1.100	10
Madagascar	587.040	9.753	7.250	74
Filipinas	300.000	8.931	3.500	39

Tabela 5

Os 17 países megadiversos ordenados por riqueza de espécies de plantas vasculares (modificado de Giam et al. 2010).

Números do Brasil atualizados segundo o presente catálogo, da África do Sul segundo von Staden et al. (2009) e da Colômbia segundo Bernal (2009).

PAÍS	ÁREA (KM²)	ESPÉCIES ENDÊMICAS	TOTAL DE ESPÉCIES	TAXA DE ENDEMISMO (%)
Brasil	**8.514.880**	**18.082**	**32.364**	**56**
Austrália	**7.741.220**	**14.182**	**15.638**	**91**
China	**9.598.088**	**14.013**	**29.650**	**47**
Indonésia	**1.904.570**	**13.750**	**29.375**	**47**
África do Sul	**1.219.090**	**13.265**	**20.407**	**65**
Papua Nova Guiné	**462.840**	**13.250**	**14.522**	**91**
México	**1.964.380**	**11.250**	**25.036**	**45**
Colômbia	**1.141.750**	**10.500**	**24.500**	**43**
Madagascar	**587.040**	**7.250**	**9.753**	**74**
Índia	**3.287.260**	**6.113**	**17.832**	**34**
Peru	**1.285.220**	**5.676**	**18.055**	**31**
Equador	**283.560**	**4.179**	**17.517**	**24**
Estados Unidos	**9.632.030**	**4.036**	**18.737**	**22**
Bolívia	1.098.580	4.000	17.367	23
Malásia	**329.740**	**3.600**	**15.250**	**24**
Filipinas	**300.000**	**3.500**	**8.931**	**39**
Cuba	110.860	3.227	6.514	50
Venezuela	**912.050**	**2.964**	**15.820**	**19**
Nova Caledônia	18.580	2.876	3.286	88
Tailândia	513.120	2.742	11.313	24
Chile	756.630	2.698	5.250	51
Nova Zelândia	267.710	1.942	2.391	81
Fiji	18.270	786	1.573	50
Polinésia Francesa	4.000	560	959	58
Ilhas Mauritius	2.040	318	718	44
Ilhas Seychelles	460	135	250	54
Santa Helena	308	55	165	33

Tabela 6

Os 27 países com maior número de espécies endêmicas ou maiores taxas de endemismo de plantas vasculares.

Países megadiversos destacados em negrito (modificado de Giam et al. 2010). Números do Brasil atualizados segundo o presente catálogo, da África do Sul segundo von Staden et al. (2009) e da Colômbia segundo Bernal (2009).

Diversidade e endemismo nas Regiões e Domínios do Brasil

Conforme referido no contexto da diversidade brasileira e mundial, a deficiência no conhecimento de algas e fungos afeta, sobremaneira, os resultados registrados até o momento e também as comparações dentro do Brasil. Foi difícil analisar a diversidade tanto por região política (fig. 3) quanto por Domínio Fitogeográfico (fig. 4). As regiões que concentram um grande número de pesquisadores ativos, coletando e registrando espécies, coincidem com o Domínio brasileiro reportado como o mais diversificado, a Mata Atlântica, corroborando Stehmann et al. (2009). Particularmente os fungos, com grupos de pesquisa em Recife e no eixo Rio-São Paulo, mostram essa tendência, sendo que os números registrados para o Nordeste do Brasil ultrapassam os do Sudeste (tab. 7), enquanto o Domínio da Caatinga, inesperadamente, ultrapassa em números tanto a Amazônia quanto o Cerrado (tab. 8, fig. 4).

	FUNGOS	ALGAS	BRIÓFITAS	SAMAMBAIAS E LICÓFITAS	GIMNOSPERMAS	ANGIOSPERMAS	TOTAL
Norte	743	703	585	441	16	12.127	14.615
Nordeste	1.749	1089	609	385	2	10.220	14.054
Centro-Oeste	296	343	460	328	7	8.516	9.950
Sudeste	1.411	2.721	1.205	789	6	15.550	21.682
Sul	1.320	1.700	796	194	7	7.333	11.350

Tabela 7
Número de espécies de fungos, algas e plantas terrestres por Região Política do Brasil.



Figura 3
Riqueza de fungos, algas e plantas terrestres nas Regiões Políticas do Brasil.
Gimnospermas e angiospermas combinadas sob plantas com sementes.

Para quase todos os grupos estudados a maior riqueza de espécies foi registrada na Região Sudeste, com a única exceção das gimnospermas. Um padrão semelhante é observado quando considerados os Domínios Fitogeográficos, nos quais todos os grupos possuem maior número de espécies na Mata Atlântica, exceto gimnospermas. O número de espécies de plantas terrestres (16.146) registrado aqui para a Mata Atlântica (tab. 8) supera aquele registrado na lista de Plantas da Floresta Atlântica (15.782) (Stehmann et al. 2009).

Os Domínios Amazônia e Cerrado, por sua vez, encontram-se próximos em riqueza total de espécies de angiospermas, mas a Amazônia parece apresentar maior diversidade de fungos, algas, briófitas, samambaias e licófitas e gimnospermas do que o Cerrado (tabs. 7 e 8, figs. 3 e 4). É difícil traçar comparações usando os números encontrados na Amazônia, por falta de trabalhos listando as espécies nesse Domínio Fitogeográfico de modo geral.

Para o Cerrado, porém, considerando as 12.070 espécies de plantas terrestres aqui registradas (tab. 8) e os números da flora vascular nativa recentemente listados por Mendonça et al. (2008), com 11.627 espécies, fica evidente que este Domínio é muito mais diverso do que comumente se previu. O número de espécies do Cerrado está mais próximo das florestas Atlântica e Amazônica (especialmente desta) em um patamar muito superior ao da Caatinga, Pampa e Pantanal (tab. 8). Esta riqueza foi um dos fatores que levaram este Domínio a ser considerado um dos dois *hotspots* brasileiros, juntamente com a Mata Atlântica (Mittermeier et al. 1998, 2004).

A Caatinga, com 5.218 espécies de fungos e plantas, aparece em quarto lugar entre os Domínios Fitogeográficos. Estimativas publicadas para este Domínio no sentido mais estrito do que o aqui utilizado (excluindo campos rupestres e outros ecossistemas menos áridos inseridos no Domínio da Caatinga) sugerem a ocorrência de 2.130 espécies de angiospermas (Gamarra-Rojas & Sampaio 2002).

	FUNGOS	ALGAS	BRIÓFITAS	SAMAMBAIAS E LICÓFITAS	GIMNOSPERMAS	ANGIOSPERMAS	TOTAL
Mata Atlântica	1.664	1.545	1.333	834	7	13.972	19.355
Amazônia	519	444	561	428	16	11.349	13.317
Cerrado	291	308	433	245	8	11.384	12.669
Caatinga	734	44	93	25	2	4.320	5.218
Pampa	1	505	107	5	1	1.345	1.964
Pantanal	28	130	179	18	0	885	1.240

Tabela 8
Número de espécies de fungos, algas e plantas terrestres por Domínio Fitogeográfico no Brasil.



Figura 4
Riqueza de fungos, algas e plantas terrestres por Domínios Fitogeográficos no Brasil.
Gimnospermas e angiospermas combinadas sob plantas com sementes.

O inventário da Mata Atlântica é, presumivelmente, o mais completo entre os Domínios Fitogeográficos, e a proporção de cada um dos grupos (fig. 5) é comparável, grosso modo, àquela encontrada em escala mundial. De acordo com os dados deste catálogo, a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga são proporcionalmente dominados pelas plantas com sementes, sugerindo que ainda existe grande parte da biodiversidade a ser inventariada para os outros grupos.

Dois dos grupos de plantas mais bem estudados, as briófitas e as samambaias e licófitas, ocorrem sabidamente em ambientes tropicais úmidos e montanhosos, dependendo de diferentes formas de disponibilidade hídrica (precipitação, condensação, neblina). Com efeito, eles apresentaram maior diversidade na Mata Atlântica (Prado 1998, Costa 2009, Salino & Almeida 2009), sendo comparáveis às Bromeliaceae, Orchidaceae e outras plantas vasculares epifíticas (Martinelli et al. 2008, Menini Neto et al. 2009, Stehmann et al. 2009). As samambaias e licófitas e as briófitas certamente apresentam um número proporcionalmente menor de espécies ocorrendo em áreas com estações secas mais



Figura 5
Contribuição proporcional de fungos, algas e plantas terrestres por Domínio Fitogeográfico no Brasil.
Gimnospermas e angiospermas combinadas sob a categoria plantas com sementes.

pronunciadas, como o Cerrado ou o Pampa, ou mesmo em clima semiárido, como a Caatinga. Por outro lado, considerando a grande disponibilidade hídrica na Amazônia, não parece haver barreiras para a ocorrência mais representativa de briófitas no vasto Domínio Amazônico, especialmente quando levamos em conta a representatividade relativa das mesmas no Pantanal.

É possível traçar um paralelo entre a situação das briófitas e o caso dos fungos e algas, respectivamente com 519 e 444 espécies na Amazônia, sendo que os resultados encontrados parecem apontar com certa segurança para a falta de coletas e estudos intensivos nesse Domínio.

O número total de espécies endêmicas por Domínio Fitogeográfico (tab. 9, fig. 6) mostra claramente a contribuição da Mata Atlântica para o endemismo no Brasil na grande maioria dos grupos. Apesar de estar totalmente incluída no território nacional, a Caatinga é menos expressiva em termos de endemismo do que o Cerrado e a Amazônia (ambos com áreas além do território brasileiro). Com efeito, apenas 318 angiospermas endêmicas da Caatinga foram listadas por Giulietti et al. (2002), enquanto neste catalogo foram registradas 744 espécies (tab. 9). A diferença no número de espécies endêmicas da Caatinga deve-se à metodologia aqui adotada, onde os campos rupestres da Bahia foram tratados dentro do grande Domínio da Caatinga.

	FUNGOS	ALGAS	BRIÓFITAS	SAMAMBAIAS E LICÓFITAS	PLANTAS COM SEMENTES	TOTAL
Mata Atlântica	100 (50,5%)	22 (61,1%)	189 (83,3%)	321 (79,7%)	7.014 (50,2%)	7.646
Cerrado	7 (3,5%)	0	9 (4%)	48 (11,9%)	4.151 (29,7%)	4.215
Amazônia	35 (17,7%)	8 (22,2%)	24 (10,6%)	31 (7,7%)	1.948 (13,9%)	2.046
Caatinga	56 (28,3%)	0	2 (0,9%)	2 (0,5%)	744 (5,3%)	804
Pampa	0	6 (16,7%)	2 (0,9%)	0	76 (0,5%)	84
Pantanal	0	0	1 (0,4%)	1 (0,2%)	46 (0,3%)	48

Tabela 9
Número de espécies endêmicas de fungos, algas e plantas terrestres por Domínio Fitogeográfico e sua porcentagem em relação ao número de espécies endêmicas do Brasil.
Gimnospermas e angiospermas combinadas sob plantas com sementes.
Para calcular as porcentagens foram consideradas apenas as espécies indicadas como endêmicas de um único Domínio.



Figura 6
Percentagem de espécies endêmicas de fungos, algas e plantas terrestres por Domínio Fitogeográfico.
Gimnospermas e angiospermas combinadas sob plantas com sementes.

Tendo em vista as 18.932 espécies indicadas no catálogo como endêmicas do Brasil (tab. 1), existem diferenças significativas entre os Domínios e os grupos (fig. 6, tab. 9). Entre elas, vale a pena ressaltar o padrão distinto registrado em fungos, o único grupo cujo endemismo relativo na Caatinga é maior (28,3%) do que na Amazônia (17,7%). As taxas relativas de endemismo mais altas encontradas foram aquelas das briófitas e das samambaias e licófitas (83,3% e 79,7%, respectivamente) na Mata Atlântica, corroborando Costa (2009), Prado (1998) e Salino & Almeida (2009).

A tabela 10 apresenta o número de espécies por unidade da Federação. Minas Gerais é o estado com maior riqueza, devido à forte influência das angiospermas, sem a contribuição das quais os estados de São Paulo e Rio de Janeiro estariam equiparados em posição mais elevada.

Os estados da Bahia e do Amazonas, situados em quarto e em quinto lugar em termos de diversidade (tab. 10), também possuem maior número de registros de angiospermas do que São Paulo e Rio de Janeiro, mas a participação expressiva de fungos, algas, briófitas e samambaias e licófitas fez com que SP e RJ ultrapassem BA e AM, mesmo com as suas extensas áreas geográficas, somados ao fato de a Bahia apresentar a maior extensão costeira do Brasil. Esta pode ser mais uma expressão da soma de fatores considerados anteriormente, na qual a concentração de estudiosos desses grupos específicos e a diversidade do Domínio da Mata Atlântica parecem atuar de maneira combinada no registro das espécies locais. É possível que os números atuais estejam exagerando a proporção da diversidade desses estados, quando comparados a outros inseridos em outros Domínios.

Uma comparação do número de espécies endêmicas por unidade da Federação (tab. 11) revela uma situação um pouco distinta da que foi discutida para o número total de espécies (tab. 10). Isso possivelmente decorre da combinação do endemismo conhecido para o Domínio da Mata Atlântica (Stehmann et al. 2009) com o dos "campos rupestres" (Giulietti et al. 1987, Giulietti & Pirani 1988, Pirani et al. 2003, Rapini et al. 2009, Stannard 1995, Zappi et al. 2003), que aparece tanto dentro do Domínio Fitogeográfico do Cerrado, em Minas Gerais, quanto no Domínio da Caatinga na Bahia.

É preciso ressaltar a importância do endemismo registrado em estados com áreas relativamente pequenas, como o Rio de Janeiro, em terceiro lugar, sustentado pela maioria dos grupos estudados. Essa posição deve-se à extrema riqueza do Domínio da Mata Atlântica nesse estado, ultrapassando o endemismo encontrado em estados com razoável representatividade desse Domínio em termos de área, mas situados mais ao sul, como São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Por outro lado, as últimas posições do Rio Grande do Norte e de Sergipe, tanto em número de espécies (tab. 10) quanto em endemismos (tab. 11), refletem antes uma carência de estudos, informações e coleta do que baixa diversidade.

Para boa parte dos estados brasileiros os números apresentados nas tabelas 10 e 11 não refletem a realidade de riqueza e endemismo de fungos e plantas, mas o resultado da documentação deficiente acerca do assunto.

	FUNGOS	ALGAS	BRIÓFITAS	SAMAMBAIAS E LICÓFITAS	GIMNOSPERMAS	ANGIOSPERMAS	TOTAL
Minas Gerais	399	79	687	580	4	10.039	11.788
São Paulo	1.161	1.489	840	561	6	6.921	10.978
Rio de Janeiro	443	1.809	873	552	5	6.768	10.450
Bahia	584	680	468	313	2	7.686	9.733
Amazonas	408	394	440	294	12	7.528	9.076
Paraná	529	995	469	426	6	5.262	7.687
Pará	302	271	320	171	4	5.626	6.694
Rio Grande do Sul	856	1.095	526	326	7	3.673	6.483
Santa Catarina	482	532	512	402	6	4.112	6.046
Goiás	104	175	277	178	5	4.818	5.557
Espírito Santo	45	740	419	331	3	3.971	5.509
Mato Grosso	135	105	307	229	5	4.585	5.366
Pernambuco	937	584	321	164	1	2.421	4.428
Acre	61	29	169	182	8	3.740	4.189
Mato Grosso do Sul	82	44	191	104	1	2.816	3.238
Distrito Federal	77	131	163	107	3	2.672	3.153
Rondônia	116	36	150	86	4	2.544	2.936
Maranhão	52	169	72	40	0	2.414	2.747
Roraima	75	18	188	98	0	2.239	2.618
Amapá	88	123	94	75	1	2.198	2.579
Ceará	106	250	158	96	0	1.888	2.498
Paraíba	261	203	82	29	0	1.272	1.847
Alagoas	290	157	77	65	1	1.102	1.692
Piauí	139	29	57	21	0	1.416	1.662
Tocantins	5	36	56	20	0	1.354	1.471
Rio Grande do Norte	148	380	16	8	0	707	1.259
Sergipe	215	81	50	10	1	770	1.127

Tabela 10
Riqueza de espécies de fungos, algas e plantas terrestres por unidade da Federação, em ordem decrescente do total de espécies.

CONCLUSÕES

O Brasil resguarda uma expressiva fração da diversidade mundial de fungos e plantas. Apesar da riqueza total registrada neste trabalho com relação ao mundo ser menor (cerca de 10%) do que as estimativas sugeridas anteriormente (mais de 16%), o Brasil apresenta 18.932 espécies endêmicas, ou seja, uma das maiores taxas de endemismo (46,2%) do planeta.

Levando em conta apenas as plantas vasculares (samambaias e licófitas, gimnospermas e angiospermas), o Brasil é o primeiro do mundo em termos de número de espécies (32.364) e de espécies endêmicas (18.082), sendo ultrapassado por outros países apenas em termos de taxa de endemismo.

As deficiências de estudos, apontadas por meio da análise dos resultados do presente catálogo, concentram-se nos grupos de fungos e algas como um todo e de pesquisas taxonômicas no extenso e proporcionalmente muito pouco explorado Domínio da Amazônia.

Espera-se que a falta de informações evidenciada para algumas unidades da Federação estimulem os botânicos brasileiros, sobretudo nas instituições locais, a intensificarem os esforços de coleta e melhor documentação da diversidade, com vistas a complementar os registros de ocorrência de espécies nas próximas versões da lista disponível *on-line*.

Para retratar de forma mais confiável a impressionante biodiversidade do Brasil é necessário principalmente: ampliar e incrementar os esforços de catalogação, envolvendo coletas multidisciplinares intensificadas dos grupos e regiões cujo conhecimento ainda é precário; investigar o grande número de nomes conhecidos apenas a partir do material-tipo; intensificar o apoio à curadoria de coleções e de acesso às mesmas para o registro sistemático do conhecimento já existente; e disponibilizar dados (espécimes, bibliografia, bancos de dados) *on-line*, visando agilizar o processo de identificação, descrição de novas espécies, elaboração de revisões e investimento na formação de novos taxonomistas.

Esta obra, colocando o Brasil em primeiro lugar em termos da riqueza de espécies e endemismo bruto, com ecossistemas riquíssimos e em grande parte exclusivos do território nacional, deve servir de alerta para as dimensões da responsabilidade que a nação tem com relação à proteção da biodiversidade em termos mundiais.

	FUNGOS	ALGAS	BRIÓFITAS	SAMAMBAIAS E LICÓFITAS	GIMNOSPERMAS	ANGIOSPERMAS	TOTAL
Minas Gerais	16	0	17	28	0	2.158	2.219
Bahia	29	0	7	9	0	1.621	1.666
Rio de Janeiro	38	9	24	31	0	1.181	1.283
Amazonas	40	7	20	13	0	692	772
Goiás	9	0	4	9	1	520	543
Espírito Santo	0	0	1	14	0	472	487
São Paulo	50	13	13	10	0	354	440
Pará	10	1	0	1	0	290	302
Mato Grosso	6	0	5	4	0	262	277
Rio Grande do Sul	54	6	10	13	0	177	260
Santa Catarina	31	0	7	7	0	183	228
Paraná	9	0	4	2	0	188	203
Acre	1	0	0	3	0	108	112
Pernambuco	34	0	1	0	0	76	111
Mato Grosso do Sul	0	0	1	1	0	59	61
Ceará	6	0	0	0	0	49	55
Rondônia	2	0	0	0	0	47	49
Maranhão	0	0	0	0	0	48	48
Tocantins	0	0	0	0	0	48	48
Distrito Federal	3	0	0	1	0	36	40
Amapá	2	0	0	0	0	37	39
Piauí	2	0	1	0	0	33	36
Roraima	0	1	1	4	0	29	35
Paraíba	8	0	0	0	0	9	17
Alagoas	2	0	0	0	0	10	12
Rio Grande do Norte	0	0	0	0	0	3	3
Sergipe	0	0	0	0	0	2	2

Tabela 11
Número de espécies endêmicas de fungos, algas e plantas terrestres por unidade da Federação, em ordem decrescente do total.

REFERÊNCIAS

Ab'Saber, A.N. 1983. O Domínio dos cerrados: introdução ao conhecimento. *Fundação Centro de Formação do Servidor Público* 3(4): 41-55.
Authors of Plant Names. 2009. The International Plant Names Index (IPNI). Published on the Internet http://www/ipni.org [accesso em 15 de março de 2009].
Barbosa, M.R.V.; Sothers, C.; Mayo, S.; Gamarra-Rojas, C. & Mesquita, A.C. (orgs.). 2006. *Checklist das plantas do Nordeste brasileiro: Angiospermas e Gymnospermas*. Brasília: Ministério de Ciência e Tecnologia.
Bernal, R. 2009. A elaboração do Catálogo de Plantas da Colômbia. In: *Simpósio Metas da Convenção da Biodiversidade para 2010: construindo a Lista de Espécies do Brasil*. 60º Congresso Nacional de Botânica, Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana: Sociedade Botânica do Brasil.
Bramwell, D. 2002. How many plant species are there? *Plant Talk* 28: 32–33.
Brummitt, R. & Powell, C.E. (eds.) 1992. *Authors of Plant Names*. Royal Botanical Gardens, Kew.
Cáceres, M. E. S. 2007. *Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil*. 1ª ed. Eching: IHW-Verlag.
Costa, D.P. 2009. Briófitas. In: Stehmann, J.R., Forzza, R.C., Salino, A., Sobral, M., Costa, D.P. & Kamino, L.H.Y. (Eds.). *Plantas da Floresta Atlântica*. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. p. 13-17.
Daly, D.C. & Prance, G.T. 1989. Brazilian Amazon. In: Campbell, D.G. & Hammond, H.D. (Eds.). *Floristic Inventory of Tropical Countries*. New York Botanical Garden, New York. p. 401–426.
Daly, D.C. & Silveira, M. 2009. *Primeiro catálogo da flora do Acre, Brasil/First Catalogue of the Flora of Acre, Brazil*. Rio Branco: EDIUFAC. 421p.
Engler, H.G.A. 1874. Simarubaceae. In C.F.P. Martius & A.G. Eichler (eds.) *Flora brasiliensis* 12(2): 197–248.
Flora Brasiliensis Revisitada. 2009. Publicado na Internet: http://flora.cria.org.br [acesso em 10 de março de 2009].
Gamarra-Rojas, C. & Sampaio, E.V. 2002. Espécies da caatinga no banco de dados do CNIP. In: Sampaio, E.V.S.B., Giulietti, A.M., Virgínio, J. & Gamarra-Rojas, C.F.I. (eds.), *Vegetação e flora da Caatinga*. Recife: Associação Plantas do Nordeste (APNE), Centro Nordestino de Informação sobre Plantas (CNIP). p. 91-101.
Giam, X.; Bradshaw, C.J.A.; Tan, H.T.W.; Sodhi, N.S. 2010. Future Habitat Loss and the Conservation of Plants Biodiversity. *Biological Conservation* 143: 1594–1602.
Giulietti, A.M.; Harley, R.M.; Queiroz, L.P.; Barbosa, M.R.V.; Bocage Neta, A.L. & Figueiredo, M.A. 2002. Espécies endêmicas da caatinga. In: Sampaio, E.V.S.B., Giulietti, A.M., Virgínio, J. & Gamarra-Rojas, C.F.I. (eds.). *Vegetação e flora da Caatinga*. Recife: Associação Plantas do Nordeste (APNE), Centro Nordestino de Informação sobre Plantas (CNIP). p. 103-118.
Giulietti, A.M.; Harley, R.M.; Queiroz, L.P.; Wanderley, M.G.L. & Van den Berg, C. 2005. Biodiversidade e conservação das plantas no Brasil. *Megadiversidade* 1: 52–61.
Giulietti, A.M.; Menezes, N.L.; Pirani, J.R.; Meguro, M.; Wanderley, M.G.L. 1987. Flora da Serra do Cipó, Minas Gerais: Caracterização e lista de espécies. *Boletim de Botânica da Univ. São Paulo* 9: 1-151.
Giulietti, A.M. & Pirani, J.R. 1988. Patterns of Geographic Distribution of Some Plant Species from the Espinhaço Range, Minas Gerais and Bahia. In: Heyer, W.R. & Vanzolini, P.E. (eds.). *Proceedings of a Workshop on Neotropical Distribution Patterns*. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 39-69.
Goldblatt, P., Manning, J.C. & Snijman, D. 2005. Cape Plants: Corrections and Additions to the Flora. I. *Bothalia* 35: 35-46.
Govaerts, R. 2001. How many species of seed plants are there? *Taxon* 50: 1085-1090.
Gradstein, S.R. & Costa, D.P. 2003. The Hepaticae and Anthocerotae of Brazil. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 87: 1-318.
Groombridge, B. (ed.) 1992. *Global Biodiversity*. London: Chapman & Hall.
Hammond, P.M. 1992. Species Inventory. In: Groombridge, B. (ed.) *Global Biodiversity, Status of the Earth's Living Resources*. London: Champman & Hall, p. 17-39.
Hennen, J.F.; Figueiredo, M.B.; Carvalho Jr., A. de A.; Hennen, P.G. 2005. Catalogue of the Species of Plant Rust Fungi (Uredinales) of Brazil http://jbrj.gov.br
Heywood, V.H. & Davis, S.D. 1997. Introduction. In: Davis, S.D. & Heywood, V.H. (eds.). *Centres of Plant Diversity*, vol. 3: The Americas: 1-38. Information Press.
Hooker, J.D. 1893. Preface. In: Jackson, B.D. (ed.). *Index Kewensis: an Enumeration of the Genera and Species of Flowering Plants from the Time of Linnaeus to the Year 1885 Inclusive*. Oxford: Clarendon.
IBGE 2010. Mapa de biomas brasileiros. Publicado na Internet: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/default_prod.shtm#MAPAS [acesso em 30 de junho de 2010].
International Plant Names Index (IPNI). 2009. http://www.ipni.org/stats.html [acesso em 7 de julho de 2010].
Jarvis, C. 2007. *Order out of Chaos. Linnaean Plant Names and their Types*. Londres: Linnean Society of London and Natural History Museum.
Kirk P.M.; Cannon, P.F.; David, J.C. & Stalpers J.A. (eds.) 2008. *Dictionary of the Fungi*. 11ª ed. Wallingford: CABI Publishing.

Lewinsohn, T.L. & Prado, P.I. 2002. *Biodiversidade brasileira, síntese do estado atual do conhecimento*. Editora Contexto. 176 p.
Lewinsohn, T.L. & Prado, P.I. 2005. Quantas espécies há no Brasil? *Megadiversidade* 1: 36-42.
Linnaeus, C. 1753. *Species Plantarum*. Stockholm: Laurentii Salvii.
Martinelli, G.; Vieira, C.M.; Gonzalez, M.; Leitman, P.; Piratininga, A.; Costa, A.F. & Forzza, R.C. 2008. Bromeliaceae da Mata Atlântica Brasileira: Lista de espécies, distribuição e conservação. *Rodriguésia* 59(1): 209-258.
Martius, C.F.P.; Eschweiler, G.G. & Nees ab Esenbeck, C.G. 1833. *Flora brasiliensis, pars prior.* Stuttgartiae et Tubingen: Sumptibus J.G. Cottae, p. 1-50.
Mendonça, R.C.; Felfili, J.M.; Walter, B.M.T.; Silva Júnior, M.C.; Rezende, A.V.; Filgueiras, T.S., Nogueira, P.E. & Fagg, C.W. 2008. Flora vascular do bioma Cerrado: checklist com 12.356 espécies. In: Sano, S.M., Almeida, S.P. & Ribeiro, J.F. *Cerrado: ecologia e flora*. Brasília: Embrapa Cerrados/ Embrapa Informação Tecnológica, v.2., p.421-1279.
Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2009. Algas – Diagnóstico Preliminar da Biodiversidade no Brasil. In: *Simpósio Metas da Convenção da Biodiversidade para 2010: construindo a Lista de Espécies do Brasil*. 60º Congresso Nacional de Botânica, Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana: Sociedade Botânica do Brasil.
Menini Neto, L.; Forzza, R.C. & Zappi, D. 2009. Angiosperm Epiphytes as Conservation Indicators in Forest Fragments: A Case Study from Southeastern Minas Gerais, Brazil. *Biodiversity and Conservation* 18: 3785-3807.
Mittermeier, R.A. 1988. Primate Diversity and the Tropical Forests. In: Wilson, E.O. (ed.) *Biodiversity*. Washington: National Academy Press.
Mittermeier, R.A.; Robles-Gil, P. & Mittermeier, C. 1997. *Megadiversity. Earth's Biological Wealthiest Nations*. Mexico City: CEMEX/Agrupación Sierra Madre.
Mittermeier, R.A.; Myers, N.; Thomsen, J.B.; Fonseca G.A.B. da, & Olivieri, S. 1998. Biodiversity Hotspots and Major Tropical Wilderness Areas: Approaches to Setting Conservation Priorities. *Conservation Biology* 12: 516-520.
Mittermeier, R.A.; Robles-Gil, P.; Hoffmann, M.; Pilgrim, J.; Brooks, T.; Mittermeier, C.G.; Lamoreux, J. & Fonseca, G.A.B. 2004. *Hotspots Revisited*. Mexico City: CEMEX/Agrupación Sierra Madre.
MMA.1998. *Primeiro relatório nacional para a Convenção da Diversidade Biológica*. Brasília: Ministério do Meio Ambiente.
Moran, R.C. 2008. Diversity, Biogeography, and Floristics. In: T.A. Ranker & C.H. Haufler (eds.). *Biology and Evolution of Ferns and Lycophytes*. Cambridge: Cambridge University Press, p. 367-394.
Myers, N. 1988. Threatened Biotas: 'Hotspots' in Tropical Forests. *The Enviornmentalist* 8: 1-20.
Oliveira, E.C.; Horta, P.A.; Amancio, C.E. & Silva, B.N.T. 2007. Algas marinhas bênticas do Brasil. http://www.ib.usp.br/algaemaris
Paton, A.J.; Brummit, N.; Govaerts, R.; Harman, K.; Hinchcliffe, S.; Allkin, B. & Nic Lughadha, E. 2008. Towards Target 1 of the Global Strategy for Plant Conservation: a Working List of all Known Plant Species – Progress and Prospects. *Taxon* 57: 602-611.
Pirani, J.R., Mello-Silva, R. & Giulietti, A.M. 2003. Flora de Grão Mogol, Minas Gerais, Brasil. *Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo* 21(1): 1-24.
Prado, J. 1998. Pteridófitas do Estado de São Paulo. In: C.E.M. Bicudo & G.J. Shepherd (eds.). *Biodiversidade do Estado de São Paulo. 2. Fungos macroscópicos & plantas*. São Paulo: Fapesp, p. 47-61.
Prance, G.T. 1977. Floristic Inventory of the Tropics: Where do We Stand? *Annals of the Missouri Botanical Garden* 64: 661-684.
Prance, G.T. 2001. Discovering the Plant World. *Taxon* 50: 345-359.
Prance, G.T.; Beentje, J.; Dransfield, J. & Johns, R. 2000. The Tropical Flora Remains Undercollected. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 87: 67-71.
Procopiak, L.K.; Fernandes, L.F. & Moreira filho, H. 2006. Diatomáceas (Bacillariophyta) marinhas e estuarinas do Paraná, Sul do Brasil: lista de espécies com ênfase em espécies nocivas. *Biota Neotropica* 6(3). http://www.biotaneotropica.org.br
Queiroz, L. P.; Conceição, A. A. & Giulietti, A. M. 2006. Nordeste semiárido: caracterização geral e lista das fanerógamas. In: Giulietti, A. M., Conceição, A. A., Queiroz, L. P. (eds.). *Instituto do Milênio do Semiárido – Diversidade e caracterização das fanerógamas do semiárido brasileiro*. Recife: Associação Plantas do Nordeste. Vol. 1, p. 15-359.
Rapini, A.; Ribeiro, P.L.; Lambert, S. & Pirani, J.R. 2009. A flora dos campos rupestres da Cadeia do Espinhaço. *Megadiversidade* 4: 16-24.
Salino, A. & Almeida, T.E. 2009. Pteridófitas. In: Stehmann, J.R.; Forzza, R.C.; Salino, A.; Sobral, M.; Costa, D.P. & Kamino, L.H.Y. (eds.). *Plantas da Floresta Atlântica*. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, p. 19-25.
Scotland, R.W. & Wortley, A.H. 2003. How Many Species of Seed Plant Are There? *Taxon* 52: 101 -104
Shepherd, G.J. 2005. Plantas terrestres. In. Lewinsohn, T.M. (org.). Avaliação do estado do conhecimento da biodiversidade brasileira. *Série Biodiversidade* 15(2): 145–192.

Sobral, M. & Stehmann, J.R. 2009. An Analysis of new Angiosperm Species Discoveries in Brazil (1990 – 2006). *Taxon* 58(1): 227-232.
Spellerberg, I.F. & Sawyer, J.W.D. 1999. *An Introduction to Applied Biogeography*. Cambridge: Cambridge University Press.
Stannard, B.L. (ed.) 1995. *Flora of the Pico das Almas, Chapada Diamantina, Bahia, Brazil*. Londres: Royal Botanic Gardens, Kew.
Stehmann, J.R.; Forzza, R.C.; Salino, A.; Sobral, M.; Costa, D.P. & Kamino, L.H.Y. (eds.). 2009. *Plantas da Floresta Atlântica*. Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 505 p.
Thorne, R.F. 2002. How Many Species of Seed Plants Are There? *Taxon* 51: 511-512.
Urban, I. 1906. Index Familiarum. In: Martius, C.P.F. von. *Flora brasiliensis* 1(1): 239-268.
Veloso, H.P.; Rangel Filho, A.L.R. & Lima, J.C.A. 1991. *Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal*. Rio de Janeiro: IBGE, 123 p.
Von Staden, L.; Raimondo, D. & Foden, W. 2009. Introduction. In: Raimondo, D., von Staden, L., Foden, W., Victor, J.E., Helme, N.A., Turner, R.C., Kamundi, D.A. & Manyama, P.A. (eds.). Red List of South African plants 2009. *Strelitzia* 25: 1-5.
Wilson, E.O. 1988. The Current State of Biological Diversity. In: Wilson, E.O.; Peter, F.M. (eds.) *Biodiversity*. Washington: National Academy Press, p.3-18.
Wilson, E.O. 1992. *The Diversity of Life*. Cambridge: Belknap Press.
World Checklist of Selected Plant Families. 2009. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://apps.kew.org/wcsp/ accesso em 12 de março de 2009.
Zappi, D.C.; Lucas, E.; Stannard, B.L.; Nic Lughadha, E.; Pirani, J.R.; Queiroz, L.P.; Atkins, S.; Hind, D.J.N.; Giulietti, A.M.G.; Harley, R.M. & Carvalho, A.M. 2003. Lista das plantas vasculares de Catolés, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. *Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo* 21(2): 345-398.
Zuloaga, F.O.; Morrone, O. & Belgrano, M.J. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), vol. 1. *Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden* 107.

APÊNDICE

	todos os grupos	fungos	algas	plantas*	plantas terrestres	briófitas	plantas vasculares	samambaias e licófitas	plantas com sementes	gimnospermas	angiospermas
***FLORA BRASILIENSIS* (URBAN 1906, MARTIUS ET AL. 1833)**	19.958	177	80	19.781	19.701	(189 + 79) 268	19.433	576	18.857	11	18.846
MMA (1998)							50.000-56.000	1.200-1.300			
GOVAERTS (2001)									35.664		
GIULIETTI ET AL. (2005)				56.000		3.100-3.200		1.400		14-16	50.000
SHEPHERD (2005)					44.339-49.541	3.125		1.200-1.400		14-16	40.000 – 45.000*
COSTA (2009)						1660					
MENEZES & BICUDO (2009)			5614								
LEWINSOHN & PRADO (2005)	61.710-70.208	13.503-14.923	4.180-5.770	47.195-55.285	43.015-49.515	1.800-3.100	41.215-56.415	1.200-1.400	40.015-45.015	15	40.000-45.000
LEWISOHN & PRADO (2005) (COM ESPÉCIES AINDA NÃO DESCRITAS)	238.900-388.800	150.300-263.900	40.100-70.400		48.500-54.500						
THORNE (1973 APUD SHEPHERD 2005)											30.000
GROOMBRIDGE 1992 (COM ESPÉCIES AINDA NÃO DESCRITAS)											55.000
CATÁLOGO 2010	40.989	3.608	3.496	37.381	33.885	1.521	32.364	1176	31.188	26	31.162
% DA *FLORA BRASILIENSIS*	48,7	4,9	2,3	52,9	58,1	17,6	60	49	60	42,3	60,5
% DE ACRÉSCIMO DESDE A *FLORA BRASILIENSIS*		2038,4	4370			567,5	166,5	204,2	165,4	236,4	165,4
ESTIMATIVA PRÉVIA MAIS BAIXA	63.456	12.914	7.527	50.542	43.015	1.650	41.215	1.200	35.664	14	30.000
ESTIMATIVA PRÉVIA MAIS ALTA	73.956	13.914	10.527	60.042	49.515	3.200	56.000	1.400	45.015	16	45.000
% DO CATÁLOGO SOBRE A ESTIMATIVA PRÉVIA MAIS BAIXA	64,6	27,9	46,4	74	78,8	92,2	78,5	98	87,4	185,7	103,9
% DO CATÁLOGO SOBRE A ESTIMATIVA PRÉVIA MAIS ALTA	55,4	25,9	33,2	62,3	68,4	47,5	57,8	84	69,3	162,5	69,2

Tabela A

Estimativas para o Brasil de espécies registradas, comparadas com o presente catálogo.

***** a estimativa de Shepherd é para espécies já descritas de fanerógamas utilizando a proporção *Flora brasiliensis*: *Flora neotrópica*. Nesta tabela não foi possível efetuar uma separação completa entre essas duas categorias (registradas e esperadas), mas os números usados nas comparações foram baseados em espécies descritas sempre que possível.

	todos os grupos	fungos	algas	plantas terrestres	briófitas	plantas vasculares	samambaias e licófitas	plantas com sementes	gimnospermas	angiospermas
HAMMOND (1992)			26.900							
MMA (1998)						250.000***				
GOVAERTS (2001)								422.127		
PRANCE (2001)		70.000*	40.000**		14.000		13.000		600+	286.000
BRAMWELL (2002)										421.968
THORNE (2002)								260,000		
SCOTLAND & WORTLEY (2003)								223,000		
SHEPHERD (2005)					14.000		9.000-12.000		806	
LEWINSOHN & PRADO (2005)	414.066-429.966	72.831-74.331	76.829	264.460-278.860	14.000-16.000	250.460-262.860	9.600-12.000	240.860-250.860	806	240.000-250.000
PATON ET AL. (2008)				379.599	13.370	366.229	12.838	353.391	1.391	352.000
KIRK ET AL. (2008)		99.000								
COSTA (2009)					18.000					
ESTIMATIVAS PRÉVIAS MAIS BAIXAS PARA O MUNDO	414.066	70.000	40.000	26.4460	13.370	250.000	9.000	223.000	806	240.000
ESTIMATIVAS PRÉVIAS MAIS ALTAS PARA O MUNDO	429.966	74.331	73.829	379.599	18.000	366.229	12.838	422.127	1.391	421.968
CATÁLOGO 2010 % ESTIMATIVAS PRÉVIAS MAIS BAIXAS	9,9	5,2	8,7	12,8	11,4	12,9	13,1	14	3,2	13
CATÁLOGO 2010 % ESTIMATIVAS PRÉVIAS MAIS ALTAS	9,5	4,9	4,7	8,9	8,5	8,8	9,2	7,4	1,9	7,4

Tabela B

Estimativas mundiais baseadas em dados publicados para fungos e plantas, comparadas com o presente catálogo.

*Prance cita Hawksworth 1991

**Prance cita Andersen 1992

***calculado a partir dos números apresentados

REFERÊNCIAS	FUNGOS	ALGAS	PLANTAS TERRESTRES	BRIÓFITAS	SAMAMBAIAS E LICÓFITAS	GIMNOSPERMAS	ANGIOSPERMAS
PRANCE (1977)	120.000-250.000	17.000		23.000	12.000	750	240.000
WILSON (1992)		40.000					
GROOMBRIDGE (1992)				14.000	10.000-13.000	600+	240.000-750.000
PRANCE ET AL. (2000)						600+	300.000-320.000
PRANCE (2001)	1.600.000	350.000		23.000			320.000
LEWINSOHN & PRADO (2005)	1.500.000	400.000	320.000				
MORAN (2008)					13.600		
ESTIMATIVAS MUNDIAIS MAIS ALTAS	1.600.000	400.000		23.000	13.600	750	750.000
ESTIMATIVAS MUNDIAIS MAIS BAIXAS	12.0000	17.000		14.000	10.000	600	240.000
CATÁLOGO 2010 % ESTIMATIVAS MUNDIAIS MAIS ALTA	0,2	0,9		6,6	8,6	3,5	4,2
CATÁLOGO 2010 % ESTIMATIVAS MUNDIAIS MAIS BAIXAS	3	20,6		10,9	11,8	4,3	13

Tabela C
Estimativas mundiais baseadas em dados esperados para fungos e plantas, comparadas com o presente catálogo.

OS FUNGOS DO BRASIL

Leonor C. Maia & Anibal A. de Carvalho Junior

CARACTERIZAÇÃO DOS FUNGOS E RECENTES CLASSIFICAÇÕES

Os fungos são organismos heterotróficos unicelulares ou pluricelulares, estes últimos caracterizados pela formação de estruturas filamentosas, as hifas, que constituem o micélio. Na fase reprodutiva, o micélio forma estruturas assexuadas e/ou sexuadas que originam os esporos, principais responsáveis pela propagação das espécies. Vivendo nos mais diversos ambientes aquáticos e terrestres, dos trópicos às regiões árticas e antárticas, muitos fungos são tão pequenos que só podem ser observados ao microscópio, enquantos vários outros são capazes de formar estruturas visíveis a olho nu e facilmente reconhecíveis (mofos, bolores, boletos, orelhas-de-pau, dedos-do-diabo, estrelas-da-terra, ninhos-de-passarinho, cogumelos, etc.).

O registro fóssil dos microrganismos muitas vezes apresenta limitações em sua interpretação devido às frequentes alterações no sedimento em que são encontrados, por possuírem estrutura muito delicada e por sofrerem mudanças genéticas não refletidas na sua morfologia, entre outras. Grande parte do registro fóssil dos fungos passou por muita desagregação ao longo do tempo, tornando-se muitas vezes inadequado para análises mais minuciosas. Evidências recentes tanto por meio da reinterpretação de dados quanto por aquisição de novos fósseis têm contribuído para fundamentar novos conhecimentos (Alexopoulos et al. 1996). Segundo este autor, o primeiro registro de fósseis de fungos data do Proterozoico posterior (há cerca de 900-570 milhões de anos), nos quais foram identificadas formas semelhantes aos Oomycota (Stramenopila), alguns protistas e provavelmente também fungos verdadeiros. Para essa época não foram encontrados registros de fósseis terrestres; nos oceanos, os mais antigos fósseis de metazoários foram descobertos na região de Ediacara, Austrália, assim como foram localizados também fósseis em forma de vermes e protistas unicelulares.

No período Siluriano (438-408 milhões de anos) foram encontrados esporos de prováveis Ascomycota associados a formas terrestres de microartrópodos (Sherwood-Pike & Gray 1985 apud Alexoupoulos et al. 1996), assim como hifas fósseis associadas a madeira deteriorada e vesículas de Endogonales, Glomales e quitrídios associadas a sítio paleontológico em Rhynie, Escócia (Alexopoulos et al. 1996, Smith & Read 2008). Ao mesmo tempo, surgiam as rinófitas, licófitas e progimnospermas, acarretando a diversificação de plantas terrestres.

Na era paleozoica, a diversidade fúngica aumentou consideravelmente e, na época pensilvaniana (320-286 milhões de anos), todas as classes modernas de fungos já eram encontradas. Da mesma forma, na

era paleozoica houve grande diversificação das gimnospermas, licófitas, esfenófitas, Pterodermales e samambaias (Alexopoulos et al. 1996).

Existe grande diversidade de ciclos vitais nos fungos, mas, em linhas gerais, a maioria apresenta ciclos reprodutivos assexuados (mitose) e sexuados (plasmogamia, cariogamia e meiose). Em Ascomycota e Basidiomycota usualmente ocorre uma fase dicariótica, com a presença de núcleos geneticamente distintos no mesmo segmento de hifa, pois a plasmogamia não é seguida de imediato pela cariogamia, como nos demais fungos.

O termo teleomórfico é utilizado para o fungo que se encontra na etapa sexuada do ciclo, enquanto anamórfico é usado para a fase assexuada. Assim, dois nomes poderão ser atribuídos a uma mesma espécie (um para a fase anamórfica, outro para a teleomórfica), sendo prioritário o do teleomorfo no caso de as duas fases estarem presentes. No caso das Pucciniales, até três nomes podem ser aplicados a uma única espécie: dois correspondentes a estádios anamórficos e um ao estádio teleomórfico ou ao holomórfico (fungo que apresenta ao mesmo tempo as duas fases reprodutivas).

Aproximadamente 99.000 espécies de fungos estão descritas (Kirk et al. 2008), o que representa apenas 6,6% das 1.500.000 estimadas no mundo (Hawksworth 2001, Kirk et al. 2001). Historicamente houve muitas controvérsias e dificuldades em delimitar os fungos como um grupo, com inclusões e exclusões comuns no último século. Em anos recentes os esforços dos taxonomistas na direção de uma definição filogenética baseada principalmente em similaridades de sequências relevantes de DNA aliadas à morfologia e aspectos fisiológicos, como produção de açúcares e outros compostos, agregaram informações importantes para a delimitação do grupo.

Jahn & Jahn (1949) e Whittaker (1969) foram os primeiros a propor a classificação dos fungos em um reino à parte, exclusivo para organismos eucarióticos com modo de nutrição por absorção, que vivem como sapróbios, parasitas e simbiontes. Essas classificações já sugeriam que grupos como Oomycota, Myxomycota, Acrasiomycota e Labyrinthulomycota não seriam monofiléticos. De fato, Barr (1992) e, posteriormente, Hawksworth et al. (1995) sugeriram sua classificação em outros reinos, ou seja: Oomycota em Stramenopila e os demais dentro de Protista. Entretanto, estes organismos continuam sendo estudados por micologistas e, por conveniência, são aqui apresentados numa categoria denominada "fungos *lato sensu*" (fungos "falsos").

A classificação mais recente dos fungos "verdadeiros" (*stricto sensu*), baseada em estudos filogenéticos e proposta por um grupo representativo de micologistas especialistas nos diversos grupos (Hibbett et al. 2007), considera os seguintes filos: Chytridiomycota, Blastocladiomycota, Neocallimastigomycota, Microsporidia, Glomeromycota, Ascomycota e Basidiomycota. Esses autores não reconhecem Zygomycota e o separam em quatro subfilos (Mucoromycotina, Kickxellomycotina, Zoopagomycotina e Entomophthoromycotina). Assim, na nova classificação do reino dos fungos, são considerados sete filos, 10 subfilos, 35 classes, 12 subclasses e 129 ordens (Hibbett et al. 2007).

Apesar de ainda persistirem controvérsias em relação à monofilia dos Chytridiomycota, esse grupo continua sendo incluído entre os fungos "verdadeiros". Quanto aos filos Blastocladiomycota e Neocallimastigomycota, eles foram segregados dos fungos flagelados. A inclusão de Microsporidia, que congrega organismos unicelulares parasitas de animais e protistas, não está confirmada. Chytridiomycota, Zygomycota e Glomeromycota apresentam hifas contínuas, asseptadas ou cenocíticas, enquanto Ascomycota e Basidiomycota apresentam hifas regularmente interrompidas por septos. Os Chytridiomycota possuem centríolos e flagelos, enquanto nos demais fungos verdadeiros essas estruturas estão ausentes. Esse filo de fungos zoospóricos produz esporos sexuados conhecidos como oosporos. Zygomycota, que inclui, entre outros, os "mofos" do pão e das frutas, produzidos por espécies de gêneros diversos, como *Rhizopus* e *Mucor*. Seus esporos sexuados são denominados zigosporos. Os Glomeromycota são simbiontes obrigatórios que formam micorriza arbuscular; não se conhece reprodução sexuada no grupo e os esporos, caracteristicamente unicelulares e multinucleados, são denominados glomerosporos. Os Ascomycota produzem, por reprodução sexuada, esporos endógenos, delimitados por estruturas especializadas denominadas ascos, que, em geral, ficam protegidas em ascomas. Incluem fungos filamentosos e leveduras, sendo comuns espécies de *Aspergillus* e *Penicillium*, entre outras. Os Basidiomycota são fungos de morfologia bastante diversificada que, na reprodução sexuada, formam esporos (basidiosporos) em estruturas especializadas, os basídios, encontrados em basidiomas que podem ser vistosos e alcançar tamanho destacado. Incluem os boletos, as orelhas-de-pau, as estrelas-da-terra, os ninhos-de-passarinho e os cogumelos, entre outros, como as ferrugens e os carvões, conhecidos fitopatógenos que não formam basidiomas.

Deste modo, os fungos podem ser delimitados pelas seguintes características: nutrição heterotrófica, principalmente por absorção; estádio vegetativo sobre o substrato ou no interior dele, com micélio tipicamente não móvel (estádios reprodutivos móveis podem ocorrer); paredes celulares usualmente contendo glucanas e quitina e raramente glucanas e celulose (Oomycota); eucariotos, uni- ou multinucleados sendo homo- ou heterocarióticos, haploides, dicarióticos ou diploides; ciclo de vida simples ou mais usualmente complexo; reprodução sexual (cariogamia e meiose) e/ou parassexual (cariogamia seguida de aneuploidia) e/ou assexual (divisão nuclear mitótica) podem estar presentes; propágulos formados por esporos microscópicos produzidos em grande número (esporos móveis confinados a certos grupos); esporocarpos microscópicos ou macroscópicos e com formas características constituídos por pseudotecidos; muito frequentes em ambientes terrestres ou de água doce e menos frequentes em ambientes marinhos; saprofíticos, simbiontes ou parasitas; cosmopolitas.

COMPILAÇÃO DOS DADOS

Para a elaboração deste catálogo, num primeiro momento foram contactados micologistas que trabalham com taxonomia dos diversos grupos, sendo que a maioria enviou suas listas. Em certos casos as listas enviadas eram exclusivas da especialidade (por exemplo, anamórficos, fungos liquenizados, Glomeromycota, Myxomycota, grupos de Basidiomycota); em outros casos, basearam-se em determinados estados do país, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Após análise do material recebido, decidiu-se incluir no sistema apenas o que estivesse publicado em periódicos, livros ou catálogos impressos ou *on-line* e com dados revistos por especialistas.

De modo a acomodar todos os organismos estudados pelos micologistas, o presente catálogo foi dividido em dois grandes grupos: o dos fungos "verdadeiros" (*stricto sensu*) e o dos fungos "falsos" (*lato sensu*). Procurou-se seguir a classificação proposta por Hibbett et al. (2007), também adotada nos índices gerais de fungos, como Kirk et al. (2008), Cooper & Kirk (2009) e Blackwell et al. (2009). No entanto, aceitou-se aqui Zygomycota como filo, devido à sua praticidade. Foram considerados *stricto sensu* os filos Ascomycota, Basidiomycota, Blastocladiomycota, Chytridiomycota, Glomeromycota, Neocallimastigomycota e Zygomycota. Como *lato sensu* foram incluídos os Myxomycota e os zoospóricos que não foram classificados em Blastocladiomycota e Chytridiomycota. Os liquens foram distribuídos nas respectivas ordens em Ascomycota. Mesmo considerando que já se conhece a conexão teleomórfica de vários fungos anamórficos, imperfeitos, mitospóricos ou conidiais, optou-se pela inclusão dos mesmos em anamórficos, dentro de Ascomycota.

DIVERSIDADE DOS FUNGOS NO BRASIL

No mundo estão descritas aproximadamente 99.000 espécies de fungos (Kirk et al. 2008), das quais cerca de 13.800 existiriam no Brasil (Lewinsohn & Prado 2006), ou seja, aproximadamente 14% da diversidade mundial. Entretanto, os autores alertam que esses números se referem a inferências e estimativas que podem ter sido afetadas por uma combinação de problemas, uma vez que na época não havia qualquer lista de controle de nomes (*check-list*) para o país.

No presente catálogo estão registradas 78 ordens, 924 gêneros e 3.608 espécies, correspondendo a apenas 3,7% das descritas mundialmente. Esse número está muito aquém dos 14% estimados por Lewinsohn & Prado (2006). Independentemente dos problemas encontrados nas estimativas, esses valores denotam que muito esforço ainda deve ser despendido na sistematização de dados e na composição de coleções para se obter uma lista mais aproximada da condição real. Há que considerar também que o resultado aqui disponibilizado representa o que foi possível fazer dentro das circunstâncias para coleta de informações. Destacam-se como dificuldades enfrentadas na elaboração do catálogo a exiguidade de tempo para inclusão de registros e a necessidade de extensivas e minuciosas revisões dos dados recebidos.

Considerando os Domínios, há mais registros de espécies de fungos na Mata Atlântica (1.664 spp.), seguida pela Caatinga (734 spp.) e a Amazônia (519 spp.), com número menos representativo no Cerrado (291 spp.). Quase nenhuma informação foi registrada a respeito de espécies no Pantanal (28 spp.) e no Pampa (1 sp.) (fig. 1). A Região Nordeste é a que possui registro de maior diversidade de espécies, com 1.749, seguida pela Sudeste com 1.411, Sul com 1.320, Norte com 743 e Centro-Oeste com 296 (fig. 2).



Figura 1.
Número de espécies de fungos por Domínio Fitogeográfico.



Figura 2.
Número de espécies de fungos por Região.

Destacam-se pelo maior número de espécies os estados de São Paulo (1.161 spp.), Pernambuco (937 spp.), Rio Grande do Sul (856 spp.), Bahia (584 spp.), Paraná (529 spp.), Santa Catarina (482 spp.), Rio de Janeiro (443 spp.), Amazonas (408 spp.), Minas Gerais (399 spp.) e Pará (302 spp.). A despeito dos dados referentes ao Amazonas e ao Pará, observa-se que a Região Norte carece de coletores e estudiosos de fungos pois, nos demais estados, o número de registros é extremamente baixo: Rondônia (116 spp.), Amapá (88 spp.), Roraima (75 spp.), Acre (61 spp.) e Tocantins (5 spp.). Além desses, destacam-se ainda a Região Centro-Oeste (Mato Grosso 135 spp., Goiás 104 spp., Mato Grosso do Sul 82 spp., Distrito Federal 77 spp.), o Maranhão e o Espírito Santo como locais em que pouco se conhece acerca da diversidade micológica (tab. 1).

Do total de espécies, 523 são mencionadas como endêmicas do Brasil, porém esse número deve ser considerado com reservas, uma vez que para fungos ainda é difícil discutir endemismos, tendo em vista a pequena parcela mundialmente conhecida.

O gênero *Puccinia* destaca-se entre os demais com 252 espécies, seguido por *Uromyces*, *Xylaria*, *Uredo*, *Aecidium*, *Physarum*, entre outros (tab. 2).

ESTADO	NÚMERO DE ESPÉCIES
São Paulo	1.161
Pernambuco	937
Rio Grande do Sul	856
Bahia	584
Paraná	529
Santa Catarina	482
Rio de Janeiro	443
Amazonas	408
Minas Gerais	399
Pará	302
Alagoas	290
Paraíba	261
Sergipe	215
Rio Grande do Norte	148
Piauí	139
Mato Grosso	135
Rondônia	116
Ceará	106
Goiás	104
Amapá	88
Mato Grosso do Sul	82
Distrito Federal	77
Roraima	75
Acre	61
Maranhão	52
Espírito Santo	45
Tocantins	5

Tabela 1.
Número de espécies de fungos por unidade da Federação

Certamente o número de espécies de fungos disponibilizado no presente catálogo não reflete a totalidade do que existe no Brasil. Diversas publicações, entre as quais listas estaduais, regionais (Maia et al. 2002, Meijer 2008, Gusmão & Maia 2006, Biota Fapesp – www.biota.org.br) e gerais, como a de Mendes et al. (1998), atualizada e disponibilizada pela Embrapa (http://pragawall.cenargen.embrapa.br/aiqweb/michtml/fgbanco01.asp), não puderam ser incorporadas neste momento.

Esta é, portanto, uma lista preliminar e como tal deve ser considerada. Entretanto, representa uma rara oportunidade de dar início a uma sistematização de dados que estavam dispersos em diversas publicações e de disponibilizar informações sobre fungos que ocorrem no Brasil.

FUNGOS	TOTAL DE ESPÉCIES	ESPÉCIES ENDÊMICAS
Puccinia	252	64
Uromyces	102	32
Xylaria	91	8
Uredo	73	41
Aecidium	67	43
Physarum	50	2
Phellinus	48	5
Glomus	43	0
Ravenelia	43	28
Pythium	41	0
Penicillium	37	0
Hypoxylon	35	2
Prospodium	30	13
Graphis	30	0
Phakopsora	29	8
Achlya	27	0
Hymenochaete	26	2
Phytophthora	24	0
Mucor	23	0
Rhizophydium	23	0

Tabela 2.
Os 20 gêneros mais diversos de fungos ocorrentes no Brasil, mostrando o total de espécies e o número de endêmicas.

Apesar das dificuldades iniciais, as perspectivas de uma participação mais ampla e efetiva de colaboradores apontam para um grande incremento das informações disponíveis. Somente a abrangente adesão dos taxonomistas proporcionará a continuidade do processo de melhoria da versão *on-line* da lista.

O conhecimento mais avançado de certas regiões do Brasil coincide com os locais onde há grupos mais ativos de micologistas, enquanto para algumas unidades da Federação os dados são praticamente inexistentes. Para conhecer efetivamente as espécies de fungos do país é preciso intensificar as coletas, os estudos taxonômicos e a formação de recursos humanos especializados, de modo a atingir as áreas insuficientemente conhecidas, que são inúmeras, e disseminar de modo mais eficaz o conhecimento micológico.

REFERÊNCIAS

Alexopoulos, C.J.; Mims, C.W. & Blackwell, M. 1996. *Introductory Mycology*. 4th ed. New York: John Wiley & Sons.
Barr, D.J.S. 1992. Evolution and Kingdoms of Organisms from the Perspective of a Mycologist. *Mycologia* 84: 1-11.
Blackwell, M.; Vilgalys, R.; James, T.Y. & Taylor J.W. 2009. Fungi. Eumycota. In: The Tree of Life Web Project (http://tolweb.org/Fungi/2377/2009.04.10).
Cooper, J. & Kirk, P. 2009. Index Fungorum (www.indexfungorum.org).
Gusmão, L.F.P. & Maia, L.C. 2006. (eds.) *Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro*. v.2. Recife: Instituto do Milênio do Semi-árido, MCT/Associação Plantas do Nordeste.
Hawksworth, D.L.; Kirk, P.M.; Sutton, B.C. & Pegler, D.M. 1995. *Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi*. 8th ed. Eghan, United Kingdom: Commonwealth Mycological Institute.
Hawksworth D.L. 2001. The Magnitude of Fungal Diversity: The 1.5 Million Species Estimate Revisited. *Mycological Research* 105: 1422-1432.
Hibbett, D.S.; Binder, M.; Bischoff, J.F.; Blackwell, M.; Cannon, P.; Eriksson, O.; Huhndorf, S.; James, T.; Kirk, P.M.; Lucking, R.; Thorsten, H.; Lutzoni, F.; Matheny, P.; McLaughlin, D.; Powell,M.; Redhead, S.; Schoch, C.L.; Spatafora, J.; Stalpers, J.; Vilgalys, R.; Aime, M.; Aptroot, A.; Bauer, R.; Begerow, D.; Benny, G.; Castlebury, L.; Crous, P.; Dai, Y-W.; Gams,W.; Geiser, D.; Griffith, G.; Gueidan, C.; Hawksworth, D.; Hestmark, G.; Hosaka, K.; Humber, R.; Hyde, K.; Ironside, J.; Ko Ljalg, U.; Kurtzman, C.; Larsson, K.H.; Lichtwardt, R.; Longcore, J.; Dlikowska, M.; Miller, A.; Moncalvo, J-M.; Mozley-Standridge, S.; Oberwinkler, F.; Parmasto, E.; Reeb, V.; Rogers, J.; Roux, C.; Ryvarden, L.; Sampaio, J.P.; Schußler, A.; Sugiyama, J.; Thorn, R.; Tibell, L.; Untereiner, W.; Walker, C.; Wang, Z.; Weir, A.; Weiss,M. White, M.; Winka, K.; Yao, Y-J.; Zhang, N. 2007. A Higher-level Phylogenetic Classification of the Fungi. *Mycological Research* 111: 509-547.
Jahn T.L. & Jahn F.F. 1949. *How to Know the Protozoa*. Dubuque: Wm C. Brown.
Kirk P.M.; Cannon P.F.; David J.C.; Stalpers J.A. (eds.) 2008. Dictionary of the Fungi, 11th ed. Wallingford: CABI Publishing.
Lewinsohn T.M. & Prado P.I. 2006. Síntese do conhecimento atual da biodiversidade brasileira. In: Lewinsohn T.M. (org.). *Avaliação do estado do conhecimento da biodiversidade brasileira*. Brasília: Ministério do Meio Ambiente.
Maia, L.C.; Melo, A.M.Y. & Cavalcante, M.A. 2002. Diversidade de fungos no estado de Pernambuco. In: M. Tabarelli & J.M.C. da Silva (orgs.). *Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco*. v.1. Recife: Editora Massangana. p. 15-50.
Meijer, A.A.R. 2008. *Macrofungos notáveis das florestas do pinheiro-do-paraná*. Brasília: Embrapa.
Mendes, M.A.S.; Silva, V.L.; Dianese, J.C; Ferreira, M.A.S.V.; Santos, C.E.N., Gomes-Neto, E.; Urben, A.F. & Castro, C. 1998. *Fungos em plantas no Brasil*. Brasília: Embrapa-SPI.
Smith, S. & Read, J.D. 2008. *Mycorrhizal Symbiosis*. 3th ed. London: Academic Press.
Whittaker, R.H. 1969. New Concepts of Kingdoms of Organisms. *Science* 163: 150-160.

AS ALGAS DO BRASIL

Carlos Eduardo de Mattos Bicudo & Mariângela Menezes

CARACTERIZAÇÃO DAS ALGAS

Algae é o plural latino de alga, nome usado entre os romanos para designar certas plantas destituídas de raiz, caule e folhas, de coloração parda, vulgarmente chamadas sargaços, que eram lançadas na praia durante as ressacas. O nome Algae para designar uma categoria sistemática de plantas aparece pela primeira vez em Linnaeus (1753). Nessa categoria, entretanto, Linnaeus reuniu tanto plantas ainda hoje denominadas algas quanto alguns líquenes e briófitas. As algas são ubíquas e ocorrem em ampla variedade de hábitats, desde aquáticos até terrestres, praticamente em todas as latitudes, longitudes e altitudes do globo.

As algas constituem um "grupo" de organismos com ampla diversidade de formas, funções e estratégias de sobrevivência e que não tem origem monofilética, conforme demonstrado, em especial, pela teoria da endossimbiose dos cloroplastos e das mitocôndrias e por estudos bioquímicos e de biologia molecular. Pode-se, então, conceituar algas como organismos fotossintéticos, que variam de uni a pluricelulares e cujos órgãos de reprodução (gametângios ou esporângios uni ou pluricelulares) não são envolvidos por camada de células estéreis.

A ampla diversidade desses organismos inclui formas procarióticas (ausência de membranas envolvendo o núcleo e organelas celulares), representadas pelas cianobactérias, bem como formas eucarióticas (com membranas envolvendo o núcleo e organelas celulares), estas últimas englobando protistas autotróficos e heterotróficos e organismos multicelulares.

As algas apresentam morfologia simples, com nível de diferenciação baixo, quando comparadas a outros grupos de organismos fotossintetizantes, variando de formas unicelulares isoladas, agregados de células, colônias, filamentos simples ou ramificados, pseudoparênquimas, cenócitos (estruturas multinucleadas) até parênquimas. Algumas formas unicelulares e coloniais podem ser móveis pela presença de flagelos, e nesse caso, frequentemente são confundidas com protozoários. Representantes multicelulares das feofíceas (algas pardas), os "kelps", exibem nível de organização mais elaborado com formação de tecidos (incluindo vasos condutores) e elaborada divisão de trabalho, podendo atingir até 60 m de comprimento (South & Whittick 1987, Lee 2008).

A reprodução das algas reúne três processos: vegetativo, assexuado e sexuado. O vegetativo envolve somente divisões celulares do tipo mitose sem ocorrer alterações no número de cromossomos das células, como a divisão binária nas euglenofíceas e diatomáceas, ou múltipla com a formação de baeocitos nas cianobactérias. Nas formas multicelulares, a reprodução vegetativa pode ocorrer por

fragmentação, em especial nas formas filamentosas, como os hormogônios formados por quebra dos tricomas nas cianobactérias, pela formação de propágulos como na feofícea *Sphacelaria*, de agregados de células nos nós inferiores e os bulbilhos sobre os rizoides em algumas carofíceas. O processo assexuado envolve a formação de células especializadas, os esporos, que podem ser móveis (zoósporos) ou não (aplanósporos). Esses esporos não têm caráter de sexualidade, são formados no interior de esporângios, em geral através de divisões mitóticas, e originam diretamente novos indivíduos, como na clorofícea *Ulothrix*. O processo sexuado envolve fusão de gametas com formação de zigoto e algumas vezes de um embrião. Os gametas são formados nos gametângios masculinos, os anterídios ou espermatângios (rodofíceas), e femininos, oogônio e carpogônio (rodofíceas). Podem ser móveis por flagelos (planogametas) ou não (aplanogametas), iguais na forma e no tamanho (isogametas) ou diferentes (heterogametas). A reprodução é isogâmica quando envolve isogametas, e anisogâmica ou oogâmica quando envolve heterogametas. Quando oogâmica, os gametas diferem na forma e no tamanho, sendo o masculino muito pequeno com flagelos (anterozoides) ou não (espermácio das rodofíceas), e o gameta feminino ou oosfera maior e imóvel. Em alguns representantes, a reprodução sexuada envolve a produção de fases distintas, gametófito (n) e esporófito (2n), que se alternam em ciclos de gerações isomórficas ou heteromórficas. Representantes das rodofíceas podem apresentar ciclo trifásico, sendo uma fase haploide (gametofítica) e duas diploides (carposporofitica e tetrasporofítica) (South & Whittick 1987, Lee 2008).

Em geral nas algas, a exemplo das briófitas, a fase gametofítica é mais desenvolvida que a esporofítica. Em algumas feofíceas, como nas Desmaratiales e Laminariales, o esporófito é maior que o gametófito, enquanto nas Fucales o gametófito é reduzido, ao contrário do esporófito que se apresenta macroscópico (South & Whittick 1987; Lee 2008).

O conhecimento das algas é, de modo geral, diretamente proporcional ao avanço dos equipamentos ópticos e ao desenvolvimento de novas técnicas de estudo dos materiais ao microscópio. Nos últimos 25 ou 30 anos houve um grande aprimoramento de certos equipamentos, principalmente de microscopia eletrônica, e o desenvolvimento de novas técnicas de estudo que tornou possíveis novas perspectivas e a obtenção de dados adicionais sobre a evolução dos diferentes grupos de algas. Descobrimentos recentes levaram à postulação de ideias sobre a evolução e, por conseguinte, à proposição de uma grande quantidade de hipóteses filogenéticas e de classificação das algas. Não existe, por certo, unanimidade a respeito de determinados conceitos ou pontos de vista, mas alguns deles já se encontram bem discutidos e plenamente estabelecidos. Tais conceitos são os seguintes: (1) a origem de plastídios e mitocôndrios a partir de processo de endossimbiose; (2) a evolução do processo mitótico e, mais especificamente, do tipo de fuso mitótico, se intra ou extranuclear; e (3) a ultraestrutura da raiz dos flagelos (Hibberd & Norris,1984; Patterson 1989).

As filogenias baseadas em caracteres moleculares, quando comparadas a aspectos de ultraestrutura, confirmaram as maiores linhagens de algas anteriormente propostas. Em particular, o tipo de crista mitocondrial, caráter destacadamente conservativo, é coerente com dados de filogenia molecular (Taylor 1999).

AS ALGAS PROCARIÓTICAS – CYANOBACTERIA

As cianobactérias representam, em conjunto com as bactérias, as primeiras evidências estruturais de vida (formas procariontes) e datam do período pré-cambriano (aproximadamente 2,7 bilhões de anos). As propriedades morfológicas, bioquímicas e fisiológicas permitiram que esse grupo de organismos se estabelecesse e persistisse nos mais distintos hábitats (Palinska et al. 2006). Ocorrem ainda, em associações extracelulares com fungos, formando os líquenes, ou intracelulares, como endossimbiontes de corais (Lee 2008).

A diversidade das cianobactérias foi estudada tradicionalmente junto com as algas eucarióticas porque ambos coocorrem em uma variedade de hábitats aquáticos e compartilham da propriedade de realizarem fotossíntese oxigênica (Palinska et al. 2006).

A taxonomia das cianobactérias foi modificada substancialmente nas quatro últimas décadas, em especial após a aplicação de métodos de análise de ultraestrutura e moleculares. Essa combinação de caracteres mostra que o grupo atualmente denominado cianobactérias é constituído por linhagens evolutivas distintas (Komárek 2003). Alguns grupos são, atualmente, reconhecidos como monofiléticos, como a ordem Nostocales; entretanto, o conceito de gênero e o número de espécies que incluem encontram-se em contínua revisão. Se, por um lado, os estudos moleculares confirmam um número significativo de gêneros tradicionais identificados com base na morfologia, indicam também

uma diversidade mais ampla resultando na separação de entidades genéticas em novos gêneros (Komárek 2003, 2010).

AS ALGAS EUCARIÓTICAS

Geralmente, com base nos pigmentos fotossintéticos, reconhecem-se três "grupos" de algas eucarióticas: as clorófitas ou algas verdes (clorofilas *a* e *b*), as rodófitas ou algas vermelhas (clorofila *a* e ficobilinas), e as cromófitas ou algas castanho-amareladas (clorofilas *a* e *c*). As cromófitas têm origem polifilética e são subdivididas em criptófitas, haptófitas ou primnesiófitas, dinoflagelados e heterocontófitas, com base na ultraestrutura do plastídio, nos pigmentos fotossintéticos, no aparato flagelar e em caracteres moleculares (Cavalier-Smith et al.1994a; Medlin et al.1995;Ben Ali et al. 2001).

As criptófitas, com a única classe Cryptophyceae (Lee 2008), são organismos unicelulares biflagelados com história evolutiva obscura e controversa, sendo posicionadas filogeneticamente com outras cromófitas (Cavalier-Smith et al. 1994a) glaucocistófitas, e Acanthamoeba (Ben Ali et al. 2001).

As haptófitas ou primnesiófitas, com a classe Prymnesiophyceae (Lee 2008), são unicelulares flageladas caracterizadas por apresentarem uma organela associada aos flagelos denominada haptonema; igualmente apresentam posicionamento filogenético obscuro (Daugbjerg & Andersen 1997a,b).

As algas heterocontófitas ou Heterokontophyta (Lee 2008), também denominadas Ochrista (Cavalier-Smith et al. 1994b), reúnem diferentes subgrupos que compartilham como principais caracteres morfológicos a presença de pelos flagelares tubulares tripartidos, quatro raízes flagelares microtubulares similares e mitocôndria eletrodensa com pequenas cristas tubulares (Patterson 1989). As principais classes dentro das heterocontófitas compreendem as Phaeophyceae, Chrysophyceae, Synurophyceae, Xanthophyceae, Eustigmatophyceae, Raphidophyceae, Bacillariophyceae, Dictyocophyceae, Pelagophyceae e Phaethamniophyceae (Lee 2008).

As heterocontófitas constituem, portanto, uma assembléia de muitos grupos diferentes de algas. As relações evolutivas entre esses diferentes grupos têm sido amplamente estudadas com base em caracteres moleculares, embora as classificações tenham sido baseadas em observações de ultraestrutura e bioquímicas (Ben Ali et al. 2001). Além disso, é provável que as algas heterocontófitas, como um grupo, sejam as mais próximas a certos grupos heterotróficos como os Oomicetes e Hifoquitridiomicetes (Cavalier-Smith et al. 1994b) formando juntos as Heterokonta (Cavalier-Smith et al. 1994b) ou as Stramenopilas (Patterson 1989).

Já os dinoflagelados, com a única classe Dinophyceae (Lee 2008), são unicelulares biflagelados que se posicionam como grupo irmão dos apicomplexas, enquanto formam, junto com os ciliados, um grupo monofilético denominado alveolados (Patterson & Sogin 1993; Van de Peer & De Wachter 1997).

OS ESTUDOS DE ALGAS NO BRASIL

O estudo das algas no Brasil teve um início simultaneamente romântico e controverso. A primeira expedição de coleta realizada em nosso país e que incluiu material de algas foi patrocinada pelo rei Maximiliano José I, da Áustria, oferecida como presente ao Brasil por ocasião das núpcias de sua filha, a arquiduquesa Maria Leopoldina, com o príncipe herdeiro de Portugal Pedro IV, mais tarde Pedro I do Brasil. Os cientistas escolhidos para compor a expedição foram Carl Friedrich Philip von Martius, botânico e antropólogo, e Johann Baptist Von Spix, zoólogo, ambos naturalistas de Munique; e Giuseppe Raddi, um botânico italiano.

O primeiro registro da ocorrência de algas no Brasil está em Raddi (1823). Encontram-se aí descritas de maneira muito sucinta quatro espécies de formas marinhas macroscópicas bentônicas (*Fucus natans* L., *Fucus bacciferus* Turner, *Fucus flagelliformis* var. *tortilis* Turner e *Ulva undulata* Raddi) que ele mesmo coletou no litoral do estado do Rio de Janeiro.

Oito espécies de algas marinhas macroscópicas bentônicas, *Ulva martensii* Mart., *U. schroederi* Mertens, *Zonaria fuliginosa* (Mertens) Mart., *Z. variegata* var. *discolor* (Mertens) Mart., *Sphaerococcus chamissoi* C. Agardh, *S. ramulosus* (Mertens) Mart., *S. maximilianui* (Mertens) Mart. e *Sargassum stenophyllum* (Martens) Mart., constituem os primeiros resultados da expedição de Martius & Spix pelo Brasil (Martius

1828). O material referido nesse trabalho foi coletado pelo próprio Martius em locais situados no litoral entre os estados de São Paulo e Bahia.

Martius et al. (1833) é o primeiro tratamento a incluir um número mais elevado de espécies de algas, dentre as quais sete são habitantes de águas continentais e 73 de águas marinhas. Também esse material foi coletado por Martius, durante sua expedição realizada pelo território brasileiro entre 8 de dezembro de 1817 e 14 de junho de 1820. O que foi referido acima como controverso é o fato de haver duas versões diferentes dessa obra. Na cópia depositada na biblioteca do Jardim Botânico de Nova Iorque, *Nitella capitata* (Nees) C. Agardh consta na página 11 e *Chara domingensis* Turpin *ex* Martius na página 12. Já o volume da biblioteca do Herbário Farlow tem *Bryopsis rosae* C. Agardh, *Bryopsis plumosa* C. Agardh e *Vaucheria terrestris* Götz na página 11 e *Vaucheria dichotoma* (L.) C. Agardh na página 12. É importante notar que neste último consta a anotação "correct sheet" feita pelo próprio Dr. Farlow. Não obstante essa confusão, existem duas partes do primeiro volume da *Flora brasiliensis*, uma das quais foi publicada em tamanho "octavo" e a outra em tamanho "folio", pela ordem, com textos completamente diferentes. Na publicação em tamanho "octavo" estão as algas, os líquenes e as briófitas coletadas durante a expedição, não incluídas na versão "folio", a qual, contudo, inicia o estudo das vasculares.

Durante mais de um século, até 1950, as contribuições em prol do conhecimento das algas do Brasil, tanto marinhas quanto de águas continentais, foram geralmente resultado da colaboração de pesquisadores estrangeiros, que nem sempre coletaram seus próprios materiais. Em sua quase totalidade, as coletas de algas foram efetuadas por não especialistas e de maneira extremamente pontual. Essas coleções carecem de dados importantes, como localidade e habitat precisos, além de não serem representativas em termos de cobertura de amostragem no território nacional. No caso específico das algas de águas continentais, restringiram-se a dois estados da Região Norte (Amazonas e Pará), a praticamente todo o Nordeste e a três estados da Região Sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro).

Em 1910 foi publicado o primeiro estudo feito no Brasil a partir de material brasileiro, com a participação de um autor nacional. Liderado pelo médico sanitarista Max Hartmann, do Instituto de Moléstias Infecciosas (Institut für Infektionskrankheiten) de Berlim, o trabalho contou com a colaboração do médico brasileiro, também sanitarista, Carlos Chagas. Trata-se do estudo de material coletado em dois alagados em Manguinhos, estado do Rio de Janeiro, em que os autores descreveram as estruturas do núcleo e do aparelho flagelar e a divisão nuclear de sete espécies de flagelados, duas das quais estão atualmente classificadas entre os protozoários e as outras cinco entre as algas, sendo duas Cryptophyceae, duas Chrysophyceae e uma Euglenophyceae (Hartmann & Chagas 1910).

Mas foi somente em 1950 que Aylthon Brandão Joly, professor na Universidade de São Paulo, realmente assumiu a tarefa de estudar as algas do Brasil. Denominado o "pai da ficologia brasileira", Joly publicou a primeira ficoflora do país (Joly 1957) ao inventariar as algas marinhas macroscópicas bentônicas da Baía de Santos e arredores. Nessa contribuição, o referido autor realizou o primeiro levantamento florístico planejado de uma área delimitada e relativamente restrita do Brasil. Nesse trabalho, encontram-se identificadas, descritas em pormenores e ilustradas 100 espécies.

O estabelecimento efetivo dos estudos de algas no Brasil deve-se ao esforço dos discípulos de Joly, dez brasileiros, um chileno e um mexicano.

COMPILAÇÃO DOS DADOS

O levantamento preliminar dos táxons que compõem o presente catálogo foi realizado a partir das informações publicadas sob a forma de guias, catálogos, atlas e *checklists* que já estavam disponíveis de forma dispersa. Para as macroalgas bentônicas da costa brasileira, consideramos o relatório elaborado por Oliveira et al. (2002) e a base de dados desenvolvida por Oliveira et al. (2007); para as microalgas epicontinentais, foram utilizados os dados sumarizados por Menezes & Dias (2001) para o estado do Rio de Janeiro e Torgan et al. (1999, 2001, 2003) para o estado do Rio Grande do Sul; e para as microalgas costeiras e marinhas, as listas publicadas por Tenenbaum et al. (2004) para a Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro, Tenenbaum et al. (2006, 2007) para Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, Procopiak et al. (2006) para o Paraná e Villac et al. (2008) para São Paulo. Esses dados foram organizados em planilhas Excel pela segunda autora desta introdução, complementadas por informações existentes no Species Link, cedidas pelo Centro de Referência em Informação Ambiental (CRIA), que reúne dados das coleções depositadas nos herbários SP, SJRP e SPF. Posteriormente, as planilhas foram importadas para o sistema e os especialistas colaboraram na complementação da distribuição geográfica, na atualização nomenclatural e na inclusão ou exclusão de táxons.

A lista aqui apresentada foi preparada com base nos conceitos mais recentes para os diversos grupos de algas, seguindo-se, para a circunscrição das classes, a classificação de Lee (2008), que agrega dados moleculares aos caracteres morfológicos estruturais e ultraestruturais, bioquímicos e ecológicos.

DIVERSIDADE DAS ALGAS NO BRASIL

As estimativas mais arrebatadas calculam em 40.000 o número de espécies de algas que ocorrem no mundo (Wilson 1992), e as mais conservadoras, em 26.900 (Hammond 1992). O Brasil carece desse tipo de informação, a despeito de Bicudo et al. (1998) calcularem em torno de 5.000 o número de espécies já referidas para o país. Menezes & Bicudo (2009) praticamente ratificaram os dados de Bicudo et al. (1998) e estimaram em 5.614 o número de espécies para o território nacional, distribuídas em 3.689 epicontinentais (164 Cyanophyceae, 50 Rhodophyceae, 10 Prasinophyceae, 700 Chlorophyceae, 875 Charophyceae, 370 Euglenophyceae, 42 Dinophyceae, 20 Cryptophyceae, 1200 Bacillariophyceae, 10 Raphidophyceae, 2 Prymensiophyceae, 14 Chrysophyceae, 40 Synurophyceae, 62 Xanthophyceae), e 1.925 marinhas (164 Cyanophyceae, 455 Rhodophyceae, 2 Prasinophyceae, 223 Ulvophyceae, 6 Euglenophyceae, 296 Dinophyceae, 653 Bacillariophyceae, 2 Raphidophyceae, 92 Phaeophyceae, 27 Prymnesiophyceae, 5 Dictyocophyceae).

Os resultados alcançados no presente catálogo confirmam a ocorrência de 3.497 espécies (1.988 epicontinentais e 1.541 marinhas) reunidas em 829 gêneros e 17 classes de algas. Deste total, dois gêneros e 52 espécies são endêmicos do Brasil (fig. 1, tab. 1).



Figura 1
Número de espécies de algas, ordenado por ambiente e classe taxonômica.

CLASSES	GÊNEROS		ESPÉCIES		SUB-ESPÉCIES		VARIEDADES	
	TOTAL	ENDÊMICOS	TOTAL	ENDÊMICAS	TOTAL	ENDÊMICAS	TOTAL	ENDÊMICAS
Cyanophyceae	89	0	208	3	0	0	1	0
Rhodophyceae	153	2	402	6	3	0	14	2
Prasinophyceae	8	0	15	0	0	0	0	0
Chlorophyceae	88	0	319	2	0	0	80	0
Charophyceae	35	0	419	11	3	0	279	19
Euglenophyceael	20	0	311	13	0	0	213	15
Dinophyceae	65	0	374	0	0	0	0	0
Cryptophyceae	9	0	35	3	0	0	2	0
Bacillariophyceae	163	0	888	5	0	0	320	0
Raphidophyceae	6	0	9	0	0	0	0	0
Prymnesiophyceae	46	0	93	0	0	0	0	0
Chrysophyceae	17	0	43	3	0	0	2	0
Synurophyceae	3	0	42	0	0	0	15	1
Xanthophyceae	28	0	71	2	0	0	4	0
Phaeophyceae	48	0	94	2	0	0	14	0
Ulvophyceae	49	0	170	2	2	0	23	0
Dictyocophyceae	2	0	4	0	0	0	0	0

Tabela 1
Número de gêneros, espécies, categorias infraespecíficas e táxons endêmicos de algas, ordenado por classe taxonômica.

É importante enfatizar que o conhecimento atual das algas de águas epicontinentais no Brasil é extremamente heterogêneo, tanto quando se considera a região geográfica quanto o grupo taxonômico (tab. 2). Assim, muito mais se conhece sobre as algas do Sul e Sudeste do país do que das demais regiões. Segue-as a Região Nordeste, que, apesar de sua relativa pobreza em recursos hídricos, possui um conhecimento já substancial de suas algas epicontinentais. As regiões Norte e Centro-Oeste, extremamente ricas em corpos d'água, são as menos conhecidas no que tange à taxonomia das algas.

O conhecimento da flora ficológica epicontinental das várias regiões geográficas do Brasil está diretamente relacionado com a quantidade de especialistas e sua distribuição pelo território brasileiro, ou seja, há certa concentração de taxonomistas nas regiões Sul e Sudeste, um bom número deles na Região Nordeste e poucos nas regiões Norte e Centro-Oeste. Esses resultados também se repetem, em parte, quando observamos que o Domínio da Mata Atlântica apresenta o maior número de espécies, seguido do Pampa (tab. 3).

	Raphidophyceae	Dinophyceae	Chlorophyceae	Charophyceae	Cryptophyceae	Chrysophyceae	Euglenophyceae	Prasinophyceae	Synurophyceae	Bacillariophyceae	Cyanophyceae	Xanthophyceae
Centro-oeste	0	5	92	14	4	6	98	0	3	19	46	11
Nordeste	0	20	35	10	3	0	17	0	0	23	31	0
Norte	0	20	57	31	3	5	159	0	16	68	33	2
Sudeste	6	20	247	208	32	34	145	9	20	379	183	59
Sul	1	12	94	50	6	12	174	1	28	290	78	25

Tabela 2
Número de espécies de algas epicontinentais, ordenado por Região e classe taxonômica.

	Chrysophyceae	Euglenophyceae	Prasinophyceae	Raphidophyceae	Synurophyceae	Bacillariophyceae	Charophyceae	Cryptophyceae	Cyanophyceae	Xanthophyceae	Dinophyceae	Chlorophyceae
Mata Atlântica	35	160	6	5	33	248	209	29	166	65	20	247
Pampa	0	142	0	0	0	132	17	1	65	1	12	21
Amazônia	4	153	0	0	16	49	28	3	38	2	5	53
Cerrado	6	66	0	0	0	17	19	4	41	9	4	93
Pantanal	0	54	0	0	0	3	11	1	23	1	4	8
Caatinga	0	2	0	0	0	2	4	0	11	0	0	22

Tabela 3
Número de espécies de algas epicontinentais, ordenado por Domínios e classe taxonômica.

O conhecimento das algas marinhas macroscópicas bentônicas é, comparativamente, mais uniforme ao longo da costa brasileira, embora também haja um maior volume de informação sobre os estados das regiões Nordeste e Sudeste (fig. 4). Fato a considerar é que quase toda a informação dessas algas vem do material coletado na região intramareal, isto é, da faixa litorânea descoberta pela maré baixa e coberta pela maré alta. Muito pouco ainda se sabe sobre as algas que habitam o infralitoral, qual seja, a faixa jamais descoberta pela maré mais baixa. O mesmo vale para as algas que habitam os litorais de ilhas e parcéis de nosso país.



Figura 4
Número de espécies de macroalgas marinhas, ordenado por Região e classe taxonômica.

	Raphidophyceae	Dinophyceae	Cryptophyceae	Dictyocophyceae	Chrysophyceae	Euglenophyceae	Prasinophyceae	Prymnesiophyceae
Norte	0	152	0	0	0	0	0	0
Nordeste	0	193	0	0	0	0	0	62
Sudeste	1	213	1	4	0	2	1	62
Sul	2	194	1	0	12	0	6	65

Tabela 4
Número de espécies de microalgas marinhas, ordenado por Região e classe taxonômica.

Finalmente, no que tange ao inventário da flora ficológica brasileira, pouco se conhece sobre as formas microscópicas, ou seja, as diversas formas do fitoplâncton marinho. Os resultados aqui apresentados mostram estudos restritos a grupos taxonômicos, em especial as diatomáceas (Bacillariophyceae) em todas as regiões geográficas de nosso país, seguidas dos dinoflagelados (Dinophyceae) nas regiões Sudeste e Sul (tab. 4).

Há bastante discrepância ao considerar os grupos taxonômicos de algas já estudados e aqueles ainda por estudar. Os resultados da presente lista apontam os estados do Rio de Janeiro (829 táxons), São Paulo (592 táxons), Paraná (465 táxons), Rio Grande do Sul (457 táxons) e Amazonas (308 táxons) como aqueles que apresentaram maior riqueza de algas epicontinentais. As classes Bacillariophyceae (791 táxons), Chlorophyceae (733 táxons), Euglenophyceae (722 táxons), Cyanophyceae (500 táxons) e Charophyceae (344 táxons) possuem a maior diversidade no Brasil (tab. 5).

Com relação às macroalgas marinhas (tab. 6), os estados com maior riqueza de táxons são Rio Janeiro (420 táxons), Espírito Santo (416 táxons), Bahia (367 táxons), São Paulo (304 táxons) e Ceará (207 táxons). Estes resultados corroboram que o Espírito Santo, considerado como uma zona de transição entre a região tropical (Norte/Nordeste) e temperada quente (Sul/Sudeste), apresenta características peculiares e alta diversidade específica, esta última associada à heterogeneidade de ambientes e às condições de temperatura (Horta et al. 2001; Guimarães 2003). Para o estado do Rio de Janeiro, a elevada diversidade de algas pode ser explicada pelo número expressivo de taxonomistas, pelos estudos abundantes na região de Cabo Frio, e, finalmente, pelo fato de essa região, além de ser considerada barreira geográfica para a distribuição de espécies, mostrar características peculiares decorrentes do fenômeno da ressurgência, possibilitando também a ocorrência de táxons típicos de regiões temperadas (Horta et al. 2001).

A classe Rhodophyceae (1.666 táxons) é a que apresenta a maior diversidade na costa do Brasil, seguida das Ulvophyceae (734 táxons) e Phaeophyceae (453 táxons), o que era esperado, uma vez que as Rhodophyceae constituem a classe de macroalgas marinhas bentônicas com o maior número de espécies (aproximadamente 4.000) (Lee 2008).

Para as microalgas marinhas (fitoplâncton) (tab. 7), os estados com maior riqueza de táxons são São Paulo (455 táxons), Rio Grande do Sul (394 táxons), Rio de Janeiro (346 táxons), Bahia (269 táxons), Sergipe e Pernambuco (238 táxons cada), seguidos do Espírito Santo (236 táxons). As Bacillariophyceae (1.359 táxons) e as Dinophyceae (1.348 táxons), seguidas das Prymnesiophyceae (346 táxons) constituem as classes com maior diversidade no Brasil.

Estes números de totais de espécies e categorias infraespecíficas identificadas para cada estado brasileiro refletem, parcialmente, o atual estágio do conhecimento das algas no Brasil, isto é, a quantidade de estudos realizados em certas áreas e a falta de informação em outras. Além disso, não foi possível incluir na presente lista alguns grupos de algas (Rhodophyceae continentais e Klebsormidiales, Coleochatales, Tetrasporales, Trebouxiales e Oedogoniales). Mesmo cientes disto, acreditamos que a publicação deste catálogo é um importante passo para o direcionamento de futuros estudos da ficologia brasileira.

	Bacillariophyceae	Raphidophyceae	Chrysophyceae	Prasinophyceae	Euglenophyceae	Dinophyceae	Chlorophyceae	Charophyceae	Cryptophyceae	Synurophyceae	Synurophyceae	Xanthophyceae	Cyanophyceae
Acre	0	0	0	0	12	0	4	3	0	0	0	1	20
Alagoas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Amapa	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4
Amazonas	51	0	3	0	142	5	43	25	0	10	2	27	308
Bahia	6	0	0	0	2	3	7	2	0	0	0	2	22
Ceará	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	5	9
Distrito Federal	14	0	2	0	44	2	22	0	2	3	1	24	114
Espírito Santo	14	0	0	0	2	7	27	5	1	6	0	8	70
Goiás	7	0	4	0	27	3	81	5	4	0	10	10	151
Maranhão	0	0	0	0	8	5	5	0	0	0	0	11	29
Mato Grosso	1	0	0	0	59	4	6	5	1	0	0	4	80
Mato Grosso do Sul	2	0	0	0	0	0	2	11	1	0	1	22	39
Minas Gerais	2	0	1	0	7	4	27	7	4	0	1	15	68
Paraná	215	0	3	0	39	60	79	26	5	0	24	14	465
Paraíba	2	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	6	21
Pará	15	0	3	0	19	6	4	2	3	13	0	17	82
Pernambuco	6	0	0	0	9	2	24	5	3	0	0	16	65
Piauí	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3
Rio Grande do Norte	10	0	0	0	2	0	12	1	0	0	0	1	26
Rio Grande do Sul	137	1	6	0	148	12	24	27	6	19	2	75	457
Rio de Janeiro	181	5	13	6	124	15	190	170	20	9	21	75	829
Rondônia	0	0	2	0	21	1	0	0	0	0	0	2	26
Roraima	0	0	0	0	0	3	10	2	0	0	0	3	18
Santa Catarina	10	0	4	0	12	5	16	2	0	12	0	9	70
Sergipe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
São Paulo	115	3	23	1	45	8	136	32	25	11	45	148	592
Tocantins	1	0	0	7	9	1	20	0	0	0	0	1	39

Tabela 5
Número de espécies de algas epicontinentais, ordenado por estado e classe taxonômica.

	Cyanophyceae	Rhodophyceae	Phaeophyceae	Ulvophyceae
Alagoas	0	28	26	21
Amapá	0	2	0	3
Bahia	0	199	58	110
Ceará	0	126	33	48
Espírito Santo	0	257	62	97
Maranhão	0	48	7	17
Paraná	0	59	20	14
Paraíba	0	65	22	65
Pará	0	1	0	1
Pernambuco	0	147	35	71
Piauí	0	11	0	6
Rio Grande do Norte	0	90	25	51
Rio Grande do Sul	0	47	18	26
Rio de Janeiro	0	246	73	101
Santa Catarina	0	123	31	39
Sergipe	0	14	2	4
São Paulo	17	203	41	60

Tabela 6
Número de espécies de macroalgas, ordenado por estado e classe taxonômica.

	Bacillariophyceae	Prymnesiophyceae	Raphidophyceae	Chrysophyceae	Prasinophyceae	Euglenophyceae	Dictyocophyceae	Dinophyceae	Cryptophyceae	Cyanophyceae
Alagoas	58	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Amapá	9	0	0	0	0	0	0	109	0	0
Bahia	53	61	0	0	0	0	0	155	0	0
Ceará	2	0	0	0	0	0	0	23	0	0
Espírito Santo	25	51	0	0	0	0	0	160	0	0
Maranhão	24	0	0	0	0	0	0	36	0	0
Paraná	182	41	0	0	0	0	0	7	0	0
Paraíba	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Pará	54	0	0	0	0	0	0	106	0	0
Pernambuco	175	0	0	0	0	0	0	63	0	0
Piauí	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Rio Grande do Norte	67	2	0	0	0	0	0	111	0	0
Rio Grande do Sul	162	60	1	3	7	0	0	160	1	0
Rio de Janeiro	90	58	1	0	4	2	3	187	1	0
Santa Catarina	89	41	2	0	0	0	0	106	0	0
Sergipe	41	0	0	0	0	0	0	15	0	0
São Paulo	310	32	0	0	0	0	3	93	0	17

Tabela 7
Número de espécies de microalgas marinhas, ordenado por estado e classe taxonômica.

REFERÊNCIAS

Ben Ali, A.; De Baere, R.; Van der Auwera,G.; De Wachter, R. & Van de Peer, Y. 2001. Phylogenetic Relationships Among Algae based on Complete Large-subunit rRNA Sequences. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology* 51: 737–749.

Bicudo, C.E.M.; Sant'Anna, C. L.; Bicudo, D.C.; Pupo, D.; Castro-Pinto, L.S.; Azevedo, M.T.P.; Xavier, M.B.; Fujii, M.T.; Yokoya, N.S. & Guimarães, S.M.P.B. 1998. O estudo das algas no Estado de São Paulo. In: Bicudo, C.E.M. & Shepherd, G.J. (eds.). *Biodiversidade do Estado de São Paulo: síntese do conhecimento ao final do século XX, 2: fungos macroscópicos e plantas*. São Paulo: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, p. 1-7.

Cavalier-Smith, T.; Allsopp, M. T. E. P. & Chao, E. E. 1994a. Chimeric Conundra: are Nucleomorphs and Chromists Monophyletic or Polyphyletic? *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 91:11.368-11.372.

Cavalier-Smith, T.; Allsopp, M. T. E. P. & Chao, E. E. 1994b. Thraustochytrids are Chromists, not Fungi: 18S rRNA Signatures of Heterokonta. *Philosophical Transactions Royal Society London Biology* 346:387-397.

Daugbjerg, N. & Andersen, R. A. 1997a. Phylogenetic Analyses of the rbcL Sequences from Haptophytes and Heterokont Algae Suggest their Chloroplasts are Unrelated. *Molecular Biology and Evolution* 14:1242-1251.

Daugbjerg, N. & Andersen, R. A. 1997b. A Molecular Phylogeny of the Heterokont Algae based on Analyses of Chloroplastencoded rbcL Sequence Data. *Journal of Phycology* 33:1031-1041.

Guimarães, S.M.P.B. 2003. Uma análise da diversidade da flora marinha bentônica do Estado do Espírito Santo, Brasil. *Hoehnea* 30: 11-19.

Hammond, P.M. 1992. Species Inventory. In: Groombridge, B. (ed.). *Global Biodiversity, Status of the Earth's Living Resources*. London: Champman & Hall, p. 17-39.

Hartmann, M. & Chagas, C. 1910. Estudos sobre flagelados. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz* 2: 64-125.

Hibberd, D. J. & Norris, R.E. 1984. Cytology and Ultrastructure of Chlorarachnion Reptans (Chlorarachniophyta divisio nova, Chlorarachniophyceae classis nova). *Journal of Phycology* 20:310-330.

Horta, P. A.; Amâncio E., Coimbra. C. S. & Oliveira, E.C. 2001. Considerações sobre a distribuição e origem da flora de macroalgas marinhas brasileiras. *Hoehnea* 28(3): 243-265

Joly, A.B. 1957. Contribuição ao conhecimento da flora ficológica marinha da Baía de Santos e arredores. *Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo: série botânica* 14: 1-196.

Komárek, J. 2003. Coccoid and Colonial Cyanobacteria. In Wehr, J.D. & Sheath, R.G. (eds.). *Freshwater Algae of North America*. California: Academic Press, p. 59-116.

Komárek, J. 2010. Modern Taxonomic Revision of Planktic Nostocacean Cyanobacteria: a Short Review of Genera. *Hydrobiologia* 639:231–243.

Lee, R.E. 2008. *Phycology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Linnaeus, C. 1753. *Species plantarum*. Holmiae: Laurentii Salvii. Vol. 1, 1.200 p.

Martius, C.F.P. 1828. *Icones plantarum cryptogamicarum quas in itinere annis MDCCCXVII-MDCCCXX per Brasiliam jussu et auspiciiis Maximiliani Josephi I. Bavariae Regis augustissimi instituto collegit et descripsit* [auctor]. München: Impensis auctoris.

Martius, C.F.P.; Eschweiler, G.G. & Nees ab Esenbeck, C.G. 1833. Algae, Lichenes, Hepaticae. In: Martius, C.P.F. (ed.). *Flora brasiliensis, seu enumeration plantarum in Brasilia tam sua sponte quam accedente cultura provenientium, quas in itinere auspiciis Maximiliani Josephi I. Bavariae Regis annis 1817-1820 peracto collegit, partim descripsit; alias Maximiliano Seren. Principe widensi, sellowio aliisque advectas addidit, communibus amicorum propriisque studiis secundum methodum naturalem dispositas et illustratas edidit*. Stuttgartiae et Tubingen: Sumptibus J.G. Cottae, p. 1-50.

Medlin, L. K.; Cooper, A.; Hill, C., Wrieden, S. & Wellbrock, U. 1995. Phylogenetic Position of the Chromista Plastids based on Small Subunit rRNA Coding Regions. *Current Genetic* 28:560-565.

Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2009. Algas – Diagnóstico preliminar da biodiversidade no Brasil. In: Simpósio Metas da Convenção da Biodiversidade para 2010: construindo a Lista de Espécies do Brasil. Pp. 59-64. In: *60º Congresso Nacional de Botânica*. Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana: Sociedade Botânica do Brasil.

Menezes, M. & Dias, I.C.A. (orgs.). 2001. *Biodiversidade de algas de águas continentais do Estado do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Museu Nacional, Série Livros 9.

Oliveira Filho, E.C.; Horta, P.A.; Amancio, C.E. & Sant'Anna, C.L. 2002. Algas e angiospermas marinhas bênticas do litoral brasileiro: diversidade, explotação e conservação. In: *Workshop sobre avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha*. Relatório Técnico. Brasília: MMA/FNMA/GEF. Campinas, BDT, Fundação André Tosello. http://www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/algas.

Oliveira, E.C.; Horta, P.A.; Amancio, C.E. & Silva, B.N.T. 2007. *Algas marinhas bênticas do Brasil*. http://www.ib.usp.br/algaemaris

Palinska, K.A.; Thomasius, C.F.; Marquardt, J. & Golubic, S. 2006. Phylogenetic Evaluation of Cyanobacteria Preserved as Historic Herbarium Exsiccate. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology* 56: 2253–2263.
Patterson, D. J. 1989. Stramenopiles: Chromophyte from a Protistan Perspective. In Green, J.C.; Leadbeater, B.S.C. & Diver, W.L. (eds.). *The Chromophyte Algae: Problems and Perspectives*. Oxford: Clarendon Press, p. 357-379.
Patterson, D. J. & Sogin, M. L. 1993. Eukaryote Origins and Protistan Diversity. In: Hartman. H. & Matsuno. K. (eds.). *The Origin and Evolution of Prokaryotic and Eukaryotic Cells*. River Edge, NJ: World Scientific Publishing, p. 13-46.
Procopiak, L.; Fernandes,L.F. & Moreira-Filho, H. 2006. Diatomáceas (Bacillariophyta) marinhas e estuarinas do Paraná, Sul do Brasil: lista de espécies com ênfase em espécies nocivas. *Biota Neotropica* 6(3): 1-28.
Raddi, G. 1823. Crittogame brasiliane raccolte e descritte. *Atti della Società italiana delle Scienze Naturali, e del Museo civile di Storia Naturale* 19: 27-57.
South, G.R. & Whittick, A. 1987. *Introduction to Phycology*. Oxford: Blackwell Scientific Publications.
Taylor, F.J. 1999. Ultrastructure as a Control for Protistan Molecular Phylogeny. *The American Naturalist* 154(4):125-136.
Tenenbaum, D.R., Gomes, E.A.T. & Guimarães, G.P. 2007. Microorganismos planctônicos: pico, nano e micro. In: Valentin, J.L. (org.). *Características hidrobiológicas da região central da zona econômica exclusiva brasileira (Salvador, BA ao Cabo de São Tome, RJ)*. Brasília: MMA, p. 83-124.
Tenenbaum, D.R.; Menezes, M.; Vianna, S.C.; Mendes, M.C.Q.; Hatherly, M.M.F. & Eduardo, J. 2006. Os dinoflagelados. In: Tenenbaum, D.R. (org.). *Dinoflagelados e Tintinídeos da região central da zona econômica exclusiva brasileira: guia de identificação*. Rio de Janeiro: Museu Nacional, Série Livros 15, p. 35-163.
Tenenbaum, D.R.; Villac, M.C.; Vianna, S.C.; Matos, M.; Hatherly, M.; Lima, I.V. & Menezes, M. 2004. *Phytoplankton Atlas of Sepetiba Bay, Rio de Janeiro, Brazil*. 1ª ed. Londres: IMO.
Torgan, L.C.; Becker, V. & Prates, H.M. 1999. *Checklist* das diatomáceas (Bacillariophyceae) de ambientes de águas continentais e costeiros do Estado do Rio Grande do Sul. *Iheringia*, Série Botânica 52: 89-144.
Torgan, L.C.; Barredas, K.A. & Fortes, D.F. 2001. Catálogo das algas Chlorophyta de águas continentais e marinhas do Rio Grande do Sul. *Iheringia*, Série Botânica 56: 147-182.
Torgan, L.C.; Barreda, K.A. & Santos, C.B. 2003. Catálogo das algas Cryptophyta, Heterokontophyta, Dinophyta, Haptophyta e Rhodophyta de águas continentais e costeiras do Rio Grande do Sul. *Iheringia*, Série Botânica 58(2): 227-250.
Van de Peer, Y. & De Wachter, R. 1997. Evolutionary Relationships Among the Eukaryotic Crown Taxa Taking into Account Site-to-site Rate Variation in 18S rRNA. *Journal of Molecular Evolution* 45: 619-630.
Villac, M.C.; Cabral-Noronha, V.A.P. & Pinto, T.O. 2008. The Phytoplankton Biodiversity of the Coast of the State of São Paulo, Brazil. *Biota Neotropica* 8(3): 152-174.
Wilson, E.O. 1992. *The Diversity of Life*. Cambridge: Belknap Press.

AS BRIÓFITAS DO BRASIL

Denise Pinheiro da Costa & Andréa Pereira Luizi-Ponzo

CARACTERIZAÇÃO DAS BRIÓFITAS

As briófitas são plantas pequenas e avasculares, cujos estudos moleculares demonstram estarem representadas por três linhagens distintas de plantas terrestres: os antóceros, as hepáticas e os musgos. Incluídas nas criptógamas, apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações heteromórficas, sendo a geração gametofítica haploide (*n*) dominante, enquanto a geração esporofítica diploide (*2n*) é dependente da primeira e efêmera. Possuem clorofilas a e b, carotenos, xantofilas, amido, gorduras, celulose e hemicelulose, como os demais membros do reino Plantae.

Podem viver sobre os mais variados tipos de substrato, como troncos e ramos de árvores (corticícolas), folhas (epífilas), troncos em decomposição (epíxilas), solo (terrícolas) ou rochas (rupícolas), geralmente em locais úmidos, já que necessitam de água para possibilitar a mobilidade dos gametas masculinos flagelados (anterozoides) durante o processo de fecundação. Podem tolerar condições ambientais extremas e por isso estão amplamente distribuídas no mundo, ocorrendo assim nos mais variados ecossistemas e em uma grande quantidade de habitats. São encontradas desde o Ártico até as florestas tropicais, em desertos e ambientes submersos, mas nunca no ambiente marinho (Delgadillo & Cárdenas 1990). Pioneiras na colonização de ambientes perturbados, atuam no combate à erosão do solo e na manutenção da umidade dos ecossistemas por interceptarem a água da chuva (Pócs 1982, Schofield 2001). Também desempenham um papel importante em muitos ecossistemas tropicais, como, por exemplo, a Mata Atlântica, auxiliando na captação de água e dos nutrientes da chuva e servindo como hábitat para animais (Gradstein et al. 2001).

As briófitas representam um passo fundamental na transição para o ambiente terrestre e, consequentemente, na evolução da vida na terra, pois compreendem as mais antigas linhagens de plantas terrestres, derivadas de algas verdes ancestrais (Goffinet et al. 2009).

Os resultados de estudos moleculares são divergentes na indicação do período em que se deu a transição para o ambiente terrestre, sugerindo ora uma origem pré-cambriana (Heckman et al. 2001), ora no Siluriano Inferior ou no Ordoviciano, há cerca de 425-490 milhões de anos (Sanderson 2003). Microfósseis do Ordoviciano Médio e do Siluriano Inferior compreendem uma evidência morfológica do surgimento das plantas terrestres (Kenrick & Crane 1997), mas a ausência de macrofósseis, sobretudo de gametófitos, associados a esses registros gera dificuldades na definição de afinidades taxonômicas (Taylor 1995; Edwards et al. 1998; Edwards 2000; Goffinet et al. 2009).

Dados mais confiáveis apontam o aparecimento das briófitas no Devoniano Inferior, cerca de 400 milhões de anos atrás (Gradstein et al. 2001; Goffinet et al. 2009; Magallón & Hilu 2009). Como as briófitas permaneceram praticamente sem mudanças e com taxas de mutação muito baixas durante o período evolutivo, são consideradas um grupo de plantas conservativas e, por essa razão, muitas características dos táxons atuais são idênticas às dos fósseis (Gradstein et al. 2001).

Segundo Gradstein et al. (2001) e Shaw & Goffinet (2000), as briófitas são o segundo maior grupo de plantas terrestres, apresentando entre 15.000-18.000 espécies no mundo, divididas entre antóceros com cerca de 100, hepáticas com cerca de 5.000 e musgos com cerca de 13.000. A maior diversidade do grupo encontra-se na região neotropical, onde ocorrem aproximadamente 4.000 espécies (Gradstein et al. 2001; Pócs 1982), das quais 1.650 foram estimadas para o Brasil (Costa et al. inéd.; Gradstein & Costa 2003), o que representaria de 9% a 11% da brioflora global e 41% daquela ocorrente na região neotropical (Gradstein et al. 2001).

Na região neotropical, as áreas montanhosas destacam-se pela presença de aproximadamente 130 gêneros endêmicos (80 de musgos e 50 de hepáticas) e pela alta diversidade de espécies. Os Andes são a região mais rica no neotrópico em termos de número de espécies e endemismo. Esse alto grau de diversidade e endemicidade relaciona-se com a grande heterogeneidade ambiental encontrada nessa região (microclima e relevo), que favorece o estabelecimento de diferentes famílias e gêneros de briófitas (Gradstein et al. 2001).

AS RECENTES CLASSIFICAÇÕES PARA AS BRIÓFITAS

Desde os anos de 1980, estudos considerando caracteres bioquímicos e morfológicos indicaram que as briófitas são parafiléticas em relação às plantas vasculares (Mishler & Churchill 1984; Crandall-Stotler 1986; Kenrick & Crane 1997), enquanto análises incluindo aspectos ultraestruturais da gametogênese (Garbary et al. 1993) sugeriam a monofilia do grupo. Contudo, filogenias baseadas em caracteres moleculares, morfológicos e anatômicos demonstram que as três linhagens incluídas nas briófitas não formam um grupo monofilético e que os antóceros e musgos estão mais relacionados com as plantas vasculares do que com as hepáticas (Bremer et al. 1987; Mishler et al. 1992; Bopp & Capesius 1996; Hedderson et al. 1996).

Segundo Goffinet (2000), a maioria dos estudos demonstra que as briófitas são parafiléticas e que incluem as linhagens mais basais das plantas terrestres, mas difere na interpretação no posicionamento dos antóceros. Recentes reconstruções da filogênese das linhagens de plantas terrestres atuais demonstram que os antóceros ocupam a posição mais basal e que os musgos e as hepáticas formam um grupo monofilético e irmão das poliesporangiófitas (plantas com esporófito ramificado).

O que denominamos briófitas (termo utilizado para caracterizar um grupo de plantas com ciclo de vida com alternância de gerações heteromórficas, haploide e diploide, e dominância da geração gametofítica) são três linhagens evolutivas distintas que correspondem às seguintes divisões ou filos: Anthocerotophyta para os antóceros (Renzaglia et al. 2009), Marchantiophyta para as hepáticas (Crandall-Stotler et al. 2009) e Bryophyta para os musgos (Goffinet et al. 2009). Essas linhagens compartilham vários caracteres, alguns dos quais foram retidos por todas as outras plantas terrestres, como o embrião protegido no início do desenvolvimento, e outros que são únicos dentre as plantas atuais, como esporófito não ramificado (Vanderpoorten & Goffinet 2009).

COMPILAÇÃO DOS DADOS

O levantamento dos nomes para compor o banco de dados inicial com os táxons de briófitas do Brasil foi realizado com base nas informações atualizadas para hepáticas e antóceros da publicação de Gradstein & Costa (2003) e nas informações de musgos da Lista de musgos do Brasil elaborada pelo Núcleo de Especialistas em Briófitas (NEB) da Sociedade Botânica do Brasil. Também foram importadas para o sistema as informações provenientes da publicação *Plantas da Floresta Atlântica* (Stehmann et al. 2009).

Durante a avaliação pelos especialistas que colaboraram conferindo os dados de musgos, algumas poucas espécies foram retiradas da lista inicial, que continha aproximadamente 900 táxons (incluindo espécies, subespécies e variedades). Além disso, a partir da literatura, foram incluídos os nomes presentes em revisões de famílias ou gêneros e em floras recentemente publicadas para o Brasil.

A citação de *voucher* foi priorizada, sendo principalmente baseada em materiais depositados no herbário RB. Outros herbários citados foram: ALCB, BM, CEPEC, FH, G, GOET, ICN, INPA, MICH, MG, NY, P, PACA, SP, SV (herbário Schäfer-Verwimp, Alemanha), UB, UFP e W.

Para elaboração da lista apresentada, foram adotadas a classificação de Stotler & Crandall-Stotler (2005) para os antóceros (Divisão Anthocerotophyta), a de He-Nygrén et al. (2006) para as hepáticas (Divisão Marchantiophyta) e a de Buck & Goffinet (2009) para os musgos (Divisão Bryophyta).

DIVERSIDADE DAS BRIÓFITAS NO BRASIL

Gradstein & Costa (2003) e Costa et al. (inéd.) estimaram uma diversidade de aproximadamente 1.650 espécies de briófitas para o Brasil, sendo cerca de 750 espécies de antóceros e hepáticas e cerca de 900 de musgos. Esse montante foi reavaliado e apresentamos neste catálogo 109 famílias, 395 gêneros e 1.521 espécies, das quais 275 (18%) são endêmicas do Brasil. Desse total, 11 espécies são de antóceros, 625 de hepáticas e 885 de musgos.

O Domínio Fitogeográfico brasileiro com o maior número de espécies de briófitas é a Mata Atlântica, com 1.333, seguido pela Amazônia, com 561, Cerrado, com 433, Pantanal com 179 e Pampa com 107 (fig. 1). A Região Sudeste é a mais diversa, com 1.205 espécies, seguida pela Sul com 796, Nordeste com 609, Norte com 585 e Centro-Oeste com 460 (fig. 2).



Figura 1
Número de espécies de briófitas por Domínio Fitogeográfico.



Figura 2
Número de espécies de briófitas por Região.

Os estados com maior riqueza são: Rio de Janeiro (873 spp.), São Paulo (840 spp.), Minas Gerais (687 spp.), Rio Grande do Sul (526 spp.), Santa Catarina (512 spp.), Paraná (469 spp.), Bahia (468 spp.), Amazonas (440 spp.), Espírito Santo (419 spp.), Pernambuco (321 spp.), Pará (320 spp.), Mato Grosso (307 spp.) e Goiás (277 spp.). Os demais estados possuem menos de 200 táxons e os menos diversos são: Rio Grande do Norte (16 spp.), Sergipe (50 spp.), Tocantins (56 spp.), Piauí (57 spp.), Maranhão (72 spp.), Alagoas (77 spp.), Paraíba (82 spp.) e Amapá (94 spp.) (tab. 1). Esses números refletem o conhecimento atual desse grupo de plantas no Brasil e os estados com menor número de táxons, possivelmente, apresentam uma diversidade maior do que se conhece hoje, visto que, nos últimos anos, os números vêm aumentando, principalmente nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, em função dos estudos realizados por novos especialistas e seus grupos de alunos.

ESTADO	NÚMERO DE ESPÉCIES
Rio de Janeiro	873
São Paulo	840
Minas Gerais	687
Rio Grande do Sul	526
Santa Catarina	512
Paraná	469
Bahia	468
Amazonas	440
Espírito Santo	419
Pernambuco	321
Pará	320
Mato Grosso	307
Goiás	277
Mato Grosso do Sul	191
Roraima	188
Acre	169
Distrito Federal	163
Ceará	158
Rondônia	150
Amapá	94
Paraíba	82
Alagoas	77
Maranhão	72
Piauí	57
Tocantins	56
Sergipe	50
Rio Grande do Norte	16

Tabela 1
Número de espécies de briófitas por unidade da Federação.

Dentre as hepáticas, as 10 famílias com maior diversidade no Brasil são: Lejeuneaceae (270 spp.), Lepidoziaceae (48 spp.), Frullaniaceae (38 spp.), Plagiochilaceae (36 spp.), Ricciaceae (33 spp.), Metzgeriaceae (26 spp.), Radulaceae (26 spp.), Geocalycaceae (23 spp.), Jungermanniaceae (18 spp.) e Aneuraceae (14 spp.). Juntas, concentram 84% (532 spp.) do total de táxons de hepáticas conhecidos para o país (fig. 3).



Figura 3
As 10 famílias mais diversas de hepáticas ocorrentes no Brasil, mostrando o total de espécies e o número de endêmicas.

Os gêneros de hepáticas mais diversos no Brasil são: *Lejeunea* (42 spp., Lejeuneaceae), *Frullania* (38 spp., Frullaniaceae), *Plagiochila* (36 spp., Plagiochilaceae), *Riccia* (32 spp., Ricciaceae), *Metzgeria* (26 spp., Metzgeriaceae), *Radula* (26 spp., Radulaceae), *Cololejeunea* (21 spp., Lejeuneaceae), *Drepanolejeunea* (19 spp., Lejeuneaceae), *Aphanolejeunea* (17 spp., Lejeuneaceae), e *Diplasiolejeunea* (14 spp., Lejeuneaceae). Estes 10 gêneros concentram 44% (275 spp.) do total de táxons de hepáticas conhecidos para o país.

Dentre os musgos, as 10 famílias com maior diversidade no Brasil são: Sphagnaceae (93 spp.), Fissidentaceae (61 spp.), Pottiaceae (61 spp.), Bryaceae (54 spp.), Dicranaceae (52 spp.), Orthotrichaceae (52 spp.), Pilotrichaceae (51 spp.), Sematophyllaceae (51 spp.), Calymperaceae (48 spp.) e Hypnaceae (27 spp.). Juntas concentram 62% (550 spp.) do total de táxons de musgos conhecidos para o país (fig. 4).



Figura 4
As 10 famílias mais diversas de musgos ocorrentes no Brasil, mostrando o total de espécies e o número de endêmicas.

Os gêneros de musgos mais diversos no Brasil são: *Sphagnum* (93 spp., Sphagnaceae), *Fissidens* (61 spp., Fissidentaceae), *Campylopus* (30 spp., Dicranaceae), *Syrrhopodon* (25 spp., Calymperaceae), *Macromitrium* (18 spp., Orthotrichaceae), *Sematophyllum* (18 spp., Sematophyllaceae), *Calymperes* (15 spp., Dicranaceae), *Philonotis* (13 spp., Bartramiaceae), *Bryum* (13 spp., Bryaceae), e *Schlotheimia* (13 spp., Orthotrichaceae). Esses concentram 43% (299 spp.) do total de táxons de musgos conhecidos para o país.

GÊNEROS	TOTAL DE ESPÉCIES	ESPÉCIES ENDÊMICAS
Sphagnum	93	65
Fissidens	61	3
Lejeunea	42	5
Frullania	38	5
Plagiochila	36	5
Riccia	32	11
Campylopus	30	7
Radula	26	1
Metzgeria	26	6
Syrrhopodon	25	1
Cololejeunea	21	4
Drepanolejeunea	19	4
Macromitrium	18	4
Sematophyllum	18	6
Bazzania	17	1
Aphanolejeunea	17	0
Cheilolejeunea	16	1
Calymperes	15	0
Diplasiolejeunea	14	2
Philonotis	13	0

Tabela 2
Os 20 gêneros mais diversos de briófitas ocorrentes no Brasil, mostrando o total de espécies e o número de endêmicas.

Quando analisamos por Domínio Fitogeográfico, no Pantanal as famílias mais diversas são: Lejeuneaceae (34 spp.), Fissidentaceae (15 spp.), Ricciaceae (9 spp., 1 endêmica), Hypnaceae (8 spp.), Frullaniaceae (7 spp.), Bryaceae (7 spp.), Dicranaceae (7 spp.), Pottiaceae (6 spp.), Sematophyllaceae (6 spp.), Stereophyllaceae e Calymperaceae (5 spp. cada uma). Essas 11 famílias concentram 7% do total de espécies do Brasil e 61% desse Domínio.

Já na Mata Atlântica, Lejeuneaceae (217 spp., sendo 17 endêmicas), Sphagnaceae (79 spp., 48 endêmicas), Pottiaceae (53 spp., 4 endêmicas), Dicranaceae (51 spp., 7 endêmicas), Fissidentaceae (51 spp., 2 endêmicas), Bryaceae (50 spp., 3 endêmicas), Sematophyllaceae (47 spp., 13 endêmicas), Orthotrichaceae (46 spp., 10 endêmicas) Pilotrichaceae (46 spp., 1 endêmica) e Lepidoziaceae (38 spp., 1 endêmica), são as 10 famílias mais diversas, concentrando 45% do total de espécies do Brasil e 51% do Domínio.

Na Amazônia as famílias mais diversas são: Lejeuneaceae (166 spp., 14 endêmicas), Calymperaceae (42 spp.), Fissidentaceae (31 spp.), Lepidoziaceae (26 spp., 2 endêmicas), Sematophyllaceae (25 spp.), Pilotrichaceae (21 spp.), Orthotrichaceae (18 spp.), Dicranaceae (17 spp.), Sphagnaceae (15 spp., 7 endêmicas), Plagiochilaceae e Bryaceae (14 spp. cada uma). Essas 11 famílias concentram 26% do total de espécies para o Brasil e 70% da diversidade do Domínio no país.

No Cerrado, Lejeuneaceae (56 spp.), Fissidentaceae (29 spp.), Bryaceae (23 spp.), Pottiaceae (21 spp., 1 endêmica), Dicranaceae (19 spp.), Sematophyllaceae (19 spp.), Calymperaceae (18 spp.), Hypnaceae (17 spp.), Pilotrichaceae (16 spp.) e Orthotrichaceae (16 spp., 1 endêmica) são as 10 famílias mais diversas, concentrando 15% do total de espécies para o país e 54% para o Domínio.

Na Caatinga destacam-se as famílias Fissidentaceae (19 spp.), Ricciaceae (9 spp., 1 endêmica), Pottiaceae (8 spp., 1 endêmica), Dicranaceae (8 spp.), Lejeuneaceae (8 spp.), Calymperaceae (6 spp.), Frullaniaceae (4 spp.), Bartramiaceae (4 spp.), Archidiaceae (3 spp.), Sematophyllaceae e Bryaceae (3 spp. cada uma). Essas 11 famílias representam 5% do total de espécies do Brasil e 81% deste Domínio.

Finalmente, no Pampa as mais diversas são: Fissidentaceae (12 spp.), Pottiaceae (11 spp.), Ricciaceae (9 spp., 1 endêmica), Sphagnaceae (7 spp., 1 endêmicas), Dicranaceae (6 spp.), Hypnaceae (6 spp.), Funariaceae (5 spp.), Lejeuneaceae (5 spp.) e Archidiaceae (4 spp.). Essas nove famílias equivalem a 5% do total de espécies do Brasil e 61% deste Domínio.

É preciso destacar que estes resultados representam o estágio atual de conhecimento da brioflora brasileira e que podem mudar conforme áreas reconhecidas como lacunas no conhecimento forem inventariadas.

REFERÊNCIAS

Bopp, M. & Capesius, I. 1996. New Aspects of Bryophyte Taxonomy Provided by a Molecular Approach. *Botanica Acta* 109: 368-372.
Bremer, K.; Humphries, C.J.; Mishler, B.D. & Churchill, S.P. 1987. On Cladistic Relationships in Green Plants. *Taxon* 36: 339-349.
Buck, W.R. & Goffinet, B. 2009. Morphology and Classification of Mosses. In: Shaw, A.J. & Goffinet, B. (eds.). *Bryophyte Biology*. New York: Cambridge University Press, p. 55-138.
Costa, D.P.; Pôrto, K.C.; Luizi-Ponzo, A.P. Anna Luiza Ilkiu-Borges, Cid José Passos Bastos, Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara, Denilson Fernandes Peralta, Silvana B. Villas Bôas-Bastos, Caio Amitrano Alencar Imbassahy, Diego Knop Henriques, Hellen Cássia dos Santos Gomes, Lucas Matheus da Rocha, Nivea Dias dos Santos, Tatiana Silva Siviero, Thaís de Freitas Vaz-Imbassahy & Steven P. Churchill. Synopsis of the Brazilian Moss Flora: Checklist, Synonyms, Distribution and Conservation. Inédito.
Crandall-Stotler, B. 1986. Morphogenesis, Developmental Anatomy and Bryophyte Phylogenetics: Contraindications of Monophyly. *Journal of Bryology* 14: 1-23.
Crandall-Stotler, B.; Stotler, R.E. & Long, D.G. 2009. Morphology and Classification of the Marchantiophyta. In: Goffinet, B. & Shaw, A.J. (eds.). *Bryophyte Biology*. New York: Cambridge University Press, p. 1-54.
Delgadillo M., C. & A. Cárdenas S. 1990. *Manual de briofitas*. 2ª ed. México: Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Edwards, D. 2000. The role of Mid-Palaeozoic Mesofossils in the Detection of Early Bryophytes. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 355: 733-55.
Edwards D.; Wellman C.H. & Axe, L. 1998. The Fossil Record of Early Land Plants and Interrelationships Between Primitive Embryophytes: Too Little Too Late? In: Bates, J.W.; Ashton, N.W. & Duckett, JG. (eds.). *Bryology for the 21st Century*. UK: Maney Publisher. Bristish Bryological Society, p. 15-43.
Garbary, D.J.; Renzaglia, K.S. & Duckett, J.G. 1993. The Phylogeny of Land Plants: a Cladistic Analysis based on Male Gametogenesis. *Plant Systematics and Evolution* 188: 237-69.
Goffinet, B. 2000. Origin and Phylogenetic Relationships of Bryophytes. In: Shaw A.J. & Goffinet, B. (eds.).*Bryophyte Biology*. Cambridge: Cambridge University Press, p. 124-149.
Goffinet, B.; Buck, W.R. & Shaw, A.J. 2009. Morphology and Classification of the Bryophyta. In: Goffinet, B. & Shaw, A.J. (eds.). *Bryophyte Biology*. New York: Cambridge University Press, p. 55-138.
Gradstein, S.R.; Churchill, S. P. & Salazar-Allen, N. 2001. Guide to the Bryophytes of Tropical America. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 87: 1-301.
Gradstein, S.R. & Costa, D.P. 2003. The Hepaticae and Anthocerotae of Brazil. *Memoirs of the New York Botanical Garden* 87: 1-301.
Heckman, D.S.et al. 2001. Molecular Evidence for the Early Colonization of Land by Fungi and Plants. *Science* 293: 1129-33.
Hedderson, T. A.; Chapman, R. L. & Rootes, W. L. (1996). Phylogenetics of Bryophytes Inferred from Nuclear-encoded rRNA Gene Sequences. *Plant Systematics and Evolution* 200: 213-24.
He-Nygrén, X.; Juslén, A.; Gelnny, D. & Piippo, S. 2006. Illuminating the Evolutionary History of Liverworts (Marchantiophyta) – Towards a Natural Classification. *Cladistics* 22: 1-31.
Kenrick, P. & Crane, P.R. 1997. The Origin and Early Evolution of Plants on Land. *Nature* 389: 33-39.
Longton, R.E. 1976. Reproductive Biology and Evolutionary Potential in Bryophytes. *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 41: 205-223.
Magallón, S. & Hilu, K.W. 2009. Land Plants (Embryophyta). In: Hedges S.B. & Kumar, S. (eds.). *The Timetree of Life*. Oxford: Oxford University Press, p. 133-137.
Mishler, B.D. & Churchill, S.P. 1984. A Cladistic Approach to the Phylogeny of the Bryophytes. *Brittonia* 36: 406-424.
Mishler, B.D.; Thrall, P.H.; Hopple, J.S. Jr.; De Luna, E. & Vilgalys, R. 1992. A Molecular Approach to the Phylogeny of Bryophytes: Cladistic Analysis of Chloroplast-encoded 16S and 23S Ribosomal RNA Genes. *The Bryologist* 95: 172-80.
Pócs, T. 1982. Tropical Forest Bryophytes. In: Smith, A.J.E. (ed.). *Bryophyte Ecology*. New York: Chapman and Hall, p. 59-103.
Renzaglia, K.S.; Villareal, J.C. & Duff, R.J. 2009. New Insights into Morphology, Anatomy, and Systematic of Hornworts. In: Goffinet, B. & Shaw, A.J. (eds.). *Bryophyte Biology*. New York: Cambridge University Press, p. 138-171.
Sanderson, M.J. 2003. Molecular Data from 23 Proteins do not support a Precambrian Origin of Land Plants. *American Journal of Botany* 90: 954-6.
Schofield, W.B. 2001. *Introdution to Bryology*, 2ª ed. New Jersey: The Blackburn Press.
Shaw A.J. & Goffinet, B. 2000. *Bryophyte Biology*. Cambridge: Cambridge University Press.
Stehmann, J.R., Forzza, R.C., Salino, A., Sobral, M., Costa, D.P. & Kamino, L.H.Y. (Eds.). 2009. *Plantas da Floresta Atlântica*. Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Stotler, R. E. & Crandall-Stotler, B. 2005. A Revised Classification of the Anthocerotophyta and a Checklist of the Hornworts of North America, North of Mexico. *The Bryologist* 108: 16-26.
Taylor, W.A. 1995. Spores in Earliest Land Plants. Nature 373: 391-392.
Vanderpoorten, A. & Goffinet, B. 2009. *Introduction to Bryology*. New York: Cambridge University Press.

AS SAMAMBAIAS E LICÓFITAS DO BRASIL

Jefferson Prado & Lana da Silva Sylvestre

CARACTERIZAÇÃO DAS SAMAMBAIAS E LICÓFITAS

As licófitas e samambaias são plantas que possuem duas fases morfologicamente distintas em seus ciclos de vida. Uma delas é caracterizada pela produção de gametas masculinos e femininos (fase gametofítica, haploide, na qual ocorrem as trocas gênicas entre os organismos). É geralmente efêmera, com duração de alguns dias ou semanas, possui pequeno porte (alguns milímetros ou centímetros de comprimento), não possui tecido vascular para condução de água e nutrientes e geralmente cresce prostrada, aderida aos substratos (rochas, cascas de árvores, solo, folhas, etc.). Para que ocorra a troca de gametas é necessária a presença de água, mesmo que em pequenas quantidades, possibilitando a transferência dos anterozoides (gametas masculinos flagelados) para a oosfera (gameta feminino), fecundando-a e formando o zigoto, que passará por várias fases de desenvolvimento, culminando na formação de uma planta denominada esporófito. Esses gametófitos, por serem tão pequenos e efêmeros, passam desapercebidos na natureza pela maioria das pessoas, exceto os estudiosos desses grupos.

A outra fase do ciclo de vida, que é muito mais conspícua e por isso mesmo chama a nossa atenção, é a fase produtora de esporos (esporofítica). Ao contrário da fase gametofítica, esta é perene (chegando a vários anos de vida), muito mais complexa em sua constituição (com número diploide de cromossomos, 2*n*), dotadas de tecido vascular e formando raízes, caule e folhas verdadeiros. As folhas podem ser de dois tipos quanto à sua fisiologia, ou seja, folhas estéreis, cuja função básica é a realização de fotossíntese, e folhas férteis, que são aquelas que irão originar os esporos, podendo ser morfologicamente distintas ou não. Os esporos são formados a partir das células-mães no interior de estruturas denominadas esporângios. Os esporângios localizam-se em regiões predeterminadas das folhas, geralmente na face inferior das mesmas, nas margens ou em posição submarginal, ocasionalmente nos ramos do esporófito. As células-mães dos esporos passam pelo processo de meiose (divisão reducional no número cromossômico, de 2*n* para *n*) e produzem quatro células-filhas denominadas esporos. Quando maduros, estes são liberados pela planta e, em geral, dispersos pelo vento. Esses esporos podem ou não entrar em dormência, sobrevivendo durante curtos ou longos períodos de tempo. Porém, se caírem em um substrato favorável para germinação, produzirão novos gametófitos, que passarão pelo processo de desenvolvimento descrito acima, fechando o ciclo de vida desses organismos. As licófitas e samambaias não produzem flores, frutos e sementes, distinguindo-se desse modo das demais plantas vasculares (Prado 1998).

AS LICÓFITAS

Os precursores das licófitas atuais surgiram muito cedo na escala evolutiva das plantas vasculares sem sementes. Os primeiros registros fósseis são da era paleozoica e datam do começo do Devoniano (ou talvez do final do Siluriano) e do final do Carbonífero, cerca de 350-410 milhões de anos atrás (Kenrick & Crane 1997). Ainda segundo esses autores, os representantes atuais das licófitas são agrupados em três famílias – Isoetaceae, Lycopodiaceae e Selaginellaceae. Apesar de terem sido abundantes no passado, atualmente representam menos de 1% de todas as plantas vasculares (Smith et al. 2006), com aproximadamente 1.300 espécies descritas (Moran 2008).

Podem ser distinguidas pelo protostelo (tipo mais simples de feixe vascular, com xilema no centro e floema na periferia, sem medula) com xilema exarco (protoxilema, i.e., primeiras células do xilema com maturação centrípeta) e folhas microfilas (folhas pequenas, com uma única nervura não ramificada). São plantas herbáceas e ocorrem como terrestres, epífitas, rupícolas ou aquáticas. Possuem distribuição tropical e subtropical (Tryon & Tryon 1982; Kramer & Green 1990).

AS SAMAMBAIAS

Os primeiros registros fósseis dessas plantas datam do Devoniano Médio, cerca de 380 milhões de anos atrás (Kenrick & Crane 1997). Entretanto, há fósseis recentes desse grupo, como os das samambaias polipodioides, que datam do começo do Cretáceo (aproximadamente 120 milhões de anos atrás), sugerindo que estas plantas (cerca de 80% das samambaias atuais) se diversificaram após a expansão das angiospermas (Schneider et al. 2004).

Smith et al. (2006) reconheceram 37 famílias nesse grupo, caracterizado pelas raízes laterais formadas a partir da endoderme, pelo protoxilema mesarco (primeiras células do xilema em posição mediana, com maturação radial) nos brotos e pelos anterozoides com 30 a 1.000 flagelos.

Moran (2008) estimou que pertencem a este grupo aproximadamente 12.240 espécies, distribuídas mundialmente, com a maior diversidade concentrada nas regiões tropicais montanhosas. Essa diversidade diminui em direção às regiões subtropicais, sendo esse efeito conhecido como gradiente de diversidade latitudinal.

As samambaias (também chamadas de monilófitas) variam consideravelmente do ponto de vista morfológico, desde plantas muito pequenas, com um ou dois centímetros de comprimento, até plantas com porte arborescente, atingindo entre cinco e sete metros de altura e com um caule pronunciado (cáudice ou tronco arborescente). Ocorrem nos mais variados ecossistemas, desde regiões quentes e úmidas, até a periferia de desertos (Tryon & Tryon 1982). Assim como as licófitas, também estão representadas por plantas terrestres, epífitas, hemiepífitas, rupícolas ou aquáticas.

AS RECENTES CLASSIFICAÇÕES PARA SAMAMBAIAS E LICÓFITAS

Até o início da década de 1990, as samambaias e licófitas eram tratadas como um grupo único de plantas e geralmente classificadas como pertencendo a uma única divisão, denominada Pteridophyta (por ex., Tryon & Tryon 1982; Kramer & Green 1990, entre outros).

Pryer et al. (2001), baseados em marcadores moleculares de quatro genes, três plastidiais (*atpB, rbcL e rps4*) e um nuclear (rDNA), e caracteres morfológicos vegetativos e reprodutivos, demonstraram que as samambaias e as cavalinhas (*Equisetum*) formam um grupo monofilético, muito mais relacionado com as plantas com sementes do que com as licófitas e briófitas, como se pensava anteriormente. Este trabalho lançou uma nova luz sobre a classificação do grupo.

Estudos recentes envolvendo dados morfológicos, incluindo sete marcadores moleculares do cloroplasto (*rbcL, atpA, atpB, accD, rps4*, 16S rDNA, ITS), um marcador nuclear (18S rDNA) e três genes mitocondriais (*atp 1, nad2, nad5*) levaram a uma nova classificação para as samambaias, publicada por Smith et al. (2006, 2008). Como resultado do reconhecimento de grupos monofiléticos, várias famílias passaram a ter um número menor de gêneros e espécies, enquanto outras foram unidas tornando-se ainda maiores

(por ex., Hymenophyllopsidaceae e Cyatheaceae) e o posicionamento evolutivo de alguns grupos, antes incerto, agora tornou-se mais claro. Nesse trabalho, ficou demonstrado que Osmundaceae é um grupo basal com relação a todas as samambaias leptosporangiadas; que as samambaias arborescentes são monofiléticas e ocupam posição mediana na evolução do grupo; que as samambaias aquáticas também são monofiléticas e que a heterosporia (presença de dois tipos de esporos na mesma planta), característica compartilhada entre todos os seus membros, surgiu mais de uma vez na história evolutiva das plantas vasculares sem sementes, uma vez que também ocorre em Selaginellaceae (licófita); que as samambaias polipodioides são as mais derivadas e que as Polypodiaceae representam o ápice evolutivo dentro desse grupo de plantas.

Como as novas classificações reconhecem apenas grupos monofiléticos, o termo "pteridófitas" não está sendo mais utilizado para definir as samambaias e licófitas, uma vez que este termo representa um grupo parafilético. O que conhecíamos antes como "pteridófitas" corresponde, na verdade, a duas linhagens evolutivas distintas, monofiléticas (licófitas e samambaias). As licófitas divergiram muito antes das demais plantas vasculares e não são o grupo mais relacionado às samambaias. Por sua vez, as samambaias são mais relacionadas filogeneticamente com as plantas com sementes (gimnospermas e angiospermas), sendo atualmente tratadas como um grupo totalmente distinto das licófitas, apesar das semelhanças no ciclo de vida.

COMPILAÇÃO DOS DADOS

O levantamento preliminar dos nomes para compor essa lista de táxons foi feito pelo primeiro autor deste capítulo. As informações cedidas para composição inicial do banco de dados encontravam-se organizadas em uma planilha em Microsoft Excel (2007). A coleta foi feita ao longo dos últimos dez anos, principalmente baseada nos materiais depositados nos herbários: INPA, K, MBM, MO, NY, P, R, RB e SP. Além disso, vários nomes também foram incluídos na lista a partir da literatura, principalmente aqueles presentes nas revisões de gêneros e grupos de espécies, bem como nos trabalhos de flora recentemente publicados para o Brasil e/ou de países vizinhos. Outro aspecto que pesou na seleção e inclusão dos nomes na lista foi a experiência pessoal do autor. Isto evitou, *a priori*, a elaboração de uma lista "suja", baseada apenas em nomes existentes em coleções e/ou bancos de dados gerados por não especialistas em licófitas e samambaias.

Durante a avaliação realizada pelos especialistas que colaboraram nos diferentes grupos, várias espécies foram retiradas da lista inicial, que continha 1.254 táxons, incluindo espécies, subespécies e variedades. Por outro lado, alguns táxons foram inseridos. Entretanto, apenas para algumas famílias o número de táxons foi alterado significativamente pelos especialistas e essas alterações foram mantidas na lista final pelos coordenadores. Assim sendo, a estimativa de diversidade para cada família e gênero em particular é de inteira responsabilidade do especialista que os revisou.

Para a elaboração da lista aqui apresentada, foram adotados os conceitos mais recentes para os grupos e principalmente a nova classificação para samambaias publicada por Smith et al. (2006, 2008). Para as licófitas foi seguida a classificação proposta em Kramer & Green (1990).

DIVERSIDADE DE SAMAMBAIAS E LICÓFITAS NO BRASIL

Conforme Moran (2008), existem aproximadamente 13.600 espécies de licófitas e samambaias em todo o mundo. Em ambos os hemisférios o número de espécies aumenta em direção à linha do Equador. Isto posto, os centros de maior diversidade para ambos os grupos encontram-se nas seguintes localidades: Sudeste Asiático com 4.500 spp., América do Sul com 3.500 spp., Mesoamérica com 1.800 spp. e a região das Antilhas com 1.200 spp.

Na faixa neotropical, as regiões montanhosas se destacam pela concentração de um grande número de espécies, sendo que cerca de 40% são endêmicas (Tryon 1972). Para os Andes estima-se a ocorrência de 2.500 espécies de licófitas e samambaias (Moran 2008). Esse alto grau de diversidade pode ser explicado pela grande heterogeneidade ambiental encontrada nas regiões montanhosas. As diferentes escarpas de uma montanha podem conter solos, rochas, microclimas e elevações que favorecem o estabelecimento de diferentes grupos de samambaias e licófitas (Moran 2008).

Tryon & Tryon (1982) estimaram a ocorrência de cerca de 600 espécies no leste do Brasil, concentradas principalmente na região da Mata Atlântica, das quais aproximadamente 40% são endêmicas. Os gêneros mais diversos seriam: *Cyathea*, *Lindsaea*, *Elaphoglossum*, *Doryopteris*, *Asplenium* e a família Polypodiaceae como um todo. Prado (1998) estimou uma diversidade de aproximadamente 1.200–1.300 espécies de licófitas e samambaias para o Brasil.

Segundo dados aqui compilados, ocorrem no Brasil 1.176 espécies, sendo 123 licófitas e 1.053 samambaias. Desse montante, 450 (38,2%) são endêmicas do Brasil. O Domínio Fitogeográfico brasileiro com o maior número de espécies é, sem dúvida, a Mata Atlântica, com 834, seguido pela Amazônia, com 428, Cerrado, com 245, Caatinga, com 25, Pantanal, com 18 e Pampa, com apenas cinco espécies (fig. 1). A Região Sudeste é a mais diversa, com 789 espécies, seguida pela Sul com 540, Norte com 441, Nordeste 385 e Centro-Oeste com 328 (fig. 2).



Figura 1
Número de espécies de samambaias e licófitas por Domínio Fitogeográfico.



Figura 2
Número de espécies de samambaias e licófitas por Região.

ESTADO	NÚMERO DE ESPÉCIES
Minas Gerais	580
São Paulo	561
Rio de Janeiro	552
Paraná	426
Santa Catarina	402
Espírito Santo	331
Rio Grande do Sul	326
Bahia	313
Amazonas	294
Mato Grosso	229
Acre	182
Goiás	178
Pará	171
Pernambuco	164
Distrito Federal	107
Mato Grosso do Sul	104
Roraima	98
Ceará	96
Rondônia	86
Amapá	75
Alagoas	65
Maranhão	40
Paraíba	29
Piauí	21
Tocantins	20
Sergipe	10
Rio Grande do Norte	8

Tabela 1
Número de espécies de samambaias e licófitas por unidade da Federação.

As famílias com maior diversidade são Pteridaceae, Dryopteridaceae, Polypodiaceae, Thelypteridaceae, Hymenophyllaceae, Aspleniaceae, Anemiaceae, Selaginellaceae, Lycopodiaceae e Cyatheaceae. Juntas, concentram cerca de 80% das espécies e 87% do endemismo registrado no Brasil (fig. 3). Os gêneros mais diversos são *Thelypteris* (Thelypteridacee), *Elaphoglossum* (Dryopteridaceae), *Asplenium* (Aspleniaceae), *Anemia* (Anemiaceae), *Adiantum* (Pteridaceae), *Selaginella* (Selaginellaceae), *Huperzia* (Lycopodiaceae), *Trichomanes* (Hymenophyllaceae), *Cyathea* (Cyatheaceae), *Hymenophyllum* (Hymenophyllaceae), *Lindsaea* (Lindsaeaceae), *Blechnum* (Blechnaceae), *Doryopteris* (Pteridaceae), *Pteris* (Pteridaceae), *Diplazium* (Woodsiaceae), *Campyloneurum* (Polypodiaceae), *Pecluma* (Polypodiaceae), *Megalastrum* (Dryopteridaceae) *Microgramma* (Polypodiaceae) e *Ctenitis* (Dryopteridaceae) (tab. 2).



Figura 3
As 10 famílias mais diversas de samambaias e licófitas ocorrentes no Brasil, mostrando o total de espécies e o número de endêmicas.

GÊNEROS	TOTAL DE ESPÉCIES	ESPÉCIES ENDÊMICAS
Thelypteris	86	46
Elaphoglossum	78	35
Asplenium	77	22
Anemia	69	40
Adiantum	62	18
Selaginella	55	15
Huperzia	38	25
Trichomanes	33	2
Cyathea	30	19
Hymenophyllum	29	8
Lindsaea	27	5
Blechnum	27	8
Doryopteris	27	16
Pteris	22	6
Diplazium	22	8
Campyloneurum	21	5
Pecluma	18	8
Megalastrum	18	13
Microgramma	18	1
Ctenitis	17	10

Tabela 2
Os 20 gêneros mais diversos de samambaias e licófitas ocorrentes no Brasil, mostrando o total de espécies e o número de endêmicas.

É óbvio que estes números refletem apenas o atual estágio de conhecimento dessas plantas no Brasil e, certamente, essa não é exatamente a realidade. Os estados com menor número de táxons apontados anteriormente deverão demonstrar uma diversidade muito maior do que a que conhecemos hoje se forem mais bem explorados. Apesar dos dados numéricos aqui apresentados, ainda desconhecemos detalhadamente a distribuição da maioria das espécies e gêneros no território brasileiro.

REFERÊNCIAS

Kenrick, P. & Crane, P.R. 1997. *The Origin and Early Diversification of Land Plants*. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press.
Kramer, K.U. & Green, P.S. 1990. *The Families and Genera of Vascular Plants*. Vol. 1. *Pteridophytes and Gymnosperms*. Berlin: Springer-Verlag.
Moran, R.C. 2008. Diversity, Biogeography, and Floristics. In: T.A. Ranker & C.H. Haufler (eds.). *Biology and Evolution of Ferns and Lycophytes*. Cambridge: Cambridge University Press, p. 367-394.
Prado, J. 1998. Pteridófitas do Estado de São Paulo. In: C.E.M. Bicudo & G.J. Shepherd (eds.). *Biodiversidade do Estado de São Paulo*. 2. Fungos macroscópicos & plantas. São Paulo: Fapesp, p. 47-61.
Pryer, K.M.; Schneider, H.; Smith, A.R.; Cranfill, R.; Wolf, P.G.; Hunt, J.S. & Sipes, S.D. 2001. Horsetails and Ferns are a Monophyletic Group and the Closest Living Relatives to Seed Plants. *Nature* 409: 618-622.
Schneider, H.; Schuettpelz, E.; Pryer, K.M.; Cranfill, R.; Magallón, S. & Lupia, R. 2004. Ferns Diversified in the Shadow of Angiosperms. *Nature* 428: 553-557.
Smith, A.R.; Pryer, K.M.; Schuettpelz, E.; Korall, P.; Schneider, H. & Wolf, P.G. 2006. A Classification for Extant Ferns. *Taxon* 55(3): 705-731.
Smith, A.R.; Pryer, K.M.; Schuettpelz, E.; Korall, P.; Schneider, H. & Wolf, P.G. 2008. Fern Classification. In: T.A. Ranker & C.H. Haufler (eds.). *Biology and Evolution of Ferns and Lycophytes*. Cambridge: Cambridge University Press, p. 417-467.
Tryon, R.M. 1972. Endemic Areas and Speciation in Tropical American Ferns. *Biotropica* 4: 76-84.
Tryon, R.M. & Tryon, A.F. 1982. *Ferns and Allied Plants, with Special Reference to Tropical America*. Berlin: Springer-Verlag.

AS GIMNOSPERMAS DO BRASIL

Vinicius Castro Souza

CARACTERIZAÇÃO DAS GIMNOSPERMAS

As gimnospermas constituem um grupo que inclui as plantas vasculares com sementes não encerradas no interior de frutos. Trata-se de um grupo formado predominantemente por árvores, sendo menos comuns os arbustos *(Ephedra)* e as lianas *(Gnetum)*. O xilema das gimnospermas possui apenas traqueídes, com exceção das Gnetales que, como a grande maioria das angiospermas, apresentam também elementos de vaso. A polinização ocorre predominantemente por intermédio do vento, mas há exceções entre as Gnetales e Cycadales.

A maioria dos trabalhos recentes vem indicando que as gimnospermas são monofiléticas, ou seja, elas teriam um único ancestral e este deu origem apenas às gimnospermas. Entretanto, se forem também considerados os grupos fósseis, as plantas com sementes não formariam um grupo monofilético, já que as extintas pteridospermatófitas, também chamadas de "samambaias com sementes" possuem uma origem distinta.

A maior parte das gimnospermas ocorre em áreas temperadas do Hemisfério Norte, chegando a ser o elemento dominante das florestas perto do Círculo Ártico. No Brasil estão pouco representadas, contabilizando apenas cerca de 3% do total de espécies existentes no mundo. Tradicionalmente as gimnospermas são divididas em quatro grupos diferentemente tratados pelos diversos autores, tendo sido aqui adotada a terminologia empregada por Judd et al. (2008): as Cycadales (representadas no Brasil pela família Zamiaceae), as Ginkgoaceae (não representadas no Brasil), as coníferas (representadas no Brasil por Araucariaceae e Podocarpaceae) e as Gnetales (representadas no Brasil por Ephedraceae e Gnetaceae).

COMPILAÇÃO DOS DADOS

O levantamento preliminar dos nomes para compor esta lista de táxons foi feito pela coordenação do projeto. Essa lista prévia foi checada e complementada por dados disponíveis em herbários nacionais e do exterior, bem como por referências bibliográficas diversas. Foram de grande importância os dados disponíveis no site *splink* (splink.cria.org.br) e em Farjon (2001), complementado pelo *world checklist*, organizado pelo Royal Botanic Gardens, Kew (www.kew.org), para as famílias Araucariaceae, Ephedraceae e Gnetaceae. Floras estaduais também foram consultadas, incluindo a flora do Acre (Daly & Silveira 2008), Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Dubs 1998), Santa Catarina (Reitz & Klein 1966) e São Paulo (Garcia 2002).

DIVERSIDADE DAS GIMNOSPERMAS NO BRASIL

Alguns táxons foram aqui acrescidos em relação aos trabalhos anteriores que visaram representar a biodiversidade de gimnospermas do Brasil. Na *Flora brasiliensis* (Eichler 1863) foram apresentadas 12 espécies, número gradativamente ampliado com a descrição de novas espécies e com o aumento do conhecimento dos limites de distribuição dos táxons. Lewinsohn & Prado (2004) estimaram em 15 o número de gimnospermas do Brasil, Giulietti et al. (2005) referiram 16 e Souza & Lorenzi (2008) estimaram em 20. No presente trabalho estão sendo arroladas 23 espécies (excluindo as três espécies de *Pinus* que ocorrem no Brasil como subespontâneas), distribuídas em seis gêneros e cinco famílias. Apenas duas espécies, *Podocarpus barretoi* Laubenf. & Silba e *P. lambertii* Klotzsch *ex* Endl., são possivelmente endêmicas do Brasil.

O Domínio Fitogeográfico brasileiro com o maior número de espécies de gimnospermas é a Amazônia, com 16 espécies. Embora isto possa parecer contrastante com o senso comum de que as gimnospermas ocorrem predominantemente em áreas mais frias, essa concentração se justifica pela riqueza de espécies de Gnetaceae, Podocarpaceae e Zamiaceae e pela escassez de outras espécies de gimnospermas nos demais Domínios. Adicionalmente, merece destaque o fato de que, no Brasil, os gêneros *Gnetum* (seis espécies) e *Retrophyllum* (duas espécies) ocorrem exclusivamente na Amazônia. O segundo Domínio mais rico é o Cerrado, com cinco espécies de *Podocarpus* e uma de *Zamia*. A Mata Atlântica, onde ocorre *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze, a principal espécie de gimnosperma do Brasil – quer pelo seu destaque na paisagem, quer pela sua ampla distribuição geográfica e importância econômica – possui apenas outras quatro espécies de gimnospermas (fig. 1 e 2).



Figura 1
Número de espécies de gimnospermas por Domínio Fitogeográfico.



Figura 2
Número de espécies de gimnospermas por Região.

Em alguns estados brasileiros – Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins – não foram registradas gimnospermas (tab. 1), mas é bastante provável que isto reflita lacunas de coleta, uma vez que a maioria desses estados tem sua flora ainda insuficientemente conhecida.

ESTADO	NÚMERO DE ESPÉCIES
Amazonas	12
Acre	8
Rio Grande do Sul	7
Paraná	6
Santa Catarina	6
São Paulo	6
Goiás	5
Mato Grosso	5
Rio de Janeiro	5
Minas Gerais	4
Pará	4
Rondônia	4
Distrito Federal	3
Espírito Santo	3
Bahia	2
Alagoas	1
Amapá	1
Mato Grosso do Sul	1
Pernambuco	1
Sergipe	1
Ceará	0
Maranhão	0
Paraíba	0
Piauí	0
Rio Grande do Norte	0
Roraima	0
Tocantins	0

Tabela 1
Número de espécies de gimnospermas por unidade da Federação.

O estabelecimento de espécies de *Pinus* subespontâneas no Brasil tem alcançado grau alarmante, em especial nos estados do Sul e Sudeste. O conhecimento sobre esse assunto ainda é precário, embora seja possível verificar com grande frequência o aparecimento de indivíduos de *Pinus* povoando bordas de estradas em áreas ocupadas originalmente por mata atlântica e também campos naturais, dificultando, assim, a recuperação das áreas degradadas e competindo com as espécies nativas. A maioria das espécies de *Pinus* foi introduzida no Brasil no século XX, com finalidade silvicultural, principalmente devido ao rápido crescimento e facilidade nos tratos culturais.

REFERÊNCIAS

Daly, D.C. & Silveira, M. 2008. *Primeiro catálogo da flora do Acre*, *Brasil*. Rio Branco: Edufac.
Dubs, B. 1998. *Prodromus florae matogrossensis*. Suíça: Betrona-Verlag, Küsnacht.
Eichler, A.G. 1863. Gnetaceae, Cycadeae, Coniferae. In: C.F.P. Martius (ed.). *Flora brasiliensis*. Vol. 4(1): 397-452.
Farjon, A. 2001. *World Checklist and Bibliography of Conifers*. 2ª ed. Kew: Royal Botanic Gardens.
Garcia, R.J.F. 2002. Araucariaceae, Podocarpaceae. In: M.G.L. Wanderley et al. (ed.). *Flora fanerogâmica do Estado de São Paulo*. Vol. 2. São Paulo: Fapesp; Hucitec.
Giulietti, A. M.; Harley, R.M.; Queiroz, L.P.; Wanderley, M.G.L.; van den Berg, C. 2005. Biodiversidade e conservação das plantas no Brasil. *Megadiversidade* 1(1): 52-61.
Judd, W.S.; Campbell, C.S.; Kellogg, E.A.; Stevens, P.F.; Donoghue, M.J. 2008. *Plant Systematics: A Phylogenetic Approach*. 3ª ed. Sunderland: Sinauer Associates.
Lewinsohn, T.M. & Prado, P.I. 2004. *Biodiversidade brasileira: síntese do conhecimento atual*. 2ª. ed. São Paulo: Contexto.
Reitz, R. & Klein, R.M. 1966. Araucariáceas. In: R. Reitz (ed.). *Flora ilustrada catarinense*, parte I, fasc. Arau. Itajaí: Herbário Barbosa Rodrigues.
Souza, V.C. & Lorenzi, H. 2008. *Botânica sistemática. Guia ilustrado para identificação das famílias de angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II*. 2ª ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudos da Flora Ltda.

AS ANGIOSPERMAS DO BRASIL

Rafaela C. Forzza, José Fernando A. Baumgratz, Andrea Costa, Mike Hopkins, Paula M. Leitman, Lucia G. Lohmann, Gustavo Martinelli, Marli P. Morim, Marcus A. Nadruz Coelho, Ariane L. Peixoto, José Rubens Pirani, Luciano P. Queiroz, João Renato Stehmann, Bruno M. T. Walter & Daniela Zappi

CARACTERIZAÇÃO DAS ANGIOSPERMAS

Maior grupo de plantas do mundo, as angiospermas, também tratadas como divisão Magnoliophyta, têm seu nome derivado do grego *angio* = urna e *sperma* = semente. Esses termos juntos fazem alusão à presença do fruto envolvendo as sementes. Além da presença de carpelos desenvolvidos protegendo as sementes, há uma série de apomorfias definindo o grupo, tais como o desenvolvimento de ápice caulinar com túnica-corpo em duas camadas, estômatos com as bordas das células-guarda no mesmo nível do poro, flores perfeitas (bissexuadas), óvulos marginais, anátropos, bitegumentados e tegumentos com duas a três células de espessura, pólen bicelular ou eventualmente tricelular no momento da liberação da antera, presença de sifonogamia, tubo crivado (floema) alongado com paredes de calose, dupla fecundação e endosperma triploide e celular (APG III 2009). Muitas dessas sinapomorfias experimentam modificações de forma independente, ao longo dos grandes clados das angiospermas (ex. posição dos óvulos, configuração das flores).

Com o incremento dos estudos morfoanatômicos e ontogenéticos em grupos sabidamente basais na filogenia das angiospermas, algumas das sinapomorfias supracitadas têm sido melhor entendidas. Williams & Friedman (2004) mostraram que o típico gametófito feminino do grupo, com sete células em dois módulos (micropilar e calazar), originando endosperma triploide, deve ter surgido apenas no ancestral comum do clado formado pelas monocotiledôneas + magnoliídeas + eudicotiledôneas. Isso porque nas linhagens mais basais, Nymphaeales e Austrobaileyales, o gametófito feminino tem apenas quatro células organizadas em um só módulo (micropilar), não havendo ainda diferenciação de antípodas, e, assim, essas plantas produzem endosperma diploide na semente.

Dois grandes grupos de angiospermas, dicotiledôneas e monocotiledôneas, foram reconhecidos desde 1798 por Jussieu (Lawrence 1951), que organizou as plantas em famílias, a categoria básica utilizada na classificação até a atualidade. Cronquist (1981), procurando retratar as afinidades evolutivas dos grupos de angiospermas, manteve as dicotiledôneas e monocotiledôneas em nível de classe, divididas em subclasses, respectivamente Magnoliopsida (divididas em seis subclasses) e Liliopsida (com cinco subclasses).

Com o advento da sistemática filogenética, já em 1978 Bremer & Wanntorp alertavam os botânicos para o fato de que as classes e subclasses reconhecidas em angiospermas e mesmo grupos menores na hierarquia não seriam monofiléticos. Contudo, na academia e na prática a classificação proposta por Arthur Cronquist e outros sistemas gradistas ou evolutivos persistiram dominando até meados da década de 1990. Tampouco tiveram o impacto e a aceitação que certamente mereciam as análises

filogenéticas baseadas em dados morfológicos apresentadas por Dahlgren & Bremer (1985), que buscavam resolver a classificação em altos níveis hierárquicos das angiospermas, ou por Dahlgren et al. (1985), aprimorando a sistemática das monocotiledôneas. Mesmo assim, trabalhos cladísticos de grande envergadura para o entendimento das relações filogenéticas em altos níveis hierárquicos nas plantas vasculares e sobre a origem das angiospermas continuaram a ser realizados, entre outros, por Crane (1985) e Doyle & Donoghue (1986). Este último trabalho deve ser destacado por ter fornecido, com base em morfologia, a primeira evidência consistente de um grande clado sustentado pela sinapomorfia pólen tricolpado, que eles denominaram "tricolpadas" ou "eudicotiledôneas" (Pirani 2005).

Durante as duas últimas décadas, o fortalecimento da cladística, combinado ao avanço das pesquisas envolvendo técnicas moleculares, permitiu a obtenção de sequências de nucleotídeos de genes plastidiais e nucleares. Esses estudos revelaram que muitos dos grupos tradicionalmente reconhecidos em angiospermas são parafiléticos ou polifiléticos, inclusive a subdivisão básica entre dicotiledôneas e monocotiledôneas (Chase et al. 1993). Por outro lado, os dados moleculares corroboraram o grande clado "eudicotiledôneas" que, como proposto por Doyle & Donoghue (1986), é composto pelos grupos dotados de pólen tricolpado e tipos derivados. Na tentativa de sistematizar as novas descobertas que rapidamente foram se acumulando, vários cientistas associaram-se sob a sigla APG, ou Angiosperm Phylogeny Group, propondo uma classificação integrada e dinâmica que refletiria as descobertas da filogenia molecular: APG (1998), APG II (2003), APG III (2009).

Tendo como base a estabilização das hipóteses filogenéticas obtidas sobre as angiospermas (APG III 2009), Chase & Reveal (2009) propuseram uma nova classificação para o grupo. Esses autores sugerem que, para manter a estabilidade nomenclatural dos grandes grupos de plantas terrestres, as angiospermas passem a ser consideradas, em nível de subclasse denominada Magnoliideae. As monocotiledôneas, corroboradas como robusto grupo monofilético, devem ser classificadas como superordem Lilianae, com 11 ordens, abrangendo cerca de 22% das espécies viventes de angiospermas. Por sua vez, as dicotiledôneas são efetivamente parafiléticas, e devem ser divididas em angiospermas-nucleares, com três superordens (Amborellanae, Nymphaeanae e Austrobaileyanae) e angiospermas-core, nas quais a superordem Magnolianae se encontra em posição basal em relação às Lilianae e ao restante das dicotiledôneas. A superordem Ceratophyllanae, com apenas uma família, está situada basalmente em relação ao restante do grupo, que continua sendo informalmente denominado "eudicotiledôneas". É nesse grupo que se concentra a maior diversidade das angiospermas (75% das espécies viventes), com nove superordens subdivididas em 34 ordens, sendo que alguns grupos ainda apresentam problemas de posicionamento.

O sistema de Chase & Reveal (2009) tem suscitado controvérsia devido a existência de muitos pontos polêmicos, como tratar todas as plantas vasculares como uma só classe (Equisetopsida) e deixar sem categorização taxonômica muitos clados robustos como eudicotiledôneas, eudicotiledôneas-nucleares, fabídeas, malvídeas, lamiídeas, campanulídeas e comelinídeas. Não se pode avaliar por ora se esse sistema será ou não acatado universalmente, mas reafirmamos seu intuito e desafio de aprimorar a sistemática.

COMPILAÇÃO DOS DADOS

As obras utilizadas para compor a base de dados inicial das angiospermas do Brasil foram: Barbosa et al. (2006), Daly & Silveira (2009), Queiroz et al. (2006), Mendonça et al. (2008), Stehmann et al. (2009) e a *Flora brasiliensis revisitada* (2009). Também foram incorporados ao sistema os dados disponibilizados pelo pesquisador Mike Hopkins (provenientes de coletas amazônicas) e os da coleção de tipos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro – RB (www.jbrj.gov.br/jabot), extremamente rica em espécimes coletados pelo botânico Adolpho Ducke na Amazônia. Estes dois últimos conjuntos de dados, provenientes exclusivamente de registros de herbário, foram incluídos por constituírem fontes de informação voltadas para a Amazônia, uma das regiões menos conhecidas em termos de número de coletas por área (Shepherd 2005) e com poucos inventários publicados. Apesar dessas bases terem gerado um aumento no número de táxons duvidosos no sistema, considerou-se necessário incluí-los para que os taxonomistas pudessem rever a validade e a ocorrência dos mesmos no Brasil.

As famílias de angiospermas apresentadas neste catálogo estão baseadas em APG II (2003).

DIVERSIDADE E ENDEMISMO DAS ANGIOSPERMAS NO BRASIL

A *Flora brasiliensis*, publicada entre 1840 e 1906, apresentou 18.846 espécies de angiospermas (Urban 1906). Devido às dimensões desse grande grupo e à dificuldade de quantificar a sobreposição das diferentes floras, as estimativas do número de espécies de angiospermas no Brasil variaram muito ao longo das últimas décadas.

Lewinsohn & Prado (2002) estimaram entre 40.000 e 45.000 o total de espécies de angiospermas conhecidas para o Brasil, enquanto Giulietti et al. (2005) citaram 50.000. Shepherd (2005) calculou a diversidade deste grupo usando como base a contagem de 20.972 espécies de dicotiledôneas apresentadas por Barroso et al. (1978, 1984, 1986) e ajustando a estimativa de monocotiledôneas em 9.236 espécies. Para tanto, utilizou a proporção de 12,3% de dicotiledôneas do mundo calculadas a partir de Mabberley (1987), sobre um total mundial de 250.000 espécies, chegando, desse modo, a uma estimativa conservadora na faixa de 30.000 a 35.000 angiospermas para o Brasil. Analisando outras fontes e estimativas para chegar ao provável número total de espécies descritas de fanerógamas ocorrentes no território nacional, Shepherd (2005) defendeu o intervalo entre 40.000 e 45.000. Porém, enquanto Lewinsohn & Prado (2002) tratavam estritamente das angiospermas, Shepherd (2005) mencionou o mesmo intervalo para fanerógamas.

Devido às flutuações nos números de plantas vasculares apresentados para a flora mundial, que oscilam entre 231.413 espécies (Stebbins 1974), 250.000 (Mabberley 1987), entre 240.000 e 250.000 (Lewinsohn & Prado 2002), 270.000 (Hammond 1992), 320.000 (Prance & Beentje 2000), 352.000 (Paton et al. 2008) até 422.127 (Govaerts 2001), as estimativas oferecidas por diferentes autores para o Brasil também variam bastante. O catálogo atual registra números de táxons que foram validados por taxonomistas – números que certamente influenciarão as próximas estimativas mundiais – contribuindo para a correção e provável diminuição dos intervalos existentes.

Na presente lista foram registradas no Brasil 227 famílias, compreendendo 2.818 gêneros e 31.162 espécies de angiospermas, das quais 8.466 (27%) são monocotiledôneas. Estes números totais de espécies ficam dentro do intervalo da estimativa conservadora apresentada por Shepherd (2005). A taxa de endemismo para o grupo é de 56,6% (17.630 spp.), enquanto somente para as monocotiledôneas a porcentagem de endemismo é de 60% (5.073 spp.).

Assim como foi visto para os fungos e plantas como um todo (capítulo 1), o Domínio da Mata Atlântica é o que exibe maior riqueza (13.972 spp.) e também a maior quantidade de espécies (7.014) e gêneros (109) endêmicos. Estes números posicionam a flora vascular da Mata Atlântica, efetivamente, entre as maiores do globo (Myers et al. 2000, Martini et al. 2007).

O Cerrado e a Amazônia estão equiparados em diversidade de espécies (fig. 1), embora o Cerrado apresente 4.150 espécies e 40 gêneros endêmicos, enquanto a Amazônia possui 1.948 espécies e 42 gêneros endêmicos, seguidos em riqueza pelo Domínio da Caatinga, com 4.320 espécies (744 spp. e 29 gêneros endêmicos). O Pampa, com 1.345 espécies (76 endêmicas), não possui gêneros endêmicos no Brasil e, no Pantanal, foram registradas apenas 885 espécies, das quais 46 são endêmicas, além de um gênero endêmico no Brasil (*Atomostigma* – Rosaceae).



Figura 1.
Número de espécies de angiospermas por Domínio Fitogeográfico.

Stehmann et al. (2009) referiram um número próximo de espécies para o Domínio da Mata Atlântica (13.708 spp.), porém o número de espécies endêmicas (6.663) indicadas por estes autores seria 5% menor do que aquele aqui registrado. A taxa de endemicidade de angiospermas da Mata Atlântica, segundo o presente catálogo, é de 51%. A alta diversidade neste Domínio não se expressa apenas pela riqueza em espécies (diversidade alfa) e no alto grau de endemismo aqui documentados. Pesquisas recentes mostram que grande contingente, se não a maioria, das espécies de árvores da Mata Atlântica exibe padrões de raridade. Todas as sete formas de raridade propostas por Rabinowitz et al. (1981) estão presentes nas 846 espécies arbóreas estudadas por Caiafa & Martins (2010), com base em 225 levantamentos fitossociológicos realizados na porção sul da Mata Atlântica (do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul).

A riqueza em espécies registrada no Cerrado corrobora os dados de Mendonça et al. (2008) e reflete a soma das espécies ocorrentes nos diversos ecossistemas encontrados nesse Domínio, como as matas de galeria, com mais de 2.000 espécies (Felfili et al. 2001). Devemos ressaltar que a maior parte do Domínio do Cerrado encontra-se inserido no Brasil (Ab'Saber 1983), incluindo na porção brasileira centros de endemismo como os campos rupestres (Giulietti & Pirani 1988), o que explica a maior taxa de endemicidade encontrada neste em relação à Amazônia. Muitos autores já chamaram a atenção para o fato de os altos níveis de endemismo apontados para o Cerrado se concentrarem ao longo das serras da Cadeia do Espinhaço e de Goiás (e.g. Prance 1994, Simon & Proença 2000, Fiaschi & Pirani 2009).

É possível que a riqueza em espécies do Domínio Amazônico esteja subamostrada. A densidade de coletas na região é baixa e pontual (Nelson et al. 1992, Schulman et al. 2007), e recentes estudos com modelagem indicam grandes regiões essencialmente inexploradas, que podem abrigar muitas espécies ainda não registradas (Hopkins 2007). A mesma situação descrita com relação à raridade de espécies na Mata Atlântica (Caiafa & Martins 2010) parece também ocorrer na Amazônia (Oliveira 1999, Oliveira et al. 2002). Assim, somente com a realização de inventários florísticos de longa duração, semelhantes ao realizado na Reserva Ducke (Ribeiro et al. 1999), poderemos conhecer melhor a diversidade da flora amazônica. Por outro lado, não esperamos um aumento significativo na taxa de endemicidade no Domínio Amazônico no território brasileiro, duas vezes menor do que o registrado no Cerrado, e isto se explica pelas vastas dimensões reais deste Domínio, que se estende muito além das fronteiras políticas do Brasil.

Para o Domínio da Caatinga, o presente catálogo registra um número 19% menor de espécies do que o citado por Queiroz et al. (2006) para o semiárido brasileiro, onde são referidas 5.344 espécies. Essa diferença deve-se, em parte, ao conceito de semiárido incluir uma porção do Cerrado no oeste da Bahia e no noroeste de Minas Gerais. O endemismo para o Domínio da Caatinga foi de 18%, mas, apesar de relativamente baixo, está coerente com os números sugeridos por Prado (2003) para o Domínio das Florestas Sazonais Tropicais, com apenas cerca de 300 espécies endêmicas.

O Pampa no Brasil apresenta baixo endemismo (cerca de 6%), pois sua extensão mais expressiva situa-se no Uruguai e no nordeste da Argentina. Porém, assim como foi comentado para a Amazônia, é possível que a riqueza em espécies desse Domínio também esteja subestimada. Apenas para o Rio Grande do Sul, Boldrini (2009) sugeriu que a diversidade campestre seria da ordem de 2.200 espécies. Pott & Pott (1997) referiram um número ao redor de 1.700 espécies para o Pantanal, estimando posteriormente em 1.800 o número de fanerógamas (Pott & Pott 2000). Infelizmente a amostragem do presente catálogo também ficou muito aquém, com apenas 885 espécies registradas, evidenciando a necessidade de um levantamento mais acurado da diversidade desse Domínio.

Conforme aqui identificado, padrões globais de diversidade vegetal discutidos por Kier et al. (2005) também apontam lacunas de conhecimento na Amazônia meridional, no Pantanal e no Pampa. Em termos de amostragem botânica, vale destacar que o Pantanal tem apenas 0,34 espécimes documentados em herbário por km^2, o Pampa 0,54 espécimes/km^2 e a Amazônia 0,13 espécimes/km^2 (Shepherd 2005, Sobral & Stehmann 2009).

Com relação às Regiões Políticas, o Sudeste possui a riqueza mais elevada do país (fig. 2), devido à soma dos Domínios da Mata Atlântica, do Cerrado e de uma pequena porção da Caatinga, que incluem ecossistemas muito ricos em espécies como os campos de altitude, os campos rupestres e as restingas. Além disso, concentra a maioria dos taxonomistas, coletores e estudiosos da botânica no país (Shepherd 2005), o que pode ter influência no seu maior conhecimento florístico.



Figura 2.
Número de espécies de angiospermas por Região.

A riqueza em espécies encontrada na Região Norte foi 30% maior do que a registrada na região Centro-Oeste (fig. 2), apesar de o Domínio do Cerrado ser equivalente ao Amazônico em número de espécies (fig. 1). Embora a região seja dominada pela Floresta Amazônica, há estados, como o Tocantins, que são cobertos em sua maior parte por vegetação de Cerrado ou áreas de transição com este Domínio. Adicionalmente, a flora das savanas amazônicas também se inclui basicamente na Região Norte. Ademais, no Centro-Oeste, ocorrem campos rupestres inseridos no Domínio do Cerrado que, contudo, detêm uma flora menos rica que a dos campos do Sudeste.

Barbosa et al. (1996), com base em literatura, estimaram 7.000 nomes para a Região Nordeste, enquanto Zappi & Nunes (2002) calcularam em torno de 10.000 espécies, utilizando como base os espécimes de herbário depositados no Royal Botanic Gardens, Kew (K). Os números aqui apresentados aproximam-se desse total (fig. 2). O fato de a riqueza no Nordeste ter sido maior do que a do Centro-Oeste e do Sul pode ser atribuído à ocorrência de quatro Domínios Fitogeográficos na Região (Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga).

Para a Região Sul, Zuloaga et al. (2008) referiram cerca de 7.000 espécies de angiospermas, um número muito próximo ao registrado no presente catálogo.

A distribuição da riqueza e do endemismo de angiospermas nas unidades da Federação é apresentada na Tabela 1. Em termos de riqueza, destacam-se os estados de Minas Gerais, Bahia, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Paraná, todos com mais de 5.000 espécies. Já com relação ao endemismo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro foram mais bem representados, com mais de 1.000 espécies

A influência da Mata Atlântica sobre os estados das Regiões Sul e Sudeste, além da Bahia, fica evidente ao se observar que aqueles com frações significativas deste Domínio aparecem entre os primeiros 11 mais diversos (tab. 1). A Mata Atlântica ao norte da foz do Rio São Francisco parece ser menos diversificada (Martinelli et al. 2008, Murray-Smith et al. 2008), ou mesmo apresenta remanescentes tão empobrecidos que não é possível saber exatamente qual a riqueza original dessas áreas (Tabarelli et al. 2007).

A maior riqueza em espécies de Minas Gerais deve-se à diversidade de ambientes e fitofisionomias presentes em três Domínios Fitogeográficos no estado. Em termos geomorfológicos, o estado possui um relevo fortemente acidentado, com as serras da Mantiqueira e do Espinhaço, cinco grandes bacias hidrográficas e outras particularidades, como a região cárstica (Drummond et al. 2005), que também influenciam o estabelecimento do rico mosaico de biodiversidade. A posição estratégica desse estado com relação à confluência de diferentes floras, representando o limite meridional de certas espécies e o limite setentrional de muitas outras, leva à extraordinária riqueza encontrada, com cerca de 30% do total da diversidade registrada no Brasil.

ESTADO	NÚMERO DE ESPÉCIES	NÚMERO DE ESPÉCIES ENDÊMICAS
Minas Gerais	10.039	2.158
Bahia	7.686	1.621
Amazonas	7.528	692
São Paulo	6.921	354
Rio de Janeiro	6.768	1.181
Pará	5.626	290
Paraná	5.262	188
Goiás	4.818	520
Mato Grosso	4.585	262
Santa Catarina	4.112	183
Espírito Santo	3.971	472
Acre	3.740	108
Rio Grande do Sul	3.673	177
Mato Grosso do Sul	2.816	59
Distrito Federal	2.672	36
Rondônia	2.544	47
Pernambuco	2.421	76
Maranhão	2.414	48
Roraima	2.239	29
Amapá	2.198	37
Ceará	1.888	49
Piauí	1.416	33
Tocantins	1.354	48
Paraíba	1.272	9
Alagoas	1.102	10
Sergipe	770	2
Rio Grande do Norte	707	3

Tabela 1.
Número de espécies de angiospermas por unidade da Federação

A Bahia, com geomorfologia também variada, contém os mesmos três Domínios encontrados em Minas Gerais, porém em proporções diferentes. Na Bahia há o predomínio territorial da Caatinga, que ocupa a Depressão Sertaneja Meridional (Queiroz et al. 2006), com seu clima semiárido. Queiroz et al. (2006) calcularam que apenas 1.512 espécies ocorram na Caatinga *stricto sensu*. Ainda assim, a Mata Atlântica no sul da Bahia (Amorim et al. 2009) e a Chapada Diamantina (Zappi et al. 2003) contribuem com o grande número de espécies registradas para o estado.

O estado do Amazonas, em terceiro lugar em ordem de riqueza em espécies, a despeito da baixa amostragem registrada por Shepherd (2005) para a Região Norte, possui mais de 7.000 espécies de angiospermas. A impressionante diversidade registrada somente na área da Reserva Ducke (100km^2), com 1.887 angiospermas (Hopkins 2005), talvez possa ser encontrada em novas áreas ainda inexploradas (Oliveira 1999, Oliveira et al. 2002).

Seguindo-se a Minas Gerais, Bahia e Amazonas, os estados mais ricos em número de espécies (tab. 1) são Rio de Janeiro e São Paulo. Ambos possuem forte influência do Domínio da Mata Atlântica, sendo que São Paulo conta ainda com a contribuição do Cerrado. De maneira semelhante ao estado do Amazonas, que foi suplantado por Minas Gerais e pela Bahia, é interessante constatar que São Paulo e o Rio de Janeiro também ultrapassaram o Pará, o sexto colocado e basicamente incluso no Domínio Amazônico. Assim, os dois maiores estados do país em dimensão territorial (Amazonas e Pará) não suportaram um maior número de espécies de angiospermas, pelo menos com os dados atualmente disponíveis. Deve ser salientado que a pouca diversidade registrada em alguns dos estados (tab. 1) pode estar refletindo uma baixa densidade de coleta e também a falta de acesso a certas coleções por parte de especialistas.

O conjunto das dez famílias mais diversificadas (fig. 3) concentra cerca de metade da diversidade e do endemismo encontrados para o Brasil como um todo. Em termos de endemismo, Fabaceae, família

com maior riqueza em espécies, apresenta taxa de endemicidade de 54,1%, portanto menor do que a encontrada em Bromeliaceae (85,3%), Myrtaceae (76,2%), Orchidaceae (66,9%), Asteraceae (65,6%), Euphorbiaceae (65,5%), Melastomataceae (64,3%) e Apocynaceae (55,56%). Entre as dez maiores famílias, Rubiaceae (51,6%) e Poaceae (32,7%) apresentaram a menor proporção de espécies endêmicas.



Figura 3.
As dez famílias mais diversas de angiospermas ocorrentes no Brasil, mostrando o total de espécies e o número de endêmicas.

MATA ATLÂNTICA	CERRADO	AMAZÔNIA	CAATINGA	PAMPA	PANTANAL
Orchidaceae (1.413)	Asteraceae (1.174)	Fabaceae (1.103)	Fabaceae (620)	Asteraceae (262)	Poaceae (134)
Fabaceae (939)	Fabaceae (1.158)	Orchidaceae (750)	Poaceae (289)	Poaceae (245)	Fabaceae (102)
Bromeliaceae (861)	Orchidaceae (669)	Rubiaceae (676)	Asteraceae (271)	Fabaceae (109)	Malvaceae (58)
Asteraceae (847)	Poaceae (614)	Melastomataceae (474)	Euphorbiaceae (199)	Cyperaceae (92)	Cyperaceae (58)
Poaceae (713)	Eriocaulaceae (482)	Poaceae (434)	Rubiaceae (155)	Solanaceae (41)	Asteraceae (51)
Myrtaceae (642)	Melastomataceae (470)	Apocynaceae (304)	Malvaceae (144)	Iridaceae (32)	Bignoniaceae (49)
Melastomataceae (579)	Rubiaceae (350)	Annonaceae (280)	Cyperaceae (137)	Verbenaceae (30)	Sapindaceae (31)
Rubiaceae (519)	Malvaceae (312)	Cyperaceae (270)	Apocynaceae (135)	Caryophyllaceae (30)	Lamiaceae (21)
Apocynaceae (348)	Lamiaceae (302)	Araceae (263)	Orchidaceae (134)	Cactaceae (29)	Convolvulaceae (18)
Solanaceae (316)	Apocynaceae (300)	Euphorbiaceae (256)	Melastomataceae (112)	Apiaceae (28)	Plantaginaceae (17)
7.177 spp.	5.831 spp.	4.810 spp.	2.196 spp.	898 spp.	539 spp.

Tabela 2.
As dez famílias mais diversas de angiospermas em cada Domínio Fitogeográfico.

As três maiores famílias de angiospermas (Orchidaceae, Asteraceae e Fabaceae) também estão entre as mais ricas nos diferentes Domínios Fitogeográficos brasileiros, excetuando a Amazônia, onde Asteraceae não figura entre as mais diversas, e o Pampa e Pantanal, onde Orchidaceae não aparece entre as mais ricas (tab. 2). Destaque-se também a alta diversidade de Poaceae em todos os Domínios brasileiros, inclusive naqueles predominantemente florestais, como Mata Atlântica e Amazônia, sendo a família mais rica no Pantanal.

Na Mata Atlântica, destaca-se a posição ocupada pelas Bromeliaceae e Myrtaceae, na Amazônia pelas Annonaceae e Araceae, no Cerrado pelas Eriocaulaceae (concentradas nos campos rupestres).

Estas famílias figuram entre as mais diversas apenas nesses Domínios. Por outro lado, na Caatinga nenhuma família exclusiva tem destaque entre as dez maiores, apesar de Euphorbiaceae e Malvaceae ocuparem uma posição diferenciada. No Pampa e no Pantanal várias famílias, que não figuram entre as dez mais ricas nos demais Domínios, podem ser observadas. No Pampa predominam grupos herbáceos, subarbustivos e arbustivos (Iridaceae, Verbenaceae, Caryophyllaceae e Apiaceae), bem como representantes globosos de Cactaceae e, no Pantanal, destacam-se trepadeiras e lianas (Bignoniaceae, Convolvulaceae, Sapindaceae).

O número de famílias necessário para atingir mais de 50% da diversidade da flora de angiospermas é maior na Amazônia do que nos outros Domínios (tab. 2), sendo que as dez maiores famílias representam mais de dois terços da flora do Pampa (70%) e do Pantanal (66%). É interessante notar que, na Mata Atlântica, no Cerrado e na Caatinga, as dez famílias mais ricas equivalem a exatamente 53% de suas floras.

Os gêneros mais bem representados na flora brasileira correspondem em boa parte àqueles mais ricos do planeta, como *Piper*, *Solanum*, *Psychotria* e *Eugenia* (Frodin 2004). As maiores famílias do mundo contribuem com dois ou mais dos gêneros mais diversificados (Fabaceae – 3, Asteraceae – 2 e Orchidaceae – 2). Já Melastomataceae (com *Miconia* e *Leandra*) e Myrtaceae (com *Eugenia* e *Myrcia*) são famílias cuja riqueza combinada é tida como característica peculiar da flora brasileira (e.g. Good 1974). Bromeliaceae (com *Vriesea* e *Aechmea*) é uma família quase exclusivamente neotropical e apresenta impressionante diversidade na costa leste brasileira (Martinelli et al. 2008).

Entre os gêneros enumerados na tabela 3, muitos têm centro de diversidade na região neotropical ou mesmo no Brasil, como *Paepalanthus* e *Xyris* (cujas famílias possuem seu centro de diversidade no Brasil), além de *Chamaecrista*, *Croton*, *Vriesea*, *Tibouchina* e *Hyptis*. Deve ser ressaltada também a alta proporção de espécies endêmicas do país em relação ao total de espécies nesses gêneros, como, por exemplo em *Vriesea*, que é o décimo quinto gênero mais rico, mas contém uma taxa de endemismo extraordinária no Brasil (95,9%). Apenas *Paspalum* e *Rhynchospora* têm proporção de endemismo relativamente mais baixa, e ambos são gêneros grandes, com ampla distribuição além dos limites do território brasileiro.

Dos dez gêneros mais diversos (tab. 3), a vasta maioria é composta por plantas lenhosas, mesmo que de pequeno porte. Doze dos gêneros mais ricos concentram sua maior diversidade específica em ambientes abertos (savânicos, campestres, rupestres), mas a maioria (18) a exibe em ambientes de florestas, mesmo levando-se em conta que foram tabulados como predominando em "formações abertas". Alguns gêneros apresentam alta riqueza na orla de formações arbóreas, na transição para formações abertas (*Mikania*, *Dioscorea*, *Passiflora*). Aparentemente, diferentes grupos experimentaram intensa diversificação e irradiação, explorando tanto formações florestais como não florestais. Um caso único nesse conjunto de 30 gêneros são as Fabaceae, onde dois gêneros alcançaram maior diversificação em formações abertas (*Chamaecrista* e *Mimosa*) e um em florestas (*Inga*).

Os dados aqui apresentados correspondem ao conhecimento atual da flora brasileira e de forma alguma podem ser considerados definitivos. Estados e Domínios com menor diversidade deverão ser melhor amostrados, tanto com coletas exploratórias como por meio de inventários de longa duração. Da mesma forma, acreditamos que somente com coleções bem preservadas, curadas e com frequentes visitas de especialistas poderemos refinar o conhecimento aqui disponibilizado.

O próximo desafio para a comunidade científica no caminho de contabilizar a flora mundial está na difícil tarefa de compatibilizar tratamentos taxonômicos dos diferentes países numa mesma base de comparação. Os países da América Latina, por exemplo, vêm apresentando suas listas nacionais nos últimos 15 anos. A sobreposição de espécies, muitas vezes tratadas com nomes diferentes em países limítrofes, e a influência das mudanças nomenclaturais e de circunscrição dos táxons dificultam a simples comparação das listas existentes. Porém, com este catálogo, o Brasil dá um passo seguro no sentido de permitir e aprimorar essas comparações, disponibilizando uma lista sólida e embasada por um grande grupo de especialistas.

GÊNEROS	FAMÍLIAS	TOTAL DE ESPÉCIES	ESPÉCIES ENDÊMICAS	% DE ESPÉCIES ENDÊMICAS	FORMAÇÕES COM MAIOR DIVERSIDADE
Paepalanthus	Eriocaulaceae	357	339	94,96	abertas
Eugenia	Myrtaceae	356	274	76,97	florestais
Mimosa	Fabaceae	323	244	75,54	abertas
Piper	Piperaceae	283	191	67,49	florestais
Miconia	Melastomataceae	276	121	43,84	florestais
Psychotria	Rubiaceae	264	137	51,89	florestais
Solanum	Solanaceae	258	127	49,22	florestais
Chamaecrista	Fabaceae	253	202	79,84	abertas
Myrcia	Myrtaceae	215	168	78,14	florestais
Leandra	Melastomataceae	213	167	78,40	florestais
Begonia	Begoniaceae	208	184	88,46	florestais
Hyptis	Lamiaceae	202	146	72,28	abertas
Paspalum	Poaceae	202	72	35,64	abertas
Mikania	Asteraceae	198	140	70,71	abertas
Vriesea	Bromeliaceae	194	186	95,88	florestais
Croton	Euphorbiaceae	186	135	72,58	abertas
Aechmea	Bromeliaceae	172	141	81,98	florestais
Xyris	Xyridaceae	167	127	76,05	abertas
Peperomia	Piperaceae	159	110	69,18	florestais
Philodendron	Araceae	156	127	81,41	florestais
Ocotea	Lauraceae	155	95	61,29	florestais
Habenaria	Orchidaceae	153	96	62,75	abertas
Tibouchina	Melastomataceae	150	131	87,33	florestais
Baccharis	Asteraceae	149	95	63,76	abertas
Rhynchospora	Cyperaceae	136	33	24,26	abertas
Epidendrum	Orchidaceae	133	81	60,90	abertas
Dioscorea	Dioscoreaceae	130	94	72,31	florestais
Passiflora	Passifloraceae	129	83	64,34	florestais
Inga	Fabaceae	127	52	40,94	florestais
Justicia	Acanthaceae	126	75	59,52	florestais

Tabela 3.
Os 30 gêneros mais diversos de angiospermas ocorrentes no Brasil.

REFERÊNCIAS

Ab'Saber, A.N. 1983. O domínio dos cerrados: introdução ao conhecimento. *Fundação Centro de Formação do Servidor Público* 3(4): 41-55.
Amorim, A.M.; Jardim, J.G.; Lopes, M.M.M.; Fiaschi, P.; Borges, R.A.X.; Perdiz, R.O. & Thomas, W.W. 2009. Angiospermas em remanescentes de floresta montana no sul da Bahia, Brasil. *Biota Neotropica* 9(3): 313-348.
APG. 1998. An Ordinal Classification for the Families of Flowering Plants. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 85: 531-553
APG II. 2003. An Update of the Angiosperm Phylogeny Group Classification for the Orders and Families of Flowering Plants: APG II. *Botanical Journal of the Linnean Society* 141: 399-436.
APG III. 2009. An Update of the Angiosperm Phylogeny Group Classification for the Orders and Families of Flowering Plants: APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society* 161: 105–121.
Barbosa, M.R.V.; Mayo, S.J.; Castro, A.A.J.F.; Freitas, G.L.D.; Pereira, M.S.; Gadelha-Neto, P.C. & Moreira, H.M. 1996. Checklist preliminar das angiospermas. p.253-415. In: Sampaio, E.V.S.B.; Mayo, S.J.; Barbosa, M.R.V. (eds.) *Pesquisa botânica nordestina: progresso e perspectivas*. Recife: SBB/Seção Regional de Pernambuco.

Barbosa, M.R.V.; Sothers, C.; Mayo, S.; Gamarra-Rojas, C. & Mesquita, A.C. (orgs.). 2006. *Checklist das plantas do Nordeste brasileiro: angiospermas e gymnospermas*. Brasília: Ministério de Ciência e Tecnologia.
Barroso, G.M.; Guimarães, E.F.; Ichaso, C.L.F.; Costa, C.G. & Peixoto, A.L. 1978. *Sistemática de angiospermas do Brasil*, vol. 1. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.
Barroso, G.M.; Peixoto, A.L.; Ichaso, C.L.F.; Costa, C.G.; Guimarães, E.F. & Lima, H.C. 1984. *Sistemática de angiospermas do Brasil*, vol. 2. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.
Barroso, G.M.; Peixoto, A.L.; Ichaso, C.L.F.; Costa, C.G.; Guimarães, E.F. & Lima, H.C. 1986. *Sistemática de angiospermas do Brasil*, vol. 3. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.
Boldrini, I.I. 2009. A flora dos campos do Rio Grande do Sul. In: Pillar, V.D.P.; Muller, S.C.; Castilhos, Z.M.S. & Jacques, A.V.A. (eds.). *Campos Sulinos: conservação e uso sustentável da biodiversidade*. Brasília: MMA, p.63-77.
Bremer, K. & Wanntorp, H-E. 1978. Phylogenetic Systematics in Botany. *Taxon* 27(4): 317-329.
Caiafa, A.N. & Martins, F.R. 2010. Forms of Rarity of Tree Species in the Southern Brazilian Atlantic Rainforest. *Biodiversity and Conservation* (publicado *on-line* DOI 10.1007/s10531-9861-6).
Chase, M.; Soltis, D.E.; Olmstead, R.G.; Morgan, D.; Les, D.H.; Mishler, B.D.; Duvall, M.R.; Price, R.A.; Hills, H.G.; Qiu, Y.-L.; Kron, K.A.; Rettig, J.H.; Conti, E.; Palmer, J.D.; Manhart, J. R.; Sytsma, K.J.; Michaels, H.J.; Kress, W.J.; Karol, K.G.; Clark, W.D.; Hedrén, M.; Gaut, B.S.; Jansen, R.K.; Kim, K.-J.; Wimpee, C.F.; Smith, J.F.; Furnier, G.R.; Strauss, S.H.; Xiang, Q.-Y.; Plunkett, G.M.; Soltis, P.S.; Swensen, S.M.; Williams, S.E.; Gadek, P.A.; Quinn, C.J.; Eguiarte, L.E.; Golenberg, E.; Learn, G.H.Jr.; Graham, S.W.; Barrett, S.C.H.; Dayanandan, S. & Albert, V.A. 1993. Phylogenetics of Seed Plants: An Analysis of Nucleotide Sequences from the Plastid Gene rbcL. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 80: 528-580.
Chase, M.W. & Reveal, J.E. 2009. A Phylogenetic Classification of the Land Plants to Accompany: APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society* 161: 122-127.
Crane, P.R. 1985. Phylogenetic Analysis of Seed Plants and the Origin of Angiosperms. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 72: 716-793.
Cronquist, A. 1981. *An Integrated System of Classification of Flowering Plants*. New York: Columbia University Press.
Dahlgren, R. M. T. & Bremer, K. 1985. Major Clades of the Angiosperms. *Cladistics* 1: 349-368.
Dahlgren, R.M.T.; Clifford, H.T. & Yeo, P.F. 1985. *The Families of the Monocotyledons*. Berlin: Springer Verlag.
Daly, D.C. & Silveira, M. 2009. *Primeiro catálogo da flora do Acre, Brasil/First catalogue of the flora of Acre*, Brazil. Rio Branco: EDIUFAC. 421 p.
Doyle, D.A. & Donoghue, M.J. 1986. Seed Plant Phylogeny and the Origin of the Angiosperms: an Experimental Cladistic Approach. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 81: 419-450.
Drummond, G.M.; Martins, C.S.; Machado, A.B.M.; Sebaio, F.A.; Antonini, Y. 2005. *Biodiversidade em Minas Gerais*, ed. 2. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte.
Felfili, J.M.; Mendonça, R.C.; Walter, B.M.T.; Silva Jr., M.C.; Nóbrega, M.G.G.; Fagg, C.W., Sevilla, A.C. & Silva, M.A. 2001. Flora fanerogâmica das matas de galeria e ciliares do Brasil Central. In: Ribeiro, J.F.; Fonseca, C.E.L. & Sousa-Silva, J.C. (eds.). *Cerrado: caracterização e recuperação de matas de galeria*. Planaltina: Embrapa Cerrados. p. 195-263.
Fiaschi, P. & Pirani, J.R. 2009. Review of Plant Biogeographic Studies in Brazil. *Journal of Systematics and Evolution* 47 (5): 477-496.
***Flora brasiliensis revisitada*. 2009.** Publicado na Internet: http://flora.cria.org.br/ [acesso em 10 de março de 2009].
Frodin, V.G. 2004. History and Concepts of Big Plant Genera. *Taxon* 53: 753-776.
Giulietti, A.M.; Harley, R.M.; Queiroz, L.P.; Wanderley, M.G.L. & Van den Berg, C. 2005. Biodiversidade e conservação das plantas no Brasil. *Megadiversidade* 1: 52-61.
Giulietti, A.M. & Pirani, J.R. 1988. Patterns of Geographic Distribution of Some Plant Species from the Espinhaço Range, Minas Gerais and Bahia. In: Heyer, W.R. & Vanzolini, P.E. (eds.), *Proceedings of a Workshop on Neotropical Distribution Patterns:*. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, p. 39-69.
Good, R. 1974. *The Geography of the Flowering Plants*. 4ª ed. London: Longman,.
Govaerts, R. 2001. How Many Species of Seed Plants are There? *Taxon* 50: 1085-1090.
Hammond, P.M. 1992. Species Inventory. In: Groombridge, B. (ed.). *Global Biodiversity, Status of the Eearth's Living Resources*. London: Chapman & Hall, p. 17-39.
Hopkins, M.J.G. 2005. Flora da Reserva Ducke. *Rodriguésia* 56(86): 9-25.
Hopkins, M.J.G. 2007. Modelling the Known and Unknown Plant Biodiversity of the Amazon Basin. *Journal of Biogeography*, 34: 1400-1411.
Kier, G.; Mutke, J.; Dinerstein, Ricketts, T.H.; Küper, W.; Kreft, H. & Barthlott, W. 2005. Global Patterns of Plant Diversity and Floristic Knowledge. *Journal of Biogeography* 32: 1107-1116.
Lawrence, G.H.M. 1951. *Taxonomy of Vascular Plants*. New York: The Macmillan Company.

Lewinsohn, T.L. & Prado, P.I. 2002. *Biodiversidade brasileira, síntese do estado atual do conhecimento*. São Paulo: Editora Contexto.
Mabberley, D.J. 1987. *The Plant Book*. Cambridge Univ. Press.
Martinelli, G.; Vieira, C.M.; Gonzalez, M.; Leitman, P.; Piratininga, A.; Costa, A.F. & Forzza, R.C. 2008. Bromeliaceae da Mata Atlântica Brasileira: lista de espécies, distribuição e conservação. *Rodriguésia* 59(1): 209-258.
Martini, A.M.Z.; Fiaschi, P.; Amorim, A.M.A.; Paixão, J.L. 2007. A Hotpoint within a Hotspot: a High Diversity Site in Brazil's Atlantic Forest. *Biodiversity and Conservation* 16: 3111-3128.
Mendonça, R.C.; Felfili, J.M.; Walter, B.M.T.; Silva Júnior, M.C.; Rezende, A.V.; Filgueiras, T.S.; Nogueira, P.E. & Fagg, C.W. 2008. Flora vascular do bioma Cerrado: *checklist* com 12.356 espécies. In: Sano, S.M., Almeida, S.P. & Ribeiro, J.F. *Cerrado: ecologia e flora*. Brasília: Embrapa Cerrados/ Embrapa Informação Tecnológica, vol. 2., p.421-1279.
Murray-Smith, C.; Brummit, N.A.; Oliveira-Filho, A.T.; Bachman, S.; Moat, J.; Nic Lughadha, E.M. & Lucas, E.J. 2008. Plant Diversity Hotspots in the Atlantic Coastal Forests of Brazil. *Conservation Biology* 23: 151-163.
Myers, N.; Mittermeier, R.A.; Mittermeier, C.G.; Fonseca, G.A.B. da & Kent, J. 2000. Biodiversity Hotspots for Conservation Priorities. *Nature* 403: 853-858
Nelson, B.W.; Ferreira, C.A.; Silva, M.F. & Kawasaki, M.L. 1992. Refugia: Endemism Centers and Collecting Density in Brazilian Amazonia. *Nature* 345: 714-716.
Oliveira, A.A. 1999. A Central Amazonian Terra Firme Forest. I. High Tree Species Richness on Poor Soils. *Biodiversity and Conservation* 8: 1219-1244.
Oliveira, A.A.; Ferreira, L.V.; Perez, E. L.; Nelson, B.W. & Almeida, S. S. 2002. A flora fanerogâmica amazônica: composição, diversidade, endemismo e conservação. In: Araújo, E.L.; Moura, A.N.; Sampaio, E.V.B.; Gestinari, L.M.S & Carneiro, J.M.T. (orgs.). *Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora brasileira*. Pernambuco: Imprensa Universitária /UFRP, p. 15-18.
Paton, A.J.; Brummit, N.; Govaerts, R.; Harman, K; Hinchcliffe, S.; Allkin, B. & Nic Lughadha, E. 2008. Towards Target 1 of the Global Strategy for Plant Conservation: A Working List of All Known Plant Species – Progress and Prospects. *Taxon* 57: 602-611
Pirani, J.R. 2005. *Sistemática: tendências e desenvolvimento, incluindo impedimentos para o avanço do conhecimento na área*. Publicado na Internet: www.cria.org.br/cgee [acessado 1º de julho de 2010].
Pott, A. & Pott, V.J. 1997. *Plants of Pantanal*. Corumbá: Embrapa – SPI.
Pott, V.J. & Pott, A. 2000. *Plantas aquáticas do Pantanal*. Brasília: Embrapa CPAP/Embrapa Comunicação para Transferência de Tecnologia.
Prado, D. 2003. As caatingas da América do Sul. In: I.R. Leal, M. Tabarelli & J.M.C. Silva (eds.). *Ecologia e conservação da Caatinga*. Recife: Editora Universitária, Universidade Federal de Pernambuco, p. 3-73.
Prance, G.T. 1994. A Comparison of the Efficacy of Higher Taxa and Species Numbers in the Assessment of Biodiversity in the Neotropics. *Philosophical Transactions of the Royal Society London, Series B: Biological Sciences* 345: 89-99.
Prance, G.T. & Beentje, H. 2000. The Tropical Flora Remains Undercollected. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 87: 67-71.
Queiroz, L. P.; Conceição, A. A. & Giulietti, A. M. 2006. Nordeste semiárido: caracterização geral e lista das fanerógamas. In: Giulietti, A. M.; Conceição, A. A., Queiroz, L. P. (eds.). *Instituto do Milênio do Semiárido – Diversidade e caracterização das fanerógamas do semiárido brasileiro*. Recife: Associação Plantas do Nordeste, vol. 1, p. 15-359.
Rabinowitz, D. & Caims, S. & Dillon, T. 1981. Seven Forms of Rarity and their Frequency in the Flora of the British Isles. In: Soulé, M.E. (ed.). *Conservation Biology: the Science of Scarcity and Diversity*. Massachusetts: Sinauer Associates..
Ribeiro, J.E.L.S.; Hopkins, M.J.G.; Vicentini, A.; Sothers, C.A.; Costa, M.A.S.; Brito, J.M.; Souza, M.A.D.; Martins, L.H.P.; Lohmann, L.G.; Assunção, P.A.C.L.; Pereira, E.C.; Silva, C.F.; Mesquita, M.R. & Procópio, L.C. 1999. *Flora da Reserva Ducke, Guia de identificação*. Manaus: DFID & INPA. 800 p.
Schulman, L.; Tovoinen, T. & Ruokolainen. 2007. Analysing Botanical Collection Effort in Amazonia and Correcting for it in Species Range Estimation. *Journal of Biogeography* 34(8): 1388-1399.
Shepherd, G.J. 2005. Plantas Terrestres. In: Lewinsohn, T.M. (org.). Avaliação do estado do conhecimento da biodiversidade brasileira. *Série Biodiversidade* 15(2): 145-192.
Simon, M.F. & Proença, C. 2000. Phytogeographic Patterns of Mimosa (Mimosoideae, Leguminosae) in the Cerrado Biome of Brazil: An Indicator Genus of High-altitude Centers of Endemism? *Biological Conservation* 96: 279-296.
Sobral, M. & Stehmann, J.R. 2009. An Analysis of New Angiosperm Species Discoveries in Brazil (1990 – 2006). *Taxon* 58(1): 227-232.
Stebbins, G.L.1974. *Flowering Plants: Evolution Above the Species Level*. London: Arnold.
Stehmann, J.R.; Forzza, R.C.; Salino, A.; Sobral, M.; Costa, D.P. & Kamino, L.H.Y. (Eds.). 2009. *Plantas da Floresta Atlântica*. Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Tabarelli, M.; Aguiar, A.V.; Grillo, A.S. & Santos, A.M.M. 2007. Fragmentation and Habitat Loss in the Atlantic Forest North of the São Francisco River. In: Siqueira Filho, J.A. & Leme, E.M.C. (eds.) *Fragments of the Atlantic Forest of Northeast Brazil*. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio.
Urban, I. 1906. Index Familiarum. In: Martius, C.P.F. von. *Flora brasiliensis* 1(1): 239-268.
Williams, J.H. & Friedman, W.E. 2004. The Four-celled Female Gametophyte of Illicium (Illiciaceae; Austrobaileyales): Implications for Understanding the Origin and Early Evolution of Monocots, Eumagnoliids and Eudicots. *American Journal of Botany* 91(3): 332-351.
Wilson, E.O. 1992. *The Diversity of Life*. Massachusetts: Cambridge.
Zappi, D. & Nunes, T.S. 2002. Lista preliminar da Família Rubiaceae na Região Nordeste do Brasil. *Série Repatriamento de Dados de Herbário de Kew para a Flora do Nordeste do Brasil* 1: 1-50.
Zappi, D.C.; Lucas, E.; Stannard, B.L.; Nic Lughadha, E.; Pirani, J.R.; Queiroz, L.P.; Atkins, S.; Hind, D.J.N.; Giulietti, A.M.; Harley, R.M. & Carvalho, A.M. 2003. Lista das Plantas Vasculares de Catolés, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. *Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo* 21(2): 345-398.
Zuloaga, F.O.; Morrone, O. & Belgrano, M.J. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), vol. 1. *Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107*.



LISTA DE ESPÉCIES

FUNGOS

Coordenadores: Leonor Costa Maia & Aníbal Alves de Carvalho Jr.
908 gêneros, 3.608 espécies (523 endêmicas),
1 subespécie (não endêmica), 74 variedades (12 endêmicas)

FUNGOS *LATO SENSU*

83 gêneros, 421 espécies (6 endêmicas),
3 variedades (nenhuma endêmica)

HYPHOCHYTRIOMYCOTA

1 gênero, 4 espécies (nenhuma endêmica)

HYPHOCHYTRIALES

Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli
1 gênero, 4 espécies (nenhuma endêmica)

Rhizidiomyces

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhizidiomyces apophysatus* Zopf**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Rhizidiomyces bivellatus* Nabel**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 41.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, RO); Amazônia
***Rhizidiomyces hansonii* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 41.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, RO); Amazônia
***Rhizidiomyces hirsutus* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 41.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AC); Amazônia

LABYRINTHULOMYCOTA

3 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica)

THRAUSTOCHYTRIALES

Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli
3 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica)

Oblongichytrium

1 espécie (não endêmica)
***Oblongichytrium multirudimentale* (S.Goldst.) R.Yokoy. & D.Honda**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 42.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica



Schizochytrium
1 espécie (não endêmica)
***Schizochytrium aggregatum* S.Goldst. & Belsky**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 41-42pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

Thraustochytrium
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Thraustochytrium pachydermum* Scholz**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 42.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Thraustochytrium proliferum* Sparrow**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 42.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

MYXOMYCOTA
38 gêneros, 216 espécies (6 endêmicas),
1 variedade (não endêmica)

CERATIOMYXALES
Laise de Holanda Cavalcanti Andrade
1 gênero, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Ceratiomyxa
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Ceratiomyxa fruticulosa* (O.F.Müll.) T.Macbr.**
Voucher: Cavalcanti, L.H. (UFP 31341)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ceratiomyxa morchella* A.L.Welden**
Voucher: Bezerra, M.F.A. (UFP 34353)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PB, PE, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Ceratiomyxa sphaerosperma* Boedijn**
Voucher: Santos, D.S. (HUEFS 61567)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PB, PE, BA, SE);
Amazônia, Mata Atlântica

ECHINOSTELIALES
Laise de Holanda Cavalcanti Andrade
2 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

Clastoderma
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Clastoderma debaryanum* A.Blytt**
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PA, PE, BA); Sudeste (SP), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Clastoderma debaryanum* var. *imperatoria* Emoto**
Referência: Cavalcanti, L.H. 1978. Análise comparativa das espécies encontradas no Cerrado protegido e no queimado anualmente 129-140.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Cerrado

Echinostelium
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Echinostelium arboreum* H.W.Keller & T.E.Brooks**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (AL); Caatinga
***Echinostelium colliculosum* K.D.Whitney & H.W.Keller**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Echinostelium minutum* De Bary**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

LICEALES
Laise de Holanda Cavalcanti Andrade
6 gêneros, 37 espécies (nenhuma endêmica)

Cribraria
16 espécies (nenhuma endêmica)
***Cribraria argillacea* (Pers. *ex* J.F.Gmel.) Pers.**
Referência: Torrend, C. 1915. Broteria 13: 72-88.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Cribraria aurantiaca* Schrad.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Cribraria cancellata* (Batsch) Nann.-Bremek.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cribraria confusa* Nann.-Bremek. & Y.Yamam.**
Referência: Cavalcanti, L.H. et al. 2006. Diversidade biológica e conservação da Floresta Atlântica ao norte do rio São Francisco 53-74.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (RN, PE, AL, SE); Mata Atlântica
***Cribraria elegans* Berk. & Curt.**
Referência: Hochgesand, E. & Gottsberger, G. 1996. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 10: 1-46.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Cribraria intricata* Schrad.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Cribraria languescens* Rex**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, SE), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Cribraria laxa* Hagelst.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Cribraria microcarpa* (Schrad.) Pers.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Cribraria minutissima* Schwein.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Cribraria mirabilis* (Rostaf.) Massee**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PB); Mata Atlântica
***Cribraria piriformis* Schrad.**
Referência: Hochgesand, E. & Gottsberger, G. 1996. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 10: 1-46.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Cribraria splendens* (Schrad.) Pers.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Cribraria tenella* Schrad.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Cribraria violacea* Rex**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (SC); Caatinga, Mata Atlântica
***Cribraria vulgaris* Schrad.**
Referência: Putzke, J. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 221-223.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB), Sul (SC); Mata Atlântica

Dictydiaethalium

1 espécie (não endêmica)
***Dictydiaethalium plumbeum* (Schumach.) Rostaf.**
Voucher: Costa, A.A.A. 575 (UFP 43219)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Licea

11 espécies (nenhuma endêmica)
***Licea biforis* Morgan**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, AL, SE), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido
***Licea castanea* G.Lister**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Licea denudescens* H.W.Keller & T.E.Brooks**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PE); Mata Atlântica
***Licea erecta* K.S.Thind & Dhillon**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Licea floriformis* T.N.Lakh. & R.K.Chopra**
Referência: Bezerra, A.C.C. et al. 2007. Revista Brasileira de Biociências 5: 30-32.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN); Mata Atlântica
***Licea kleistobolus* G.W.Martin**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Licea operculata* (Wingate) G.W.Martin**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Licea parasitica* (Zukal) G.W.Martin**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Licea pedicellata* (H.C.Gilbert) H.C.Gilbert**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Licea tenera* E.Jahn**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido
***Licea variabilis* Schrad.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PE); Mata Atlântica

Lycogala
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Lycogala conicum* Pers.**
Referência: Bezerra, M.F.A. et al. 2007.
Acta botanica 21: 107-118.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Lycogala epidendrum* (L.) Fr.**
Referência: Bezerra, M.F.A. et al. 2007.
Acta botanica 21: 107-118.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Amazônia, Mata Atlântica
***Lycogala exiguum* Morgan**
Referência: Costa, A.A.A. et al. 2009. Acta botanica 23: 313-322.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, PE, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

Reticularia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Reticularia jurana* Meyl.**
Voucher: Bezerra, A.C.C. s.n. (URM 13720)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, PE, AL, SE), Sudeste (SP), Sul; Caatinga, Mata Atlântica
***Reticularia lycoperdon* Bull.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (RN, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Tubulifera
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Tubulifera arachnoidea* Jacq.**
Referência: Bezerra, M.F.A. et al. 2007.
Acta botanica 21: 107-118.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE, SE), Sul (SC); Mata Atlântica
***Tubulifera bombarda* (Berk. & Broome) Lado**
Referência: Bezerra, M.F.A. et al. 2007.
Acta botanica 21: 107-118.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE, SE), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Tubulifera dimorphotheca* (Nann.-Bremek. & Loer.) Lado**
Voucher: Lemos, D.B.N. s.n. (UFP 58433)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE, SE); Mata Atlântica
***Tubulifera microsperma* (Berk. & M.A.Curtis) Lado**
Voucher: Parente, M.P.M. s.n. (UFP 58607)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

PHYSARALES
Laise de Holanda Cavalcanti Andrade, Larissa Trierveiler Pereira
11 gêneros, 94 espécies (3 endêmicas)

Badhamia
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Badhamia affinis* Rostaf.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Badhamia calcaripes* Gottsb.**
Referência: Hochgesand, E. & Gottsberger, G. 1996.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 10: 1-46.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Badhamia macrocarpa* (Ces.) Rostaf.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (CE, PE); Mata Atlântica
***Badhamia melanospora* Speg.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (RN, PE), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Badhamia nitens* Berk.**
Referência: Putzke, J. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 221-223.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Badhamia panicea* (Fr.) Rostaf.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Badhamia papaveracea* Berk. & Ravenel**
Referência: Torrend, C. 1915. Broteria 13: 72-88.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Badhamiopsis
1 espécie (não endêmica)
***Badhamiopsis ainoae* (Yamash.) T.E.Brooks & H.W.Keller**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica

Craterium
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Craterium aureum* (Schumach.) Rostaf.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PI, PB, PE, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Craterium leucocephalum* (Pers. *ex* J.F.Gmel.) Ditmar**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Craterium paraguayense* (Speg.) G.Lister**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, PE, SE), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Diachea
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Diachea bulbillosa* (Berk. & Broome) Lister**
Referência: Cavalcanti, L.H. et al. 2009.
Mycotaxon 110: 163-172.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PI); Cerrado, Mata Atlântica

***Diachea leucopodia* (Bull.) Rostaf.**
Referência: Cavalcanti, L.H. et al. 2009. Mycotaxon 110: 163-172.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PE, BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Diachea sIlvaepluvialis* M.L.Farr**
Referência: Cavalcanti, L.H. et al. 2009. Mycotaxon 110: 163-172.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, PE, SE); Mata Atlântica

Diderma

9 espécies (1 endêmica)
***Diderma chondrioderma* (De Bary & Rostaf.) G.Lister**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Diderma cor-rubrum* T.Macbr.**
Referência: Maimoni-Rodella, R.C.S. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 217-220.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Diderma corrugatum* T.E.Brooks & H.W.Keller**
Referência: Hochgesand, E. & Gottsberger, G. 1996. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 10: 1-46.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Diderma deplanatum* Fr.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, PE, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Diderma effusum* (Schwein.) Morgan**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, SE), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Diderma hemisphaericum* (Bull.) Hornem.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Diderma rugosum* (Rex) T.Macbr.**
Voucher: Bezerra, M.F.A. 776 (UFP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Diderma spumarioides* (Fr.) Fr.**
Referência: Torrend, C. 1915. Broteria 13: 72-88.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC); Mata Atlântica
***Diderma stellulum* M.L.Farr**
Referência: Rodrigues, C.L.M. & Guerrero, R.T. 1990. Boletim do Instituto de Biociências 46: 1-102.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Didymium

15 espécies (nenhuma endêmica)
***Didymium anellus* Morgan**
Referência: Cavalcanti, L.H. et al. 2006. Diversidade biológica e conservação da Floresta Atlântica ao norte do rio São Francisco 53-74.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Didymium aquatile* Gottsb. & Nann.-Bremek.**
Referência: Hochgesand, E. & Gottsberger, G. 1996. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 10: 1-46.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Didymium bahiense* Gottsb.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica
***Didymium clavus* (Alb. & Schwein.) Rabenh.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PI, PE, BA, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Didymium columella-cavum* Hochg. et al.**
Voucher: Bezerra, A.C.C. s.n. (UFP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Didymium difforme* (Pers.) Gray**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Mata Atlântica
***Didymium eximium* Peck**
Referência: Torrend, C. 1915. Broteria 13: 72-88.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Didymium flexuosum* Yamash.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Didymium intermedium* J.Schröt.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (SC); Mata Atlântica
***Didymium iridis* (Ditmar) Fr.**
Referência: Torrend, C. 1915. Broteria 13: 72-88.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Didymium melanospermum* (Pers.) T.Macbr.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Didymium minus* (Lister) Morgan**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Didymium nigripes* (Link) Fr.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PI, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Didymium ochroideum* G.Lister**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Didymium squamulosum* (Alb. & Schwein.) Fr.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

Fuligo

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Fuligo cinerea* (Schwein.) Morgan**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Fuligo megaspora* Sturgis**
Referência: Hochgesand, E. & Gottsberger, G. 1996. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 10: 1-46.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Fuligo septica* (L.) F.H.Wigg.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Leocarpus

1 espécie (não endêmica)
***Leocarpus fragilis* (Dicks.) Rostaf.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul; Mata Atlântica

Physarella

1 espécie (não endêmica)
***Physarella oblonga* (Berk. & M.A.Curtis) Morgan**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Physarum

50 espécies (2 endêmicas)
***Physarum albescens* Ellis *ex* T.Macbr.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Physarum album* (Bull.) Chevall.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Physarum alvoradianum* Gottsb.**
Referência: Gottsberger, G. 1968. Nova Hedwigia 15: 361-368.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Physarum auriscalpium* Cooke**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Physarum bethelii* T.Macbr. *ex* G.Lister**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Physarum bivalve* Pers.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Physarum bogoriense* Racib.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Physarum cinereum* (Batsch) Pers.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Physarum compressum* Alb. & Schwein.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Physarum conglomeratum* (Fr.) Rostaf.**
Referência: Bezerra, M.F.A. et al. 2008. Acta botanica 22: 1044-1056.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Physarum crateriforme* Petch**
Referência: Bezerra, M.F.A. et al. 2008. Acta botanica 22: 1044-1056.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, SE), Sudeste; Mata Atlântica
***Physarum decipiens* M.A.Curtis**
Referência: Bezerra, M.F.A. et al. 2008. Acta botanica 22: 1044-1056.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, PE, SE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Physarum didermoides* (Pers.) Rostaf.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Physarum echinosporum* Lister**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Physarum flavicomum* Berk.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Physarum fulgens* Pat.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Physarum galbeum* Wingate**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Physarum globuliferum* (Bull.) Pers.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Physarum gyrosum* Rostaf.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sul (SC); Caatinga, Mata Atlântica

***Physarum javanicum* Racib.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Physarum lateridium* (Berk. & Ravenel) Morgan**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Physarum leucophaeum* Fr.**
Referência: Bezerra, M.F.A. et al. 2008. Acta botanica 22: 1044-1056.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, SE), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Physarum leucopus* Link**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Physarum megalosporum* T.Macbr.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Physarum melleum* (Berk. & Broome) Massee**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Physarum mennengae* Nann.-Bremek.**
Referência: Maimoni-Rodella, R.C.S. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 217-220.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Physarum mutabile* (Rostaf.) G.Lister**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Physarum nicaraguense* T.Macbr.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, AL), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Physarum nitens* (Lister) Ing**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Physarum notabile* T.Macbr.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Physarum nucleatum* Rex**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PI, CE, PE, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Physarum nudum* T.Macbr.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Physarum oblatum* T.Macbr.**
Referência: Bezerra, M.F.A. et al. 2008. Acta botanica 22: 1044-1056.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE); Mata Atlântica

***Physarum ovisporum* G.Lister**
Referência: Hochgesand, E. & Gottsberger, G. 1996. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 10: 1-46.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Physarum penetrale* Rex**
Referência: Cavalcanti, L.H. et al. 2006. Diversidade biológica e conservação da Floresta Atlântica ao norte do rio São Francisco 53-74.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Physarum pezizoideum* (Jungh.) Pav. & Lagarde**
Referência: Cavalcanti, L.H. et al. 2006. Diversidade biológica e conservação da Floresta Atlântica ao norte do rio São Francisco 14: 53-74.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE, BA, AL), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Physarum polycephalum* Schwein.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Physarum pulcherrimum* Berk. & Ravenel**
Referência: Bezerra, M.F.A. et al. 2008. Acta botanica 22: 1044-1056.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica

***Physarum pusillum* (Berk. & Curtis) G.Lister**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, SE), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Physarum reniforme* (Massee) G.Lister**
Referência: Torrend, C. 1915. Broteria 13: 72-88.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (MA); Domínio desconhecido
***Physarum rigidum* (G.Lister) G.Lister**
Referência: Parente, M.P.M. et al. 2009. Check List 5: 759-762.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (PI, PE), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica
***Physarum roseum* Berk. & Broome**
Referência: Bezerra, M.F.A. et al. 2008.
Acta botanica 22: 1044-1056.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (RN, PE, SE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Physarum serpula* Morgan**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade,
conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Physarum sessile* Brândza**
Referência: Hochgesand, E. & Gottsberger, G. 1996.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 10: 1-46.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Physarum stellatum* (Massee) G.W.Martin**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade,
conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP,
AM), Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Physarum straminipes* Lister**
Referência: Cavalcanti, L.H. et al. 2006. Diversidade e
caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 49-74.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Physarum sulphureum* Alb. & Schwein.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade,
conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Physarum tenerum* Rex**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa,
série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (AM), Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (SP),
Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Physarum vernum* Sommerf.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa,
série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Physarum viride* (Bull.) Pers.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade,
conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (PI, RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,
SC); Amazônia, Mata Atlântica

Willkommlangea
1 espécie (não endêmica)
***Willkommlangea reticulata* (Alb. & Schwein.) Kuntze**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa,
série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido

STEMONITALES
Laise de Holanda Cavalcanti Andrade
10 gêneros, 34 espécies (1 endêmica)

Collaria
1 espécie (não endêmica)
***Collaria arcyrionema* (Rostaf.) Nann.-Bremek. *ex* Lado**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade,
conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (AM), Nordeste (RN, PB, PE, AL, SE), Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Comatricha
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Comatricha elegans* (Racib.) G.Lister**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade,
conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI,
RN, PB, PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Comatricha laxa* Rostaf.**
Referência: Tenório, J.C.G. et al. 2009.
Acta botanica 23: 644-656.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI,
PE, SE), Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Comatricha mirabilis* R.K.Benj. & Poitras**
Referência: Tenório, J.C.G. et al. 2009.
Acta botanica 23: 644-656.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Comatricha nigra* (Pers. *ex* J.F.Gmel.) J.Schröt.**
Referência: Tenório, J.C.G. et al. 2009.
Acta botanica 23: 644-656.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Amazônia, Mata Atlântica
***Comatricha pulchella* (C.Bab.) Rostaf.**
Referência: Tenório, J.C.G. et al. 2009.
Acta botanica 23: 644-656.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI,
PB, PE, BA, SE), Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Comatricha suksdorfii* Ellis & Everh.**
Referência: Torrend, C. 1915. Broteria 13: 72-88.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Comatricha tenerrima* (M.A.Curtis) G.Lister**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa,
série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Enerthenema
1 espécie (não endêmica)
***Enerthenema papillatum* (Pers.) Rostaf.**
Referência: Cavalcanti, L.H. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 49-74.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica

Lamproderma
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Lamproderma muscorum* (Lév.) Hagelst.**
Referência: Tenório, J.C.G. et al. 2009. Acta botanica 23: 644-656.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Mata Atlântica
***Lamproderma sauteri* Rostaf.**
Referência: Farr, M.L. 1960. Publicações do Instituto de Micologia, Universidade de Recife 184: 1-54.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Lamproderma scintillans* (Berk. & Broome) Morgan**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Macbrideola
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Macbrideola decapillata* H.C.Gilbert**
Referência: Bezerra, A.C.C. et al. 2007. Revista Brasileira de Biociências 5: 30-32.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN); Mata Atlântica
***Macbrideola martinii* (Alexop. & Beneke) Alexop.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PE); Mata Atlântica
***Macbrideola scintillans* H.C.Gilbert**
Referência: Costa, A.A.A. et al. 2009. Acta botanica 23: 313-322.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Mata Atlântica

Paradiacheopsis
2 espécies (1 endêmica)
***Paradiacheopsis curitibana* Hertel**
Referência: Bezerra, A.C.C. & Cavalcanti, L.H. 2009. Acta botanica 23: 160-163.
Distribuição: subespontânea; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Paradiacheopsis longipes* Hoof & Nann.-Bremek.**
Referência: Bezerra, A.C.C. & Cavalcanti, L.H. 2009. Acta botanica 23: 160-163.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN); Mata Atlântica

Stemonaria
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Stemonaria fuscoides* Nann.-Bremek. & Y.Yamam.**
Referência: Damasceno, G. et al. 2009. Mycotaxon 108: 205-211.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Stemonaria irregularis* (Rex) Nann.-Bremek. et al.**
Referência: Damasceno, G. et al. 2009. Mycotaxon 108: 205-211.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, PE); Mata Atlântica
***Stemonaria longa* (Peck) Nann.-Bremek. et al.**
Referência: Damasceno, G. et al. 2009. Mycotaxon 108: 205-211.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

Stemonitis
8 espécies (nenhuma endêmica)
***Stemonitis axifera* (Bull.) T.Macbr.**
Referência: Tenório, J.C.G. et al. 2009. Acta botanica 23: 644-656.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Stemonitis flavogenita* E.Jahn**
Referência: Tenório, J.C.G. et al. 2009. Acta botanica 23: 644-656.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PI, CE, PB, PE, SE), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Stemonitis fusca* Röth**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Stemonitis herbatica* Peck**
Referência: Tenório, J.C.G. et al. 2009. Acta botanica 23: 644-656.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, SE), Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Stemonitis mussooriensis* G.W.Martin et al.**
Referência: Farr, M.L. 1960. Publicações do Instituto de Micologia, Universidade de Recife 184: 1-54.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Stemonitis pallida* Wingate**
Referência: Tenório, J.C.G. et al. 2009. Acta botanica 23: 644-656.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, SE), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Stemonitis splendens* Rostaf.**
Referência: Tenório, J.C.G. et al. 2009. Acta botanica 23: 644-656.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Stemonitis virginiensis* Rex**
Referência: Tenório, J.C.G. et al. 2009. Acta botanica 23: 644-656.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PE, SE); Mata Atlântica

Stemonitopsis
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Stemonitopsis aequalis* (Peck) Y.Yamam.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Stemonitopsis hyperopta* (Meyl.) Nann.-Bremek.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Stemonitopsis subcaespitosa* (Peck) Nann.-Bremek.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, AL), Sul (RS); Mata Atlântica
***Stemonitopsis typhina* (F.H.Wigg.) Nann.-Bremek.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PI, CE, PB, PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Symphytocarpus
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Symphytocarpus confluens* (Cooke & Ellis) Ing & Nann.-Bremek.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Symphytocarpus flaccidus* (Lister) Ing & Nann.-Bremek.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

TRICHIALES
Laise de Holanda Cavalcanti Andrade
8 gêneros, 44 espécies (2 endêmicas)

Arcyria
16 espécies (nenhuma endêmica)
***Arcyria cinerea* (Bull.) Pers.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Arcyria corymbosa* M.L.Farr & G.W.Martin**
Voucher: Farr, M.L. s.n (URM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Arcyria denudata* (L.) Wettst.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, RO), Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Arcyria ferruginea* Saut.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Arcyria globosa* Schwein.**
Voucher: Cavalcanti, L.H. s.n (UFP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Arcyria incarnata* (Pers. *ex* J.F.Gmel.) Pers.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Arcyria insignis* Kalchbr. & Cooke**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Arcyria magna* Rex**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, AL), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Arcyria major* (G.Lister) Ing**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Arcyria minuta* Buchet**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Arcyria obvelata* (Oeder) Onsberg**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Arcyria occidentalis* (T.Macbr.) G.Lister**
Referência: Hochgesand, E. & Gottsberger, G. 1996. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 10: 1-46.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Arcyria oerstedii* Rostaf.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sul (PR); Mata Atlântica
***Arcyria pomiformis* (Leers) Rostaf.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Arcyria stipata* (Schwein.) Lister**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Arcyria versicolor* W.Phillips**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Arcyriatella
1 espécie (1 endêmica)
***Arcyriatella congregata* Hochg. & Gottsb.**
Referência: Hochgesand, E. & Gottsberger, G. 1989. Nova Hedwigia 48: 485.
Distribuição: subespontânea; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Calomyxa
1 espécie (não endêmica)
***Calomyxa metallica* (Berk.) Nieuwl.**
Referência: Hochgesand, E. & Gottsberger, G. 1996. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 10: 1-46.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

Hemitrichia
8 espécies (1 endêmica)
***Hemitrichia calyculata* (Speg.) M.L.Farr**
Referência: Bezerra, A.C.C. et al. 2009. Mycotaxon 107: 35-48.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hemitrichia clavata* (Pers.) Rostaf.**
Referência: Bezerra, A.C.C. et al. 2009. Mycotaxon 107: 35-48.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Hemitrichia insignis* Torrend**
Voucher: Torrend, C. s.n (URM (574A-10011))
Distribuição: subespontânea; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hemitrichia leiocarpa* (Cooke) Lister**
Referência: Bezerra, A.C.C. et al. 2009. Mycotaxon 107: 35-48.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Hemitrichia minor* G.Lister**
Referência: Bezerra, A.C.C. et al. 2009. Mycotaxon 107: 35-48.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, SE); Mata Atlântica
***Hemitrichia pardina* (Minakata) Ing**
Referência: Bezerra, A.C.C. et al. 2009. Mycotaxon 107: 35-48.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, PE); Mata Atlântica
***Hemitrichia serpula* (Scop.) Rostaf.**
Referência: Bezerra, A.C.C. et al. 2009. Mycotaxon 107: 35-48.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hemitrichia spinifera* M.L.Farr**
Referência: Bezerra, A.C.C. et al. 2009. Mycotaxon 107: 35-48.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Metatrichia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Metatrichia floriformis* (Schwein.) Nann.-Bremek.**
Referência: Costa, A.A.A. et al. 2009. Acta botanica 23: 313-322.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Metatrichia vesparia* (Batsch) Nann.-Bremek. *ex* G.W.Martin & Alexop.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Oligonema
1 espécie (não endêmica)
***Oligonema schweinitzii* (Berk.) G.W.Martin**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Perichaena
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Perichaena chrysosperma* (Curr.) A.Lister**
Referência: Costa, A.A.A. et al. 2009. Acta botanica 23: 313-322.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Perichaena corticalis* (Batsch) Rostaf.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, PE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Perichaena depressa* Lib.**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Perichaena microspora* Penz. & Lister**
Referência: Cavalcanti, L.H. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 209-216.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Perichaena vermicularis* (Schwein.) Rostaf.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

Trichia
10 espécies (nenhuma endêmica)
***Trichia affinis* De Bary**
Voucher: Costa, A.A.A. 267 (UFP 43092)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PB, PE); Mata Atlântica
***Trichia agaves* (G.Moreno et al.) Mosquera et al.**
Referência: Cavalcanti, L.H. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 49-74.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Trichia botrytis* (J.F.Gmel.) Pers.**
Referência: Maimoni-Rodella, R.C.S. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 217-220.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Trichia contorta* (Ditmar) Rostaf.**
Referência: Maimoni-Rodella, R.C.S. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 217-220.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Trichia decipiens* (Pers.) T.Macbr.**
Referência: Maimoni-Rodella, R.C.S. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 217-220.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Trichia favoginea* (Batsch) Pers.**
Referência: Jahn, E. 1902. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 20: 268-280.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Trichia lutescens* (Lister) Lister**
Referência: Maimoni-Rodella, R.C.S. 2002. Biodiversidade, conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 217-220.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Trichia persimilis* P.Karst.**
Referência: Torrend, C. 1915. Broteria 13: 72-88.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Trichia scabra* Rostaf.**
Referência: Putzke, J. 1996. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 8: 3-133.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Trichia verrucosa* Berk.**
Referência: Jahn, E. 1902. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 20: 268-280.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

OOMYCOTA

37 gêneros, 193 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

ALBUGINALES

Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli
1 gênero, 9 espécies (nenhuma endêmica)

Albugo

9 espécies (nenhuma endêmica)
***Albugo bliti* (Biv.) O.Kuntze**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 44.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Albugo candida* (Pers.) O.Kuntze**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi 44-45pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Albugo convolvulacearum* (Speg.) P.Henn.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 45.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Albugo ipomoeae-panduratae* (Schwein.) Swingle**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi 45-46pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, SE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
Albugo minor* (Speg.) *Cif.
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 46.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Albugo platensis* (Speg.) Swingle**
Referência: Mendes, M.A.S. & Urben, A.F. 2009. Fungos relatados em plantas no Brasil, Laboratório de Quarentena Vegetal.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Albugo portulacae* (DC.) O.Kuntze**
Referência: Mendes, M.A.S. & Urben, A.F. 2009. Fungos relatados em plantas no Brasil, Laboratório de Quarentena Vegetal.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Albugo solivae* J.Schröt.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Albugo trapogonis* (DC.) Gray**
Referência: Mendes, M.A.S. & Urben, A.F. 2009. Fungos relatados em plantas no Brasil, Laboratório de Quarentena Vegetal.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

HAPTOGLOSSALES

Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Haptoglossa

1 espécie (não endêmica)
***Haptoglossa heterospora* Drechsler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 42.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

INCERTAE SEDIS

Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Pythiella

1 espécie (não endêmica)
***Pythiella vernalis* Couch**
Referência: Pires-Zottarelli, C.L.A. et al. 2009. Summa Phytopathologica 35: 325-326.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

LEPTOMITALES

Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli,
José de Ribamar de Sousa Rocha
4 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica)

Aphanodictyon

1 espécie (não endêmica)
***Aphanodictyon papillatum* Huneycutt**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 70.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Apodachlya

1 espécie (não endêmica)
***Apodachlya pyrifera* Zopf**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 42.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido

Cornumyces

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cornumyces destruens* (Sparrow) M.W.Dick**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 52.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Cornumyces irregularis* (Const.) M.W.Dick**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 84.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Leptolegniella

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Leptolegniella exogena* Karling**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (SP 381315)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Leptolegniella exoospora* W.D.Kane**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 70.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Leptolegniella keratinophila* Huneycutt**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 70.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, PE), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

OLPIDIOPSIDALES

Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli
2 gêneros, 6 espécies (nenhuma endêmica)

Gracea

1 espécie (não endêmica)
***Gracea gracilis* (E.J.Butler) M.W.Dick**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Olpidiopsis

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Olpidiopsis achlyae* Mclarty**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Olpidiopsis brasiliensis* (Viégas & Teixeira) Sparrow**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Olpidiopsis fusiformis* Cornu**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Olpidiopsis saprolegniae* Cornu**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 43-44pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Olpidiopsis varians* Shanor**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 44.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

PERONOSPORALES

Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli
8 gêneros, 22 espécies (nenhuma endêmica)

Basidiophora

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Basidiophora entospora* Roze & Cornu**
Referência: Mendes, M.A.S. & Urben, A.F. 2009.
Fungos relatados em plantas no Brasil, Laboratório de Quarentena Vegetal.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Basidiophora montana* R.W.Barreto**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 48.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Bremia

1 espécie (não endêmica)
***Bremia lactucae* Regel**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 48.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Hyaloperonospora

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hyaloperonospora brassicae* (Gäum.) Göker**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 48.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido

***Hyaloperonospora parasitica* (Pers.) Const.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Peronosclerospora
1 espécie (não endêmica)
***Peronosclerospora sorghi* (W.Weston & Uppal) C.G.Shaw**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 83-84pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Peronospora
11 espécies (nenhuma endêmica)
***Peronospora alsinearum* Casp.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 48.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Peronospora debaryi* E.S.Salmon & Warre**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 48-49pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Peronospora destructor* (Berk.) Casp. *ex* Berk.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 49.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Peronospora dianthicola* R.Heim**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 49.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Peronospora farinosa* (Fr.) Fr.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 49.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Peronospora gossypina* Av.-Saccá**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 49.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Peronospora hyoscyami* f.tabacina Skalický**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 49-50pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Peronospora manshurica* (Naumov) Syd.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido
***Peronospora sparsa* Berk.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 51.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Peronospora viciae* (Berk.) De Bary**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 51.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Peronospora viciae* Boerema & Verh.**
Referência: Mendes, M.A.S. & Urben, A.F. 2009. F ungos relatados em plantas no Brasil, Laboratório de Quarentena Vegetal.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Plasmopara
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Plasmopara halstedii* (Farl.) Berl. De Toni**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 51.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Plasmopara nivea* (Unger) J.Schröt.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 51.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Plasmopara viticola* (Berk. & M.A.Curtis) Berl. & De Toni**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 51-52pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

Pseudoperonospora
1 espécie (não endêmica)
***Pseudoperonospora cubensis* (Berk. & M.A.Curtis) Rostovzev**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 52.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, RS); Cerrado

Sclerophthora
1 espécie (não endêmica)
***Sclerophthora macrospora* (Sacc.) Thirum et al.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 84.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

PYTHIALES
Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli, José de Ribamar de Sousa Rocha
5 gêneros, 74 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Lagenidium
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Lagenidium distylae* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 53.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lagenidium intermedium* De Wild.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 53.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Lagenidium parthenosporum* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 53.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS); Cerrado

Myzocytium

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Myzocytium megastomum* De Wild.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 53.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Myzocytium microsporum* (Karling) Sparrow**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 53.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Phytophthora

24 espécies (nenhuma endêmica)
***Phytophthora boehmeriae* Sawada**
Referência: Santos, A.F. et al. 2006.
Fitopatologia brasileira 29: 144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP), Sul (SC, RS);
Domínio desconhecido
***Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schoröt.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 53-54pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP), Sul (SC, RS);
Domínio desconhecido
***Phytophthora capsici* Leonian**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Phytophthora carica* (Hara) Hori**
Referência: Farr, D.F. & Rossman, A.Y. 2009. Fungal Databases, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Phytophthora cinnamomi* Rands**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, RN, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Phytophthora citricola* Sawada**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Phytophthora citrophthora* (R.E.Sm. & E.H.Sm.) Leonian**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Phytophthora colocasiae* Racib.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 55-56pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Phytophthora cryptogea* Pethybr. & Laff.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);
Domínio desconhecido
***Phytophthora drechsleri* Tucker**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (CE, PB, PE, AL), Centro-Oeste (DF),
Sul (SC); Domínio desconhecido
***Phytophthora gonapodyides* (H.E.Petersen) Buisman**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 56.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Phytophthora hibernalis* J.R.Carne**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Phytophthora idaei* D.M.Kenn.**
Referência: Mendes, M.A.S. & Urben, A.F. 2009. F
ungos relatados em plantas no Brasil,
Laboratório de Quarentena Vegetal.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, RS);
Domínio desconhecido
***Phytophthora infestans* (Mont.) De Bary**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 56-57pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, RS); Cerrado
***Phytophthora meadii* McRae**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 57.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Domínio desconhecido
***Phytophthora megasperma* Drechsler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 57.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (SC); Domínio desconhecido
***Phytophthora nicotianae* Breda**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 57-58pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, ES), Sul (PR, SC, RS); Cerrado
***Phytophthora oryzae* (S.Ito & Nagai) Waterh**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 58.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido
***Phytophthora palmivora* (E.J.Butler) E.J.Butler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 58-59pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT),
Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido

***Phytophthora phaseoli* Thaxt.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 59.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Phytophthora richardie* Buisman**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 59.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido
***Phytophthora sojae* Kaufm. & Gerd.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 59-60pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido
***Phytophthora tropicalis* Aragaki & J.Y.Uchida**
Referência: Mendes, M.A.S. & Urben, A.F. 2009.
Fungos relatados em plantas no Brasil, Laboratório de Quarentena Vegetal.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Phytophthora undulata* (H.E.Petersen) M.W.Dick**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 60.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

Pythiogeton

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Pythiogeton dichotomum* Tokun.**
Voucher: Rocha, J.R.S. ZFBR74 (Coleção de Cultura de Fungos Zoospóricos da UFPI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Pythiogeton ramosum* Minden**
Voucher: Rocha, J.R.S. ZFBR27 (Coleção de Cultura de Fungos Zoospóricos da UFPI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, PE), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Pythiogeton uniforme* A.Lund**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 68.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Pythiogeton utriforme* Minden**
Voucher: Rocha, J.R.S. ZFBR28 (Coleção de Cultura de Fungos Zoospóricos da UFPI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

Pythium

41 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Pythium acanthicum* Drechsler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 60.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Pythium aphanidermatum* (Edson) Fitz.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 60-61pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pythium arrhenomanes* Drechsler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 61.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Pythium catenulatum* V.D.Matthews**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 61.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Pythium debaryanum* R.Hesse**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 61.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Pythium deliense* Meurs**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 61-62pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Pythium diclinum* Tokun.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Pythium dictyosporum* Racib.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Pythium dissotocum* Drechsler**
Voucher: Miranda, M.L. s.n. (CCIBt 2024)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Pythium echinulatum* V.D.Matthews**
Voucher: Rocha, J.R.S. ZFBR1 (Coleção de Cultura de Fungos Zoospóricos da UFPI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Pythium graminicola* Subraman.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado
***Pythium helicandrum* Drechsler**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1959)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Pythium helicoides* Drechsler**
Referência: Teixeira, L.D.D. et al. 2006.
Summa Phytopathologica 32: 221-226.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Pythium hydnosporum* (Mont.) J.Schröet.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Pythium hypogynum* Middleton**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 62-63pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Pythium indigoferae* Butler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 63.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado

***Pythium inflatum* V.D. Matthews**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 63.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pythium insidiosum* De Cock et al.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 63.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

***Pythium irregulare* Buisman**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 63-64pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Pythium mamillatum* Meurs**
Voucher: Rocha, J.R.S. ZFBR2 (Coleção de Cultura de Fungos Zoospóricos da UFPI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (SP, RJ); Cerrado

***Pythium megalacanthum* De Bary**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 64.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Pythium middletonii* Sparrow**
Voucher: Rocha, J.R.S. ZFBR136 (Coleção de Cultura de Fungos Zoospóricos da UFPI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Pythium monospermum* Pringsh.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 64.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Pythium myriotylum* Drechsler**
Voucher: Rocha, J.R.S. ZFBR140 (Coleção de Culturas de Fungos Zoospóricos da UFPI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado

***Pythium nagaii* S.Ito & Tokun.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 65.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Pythium oligandrum* Drechsler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 65.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado

***Pythium palingenes* Drechsler**
Voucher: Rocha, J.R.S. ZFBR133 (Coleção de Culturas de Fungos Zoospóricos da UFPI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

***Pythium paroecandrum* Drechsler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 65.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Pythium parvum* Ali-Stayeh**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 65.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Pythium periilum* Drechsler**
Voucher: Rocha, J.R.S. ZFBR96 (Coleção de Culturas de Fungos Zoospóricos da UFPI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI); Cerrado

***Pythium periplocum* Drechsler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 65.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Pythium perplexum* H.Kouyeas & Theoh.**
Referência: Pereira, A.A. & Rocha, J.R.S. 2008. Acta Bot. Malac. 33: 349.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Caatinga, Cerrado

***Pythium pleroticum* T. Ito**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 65.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Pythium pulchrum* Minden**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 65-66pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Pythium rostratum* E.J.Butler**
Voucher: Miranda, M.L. s.n. (CCIBt 2013)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Pythium spinosum* Sawada**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Pythium splendens* Hans Braun**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE); Amazônia

***Pythium tardicrescens* Vanterp.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Pythium torulosum* Coker & P.Patt.**
Voucher: Miranda, M.L. s.n. (CCIBt 2027)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Pythium ultimum* Trow**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Pythium ultimum* var. *sporangiiferum* Drechsler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Pythium ultimum* Trow var. *ultimum
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 67.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PI, PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica
***Pythium vexans* De Bary**
Voucher: Rocha, J.R.S. ZFBR108 (Coleção de
Cultura de Fungos Zoospóricos da UFPI)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PI, PE), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

RHIPIDIALES

Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli,
José de Ribamar de Sousa Rocha
2 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica)

Rhipidium

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhipidium interruptum* Cornu**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 69.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Rhipidium thaxteri* Minden**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 69.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

Sapromyces

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sapromyces androgynus* Thaxt.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 69.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Sapromyces elongatus* (Cornu) Thaxt.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 69.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PI), Sudeste (SP, RJ); Cerrado

ROZELLOPSIDALES

Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Sphaerita

1 espécie (não endêmica)
***Sphaerita minor* A.M.Cunha & Muniz**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 70.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Domínio desconhecido

SAPROLEGNIALES

Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli,
José de Ribamar de Sousa Rocha
12 gêneros, 68 espécies (nenhuma endêmica)

Achlya

27 espécies (nenhuma endêmica)
***Achlya achlyoides* (Coker & Alexander)**
T.W.Johnson & R.L.Seym.
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 70-71pp.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PB, PE); Caatinga
***Achlya ambisexualis* J.R.Raper**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 71.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Achlya americana* Humphrey**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 71.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Achlya apiculata* De Bary**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 2005)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN),
Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Achlya benekei* J.S.Furtado**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 71.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Cerrado, Mata Atlântica
***Achlya bisexualis* Coker & Couch**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1997)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Achlya brasiliensis* A.I.Milanez**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 72.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Achlya cambrica* (Trow) T.W.Johnson**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 72.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Achlya caroliniana* Coker**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 72.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Achlya crenulata* Ziegler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 72.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (RN, PB, PE); Caatinga
***Achlya debaryana* Humphrey**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 72.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Achlya diffusa* J.V.Harv. *ex* T.W.Johnson**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 72.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Achlya dubia* Coker**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 72-73pp.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Achlya flagellata* Coker**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 73.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (PI, PB, PE), Sudeste (MG, SP, RJ);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Achlya glomerata* Coker**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 73.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Achlya hypogyna* Coker & Pemberton**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 74.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Achlya klebsiana* Pieters**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1980)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Achlya orion* Coker & Couch**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 2001)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI,
PE), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Achlya oviparvula* A.L.Rogers & Beneke**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 74-75pp.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Achlya paradoxa* Coker**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 75.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Achlya prolifera* C.G.Nees**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1984)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (PI, PE), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica
***Achlya proliferoides* Coker**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 75-76pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (PI, PE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Achlya pseudoachlyoides* (Beneke) T.W.Johnson &
R.L.Seym.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 76.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Achlya radiosa* Maurizio**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1966)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Achlya recurva* Cornu**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 76.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI),
Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Achlya subterranea* Coker & Braxton**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1993)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Achlya treleaseana* (Humphrey) Kauffm.**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1986)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

Aphanomyces

8 espécies (nenhuma endêmica)
***Aphanomyces cladogamus* Drechsler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 76-77pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste, Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aphanomyces euteiches* Drechsler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,
Nordeste (PI), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Aphanomyces helicoides* Minden**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(PI), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aphanomyces irregularis* W.W. Scott**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1998)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aphanomyces keratinophilus* (Ôokubo & Kobayasi)**
R.L.Seym. & T.W.Johnson
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Aphanomyces laevis* De Bary**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 77-78pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI),
Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Aphanomyces raphani* J.B.Kendr.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 78p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Aphanomyces stellatus* De Bary**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 78p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Aplanes

1 espécie (não endêmica)
***Aplanes braunii* De Bary**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 78.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE);
Domínio desconhecido

Brevilegnia
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Brevilegnia diclina* J.V. Harv.**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (SP 381550)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Brevilegnia linearis* Coker**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1983)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Brevilegnia megasperma* J.V. Harv.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 78.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Brevilegnia minutandra* Höhnk**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 78.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Brevilegnia subclavata* Couch**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 79.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

Dictyuchus
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Dictyuchus monosporus* Leitg.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 79.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dictyuchus pseudodictyon* Coker & Braxton *ex* Couch**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1995)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PB, PE), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Geolegnia
1 espécie (não endêmica)
***Geolegnia inflata* Coker & J.V.Harv.**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (SP 381555)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

Leptolegnia
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Leptolegnia caudata* De Bary**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 80.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Leptolegnia eccentrica* Coker & Matthews**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 2004)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Leptolegnia hemihypogyna* R.L.Seym.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 80.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Leptolegnia subterranea* Coker & J.V. Harv.**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1990)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Phragmosporangium
1 espécie (não endêmica)
***Phragmosporangium uniseriatum* R.L.Seym.**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1996)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Plectospira
1 espécie (não endêmica)
***Plectospira myriandra* Drechsler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 80.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

Pythiopsis
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Pythiopsis humphreyana* Coker**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 2002)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Pythiopsis irregularis* R.L.Seym.**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1965)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Pythiopsis papilliformis* R.L. Seym.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 80.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Saprolegnia
14 espécies (nenhuma endêmica)
***Saprolegnia asterophora* De Bary**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 80.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Saprolegnia australis* R.F. Elliot**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 81.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Saprolegnia blelhamensis* (M.W.Dick) Milko**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1991)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Saprolegnia diclina* Humphrey**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1961)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Saprolegnia ferax* (Gruith.) Thur.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 81.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Saprolegnia furcata* Maurizio**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 82.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Saprolegnia litoralis* Coker**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 82.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Saprolegnia megasperma* Coker**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 82.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Saprolegnia parasitica* Coker**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 82.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Saprolegnia subterranea* (Dissmann) R.L.Seym.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 82-83pp.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Saprolegnia terrestris* Cookson *ex* R.L. Seym.**
Voucher: Gomes, A.L. s.n. (CCIBt 1968)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Saprolegnia torulosa* De Bary**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 83.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PB); Domínio desconhecido
***Saprolegnia truncata* R.L.Seym.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Saprolegnia unispora* (Coker & Couch) R.L.Seym.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB);
Domínio desconhecido

Thraustotheca
1 espécie (não endêmica)
***Thraustotheca clavata* (De Bary) Humphrey**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 83.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

PLASMODIOPHOROMYCOTA
4 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica)

PLASMODIOPHORALES
Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli
4 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica)

Plasmodiophora
1 espécie (não endêmica)
***Plasmodiophora brassicae* Woronin**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Polymyxa
1 espécie (não endêmica)
***Polymyxa graminis* Leding**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

Spongospora
1 espécie (não endêmica)
***Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 86.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP),
Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Woronina
1 espécie (não endêmica)
***Woronina polycystis* Cornu**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 86.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

FUNGOS *STRICTO SENSU*
825 gêneros, 3.187 espécies (517 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 71 variedades (12 endêmicas)

ASCOMYCOTA
372 gêneros, 1134 espécies (92 endêmicas),
18 variedades (3 endêmicas)

ANAMÓRFICOS
Luís Fernando Pascholati Gusmão
231 gêneros, 519 espécies (61 endêmicas),
6 variedades (nenhuma endêmica)

Acremonium
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Acremonium bonordenii* Sacc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Acremonium vitis* Catt.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (RN); Caatinga

Acrogenospora
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Acrogenospora gigantospora* S.Hughes**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Acrogenospora sphaerocephala* (Berk. & Broome) M.B.Ellis**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007.
Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Acrophialophora
1 espécie (não endêmica)
***Acrophialophora fusispora* (S.B.Saksena) Samson**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Acrophragmis
1 espécie (não endêmica)
***Acrophragmis coronata* Kiffer & Reisinger**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Acrotheca
1 espécie (não endêmica)
***Acrotheca caulium* (Sacc.) Sacc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Actinocladium
1 espécie (não endêmica)
***Actinocladium rhodosporum* Ehrenb.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Actinonema
1 espécie (não endêmica)
***Actinonema rosae* (Lib.) Fr.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Acumispora
1 espécie (não endêmica)
***Acumispora phragmospora* Matsush.**
Referência: Castañeda Ruiz, R.F. et al. 2006.
Mycotaxon 95: 261-270.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Alternaria
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Alternaria alternata* (Fr.) Keissl.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE, BA), Sul (RS); Caatinga
***Alternaria brassicae* (Berk.) Sacc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Alternaria gossypii* (Jacz.) Y.Nisik. et al.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Alternaria porri* (Ellis) Cif.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Progress 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Alternaria tenuissima* (Kunze) Wiltshire**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Amerodiscosiellina
1 espécie (1 endêmica)
***Amerodiscosiellina annonacearum* Bat. & Cavalc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

Anungitea
1 espécie (não endêmica)
***Anungitea globosa* B. Sutton & Hodges**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Ardhachandra
1 espécie (não endêmica)
***Ardhachandra cristaspora* (Matsush.) Subram. & Sudha**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2008.
Acta botanica 22(1): 29-36.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Aspergillus
18 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Aspergillus candidus* Link**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus deflectus* Fennell & Raper**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus elegans* Gasperini**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Aspergillus flavipes* (Bainier & R.Sartory) Thom & Church**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus flavofurcatus* Bat. & H.Maia**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus flavus* Link**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus japonicus* Saito**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus nidulans* (Eidam) G.Winter**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus niger* Tiegh.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
Aspergillus niger* Tiegh. var. *niger
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus niveus* Blochwitz**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus sulphureus* (Fresen.) Thom & Church**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus sydowii* (Bainier & R.Sartory) Thom & Church**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus tamarii* Kita**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus terreus* Thom**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus terricola* Marchal & É.J.Marchal**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus ustus* (Bainier & R.Sartory) Thom & Church**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus versicolor* (Vuill.) Tirab.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Aspergillus wentii* Wehmer**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Atrosetaphiale

1 espécie (não endêmica)
***Atrosetaphiale flagelliformis* Matsush.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Bacillopeltis

1 espécie (1 endêmica)
***Bacillopeltis paypayrolae* Bat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Bactrodesmium

1 espécie (não endêmica)
***Bactrodesmium linderi* (J.L.Crane & Shearer) M.E.Palm & E.L.Stewart**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Beltrania

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Beltrania africana* S.Hughes**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Beltrania querna* Harkn.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Beltrania rhombica* Penz.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica

Beltraniella

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Beltraniella amoena* R.F.Castañeda et al.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Beltraniella japonica* Matsush.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga
***Beltraniella portoricensis* (F.Stevens) Piroz. & S.D.Patil**
Referência: Gusmão, L.F.P. 1998. Fungos Mitospóricos associados a folhas de Miconia cabussu Hoehne (Melastomataceae), na Reserva Biológica de Paranapiacaba (Mata Atlântica), Santo André, SP. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga

Beltraniopsis

3 espécies (2 endêmicas)
***Beltraniopsis esenbeckiae* Bat. & J.L.Bezerra**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Beltraniopsis miconiae* Gusmão & Grandi**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2000. Mycological Research 104(2): 251-253.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Beltraniopsis ramosa* R.F.Castañeda**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Bipolaris

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Bipolaris sacchari* (E.J.Butler) Shoemaker**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Bipolaris sorokiniana* (Sacc.) Shoemaker**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

Blastophorum

1 espécie (não endêmica)
***Blastophorum uniseptatum* Matsush.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Botryotrichum

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Botryotrichum atrogriseum* J.F.H.Beyma**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Botryotrichum piluliferum* Sacc. & Marchal**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Botrytis

1 espécie (não endêmica)
***Botrytis cinerea* Pers.**
Voucher: Soares, D.J. s.n. (VIC 30608)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido

Brachydesmiella

2 espécies (2 endêmicas)
***Brachydesmiella braziliensis* R.F.Castañeda et al.**
Referência: Castañeda Ruiz, R.F. et al. 2006. Mycotaxon 95: 261-270.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Brachydesmiella obclavata* R.F.Castañeda et al.**
Referência: Castañeda Ruiz, R.F. et al. 2006. Mycotaxon 95: 261-270.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Brachysporiella

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Brachysporiella cordinae* Bat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Brachysporiella gayana* Bat.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

Brachysporiellina

1 espécie (1 endêmica)
***Brachysporiellina fecunda* S.M.Leão et al.**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. et al. 2008. Mycotaxon 104: 309-312.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Cacumisporium

1 espécie (não endêmica)
***Cacumisporium sigmoideum* Mercado & R.F.Castañeda**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Camposporium

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Camposporium antennatum* Harkn.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Camposporium cambrense* S.Hughes**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Canalisporium
1 espécie (não endêmica)
***Canalisporium caribense* (Hol.-Jech. & Mercado) Nawawi & Kuthub.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Ceratosporella
1 espécie (não endêmica)
***Ceratosporella compacta* R.F.Castañeda et al.**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007. Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Cercospora
5 espécies (2 endêmicas)
***Cercospora apii* Fresen.**
Referência: Soares, D.J. et al. 2009. Mycologia 101: 401-406
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido
***Cercospora capparicola* Hansf. & Thirum.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Cercospora longipes* E.J. Butler**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cercospora sagittariae* Ellis & Kellerm.**
Referência: Soares, D.J. et al. 2009. Mycologia 101: 401-406
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cercospora urenae* Viégas & Chupp**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Chaetendophragmia
1 espécie (não endêmica)
***Chaetendophragmia triangularis* Matsush.**
Referência: Barbosa, F.R. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Chaetopsina
1 espécie (não endêmica)
***Chaetopsina fulva* Rambelli**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Chalara
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Chalara acuaria* Cooke & Ellis**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN); Caatinga
***Chalara affinis* Sacc. & Berl.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chalara alabamensis* Morgan-Jones & E.G.Ingram**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Chloridium
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Chloridium lignicola* (F.Mangenot) W.Gams & Hol.-Jech.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chloridium transvaalense* Morgan-Jones et al.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chloridium virescens* (Pers.) W.Gams & Hol.-Jech.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Chrysosporium
1 espécie (não endêmica)
***Chrysosporium tropicum* J.W.Carmich.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Circinotrichum
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Circinotrichum britannicum* P.M. Kirk**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Circinotrichum falcatisporum* Piroz.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Circinotrichum maculiforme* Nees**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Circinotrichum olivaceum* (Speg.) Piroz.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Circinotrichum papakurae* S.Hughes & Piroz.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Cladorrhinum
1 espécie (não endêmica)
***Cladorrhinum maiae* Bat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Cladosporium
6 espécies (1 endêmica)
***Cladosporium cladosporioides* (Fresen.) G.A. de Vries**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica
***Cladosporium cucumerinum* Ellis & Arthur**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Cladosporium herbarum* (Pers.) Link**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Cladosporium lignicola* Corda**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Cladosporium oxysporum* Berk. & Curt.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga
***Cladosporium tenuissimum* Cooke**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Clasterosporium
1 espécie (não endêmica)
***Clasterosporium domus-aliena* Cif. & Bat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga

Clonostachys
1 espécie (não endêmica)
***Clonostachys compactiuscula* (Sacc.) D.Hawksw. & W.Gams**
Referência: Barbosa, F.R. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Clypeoseptoria
1 espécie (não endêmica)
***Clypeoseptoria intricata* Cif. & Bat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga

Colletotrichum
6 espécies (5 endêmicas)
***Colletotrichum ampelinum* Cavara**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Colletotrichum annonicola* Speg.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Colletotrichum dematium* (Pers.) Grove**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); Caatinga
***Colletotrichum gloesporioides* (Penz.) Penz. & Sacc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE), Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Caatinga
***Colletotrichum graminicola* (Ces.) G.W. Wilson**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Colletotrichum lindemuthianum* (Sacc. & Magnus) Briosi & Cavara**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Coniothyrium
1 espécie (não endêmica)
***Coniothyrium amphistelmae* Henn.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Cordana
1 espécie (não endêmica)
***Cordana versicolor* D.J.Soares & R.W.Barreto**
Referência: Soares, D.J & Barreto, R.W. 2005.
Australas. Pl. Pathol. 35: 347-353
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

Corynespora
1 espécie (não endêmica)
***Corynespora cassiicola* (Berk. & M.A.Curtis) C.T.Wei**
Referência: Silva, J. L. et al. 2006.
Pl. Pathol. 55: 580
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

Cryptophiale
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Cryptophiale guadalcanalensis* Matsush.**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2008.
Revista Brasil. Bot. 31(2): 339-344.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Cryptophiale kakombensis* Piroz.**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2008.
Revista Brasil. Bot. 31(2): 339-344.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (SP); Amazônia,
Caatinga, Mata Atlântica
***Cryptophiale minor* M.L.Farr**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2008.
Revista Brasil. Bot. 31(2): 339-344.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cryptophiale udagawae* Piroz. & Ichinoe**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2008.
Revista Brasil. Bot. 31(2): 339-344.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP); Caatinga, Mata Atlântica

Cryptophialoidea
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cryptophialoidea fasciculata* Kuthub. & Nawawi**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2008.
Revista Brasil. Bot. 31(2): 339-344.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Cryptophialoidea ramosa* Delgado et al.**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2008.
Revista Brasil. Bot. 31(2): 339-344.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Cubasina
1 espécie (1 endêmica)
***Cubasina microspora* M.F.O.Marques et al.**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007.
Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Curvularia
8 espécies (nenhuma endêmica)
***Curvularia brachyspora* Boedijn**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e
caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE,
BA); Caatinga
***Curvularia crepinii* (Westend.) Boedjin**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e
caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga
***Curvularia eragrostidis* (Henn.) J.A.Mey**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e
caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga
***Curvularia intermedia* Boedijn**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e
caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga
***Curvularia lunata* (Wakker) Boedijn**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e
caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga
***Curvularia pallescens* Boedijn**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e
caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE);
Caatinga
***Curvularia protubetara* R.R.Nelson & Hodges**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e
caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga
***Curvularia senegalensis* (Speg.) Subram.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e
caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Cylindrocarpon
1 espécie (não endêmica)
***Cylindrocarpon candidum* (Link) Wollenw.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga

Cylindrocladium
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cylindrocladium candelabrum* Viégas**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e
caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cylindrocladium naviculatum* Crous & M.J.Wingf.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e
caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Amazô-
nia, Caatinga

Dactylaria
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Dactylaria belliana* B.C.Paulus et al.**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dactylaria botulispora* R.F.Castañeda & W.B.Kendr.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Dactylaria candidula* (Höhn.) G.C.Bhatt & W.B.Kendr.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dactylaria cazorlii* Mercado et al.**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dactylaria ficusicola* B.C.Paulus et al.**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Dactylaria fusiformis* Shearer & J.L.Crane**
Referência: Barbosa, F.R. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dactylaria parvispora* (Preuss) de Hoog & Arx**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Deightoniella
1 espécie (1 endêmica)
***Deightoniella rugosa* F.R.Barbosa et al.**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Dendrophoma
1 espécie (não endêmica)
***Dendrophoma phyllogena* Trail**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Dendryphiella
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Dendryphiella aspera* R.W.Barreto & J.C.David**
Referência: Barreto, R.W. et al. 1995.
Mycological Research 99(7): 769-782.
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Dendryphiella vinosa* (Berk. & M.A.Curtis) Reisinger**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. et al. 2008.
Mycotaxon 104: 309-312.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Dendryphiopsis
1 espécie (não endêmica)
***Dendryphiopsis atra* (Corda) S.Hughes**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Dendryphiosphaera
1 espécie (não endêmica)
***Dendryphiosphaera taiensis* Lunghini & Rambelli**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Dictyoarthrinium
1 espécie (não endêmica)
***Dictyoarthrinium sacchari* (J.A.Stev.) Damon**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Dictyochaeta
12 espécies (2 endêmicas)
***Dictyochaeta britannica* (M.B.Ellis) Whitton et al.**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2008. Mycotaxon 106: 15-27.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dictyochaeta caatingae* A.C.Cruz & Gusmão**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2008. Mycotaxon 106: 15-27.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Dictyochaeta fertilis* (S.Hughes & W.B.Kendr.) Hol.-Jech.**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2008. Mycotaxon 106: 15-27.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dictyochaeta heteroderae* (Morgan-Jones) Carris & Glawe**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2008. Mycotaxon 106: 15-27.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dictyochaeta intermedia* Gusmão & S.M.Leão**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2008. Mycotaxon 106: 15-27.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Dictyochaeta microcylindrospora* Whitton et al.**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2008. Mycotaxon 106: 15-27.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dictyochaeta novae-guineensis* (Matsush.) A.I.Romero**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2006. Mycotaxon 106: 15-27.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dictyochaeta obesispora* (S.Hughes & W.B.Kendr.) Whitton et al.**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2008. Mycotaxon 106: 15-27.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

***Dictyochaeta pluriguttulata* Kuthub. & Nawawi**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2008. Mycotaxon 106: 15-27.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dictyochaeta setosa* (S.Hughes & W.B.Kendr.) Whitton et al.**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2008. Mycotaxon 106: 15-27.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dictyochaeta simplex* (S.Hughes & W.B.Kendr.) Hol.-Jech.**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2008. Mycotaxon 106: 15-27.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dictyochaeta triseptata* (Matsush.) R.F.Castañeda**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2008. Mycotaxon 106: 15-27.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Dictyosporium

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Dictyosporium bulbosum* Tzean & J.L.Chen**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dictyosporium cocophylum* Bat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga
***Dictyosporium digitatum* J.L.Chen et al.**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dictyosporium elegans* Corda**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Dicyma

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Dicyma pulvinata* (Berk. & M.A.Curtis) Arx**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dicyma vesiculifera* Piroz.**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Dinemasporium

1 espécie (não endêmica)
***Dinemasporium coffeanum* Bat. & Peres**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga

Diplocladiella

2 espécies (1 endêmica)
***Diplocladiella cornitumida* F.R.Barbosa et al.**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Diplocladiella scalaroides* G.Arnaud *ex* M.B.Ellis**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Diplococcium

2 espécies (1 endêmica)
***Diplococcium stoveri* (M.B.Ellis) R.C.Sinclair et al.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Diplococcium verruculosum* A.C.Cruz et al.**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 33-38.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Diplodia

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Diplodia cacti* Rolland**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Diplodia paupercula* Berk. & Broome**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Dischloridium

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Dischloridium laeense* (Matsush.) B.Sutton**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Dischloridium tenuisporum* Hol.-Jech.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Dothiorella

1 espécie (não endêmica)
***Dothiorella urae* Tassi**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Drechslera
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Drechslera halodes* (Drechsler) Subram. & B.L.Jain**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Drechslera hawaiiensis* Bugnic. *ex* M.B. Ellis**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Drechslera rostrata* (Drechsler) M.J.Richardson & E.M.Fraser**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Drechslera victoriae* (F.Meehan & H.C.Murphy) Subram. & B.J.Jain**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Ellisembia
3 espécies (1 endêmica)
***Ellisembia adscendens* (Berk.) Subram.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Ellisembia bambusae* (M.B.Ellis) W.P.Wu**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Ellisembia brachypus* (M.B.Ellis & Everh.) Subram.**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Endophragmiella
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Endophragmiella collapsa* (B.Sutton) S.Hughes**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Endophragmiella dimorphospora* (Awao & Udagawa) S.Hughes**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Endophragmiella quadrilocularis* Matsush.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Endophragmiella rigidiuscula* R.F.Castañeda**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. et al. 2008. Mycotaxon 104: 309-312.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Ephelis
1 espécie (não endêmica)
***Ephelis mexicana* Fr.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Exserticlava
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Exserticlava triseptata* (Matsush.) S.Hughes**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2008. Revista Brasil. Bot. 32(2): 357-361.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga
***Exserticlava vasiformis* (Matsush.) S.Hughes**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2008. Revista Brasil. Bot. 32(2): 357-361.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Falcocladium
1 espécie (não endêmica)
***Falcocladium sphaeropeduculatum* Crous & Alfenas**
Referência: Crous, P.W. et al. 1997. Journal of South African Botany. Kirstenbosch 63: 286-290.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga

Flosculomyces
1 espécie (não endêmica)
***Flosculomyces floridaensis* B. Sutton**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007. Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Fusariella
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Fusariella atrovirens* (Berk.) Sacc.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Fusariella concinna* (Syd.) S. Hughes**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Fusariella obstipa* (Pollack) S.Hughes**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Fusarium

12 espécies (5 endêmicas)
***Fusarium chlamydosporum* Wollenw. & Reinking**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Fusarium equiseti* (Corda) Sacc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, Mata Atlântica
***Fusarium lactis* Pirotta**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Fusarium lateritium* Nees**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE); Caatinga, Mata Atlântica
***Fusarium merismoides* Corda**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, Mata Atlântica
***Fusarium nivale* Ces. *ex* Berl. & Voglio**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Fusarium oxysporum* Schltdl.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE); Caatinga, Mata Atlântica
***Fusarium poae* (Peck) Wollenw.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Fusarium sacchari* (E.J.Butler & Hafiz Khan) W.Gams**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Fusarium solani* (Mart.) Sacc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, Mata Atlântica
***Fusarium sporotrichioides* Sherb.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Fusarium subglutinans* (Wollew. & Reinking) P.E.Nelson et al.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Fusicladium

1 espécie (não endêmica)
***Fusicladium fasciculatum* Cooke & Ellis**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Fusidium

1 espécie (não endêmica)
***Fusidium carneolum* (Sacc.) Sacc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Gangliostilbe

1 espécie (não endêmica)
***Gangliostilbe costaricensis* Mercado et al.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Gliocladium

1 espécie (não endêmica)
***Gliocladium penicilloides* Corda**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Gloeosporium

1 espécie (1 endêmica)
***Gloeosporium mirabilis* Bres.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga, Mata Atlântica

Gonatophragmium

1 espécie (não endêmica)
***Gonatophragmium mori* (Sawada) Deighton**
Voucher: Barreto, R.W. s.n. (VIC 30404)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Gonytrichum

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Gonytrichum chlamydosporium* G.L.Barron & G.C.Bhatt**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Gonytrichum macrocladum* (Sacc.) S.Hughes**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Gonytrichum mirabile* Hol.-Jech.**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Guedea
1 espécie (não endêmica)
***Guedea novae-zelandiae* S.Hughes**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007. Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Gyrothrix
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Gyrothrix circinata* (Berk. & M.A.Curtis) S.Hughes**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Gyrothrix grisea* Piroz.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Gyrothrix hughesii* Piroz.**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Gyrothrix magica* Lunghini & Onofri**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Gyrothrix microsperma* (Höhn.) Piroz.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Gyrothrix podosperma* (Corda) Rabenh.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Gyrothrix verticiclada* (Goid.) S.Hughes & Piroz.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Helicomyces
1 espécie (não endêmica)
***Helicomyces hyderabadensis* P.Rag. Rao & D.Rao**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Helicosporium
9 espécies (1 endêmica)
***Helicosporium aureum* (Corda) Linder**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2009. Mycotaxon 110: 53-64.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Helicosporium decumbens* Linder**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Helicosporium gracile* (Morgan) Linder**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2009. Mycotaxon 110: 53-64.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Helicosporium griseum* Berk. & Curt.**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Helicosporium nizamabadense* P.Rag. Rao & D.Rao**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2009. Mycotaxon 110: 53-64.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Helicosporium panacheum* R.T.Moore**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2009. Mycotaxon 110: 53-64.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Helicosporium pannosum* (Berk. & M.A.Curtis) R.T.Moore**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2009. Mycotaxon 110: 53-64.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Helicosporium vesiculiferum* A.C.Cruz & Gusmão**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2009. Mycotaxon 110: 53-64.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Helicosporium virescens* (Pers.) Sivan.**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2009. Mycotaxon 110: 53-64.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Heliocephala
1 espécie (não endêmica)
***Heliocephala zimbabweensis* Decock et al.**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Helminthosporium
4 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Helminthosporium dorycarpum* Mont.**
Distribuição: subespontânea; endêmica(?)
***Helminthosporium dorycarpum* var. *amazoniae* S.Hughes**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Helminthosporium foveolatum* Pat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Helminthosporium nodulosum* Berk. & Curt.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Helminthosporium oryzae* Breda de Haan**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Hemibeltrania

3 espécies (1 endêmica)
***Hemibeltrania malaysiana* Matsush.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Hemibeltrania nectandrae* (Bat. & H. Maia) Piroz.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga
***Hemibeltrania urbanodendrii* R.C.Fern. et al.**
Referência: Fernandes, R.C. et al. 2007.
Brazilian Journal of Microbiology 38: 756-758.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Henicospora

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Henicospora coronata* B. Sutton & P.M. Kirk**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga
***Henicospora minor* P.M.Kirk & B.Sutton**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Hormodendrum

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Hormodendrum hordei* Bruhne**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga
***Hormodendrum nigrescens* F.S.Paine**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga
***Hormodendrum viride* (Fresen.) Sacc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga

Humicola

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Humicola brevis* (J.C.Gilman & E.V.Abbott) J.C.Gilman**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Humicola fuscoatra* Traaen**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Humicola nigrescens* Omvik**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Hyphodiscosia

1 espécie (não endêmica)
***Hyphodiscosia jaipurensis* Lodha & K.R. C. Reddy**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Idriella

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Idriella falcata* (B.Sutton & Hodges) Arx**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Idriella lunata* P.E.Nelson & S.Wilh.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Idriella ramosa* Matsush.**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007.
Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Idriella setiformis* R.F.Castañeda & G.R.W.Arnold**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007.
Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Janetia

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Janetia curviapicis* Goh & K.D.Hyde**
Referência: Almeida, D.A.C. 2010. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Janetia mangiferae* S.Hughes & Cavalc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Nordeste (PE); Caatinga

Johncouchia
1 espécie (não endêmica)
***Johncouchia mangiferae* (Bat.) S.Hughes & Cavalc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga

Junewangia
1 espécie (não endêmica)
***Junewangia globulosa* (Tóth) W.A.Baker & Morgan-Jones**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Kiliophora
1 espécie (não endêmica)
***Kiliophora ubiensis* (Caneva & Rambelli) Kuthub. & Nawawi**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Kionochaeta
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Kionochaeta malaysiana* P.M. Kirk**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Kionochaeta nanophora* Kuthub. & Nawawi**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Kionochaeta pughii* Kuthub. & Nawawi**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Kionochaeta ramifera* (Matsush.) P.M.Kirk & B.Sutton**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Kionochaeta spissa* P.M.Kirk & B.Sutton**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Kylindria
1 espécie (não endêmica)
***Kylindria pluriseptata* R.F.Castañeda**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007.
Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Lacellina
1 espécie (não endêmica)
***Lacellina graminicola* (Berk. & Broome) Petch**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Lacellinopsis
1 espécie (não endêmica)
***Lacellinopsis sacchari* Subram.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Lauriomyces
1 espécie (não endêmica)
***Lauriomyces heliocephalus* (V.Rao & de Hoog) R.F.Castañeda & W.B.Kendr.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Lobatopedis
1 espécie (1 endêmica)
***Lobatopedis longistriatum* A.C.Cruz et al.**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 33-38.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Luzfridiella
1 espécie (não endêmica)
***Luzfridiella insignus* R.F.Castañeda & W.B.Kendr.**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Macrophoma
3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Macrophoma coffeae* (Delacr.) Sacc. & P. Syd.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
***Macrophoma coffeae* var. *macrospora* Bat. et al.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Macrophoma hederaceae* Brunaud.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Macrophoma opunticola* (Speg.) Sacc. & P. Syd.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
***Macrophoma opunticola* var. *tunae* Cif. & Gonz. Frag.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga

Macrosporium
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Macrosporium commune* Rabenh.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Macrosporium lagenariae* Thüm.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Mammaria
1 espécie (não endêmica)
***Mammaria echinobotryoides* Ces.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Megaster
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Megaster curvicornis* Cif. et al.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Megaster longicornis* Cif. et al.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga

Melanocephala
1 espécie (não endêmica)
***Melanocephala australiensis* (G.W.Beaton & M.B.Ellis) S.Hughes**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Melasmia
1 espécie (não endêmica)
***Melasmia myrciae* Bat. & Poroca**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga

Memnoniella
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Memnoniella echinata* (Rivolta) Galloway**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Memnoniella levispora* Subram.**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Menisporopsis
1 espécie (não endêmica)
***Menisporopsis theobromae* S.Hughes**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

Micropustulomyces
1 espécie (1 endêmica)
***Micropustulomyces mucilaginosus* R.W.Barreto**
Referência: Barreto, R.W. et al. 1995. Mycological Research 99(7): 769-782.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

Microxyphiella
1 espécie (não endêmica)
***Microxyphiella trichostoma* (Speg.) Bat. & Cif.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Microxyphium
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Microxyphium aciculiforme* Cif. et al.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Microxyphium columnatum* Bat. et al.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PB); Caatinga
***Microxyphium philippinense* Cif. & Bat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PB); Caatinga
***Microxyphium spathodeae* Bat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga

Monacrosporium
1 espécie (não endêmica)
***Monacrosporium ellipsosporum* (Preuss) R.C.Cooke & C.H.Dickinson**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Monotosporella
1 espécie (não endêmica)
***Monotosporella setosa* (Berk. & M.A.Curtis) S.Hughes**
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Moorella
1 espécie (não endêmica)
***Moorella speciosa* P.Rag. Rao & D. Rao**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Musicillium
1 espécie (não endêmica)
***Musicillium theobromae* (Turconi) Zare & W.Gams**
Referência: Zare, R. et al. 2007.
Nova Hedwigia 85(3-4): 463-489.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Domínio desconhecido

Mycoenterolobium
1 espécie (não endêmica)
***Mycoenterolobium platysporum* Goos**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Myrmecridium
1 espécie (não endêmica)
***Myrmecridium schulzeri* (Sacc.) Arzanlou et al.**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Myrothecium
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Myrothecium roridum* Tode**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PI, RN); Caatinga
***Myrothecium verrucaria* (Alb. & Schwein.) Ditmar**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Myxosporium
1 espécie (não endêmica)
***Myxosporium belludum* (Preuss) Sacc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Nakataea
1 espécie (não endêmica)
***Nakataea fusispora* (Matsush.) Matsush.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Neojohnstonia
1 espécie (1 endêmica)
***Neojohnstonia minima* Gusmão & Grandi**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Nigrospora
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Nigrospora oryzae* (Berk. & Broome) Petch**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Nigrospora sphaerica* (Sacc.) E.W.Mason**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PI); Caatinga

Ochroconis
1 espécie (não endêmica)
***Ochroconis crassihumicola* (Matsush.) de Hoog & Arx**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Oidiodendron
1 espécie (não endêmica)
***Oidiodendron griseum* Robak**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Olpitrichum
1 espécie (não endêmica)
***Olpitrichum sphaerosporum* Matsush.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Paliphora
4 espécies (2 endêmicas)
***Paliphora inflata* Gusmão et al.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2008. Mycologia 100: 306-309.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Paliphora intermedia* Alcorn**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

***Paliphora multiseptata* Gusmão & S.M. Leão**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2008. Mycologia 100: 306-309.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Paliphora porosa* Kuthub.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2008. Mycologia 100: 306-309.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Paraceratocladium

3 espécies (1 endêmica)
***Paraceratocladium bacilliforme* M.Calduch et al.**
Referência: Calduch, M. et al. 2002. Mycologia 94(6): 1071-1077.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Paraceratocladium polysetosum* R.F.Castañeda**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Paraceratocladium silvestre* R.F.Castañeda**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Parapleurotheciopsis

1 espécie (não endêmica)
***Parapleurotheciopsis inaequiseptata* (Matsush.) P.M. Kirk**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Parasympodiella

1 espécie (não endêmica)
***Parasympodiella laxa* (Subram. & Vital) Ponnapa**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica

Passarola

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Passarola barretoana* (U.Braun & Crous) D.J. Soares et al.**
Referência: Soares, D.J. & Barreto, R.W. 2005.
Australas. Pl. Pathol. 55: 347-353
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Passarola psidii* Bat. & R. Garnier**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 2006.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE); Caatinga

Peltasteropsis

2 espécies (2 endêmicas)
***Peltasteropsis discreta* Bat. & H.Maia**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Peltasteropsis jahnii* Bat. et al.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Penicillium

37 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Penicillium aculeatum* Raper & Fennell**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Penicillium aurantiogriseum* Dierckx**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Penicillium brevicompactum* Dierckx**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Penicillium canescens* Sopp**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga
***Penicillium citrinum* Thom**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Penicillium comune* Thom**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Penicillium corylophilum* Dierckx**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga
***Penicillium dierckxii* Biourge**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga
***Penicillium dodgei* Pitt**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Penicillium funiculosum* Thom**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Penicillium glabrum* (Wehmer) Westling**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Penicillium griseofulvum* Dierckx**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

***Penicillium humuli* J.F.H.Beyma**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Penicillium indonesiae* Pitt**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Penicillium jensenii* K.M.Zalessky**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Penicillium lanosum* Westling**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Penicillium lapidosum* Raper & Fennell**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Penicillium levitum* Raper & Fennell**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Penicillium lividum* Westling**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Penicillium olivicolor* Pitt**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Penicillium olsoni* Bainier & Sartory**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Penicillium pinophilum* Thom**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Penicillium purpurescens* (Sopp) Biourge**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Penicillium raistricki* G. Sm.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Penicillium restrictum* J.C. Gliman & E.V. Abbott**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, PE); Caatinga

***Penicillium rubrum* Soop**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Penicillium rugulosum* Thom**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Penicillium sclerotorum* J.F.H.Beyma**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Penicillium simplicissimum* (Oudem.) Thom**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Penicillium spinulosum* Thom**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, PE); Caatinga

***Penicillium thomii* Maire**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Penicillium turbatum* Westling**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Penicillium variabile* Soop**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Penicillium vermiculatum* P.A. Dang**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Penicillium verruculosum* Peyronel**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Penicillium vinaceum* J.C. Gliman & E.V. Abbott**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Penicillium waksmanii* K.M. Zalessky**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Periconia
5 espécies (1 endêmica)
***Periconia byssoides* Pers.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica
***Periconia cookei* E.W.Mason & M.B.Ellis**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Periconia hispidula* (Pers.) E.W.Mason & M.B.Ellis**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
***Periconia jabalpurensis* D.P.Tiwari & P.D.Agrawal**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Periconia sidae* Bat. & J.L.Bezerra**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Caatinga

Periconiella
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Periconiella daphniphylli* M.B.Ellis**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Periconiella mucunae* M.B.Ellis**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Pestalotiopsis
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Pestalotiopsis guepinii* (Desm.) Steyaert**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Caatinga
***Pestalotiopsis mangiferae* (Henn.) Steyaert**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Caatinga
***Pestalotiopsis microspora* (Speg.) G.C.Zhao & N.Li**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Pestalotiopsis versicolor* (Speg.) Steyaert**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

Peyronelina
1 espécie (não endêmica)
***Peyronelina glomerulata* P.J.Fisher et al.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Phaeocytostroma
1 espécie (não endêmica)
***Phaeocytostroma sacchari* (Ellis & Everh.) B.Sutton**
Referência: da Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

Phaeoisaria
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phaeoisaria clematidis* (Fuckel) S.Hughes**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Phaeoisaria infrafertilis* B. Sutton & Hodges**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Phaeostalagmus
1 espécie (não endêmica)
***Phaeostalagmus tenuissimus* (Corda) W.Gams & Hol.-Jech.**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Phaeoxyphium
2 espécies (1 endêmica)
***Phaeoxyphium dubium* (Sacc.) Bat. & Cif.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Phaeoxyphium sorghi* Bat. & J.L.Bezerra**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Phialocephala
1 espécie (não endêmica)
***Phialocephala humicola* S.C.Jong & E.E.Davis**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Phialophora
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phialophora alba* J.F.H.Beyma**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN); Caatinga
***Phialophora verrucosa* Medlar**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Phialosporostilbe
1 espécie (não endêmica)
***Phialosporostilbe setosa* Bhat & W.B.Kendr.**
Referência: Castañeda Ruiz, R.F. et al. 2006. Mycotaxon 95: 261-270.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Phoma
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Phoma acuta* (Hoffm.) Fuckel**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Phoma forsythiae* Cooke**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Phoma onagracearum* Cooke**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Phoma tripolii* Died.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Phoma tropica* R.Scheneid. & Boerema**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Phoma uvarum* (Berk. & M.A.Curtis) Sacc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Phragmocephala
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phragmocephala elegans* R.F.Castañeda**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007. Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Phragmocephala stemphylioides* (Corda) S.Hughes**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007. Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Phyllosticta
14 espécies (3 endêmicas)
***Phyllosticta acaciicola* Henn.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Phyllosticta aloysiae* Speg.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Phyllosticta annonarum* Bat. & A.F.Vital**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga
***Phyllosticta autralis* Speg.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Phyllosticta bauhiniicola* Henn.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Phyllosticta hesperidearum* (Catt.) Penz.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Phyllosticta mangiferae* Bat. & A.F.Vital**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Phyllosticta manihoticola* Syd. & P.Syd.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Phyllosticta mortonii* Fairm.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Phyllosticta opuntiae-parahybensis* Bat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Phyllosticta phaseolina* Sacc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Phyllosticta solani* Ellis & G. Martin**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, PE); Caatinga
***Phyllosticta theobromae* J.V.Almeida & Sousa da Câmara**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Phyllosticta vagans* Peck**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (AL); Caatinga

Physalidiella
1 espécie (não endêmica)
***Physalidiella matsushimae* (R.F.Castañeda & W.B.Kendr.) M.Morelet**
Referência: Castañeda Ruiz, R.F. et al. 2006.
Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Piricauda
1 espécie (não endêmica)
***Piricauda exasperata* (Ellis & Barthol.) R.T.Moore**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga

Pithomyces
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Pithomyces chartarum* (Berk. & M.A.Curtis) M.B.Ellis**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Pithomyces graminicola* R.Y.Roy & B.Rai**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Pithomyces sacchari* (Speg.) M.B.Ellis**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Plenocatenulis
2 espécies (2 endêmicas)
***Plenocatenulis magnoliae* Bat. & Cif.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Plenocatenulis osmanthi* Bat. & Cif.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Plenotrichaius
1 espécie (1 endêmica)
Plenotrichaius swartziae Bat. & Valle
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Pleurophragmium
1 espécie (não endêmica)
***Pleurophragmium varieseptatum* Matsush.**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Pleurotheciopsis
1 espécie (não endêmica)
***Pleurotheciopsis setiformis* R.F. Castañeda**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Pleurothecium
1 espécie (não endêmica)
***Pleurothecium recurvatum* (Morgan) Höhn.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Pochonia
2 espécies (1 endêmica)
***Pochonia chlamydosporia* (Goddard) Zare & W. Gams**
Referência: Gams, W & Zare 2001. Nova Hedwigia 72(3-4): 334.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Domínio desconhecido
***Pochonia humicola* Bat. & O.M.Fonseca**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE); Caatinga

Podosporium
1 espécie (não endêmica)
***Podosporium dialii* Bat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga

Podoxyphium
1 espécie (não endêmica)
***Podoxyphium yuccae* Bat. & Nascim.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PB); Caatinga

Polythrinciella
1 espécie (1 endêmica)
***Polythrinciella bombacifolia* Bat. & H.Maia**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Pseudoacrodictys
1 espécie (não endêmica)
***Pseudoacrodictys deightonii* (M.B.Ellis) W.A.Baker & Morgan-Jones**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007.
Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Pseudobeltrania
2 espécies (1 endêmica)
***Pseudobeltrania angamosensis* Matsush.**
Referência: Fernandes, R.C. et al. 2007.
Brazilian Journal of Microbiology 38: 756-758.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudobeltrania cedrelae* Henn.**
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Pseudobotrytis
1 espécie (não endêmica)
***Pseudobotrytis terrestris* (Timonin) Subram.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Pseudocercospora
1 espécie (não endêmica)
***Pseudocercospora vitis* (Lév.) Speg.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Pseudodictyosporium
1 espécie (não endêmica)
***Pseudodictyosporium wauense* Matsush.**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Pseudopetrakia
1 espécie (não endêmica)
***Pseudopetrakia kambakkamensis* (Subram.) M.B.Ellis**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Pyrenochaeta
1 espécie (não endêmica)
***Pyrenochaeta vinosa* Speg.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga

Pyricularia
1 espécie (não endêmica)
***Pyricularia caffra* Matsush.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Ramularia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Ramularia areola* G.F.Atk.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE, BA, AL); Caatinga
***Ramularia solani* (Sacc.) Bat. & J.L.Bezerra**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Repetophragma
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Repetophragma fasciatum* (R.F.Castañeda) R.F.Castañeda et al.**
Referência: Castañeda Ruiz, R.F. et al. 2006.
Mycotaxon 95: 261-270.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Repetophragma filiferum* (Piroz.) R.F. Castañeda et al.**
Referência: Castañeda Ruiz, R.F. et al. 2006.
Mycotaxon 95: 261-270.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Repetophragma inflatum* (Berk. & Ravenel) W.P.Wu**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PI); Caatinga

Rhabdospora
1 espécie (não endêmica)
***Rhabdospora bogenhardiae* Bat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga

Rhizoctonia
1 espécie (não endêmica)
***Rhizoctonia rubiginosa* Sappa & Mosca**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Sadasivania
1 espécie (não endêmica)
***Sadasivania girisa* Subram.**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Sarcopodium
1 espécie (não endêmica)
***Sarcopodium circinatum* Ehrenb.**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. et al. 2008.
Mycotaxon 104: 309-312.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Satchmopsis
1 espécie (1 endêmica)
***Satchmopsis brasiliensis* B.Sutton & Hodges**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

Schizothyra
1 espécie (1 endêmica)
***Schizothyra minuta* Bat. & C.A.A.Costa**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Scolecobasidium
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Scolecobasidium constrictum* E.V.Abbott**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Scolecobasidium terreum* E.V.Abbott**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Scolecobasidium tshawytschae* (Doty & D.W.Slater) McGinnis & Ajello**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Scopulariopsis
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Scopulariopsis brevicaulis* (Sacc.) Bainier**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Scopulariopsis brumpti* Salv.-Duval**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Selenodriella
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Selenodriella fertilis* (Piroz. & Hodges) R.F.Castañeda & W.B.Kendr.**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007. Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Selenodriella perramosa* W.B.Kendr. & R.F.Castañeda**
Referência: Barbosa, F.R. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Selenosporella
1 espécie (não endêmica)
***Selenosporella curvispora* G.Arnaud *ex* MacGarvie**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Septonema
2 espécies (1 endêmica)
***Septonema longisporum* Bat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Septonema multiplex* Berk. & Curt.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Septoria
2 espécies (2 endêmicas)
***Septoria lantanaefolii* Bat. & J.L.Bezerra**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Septoria sapindacearum* Bat. & Cavalc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

Spegazzinia
1 espécie (não endêmica)
***Spegazzinia tessarthra* (Berk. & M.A.Curtis) Sacc.**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PE); Caatinga

Speiropsis
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Speiropsis pedatostopora* Tubaki**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Speiropsis scopiformis* Kuthub. & Nawawi**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Sphaceloma
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sphaceloma citri* (E.E.Butler) Cif.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Sphaceloma fawcettii* Jenkins**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Spicaria
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Spicaria griseola* Sacc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga
***Spicaria violacea* Petch**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga

Sporendocladia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sporendocladia bactrospora* (W.B.Kendr.) M.J.Wingf.**
Referência: Barbosa, F.R. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Sporendocladia foliicola* (P.M.Kirk) M.J.Wingf.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Sporendonema
1 espécie (não endêmica)
***Sporendonema purpuracens* (Bonord.) E.W.Mason & S.Hughes**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Sporidesmiella
5 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Sporidesmiella claviformis* P.M. Kirk**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Sporidesmiella cuneiformis* (B.Sutton) P.M.Kirk**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Sporidesmiella hyalosperma* (Corda) P.M.Kirk**
Distribuição: nativa; endêmica
Sporidesmiella hyalosperma* (Corda) P.M.Kirk var. *hyalosperma
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Sporidesmiella parva* (M.B.Ellis) P.M.Kirk**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Sporidesmiella vignalensis* W.B.Kendr. & R.F.Castañeda**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007.
Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Sporidesmium
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Sporidesmium circinophorum* Matsush.**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 25-32.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Sporidesmium tropicale* M.B.Ellis**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Sporidesmium verrucisporum* M.B.Ellis**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Sporoschisma
2 espécies (1 endêmica)
***Sporoschisma saccardoi* E.W.Mason & S.Hughes**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Sporoschisma stilboideum* Bat. & J.L.Bezerra**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Sporotichum
1 espécie (não endêmica)
***Sporotichum roseum* Link**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Stachybotrys
8 espécies (nenhuma endêmica)
***Stachybotrys bisby* (Sriniv.) G.L.Barron**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007.
Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Stachybotrys chartarum* (Ehrenb.) S.Hughes**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Stachybotrys globosa* P.C.Misra & S.K.Srivast.**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. et al. 2008.
Mycotaxon 104: 309-312.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (RN, BA); Caatinga

***Stachybotrys kampalensis* Hansf.**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2007.
Mycotaxon 102: 17-23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Stachybotrys longispora* Matsush.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Stachybotrys nephrospora* Hansf.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (CE, BA); Caatinga
***Stachybotrys parvispora* S.Hughes**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Stachybotrys verrucispora* Matsush.**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. et al. 2008.
Mycotaxon 104: 309-312.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (RN); Caatinga

Stachylidium
1 espécie (não endêmica)
***Stachylidium bicolor* Link**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Domínio desconhecido

Strionemadiplodia
1 espécie (não endêmica)
***Strionemadiplodia frumenti* (Ellis & Everh.) Zambett.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

Stylaspergillus
1 espécie (não endêmica)
***Stylaspergillus laxus* B.Sutton et al.**
Referência: Castañeda Ruiz, R.F. et al. 2006.
Mycotaxon 95: 261-270.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Subramaniomyces
1 espécie (1 endêmica)
***Subramaniomyces pulcher* A.C.Cruz et al.**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 25-32.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Subulispora
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Subulispora longirostrata* Nawawi & Kuthub.**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Subulispora rectilineata* Tubaki**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Taeniolella
1 espécie (não endêmica)
***Taeniolella alta* (Ehrenb.) S.Hughes**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Tetracoccosporium
1 espécie (não endêmica)
***Tetracoccosporium paxianum* Szabó**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB); Caatinga

Tetraploa
1 espécie (não endêmica)
***Tetraploa aristata* Berk. & Broome**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Thozetella
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Thozetella cristata* Piroz. & Hodges**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Thozetella cubensis* R.F.Castañeda & G.R.W.Arnold**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Thozetella havanensis* R.F.Castañeda**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Thozetella queenslandica* B.C.Paulus et al.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

Torula
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Torula allii* (Harz.) Sacc.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN); Caatinga
***Torula caligans* (Bat. & Upadhyay) M.B.Ellis**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga
***Torula deospora* (Bat. & H.P. Upadhyay) de Hoog & Grinb.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Nordeste (RN); Caatinga
***Torula herbarum* (Pers.) Link**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Tretopileus
1 espécie (não endêmica)
***Tretopileus sphaerophorus* (Berk. & M.A.Curtis) S.Hughes & Deighton**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Trichocladium
1 espécie (não endêmica)
***Trichocladium opacum* (Corda) S.Hughes**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Trichoderma
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Trichoderma aureoviride* Rifai**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Trichoderma harzianum* Rifai**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Trichoderma koningii* Oudem.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Trichoderma pseudokoningii* Rifai**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Trichosporon
1 espécie (não endêmica)
***Trichosporon cutaneum* (Beurm. et al.) M. Ota**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Tripospermum
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Tripospermum gardnerii* (Berk.) Speg.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Tripospermum roupalae* (Syd.) S. Hughes**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Triposporium
1 espécie (não endêmica)
***Triposporium elegans* Corda**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Triramulispora
1 espécie (1 endêmica)
***Triramulispora gracilis* Matsush.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Triscelophorus
1 espécie (não endêmica)
***Triscelophorus deficiens* (Matsush.) Matsush.**
Referência: Cruz, A.C.R. et al. 2007. Acta botanica 21(4): 847-855.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Tubercularia
1 espécie (1 endêmica)
***Tubercularia agaves* Pat.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

Uberispora
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Uberispora heteroseptata* R.F.Castañeda et al.**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Uberispora tropicalis* Bhat & W.B.Kendr.**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Umbellidion
1 espécie (1 endêmica)
***Umbellidion radulans* B.Sutton & Hodges**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Vanakripa
1 espécie (não endêmica)
***Vanakripa rhizophorae* R.M.Arias et al.**
Referência: Leão-Ferreira, S.M. 2009. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Vermiculariopsiella
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Vermiculariopsiella cornuta* (V.Rao & de Hoog) Nawawi et al.**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2008. Revista Brasil. Bot. 31(4): 659-665.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Vermiculariopsiella cubensis* (R.F.Castañeda) Nawawi et al.**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2008. Revista Brasil. Bot. 31(4): 659-665.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Vermiculariopsiella falcata* Nawawi et al.**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2008. Revista Brasil. Bot. 31(4): 659-665.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Vermiculariopsiella immersa* (Desm.) Bender**
Referência: Marques, M.F.O. et al. 2008. Revista Brasil. Bot. 31(4): 659-665.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Veronaea
1 espécie (não endêmica)
***Veronaea botryosa* Cif. & Montemart.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Verticicladium
1 espécie (não endêmica)
***Verticicladium trifidum* Preuss**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Verticillium
1 espécie (não endêmica)
***Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Virgaria
1 espécie (não endêmica)
***Virgaria nigra* (Link) Ness**
Referência: Marques, M.F.O. 2007. Fungos conidiais associados à decomposição de substratos vegetais em fragmento de mata atlântica, serra da Jiboia, Bahia. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Virgatospora
1 espécie (não endêmica)
***Virgatospora echinofibrosa* Finley**
Referência: Grandi, R.A.P. & Gusmão, L.F.P. 2001. Revista Biol. Trop. 49: 1296-1296.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Volutella
1 espécie (não endêmica)
***Volutella minima* Höhn.**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Wiesneriomyces
1 espécie (não endêmica)
***Wiesneriomyces laurinus* (Tassi) P.M.Kirk**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Yinmingella
1 espécie (não endêmica)
***Yinmingella mitriformis* Goh et al.**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Zanclospora
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Zanclospora indica* Subram. & Vittal**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Zanclospora novae-zelandiae* S.Hughes & W.B.Kendr.**
Referência: Barbosa, F.R. et al. 2007. Mycotaxon 102: 39-49.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Zygosporium
4 espécies (1 endêmica)
***Zygosporium echinosporum* Bunting & E.W.Mason**
Referência: Gusmão, L.F.P. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 2: 161-201.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Zygosporium gibbum* (Sacc. et al.) S.Hughes**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Zygosporium mansonii* S.Hughes**
Referência: Cruz, A.C.R. 2008. Fungos Conidiais do Bioma Caatinga no Semi-árido Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Feira de Santana.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Zygosporium oscheoides* Mont.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

ARTHONIALES
Marcela Eugenia da Silva Cáceres
14 gêneros, 43 espécies (nenhuma endêmica)

Arthonia
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Arthonia andamanica* (Makhija & Patw.) Cáceres & Lücking**
Referência: Cáceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Arthonia bessalis* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL); Mata Atlântica
***Arthonia complanata* Fée**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Arthonia leptosperma* (Müll.Arg.) R.Sant.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Arthonia microsperma* Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Arthonia platygraphidea* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Bactrospora
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Bactrospora jenikii* (Vûzda) Egea & Torrente**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Bactrospora macrospora* R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Bactrospora myriadea* (Fée) Egea & Torrente**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Chiodecton
1 espécie (não endêmica)
***Chiodecton malmei* G.Thor**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Chrysothrix
3 espécies (não endêmicas)
***Chrysothrix candelaris* (L.) J.R.Laundon**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Caatinga
***Chrysothrix chlorina* (Ach.) J.R.Laundon**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); Mata Atlântica
***Chrysothrix xanthina* (Vain.) Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Coniocarpon
1 espécie (não endêmica)
***Coniocarpon cinnabarinum* DC.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

Cresponia
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Cresponia flava* (Vain.) Egea & Torrente**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); Mata Atlântica
***Cresponia leprieurii* (Mont.) Egea & Torrente**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Cresponia melanocheiloides* (Vain.) Egea & Torrente**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, AL); Mata Atlântica
***Cresponia proximata* (Nyl.) Egea & Torrente**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, SE); Mata Atlântica

Crypthothecia

4 espécies (não endêmicas)
***Cryptothecia effusa* (Müll.Arg.) R.Sant.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Cryptothecia punctosorediata* Sparrius & Saipunkaew**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Cryptothecia striata* G.Thor**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE, AL); Domínio desconhecido
***Cryptothecia subcandida* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

Dichosporidium

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Dichosporidium lanuginosun* Aptroot & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Dichosporidium nigrocinctum* (Ehrenb.) G.Thor**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

Enterographa

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Enterographa anguinella* (Nyl.) Redinger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Enterographa chiodectonoites* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Enterographa compunctula* (Nyl.) Redinger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Enterographa sipmanii* Sparrius**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Enterographa subquassiaecola* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Nordeste (PE); Mata Atlântica

Helminthocarpon

1 espécie (não endêmica)
***Helminthocarpon leprevostii* Fée**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE, SE); Domínio desconhecido

Herpothallon

1 espécie (não endêmica)
***Herpothallon rubrocinctum* (Ehrenb.) Aptroot & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica

Lecanactis

1 espécie (não endêmica)
***Lecanactis epileuca* (Nyl.) Tehler**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL);
Mata Atlântica

Lecanographa

1 espécie (não endêmica)
***Lecanographa lyncea* (Sm.) Egea & Torrente**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Cerrado

Mazosia

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Mazosia ocellata* (Nyl.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (RN, PE, AL); Mata Atlântica
***Mazosia phyllosema* (Nyl.) Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE, SE); Mata Atlântica

Opegrapha

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Opegrapha atratula* Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Opegrapha cylindrica* Raddi**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE, SE); Domínio desconhecido
***Opegrapha quintana* Redinger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (SE); Mata Atlântica

Plectocarpon
1 espécie (não endêmica)
***Plectocarpon syncesioides* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Nordeste (AL); Mata Atlântica

Sagenidiopsis
1 espécie (não endêmica)
***Sagenidiopsis undulata* (Fée) Egea et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Sclerophyton
1 espécie (não endêmica)
***Sclerophyton elegans* Eschw.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (AL); Mata Atlântica

Syncesia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Syncesia effusa* (Fée) Tehler**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Syncesia rhizomorpha* Tehler**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (AL, SE); Mata Atlântica

CANDELARIALES
Marcela Eugenia da Silva Cáceres
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Candelaria
1 espécie (não endêmica)
***Candelaria concolor* (Dicks.) Stein**
Referência: Cáceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE);
Caatinga

CAPNODIALES
Dartanhã J. Soares
1 gênero, 4 espécies (nenhuma endêmica)

Mycosphaerella
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Mycosphaerella americanae* B.V.Lima et al.**
Referência: Lima, B.V. et al. 2009.
Mycotaxon 98: 108:308
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Mycosphaerella hedychii* F. Stevens & P.A. Young**
Referência: Soares, D.J. & Barreto, R.W. 2008.
Fungal Diversity 28: 85-96
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Mycosphaerella sapii* D.J.Soares et al.**
Referência: Soares, D.J. et al. 2006.
Mycotaxon 98: 169-176
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Mycosphaerella sapiicola* D.J.Soares et al.**
Referência: Soares, D.J. et al. 2006.
Mycotaxon 98: 169-176
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Sudeste (MG); Domínio desconhecido

DIAPORTHALES
Dartanhã J. Soares
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Cytospora
1 espécie (não endêmica)
***Cytospora rhizophorae* Kohlm. & E.Kohlm.**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. et al. 2008.
Mycotaxon 104: 119-122.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (SC); Domínio desconhecido

DOTHIDEALES
José Luis Bezerra, Dartanhã J. Soares
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Botryosphaeria
1 espécie (não endêmica)
***Botryosphaeria dothidea* (Moug.) Ces. & De Not.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005.
Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Domínio desconhecido

ERYSIPHALES

Dartanhã J. Soares

3 gêneros, 7 espécies (2 endêmicas)

Erysiphe

1 espécie (não endêmica)

***Erysiphe platani* (Howe) U. Braun & S. Takam.**
Referência: Inokuti et al. 2008.
Pl. Pathol. 57: 375
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Oidiopsis

1 espécie (não endêmica)

***Oidiopsis haplophyli* (Magnus) Rulamort**
Referência: Parreira, D.F. et al. 2007.
Summa Phytopathologica 32: 99
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

Oidium

5 espécies (2 endêmicas)

***Oidium ambrosiae* Thüm.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 1: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Oidium anacardii* F.Noack**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 1: 1-585.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Oidium balsamii* Mont.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 1: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga

***Oidium piperis* Uppal et al.**
Voucher: So, D.J. 27825 s.n. (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Oidium tuckeri* Berk.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995.
Mycological Papers 1: 1-585.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE, BA); Caatinga

HELOTIALES

**José Luis Bezerra, Larissa Trierveiler Pereira,
Clarice Loguercio Leite, Rosa Mara Borges da Silveira**

7 gêneros, 9 espécies (2 endêmicas), 1 variedade
(1 endêmica)

Amphobotrys

1 espécie (endêmica)

***Amphobotrys ricini* (N.F.Buchw.) Hennebert**
Referência: Lima et al. 2008
Australas. Pl. Pathol. 3: 5-7
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

Chlorociboria

2 espécies (1 endêmica), 1 variedade (endêmica)

***Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse *ex* C.S.Ramamurthi et al.**
Distribuição: nativa; endêmica

***Chlorociboria aeruginascens* var. *brasiliensis* (Nyl.) J.R.Dixon**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. et al. 2008.
Mycotaxon 104: 415-421.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC);
Domínio desconhecido

***Chlorociboria aeruginosa* (Oeder) Seaver *ex* C.S.Ramamurthi et al.**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. et al. 2008.
Mycotaxon 104: 415-421.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);
Domínio desconhecido

Encoelia

1 espécie (não endêmica)

***Encoelia heteromera* (Mont.) Nannf.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian
Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

Hymenoscyphus

1 espécie (não endêmica)

***Hymenoscyphus lasiopodius* (Pat.) Dennis**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian
Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (RS); Domínio desconhecido

Lachnum

2 espécies (1 endêmica)

***Lachnum brasiliense* (Mont.) J.H.Haines & Dumont**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian
Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

***Lachnum pudibundum* (Quél.) J.Schröt.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian
Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

Neodasyscypha

1 espécie (não endêmica)

***Neodasyscypha cerina* (Pers.) Spooner**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian
Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

Proliferodiscus

1 espécie (não endêmica)

***Proliferodiscus alboviridis* (Sacc.) Spooner**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian
Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

HYPOCREALES

José Luis Bezerra, Dartanhã J. Soares
6 gêneros, 6 espécies (2 endêmicas)

Ascopolyporus

1 espécie (endêmica)
***Ascopolyporus polyporoides* Möller**
Referência: Saccardo, P.A. & Sydow, P. 1902. Syllogue Fungorum 16: 605
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

Cordyceps

1 espécie (não endêmica)
***Cordyceps dipterigena* Berk. & Broome**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Hypocrea

1 espécie (1 endêmica)
***Hypocrea stromatica* Bezerra et al.**
Referência: Bezerra, J.L. et al. 2003. Fitopatologia brasileira 28: 408-412.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Hypomyces

1 espécie (não endêmica)
***Hypomyces chrysospermus* Tul. & C.Tul.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Mycomalus

1 espécie (não endêmica)
***Mycomalus bambusinus* A. Möller**
Referência: Saccardi, P.A. & Sydow, P. 1902. Syllogue fungorum 16: 1604
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

Neobarya

1 espécie (não endêmica)
***Neobarya agaricicola* (Berk.) Samuels & Lowen**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

INCERTAE SEDIS

Marcela Eugenia da Silva Cáceres
16 gêneros, 34 espécies (nenhuma endêmica)

Anisomeridium

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Anisomeridium americanum* (A.Massal.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL, SE); Caatinga
***Anisomeridium leptospermun* (Zahlbr.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Anisomeridium polycarpum* (Müll.Arg.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Anisomeridium tamarindii* (Fée) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, Mata Atlântica

Architrypethelium

1 espécie (não endêmica)
***Architrypethelium uberilium* (Fée) Aptroot**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

Astrothelium

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Astrothelium cinnamomeun* (Eschw.) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Astrothelium eustomum* (Mont.) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Astrothelium scorioides* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Astrothelium variolosum* (Ach.) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Bathelium

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Bathelium madreporiforme* (Eschw.) Trevis.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Bathelium mastoideum* Afz. *ex* Ach.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Caprettia
1 espécie (não endêmica)
***Caprettia amazonensis* Bat. & H.Maia**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica

Cryptothelium
1 espécie (não endêmica)
***Cryptothelium sepultum* (Mont.) A.Massal.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Domínio desconhecido

Laurera
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Laurera megasperma* (Mont.) Riddle**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Laurera sphaeroides* (Mont.) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Lopezaria
1 espécie (não endêmica)
***Lopezaria versicolor* (Fée) Kalb & Haf.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

Musaespora
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Musaespora epiphylla* (R.Sant.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Musaespora gigas* (Zahlbr.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Musaespora kalbii* Lücking & Sérus.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Plectosporium
1 espécie (não endêmica)
***Plectosporium alismatis* (Oudem.) W.M. Pitt et al.**
Referência: Soares et al. 2009.
Mycologia 101: 401-416
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Polymeridium
1 espécie (não endêmica)
***Polymeridium proponens* (Nyl.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

Pseudopyrenula
1 espécie (não endêmica)
***Pseudopyrenula subnudata* Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Domínio desconhecido

Strigula
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Strigula obtecta* (Vain.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Strigula phaea* (Ach.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Strigula stigmatella* (Ach.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Strigula viridiseda* (Nyl.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

Trypethelium
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Trypethelium aeneum* (Eschw.) Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Trypethelium eluteriae* Spreng.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Trypethelium nitidiusculum* (Nyl.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL); Amazônia, Mata Atlântica
***Trypethelium ochroleucum* (Eschw.) Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica

***Trypethelium subeluteriae* Makhija & Patw.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Trypethelium tropicum* (Ach.) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga

Tylophoron
1 espécie (não endêmica)
***Tylophoron moderatum* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL, SE); Mata Atlântica

Xylobotrium
1 espécie (não endêmica)
***Xylobotrium portentosum* (Mont.) Pat.**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. et al. 2008. Nova Hedwigia 87: 169-174.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

LECANORALES
Marcela Eugenia da Silva Cáceres
21 gêneros, 67 espécies (1 endêmica)

Aciculopsora
1 espécie (não endêmica)
***Aciculopsora cinerea* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Bacidia
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Bacidia fluminensis* (Malme) Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Bacidia medialis* (Tuck.) Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Bacidia russeola* (Kremp.) Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Mata Atlântica

Bacidina
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Bacidina digitalis* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Bacidina multiseptata* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Bacidina pallidocarnea* (Müll.Arg.) Vězda**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Bacidina penicillata* Aptroot et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Bacidina varia* S. Ekman**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Bacidiopsora
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Bacidiopsora microphyllina* Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Bacidiopsora orizabana* (Vain.) Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica

Bapalmuia
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Bapalmuia halleana* Sérus.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Bapalmuia lafayetteana* (Vain.) Kalb & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Bapalmuia palmularis (*Müll. Arg.) Sérus.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Brigantiaea
1 espécie (não endêmica)
***Brigantiaea leucoxantha* (Spreng.) R.Sant. & Haf.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Byssoloma
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Byssoloma chlorinum* (Vain.) Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Byssoloma leucoblepharum* (Nyl.) Vain.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Byssoloma vanderystii* Sérus.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Calopadia
6 espécies (1 endêmica)
***Calopadia bonitensis* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Calopadia foliicola* (Fée) Vězda**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Calopadia perpallida* (Nyl.) Vězda**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Calopadia pruinosa* Lücking & Chaves**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Calopadia puiggarii* (Müll.Arg.) Vězda**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Calopadia subcoerulescens* (Zahlbr.) Vězda**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Crocynia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Crocynia gossypina* (Sw.) A.Massal.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Crocynia pyxinoides* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Dactylospora
1 espécie (não endêmica)
***Dactylospora stygia* (Berk. & M.A.Curtis) Hafellner**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Eugeniella
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Eugeniella corallifera* (Lücking) Lücking et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Eugeniella leucocheila* (Tuck.) Lücking et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Fellhanera
1 espécie (não endêmica)
***Fellhanera microdiscus* (Vain.) Vězda**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Haematomma
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Haematomma leprarioides* (Vain.) Vain.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Haematomma personii* (Fée) A.Massal.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga

Lecanora
8 espécies (nenhuma endêmica)
***Lecanora achroa* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Lecanora caesiorubella* Ach.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga
***Lecanora concilianda* Vain.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Lecanora concilians* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Caatinga

***Lecanora coronulans* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Lecanora helva* Stizenb.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Lecanora hipocrocina* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga
***Lecanora tropica* Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Malcolmiella

14 espécies (nenhuma endêmica)
***Malcolmiella atlantica* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Mata Atlântica
***Malcolmiella badimioides* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Malcolmiella flavopustulosa* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Malcolmiella furfurosa* (Tuck. *ex* Nyl.) Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Mata Atlântica
***Malcolmiella fuscella* (Müll.Arg.) Cáceres & Lück.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Malcolmiella granifera* (Ach.) Kalb & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Malcolmiella gyalectoides* (Vain.) Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL); Mata Atlântica
***Malcolmiella hipomela* (Nyl.) Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Malcolmiella leptoloma* (Müll.Arg.) Cáceres & Lück.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Malcolmiella perisidiata* (Malme) Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Malcolmiella piperis* (Spreng.) Kalb & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (RN, PE, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Malcolmiella polycampia* (Tuck.) Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Malcolmiella psychotrioides* Kalb & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Malcolmiella vinosa* (Eschw.) Kalb & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica

Maronina

1 espécie (não endêmica)
***Maronina multifera* (Nyl.) Hafellner & R. W. Rogers**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga

Phyllopsora

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Phyllopsora corallina* (Eschw.) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Phyllopsora furfuraceae* (Pers.) Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Phyllopsora intermediella* (Nyl.) Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Phyllopsora kalbii* Brako**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica

***Phyllopsora longiuscula* (Nyl.) Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Phyllopsora parvifolia* (Pers.) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Ramboldia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Ramboldia haematites* (Fée) Kalb et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Domínio desconhecido
***Ramboldia russula* (Ach.) Kalb et al.**
Referência: Cáceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

Squamacidia
1 espécie (não endêmica)
***Squamacidia janeirensis* (Müll. Arg.) Brako**
Referência: Cáceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Tapellaria
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Tapellaria leonorae* M. Cáceres & Lücking**
Referência: Cáceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Tapellaria malmei* R.Sant.**
Referência: Cáceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Vainionora
1 espécie (não endêmica)
***Vainionora flavovirens* (Fée) Kalb**
Referência: Cáceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

MELIOLALES
José Luis Bezerra, Dartanhã J. Soares
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

Asteridiella
1 espécie (não endêmica)
***Asteridiella pittieri* (Toro) Hansf.**
Referência: Pereira, J. et al. 2006. Astralas. Pl. Pathol. 1: 17-18
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Meliola
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Meliola thalliformis* Deighton**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
***Meliola thalliformis* var. *major* D.J.Soares & R.W.Barreto**
Referência: Soares et al. 2006 Mycotaxon 95: 201-204
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido

OSTROPALES
Marcela Eugenia da Silva Cáceres
33 gêneros, 155 espécies (1 endêmica)

Acanthotrema
1 espécie (não endêmica)
***Acanthotrema brasilianum* (Kalb) Frisch**
Referência: Cáceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica

Aderkomyces
1 espécie (não endêmica)
***Aderkomyces heterellus* (Stirt.) Lücking et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Ampliotrema
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Ampliotrema amplius* (Nyl.) Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Ampliotrema auratum* (Tuck.) Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica

Anomomorpha
1 espécie (não endêmica)
***Anomomorpha aggregans* (Nyl.) Staiger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

Aspidothelium
1 espécie (não endêmica)
***Aspidothelium geminiparum* (Malme) R.Sant.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Carbacanthographis
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Carbacanthographis crassa* (Müll.Arg.) Staiger & Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Carbacanthographis marcescens* (Fée) Staiger & Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); Mata Atlântica
***Carbacanthographis stictica* Staiger & Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica

Chapsa
12 espécies (nenhuma endêmica)
***Chapsa alborosella* (Nyl.) A.Frisch**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Chapsa astroidea* (Berk. & Broome) Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Chapsa dilatata* (Müll.Arg.) Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica
***Chapsa indica* A. Massal.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Chapsa leprieurii* (Mont.) A.Frisch**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Chapsa leprocarpa* (Nyl.) A.Frisch**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Chapsa leprocarpoides* (Hale) Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Mata Atlântica
***Chapsa patens* (Nyl.) A.Frisch**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Chapsa platycarpella* (Vain.) A.Frisch**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, SE); Mata Atlântica
***Chapsa punicea* (Müll.Arg.) Cáceres & Lück.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Chapsa sublilacina* (Ellis & Everh.) Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Chapsa velata* (Müll.Arg.) Cáceres & Lück.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Coenogonium
18 espécies (nenhuma endêmica)
***Coenogonium barbatellum* Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Coenogonium confervoides* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Coenogonium disjunctum* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Coenogonium geralense* (P.Henn) Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Coenogonium interplexum* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Coenogonium isidiosum* (Breuss) Rivas Plata et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Coenogonium leprieurii* (Mont.) Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica

***Coenogonium linkii* Ehrenb.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Coenogonium luteocitrinum* Rivas Plata et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL, SE); Mata Atlântica
***Coenogonium moniliforme* Tuck.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Caatinga
***Coenogonium nepalense* (G.Thor & Vězda) Lück. et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Coenogonium pyrophthalmum* (Mont.) Lück. et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Mata Atlântica
***Coenogonium strigosum* Rivas Plata et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica
***Coenogonium subdentatum* (Vězda & G. Thor) Rivas Plata et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Coenogonium subdilutum* (Malme) Lücking et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Coenogonium subfallaciosum* (Vězda & Farkas) Lücking et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Coenogonium subzonatum* (Lücking) Lücking et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Coenogonium zonatum* (Müll.Arg.) Kalb & Lück.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Cryptolechia

1 espécie (não endêmica)
***Cryptolechia nana* (Tucker) D.Hawksw. & Dibben**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Diorygma

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Diorygma africanum* Kalb et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Diorygma alagoense* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Diorygma hieroglyphicum* (Pers.) Staiger & Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Diorygma poitaei* (Fée) Kalb et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE); Mata Atlântica
***Diorygma reniforme* (Fée) Kalb et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Diorygma sipmanii* Kalb et al.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Dyplolabia

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Dyplolabia afzelii* (Ach.) A.Massal.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dyplolabia oryzoides* (Leight.) Kalb & Staiger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Echinoplaca

3 espécies (1 endêmica)
***Echinoplaca bispora* Kalb & Vězda**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Echinoplaca caruaruensis* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Echinoplaca leucotrichoides* (Vain.) R. Sant.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Fissurina

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Fissurina dumastii* Fée**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Fissurina incrustanas* Fée**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Fissurina instabilis* (Nyl.) Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Fissurina radiata* Mont.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Fissurina rufula* (Mont.) Staiger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); Mata Atlântica

Glyphis

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Glyphis cicatricosa* Ach.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Glyphis scyphulifera* (Ach.) Staiger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PE, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Glyphis substriatula* (Nyl.) Staiger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL, SE); Caatinga

Graphis

30 espécies (nenhuma endêmica)

***Graphis acharii* Fée**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Domínio desconhecido

***Graphis argentea* Lücking & Umaña**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Graphis caesiella* Vain.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

***Graphis carassensis* Vain.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Graphis chrysocarpa* (Raddi) Spreng.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Graphis dendogramma* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

***Graphis dupaxana* Vain.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

***Graphis duplicata* Ach.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Domínio desconhecido

***Graphis furcata* Fée**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Graphis geraensis* Redinger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

***Graphis glaucescens* Fée**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL); Mata Atlântica

***Graphis kakaduensis* A.W.Archer**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Graphis lumbricina* Vain.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, Mata Atlântica

***Graphis macella* Kremp.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

***Graphis oxyclada* Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

***Graphis palmyrensis* Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

***Graphis parallela* (Müll.Arg.) Cáceres & Lück.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Graphis paraserpens* Lizano & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Graphis pavoniana* Fée**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Graphis pernambucoradians* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Graphis pilarensis* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Graphis rigidula* Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Graphis schiffneri* Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Graphis stellata* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Graphis striatula* (Ach.) Spreng.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Graphis submarginata* Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Graphis subturgidula* Lücking & Sipman**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Domínio desconhecido
***Graphis tenella* Ach.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Graphis vestitoides* (Fink) Staiger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Graphis virescens* Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

Hemithecium

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hemithecium chlorocarpum* (Fée) Trevis.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Hemithecium chrysentheron* (Mont.) Trevis.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

Myeloconis

1 espécie (não endêmica)
***Myeloconis guyanensis* P.M. McCarthy & Elix**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (PE); Mata Atlântica

Myriotrema

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Myriotrema congestum* (Hale) Hale**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Myriotrema costaricense* (Müll.Arg.) Hale**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Myriotrema glaucophaenum* (Kremp.) Hale**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Myriotrema myrioporoides* (Müll.Arg.) Hale**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Ocellularia

9 espécies (nenhuma endêmica)
***Ocellularia bahiana* (Ach.) A.Frisch**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Ocellularia cavata* (Ach.) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Ocellularia crocea* (Kremp.) Overeem & D. Overeem**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Ocellularia gracilis* Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Ocellularia landronii* Hale**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Ocellularia mauritiana* Hale**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Ocellularia papillata* (Leight.) Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); Mata Atlântica
***Ocellularia praestans* (Müll.Arg.) Hale**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Ocellularia subemersa* Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Phaeographis

12 espécies (nenhuma endêmica)
***Phaeographis brasiliensis* (A.Massal.) Kalb & Mathes-Leicht**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica
***Phaeographis crispata* Kalb & Mathes-Leicht**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL, SE); Mata Atlântica
***Phaeographis dendritica* (Ach.) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Phaeographis haematites* (Fée) Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PE, BA, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Phaeographis kalbii* Staiger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Phaeographis lobata* (Eschw.) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Phaeographis neotricosa* Redinger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Phaeographis nylanderi* (Vain.) Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Phaeographis punctiformis* (Eschw.) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga
***Phaeographis rubrostoma* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Phaeographis scalpturata* (Ach.) Staiger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Phaeographis tortuosa* (Ach.) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica

Phlyctella

1 espécie (não endêmica)
***Phlyctella brasiliensis* (Nyl.) Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Platygramme

1 espécie (não endêmica)
***Platygramme caesiopruinosa* (Fée) Fée**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga

Platythecium

1 espécie (não endêmica)
***Platythecium dimorphodes* (Nyl.) Staiger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, Mata Atlântica

Porina

19 espécies (nenhuma endêmica)

***Porina africana* Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica

***Porina ambigua* Malme**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Porina cestrensis* (Michener) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Porina conspersa* Malme**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Porina curtula* Malme**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Porina epilucida* Sipman**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica

***Porina farinosa* C.Knight**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Porina guaranitica* Malme**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Porina imitatrix* Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Mata Atlântica

***Porina internigrans* (Nyl.) Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Porina leptalea* (Durieau & Mont.) A.L. Sm.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Porina limitata* C. Knight**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Porina mastoidea* (Ach.) Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL, SE); Mata Atlântica

***Porina nucula* Ach.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica

***Porina nuculastrum* (Müll.Arg.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica

***Porina rudiuscula* (Nyl.) Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Porina scabrida* R.C. Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Porina simulans* Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Porina tetracerae* (Ach.) Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL); Mata Atlântica

Ramonia

1 espécie (não endêmica)

***Ramonia intermedia* Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL); Mata Atlântica

Sarcographa

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Sarcographa fenicis* (Vain.) Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Sarcographa fissurinoides* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Sarcographa labyrinthica* (Ach.) Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica

***Sarcographa ramificans* (Kremp.) Staiger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Sarcographa tricosa* (Ach.) Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Stegobolus
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Stegobolus anamorphus* (Nyl.) A. Frisch & Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Stegobolus auberianus* (Mont.) A. Frisch & Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Stegobolus wrightii* (Tuck.) A. Frisch**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Stictis
1 espécie (não endêmica)
***Stictis urceolata* (Ach.) Gilenstam**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica

Thalloloma
1 espécie (não endêmica)
***Thalloloma astroideum* (Müll. Arg.) Staiger**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga, Mata Atlântica

Thelenella
1 espécie (não endêmica)
***Thelenella paraguayensis* Malme**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Thelotrema
1 espécie (não endêmica)
***Thelotrema glaucopallens* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Tricharia
1 espécie (não endêmica)
***Tricharia vainioi* R.Sant.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Trichothelium
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Trichothelium angustisporum* Cáceres & Lücking**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Trichothelium horridulum* (Müll.Arg.) R.Sant.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

PELTIGERALES
Marcela Eugenia da Silva Cáceres
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Coccocarpia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Coccocarpia microphyllina* Lücking & Aptroot**
Referência: Cáceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Coccocarpia palmicola* (Spreng.) Arv. & D.J.Galloway**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

PERTUSARIALES
Marcela Eugenia da Silva Cáceres
2 gêneros, 8 espécies (nenhuma endêmica)

Ochrolechia
1 espécie (não endêmica)
***Ochrolechia africana* Vain.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga

Pertusaria
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Pertusaria carneola* (Eschw.) Müll.Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, Mata Atlântica
***Pertusaria dehiscens* Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Domínio desconhecido

***Pertusaria flavens* Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga
***Pertusaria quassiae* (Fée) Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga
***Pertusaria tetrathalamia* (Fée) Nyl.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga
***Pertusaria ventosa* Malme**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Pertusaria wulfenioides* B. de Lesd.**
Referência: Cáceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Caatinga

PEZIZALES

Rosa Mara Borges da Silveira , Larissa Trierveiler Pereira, Clarice Loguercio Leite
8 gêneros, 10 espécies (nenhuma endêmica)

Cookeina

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cookeina colensoi* (Berk.) Seaver**
Referência: Sobestiansky, G. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457 2005
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Cookeina tricholoma* (Mont.) Kuntze**
Referência: Sobestiansky, G. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457 2005
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Galiella

1 espécie (não endêmica)
***Galiella spongiosa* (Berk. & M.A.Curtis) Pfister**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Morchella

1 espécie (não endêmica)
***Morchella esculenta* (L.) Pers.**
Referência: Sobestiansky, G. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457 2005
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Nanoscypha

1 espécie (não endêmica)
***Nanoscypha tetraspora* (Seaver) Denison**
Referência: Sobestiansky, G. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457 2005
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Phillipsia

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phillipsia domingensis* Berk.**
Referência: Guerrero, R.T. & Homrich, M H 1999. Fungos macroscópicos comuns no Rio Grande do Sul.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Phillipsia olivacea* Rick**
Referência: Sobestiansky, G. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457 2005
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Pithya

1 espécie (não endêmica)
***Pithya cupressina* Fuckel**
Referência: Sobestiansky, G. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457 2005
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Plectania

1 espécie (não endêmica)
***Plectania campylospora* (Berk.) Nannf.**
Referência: Guerrero, R.T. & Homrich, M H 1999. Fungos macroscópicos comuns no Rio Grande do Sul.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Domínio desconhecido

Scutellinia

1 espécie (não endêmica)
***Scutellinia scutellata* (L.) Lambotte**
Referência: Sobestiansky, G. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457 2005.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

PHYLLACHORALES

José Luis Bezerra, Dartanhã J. Soares
2 gêneros, 2 espécies (1 endêmica)

Ophiodothella

1 espécie (1 endêmica)
***Ophiodothella anonnae* Bezerra et al.**
Referência: Bezerra, J.L. et al. 2006. Fitopatologia brasileira 31: 592.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Domínio desconhecido

Phyllachora

1 espécie (não endêmica)
***Phyllachora minutissima* (Welw. & Curr.) A.L. Sm.**
Referência: Soares, D.J. & Bando, R.W. 2006. Australos. Pl. Pathol. 35: 347-353
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS); Domínio desconhecido

PLEOSPORALES

Dartanhã J. Soares
3 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Arthopyrenia

1 espécie (não endêmica)
***Arthopyrenia cinchonae* (Ach.) Müll.Arg.**
Referência: Cáceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica

Mycomicrothelia

1 espécie (não endêmica)
***Mycomicrothelia hemispherica* (Müll.Arg.) D.Hawksw.**
Referência: Cáceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica

Paraphaeosphaeria

1 espécie (não endêmica)
***Paraphaeosphaeria michotii* (Westend.) OE Erikss.**
Referência: Soares, D.J. & Bando, R.W. 2006. Australos. Pl. Pathol. 35: 347-353
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Domínio desconhecido

PYRENULALES

Marcela Eugenia da Silva Cáceres
4 gêneros, 23 espécies (nenhuma endêmica)

Anthracothecium

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Anthracothecium duplicans* (Nyl.) Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Anthracothecium prasinum* (Eschw.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); Mata Atlântica

Celothelium

1 espécie (não endêmica)
***Celothelium aciculiferum* (Nyl.) Vain.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

Pyrenula

19 espécies (nenhuma endêmica)
***Pyrenula anomala* (Ach.) Vain.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Pyrenula apistea* (Ach.) Ach.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Pyrenula astroidea* (Fée) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Mata Atlântica
***Pyrenula concatervans* (Nyl.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Pyrenula cruenta* (Mont.) Vainio**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Caatinga
***Pyrenula cruentata* (Müll.Arg.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Pyrenula lineatostroma* Aptroot**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Pyrenula macrocarpa* A. Massal.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Pyrenula macularis* (Zahlbr.) R.C. Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Pyrenula mamillana* (Ach.) Trevis.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica
***Pyrenula micromma* (Mont.) Trevis.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Pyrenula mycrotheca* R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Pyrenula nitidula* (Bres.) R.C. Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica

***Pyrenula ochraceoflava* (Nyl.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Pyrenula prelucida* (Mont.) Trevis.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Pyrenula pyrenuloides* (Mont.) R.C. Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Pyrenula quassiaecola* Fée**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE); Mata Atlântica
***Pyrenula santensis* (Nyl.) Müll. Arg.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Pyrenula septicollaris* (Eschw.) R.C.Harris**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Pyrgillus
1 espécie (não endêmica)
***Pyrgillus javanicus* (Ach.) Vain.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL, SE); Mata Atlântica

RHYTISMATALES
José Luis Bezerra, Dartanhã J. Soares
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Cerion
1 espécie (não endêmica)
***Cerion coccineum* Massee & Rodway**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

TELOSCHISTALES
Marcela Eugenia da Silva Cáceres
9 gêneros, 22 espécies (nenhuma endêmica)

Baculifera
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Baculifera endochlora* (J.Steiner) Marbach**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Baculifera pseudomicromera* Marbach**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga

Cratiria
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cratiria lauricassiiae* (Fée) Marbach**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Cratiria obscurior* (Stirton) Marbach & Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Dirinaria
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Dirinaria applanata* (Fée) D.D.Awasthi**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Caatinga
***Dirinaria confluens* (Fr.) D.D.Awashti**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Dirinaria confusa* D.D. Awasthi**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Dirinaria leopoldii* (Stein) D.D. Awasthi**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Dirinaria picta* (Sw.) Schaer. *ex* Clem.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Dirinaria purpurascens* (Vain.) B.J. Moore**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Hafellia
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Hafellia bahiana* (Malme) Sheard**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Hafellia curatellae* (Malme) Marbach**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Hafellia demutans* (Stirton) Pußwald**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Hafellia parastata* (Nyl.) Kalb**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Heterodermia
1 espécie (não endêmica)
***Heterodermia dissecta* (Kurok.) D. D. Awasthi**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Letrouitia
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Letrouitia domingensis* (Pers.) Haf. & Bellem.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica
***Letrouitia subvulpina* (Nyl.) Haf.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Letrouitia vulpina* (Tuck.) Haf. & Bellem.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL); Mata Atlântica

Physcia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Physcia rolfii* Moberg**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Caatinga
***Physcia sorediosa* (Vain.) Lynge**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Caatinga

Pyxine
1 espécie (não endêmica)
***Pyxine berteriana* (Fée) Imsh.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga

Stigmatochroma
1 espécie (não endêmica)
***Stigmatochroma gerontoides* (Stirt.) Marbach**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Caatinga

VERRUCARIALES
Marcela Eugenia da Silva Cáceres
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Flakea
1 espécie (não endêmica)
***Flakea papillata* O.E. Erikss.**
Referência: Cáceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

XYLARIALES
Jadergudson Pereira, Rosa Mara Borges da Silveira , Larissa Trierveiler Pereira, Clarice Loguercio Leite
24 gêneros, 213 espécies (22 endêmicas), 10 variedades (2 endêmicas)

Annulohypoxylon
12 espécies (4 endêmicas)
***Annulohypoxylon apiahynum* (Speg.) Hladki & A.I.Romero**
Referência: Hladki, A.I. & Romero, A.I. 2009. Mycologia 101: 739.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Annulohypoxylon austrobahiense* Jad. Pereira et al.**
Referência: Pereira, J. et al. 2010. Mycologia 102: 248-252.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Annulohypoxylon hemicarpum* Jad. Pereira et al.**
Referência: Pereira, J. et al. 2010. Mycologia 102: 248-252.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Annulohypoxylon leptascum* (Speg.) Y.-M.Ju et al.**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20: 1-365.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Annulohypoxylon macrodiscum* Jad. Pereira et al.**
Referência: Pereira, J. et al. 2010. Mycologia 102: 248-252.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Annulohypoxylon moriforme* (Henn.) Y.-M.Ju et al.**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20: 1-365.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Annulohypoxylon multiforme* (Fr.) Y.M.Ju et al.**
Voucher: 102431 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Annulohypoxylon nitens* (Ces.) Y.M.Ju et al.**
Voucher: Pereira, J. s.n. (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Annulohypoxylon purpureonitens* (Y.-M.Ju & J.D.Rogers) Y.-M.Ju et al.**
Voucher: 129622 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Annulohypoxylon purpureopigmentum* Jad. Pereira et al.**
Referência: Pereira, J. et al. 2010. Mycologia 102: 248-252.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Annulohypoxylon stygium* (Lév.) Y.-M.Ju et al.**
Voucher: 129680, 216265, 216266, 216267 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Annulohypoxylon truncatum* (Schwein.) Y.-M.Ju et al.**
Voucher: 64833, 65157, 100336 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, BA), Sul (RS); Mata Atlântica

Astrocystis
2 espécies (1 endêmica)
***Astrocystis amazonensis* Bat. & H. Maia**
Referência: Batista, A.C. & Maia, H.S. 1964.
Anais 14 Congr. Soc. Bot. Brasil 135.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);
Amazônia
***Astrocystis sublimbata* (Durieu & Mont.) G.C. Hughes**
Voucher: Goos, R.D. s.n. (INPA 125178)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO);
Domínio desconhecido

Batistia
1 espécie (não endêmica)
***Batistia annulipes* (Mont.) Cif.**
Referência: Fidalgo, O. 1968. Rickia 3: 1-43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sudeste (RJ); Amazônia

Biscogniauxia
8 espécies (3 endêmicas), 3 variedades
(nenhuma endêmica)
***Biscogniauxia capnodes* (Berk.) Y.M. Ju & J.D.Rogers**
Distribuição: nativa; não endêmica
Biscogniauxia capnodes* (Berk.) Y.M. Ju & J.D.Rogers var. *capnodes
Referência: Ju, Y.-M. et al. 1998. Mycotaxon 66: 23.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),
Sul (RS); Mata Atlântica
***Biscogniauxia capnodes* var. *rumpens* (Cooke) Y.-M. Ju & J. D. Rogers**
Referência: Ju, Y.-M. et al. 1998. Mycotaxon 66: 27.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Biscogniauxia capnodes* var. *theissenii* (Syd. & P.Syd.) Y.-M.Ju & J.D.Rogers**
Referência: Ju, Y.-M. et al. 1998. Mycotaxon 66: 23.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Biscogniauxia cinereolilacina* (J. H. Miller) Pouzar**
Referência: Hennings, p. 1904. Hedwigia 43: 199-209.
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Biscogniauxia communapertura* Y.-M. Ju & J. D. Rogers**
Referência: Ju, Y.-M. et al. 1998. Mycotaxon 66: 31.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Biscogniauxia divergens* (Theiss.) Whalley & Laessøe**
Referência: Whalley, A.J.S. et al. 1990.
Mycological Research 94: 239.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Biscogniauxia mediterranea* (De Not.) Kuntze**
Referência: Ju, Y.-M. et al. 1998. Mycotaxon 66: 1-98.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),
Sul (RS); Mata Atlântica
***Biscogniauxia nummularia* (Bull.) Kuntze**
Voucher: 80997 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Biscogniauxia repanda* (Fr.) Kuntze**
Referência: Hennings, p. 1904. Hedwigia 43: 242-273.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Biscogniauxia sinuosa* (Theiss.) Y.-M.Ju & J.D. Rogers**
Referência: Ju, Y.-M. et al. 1998. Mycotaxon 66: 55.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Camillea
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Camillea bilabiata* Speg.**
Voucher: 75175 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Camillea cyclops* Mont.**
Voucher: Pereira, J. s.n. 79234 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),
Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Camillea labellum* Mont.**
Voucher: 137043 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Camillea leprieurii* Mont.**
Voucher: 41264 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Camillea mucronata* Mont.**
Voucher: 128980 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia
***Camillea turbinata* (Berk.) Speg.**
Voucher: Batista 20954 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(BA), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Creosphaeria
1 espécie (não endêmica)
***Creosphaeria sassafras* (Schwein.) Y.-M. Ju et al.**
Referência: Ju, Y.-M. et al. 1993. Mycotaxon 47: 223.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Daldinia
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Daldinia caldariorum* Henn.**
Referência: Silveira, V.D. & Rodrigues, K.F. 1985.
Acta Amazonica 15: 14.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Domínio desconhecido
***Daldinia clavata* Henn.**
Referência: Ju, Y.-M. 1997. Mycotaxon 61: 243-294.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Daldinia concentrica* (Bolton) Ces. & De Not.**
Voucher: 183825 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sul (SC); Amazônia,
Mata Atlântica
***Daldinia eschscholzii* (Ehrenb.) Rehm**
Voucher: Yuyama, K. s.n. (INPA 45340)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (MT), Sul (PR, RS); Amazônia

Entonaema
1 espécie (não endêmica)
***Entonaema liquescens* Möller**
Referência: Rogers, J.D. 1981. Mycologia 73: 28-61.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Eutypella
1 espécie (não endêmica)
***Eutypella leprosa* (Pers.) Berl.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Hypoxylon
35 espécies (2 endêmicas)
***Hypoxylon anthochroum* Berk. & Broome**
Voucher: 16108, 16109 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Hypoxylon bombacinum* Bat. & Oliveira**
Referência: Batista, A.C & Oliveira, T.J. 1959. Anais Soc. Biol. Pernambuco 16: 153.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Hypoxylon brevirimum* Y.-M. Ju & J. D. Rogers**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Hypoxylon brevisporum* Y.-M. Ju & J. D. Rogers**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Hypoxylon chionostomum* (Speg.) Speg.**
Voucher: 22266, 22072, 21787, 21535, 16186 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon cinnabarinum* (Henn.) Y.-M.Ju & J.D. Rogers**
Voucher: 22191 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon crocopeplum* Berk. & Curt.**
Voucher: 16143, 16195, 16317, 16318, 20884, 21757, 22949 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Hypoxylon diatrypeoides* Rehm**
Voucher: 16174, 22317 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Hypoxylon dickermanii* Theiss.**
Voucher: 129644 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia
***Hypoxylon erythrostroma* J. H. Miller**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hypoxylon fuscopurpureum* (Schwein.) M.A.Curtis**
Voucher: 16302, 16273, 16238, 16209, 16198, 16171, 16124, 22528 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon fuscum* (Pers.) Fr.**
Voucher: 16189 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon haematostroma* Mont.**
Voucher: 16083, 16205 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon hypomiltum* Mont.**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hypoxylon jecorinum* Berk. & Ravenel**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon lenormandii* Berk. & Curt.**
Voucher: Pereira, J. s.n. (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon megalosporum* Speg.**
Voucher: 16285, 22019, 16155, 16120 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon moellerianum* (Henn.) Y.-M.Ju & J.D.Rogers**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Hypoxylon monticulosum* Mont.**
Voucher: 20827, 20322, 16296, 16073, 16250, 16138, 16133, 16262 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon notatum* Berk. & Curt.**
Voucher: 16100, 16107, 16087, 16176 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon ochraceum* Henn.**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Hypoxylon perforatum* (Schwein.) Fr.**
Voucher: 16258, 16270, 16293, 21539, 16066, 16103, 16221 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon pilgerianum* Henn.**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Hypoxylon placentiforme* Berk. & Curt.**
Voucher: 16148, 21813 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon polyporum* (Starb.) Y.-M.Ju & J.D. Rogers**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon rickii* Y.-M. Ju & J. D. Rogers**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon rubigineoareolatum* Rehm**
Voucher: 16078, 16079, 20945, 16065, 16111, 16188, 16136, 16074, 22283, 22020, 16135, 21988, 16283 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon rubiginosum* (Pers.) Fr.**
Voucher: 21129, 22442, 16228, 16233, 16310, 16116, 16092, 16134, 16130, 16290, 16123, 16098, 16272 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon sclerophaeum* Berk. & Curt.**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon subgilvum* Berk. & Broome**
Voucher: Pereira, J. s.n. (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon subnigricans* Speg.**
Referência: Hladki, A.I. & Romero, A.I. 2009. Mycologia 101: 733–744.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Hypoxylon subrutilum* Starb.**
Voucher: 22068, 21528, 16252, 16212, 16067, 16121, 16156, 16227 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon symphyon* A. Möller**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 1996. Mycologia Memoir 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Hypoxylon truncatum* (Schwein.) J.H. Miller**
Voucher: Pereira, J. s.n. (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Hypoxylon umbilicatum* Speg.**
Voucher: 22886 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Jumillera

4 espécies (1 endêmica)
***Jumillera albida* J.D. Rogers et al.**
Referência: Rogers, J.D. et al. 1997. Mycotaxon 64: 42.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Jumillera cinerea* (Ellis & Everh.) J.D. Rogers et al.**
Referência: Rogers, J.D. et al. 1997. Mycotaxon 64: 43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Jumillera punctatobrunnea* (Theiss.) J.D. Rogers et al.**
Referência: Rogers, J.D. et al. 1997. Mycotaxon 64: 47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Jumillera viridis* (Theiss.) J.D. Rogers et al.**
Referência: Rogers, J.D. et al. 1997. Mycotaxon 64: 47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Kretzschmaria

12 espécies (2 endêmicas)
***Kretzschmaria albogrisea* Jad. Pereira et al.**
Referência: Pereira, J. et al. 2008. Mycotaxon 106: 237-241.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Kretzschmaria aspinifera* Jad. Pereira et al.**
Referência: Pereira, J. et al. 2009. Sydowia 61: 321-325.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Kretzschmaria cetrarioides* (Welw. & Curr.) Sacc.**
Voucher: 144560 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Kretzschmaria clavus* (Fr.) Sacc.**
Referência: Silvana, V.D. & Rodrigues, K.F. 1985 Acta Amazônica 15: 16
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Kretzschmaria curvirima* J.D. Rogers & Y.M. Ju**
Referência: Rogers, J.D. & Ju, Y-.M. 1998. Mycotaxon 68: 345-393.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Kretzschmaria deusta* (Hoffm.) P.M.D. Martin**
Referência: Hennings, p. 1897. Hedwigia 36: 190-246.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica
***Kretzschmaria guyanensis* J.D. Rogers & Y.-M. Ju**
Voucher: Rodrigues, K.F. s.n. (INPA 128996)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Kretzschmaria lucidula* (Mont.) Dennis**
Voucher: Jesus, M.A. (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia
***Kretzschmaria micropus* (Fr.) Sacc.**
Referência: Rogers, J.D. & Ju, Y-.M. 1998. Mycotaxon 68: 345-393.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Kretzschmaria pavimentosa* (Ces.) P. Martin**
Referência: Rogers, J.D. & Ju, Y-.M. 1998. Mycotaxon 68: 345-393.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia
***Kretzschmaria sandvicensis* (Reichardt) J.D.Rogers & Y.-M.Ju**
Referência: de Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1–55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Kretzschmaria sigmoidrima* A.I.Hladki & A.I.Romero**
Referência: de Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1–55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Kretzschmariella

1 espécie (não endêmica)
***Kretzschmariella culmorum* (Cooke) Y.M. Ju & J.D. Rogers**
Referência: Viégas, A.P. 1944. Bragantia 4: 105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Leprieuria

1 espécie (não endêmica)
***Leprieuria bacillun* (Mont.) Læssøe et al.**
Voucher: Pires, J.M. 48635 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG); Amazônia

Leptomassaria

1 espécie (não endêmica)
***Leptomassaria simplex* (Nitschke *ex* G.H. Otth) Petr.**
Referência: Hladki, A.I. & Romero, A.I. 2003. Sydowia 55: 65-76.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Nemania

5 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Nemania beaumontii* (Berk. & M.A. Curtis) Y.-M. Ju & J.D. Rogers**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 2002. Nova Hedwigia 74: 75-120.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Nemania bipapillata* (Berk. & M.A. Curtis) Pouzar**
Voucher: Pereira, J. s.n. (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Nemania chestersii
Distribuição: nativa; não endêmica
***Nemania chestersii* var. *microspora* (J.D.Rogers & Samuels) Y.-M.Ju & J.D.Rogers**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 2002. Nova Hedwigia 74: 75-120.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Nemania confluens* (Tode) Læssøe & Spooner**
Referência: Batista, A.C. 1960. IMUR 279: 12.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Nemania diffusa* (Sowerby) S.F.Gray**
Referência: Ju, Y.-M. & Rogers, J.D. 2002.
Nova Hedwigia 74: 75-120.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Phylacia

5 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Phylacia bomba* (Mont.) Pat.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Phylacia bomba* var. *macrospora* K.F. Rodrigues & Samuels**
Voucher: Jesus, M.A. s.n. (INPA 230811)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phylacia globosa* Lév.**
Voucher: 128979, 129897, 143350 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM, RO); Amazônia
***Phylacia poculiformis* (Mont.) Mont.**
Voucher: Pereira, J. s.n. (URM 79231)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT);
Amazônia, Mata Atlântica
***Phylacia surinamensis* (Berk.) Dennis**
Referência: Silveira, V.D. & Rodrigues, K.F. 1985.
Acta Amazonica 15: 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phylacia turbinata* (Berk.) Dennis**
Voucher: Fidalgo, O. s.n. (SP 43076)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Poronia

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Poronia fornicata* Möller**
Voucher: Torrand, C. s.n. (URM 6324)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (BA), Sul (SC); Mata Atlântica
***Poronia oedipus* (Mont.) Mont.**
Voucher: Vohland, K. s.n. (INPA 216354)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Rhopalostroma

1 espécie (não endêmica)
***Rhopalostroma sphaerocephalum* (Petch) D.Hawksw.**
Voucher: Rodrigues, K.F. s.n. (INPA 137042)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Rosellinia

12 espécies (nenhuma endêmica),
1 variedade (não endêmica)
***Rosellinia arcuata* Petch**
Referência: Mendes, MAS et al. 1998. Fungos
em plantas no Brasil. 569 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Rosellinia bunodes* (Berk. & Broome) Sacc.**
Referência: Mendes, MAS et al. 1998. Fungos
em plantas no Brasil. 569 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
Rosellinia desmazieri
Distribuição: nativa; não endêmica
***Rosellinia desmazieri* var. *acutispora* Theiss.**
Referência: Petrini, L.E. 2003. New Zealand J. Bot. 41:71-138.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Rosellinia griseocincta* Starbäck**
Referência: Petrini, L.E. 2003. New Zealand J. Bot. 41:71-138.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Rosellinia hyalospora* Theiss.**
Referência: Petrini, L.E. 2003. New Zealand J. Bot. 41:71-138.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Rosellinia longispora* Rick**
Referência: Petrini, L.E. 2003. New Zealand J. Bot. 41:71-138.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Rosellinia necatrix* Berl. *ex* Prill.**
Voucher: Angeiras, C. 399 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),
Sul (SC); Mata Atlântica
***Rosellinia pepo* Pat.**
Referência: Mendes, MAS et al. 1988. Fungos em
plantas no Brasil 569.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Rosellinia perusensis* Henn.**
Referência: Petrini, L.E. 2003. New Zealand J. Bot. 41:71-138.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Rosellinia puiggari* Pat.**
Referência: Petrini, L.E. 2003. New Zealand J. Bot. 41:71-138.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (RS); Mata Atlântica
***Rosellinia rickii* Bres.**
Referência: Petrini, L.E. 2003. New Zealand J. Bot. 41:71-138.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Rosellinia stenasca* Rick**
Referência: Petrini, L.E. 2003. New Zealand J. Bot. 41:71-138.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica

Stilbohypoxylon

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (1 endêmica)
***Stilbohypoxylon moelleri* Henn.**
Referência: Rogers, J.D. & Ju, Y-.M. 1997.
Mycological Research 101: 135-138.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Stilbohypoxylon quisquiliarum* (Mont.) J.D.Rogers & Y.M. Ju**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Stilbohypoxylon quisquiliarum* var. *microsporum* Jad. Pereira et al.**
Referência: Pereira, J. et al. 2009. Sydowia 61: 321-325.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Thamnomyces

4 espécies (1 endêmica)
***Thamnomyces chamissonis* Ehrenb.**
Voucher: Batista, A.C. s.n. (URM 20951, 20952)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Thamnomyces chordalis* Fr.**
Voucher: Pereira, J. s.n. (URM 79228, 79229)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF),
Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Thamnomyces dendroidea* Cooke & Massee**
Voucher: Batista, A.C. s.n. (URM 20951, 20952)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Thamnomyces fuciformis* Berk.**
Voucher: Samuels, G.J. s.n. (INPA 129998)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Whalleya

1 espécie (não endêmica)
***Whalleya maculata* (Theiss.) J.D.Rogers et al.**
Referência: Rogers, J.D. et al. 1987. Mycotaxon 64: 39-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Xylaria

91 espécies (8 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)
***Xylaria abnormis* Berk.**
Referência: Berkeley, M.J. 1856. Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 8: 272-280.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Xylaria acerata* Bat. & Vital**
Referência: Batista, A.C. & Vital, A.F. 1956. Revista Biol. (Lisbon) 1: 41-48
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Xylaria adscendens* Fr.**
Referência: Hamme, M.S. & Guerrero, R.T. 2002. Iheringia, Bot. 57: 135-201.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Xylaria allantoidea* (Berk.) Fr.**
Voucher: 216356 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Amazônia
***Xylaria amazonica* Henn.**
Referência: Hennings, p. 1904. Hedwigia 43: 261.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Xylaria anisopleura* (Mont.) Fr.**
Voucher: 621 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Xylaria apeibae* Mont.**
Referência: Berkeley, M.J. & Cooke, M.C. 1887. J. Linn. Soc., Bot. 15: 363-398.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Xylaria aphrodisiaca* Welw. & Curr.**
Referência: Pazschke, O. 1892. Hedwigia 31: 93-114.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Xylaria apiculata* Cooke**
Voucher: 425, 511, 594 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Xylaria arbuscula* Sacc.**
Voucher: Samuels, G.J. s.n. (INPA 129053)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Xylaria axifera* Mont.**
Voucher: Pereira, J. s.n. (URM 79236, 79237)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Xylaria biceps* Speg.**
Voucher: Vital, A.F. 368, 586 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Xylaria brasiliensis* (Theiss.) Lloyd**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin. Kew, England 3: 401-444.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Xylaria caespitulosa* Ces.**
Voucher: Vital, A.F. 628 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Xylaria castorea* Berk.**
Voucher: Vital, A.F. 727 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Xylaria coccinea* Henn.**
Referência: Hennings, p. 1904. Hedwigia 43: 78-95.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Xylaria coccophora* Mont.**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin. Kew, England 3: 401-444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Xylaria comosa* Mont.**
Voucher: Soares, O. 1206 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Xylaria conocephala* Berk. & Curt.**
Referência: Berkeley, M.J. & Cooke, M.C. 1877. J. Linn. Soc., Bot. 15: 363-398.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Xylaria consorciata* Starbäck**
Voucher: Batista, A.C. (URM 613)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Xylaria corniformis* (Fr.) Fr.**
Referência: Hamme, M.S. & Guerreiro, R.T. 2002. Iheringia, Bot. 57: 135-201.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (RS); Mata Atlântica
***Xylaria cornu-damae* (Schwein.) Berk.**
Referência: Silva, M. & Minter, D.W. 1995. Mycological Papers 169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (SC); Mata Atlântica
***Xylaria cubensis* (Mont.) Fr.**
Voucher: Maia, L.C. s.n. (URM 73597)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Xylaria curta* Fr.**
Voucher: Vital, A.F. 800 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Xylaria cylindrica* Lév.**
Referência: Rehm, H. 1901. Hedwigia 40: 100-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Xylaria dealbata* Berk. & Curt.**
Referência: Silveira, V.D. & Rodrigues, K.F. 1985. Acta Amazonica 15: 22.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xylaria deserticola* Speg.**
Referência: Hamme, M.S. & Guerrero, R.T. 2002. Iheringia, Bot. 57: 135-201.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Xylaria digitata* Fr.**
Referência: Berkeley, M.J. & Cooke, M.C. 1877. J. Linn. Soc., Bot. 15: 363-398.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Xylaria eucephala* Sacc. & Paol.**
Voucher: Ferreira, C. 473 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Xylaria euglossa* Fr.**
Voucher: Silva, S.J. 1075 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Xylaria euphorbiicola* Rehm**
Referência: Dennis, R.W.G. 1957. Kew Bulletin. Kew, England 3: 401-444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xylaria exalbida* Bat. & Vital**
Voucher: Batista, A.C. s.n. (URM 5280)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Xylaria feejeensis* (Berk.) Fr.**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin. Kew, England 3: 401-444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Xylaria filiformis* (Alb. & Schwein.) Fr.**
Referência: Berkeley, M.J. & Cooke, M.C. 1877. J. Linn. Soc., Bot. 15: 363-398.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Xylaria fistuca* Berk.**
Referência: Batista, A.C. & Vital, A.F. 1948. Boletim da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, Recife 15: 166-178.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Xylaria fockei* (Miq.) Cooke**
Voucher: Oliveira, A. s.n. (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
Xylaria furcata
Distribuição: nativa; não endêmica
Xylaria furcata* var. *furcata
Referência: Silveira, V.D. & Rodrigues, K.F. 1985. Acta Amazonica (Supl.)15: 23.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xylaria globosa* (Spreng. *ex* Fr.) Mont.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Xylaria gracillima* (Fr.) Fr.**
Voucher: Vital, A.F. 447 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Xylaria graminicola* W.R. Gerard**
Referência: Batista, A.C. & Vital, A.F. 1948. Boletim da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, Recife 15: 166-178.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Xylaria grammica* (Mont.) Mont.**
Referência: Hamme, M.S. & Guerrero, R.T. 2002. Iheringia, Bot. 57: 135-201.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Xylaria guaranitica* (Speg.) Dennis**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin. Kew, England 3: 401 –444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Xylaria heliscus* (Mont.) J.D.Rogers & Y.M.Ju**
Referência: Dennis, R.W.G. 1957. Kew Bulletin. Kew, England 3: 314
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Xylaria herculea* (Miq.) Cooke**
Voucher: Ferreira, C. 792 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Xylaria holmbergi* Speg.**
Referência: Hamme, M.S. & Guerrero, R.T. 2002. Iheringia, Bot. 57: 135-201.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Xylaria hyperythra* (Mont.) Mont.**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin. Kew, England 3: 401 –444.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Xylaria hypoxylon* (L.) Grev.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Xylaria hypoxylon* var. *cupressiformis* Pers.**
Referência: Berkeley, M.J. 1880. Vidensk. Meddel. Dansk Natuhist. Foren. Kjøbenhavn 31/32: 31-34.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Xylaria ianthinovelutina* (Mont.) Fr.**
Referência: Hamme, M.S. & Guerreiro, R.T. 2002. Iheringia, Bot. 57: 135-201
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Xylaria inaequalis* Berk. & Curt.**
Referência: Berkeley, M.J. & Cooke, M.C. 1877. J. Linn. Soc., Bot. 15: 363-398.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Xylaria involuta* Klotzsch**
Referência: Hennings, p. 1902. Hedwigia 41: 1-33.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Xylaria juruensis* Henn.**
Referência: Silveira, V.D. & Rodrigues, K.F. 1985. Acta Amazonica 15: 23.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xylaria laevis* Lloyd**
Voucher: Pereira, J. s.n. (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Xylaria longipes* Nitschke**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin. Kew, England 3: 401 –444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Xylaria luxurians* (Rehm) Lloyd**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin. Kew, England 3: 401-444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Xylaria luzonensis* Henn.**
Referência: Hennings, p. 1904. Hedwigia 43: 78-95.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Xylaria magnoliae* J.D. Rogers**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. et al. 2009. Mycotaxon 107: 139-156.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Xylaria mali* Fromme**
Referência: Kimati, H. 1997. Manual de Fitopatologia Vol. 2.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Xylaria marasmoides* Berk. & Cooke**
Referência: Berkeley, M.J. & Cooke, M.C. 1877.
J. Linn. Soc., Bot. 15: 396.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Xylaria melanura* Lév.**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin.
Kew, England 3: 401 –444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica
***Xylaria mellissii* (Berk.) Cooke**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. et al. 2009.
Mycotaxon 107: 139-156
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE), Sul (SC); Mata Atlântica
***Xylaria mesenterica* (Möller) M.Stadler et al.**
Referência: Stadler, M. et al. 2008.
Mycological Progress 7: 53:73-2008.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Xylaria microceras* (Mont.) Berk.**
Referência: Hamme, M.S. & Guerrero, R.T. 2002.
Iheringia, Bot. 57: 135-201.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sul (RS); Mata Atlântica
***Xylaria montagnei* Hamme & Guerrero**
Referência: Hamme, M.S. & Guerrero, R.T. 1997.
Mycotaxon 64: 196.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica
***Xylaria multiplex* (Kunze) Fr.**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin.
Kew, England 3: 401-444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),
Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Xylaria nodulosa* Lloyd**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin.
Kew, England 3: 401-444.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC);
Domínio desconhecido
***Xylaria obovata* (Berk.) Berk.**
Referência: Hamme, M.S. & Guerreiro, R.T.
Iheringia, Bot. 57: 135-201
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (PE), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Xylaria pallida* Berk. & Cooke**
Referência: Berkeley, M.J. & Cooke, M.C. 1877.
J. Linn. Soc., Bot. 15: 363-398.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM);
Domínio desconhecido
***Xylaria palmicola* G.Winter**
Referência: Pazschke, O. 1892. Hedwigia 31: 93-114.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sul (SC); Mata Atlântica
***Xylaria papulis* Lloyd**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Xylaria papulis* var. *microsporum* Jad. Pereira et al.**
Referência: Pereira, J. et al. 2009. Sydowia 61: 321-325.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica
***Xylaria patrisiae* Henn.**
Referência: Hennings, p. 1904. Hedwigia 43: 268.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM);
Amazônia
***Xylaria paulistana* Bat. & Vital**
Voucher: Batista, A.C. & Vital, A.F. 1956. Revista Biol. (Lisbon) 1: 41-48
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica
***Xylaria phosphorea* Berk.**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin.
Kew, England 3: 401-444.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS);
Mata Atlântica
***Xylaria platypoda* (Lév.) Fr.**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin.
Kew, England 3: 401-444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Xylaria polymorpha* (Pers.) Grev.**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin. Kew,
England 3: 401-444.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),
Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Amazônia,
Mata Atlântica
***Xylaria portoricensis* Klotzsch**
Referência: Bresadola, G. 1896. Hedwigia 35: 276-302.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC);
Mata Atlântica
***Xylaria pseudoapiculata* Hamme & Guerrero**
Referência: Hamme, M.S. & Guerrero, R.T. 1997.
Mycotaxon 84:198.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Xylaria regalis* Cooke**
Referência: Batista, A.C. 1967. Atas Inst. Micol.
Univ. Recife 5: 125.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica
***Xylaria reperta* Bat. & Vital**
Referência: Batista, A.C. & Vital, A.F. 1956. Revista Biol.
(Lisbon) 1: 41-48.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Xylaria rhopaloides* (Kunze) Mont.**
Referência: Berkeley, M.J. et al. 1856.
J. Bot. Kew. Gard. Misc. 8: 272-280.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Xylaria rickii* Theiss.**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin.
Kew, England 3: 401 –444.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Xylaria schwackei* Henn.**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956. Kew Bulletin.
Kew, England 3: 401 –444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Xylaria scopiformis* Mont.**
Referência: Berkeley, M.J. & Cooke, M.C. 1877.
J. Linn. Soc., Bot. 15: 363-398.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Xylaria scruposa* (Fr.) Berk.**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956.
Kew Bulletin. Kew, England 3: 401-444
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Xylaria subgracillima* Henn.**
Referência: Hennings, p. 1904. Hedwigia 43: 262.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Xylaria subtrachelina* Henn.**
Referência: Hennings, p. 1904. Hedwigia 43: 207.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Xylaria telfairii* (Berk.) Sacc.**
Referência: Dennis, R.W.G. 1956.
Kew Bulletin. Kew, England 3: 401-444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Amazônia
***Xylaria theissenii* Lloyd**
Referência: Dennis, R.W.G. 1957. Kew Bulletin.
Kew, England 3: 401 –444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Xylaria tuberoides* Rehm**
Referência: Henings,, p. 1904. Hedwigia 43: 242-273.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Xylaria tuberosa* (Pers.) Cooke**
Voucher: B. Pickel s.n. (URM 356)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Xylaria ustorum* (Pat.) Dennis**
Referência: Dennis, R.W.G. 1957. Kew Bulletin.
Kew, England 3: 401-444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Xylaria wrightii* Berk. & Curt.**
Referência: Hennings, p. 1902. Hedwigia 41: 1-33.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC);
Mata Atlântica

BASIDIOMYCOTA

376 gêneros, 1.730 espécies (417 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 38 variedades (9 endêmicas)

AGARICALES

**Marina Capelari, Iuri Goulart Baseia ,
Vagner Gularte Cortez, Marcelo Aluísio Sulzbacher,
Rosa Mara Borges da Silveira , Clarice Loguercio Leite,
Marisa Campos Santana**

92 gêneros, 255 espécies (34 endêmicas), 7 variedades (nenhuma endêmica)

Agaricus

7 espécies (1 endêmica)
***Agaricus mediofuscus* (F.H.Moller) Pilat**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica
***Agaricus meijeri* Heinem.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica
***Agaricus parasilvaticus* Heinem.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica
***Agaricus porphyrizon* P.D. Orton**
Referência: Rother, M.S. & Silveira, R.M.B. 2008.
Revista Brasileira de Biociências 6: 259-268.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Agaricus pseudoargentinus* Albertó & J.E. Wright**
Referência: Rother, M.S. & Silveira, R.M.B. 2008.
Revista Brasileira de Biociências 6: 259-268.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Agaricus stijvei* Meijer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sul (PR);
Mata Atlântica
***Agaricus volvatulus* Heinem. & Gooss.-Font.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis
das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica

Agrocybe

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Agrocybe allocystis* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sul (PR);
Mata Atlântica
***Agrocybe cubensis* (Murrill) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica
***Agrocybe retigera* (Speg.) Singer**
Referência: Cortez, V.G. & Silveira, R.M.B. 2005.
Biociências 13: 227-229.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Agrocybe sororia* (Peck) Singer**
Referência: Sobestiansky, G. 2005.
Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Agrocybe underwoodii* (Murrill) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica

Amanita

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Amanita grallipes* Bas & de Meijer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica
***Amanita muscaria* (L.) Lam.**
Referência: Sobestiansky, G. 1965. Brazilian Archives
of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Amanita rubescens* Pers.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives
of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Armillaria
1 espécie (não endêmica)
***Armillaria puiggarii* (Speg.) Speg.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Battarrea
1 espécie (1 endêmica)
***Battarrea phalloides* (Dicks.) Pers.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Bolbitius
1 espécie (não endêmica)
***Bolbitius mesosporus* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Bovista
1 espécie (não endêmica)
***Bovista longispora* Kreisel**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Calathella
1 espécie (1 endêmica)
***Calathella columbiana* Agerer**
Referência: Sulzbacher, M.A. et al. 2008. Mycotaxon 105: 37-42.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Callistosporium
1 espécie (não endêmica)
***Callistosporium luteo-olivaceum* (Berk. & M.A. Curtis) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Calocybe
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Calocybe cyanea* Singer *ex* Redhead & Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Calocybe rubra* Rick *ex* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Calvatia
3 espécies (2 endêmicas)
***Calvatia cyathiformis* (Bosc) Morgan**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Calvatia fragilis* Fr.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Calvatia rugosa* (Berk. & M.A.Curtis) D.A.Reid**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Camarophyllus
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Camarophyllus buccinulus* (Speg.) Pegler**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Camarophyllus pratensis* (Fr.) P.Kumm.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Campanella
4 espécies (1 endêmica)
***Campanella aeruginea* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Campanella agaricina* (Mont.) Lloyd**
Referência: Putzke, J. 2002. Caderno de Pesquisa, série Biologia 14: 45-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Campanella alba* (Berk. & M.A.Curtis) Singer**
Referência: Putzke, J. 2002. Caderno de Pesquisa, série Biologia 14: 45-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Campanella elongatispora* Singer**
Referência: Putzke, J. 2002. Caderno de Pesquisa, série Biologia 14: 45-66.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Caripia
1 espécie (não endêmica)
***Caripia montagnei* (Berk.) Kuntze**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Nova Hedwigia 82: 105-113.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE, SE); Domínio desconhecido

Cellypha
1 espécie (não endêmica)
***Cellypha goldbachii* (Weinm.) Donk**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Chaetocalathus
1 espécie (não endêmica)
***Chaetocalathus liliputianus* (Mont.) Singer**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Cheimonophyllum
1 espécie (não endêmica)
***Cheimonophyllum candidissimum* (Berk. & M.A.Curtis) Singer**
Referência: Putzke, J. 2002. Caderno de Pesquisa, série Biologia 14: 45-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Chlorophyllum
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Chlorophyllum hortense* (Murrill) Vellinga**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Chlorophyllum molybdites* (G.Mey.) Massee**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (RS); Mata Atlântica

Clavaria
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Clavaria corniculata* Schaeff.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Clavaria depokensis* Overeem**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Clavaria zollingeri* Lév.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Clitocybe
1 espécie (não endêmica)
***Clitocybe silvae-araucariae* de Meijer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Clitocybula
1 espécie (não endêmica)
***Clitocybula azurea* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Clitopilus
3 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Clitopilus argentinus* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Clitopilus hobsonii* (Berk. & Broome) P.D. Orton**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
Clitopilus hobsonii* (Berk. & Broome) P.D. Orton var. *hobsonii
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica
***Clitopilus scyphoides* (Fr.) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Mata Atlântica

Collybia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Collybia pseudomphalodes* Dennis**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Collybia syringea* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Conocybe
9 espécies (nenhuma endêmica)
***Conocybe ambigua* Watling**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Conocybe brunneola* Kühner *ex* Kühner & Watling**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Conocybe fragilis* (Peck) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Conocybe lentispora* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Conocybe mesospora* Kühner *ex* Watling**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Conocybe missionum* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Conocybe rugosa* (Peck) Watling**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Conocybe siennophylla* (Berk. & Broome) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Conocybe xylophylla* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Coprinellus

2 espécies (1 endêmica)
***Coprinellus disseminatus* (Pers.) J.E.Lange**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Coprinellus xanthothrix* (Romagn.) Vilgalys**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Coprinus

3 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Coprinus lagopus* (Fr.) Fr.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
Coprinus lagopus* (Fr.) Fr. var. *lagopus
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Coprinus micaceus* (Bull.) Fr.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Coprinus xanthothrix* Romagn.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Cotylidia

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cotylidia aurantiaca* (Pers.) A.L.Welden**
Referência: Reid, D.A. 1965. Nova Hedwigia 18: 1-184.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cotylidia spectabilis* (Lév.) Courtec.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Crepidotus

14 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Crepidotus acanthosyrinus* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Crepidotus albidus* Ellis & Everh.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Crepidotus antillarum* (Pat.) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Crepidotus applanatus* (Pers.) P.Kumm.**
Referência: Pereira, A.B. 1990. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 2: 65-85.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Crepidotus aquosus* Murrill**
Referência: Pereira, A.B. 1990. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 2: 65-85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Crepidotus brasiliensis* Rick**
Referência: Pereira, A.B. 1990. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 2: 65-85.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Crepidotus catamarcae* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Crepidotus citricolor* Singer**
Referência: Pereira, A.B. 1990. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 2: 65-85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Crepidotus citrinus* Petch**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Crepidotus croceotinctus* Peck**
Distribuição: nativa; não endêmica
Crepidotus croceitinctus* Peck var. *croceotinctus
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Crepidotus croceotinctus* var. *cystidiophilus* Senn-Irlet & de Meijer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Crepidotus crocophyllus* Berk.**
Referência: Pereira, A.B. 1990. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 2: 65-85.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Crepidotus cystidiosus* Hesler & A.H. Sm.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Crepidotus epibryus* (Fr.) Quél.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Crepidotus grumosopilosus* (Berk. & Broome) Sacc.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Crinipellis

3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Crinipellis foliicola* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Crinipellis pseudostipitaria* Singer**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
***Crinipellis pseudostipitaria* var. *mesites* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Crinipellis pseudostipitaria* Singer var. *pseudostipitaria
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Crinipellis siparunae* Singer**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Crucibulum

1 espécie (1 endêmica)
***Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly**
Referência: Esposito, E. & Guerrero, R.T. 1988. Napaea 4: 1-9.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado

Cyathus

6 espécies (1 endêmica)
***Cyathus berkeleyanus* (Tul. & C.Tul.) Lloyd**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Cyathus montagnei* Tul. & C.Tul.**
Referência: Rick, J. 1961. Iheringia, Bot. 9: 451-480.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Cyathus olla* (Batsch) Pers.**
Referência: Rick, J. 1961. Iheringia, Bot. 9: 451-480.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Cyathus poeppigii* Tul. & C.Tul.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Domínio desconhecido
***Cyathus stercoreus* (Schwein.) De Toni**
Referência: Sobestiansky, G. 1988. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Cyathus striatus* (Huds.) Willd.**
Referência: Esposito, E. & Guerrero, R.T. 1988. Napaea 4: 1-9.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Cyphellostereum

1 espécie (não endêmica)
***Cyphellostereum pusiolum* (Berk. & M.A.Curtis) D.A.Reid**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Cyptotrama

1 espécie (não endêmica)
***Cyptotrama asprata* (Berk.) Redhead & Ginns**
Referência: Sobestiansky, G. 1988. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Cystoderma

1 espécie (não endêmica)
***Cystoderma austrofallax* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Dactylosporina

1 espécie (1 endêmica)
***Dactylosporina steffenii* (Rick) Dörfelt**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido

Deflexula
1 espécie (não endêmica)
***Deflexula subsimplex* (Henn.) Corner**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Dennisiomyces
1 espécie (não endêmica)
***Dennisiomyces glabrescentipes* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Descomyces
1 espécie (não endêmica)
***Descomyces albellus* (Massee & Rodway) Bougher & Castellano**
Referência: Cortez, V.G. et al. 2008. Hoehnea 35: 513-518.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

Disciseda
1 espécie (1 endêmica)
***Disciseda subterranea* (Peck) Coker & Couch**
Referência: Rick, J. 1961. Iheringia, Bot. 9: 451-480.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Entoloma
9 espécies (1 endêmica)
***Entoloma bakeri* Dennis**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Entoloma bloxamii* (Berk. & Broome) Sacc.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Entoloma cystidiophorum* Dennis**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Entoloma machielli* de Meijer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Entoloma murrayi* (Berk. & M.A.Curtis) Sacc.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Entoloma obtusisporum* H. Horak**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Entoloma pruinatocutis* E. Horak**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Entoloma silvae-araucariae* de Meijer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; S ul (PR); Mata Atlântica
***Entoloma tympaniferum* (E.Horak) J.Putzke & M.T.L.Putzke**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Favolaschia
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Favolaschia aurantiaca* Singer**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Favolaschia cinnabarina* (Berk. & M.A.Curtis) Pat.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Favolaschia intermedia* (Berk. & M.A. Curtis) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Favolaschia rubra* (Bres.) Pat.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Filoboletus
1 espécie (1 endêmica)
***Filoboletus gracilis* (Klotzsch *ex* Berk.) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná 418.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Fistulina
1 espécie (não endêmica)
***Fistulina hepatica* (Schaeff.) With**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

Galerina
7 espécies (1 endêmica)
***Galerina minor* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Galerina montivaga* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Galerina nana* (Petri) Kühner**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Galerina physospora* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Galerina recedens* (Singer) E.Horak**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Galerina stylifera* (G.F.Atk.) A.H.Sm. & Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Galerina velutipes* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Gerronema
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Gerronema cyathiforme* (Berk. & M.A.Curtis) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Gerronema infundibuliforme* Singer**
Voucher: Singer, R. F1350g (BAFC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Gerronema tenue* Dennis**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Gloiocephala
1 espécie (não endêmica)
***Gloiocephala longifimbriata* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Gymnopilus
6 espécies (1 endêmica)
***Gymnopilus earlei* Murrill**
Referência: Cortez, V.G. & Coelho, G. 2005. Inheringia, série Botânica 60: 69-75.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Gymnopilus imperialis* (Speg.) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Gymnopilus peliolepsis* (Speg.) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Gymnopilus pyrrhum* (Berk. & M.A.Curtis) B.J.Rees**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Gymnopilus russipes* Pegler**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Gymnopilus subtropicus* Hesler**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Gymnopus
1 espécie (não endêmica)
***Gymnopus subaquosus* de Meijer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Hohenbuehelia
3 espécies (1 endêmica)
***Hohenbuehelia angustata* (Berk.) Singer**
Referência: Putzke, J. & Cavalcanti, M.A. 1995. Cadernos de Pesquisa, série Botânica 7: 3-106.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Hohenbuehelia petalodes* (Bull.) Schulzer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Hohenbuehelia silvae-araucariae* de Meijer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Hydropus
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Hydropus amarus* de Meijer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hydropus cavipes* (Pat. & Gaillard) Dennis**
Referência: Pegler, D.N. 1997. The Agarics of São Paulo, Brazil 25.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Hydropus corneri* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hydropus mycenoides* (Dennis) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Hygroaster

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hygroaster albellus* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Hygroaster nodulisporus* (Dennis) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Hygrocybe

12 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Hygrocybe arnoldsii* de Meijer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hygrocybe conica* (Schaeff.) P.Kumm.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná 418.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Hygrocybe hypohaemacta* (Corner) Pegler**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hygrocybe magnifica* de Meijer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hygrocybe melleofusca* Lodge & Pegler**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hygrocybe occidentalis* (Dennis) Pegler**
Distribuição: nativa; não endêmica
Hygrocybe occidentalis* (Dennis) Pegler var. *occidentalis
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Hygrocybe parvula* (Peck) Pegler**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Hygrocybe psittacina* (Schaeff.) P.Kumm.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hygrocybe silvae-araucariae* de Meijer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hygrocybe subflavida* (Murrill) Pegler**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hygrocybe troyana* (Murrill) Courtec.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hygrocybe viridis* Capelari & Maziero**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Hypholoma

2 espécies (1 endêmica)
***Hypholoma ericaeum* (Pers.) Kühner**
Referência: Silva, P.S. et al. 2006. Mycotaxon 97: 219-229.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Hypholoma subviride* (Berk. & M.A.Curtis) Dennis**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná 418.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Inocybe

1 espécie (não endêmica)
***Inocybe curvipes* P. Karst.**
Referência: Cortez, V.G. & Coelho, G. 2005. Inheringia, série Botânica 60: 69-75.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Laccaria

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Laccaria fraterna* (Cooke & Massee) Pegler**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Laccaria proxima* (Boud.) Pat.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Laccaria tetraspora* Singer**
Referência: Singer, R. 1953. Lilloa 26: 57-159.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Lacrymaria
1 espécie (não endêmica)
***Lacrymaria hypertropicalis* (Guzmán et al.) Cortez**
Referência: Cortez, V.G. & Coelho, G. 2005.
Mycotaxon 93: 129-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

Lactocollybia
1 espécie (não endêmica)
***Lactocollybia aurantiaca* Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná 418.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);
Domínio desconhecido

Langermannia
1 espécie (1 endêmica)
***Langermannia bicolor* (Lév.) Demoulin & Dring**
Referência: Homrich, M.H. & Wright, J.E. 1973.
Mycologia 65: 779-794.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

Lentinula
1 espécie (não endêmica)
***Lentinula boryana* (Berk. & Mont.) Pegler**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Lepiota
10 espécies (1 endêmica)
***Lepiota abruptibulba* Murrill**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); Mata Atlântica
***Lepiota citrophylla* (Berk. & Broome) Sacc.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Lepiota glabella* (Speg.) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica
***Lepiota guatopoensis* Dennis**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Lepiota hemisclera* (Berk. & M.A.Curtis) Sacc.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Domínio desconhecido
***Lepiota metulispora* (Berk. & Broome) Sacc.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica
***Lepiota murinocapitata* Dennis**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lepiota phaeosticta* Morgan**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lepiota pseudoignicolor* Dennis**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);
Domínio desconhecido
***Lepiota silvae-araucariae* de Meijer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica

Leratiomyces
1 espécie (não endêmica)
***Leratiomyces ceres* (Cooke & Massee) Spooner & Bridge**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives
of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

Leucoagaricus
6 espécies (2 endêmicas)
***Leucoagaricus erythrellus* (Speg.) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica
***Leucoagaricus gongylophorus* (Möller) Singer**
Referência: Spielmann, A.A. & Pultzke, J. 1998.
Cadernos de Pesquisa, série Botânica 10: 27-36.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Leucoagaricus lilaceus* Singer**
Referência: Rother, M.S. & Silveira, R.M.B. 2008.
Revista Brasileira de Biociências 6: 259-268.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Leucoagaricus rubrotinctus* (Peck) Singer**
Referência: Rother, M.S. & Silveira, R.M.B. 2008.
Revista Brasileira de Biociências 6: 259-268.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Leucoagaricus serenus* (Fr.) Bon & Boiffard**
Referência: Rother, M.S. & Silveira, R.M.B. 2008.
Revista Brasileira de Biociências 6: 259-268.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Leucoagaricus viridiflavoides* Akers & S.A.Angels**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica

Leucocoprinus
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Leucocoprinus birnbaumii* (Corda) Singer**
Referência: Rother, M.S. & Silveira, R.M.B. 2008. Revista Brasileira de Biociências 6: 259-268.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Leucocoprinus brebissonii* (Godey) Locq.**
Referência: Rother, M.S. & Silveira, R.M.B. 2008. Revista Brasileira de Biociências 6: 259-268.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Leucocoprinus cepistipes* (Sowerby) Pat.**
Referência: Rother, M.S. & Silveira, R.M.B. 2008. Revista Brasileira de Biociências 6: 259-268.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Leucocoprinus cretaceus* (Bull.) Locq.**
Referência: Rother, M.S. & Silveira, R.M.B. 2008. Revista Brasileira de Biociências 6: 259-268.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Leucocoprinus fragilissimus* (Rav.) Pat.**
Referência: Rother, M.S. & Silveira, R.M.B. 2008. Revista Brasileira de Biociências 6: 259-268.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Lycoperdon
5 espécies (1 endêmica)
***Lycoperdon juruense* Henn.**
Referência: Rick, J. 1961. Iheringia, Bot. 9: 451-480.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Lycoperdon marginatum* Vittad.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Lycoperdon perlatum* Pers.**
Referência: Cortez, V.G. et al. 2008. Revista Brasileira de Biociências 6: 291-299.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Lycoperdon pratense* Pers.**
Referência: Cortez, V.G. et al. 2008. Revista Brasileira de Biociências 6: 291-299.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Lycoperdon pseudogemmatum* Speg.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Lyophyllum
1 espécie (não endêmica)
***Lyophyllum decastes* (Fr.) Singer**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Macrolepiota
1 espécie (não endêmica)
***Macrolepiota pulchella* Meijer & Vellinga**
Referência: Vellinga, E.C. Yang, Z.L. 2003. Mycotaxon 85: 183-186.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

Marasmius
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Marasmius amazonicus* Henn.**
Voucher: Oliveira, J.J.S. s.n. (UFRN 251)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Nordeste (RN); Mata Atlântica
***Marasmius berteroi* (Lév.) Murrill**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

Melanotus
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Melanotus alpiniae* (Berk.) Pilát**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Melanotus horizontalis* (Bull.) P.D.Orton**
Referência: Cortez, V.G. & Coelho, G. 2004. Mycotaxon 89: 355-378.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Montagnea
1 espécie (não endêmica)
***Montagnea haussknechtii* Rab.**
Referência: Baseia, I.G. & Milanez, A.I. 2002. Acta botanica 16: 311-315.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Morganella
3 espécies (1 endêmica)
***Morganella benjaminii* (Rick) Cortez**
Referência: Cortez, V.G. et al. 2007. Mycotaxon 102: 425-429.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Morganella fuliginea* (Berk. & M.A.Curtis) Kreisel & Dring**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Morganella pyriformis* (Schaeff.) Kreisel & D.Krüger**
Referência: Rick, J. 1961. Iheringia, Bot. 9: 451-480.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Mucronella
1 espécie (não endêmica)
***Mucronella calva* (Alb. & Schwein.) Fr.**
Referência: Capelari, M. & Maziero, R. 1998. Hoehnea 15: 28-36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia, Mata Atlântica

Mycena
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Mycena austinii* (Peck) Kühner**
Referência: Maas Geesteranus, R.A. & Meijer, A.A.R. 1997. Mycena Paranaenses. Koni Ned. Akad. Wet Verh. Afd. Nad. II 97: 1-164
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Mycena filopes* (Bull.) P.Kumm.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Mycena globulispora* Maas Geest. & de Meijer**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Mycena paranaensis* Maas Geest. & de Meijer**
Voucher: Meijer, A.A.R. 990.200 (L, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Mycena tapeina* Maas Geest. & de Meijer**
Voucher: Meijer, A.A.R. PAC 2774 (L, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Neoclitocybe
1 espécie (não endêmica)
***Neoclitocybe byssiseda* (Bres.) Singer**
Referência: Sobestiansky, G. 2005 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Nidularia
1 espécie (não endêmica)
***Nidularia pulvinata* (Schwein.) Fr.**
Referência: Baseia, I.G. & Milanez, A.I. 2002. Revista Brasil. Bot. 24: 479-481.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado

Oudemansiella
1 espécie (não endêmica)
***Oudemansiella platensis* (Speg.) Speg.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Panaeolus
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Panaeolus antillarum* (Fr.) Dennis**
Referência: Sobestiansky, G. 2005 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Panaeolus cinctulus* (Bolton) Sacc.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Panaeolus papilionaceus* (Bull.) Quél.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Pholiota
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pholiota limonella* (Peck) Sacc.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Pholiota spumosa* (Fr.) Singer**
Referência: Cortez, V.G. & Coelho, G. 2003. Biociências 11: 133-136.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

Pleurotus
2 espécies (1 endêmica)
***Pleurotus djamor* (Rumph. *ex* Fr.) Boedijn**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Pleurotus rickii* Bres.**
Referência: Singer, R. 1952. Lilloa 25: 5-461.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido

Pluteus
6 espécies (1 endêmica)
***Pluteus albostipitatus* (Dennis) Singer**
Referência: Pegler, D.N. 1997. The Agarics of São Paulo, Brazil 68.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Pluteus aquosus* Singer**
Referência: Wartchow, F. et al. 2006. Mycotaxon 96: 241-252.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Pluteus beniensis* Singer**
Referência: Wartchow, F. et al. 2006. Mycotaxon 96: 241-252.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Pluteus globiger* Singer**
Referência: Wartchow, F. et al. 2006. Mycotaxon 96: 241-252.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Pluteus nigrolineatus* Murrill**
Referência: Wartchow, F. et al. 2006. Mycotaxon 96: 241-252.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Pluteus thomsonii* (Berk. & Broome) Dennis**
Referência: Wartchow, F. et al. 2006. Mycotaxon 96: 241-252.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Podaxis
1 espécie (não endêmica)
***Podaxis pistillaris* (L.) Fr.**
Referência: Baseia, I.G. & Galvão, T.C.O. 2003. Acta botanica 16: 1-8.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Psathyrella
1 espécie (não endêmica)
***Psathyrella coprinoceps* (Berk. & M.A.Curtis) Dennis**
Referência: Cortez, V.G. & Coelho, G. 2005.
Iheringia, Bot. 60: 69-75.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

Pseudogymnopilus
1 espécie (não endêmica)
***Pseudogymnopilus pampeanus* (Speg.) Raithelh.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives
of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

Ripartitella
1 espécie (não endêmica)
***Ripartitella brasiliensis* (Speg.) Singer**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives
of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

Schizophyllum
1 espécie (não endêmica)
***Schizophyllum commune* Fr.**
Referência: Capelari, M. & Maziero, R. 1988.
Hoehnea 15: 28-36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO),
Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (SP), Sul (SC);
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Setchelliogaster
1 espécie (não endêmica)
***Setchelliogaster tenuipes* (Setchell) Pouzar**
Referência: Cortez, V.G. et al. 2008. Hoehnea 35: 513-518.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Stropharia
11 espécies (2 endêmicas)
***Stropharia acanthocystis* Cortez & R.M.Silveira**
Referência: Cortez, V.G. & Silveira, R.M.B. 2008.
Fungal Diversity 32: 31-57.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Stropharia aeruginosa* (Curtis) Quél.**
Referência: Cortez, V.G. & Silveira, R.M.B. 2008.
Fungal Diversity 32: 31-57.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Stropharia alcis* Kytöv.**
Referência: Cortez, V.G. & Silveira, R.M.B. 2008.
Fungal Diversity 32: 31-57.
Distribuição: nativa; não endêmica; Mata Atlântica
***Stropharia apiahyna* (Speg.) Cortez & R.M. Silveira**
Referência: Cortez, V.G. & Silveira, R.M.B. 2008.
Fungal Diversity 32: 31-57.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Stropharia araucariae* Cortez & R.M.Silveira**
Referência: Cortez, V.G. & Silveira, R.M.B. 2008.
Fungal Diversity 32: 31-57.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Stropharia coronilla* (Bull.) Quél.**
Referência: Cortez, V.G. & Silveira, R.M.B. 2008.
Fungal Diversity 32: 31-57.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Stropharia dorsipora* Esteve-Rav. & Barrasa**
Referência: Cortez, V.G. & Silveira, R.M.B. 2008.
Fungal Diversity 32: 31-57.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Stropharia earlei* Norvell & Redhead**
Referência: Cortez, V.G. & Silveira, R.M.B. 2008.
Fungal Diversity 32: 31-57.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Stropharia melanosperma* (Bull.) Gillet**
Referência: Cortez, V.G. & Coelho, G. 2008.
Boletín de la Sociedad Micologica de Madrid 32: 31-37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Stropharia rugosoannulata* Farl. *ex* Murrill**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives
of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Stropharia semiglobata* (Batsch) Quél.**
Referência: Cortez, V.G. & Silveira, R.M.B. 2008.
Fungal Diversity 32: 31-57.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

Tetrapyrgos
1 espécie (1 endêmica)
***Tetrapyrgos nigripes* (Schwein.) E. Horak**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives
of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Tulostoma
13 espécies (2 endêmicas)
***Tulostoma beccarianum* Bresad.**
Referência: Baseia, I.G. & Milanez, A.I. 2002.
Acta botanica 16: 311-315.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Tulostoma brasiliense* J.E.Wright**
Referência: Wright, J.E. 1987. Biblioth. Mycol. 113.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Tulostoma brumale* Pers.**
Referência: Baseia, I.G. & Milanez, A.I. 2002.
Acta botanica 16: 311-315.
Distribuição: nativa; não endêmica; Cerrado
***Tulostoma cretaceum* Long**
Referência: Silva, B.D.B. et al. 2007. Mycotaxon 101: 47-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio
desconhecido
***Tulostoma cyclophorum* Lloyd**
Referência: Wright, J.E. 1987. Biblioth. Mycol. 113.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN),
Sul (RS); Mata Atlântica
***Tulostoma dumeticola* Long**
Referência: Wright, J.E. 1987. Biblioth. Mycol. 113.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tulostoma exasperatum* Mont.**
Referência: Baseia, I.G. & Milanez, A.I. 2002.
Acta botanica 16: 9-14.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB),
Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado

***Tulostoma excentricum* Long**
Referência: Silva, B.D.B. et al. 2007. Mycotaxon 101: 47-54.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Tulostoma fimbriatum* Fr.**
Referência: Silva, B.D.B. et al. 2007. Mycotaxon 101: 47-54.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (RN); Mata Atlântica
***Tulostoma obesum* Cooke & Ellis**
Referência: Silva, B.D.B. et al. 2007. Mycotaxon 101: 47-54.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PB); Mata Atlântica
***Tulostoma rickii* Lloyd**
Referência: Wright, J.E. 2008. Biblioth. Mycol. 113.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica
***Tulostoma striatum* G. Cunn.**
Referência: Wright, J.E. 1987. Biblioth. Mycol. 113.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tulostoma xerophilum* Long**
Referência: Silva, B.D.B. et al. 2007. Mycotaxon 101: 47-54.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica

Vascellum
1 espécie (não endêmica)
***Vascellum hyalinum* Homrich**
Referência: Homrich, M.H. & Wright, J.E. 1988.
Canad. J. Bot. 66: 1285-1307.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

Volvariella
1 espécie (não endêmica)
***Volvariella bombycina* (Schaeff.) Singer**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives
of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

Xeromphalina
1 espécie (não endêmica)
***Xeromphalina tenuipes* (Schwein.) A.H.Sm.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives
of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

Xerula
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Xerula radicata* (Relhan) Dörfelt**
Referência: Putzke, J. & Pereira, A.B. 1988.
Cadernos de Pesquisa, série Botânica 1: 47-69.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica
***Xerula setulosa* (Murrill) R.H.Petersen & T.J.Baroni**
Referência: Putzke, J. & Pereira, A.B. 1988.
Cadernos de Pesquisa, série Botânica 1: 47-69.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

ATHELIALES
Tatiana B. Gibertoni, Marcela Eugenia da Silva Cáceres, Juliano M. Baltazar
6 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica)

Amphinema
1 espécie (não endêmica)
***Amphinema byssoides* (Pers.) J.Erikss.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009.
Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

Athelia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Athelia arachnoidea* (Berk.) Jülich**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009.
Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica
***Athelia rolfsii* (Curzi) C.C.Tu & Kimbr.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009.
Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

Athelopsis
1 espécie (não endêmica)
***Athelopsis crystallifera* (Rick) Hjortstam**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009.
Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS);
Mata Atlântica

Byssoporia
1 espécie (não endêmica)
***Byssoporia terrestris* (DC.) M.J.Larsen & Zak**
Referência: Gibertoni, T.B. & Drechsler-Santos,
R.E. 2010. Mycotaxon 111: 87-90.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Cerrado, Mata Atlântica

Dictyonema
1 espécie (não endêmica)
***Dictyonema phyllogenum* (Müll. Arg.) Zahlbr.**
Referência: Caceres, M.E.S. 2007. Corticolous Crustose
and Microfoliose Lichens of Northeastern Brazil 168p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica

Melzericium
1 espécie (não endêmica)
***Melzericium rimosum* Bononi & Hjortstam**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009.
Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP);
Mata Atlântica

AURICULARIALES

Clarice Loguercio Leite, Marisa Campos Santana

11 gêneros, 28 espécies (nenhuma endêmica),
1 variedade (não endêmica)

Auricularia

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Auricularia delicata* (Fr.) Henn.**
Referência: Capelari, M. & Maziero, R. 1988. Hoehnea 15: 28-36.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Auricularia fuscosuccinea* (Mont.) Henn.**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Auricularia mesenterica* (Dicks.) Pers.**
Referência: Góes-Neto, A. & Baseia, I.G. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 141-159.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Auricularia polytricha* (Mont.) Sacc.**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Basidiodendron

1 espécie (não endêmica)

***Basidiodendron luteogriseum* Rick**
Referência: Rick, J. 1938. Broteria Ci. Nat. 7: 74.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Elmerina

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Elmerina caryae* (Schwein.) D.A.Reid**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Elmerina dimidiata* (A.David) D.A.Reid**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Exidia

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Exidia maracensis* Lowy**
Referência: Lowy, B. 1987. Mycotaxon 89: 13.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Exidia nucleata* (Schw.) Burt**
Referência: Lowy, B. 1987. Mycotaxon 89: 18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Exidia parvula* Rick**
Referência: Rick, J. 1958. Iheringia, Bot. 3: 34.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Exidia vitrea* Rick**
Referência: Rick, J. 1958. Iheringia, Bot. 2: 34.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Exidiopsis

6 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Exidiopsis albopruinata* Rick**
Referência: Rick, J. 1958. Iheringia, Bot. 2: 33.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Exidiopsis cartilaginea* Rick**
Referência: Rick, J. 1958. Iheringia, Bot. 2: 33.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Exidiopsis fuliginea* Rick**
Referência: Rick, J. 1906. Broteria, Ser. Bot. 5: 8.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Exidiopsis moelleri* Rick**
Referência: Rick, J. 1933. Egatea 18: 344.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Exidiopsis rufula* Rick**
Referência: Rick, J. 1958. Iheringia, Bot. 2: 33.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Exidiopsis tremellispora* Möller**
Distribuição: subespontânea; não endêmica

***Exidiopsis tremellispora* var. *macrospora* Rick**
Referência: Rick, J. 1958. Iheringia, Bot. 2: 32.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Heterochaete

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Heterochaete bodmany* Lowy**
Referência: Lowy, B. 1987. Mycotaxon 89: 15.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Heterochaete brasiliensis* Bodman**
Referência: Bodman, M. C. 1953. Lloydia 14(4): 210.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Heterochaete delicatula* Rick**
Referência: Rick, J. 1933. Egatea 18: 286.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Heterochaete sanctae-catharinae* Möller**
Referência: Saccardo, P.A. 1910. Syll. Fung. 19: 864.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

Heterochaetella

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Heterochaetella alba* Rick**
Referência: Rick, J. 1933. Iheringia, Bot. 2: 42.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Heterochaetella cystidiophora* Lowy**
Referência: Lowy, B. 1987. Mycotaxon 89: 18.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Heterochaetella ochracea* Viégas**
Referência: Viégas, A.P. 1945. Bragantia 5: 241.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Domínio desconhecido

Protograndinia
1 espécie (não endêmica)
***Protograndinia cinerea* Rick**
Referência: Rick, J. 1933. Egatea 18: 213.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (RS); Domínio desconhecido

Protohydnum
1 espécie (não endêmica)
***Protohydnum cartilagineum* Möller**
Referência: Saccardo, P.A. 1911. Syll. Fung. 20: 523.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (SC); Domínio desconhecido

Protomerulius
1 espécie (não endêmica)
***Protomerulius substuppeus* (Berk. & Cooke) Ryvarden**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008.
Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (SC); Mata Atlântica

Protoradulum
1 espécie (não endêmica)
***Protoradulum ceraceovitreum* Rick**
Referência: Rick, J. 1933. Egatea 18: 348.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (RS); Domínio desconhecido

BOLETALES
Maria Alice Neves, Clarice Loguercio Leite, Marisa Campos Santana
25 gêneros, 86 espécies (30 endêmicas),
5 variedades (4 endêmicas)

Austroboletus
4 espécies (3 endêmicas)
***Austroboletus festivus* (Singer) Wolfe**
Voucher: Singer, R. B3384 (LIL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),
Sul (PR); Mata Atlântica
***Austroboletus graciliaffinis* Singer**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007.
Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Austroboletus olivaceus* Singer**
Voucher: Singer, R. B11323 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Austroboletus rionegrensis* (Singer & Araujo) Sing.**
Voucher: Singer, R. B12088 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Battarrea
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Battarrea phalloides* (Dicks.) Pers**
Referência: Silva, B.D.B. et al. 2007. Acta botanica 21: 624.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Battarrea stevenii* (Libosch) Fr.**
Referência: Silva, B.D.B. et al. 2007. Acta botanica 21: 624.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga

Boletellus
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Boletellus ananas* (M.A.Curtis) Murrill**
Voucher: Singer, R. B10913 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Boletellus lepidospora* E.-J.Gilbert *ex* Heinem.**
Voucher: Oliveira, I.C. 6891 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PB); Mata Atlântica
***Boletellus pustulatus* (Beeli) E.-J.Gilbert**
Voucher: Oliveira, I.C. 6896 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PB); Mata Atlântica

Boletinellus
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Boletinellus exiguus* (Singer & Digilio) Watling**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007.
Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica
***Boletinellus rompelii* (Pat. & Rick) Watling**
Voucher: Fidalgo, O. 48186 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Boletus
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Boletus calopus* Pers**
Voucher: Rick, J. s.n. (FH)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica
***Boletus edulis* Bull.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives
of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Boletus panormitanus* Inzenga**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007.
Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Boletus spadiceus* Schaeff.**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007.
Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Calostoma
2 espécies (1 endêmica)
***Calostoma cinnabarinum* Corda**
Referência: Baseia, I.G. et al. 2007. Acta botanica 21: 278.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Calostoma zanchianum* (Rick) Baseia & Calonge**
Referência: Baseia, I.G. et al. 2007. Acta botanica 21: 278.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

Chalciporus
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Chalciporus piperatus* (Bull.) Bataille**
Voucher: Oliveira, I.C. 6909 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PB), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Chalciporus trinitensis* (Heinem.) Singer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chalciporus trinitensis* (Heinem.) Singer var. *trinitensis
Voucher: Singer, R. B11434 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Durosaccum
1 espécie (não endêmica)
***Durosaccum pisiforme* Lloyd**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. & Baseia, I.G. 2009.
Mycotaxon 108: 23.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica

Fistulinella
2 espécies (1 endêmica)
***Fistulinella campinaranae* Singer**
Voucher: Singer, R. B10109 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Fistulinella violaceipora* (G.Stev.) Pegler & T.W.K.Young**
Voucher: Oliveira, I.C. 6912 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB);
Mata Atlântica

Gyrodon
3 espécies (1 endêmica)
***Gyrodon adisianus* Singer**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007.
Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 167.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
G***yrodon cupreus* Heinem.**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007.
Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Gyrodon proximus* Singer**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007.
Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PB); Mata Atlântica

Gyroporus
1 espécie (não endêmica)
***Gyroporus castaneus* (Bull.) Quél.**
Voucher: Singer, R. B11497 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste, Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

Neopaxillus
1 espécie (não endêmica)
***Neopaxillus echinospermus* (Speg.) Singer**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007.
Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Paxillus
3 espécies (2 endêmicas)
***Paxillus guttatus* Singer**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007.
Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE);
Mata Atlântica
***Paxillus involutus* (Batsch) Fr.**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007.
Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica
***Paxillus scleropus* Rick**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007.
Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Phlebopus
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Phlebopus beniensis* (Singer & Digilio)**
Heinem. & Rammeloo
Voucher: Oliveira, I.C. 6969 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB),
Sul (PR); Mata Atlântica
***Phlebopus brasiliensis* Singer**
Voucher: Singer, R. B12098 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (PB); Amazônia, Mata Atlântica
***Phlebopus braunii* (Bres.) Heinem.**
Referência: Putzke, J. & Pereira, A.B. 1994.
Cadernos de Pesquisa, série Botânica 6: 75-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Phlebopus harleyi* Heinem. & Rammeloo**
Voucher: Oliveira, I.C. 6951 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PB); Mata Atlântica
***Phlebopus portentosus* (Berk. & Broome) Boedijn**
Voucher: Oliveira, I.C. 6916 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PB); Mata Atlântica
***Phlebopus tropicus* (Rick) Heinem. & Rammeloo**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007.
Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

Phyllobolites
1 espécie (1 endêmica)
***Phyllobolites miniatus* (Rick) Singer**
Voucher: Singer, R. B11333 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sul (RS);
Amazônia, Mata Atlântica

Phylloporus
5 espécies (5 endêmicas)
***Phylloporus flavipes* Rick**
Referência: Neves, M.A. 2010. Mycologia In Press.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Phylloporus gymnocystis* Singer**
Voucher: Singer, R. B11310 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phylloporus manausensis* Singer**
Voucher: Singer, R. B10587 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phylloporus pratensis* Rick**
Referência: Neves, M.A. 2010. Mycologia In Press.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Phylloporus viridis* (Berk.) Singer**
Referência: Neves, M.A. 2010. Mycologia In Press.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pisolithus

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Pisolithus albus* (Cooke & Massee) Priest**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1170.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Pisolithus arhizus* (Scop.) Rauschert**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. & Baseia, I.G. 2009. Mycotaxon 108: 23.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Pisolithus microcarpus* (Cooke & Massee) G.Cunn.**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1170.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Pisolithus pisoformis* (Lloyd) Rick**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. & Baseia, I.G. 2009. Mycotaxon 108: 24.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica

Pulveroboletus

2 espécies (2 endêmicas)
***Pulveroboletus duckeanus* Singer**
Voucher: Singer, R. B11247 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pulveroboletus roseamariae* Singer**
Voucher: Singer, R. B11458 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Rhizopogon

5 espécies (1 endêmica)
***Rhizopogon fuscorubens* A.H. Sm.**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1170.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Rhizopogon luteolus* Fr. & Nordholm**
Referência: Baseia, I.G. & Milanez, A.I. 2002. Mycotaxon 84: 23.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Rhizopogon nigrescens* Coker & Couch**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1170.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Rhizopogon roseolus* (Corda) Th. Fr.**
Referência: Baseia, I.G. & Milanez, A.I. 2002. Mycotaxon 84: 23.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado
***Rhizopogon zelleri* A.H. Sm.**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1170.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

Sclerangium

1 espécie (não endêmica)
***Sclerangium brasiliense* Henn.**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. & Baseia, I.G. 2009. Mycotaxon 108: 24.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Scleroderma

14 espécies (1 endêmica)
***Scleroderma albidum* Pat. & Trab.**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1170.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Scleroderma areolatum* Ehrenb.**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1170.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Scleroderma bougheri* Trappe et al.**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1170.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Scleroderma bovista* Fr.**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1170.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Scleroderma cepa* Pers.**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1170.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Scleroderma citrinum* Pers.**
Referência: Giachini, A.J. 2000. Mycologia 92: 1170.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido
***Scleroderma floridanum* Guzmán**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1171.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Scleroderma nitidum* Berk.**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. & Baseia, I.G. 2009. Mycotaxon 108: 24.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA); Mata Atlântica
***Scleroderma polyrhizon* (J.F.Gmel.) Pers.**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. & Baseia, I.G. 2009. Mycotaxon 108: 25.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Scleroderma stellatum* Berk.**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. & Baseia, I.G. 2009. Mycotaxon 108: 25.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Domínio desconhecido
***Scleroderma tenerum* Berk. & Curt.**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. & Baseia, I.G. 2009. Mycotaxon 108: 25.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Domínio desconhecido
***Scleroderma tuberoideum* Speg.**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. & Baseia, I.G. 2009. Mycotaxon 108: 25.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Scleroderma uruguayense* (Guzmán) Guzmán**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1171.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Scleroderma verrucosum* (Bull.) Pers.**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1171.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Strobilomyces
1 espécie (1 endêmica)
***Strobilomyces pauper* Singer**
Voucher: Singer, R. B10915 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Suillus
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Suillus cothurnatus* Singer**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007. Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Suillus granulatus* (L.) Roussel**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007. Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Suillus luteus* (L.) Roussel**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007. Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Suillus subaureus* (Peck) Snell**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007. Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Tylopilus
3 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Tylopilus acutesquamosus* Singer**
Voucher: Singer, R. B11483 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tylopilus arenarius* Singer**
Voucher: Singer, R. B10590 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tylopilus potamogeton* Singer**
Distribuição: nativa; endêmica
***Tylopilus potamogeton* var. *aquarius* Singer**
Voucher: Singer, R. B12052 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Tylopilus potamogeton* Singer var. *potamogeton
Voucher: Singer, R. B11443 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Xerocomus
10 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Xerocomus amazonicus* Singer**
Distribuição: nativa; endêmica
Xerocomus amazonicus* Singer var. *amazonicus
Voucher: Singer, R. B10360 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xerocomus amazonicus* var. *obscuratus* Singer & I.J.Araujo**
Voucher: Singer, R. B11451 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xerocomus brasiliensis* (Rick) Singer**
Voucher: Singer, R. F641 (FH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Xerocomus campinaranae* Singer**
Voucher: Singer, R. B10917 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xerocomus chapinii* Singer**
Voucher: Singer, R. B12027 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xerocomus coccolobae* Pegler**
Referência: Neves, M.A. & Capelari, M. 2007. Sitientibus Sér. Ci. Biol. 7: 163-169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Xerocomus globuliger* Singer**
Voucher: Singer, R. B11015 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xerocomus hypoxanthus* Singer**
Voucher: Singer, R. F625 (FH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Xerocomus inundabilis* Singer**
Voucher: Singer, R. B11432 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xerocomus radicicola* Singer & I.J. Araujo**
Voucher: Araújo, I. 916 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xerocomus scrobiculatus* Singer**
Voucher: Singer, R. B10856 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

CANTHARELLALES
Tatiana B. Gibertoni, Juliano M. Baltazar, Allyne Christina Gomes Silva, Rosa Mara Borges da Silveira
9 gêneros, 22 espécies (6 endêmicas)

Aphelaria
1 espécie (não endêmica)
***Aphelaria deflectens* (Bres.) Corner**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

Botryobasidium
5 espécies (1 endêmica)
***Botryobasidium bondarcevii* (Parmasto) G.Langer**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Botryobasidium curtisii* Hallenb.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Botryobasidium obtusisporum* J. Erikss.**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 319-322.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Botryobasidium pteridophytorum* Rick**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Botryobasidium subcoronatum* (Höhn. & Litsch.) Donk**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Cantharellus
1 espécie (não endêmica)
***Cantharellus guyanensis* Mont.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Ceratoporia
1 espécie (1 endêmica)
***Ceratoporia perplexa* Ryvarden & de Meijer**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Clavulina
7 espécies (4 endêmicas)
***Clavulina cartilaginea* (Berk. & M.A.Curtis) Corner**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Clavulina connata* (Berk.) Corner**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 319-322.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clavulina coralloides* (L.) J.Schröt.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Clavulina delicia* (Berk.) Corner**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Clavulina floridana* (Singer) Corner**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Clavulina panurensis* (Berk.) Corner**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: subespontânea; endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Clavulina sprucei* (Berk.) Corner**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 319-322.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Multiclavula
1 espécie (não endêmica)
***Multiclavula clara* (Berk. & M.A.Curtis) R.H. Petersen**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Scotomyces
1 espécie (não endêmica)
***Scotomyces subviolaceus* (Peck) Jülich**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Sistotrema
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Sistotrema brinkmanii* (Bres.) J. Erikss.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Sistotrema niveocremeum* (Höhn. & Litsch.) J.Erikss.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Sistotrema subtrigonopermum* D.P. Rogers**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Thanatephorus
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Thanatephorus biapiculatus* (D.P. Rogers) P. Roberts**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Thanatephorus ochraceus* (Massee) P. Roberts**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

CORTICIALES
Tatiana B. Gibertoni, Elisandro Ricardo Drechsler-Santos, Rosa Mara Borges da Silveira, Allyne Christina Gomes Silva, Juliano M. Baltazar
4 gêneros, 10 espécies (1 endêmica)

Corticium
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Corticium ceraceum* Berk. & Curt.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Corticium cinereocarneum* Henn.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Corticium macrosporopsis* Jülich**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Corticium roseocarneum* (Schwein.) Hjortstam**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Corticium subcontinuum* Berk. & Curt.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Corticium subochraceum* Bres.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Cytidia
2 espécies (1 endêmica)
***Cytidia conspersa* Rick**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Cytidia cornea* Lloyd**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Dendrothele
1 espécie (não endêmica)
***Dendrothele strumosa* (Fr.) P.A. Lemke**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Vuilleminia
1 espécie (não endêmica)
***Vuilleminia comedens* (Nees) Maire**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 319-322.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

DACRYMYCETALES
Rosa Mara Borges da Silveira
2 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Dacryopinax
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Dacryopinax dennisii* McNabb**
Referência: Bononi, V.L.R. & Capelari, M. 1984. Rickia 11: 109-114.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Dacryopinax spathularia* (Schwein.) G.W.Martin**
Referência: Bononi, V.L.R. & Capelari, M. 1984. Rickia 11: 109-114.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Dactylospora
1 espécie (não endêmica)
***Dactylospora stygia* (Berk. & M.A. Curtis)**
Referência: Sobestiansky, G. 2005.Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

DOASSANSIALES
Dartanhã J. Soares
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Narasimhania
1 espécie (não endêmica)
***Narasimhania alismatis* Pavgi & Thirum.**
Referência: Soares, D.J. 2009. Mycologia 101: 401-416
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido

GEASTRALES
Iuri Goulart Baseia, Larissa Trierveiler Pereira, Rosa Mara Borges da Silveira, Vagner Gularte Cortez
4 gêneros, 22 espécies (nenhuma endêmica)

Astraeus
1 espécie (não endêmica)
***Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morgan**
Referência: Baseia, I.G. & Galvão, T.C.O. 2002. Acta Botanica 16: 1-8
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Sul (RS); Caatinga

Geastrum
19 espécies (nenhuma endêmica)
***Geastrum archeri* Berk.**
Voucher: Rick, J. 15990 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Geastrum asper* Lloyd**
Voucher: Rick, J. 1961 . Iheringia 9: 451-480
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Geastrum coronatum* Pers.**
Referência: Leite, A.G. et al. 2007. Mycotaxon 101: 103-111
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Geastrum elegans* Vittad.**
Referência: Leite, A.G. et al. 2007. Mycotaxon 101: 103-111
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Geastrum englerianum* Henn.**
Referência: Rick, J. 1930. Egatea 15: 19-30
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Geastrum entomophilum* Fazolino et al.**
Referência: Fazolino, E.P. et al. 2008. Mycotaxon 104: 449-453
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Nordeste (RN); Mata Atlântica
***Geastrum fenestratum* (Batsch) Lloyd**
Referência: Rick, J. 1961. Iheringia 9: 451-480
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Geastrum fimbriatum* Fr.**
Referência: Leite, A.G. et al. 2007. Mycotaxon 101: 103-111
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE), Sul (RS); Mata Atlântica
***Geastrum fornicatum* (Huds.) Hook.**
Referência: Leite, A.G. et al. 2007. Mycotaxon 101: 103-111
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Geastrum hariotii* Lloyd**
Referência: Rick, J. 1961. Iheringia 9: 451-480
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Geastrum hieronymi* Henn.**
Referência: Leite, A.G. et al. 2007.
Mycotaxon 101: 103-111
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica
***Geastrum hirsutum* Baseia & Calonge**
Referência: Baseia, I.G. & Calonge F.D. 2006.
Mycotaxon 95: 301-304
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE);
Mata Atlântica
***Geastrum minimum* Schwein.**
Referência: Rick, J. 1930. Esdea 15: 19-30
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Geastrum ovalisporum* Calonge & Mor.-Arr.**
Referência: Leite, A.G. et al. 2007.
Mycotaxon 101: 103-111
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (RN), Sul (SC); Mata Atlântica
***Geastrum saccatum* Fr.**
Referência: Rick, J. 1961.
Iheringia Serv. Bot. 9: 451-480
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB,
PE), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Geastrum schweinitzii* (Berk. & M.A.Curtis) Zeller**
Referência: Rick, J. 1930. Egatea 15: 19-30
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (SP),
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Geastrum setiferum* Baseia**
Voucher: Baseia, I.G. 206 (UFRN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PB, PE),
Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Geastrum triplex* Jungh.**
Referência: Rick, J. 1961.
Iheringia Ser. Bot. 9: 451-480
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN),
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Geastrum velutinum* Morgan**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica

Myriostoma
1 espécie (não endêmica)
***Myriostoma coliforme* (Dicks.) Corda**
Voucher: Baseia, I.G. s.n. (SP 307511)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB), Sul (SC, RS); Caatinga, Pampa

Radiigera
1 espécie (não endêmica)
***Radiigera paulensis* Singer et al.**
Referência: Singer, R. et al. 1963. Darwiniana 12(4): 598.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

GLOEOPHYLLALES
Tatiana B. Gibertoni, Juliano M. Baltazar, Allyne Christina Gomes Silva, Elisandro Ricardo Drechsler-Santos, Rosa Mara Borges da Silveira
2 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Gloeophyllum
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Gloeophyllum striatum* (Sw.) Murrill**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009.
Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (RN, PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica
***Gloeophyllum trabeum* (Pers.) Murrill**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009.
Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sul (RS); Mata Atlântica

Mycobonia
1 espécie (não endêmica)
***Mycobonia flava* (Sw.) Fr.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009.
Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Mata Atlântica

GOMPHALES
Rosa Mara Borges da Silveira
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Gomphus
1 espécie (não endêmica)
***Gomphus subclavaeformis* (Berk.) Corner**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica

Lentaria
1 espécie (não endêmica)
***Lentaria surculus* (Berk.) Corner**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos
notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica

HYMENOCHAETALES

Tatiana B. Gibertoni, Juliano M. Baltazar, Allyne Christina Gomes Silva, Elisandro Ricardo Drechsler-Santos, Clarice Loguercio Leite, Marisa Campos Santana, Rosa Mara Borges da Silveira

22 gêneros, 136 espécies (9 endêmicas)

Alutaceodontia

1 espécie (não endêmica)

***Alutaceodontia alutacea* (Fr.) Hjortstam & Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Basidioradulum

1 espécie (não endêmica)

***Basidioradulum radula* (Fr.) Nobles**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Clavariachaete

1 espécie (1 endêmica)

***Clavariachaete peckoltii* (Lloyd.) Corner**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Coltricia

7 espécies (1 endêmica)

***Coltricia barbata* Ryvarden & de Meijer**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Coltricia cinnamomea* (Jacq.) Murrill**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, SE), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Coltricia duportii* (Pat.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Coltricia focicola* (Berk. & M.A.Curtis) Murrill**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycologia submetido.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB); Mata Atlântica

***Coltricia globispora* Gomes-Silva et al.**
Voucher: Gomes-Silva, A.C. 280 (URM 79581)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Coltricia hamata* (Romell) Ryvarden**
Voucher: Gibertoni, T.B. (URM 79425)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Coltricia perennis* (L.) Murrill**
Voucher: Meijer, A.A.R. 1223 (O)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido

Coltriciella

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Coltriciella navispora* T.W.Henkel et al.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE); Mata Atlântica

***Coltriciella oblectabilis* (Lloyd) Kotl. et al.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Cyclomyces

1 espécie (não endêmica)

***Cyclomyces iodinus* (Mont.) Pat.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Dichochaete

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Dichochaete ceratophora* (D.J. Job) Parmasto**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Dichochaete setosa* (Sw.) Parmasto**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (RS); Mata Atlântica

Echinoporia

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Echinoporia aculeifera* (Berk. & M.A.Curtis) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste, Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pantanal

***Echinoporia inermis* G. Coelho**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica

Fomitiporia

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Fomitiporia maxonii* Murrill**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sul (PR); Mata Atlântica

***Fomitiporia tabaquilio* (Urcelay et al.) Decock & Robledo**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Fulvifomes
1 espécie (não endêmica)
***Fulvifomes fastuosus* (Lév.) Bondartseva & S. Herrera**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Fuscoporia
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Fuscoporia callimorpha* (Lév.) Groposo et al.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Fuscoporia flavomarginata* (Murrill) Groposo et al.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Fuscoporia rhabarbarina* (Berk.) Groposo et al.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Fuscoporia senex* (Nees & Mont.) Ghobad-Nejhad**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 319-322.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Hydnochaete
1 espécie (não endêmica)
***Hydnochaete peroxydata* (Berk. *ex* Cooke) Dennis**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Hymenochaete
26 espécies (2 endêmicas)
***Hymenochaete anomala* Burt**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hymenochaete attenuata* (Lév.) Lév.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Hymenochaete berkeleyana* (Mont.) Cooke**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Hymenochaete cacao* (Berk.) Berk. & M.A.Curtis**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Hymenochaete cervina* Berk. & Curt.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hymenochaete cinnamomea* (Pers.) Bres.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Hymenochaete corrugata* (Fr.) Lév.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Hymenochaete damicornis* (Link) Lév.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PB, PE, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Hymenochaete dura* Berk. & Curt.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Hymenochaete epichlora* (Berk. & M.A.Curtis) Cooke**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hymenochaete floridea* Berk. & Broome**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hymenochaete leonina* Berk. & Curt.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Nordeste (RN, PE, AL), Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Hymenochaete luteobadia* (Fr.) Höhn. & Litsch.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (RN, PB, PE, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Hymenochaete minuscula* G.Cunn.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Hymenochaete pinnatifida* Burt**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Hymenochaete pratensis* Viégas**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Hymenochaete proxima* Rick**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Hymenochaete reniformis* (Fr.) Lév.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Hymenochaete rhabarbarina* Massee**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Hymenochaete rheicolor* (Mont.) Lév.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Hymenochaete rigidula* Berk. & Curt.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hymenochaete rubiginosa* (Dicks.) Lév.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hymenochaete spreta* Peck**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hymenochaete tenuis* Peck**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Hymenochaete unicolor* Berk. & Curt.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Hymenochaete ustulata* G.A. Escobar *ex* J.C.Léger**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Hyphodontia

14 espécies (nenhuma endêmica)
***Hyphodontia arguta* (Fr.) J.Erikss.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hyphodontia barba-jovis* (Bull.) J.Erikss.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Hyphodontia brevidens* (Pat.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Hyphodontia crustosa* (Pers.) J.Erikss.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Hyphodontia fimbriiformis* (Berk. & M.A.Curtis) Ginns & M.N.L. Lefebvre**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hyphodontia gossypina* (Parmasto) Hjortstam**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Hyphodontia lutescens* Hjortstam & Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hyphodontia nesporii* (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Hyphodontia orasinusensis* Gilb. & M.Blackw.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hyphodontia radula* (Fr.) Langer & Vesterh.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Hyphodontia rimosissima* (Peck) Gilb.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hyphodontia sambuci* (Pers.) J.Erikss.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Hyphodontia spathulata* (Schrad.) Parmasto**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Hyphodontia tomentosa* (Berk. & M.A.Curtis) Hjortstam**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Inonotus

9 espécies (nenhuma endêmica)
***Inonotus jamaicensis* Murrill**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Inonotus luteoumbrinus* (Romell) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Inonotus micantissimus* (Rick) Rajchenb.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Inonotus patouillardii* (Rick) Imazeki**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal
***Inonotus pseudoradiatus* (Pat.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Inonotus radiatus* (Sowerby) P.Karst.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Inonotus splitgerberi* (Mont.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Inonotus tabacinus* (Mont.) G.Cunn.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Inonotus venezuelicus* Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); Mata Atlântica

Leucophellinus

1 espécie (não endêmica)
***Leucophellinus hobsonii* (Berk. *ex* Cooke) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Odontiopsis

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Odontiopsis ambigua* (Berk. & Broome) Hjortstam**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Odontiopsis hyphodontina* Hjortstam & Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Oxyporus

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Oxyporus cinnamomeus* Núñez & Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Oxyporus latemarginatus* (Durieu & Mont.) Donk**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Oxyporus obducens* (Pers.) Donk**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Oxyporus populinus* (Schumach.) Donk**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Phellinus

48 espécies (5 endêmicas)
***Phellinus allardii* (Bres.) S.Ahmad**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Phellinus apiahynus* (Speg.) Rajchenb. & J.E.Wright**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Phellinus baccharidis* (Pat.) Pat.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Phellinus bambusarum* (Rick) M.J.Larsen**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Phellinus bambusinus* (Pat.) Pat.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2008. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Phellinus calcitratus* (Berk. & M.A.Curtis) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Phellinus caryophylleus* (Cooke) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Phellinus cesatii* (Bres.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Phellinus contiguus* (Pers.) Pat.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Phellinus dependens* (Murrill) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Phellinus extensus* (Lév.) Pat.**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2009. Mycotaxon 108: 214-244.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga

***Phellinus fastuosus* (Lév.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Phellinus ferreus* (Pers.) Bourdot & Galzin**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Phellinus ferrugineovelutinus* (Henn.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (RN, PB, PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Phellinus ferruginosus* (Schrad.) Pat.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Phellinus gilvus* (Schwein.) Pat.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Phellinus grenadensis* (Murrill) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica
***Phellinus linteus* (Berk. & M.A.Curtis) Teng**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Phellinus macrosporus* Gibertoni & Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Phellinus mangrovicus* (Imazeki) Imazeki**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 319-322.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Phellinus melanodermus* (Pat.) M.Fidalgo**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Phellinus melleoporus* (Murrill) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica, Pantanal
***Phellinus membranaceus* J.E. Wright & Blumenf.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Phellinus merrillii* (Murrill) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica
***Phellinus neocallimorphus* Gibertoni & Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Phellinus nilgheriensis* (Mont.) G.Cunn.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Phellinus noxius* (Corner) G.Cunn.**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 319-322.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Phellinus palmicola* (Berk. & M.A.Curtis) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); Mata Atlântica
***Phellinus piptadeniae* Teixeira**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica
***Phellinus portoricensis* (Overh.) M.Fidalgo**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL); Mata Atlântica
***Phellinus pseudosenex* (Murrill) Bondartseva & S. Herrera**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 319-322.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Phellinus punctatiformis* (Murrill) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Phellinus punctatus* (Fr.) Pilát**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Phellinus rhytiphloeus* (Mont.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Phellinus rickii* Teixeira**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Phellinus rimosus* (Berk.) Pilát**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Phellinus robiniae* (Murrill) A. Ames**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 319-322.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Phellinus robustus* (P.Karst.) Bourdot & Galzin**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Phellinus roseocinereus* (Murrill) D.A.Reid**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Phellinus sancti-georgii* (Pat.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR); Mata Atlântica
***Phellinus sarcites* (Fr.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Phellinus shaferi* (Murrill) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (AL); Amazônia, Mata Atlântica
***Phellinus spinescens* J.E. Wright & G.Coelho**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Phellinus tropicalis* M.J. Larsen & Lombard**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Phellinus umbrinellus* (Bres.) S.Herrera & Bondarzeva**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Phellinus undulatus* (Murrill) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (AL), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Phellinus viticola* (Schwein.) Donk**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Phellinus wahlbergii* (Fr.) D.A. Reid**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Phylloporia
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Phylloporia chrysites* (Berk.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Phylloporia fruticum* (Berk. & M.A.Curtis) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Phylloporia pectinata* (Klotzsch) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Phylloporia spathulata* (Hook.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Pseudochaete
1 espécie (não endêmica)
***Pseudochaete tabacina* (Sowerby) T.Wagner & M.Fisch.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

Schizopora
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Schizopora flavipora* (Berk. & M.A.Curtis *ex* Cooke) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PB, AL), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Schizopora paradoxa* (Schrad.) Donk**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (PB, PE, AL), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

HYSTERANGIALES
Tatiana B. Gibertoni, Larissa Trierveiler Pereira, Iuri Goulart Baseia, Clarice Loguercio Leite, Marisa Campos Santana
2 gêneros, 3 espécies (2 endêmicas)

Chondrogaster
1 espécie (1 endêmica)
***Chondrogaster angustisporus* Giachini et al.**
Referência: Giachini, A.J. et al. 2000. Mycologia 92: 1166-1177.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

Hysterangium
2 espécies (1 endêmica)
***Hysterangium australe* Speg.**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. & Baseia, I.G. 2009. Mycotaxon 108: 441-444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Hysterangium gardneri* E.Fisch.**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. & Baseia, I.G. 2009. Mycotaxon 108: 441-444.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

PHALLALES
Iuri Goulart Baseia, Rosa Mara Borges da Silveira , Vagner Gularte Cortez, Larissa Trierveiler Pereira, Marisa Campos Santana, Clarice Loguercio Leite
12 gêneros, 24 espécies (6 endêmicas)

Aseroë
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Aseroë floriformis* Baseia & Calonge**
Referência: Baseia, I.G. & Calonge, F.D. 2005. Mycotaxon 91: 169-1721851 (UFRN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE, RN, BA); Mata Atlântica
***Aseroë rubra* Labill.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Blumenavia
1 espécie (1 endêmica)
***Blumenavia rhacodes* A. Möller**
Referência: Rick, J. 1961. Iheringia Serv. Bot. 9: 451
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Clathrus
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Clathrus chrysomycelinus* A. Möller**
Referência: Möller, A. 1895. Bot. Mitt. Tropen 7: 1.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica
***Clathrus columnatus* Bosc**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Ileodictyon
1 espécie (não endêmica)
***Ileodictyon cibarium* Tul. *ex* Raoul**
Referência: Leite, A.G. et al. 2007. Acta Botanica Brasileira 21: 119-124
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN); Mata Atlântica

Laternea
2 espécies (1 endêmica)
***Laternea columnata* Nees**
Referência: Möller, A. 1895. Bot. Mitt. Tropen 7:1.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Laternea triscapa* Turpin**
Referência: Leite, A.G. et al. 2007. Acta Botanica Brasileira 21: 119-124
Distribuição: subespontânea; endêmica; Nordeste (RN), Sul (RS); Mata Atlântica

Lysurus
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Lysurus cruciatus* (Lepr. & Mont.) Henn**
Referência: Rick, J. 1961. Iheringia, Bot. 9: 451.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Lysurus periphragmoides* (Klotzsch) Dring.**
Referência: Cortez, V.G. et al. 2008. Biociências (Porto Alegre) 6: 291-299.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Mutinus
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Mutinus bambusinus* (Zoll.) E.Fischer**
Referência: Rick, J. 1961. Iheringia 9: 451-480.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mutinus borneensis* Ces.**
Referência: Rick, J. 1961. Iheringia 9: 451-480.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mutinus elegans* (Mont.) E.Fisch.**
Voucher: Cortez, V.G. 04-16 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mutinus rugulosus* Rick**
Referência: Rick, J. 1961. Iheringia 9: 451-480.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

Phallus
6 espécies (4 endêmicas)
***Phallus callichrous* (A.Möller) Lloyd**
Referência: Möller, A. 1895. Jena: Gustav Fischer Verlag.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Phallus galericulatus* (A.Möller) Kreisel**
Referência: Möller, A. 1895. Jena: Gustav Fischer Verlag.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Phallus glutinolens* (A.Möller) Kuntze**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. et al. 2009. Mycological Progress 8: 377-380
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Phallus indusiatus* Vent.: Pers.**
Referência: Baseia, I.G. et al. 2006. Bol. Soc. Micol. Madrid 30: 87-93
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sul (SC); Mata Atlântica
***Phallus pygmaeus* Baseia**
Referência: Baseia, I.G. et al. 2003. Mycotaxon 85: 78.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Phallus subtilis* (A.Möller) Lloyd**
Referência: Möller, A. 1895. Jena: Gustav Fischer Verlag.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Protubera
1 espécie (não endêmica)
***Protubera maracuja* Moller**
Referência: Möller, A. 1895. Bot. Mitt. Tropen 7: 1.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Pseudocolus
1 espécie (não endêmica)
***Pseudocolus garciae* (A. Möller) Lloyd**
Referência: Rick, J. 1961. Iheringia 9: 451
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Simblum
1 espécie (não endêmica)
***Simblum sphaerocephalum* Schltdl.**
Referência: Rick, J. 1929. Egatea 14: 305.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Staheliomyces
1 espécie (não endêmica)
***Staheliomyces cinctus* E.Fisch.**
Referência: Leite, A.G. et al. 2007.
Acta Botanica Brasílica 21: 119-124
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); Mata Atlântica

POLYPORALES
Adriana de Mello Gugliotta, Rosa Mara Borges da Silveira, Clarice Loguercio Leite, Marisa Campos Santana, Tatiana B. Gibertoni, Elisandro Ricardo Drechsler-Santos, Allyne Christina Gomes Silva, Juliano M. Baltazar
91 gêneros, 333 espécies (50 endêmicas),
1 subespécie (não endêmica)

Abortiporus
1 espécie (não endêmica)
***Abortiporus biennis* (Bull.) Singer**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Abundisporus
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Abundisporus fuscopurpureus* (Pers.) Ryvarden**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Abundisporus roseoalbus* (Jungh.) Ryvarden**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2009.
Mycotaxon 108: 214-244.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Amauroderma
20 espécies (1 endêmica)
***Amauroderma aurantiacum* (Torrend) Gibertoni & Bernicchia**
Voucher: Fidalgo, O. s.n. (SP 47626)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul; Amazônia, Mata Atlântica
***Amauroderma boleticeum* (Pat. & Gaillard) Torrend**
Voucher: Capelari, M. s.n. (SP 211529)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Amauroderma brasiliense* (Singer) Ryvarden**
Referência: Coelho, G. et al. 2007. Mycotaxon 100: 177-183.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Amauroderma calcigenum* (Berk.) Torrend**
Voucher: Gugliotta, A.M. 18 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Amauroderma camerarium* (Berk.) J.S. Furtado**
Voucher: Mariano, R.H. s.n. (SP 375890)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Amauroderma coltricioides* T.W.Henkel et al.**
Referência: Campacci, T.V.S. & Gugliotta, A.M. 2009. Mycotaxon 110: 423-436.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Amauroderma elegantissimum* Ryvarden & Iturr.**
Referência: Campacci, T.V.S. & Gugliotta, A.M. 2009. Mycotaxon 110: 423-436.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Amauroderma exile* (Berk.) Torrend**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1300 (SJRP, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Amauroderma fasciculatum* (Pat.) Torrend**
Referência: Bononi, V.L.R. 1992. Hoehnea 19: 31-37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Amauroderma oblongisporum* J.S. Furtado**
Voucher: Skvortzov, B. s.n. (SP 107239)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Amauroderma omphalodes* (Berk.) Torrend**
Voucher: Fonsêca, M.P. 215 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Amauroderma praetervisum* (Pat.) Torrend**
Voucher: Kuhlmann, M. 411 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Amauroderma pseudoboletus* (Speg.) J.S.Furtado**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1302 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Amauroderma renidens* (Bres.) Torrend**
Voucher: Bononi, V.L.R. 31 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sul (SC); Mata Atlântica, Pantanal
***Amauroderma rude* (Berk.) Torrend**
Voucher: Furtado, J.S. s.n. (SP 102714)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Amauroderma schomburgkii* (Mont. & Berk.) Torrend**
Voucher: Campacci, T.V.S. 17 (SP 382041)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Amauroderma sprucei* (Pat.) Torrend**
Voucher: Abrahão, M.C. 240 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Amauroderma subrugosum* (Bres. & Pat.) Torrend**
Referência: Campacci, T.V.S. & Gugliotta, A.M. 2009. Mycotaxon 110: 423-436.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Amauroderma trichodermatum* J.S. Furtado**
Referência: Campacci, T.V.S. & Gugliotta, A.M. 2009. Mycotaxon 110: 423-436.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Amauroderma unilatereum* (Lloyd) Ryvarden**
Referência: Góes-Neto, A. 1999. Mycotaxon 72: 43-56.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Antrodia

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Antrodia albida* (Fr.) Donk**
Voucher: Fonsêca, M.P. 351 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Antrodia gossypium* (Speg.) Ryvarden**
Referência: Rick, J. 1960. Iheringia, Bot. 7: 193-295.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Antrodia lenis* (P.Karst.) Ryvarden**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (SE), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Antrodia malicola* (Berk. & M.A.Curtis) Donk**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Antrodia porothelioides* (Berk. & M.A.Curtis *ex* Cooke) Ryvarden**
Referência: Rick, J. 1960. Iheringia, Bot. 7: 193-295.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Antrodia sinuosa* (Fr.) P.Karst.**
Referência: Sotão, H.M.P. et al. 2003. Os manguezais da costa norte brasileira, p. 45-59.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

Antrodiella

9 espécies (4 endêmicas)
***Antrodiella angulatopora* Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 401 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (AL), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Antrodiella brasiliensis* Ryvarden & de Meijer**
Referência: Ryvarden, L. & Meijer, A.A.R. 2002. Synopsis Fungorum 15: 34-69.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido
***Antrodiella incrustans* (Berk. & M.A.Curtis) Ryvarden**
Referência: Rick, J. 1960. Iheringia, Bot. 7: 193-295.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Antrodiella luteocontexta* Ryvarden & de Meijer**
Referência: Ryvarden, L. & Meijer, A.A.R. 2002. Synopsis Fungorum 15: 34-69.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Antrodiella mollis* Gibertoni & Ryvarden**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004. Synopsis Fungorum 18: 44-56.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Antrodiella multipileata* Log.-Leite & J.E. Wright**
Voucher: Loguercio-Leite, C. 251 (FLOR 10633)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Antrodiella reflexa* Ryvarden & Núñez**
Referência: Ryvarden, L. & Meijer, A.A.R. 2002. Synopsis Fungorum 15: 34-69.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Antrodiella semisupina* (Berk. & M.A.Curtis) Ryvarden**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004. Synopsis Fungorum 18: 33-43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Antrodiella versicutis* (Berk. & M.A.Curtis) Gilb. & Ryvarden**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004. Synopsis Fungorum 18: 33-43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (RN, PB, PE, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

Aquascypha

1 espécie (não endêmica)
***Aquascypha hydrophora* (Berk.) D.A.Reid**
Voucher: Capelari, M. s.n. (SP 157169)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Auriporia

1 espécie (1 endêmica)
***Auriporia brasilica* G.Coelho**
Voucher: Coelho, G. 287-1 (BAFC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Bjerkandera

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Bjerkandera adusta* (Willd.) P.Karst.**
Voucher: Fonsêca, M.P. 73 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Bjerkandera fumosa* (Pers.) P.Karst.**
Referência: Rick, J. 1963. Iheringia, Bot. 11: 1-32.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Bulbillomyces
1 espécie (não endêmica)
***Bulbillomyces farinosus* (Bres.) Jülich**
Voucher: Penteado, V.L. s.n. (SP 142210)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Byssomerulius
1 espécie (não endêmica)
***Byssomerulius corium* (Pers.) Parmasto**
Voucher: Furtado, J.S. s.n. (SP 61104)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Ceriporia
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Ceriporia purpurea* (Fr.) Donk**
Referência: Nietiedt, S.A. & Guerrero, R.T. 2000.
Iheringia, Bot. 54: 45-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Ceriporia spissa* (Schwein. *ex* Fr.) Rajchenb.**
Referência: Coelho, G. et al. 2005. Biociências 13 (2): 107-111.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Ceriporia tarda* (Berk.) Ginns**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do
Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC);
Mata Atlântica
***Ceriporia viridans* (Berk. & Broome) Donk**
Referência: Rajchenberg, M. 1987. Nordic J. Bot. 7: 553-568.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Ceriporia xylostromatoides* (Berk.) Ryvarden**
Referência: Silveira, R.M.B. & Guerrero, R.T. 1991.
Boletim do Instituto de Biociências 48: 1-121.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Ceriporiopsis
5 espécies (2 endêmicas)
***Ceriporiopsis cystidiata* Log.-Leite et al.**
Referência: Loguercio-Leite, C. et al. 2001.
Mycotaxon 79: 285-288.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Ceriporiopsis flavilutea* (Murrill) Ryvarden**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004.
Synopsis Fungorum 18: 33-43.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (RN); Mata Atlântica
***Ceriporiopsis latemarginata* (Rick) Rajchenb.**
Referência: Rajchenberg, M. 1987. Nordic J. Bot. 7: 553-568.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Ceriporiopsis lowei* Rajchenb.**
Referência: Rajchenberg, M. 1987. Nordic J. Bot. 7: 553-568.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica
***Ceriporiopsis pannocincta* (Romell) Gilb. & Ryvarden**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008.
Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Cerrena
3 espécies (1 endêmica)
***Cerrena cystidiata* Rajchenb. & De Meijer**
Voucher: Meijer, A.A.R. 1169 (BAFC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Cerrena sclerodepsis* (Berk.) Ryvarden**
Voucher: Capelari, M. 886 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),
Nordeste (PE, AL), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Cerrena unicolor* (Bull.) Murrill**
Referência: Rick, J. 1960. Iheringia, Bot. 7: 193-295.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

Climacodon
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Climacodon chlamydocystis* Maas Geest.**
Referência: Bononi, V.L.R. 1981. Rickia 9: 17-30.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Amazônia
***Climacodon pulcherrimus* (Berk. & M.A.Curtis) Nikol.**
Voucher: Fidalgo, O. s.n. (SP 47258)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),
Nordeste (PB, PE), Sudeste (SP), Sul (PR, RS);
Amazônia, Mata Atlântica

Coriolopsis
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Coriolopsis aspera* (Jungh.) Teng**
Referência: Trierveiler-Pereira, L. et al. 2009.
Mycotaxon 109: 107-110.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Coriolopsis badia* (Berk.) Murrill**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004.
Synopsis Fungorum 18: 33-43.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Coriolopsis byrsina* (Mont.) Ryvarden**
Voucher: Capelari, M. 1728 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),
Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Coriolopsis caperata* (Berk.) Murrill**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1327 (SJRP, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC,
RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,
Mata Atlântica
***Coriolopsis floccosa* (Jungh.) Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1265 (SJRP, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO),
Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC,
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Coriolopsis gallica* (Fr.) Ryvarden**
Voucher: Bononi, V.L.R. s.n. (SP 156751)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Coriolopsis polyzona* (Pers.) Ryvarden**
Voucher: Abrahão, M.C. 5 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste
(SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica,
Pantanal

Cymatoderma
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cymatoderma caperatum* (Berk. & Mont.) D.A.Reid**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1388 (SJRP, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Cymatoderma dendriticum* (Pers.) D.A.Reid.**
Voucher: Okino, L.K. 276 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (PB, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Cystidiodontia
1 espécie (não endêmica)
***Cystidiodontia artocreas* (Berk. & M.A.Curtis *ex* Cooke) Hjortstam**
Referência: Jesus, M.A. 1996. Mycotaxon 57: 323-328.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

Dacryobolus
1 espécie (não endêmica)
***Dacryobolus sudans* (Alb. & Schwein.) Fr.**
Voucher: Marino, M.C. s.n. (SP 83989)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Daedalea
3 espécies (1 endêmica)
***Daedalea aethalodes* (Mont.) Rajchenb.**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1335 (SJRP, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, AL, SE), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Daedalea latemarginata* Rick**
Referência: Rajchenberg, M. 1987. Nordic J. Bot. 7: 553-568.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Daedalea quercina* (L.) Pers.**
Referência: Rick, J. 1960. Iheringia, Bot. 7: 193-295.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Datronia
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Datronia mollis* (Sommerf.) Donk**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1377 (SJRP, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Datronia scutellata* (Schwein.) Gilb. & Ryvarden**
Referência: Loguercio-Leite, C. & Wright, J.E. 1991. Mycotaxon 41: 161-166.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE), Sul (SC); Mata Atlântica
***Datronia stereoides* (Fr.) Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 169 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Diacanthodes
2 espécies (1 endêmica)
***Diacanthodes fluminensis* Corner**
Referência: Corner, E.J.H. 1989. Nova Hedwigia 96: 1-218.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Diacanthodes novo-guineensis* (Henn.) O.Fidalgo**
Referência: Fidalgo, O. 1962. Rickia 1: 145-481.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR); Mata Atlântica

Dichomitus
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Dichomitus anoectoporus* (Berk. & M.A.Curtis) Ryvarden**
Referência: Loguercio-Leite, C. & Wright, J.E. 1991. Mycotaxon 41: 161-166.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Dichomitus cavernulosus* (Berk.) Masuka & Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 156 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Dichomitus citricremeus* Masuka & Ryvarden**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Dichomitus setulosus* (Henn.) Masuka & Ryvarden**
Voucher: Redivo, C.L.C. 06 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Diplomitoporus
5 espécies (4 endêmicas)
***Diplomitoporus allantosporus* Ryvarden & Iturr.**
Referência: Martins-Júnior, A.S. et al. 2008. Mycotaxon 106: 195-198.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Diplomitoporus dilutabilis* Log.-Leite & J.E. Wright**
Voucher: Loguercio-Leite, C. 365 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Diplomitoporus marianoi-rochae* G.Coelho**
Voucher: Coelho, G. (ICN 139387)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Diplomitoporus navisporus* Gibertoni & Ryvarden**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Diplomitoporus taquarae* G.Coelho**
Voucher: Coelho, G. s.n. (ICN 139391)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Earliella
1 espécie (não endêmica)
***Earliella scabrosa* (Pers.) Gilb. & Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1298 (SJRP, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Echinochaete
1 espécie (não endêmica)
***Echinochaete brachypora* (Mont.) Ryvarden**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004. Synopsis Fungorum 18: 33-43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, BA, AL), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Epithelopsis
1 espécie (não endêmica)
***Epithelopsis fulva* (G.Cunn.) Jülich**
Voucher: Bononi, V.L.R. s.n. (SP 142138)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado, Pantanal

Flaviporus
5 espécies (1 endêmica)
***Flaviporus brownei* (Humb.) Donk**
Referência: Silveira, R.M.B. et al. 2008.
Hoehnea 35: 619-630.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Flaviporus hydrophilus* (Berk. & M.A.Curtis) Ginns**
Referência: Jesus, M.A. 1993. Hoehnea 20: 119-126.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL),
Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Flaviporus liebmannii* (Fr.) Ginns**
Voucher: Gugliotta, A.M. 441 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Mata Atlântica
F***laviporus subhydrophilus* (Speg.) Rajchenb. & J.E.Wright**
Referência: Gerber, A.L. & Loguercio-Leite, C. 1997.
Mycotaxon 62: 305-318.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste,
Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Flaviporus venustus* A. David & Rajchenb.**
Referência: Silveira, R.M.B. & Guerrero, R.T. 1991.
Boletim do Instituto de Biociências 48: 1-121.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Fomes
2 espécies (1 endêmica)
***Fomes fasciatus* (Sw.) Cooke**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1309 (SJRP, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),
Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (SP),
Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Fomes paulensis* Henn.**
Referência: Hennings, p. 1904. Hedwigia 43: 197-209.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Fomitella
1 espécie (não endêmica)
***Fomitella supina* (Sw.) Murrill**
Voucher: Capelari, M. 3336 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul
(PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Fomitopsis
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Fomitopsis cupreorosea* (Berk.) J.Carranza & Gilb.**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007.
Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Fomitopsis feei* (Fr.) Kreisel**
Voucher: Gugliotta, A.M. 714 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (PB),
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Fomitopsis meliae* (Underw.) Gilb.**
Referência: Rajchenberg, M. & Meijer, A.A.R. 1990.
Mycotaxon 38: 173-185.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Fomitopsis rosea* (Alb. & Schwein.) P.Karst.**
Voucher: Furtado, J.S. s.n. (SP 91388)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

Fuscocerrena
1 espécie (não endêmica)
***Fuscocerrena portoricensis* (Fr.) Ryvarden**
Voucher: Capelari, M. 3303 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Ganoderma
22 espécies (1 endêmica)
***Ganoderma amazonense* Weir**
Referência: Furtado, J.S. 1967. Persoonia 4: 379-389.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat.**
Voucher: Jesus, M.A. s.n. (SP 211910)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO),
Sudeste (SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Ganoderma australe* (Fr.) Pat.**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1188 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Ganoderma colossus* (Fr.) C.F.Baker**
Voucher: Ledoux, p. s.n. (URM 48733)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP),
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ganoderma concinnum* Ryvarden**
Voucher: Santos, E.C. 29 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica
***Ganoderma dorsale* (Lloyd) Torrend**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009.
Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA);
Mata Atlântica
***Ganoderma elegantum* Ryvarden**
Voucher: Capelari, M. 962 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Ganoderma lobatum* (Schwein.) G.F. Atk.**
Voucher: Bononi, V.L.R. s.n. (SP 381540)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Ganoderma lucidum* (Curtis) P.Karst.**
Voucher: Oliveira, A.K.M. s.n. (SP 381336)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP),
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (ES, SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Ganoderma multiplicatum* (Mont.) Pat.**
Voucher: Campacci, T.V.S. 12 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Ganoderma oerstedii* (Fr.) Torrend**
Voucher: Oliveira, A.K.M. s.n. (SP 381914)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal
***Ganoderma opacum* (Berk. & Mont.) Pat.**
Referência: Berkeley, M.J. & Montagne 1849. Ann. Sci. Nat., Bot. 11: 236.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ganoderma orbiforme* (Fr.) Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1255 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Ganoderma perturbatum* (Lloyd) Torrend**
Voucher: Costa-Neto, J.P. s.n. (SP 60278)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Ganoderma perzonatum* Murrill**
Voucher: Salles, A.R.C. s.n. (SP 61968)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Ganoderma resinaceum* Boud.**
Voucher: Mee, M. s.n. (SP 61535)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Ganoderma sessiliforme* Murrill**
Voucher: Honrich, M.H. s.n. (SP 61432)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Ganoderma stipitatum* (Murrill) Murrill**
Voucher: Capelari, M. 636 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PB, PE, AL), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Ganoderma subfornicatum* Murrill**
Voucher: Yano, O. 5977 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Ganoderma vivianimercedianum* Torres-Torres**
Voucher: Costa-Neto, J.P. s.n. (SP 70533)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Ganoderma weberianum* (Bres. & Henn. *ex* Sacc.) Steyaert**
Voucher: Milanez, A.I. s.n. (SP 61099)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Ganoderma zonatum* Murrill**
Voucher: Campacci, T.V.S. 20 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Gloeoporus

6 espécies (2 endêmicas)
***Gloeoporus cystidiatus* Ryvarden**
Referência: Ryvarden, L. 1987. Mycotaxon 28: 525-541.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Gloeoporus dichrous* (Fr.) Bres.**
Voucher: Capelari, M. 3477 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Gloeoporus guerreroanus* G.Coelho et al.**
Voucher: Coelho, G. GC 451-1 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Gloeoporus phlebophorus* (Berk.) G. Cunn.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2008. Macrofungos notáveis das Florestas de Pinheiro-do-Paraná.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Gloeoporus taxicola* (Pers.) Gilb. & Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1293 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Gloeoporus thelephoroides* (Hook.) G.Cunn.**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1424 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

Grammothele

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Grammothele fuligo* (Berk. & Broome) Ryvarden**
Referência: Jesus, M.A. 1996. Mycotaxon 57: 323-328.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Grammothele lineata* Berk. & Curt.**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE, AL), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Grammothele subargentea* (Speg.) Rajchenb.**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PB, PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Grammothelopsis

2 espécies (2 endêmicas)
***Grammothelopsis bambusicola* Ryvarden & de Meijer**
Voucher: Meijer, A.A.R. 3631 (HFC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Grammothelopsis puiggarii* (Speg.) Rajchenb. & J.E.Wright**
Referência: Ryvarden, L. & Meijer, A.A.R. 2002. Synopsis Fungorum 15: 34-69.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Haddowia

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Haddowia longipes* (Lév.) Steyaert**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 319-322.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste; Amazônia
***Haddowia neurospora* (J.S.Furtado) Teixeira**
Referência: Furtado, J.S. 1967. Persoonia 4: 379-389.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Hapalopilus
1 espécie (não endêmica)
***Hapalopilus phlebiiformis* (Berk. *ex* Cooke) Ryvarden**
Voucher: Fidalgo, O. s.n. (SP 61143)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

Henningsia
1 espécie (não endêmica)
***Henningsia brasiliensis* (Speg.) Speg.**
Voucher: Capelari, M. 2023 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Hexagonia
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Hexagonia hirta* (P.Beauv.) Fr.**
Voucher: Abrahão, M.C. 93 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Hexagonia hydnoides* (Sw.) M.Fidalgo**
Voucher: Gugliotta, A.M. 248 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Hexagonia papyracea* Berk.**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1260 (SJRP, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Hexagonia tenuis* (Hook.) Fr.**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC); Mata Atlântica

Humphreya
1 espécie (não endêmica)
***Humphreya coffeata* (Berk.) Steyaert**
Voucher: Furtado, J.S. s.n. (SP 95408)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Hydnopolyporus
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Hydnopolyporus fimbriatus* (Fr.) D.A.Reid**
Voucher: Gugliotta, A.M. 55 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Hydnopolyporus hartmannii* (Mont.) D.A.Reid**
Referência: Bononi, V.L.R. 1979. Rickia 8: 105-121.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Hydnopolyporus palmatus* (Hook.) O.Fidalgo**
Voucher: Eiten, G. 1869 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

Hyphoderma
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Hyphoderma puberum* (Fr.) Wallr.**
Voucher: Skvortzov, B. s.n. (SP 98021)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Hyphoderma rude* (Bres.) Hjortstam & Ryvarden**
Voucher: Skvortzov, B. s.n. (SP 103919)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Hyphoderma setigerum* (Fr.) Donk**
Voucher: Lowy, B. 195b (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Hyphoderma transiens* (Bres.) Parmasto**
Voucher: Fidalgo, O. s.n. (SP 112084)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Hyphodermella
1 espécie (não endêmica)
***Hyphodermella corrugata* (Fr.) J.Erikss. & Ryvarden**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, SE), Sul (RS); Mata Atlântica

Hypochnicium
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Hypochnicium lundellii* (Bourdot) J.Erikss.**
Referência: Jesus, M.A. 1996. Mycotaxon 57: 323-328.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Hypochnicium punctulatum* (Cooke) J.Erikss.**
Voucher: Requejo, H. s.n. (SP 97573)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Hypochnicium sphaerosporum* (Höhn. & Litsch.) J.Erikss.**
Referência: Bononi, V.L.R. et al. 2008. Hoehnea 35(4): 489-511.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal
***Hypochnicium subrigescens* Boidin**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Irpex
1 espécie (não endêmica)
***Irpex lacteus* (Fr.) Fr.**
Voucher: Bononi, V.L.R. s.n. (SP 157606)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Ischnoderma
1 espécie (não endêmica)
***Ischnoderma resinosum* (Schrad.) P.Karst.**
Voucher: Capelari, M. 524 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Junghuhnia
5 espécies (1 endêmica)
***Junghuhnia crustacea* (Jungh.) Ryvarden**
Referência: Bononi, V.L.R. 1992. Hoehnea 19: 31-37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Junghuhnia minuta* I. Lindblad & Ryvarden**
Referência: Silveira, R.M.B. et al. 2008.
Hoehnea 35: 619-630.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Junghuhnia nitida* (Pers.) Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 271 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (AL), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Junghuhnia polycystidifera* (Rick) Rajchenb.**
Voucher: Fonsêca, M.P. 238 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Junghuhnia undigera* (Berk. & M.A.Curtis) Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1175 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste
(SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Laetiporus
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Laetiporus persicinus* (Berk. & M.A.Curtis) Gilb.**
Voucher: Capelari, M. s.n. (SP 308005)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP),
Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murrill**
Voucher: Fonsêca, M.P. 180 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Lentinus
12 espécies (nenhuma endêmica)
***Lentinus badius* (Berk.) Berk.**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008.
Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),
Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Lentinus bertieri* (Fr.) Fr.**
Referência: Pegler, D.N. 1997. The Agarics of
São Paulo, Brazil 60p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Cerrado, Mata Atlântica
***Lentinus concavus* (Berk.) Corner**
Referência: Bononi, V.L.R. 1992. Hoehnea 19: 31-37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal
***Lentinus crinitus* (L.) Fr.**
Voucher: Fonsêca, M.P. 433 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Lentinus patulus* Lév.**
Referência: Pegler, D.N. 1997. The Agarics of
São Paulo, Brazil 60p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Lentinus scleropus* (Pers.) Fr.**
Referência: Pegler, D.N. 1997. The Agarics of
São Paulo, Brazil 60p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Lentinus striatulus* Lév.**
Referência: Pegler, D.N. 1997. The Agarics of
São Paulo, Brazil 60p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Lentinus strigellus* Berk.**
Referência: Pegler, D.N. 1997. The Agarics of
São Paulo, Brazil 60p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Lentinus strigosus* (Schwein.) Fr.**
Referência: Groposo, C. & Loguercio-Leite, C. 2005.
Mycotaxon 92: 103-106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste
(SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Lentinus swartzii* Berk.**
Referência: Bononi, V.L.R. et al. 2008.
Hoehnea 35(4): 489-511.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ);
Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Lentinus tephroleucus* Mont.**
Referência: Pegler, D.N. 1997. The Agarics of
São Paulo, Brazil 60p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Cerrado, Mata Atlântica
***Lentinus velutinus* Fr.**
Voucher: Capelari, M. 767 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (RN), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS);
Amazônia, Mata Atlântica

Lenzites
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Lenzites betulina* (L.) Fr.**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008.
Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lenzites elegans* (Spreng.) Pat.**
Voucher: Gugliotta, A.M. 314 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Lenzites stereoides* (Fr.) Ryvarden**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007.
Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(PB, PE, AL, SE), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

Lopharia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Lopharia cinerescens* (Schwein.) G.Cunn.**
Voucher: Penteado, V.L. s.n. (SP 141903)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (RN, PB, PE, AL, SE), Centro-Oeste (MT),
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Lopharia papyrina* (Mont.) Boidin**
Voucher: Penteado, V.L. s.n. (SP 141906)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Loweomyces
1 espécie (não endêmica)
***Loweomyces fractipes* (Berk. & M.A.Curtis) Jülich**
Voucher: Skvortzov, B. s.n. (SP 103956)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Melanoporella
1 espécie (não endêmica)
***Melanoporella carbonacea* (Berk. & M.A.Curtis) Murrill**
Voucher: Bononi, V.L.R. s.n. (SP 156772)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Melanoporia
1 espécie (não endêmica)
***Melanoporia nigra* (Berk.) Murrill**
Voucher: Penteado, V.L. s.n. (SP 142159)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Merulius
1 espécie (não endêmica)
***Merulius tremellosus* Schrad.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Microporellus
3 espécies (1 endêmica)
***Microporellus brasiliensis* Ryvarden & Decock**
Voucher: Meijer, A.A.R. 3658 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Microporellus dealbatus* (Berk. & M.A.Curtis) Murrill**
Voucher: Capelari, M. 1135 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Microporellus obovatus* (Jungh.) Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 383 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Mycoacia
2 espécies (1 endêmica)
***Mycoacia fuscoatra* (Fr.) Donk**
Referência: Nietiedt, S.A. & Guerrero, R.T. 2000. Iheringia, Bot. 54: 45-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mycoacia subconspersa* (Rick) Hjortstam & Ryvarden**
Voucher: Fidalgo, O. s.n. (SP 47648)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

Mycoaciella
1 espécie (não endêmica)
***Mycoaciella bispora* (Stalpers) J.Erikss. & Ryvarden**
Referência: Bononi, V.L.R. et al. 2008. Hoehnea 35(4): 489-511.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Navisporus
3 espécies (1 endêmica)
***Navisporus floccosus* (Bres.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (RS); Mata Atlântica
***Navisporus sulcatus* (Lloyd) Ryvarden**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Navisporus terrestris* Gibertoni & Ryvarden**
Voucher: Gibertoni, T.B. s.n. (URM 77580)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA); Caatinga, Mata Atlântica

Nigrofomes
1 espécie (não endêmica)
***Nigrofomes melanoporus* (Mont.) Murrill**
Voucher: Fidalgo, O. s.n. (SP 61169)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Nigroporus
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Nigroporus macroporus* Ryvarden & Iturr.**
Voucher: Lucchesi, C. s.n. (SP 38059)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal
***Nigroporus rigidus* Ryvarden**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 319-322.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Nigroporus vinosus* (Berk.) Murrill**
Voucher: Capelari, M. 597 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC, RO), Nordeste (RN, PB, PE), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Pachykytospora
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pachykytospora alabamae* (Berk. & Cooke) Ryvarden**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Pachykytospora papyracea* (Schwein.) Ryvarden**
Voucher: Piccolo, R.A. s.n. (SP 156794)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Panus
1 espécie (não endêmica)
***Panus conchatus* (Bull.) Fr.**
Referência: Pegler, D.N. 1997. The Agarics of São Paulo, Brazil 60p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Perenniporia
15 espécies (3 endêmicas)
***Perenniporia aurantiaca* (A.David & Rajchenb.) Decock & Ryvarden**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004. Synopsis Fungorum 18: 33-43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Perenniporia contraria* (Berk. & M.A.Curtis) Ryvarden**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004. Synopsis Fungorum 18: 33-43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Perenniporia detrita* (Berk.) Ryvarden**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Perenniporia inflexibilis* (Berk.) Ryvarden**
Referência: Jesus, M.A. 1996. Mycotaxon 57: 323-328.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Perenniporia martia* (Berk.) Ryvarden**
Voucher: Oliveira, A.K.M. s.n. (SP 381521)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Perenniporia medulla-panis* (Jacq.) Donk**
Voucher: Furtado, J.S. s.n. (SP 61103)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Perenniporia neofulva* (Lloyd) Ryvarden**
Voucher: Capelari, M. 3011 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Perenniporia ochroleuca* (Berk.) Ryvarden**
Referência: Reck, M.A. & Silveira, R.M.B. 2008. Revista Brasileira de Biociências 6(3): 301–314.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Perenniporia ohiensis* (Berk.) Ryvarden**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Perenniporia parvispora* Decock & Ryvarden**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Perenniporia piperis* (Rick) Rajchenb.**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Perenniporia sinuosa* Ryvarden**
Voucher: Samuels, G. 117 (NY, O)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Perenniporia stipitata* Ryvarden**
Voucher: Samuels, G. 487 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Perenniporia subannosa* (Bres.) Decock et al.**
Voucher: Rick, J. 89 (BPI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Perenniporia tephropora* (Mont.) Ryvarden**
Voucher: Abrahão, M.C. 334 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

Perenniporiella
1 espécie (não endêmica)
***Perenniporiella neofulva* (Lloyd) Decock & Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1086 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Phaeolus
2 espécies (1 endêmica)
***Phaeolus schweinitzii* (Fr.) Pat.**
Referência: Bononi, V.L.R. 1992. Hoehnea 19: 31-37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Phaeolus subbulbipes* (Henn.) O.Fidalgo & M.Fidalgo**
Referência: Fidalgo, O. & Fidalgo, M.E.P.K. 1957. Arq. Mus. Nac. Rio de Janeiro 43: 157-188.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Phanerochaete
8 espécies (1 endêmica)
***Phanerochaete chrysorhiza* (Torr.) Budington & Gilb.**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (PB), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Phanerochaete filamentosa* (Berk. & M.A.Curtis) Burds.**
Referência: Hjortstam, K. & Bononi, V.L.R. 1987. Mycotaxon 28(1): 1-15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Phanerochaete furfuraceovelutinus* (Rick) Rajchenb.**
Referência: Rajchenberg, M. 1987. Nordic J. Bot. 7: 553-568.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Phanerochaete fuscomarginata* (Burt) Gilb.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Phanerochaete magnoliae* (Berk. & M.A.Curtis) Burds.**
Referência: Nietiedt, S.A. & Guerrero, R.T. 2000. Iheringia, Bot. 54: 45-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Phanerochaete sacchari* (Burt) Burds.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Phanerochaete sordida* (P.Karst.) J. Erikss. & Ryvarden**
Referência: Jesus, M.A. 1996. Mycotaxon 57: 323-328.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Phanerochaete velutina* (DC.) Parmasto**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

Phlebia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phlebia livida* (Pers.) Bres.**
Voucher: Skvortzov, B. s.n. (SP 97532)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Phlebia queletii* (Bourdot & Galzin) M.P.Christ.**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL), Sul (PR); Mata Atlântica

Phlebiopsis
2 espécies (1 endêmica)
***Phlebiopsis galochroa* (Bres.) Hjortstam & Ryvarden**
Voucher: Möller s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Phlebiopsis ravenelii* (Cooke) Hjortstam**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

Podoscypha
13 espécies (5 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Podoscypha brasiliensis* D.A.Reid**
Referência: Bononi, V.L.R. 1992. Hoehnea 19: 31-37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Podoscypha bubalina* D.A.Reid**
Referência: Reid, D.A. 1965. Nova Hedwigia 18: 1-388.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Podoscypha fulvonitens* (Berk.) D.A.Reid**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Podoscypha mellissii* (Berk. *ex* Sacc.) Bres.**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Podoscypha moelleri* (Bres. & Henn.) D.A.Reid**
Voucher: Möller, A. 110 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Podoscypha nitidula* (Berk.) Pat.**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (RN, PB, PE), Centro-Oeste (GO), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Podoscypha ovalispora* D. A.Reid**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN, PE, AL); Amazônia, Mata Atlântica
***Podoscypha petalodes* (Berk.) Boidin**
Distribuição: nativa; não endêmica
Podoscypha petalodes* (Berk.) Boidin subsp. *petalodes
Referência: Reid, D.A. 1965. Nova Hedwigia 18: 1-388.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Podoscypha replicata* (Lloyd) D. A.Reid**
Referência: Reid, D.A. 1965. Nova Hedwigia 18: 1-388.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Podoscypha semiresupinata* A.L. Welden**
Voucher: Corner, E.J.H. s.n. (NO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Podoscypha tomentipes* (Overh.) D.A. Reid**
Referência: Reid, D.A. 1965. Nova Hedwigia 18: 1-388.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Podoscypha venustula* (Speg.) D.A. Reid**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Podoscypha viridans* (Lloyd) D.A. Reid**
Referência: Reid, D.A. 1965. Nova Hedwigia 18: 1-388.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Polyporus
19 espécies (4 endêmicas)
***Polyporus aquosus* Henn.**
Voucher: Puttemans, A. 796 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Polyporus arcularius* (Batsch) Fr.**
Voucher: Osaku, C.A. s.n. (SP 308034)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Polyporus ciliatus* Fr.**
Referência: Silveira, R.M.B. & Wright, J.E. 2005. Mycotaxon 93: 1-59.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Polyporus dictyopus* Mont.**
Voucher: Gugliotta, A.M. 424 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Polyporus grammocephalus* Berk.**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004. Synopsis Fungorum 18: 33-43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Polyporus guianensis* Mont.**
Voucher: Gugliotta, A.M. 83 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Polyporus ianthinus* Gibertoni & Ryvarden**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004. Synopsis Fungorum 18: 44-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Polyporus lentinoides* (Henn.) Lloyd**
Voucher: Eiten, G. 2429 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Polyporus leprieurii* Mont.**
Voucher: Gugliotta, A.M. 9 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Polyporus philippinensis* Berk.**
Voucher: Medeiros, K.A. s.n. (SP 381517)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Polyporus puiggarianus* Henn.**
Voucher: Puttemans, A. 950 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Polyporus puttemansii* Henn.**
Voucher: Puttemans, A. 900 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Polyporus sapurema* Möller**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48(3): 437-457.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Polyporus squamosus* (Huds.) Fr.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Polyporus tenuiculus* (P.Beauv.) Fr.**
Voucher: Bononi, V.L.R. s.n. (SP 157077)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Polyporus tricholoma* Mont.**
Voucher: Gugliotta, A.M. 270 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Polyporus udus* Jungh.**
Voucher: Peixoto, U.C. s.n. (SP 381514)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Polyporus varius* (Pers.) Fr.**
Referência: Silveira, R.M.B. & Wright, J.E. 2005. Mycotaxon 93: 1-59.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Polyporus virgatus* Berk. & Curt.**
Referência: Silveira, R.M.B. & Wright, J.E. 2005. Mycotaxon 93: 1-59.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PB), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Poronidulus

1 espécie (não endêmica)
***Poronidulus conchifer* (Schwein.) Murrill**
Referência: Sotão, H.M.P. et al. 2003. Os manguezais da costa norte brasileira, p. 45-59.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Porostereum

1 espécie (não endêmica)
***Porostereum crassum* (Lév.) Hjortstam & Ryvarden**
Referência: Teixeira, A.R. 1945. Bragantia 5: 397-434.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

Porotheleum

1 espécie (não endêmica)
***Porotheleum fimbriatum* (Pers.) Fr.**
Voucher: Bononi, V.L.R. s.n. (SP 156846)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Postia

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Postia caesia* (Schrad.) P.Karst.**
Voucher: Fidalgo, O. s.n. (SP 47185)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Postia subcaesia* (A.David) Jülich**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Postia tephroleuca* (Fr.) Jülich**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Pseudofavolus

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pseudofavolus cucullatus* (Mont.) Pat.**
Voucher: Capelari, M. 639 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Pseudofavolus miquelii* (Mont.) Pat.**
Voucher: Capelari, M. 987 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Pycnoporus

1 espécie (não endêmica)
***Pycnoporus sanguineus* (L.) Murrill**
Voucher: Gugliotta, A.M. 439 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Pyrofomes

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Pyrofomes fulvoumbrinus* (Bres.) A. David & Rajchenb.**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 3: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC); Mata Atlântica
***Pyrofomes lateritius* (Cooke) Ryvarden**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Pyrofomes perlevis* (Lloyd) Ryvarden**
Referência: Rick, J. 1960. Iheringia, Bot. 7: 193-295.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Rigidoporus
7 espécies (1 endêmica)
***Rigidoporus amazonicus* Ryvarden**
Referência: Campos-Santana, M. & Loguercio-Leite, C. 2008. Biotemas 21 (2): 19-26.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Rigidoporus biokoensis* (Bres. *ex* Lloyd) Ryvarden**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 49-67.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica
***Rigidoporus lineatus* (Pers.) Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 5 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Rigidoporus microporus* (Sw.) Overeem**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1280 (SJRP, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rigidoporus sanguinolentus* (Alb. & Schwein.) Donk**
Referência: Gerber, A.L. & Loguercio-Leite, C. 2000. Mycotaxon 76: 175-185.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Rigidoporus ulmarius* (Sowerby) Imazeki**
Voucher: Gugliotta, A.M. 254 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Rigidoporus vinctus* (Berk.) Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1288 (SJRP, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Rubroporus
1 espécie (1 endêmica)
***Rubroporus carneoporis* Log.-Leite et al.**
Referência: Loguercio-Leite, C. et al. 2002. Mycotaxon 83: 223-227.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Skeletocutis
2 espécies (1 endêmica)
***Skeletocutis diluta* (Rajchenb.) A.David & Rajchenb.**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Skeletocutis roseola* (Rick *ex* Theiss.) Rajchenb.**
Referência: Rajchenberg, M. 1987. Nordic J. Bot. 7: 553-568.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Steccherinum
4 espécies (1 endêmica)
***Steccherinum hydneum* Rick *ex* Maas Geest.**
Voucher: Capelari, M. 3292 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Steccherinum ochraceum* (Pers.) Gray**
Voucher: Lowy, B. 182 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Steccherinum reniforme* (Berk. & M.A.Curtis) Banker**
Voucher: Teixeira, A.R. s.n. (SP 71275)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Steccherinum subrawakense* Murrill**
Voucher: Skvortzov, B. s.n. (SP 107486)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Stereopsis
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Stereopsis hiscens* (Berk. & Ravenel) D.A. Reid**
Voucher: Bononi, V.L.R. s.n. (SP 177858)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Stereopsis radicans* (Berk.) D.A. Reid**
Referência: Bononi, V.L.R. 1992. Hoehnea 19: 31-37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT), Sul (PR, RS); Amazônia

Stiptophyllum
1 espécie (não endêmica)
***Stiptophyllum erubescens* (Berk.) Ryvarden**
Referência: Campos-Santana, M. & Loguercio-Leite, C. 2008. Biotemas 21(2): 19-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (RN, PB), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Tinctoporellus
1 espécie (não endêmica)
***Tinctoporellus epimiltinus* (Berk. & Broome) Ryvarden**
Voucher: Skvortzov, B. s.n. (SP 107263)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

Trametes
20 espécies (2 endêmicas)
***Trametes cotonea* (Pat. & Har.) Ryvarden**
Referência: Bononi, V.L.R. 1992. Hoehnea 19: 31-37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Trametes cubensis* (Mont.) Sacc.**
Voucher: Fonsêca, M.P. 412 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Trametes ectypa* (Berk. & M.A.Curtis) Gilb. & Ryvarden**
Referência: Rajchenberg, M. 1987. Nordic J. Bot. 7: 553-568.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Trametes farcta* Lloyd**
Referência: Rajchenberg, M. 1987. Nordic J. Bot. 7: 553-568.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Trametes hirsuta* (Wulfen) Lloyd**
Referência: Fidalgo, O. & Fidalgo, M.E.P.K. 1957. Arq. Mus. Nac. Rio de Janeiro 43: 157-188.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Trametes incerta* (Curr.) Cooke**
Voucher: Furtado, J.S. s.n. (SP 58113)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Trametes lactinea* (Berk.) Sacc.**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 319-322.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Trametes marianna* (Pers.) Ryvarden**
Referência: Góes-Neto, A. 1999. Mycotaxon 72: 43-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Trametes maxima* (Mont.) A.David & Rajchenb.**
Referência: Sotão, H.M.P. et al. 2003. Os manguezais da costa norte brasileira 45-59.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Trametes membranacea* (Sw.) Kreisel**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004. Synopsis Fungorum 18: 33-43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Trametes modesta* (Kunze *ex* Fr.) Ryvarden**
Voucher: Abrahão, M.C. 8 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Trametes nivosa* (Berk.) Murrill**
Voucher: Oliveira, A.L.S. s.n. (SP 250584)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Trametes ochracea* (Pers.) Gilb. & Ryvarden**
Voucher: Vital, D.M. s.n. (SP 70785)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Trametes ochroflava* Cooke**
Referência: Ryvarden, L. 1988. Mycotaxon 31: 45-58.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Trametes pavonia* (Hook.) Ryvarden**
Voucher: Capelari, M. 1277 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Trametes pubescens* (Schumach.) Pilát**
Referência: Bononi, V.L.R. 1992. Hoehnea 19: 31-37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Trametes socotrana* Cooke**
Referência: Loguercio-Leite, C. 1993. Insula (22): 3-20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Trametes subectypa* (Murrill) Gilb. & Ryvarden**
Voucher: Bononi, V.L.R. s.n. (SP 381542)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Trametes versicolor* (L.) Lloyd**
Voucher: Teixeira, A.R. s.n. (SP 109490)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Trametes villosa* (Sw.) Kreisel**
Voucher: Gugliotta, A.M. 247 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Trichaptum

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Trichaptum abietinum* (Dicks.) Ryvarden**
Voucher: Fonsêca, M.P. 304 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Trichaptum biforme* (Fr.) Ryvarden**
Referência: Fidalgo, O. & Fidalgo, M.E.P.K. 1957. Arq. Mus. Nac. Rio de Janeiro 43: 157-188.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Trichaptum byssogenum* (Jungh.) Ryvarden**
Voucher: Capelari, M. 1717 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Trichaptum perrottetii* (Lév.) Ryvarden**
Voucher: Gugliotta, A.M. 1384 (SJRP, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Trichaptum sector* (Ehrenb.) Kreisel**
Voucher: Gugliotta, A.M. 40 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Tubulicrinis

1 espécie (não endêmica)
***Tubulicrinis chaetophorus* (Höhn.) Donk**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004. Synopsis Fungorum 18: 33-43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica

Tyromyces

9 espécies (3 endêmicas)
***Tyromyces atroalbus* (Rick) Rajchenb.**
Referência: Rajchenberg, M. 1987. Nordic J. Bot. 7: 553-568.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tyromyces crassisporus* Log.-Leite & J.E. Wright**
Voucher: Loguercio-Leite, C. 419 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Tyromyces duracinus* (Pat.) Murrill**
Voucher: Gugliotta, A.M. 433 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Tyromyces fumidiceps* G.F. Atk.**
Voucher: Fonsêca, M.P. 426 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal
***Tyromyces hypocitrinus* (Berk.) Ryvarden**
Referência: Ryvarden, L. 1984. Mycotaxon 20(2): 329-363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Tyromyces leucomallus* (Berk. & M.A.Curtis) Murrill**
Voucher: Capelari, M. 3093 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tyromyces pulcherrimus* (Rodway) G.Cunn.**
Referência: Meijer, A.A.R. 2006. Boletim do Museu Botânico Municipal 68: 1-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Tyromyces singeri* Ryvarden**
Referência: Ryvarden, L. 1987. Mycotaxon 28: 525-541.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tyromyces tephrus* (Pat.) Ryvarden**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 197-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Xenasma
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Xenasma pruinosum* (Pat.) Donk**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Xenasma pulverulentum* (Litsch.) Donk**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Xenasmatella
1 espécie (não endêmica)
***Xenasmatella vaga* (Fr.) Stalpers**
Referência: Nietiedt, S.A. & Guerrero, R.T. 2000. Iheringia, Bot. 54: 45-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

PUCCINIALES
Aníbal Alves de Carvalho Jr., Helen Maria Pontes Sotão
65 gêneros, 729 espécies (272 endêmicas), 25 variedades (5 endêmicas)

Achrotelium
1 espécie (não endêmica)
***Achrotelium lucumae* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Aecidium
67 espécies (43 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Aecidium alternantherae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Aecidium amazonense* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Aecidium annonae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido
***Aecidium aridum* Dietel & Neger**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Aecidium baccharidis* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Aecidium borreriicola* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Aecidium brasiliense* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (PB), Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido
***Aecidium byrsonimatis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Aecidium calosporum* Juel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Aecidium cephalanthi-peruviana* Henn.**
Referência: Sotão H.M.P. 2007. Micologia: Avanços no Conhecimento, p. 123.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Aecidium chrysanthum* Syd. & P.Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Domínio desconhecido
***Aecidium chuquiraguae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Aecidium circinatum* G. Winter**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Aecidium cordiae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Aecidium cornu-cervi* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Aecidium cyttarioides* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aecidium dalechampiicola* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido
***Aecidium domingensis* F.Kern & Cif.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido
***Aecidium duguetiae* (Hariot) Heydr.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Aecidium eupatorii* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS);
Mata Atlântica
***Aecidium glechonis* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Domínio desconhecido
***Aecidium goyazense* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Domínio desconhecido
***Aecidium guareae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM);
Domínio desconhecido
***Aecidium guatteriae* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido
***Aecidium holwayi* H.S. Jacks.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Aecidium invallatum* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO);
Domínio desconhecido
***Aecidium jacarandae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Domínio desconhecido
***Aecidium juruense* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);
Domínio desconhecido
***Aecidium kiehlianum* Viégas**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Aecidium lantanae* Mayor**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Domínio desconhecido
***Aecidium lindavianum* P.Syd & Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido
***Aecidium lippiae-sidoidis* Syd. & P.Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Aecidium loranthi* Thüm.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);
Domínio desconhecido
***Aecidium mabeae* Thurst.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido
***Aecidium maprouneae* Henn.**
Distribuição: nativa; endêmica
Aecidium maprouneae* Henn. var. *maprouneae
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Domínio desconhecido
***Aecidium maprouneae* var. *noncrassatum* J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP);
Domínio desconhecido
***Aecidium mattogrossense* Juel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Domínio desconhecido
***Aecidium mayteni* Pazschke**
Voucher: Ule, E.H.G. 9; 1910; 2262; 2676
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Aecidium meiapontense* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO);
Domínio desconhecido
***Aecidium melananthi* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aecidium microsporum* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Aecidium minimum* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Aecidium miryense* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2007. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);
Domínio desconhecido

***Aecidium momordicae* Juel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2007. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Domínio desconhecido

***Aecidium muelleri* Thurst.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Domínio desconhecido

***Aecidium nectandrae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Aecidium ochraceum* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Domínio desconhecido

***Aecidium pachycephalum* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Aecidium piptocarphae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Aecidium posoqueriae* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Aecidium pratae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

***Aecidium psychotriae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR);
Domínio desconhecido

***Aecidium randiae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),
Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Aecidium rickii* P. Syd & Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido

***Aecidium santanense* J.C. Lindq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

***Aecidium senecionis-acanthifolii* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

***Aecidium serjaniae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

***Aecidium steviae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aecidium struthanthi* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Aecidium tournefortiae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Aecidium tubiforme* Dietel & Neger**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido

***Aecidium ulei* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aecidium usterianum* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Aecidium vernoniae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Aecidium vinnulum* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP);
Domínio desconhecido

***Aecidium wulffiae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aecidium xanthoxylinum* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Domínio desconhecido

***Aecidium xylopiae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Anthomyces
1 espécie (1 endêmica)
***Anthomyces brasiliensis* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

Aplopsora
1 espécie (1 endêmica)
***Aplopsora hennenii* Dianese & L.T.P. Santos**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Apra
1 espécie (não endêmica)
***Apra bispora* J.F. Hennen & F.O. Freire**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Arthuria
2 espécies (2 endêmicas)
***Arthuria catenulata* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Arthuria demicycla* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

Atelocauda
1 espécie (não endêmica)
***Atelocauda incrustans* Arthur & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

Batistopsora
1 espécie (não endêmica)
***Batistopsora crucis-filii* Dianese**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Botryorhiza
1 espécie (não endêmica)
***Botryorhiza hippocrateae* Whetzel & Olive**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

Calidion
1 espécie (1 endêmica)
***Calidion lindsaeae* (Henn.) Syd. & P. Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

Catenulopsora
3 espécies (1 endêmica)
***Catenulopsora henneneae* Buriticá**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Catenulopsora petrea* Pardo-Cardona**
Voucher: Hennen, J.F. 88-136 (IBI 16242)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Catenulopsora praelonga* (Speg.) Buriticá**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

Cerotelium
9 espécies (6 endêmicas)
***Cerotelium coccolobae* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido
***Cerotelium ficicola* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Cerotelium figueiredeae* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Cerotelium giacomettii* Dianese**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Cerotelium mariae* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

***Cerotelium nuxae* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido
***Cerotelium rectangulata* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Domínio desconhecido
***Cerotelium sabiceae* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Cerotelium xylopiae* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Domínio desconhecido

Cerradoa

1 espécie (não endêmica)
***Cerradoa palmaea* J.F. Hennen & Y. Ono**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Chaconia

5 espécies (1 endêmica)
***Chaconia alutacea* Juel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Domínio desconhecido
***Chaconia braziliensis* Y. Ono & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Chaconia hennenii* Berndt**
Voucher: (IBI 16250; 18518)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Chaconia ingae* (Syd.) Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PB), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Chaconia maprouneae* (Viégas) Y.Ono & J.F.Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Chrysocyclus

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Chrysocyclus cestri* (Dietel & Henn.) Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Chrysocyclus mikaniae* (Arthur) Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido

Cionothrix

2 espécies (1 endêmica)
***Cionothrix praelonga* (G.Winter) Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Cionothrix usneoides* (Henn.) Syd. & P. Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido

Coleosporium

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Coleosporium asterum* (Dietel) Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Coleosporium clematidis* Barclay**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Coleosporium ipomoeae* Burrill**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Coleosporium plumeriae* Pat. & Har.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Coleosporium tussilaginis* (Pers.) Lév.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Coleosporium vernoniae* Berk. & Curt.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

Crossopsora

10 espécies (2 endêmicas)
***Crossopsora angusta* Jorst.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Crossopsora asclepidiaceae* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Crossopsora bixae* Buriticá**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Domínio desconhecido
***Crossopsora byrsonimatis* (Henn.) R.S.Peterson**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Crossopsora crassa* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Crossopsora hymenaeae* Dianese**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Crossopsora mateleae* W.T. Dale**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Crossopsora notata* (Arthur & J.R.Johnst.) Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Crossopsora piperis* Berndt**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Crossopsora uleana* (Syd. & P.Syd.) R.S.Peterson**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Domínio desconhecido

Cumminsiella

1 espécie (1 endêmica)
***Cumminsiella santa* J.W. McCain & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

Dasyspora

1 espécie (não endêmica)
***Dasyspora gregaria* (Kunze) Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

Desmella

1 espécie (não endêmica)
***Desmella anemiae* Syd. & P.Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

Desmosorus

1 espécie (não endêmica)
***Desmosorus oncidii* Ritschel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

Diabole

1 espécie (não endêmica)
***Diabole cubensis* (Arthur & J.R.Johnst.) Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido

Dicheirinia

7 espécies (2 endêmicas)
***Dicheirinia antunesii* A.A.Carvalho & J.F.Hennen**
Referência: Carvalho-Jr., A.A. & Hennen, J.F. 2008. Mycologia 100: 776.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS); Domínio desconhecido
***Dicheirinia archeri* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido
***Dicheirinia guianensis* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Domínio desconhecido
***Dicheirinia manaosensis* (Henn.) Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Domínio desconhecido
***Dicheirinia ormosiae* (Arthur) Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido
***Dicheirinia solenoides* (Henn.) Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido
***Dicheirinia superba* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

Didymopsora
3 espécies (3 endêmicas)
***Didymopsora chuquiraguae* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Didymopsora solani-argentei* (Henn.) Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Didymopsora triumfettae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Dietelia
1 espécie (1 endêmica)
***Dietelia duguetiae* (Thurst.) Buriticá & J.F.Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Diorchidiella
2 espécies (1 endêmica)
***Diorchidiella australis* (Speg.) J.C.Lindq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Diorchidiella verlandii* F.A.Ferreira & A.O.Carvalho**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Diorchidium
4 espécies (3 endêmicas)
***Diorchidium acanthostephum* Syd. & P.Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Domínio desconhecido
***Diorchidium amapaensis* J.F. Hennen & Sotão**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Domínio desconhecido
***Diorchidium copaiferae* (P.Syd. & Syd.) Cummins & Y.Hirats.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Diorchidium puiggarii* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

Dipyxis
1 espécie (1 endêmica)
***Dipyxis viegasii* (Jorst.) Cummins & J.W.Baxter**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Domínio desconhecido

Endophyllum
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Endophyllum circumscriptum* Whetzel & Olive**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Endophyllum stachytarphetae* Whetzel & Olive**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

Esalque
1 espécie (1 endêmica)
***Esalque holwayi* (H.S.Jacks.) J.F.Hennen et al.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

Frommeëlla
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Frommeëlla mexicana* (Mains) J.W. McCain & J.F.Hennen**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Frommeëlla mexicana* var. *indica* J.W. McCain & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Hemileia
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hemileia colombiana* Buriticá**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Hemileia vastatrix* Berk. & Broome**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Domínio desconhecido

Intrapes
1 espécie (1 endêmica)
***Intrapes paliformis* J.F. Hennen & Figueiredo**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Kimuromyces
1 espécie (não endêmica)
***Kimuromyces cerradensis* Dianese et al.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Kuehneola
1 espécie (não endêmica)
***Kuehneola loeseneriana* (Arthur) H.S.Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Kweilingia
1 espécie (não endêmica)
***Kweilingia divina* (Syd.) Buriticá**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

Leptinia
1 espécie (não endêmica)
***Leptinia brasiliensis* Juel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO, MS); Domínio desconhecido

Malupa
1 espécie (1 endêmica)
***Malupa condylocarpi* (H.S.Jacks. & Holw.) Buriticá & J.F.Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Maravalia
8 espécies (6 endêmicas)
***Maravalia amazonensis* (F.C.Albuq.) Y.Ono**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido
***Maravalia bauhiniicola* (Cummins) Y.Ono**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO, MS); Domínio desconhecido
***Maravalia erythroxyli* (Viégas) Y.Ono & J.F.Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Maravalia lucumae* (Dietel) Y.Ono**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Maravalia palaquii* (Cummins) Y.Ono**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Maravalia perae* A.A.Carvalho & J.F.Hennen**
Referência: Carvalho-Jr., A.A. & Hennen, J.F. 2009. Mycologia 101: 239.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Maravalia sebastianiae* J.C. Lindq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Maravalia swartziae* Y. Ono**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido

Melampsora
8 espécies (nenhuma endêmica)
***Melampsora epitea* Thüm.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Melampsora euphorbiae* (C.Schub.) Castagne**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Melampsora hypericorum* G.Winter**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Melampsora larici-populina* Kleb.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Melampsora lini* (Ehrenb.) Lév.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Melampsora medusae* Thüm.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Melampsora occidentalis* H.S. Jacks.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Melampsora populnea* (Pers.) P.Karst.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido

Milesia

1 espécie (1 endêmica)
***Milesia crotalariae* (Dietel) Y.Ono**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

Olivea

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Olivea capituliformis* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Olivea viticis* Y. Ono & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido

Phakopsora

29 espécies (8 endêmicas)
***Phakopsora apoda* (Har. & Pat.) Mains**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Phakopsora arrabidaeae* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Phakopsora arthuriana* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, PE), Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Phakopsora bauhiniicola* Y. Ono**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Phakopsora butleri* Dianese et al.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Phakopsora cameliae* (Arthur) Buriticá**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Phakopsora chavesii* Dianese et al.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Phakopsora cheoana* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Phakopsora coca* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Phakopsora colubrinae* Viégas**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Phakopsora compressa* (Arthur & Holw.) Buriticá & J.F.Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido
***Phakopsora crotonis* (Burrill) Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Phakopsora cupheae* Buriticá**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Phakopsora euvitis* Y. Ono**
Referência: Souza, N.S. 2004. Fitopatologia brasileira 29: 226.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Phakopsora gossypii* (Lagerh.) N.Hirats.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil Fitopatologia brasileira.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Phakopsora meibomiae* (Arthur) Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Phakopsora melaena* Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (MS); Domínio desconhecido
***Phakopsora nishidana* S.Ito *ex* S.Ito & Homma**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

***Phakopsora pachyrhizi* Syd. & P. Syd.**
Referência: Yorinori et al. 2002. Fitopatologia brasileira 27(supl.):S178.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Phakopsora pavida* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Phakopsora phakopsoroides* (Arthur & Mains) Buriticá & J.F.Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Phakopsora rossmaniae* Dianese**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Phakopsora tecta* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Phakopsora tijucae* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Phakopsora tocoyenae* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Phakopsora tomentosae* F.A.Ferreira & Gasparotto**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phakopsora ulei* (Syd. & P.Syd.) Buriticá & J.F.Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido
***Phakopsora zeae* (Mains) Buriticá**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Phakopsora zizyphi-vulgaris* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (SP); Domínio desconhecido

Phragmidiella

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Phragmidiella bignoniacearum* (W.T.Dale) Buriticá & J.F.Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido
***Phragmidiella holwayi* (H.S.Jacks.) Buriticá**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido
***Phragmidiella minuta* (Arthur) Buriticá & J.F.Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Phragmidiella paulista* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Domínio desconhecido

Phragmidium

1 espécie (não endêmica)
***Phragmidium mucronatum* (Pers.) Schltdl.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Porotenus

4 espécies (2 endêmicas)
***Porotenus bibasiporulus* J.F. Hennen & Sotão**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Porotenus biporus* J.F. Hennen & Sotão**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Porotenus concavus* Viégas**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Porotenus memorae* F.C.Albuq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Prospodium

30 espécies (13 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Prospodium amapaensis* J.F. Hennen & Sotão**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Domínio desconhecido
***Prospodium anemopaegmatis* (Henn.) Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Prospodium anomalum* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Prospodium appendiculatoides* (Henn.) Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido

***Prospodium appendiculatum* (G.Winter) Arthur**
Distribuição: nativa; não endêmica

Prospodium appendiculatum* (G.Winter) Arthur var. *appendiculatum
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Prospodium arrabidaeae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Prospodium bicolor* F.A.Ferreira & J.F.Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Prospodium bicristatum* Berndt & F.O.Freire**
Referência: Berndt, R. & Freire, F. 2007. Mycological Progress 6: 29.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Domínio desconhecido

***Prospodium bignoniacearum* (Speg.) Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Prospodium compressum* (Dietel) Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Prospodium cremastum* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Prospodium cyathiforme* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Prospodium elegans* (Schröt.) Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Prospodium evernium* Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido

***Prospodium holwayi* H.S. Jacks.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Prospodium impolitum* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Prospodium laevigatum* J.F. Hennen & Sotão**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido

***Prospodium lippiae* (Speg.) Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Prospodium lundiae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Prospodium palmatum* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Domínio desconhecido

***Prospodium paraguayense* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Prospodium peruvianum* P.Syd & Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Prospodium pithecoctenii* (Pazschke) Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido

***Prospodium reticulatum* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Prospodium singeri* Petr.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Prospodium stizophylli* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Prospodium tecomicola* (Speg.) H.S.Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Prospodium tuberculatum* (Speg.) Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Prospodium venezuelanum* F. Kern**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Domínio desconhecido
P***rospodium vonguntenii* (Mayor) Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

Puccinia

252 espécies (64 endêmicas), 17 variedades (nenhuma endêmica)
***Puccinia abnormis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Puccinia achyroclines* (Henn.) H.S.Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido
***Puccinia agnitionalis* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia albula* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia alia* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia allaudabilis* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia allii* F. Rudolphi**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Puccinia angustatoides* R.Stone**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Puccinia anthephorae* Arthur & J.R. Johnst.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Puccinia antirrhini* Dietel & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Puccinia apii* Desm.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido
***Puccinia arachidis* Speg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Puccinia arachidis* Speg. var. *arachidis
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Puccinia arachidis* var. *offuscata* (Arthur) Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia araujae* Lèveillé**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido
***Puccinia arechavaletae* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Puccinia aspiliae* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Puccinia azteca* Cummins & J.F.Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Puccinia baccharidicola* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia baccharidis* Dietel & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia baccharidis-cassinoides* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Puccinia baccharidis-multiflorae* Dietel & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia bambusarum* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Domínio desconhecido
***Puccinia banisteriae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Puccinia barbatula* Arthur & J.R. Johnst.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Puccinia becki* Mayor**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia berberidis* Mont.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Puccinia bergii* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Puccinia boehmeriae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Puccinia bomareae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Puccinia bonariensis* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Puccinia boutelouae* (H.S.Jenn.) Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE); Domínio desconhecido
***Puccinia brachypodii* G.H. Otth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Puccinia brachypodii* var. *arrhenatheri* (Kleb.) Cummins & H.C.Greene**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Puccinia brachypodii* var. *poae-nemoralis* (G.H.Otth) Cummins & H.C.Greene**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Puccinia brachypodii-phoenicoidis* Guyot & Malençon**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Puccinia brachypodii-phoenicoidis* var. *chisosana* (Cummins) Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (PR); Domínio desconhecido
***Puccinia buchnerae* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Puccinia cacabata* Arthur & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Puccinia caleae* Arthur**
Distribuição: nativa; não endêmica
Puccinia caleae* Arthur var. *caleae
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Puccinia callosa* Jorst.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
***Puccinia canaliculata* (Schwein.) Lagerh.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia cavatica* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Puccinia caxiuanensis* Sotão**
Referência: Hennen, J.F. et al. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido
***Puccinia cenchri* Dietel & Holw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Puccinia cenchri* Dietel & Holw. var. *cenchri
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia chaetochloae* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Puccinia chloridis* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia circinans* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Puccinia claviformis* Lagerh.**
Referência: Hennen, J.F. et al. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Domínio desconhecido

***Puccinia coccocypseli* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

***Puccinia commelinae* Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Domínio desconhecido

***Puccinia concrescens* Ellis & Everh.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP);
Domínio desconhecido

***Puccinia conformata* Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

***Puccinia congesta* Berk. & Broome**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Puccinia conspersa* Dietel**
Distribuição: nativa; não endêmica

Puccinia conspersa* Dietel var. *conspersa
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia consulta* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Domínio desconhecido

***Puccinia conyzae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia cordiae* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Puccinia coronata* Corda**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia crassipes* Berk. & Curt.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia crepidis-japonicae* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Puccinia cucumeris* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PE, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia cunilae* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia cymbopogonis* Massee**
Referência: Vida, J.B. et al. 2006.
Summa Phytopathologica 32: 89.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR); Domínio desconhecido

***Puccinia cynanchi* Berk. & Curt.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Domínio desconhecido

***Puccinia cynodontis* Lacroix *ex* Desm.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Domínio desconhecido

***Puccinia cyperi* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB, AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia cyperi-tegetiformis* F.Kern**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, AL);
Domínio desconhecido

***Puccinia deformata* Berk. & Curt.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA);
Domínio desconhecido

***Puccinia deprecanea* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

***Puccinia destruens* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO);
Domínio desconhecido

***Puccinia dichondrae* Mont.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia dichorisandrae* (Henn.) J.F.Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Puccinia dioicae* Magnus**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia dolosa* Arthur & Fromme**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Puccinia dolosa* var. *circumdata* Ramachar & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Puccinia dolosa* Arthur & Fromme var. *dolosa
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia erianthicola* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia esclavensis* Dietel & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Puccinia eupatorii* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia eupatorii-columbiani* Mayor**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia evadens* Harkn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia exilis* Syd. & P.Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Puccinia exornata* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Domínio desconhecido

***Puccinia faceta* Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido

***Puccinia fallax* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Puccinia farameae* F.Kern**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Puccinia farinacea* Long**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia fausta* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia filopes* Arthur & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Puccinia fimbristylidis* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia flavo-virens* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Puccinia fuchsiae* Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Puccinia fuirenicola* F. Kern**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia fundata* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia gesneracearum* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido

***Puccinia gnaphaliicola* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Domínio desconhecido

P***uccinia gouaniae*** **Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

Puccinia graminella **Dietel & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

Puccinia graminis **Pers.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Puccinia griseliniae **Pazschke**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

Puccinia guaranitica **Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Puccinia gymnopogonicola **J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Domínio desconhecido

Puccinia gymnothrichis **Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Puccinia helianthi **Schwein.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Domínio desconhecido

Puccinia heliconiae **Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PB), Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

Puccinia heliocarpi **P.Syd & Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Puccinia henningsii **Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

Puccinia heteropteridis **Thüm.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Domínio desconhecido

Puccinia heterospora **Berk. & Curt.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

Puccinia hieracii **(Röhl.) H.Mart.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido

Puccinia hordei **G.H.Otth**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Puccinia horiana **Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Domínio desconhecido

Puccinia huberi **Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Domínio desconhecido

Puccinia hydrocotyles **Cooke**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Puccinia hyptidis-mutabilis **Mayor**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

Puccinia ichnanthi **Mains**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

Puccinia immaculata **Juel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Puccinia impetrabilis **H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

Puccinia improcera **H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Puccinia improvisa **H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia inaequata* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Domínio desconhecido

***Puccinia inclita* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia inconspicua* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia indagata* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia infuscans* Arthur & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia inrecta* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Puccinia insititia* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido

***Puccinia insueta* G.Winter**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia invaginata* Arthur & J.R. Johnst.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Puccinia irregularis* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia itatiayensis* J.C. Lindq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia joannesiae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the s pecies of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia joerstadiana* J.C. Lindq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia jungiae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Domínio desconhecido

***Puccinia jussiaeae* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia justiciae* Puttemans**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia lantanae* Farl.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia lateritia* Berk. & Curt.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia leonotidicola* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia leptochloae* Arthur & Fromme**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia levis* (Sacc. & Bizz.) Magnus**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Puccinia levis* var. *goyazensis* (Henn.) Ramachar & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

Puccinia levis* (Sacc. & Bizz.) Magnus var. *levis
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia levis* var. *panici-sanguinalis* (Rangel) Ramachar & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia levis* var. *tricholaenae* (Syd. & P.Syd.) Ramachar & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia liberta* F.Kern**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Puccinia lisianthi* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Puccinia lithospermi* Ellis & Kellerm.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE), Sudeste (RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia lobata* Berk. & Curt.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido

***Puccinia lorentzii* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia lygodii* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ);
Domínio desconhecido

***Puccinia macropoda* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido

***Puccinia malvacearum* Bertero *ex*. Mont.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia marisci* Mayor**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Domínio desconhecido

***Puccinia medellinensis* Mayor**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia melanocephala* Syd. & P.Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Puccinia melanosora* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

***Puccinia melantherae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC);
Domínio desconhecido

***Puccinia menthae* Pers.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Domínio desconhecido

***Puccinia meyeri-alberti* Magnus**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia microspora* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Domínio desconhecido

***Puccinia mikaniae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia mikanifolia* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ),
Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia millegranae* Cummins**
Referência: Carvalho-Jr. A.A. et al 2004. Hoehnea 31: 316.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Domínio desconhecido

***Puccinia minuta* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Domínio desconhecido

***Puccinia modica* Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

***Puccinia mogiphanis* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia nassellae* Arthur & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Domínio desconhecido

***Puccinia negrensis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Puccinia neohyptidis* Laundon**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);
Domínio desconhecido

***Puccinia neorotundata* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia niederleinii* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia noackii* P. Syd & Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

***Puccinia oahuensis* Ellis & Everh.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS);
Domínio desconhecido

***Puccinia obliquo-septata* Vienn.-Bourg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido

***Puccinia obrepta* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB);
Domínio desconhecido

***Puccinia obvoluta* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia ocellifera* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido

***Puccinia oldenlandiicola* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Domínio desconhecido

***Puccinia oncidii* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

***Puccinia oxalidis* Dietel & Ellis**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia palicoureae* Mains**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Domínio desconhecido

***Puccinia pallidissima* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

***Puccinia pampeana* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia paraensis* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido

***Puccinia paranahybae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia pelargonii-zonalis* Doidge**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Puccinia peperomiae* J.C. Lindq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia pertrita* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

***Puccinia pestibilis* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido

***Puccinia phragmitis* (Schumach.) Körn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido

***Puccinia pilocarpi* Cooke**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia pindoramae* Viégas**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

***Puccinia pinguis* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Puccinia piptocarphae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Puccinia piptochaetii* Dietel & Neger**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Puccinia pitcairniae* Lagerh.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Puccinia poarum* E. Nielsen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido
***Puccinia polygoni-amphibii* Pers.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Puccinia polypogonis* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Puccinia polysora* Underw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Puccinia porophylli* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Puccinia posadensis* Sacc. & Trotter**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Puccinia praeculta* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Puccinia praedicta* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia procerula* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia proluviosa* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Puccinia promatensis* Berndt**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Puccinia pseudoatra* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia psidii* G.Winter**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido
***Puccinia psychotriae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido
***Puccinia pterocauli* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Puccinia pulverulenta* Grev.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Domínio desconhecido
***Puccinia purpurea* Cooke**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (RN, PB, SE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Puccinia puta* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS); Domínio desconhecido
***Puccinia puttemansii* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia recondita* Roberge *ex* Desm.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia rouliniae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia ruderaria* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia sanguinolenta* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Puccinia schedonnardi* Kellerm. & Swingle**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia schileana* Speg.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Puccinia schileana* var. *partheniicola* (H.S.Jacks.) J.C.Lindq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Domínio desconhecido

***Puccinia scleriae* (Pazschke) Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia scutiae* J.C. Lindq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia semiinsculpta* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Puccinia seorsa* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Domínio desconhecido

***Puccinia sessilis* Schneid.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia sherardiana* Koernicke**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia simasii* Rangel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia solani-tristis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Puccinia sorghi* Schwein.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia sparganioides* Ellis & Barthol.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

***Puccinia spegazzinii* De Toni**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia spigeliae* Syd. & P.Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Domínio desconhecido

***Puccinia spilanthicola* Mayor**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia straminea* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia striiformis* Westend.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido

***Puccinia stylosanthis* (Henn.) Viégas**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Puccinia subcoronata* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Puccinia substriata* Ellis & Barthol.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Puccinia tageticola* Dietel & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Puccinia tanaceti* DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Puccinia tanaceti* var. *dracunculina
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
Puccinia tanaceti* DC. var. *tanaceti
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia tessariae* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido
***Puccinia thaliae* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Puccinia tuyutensis* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Puccinia uleana* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido
***Puccinia urbaniana* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia valentula* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia varia* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia varioides* Jorst.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Puccinia velata* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia veniabilis* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Puccinia verbeniphila* J.C. Lindq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido
***Puccinia verbesinae-dentatae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia vernoniphila* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Puccinia versicolor* Dietel & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Puccinia vincae* Berk.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Puccinia vinulla* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Puccinia virgata* Ellis & Everh.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Puccinia wedeliicola* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Puccinia xanthii* Schwein.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Puccinia zoysiae* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

Pucciniastrum

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Pucciniastrum agrimoniae* (Dietel) Tranzschel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Pucciniastrum americanum* (Farl.) Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Pucciniastrum goeppertianum* (Kuehn) Kleb.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

Pucciniosira

2 espécies (1 endêmica)

***Pucciniosira holwayi* H.S. Jacks.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Pucciniosira pallidula* (Speg.) Lagerh.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

Ravenelia

43 espécies (28 endêmicas)

***Ravenelia armata* Syd. & P.Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Domínio desconhecido

***Ravenelia atrocrustacea* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB); Domínio desconhecido

***Ravenelia bahienses* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

***Ravenelia bakeriana* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Ravenelia bezerrae* Dianese**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Domínio desconhecido

***Ravenelia cassiaecola* Atkinson**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Ravenelia cebil* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Ravenelia cenostigmatis* Berndt & F.O.Freire**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Domínio desconhecido

***Ravenelia cerradensis* Resende & Dianese**
Referência: Resende D.V. & Dianese J.C. 2001. Fitopatologia brasileira 26: 628.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido

***Ravenelia cohniana* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Ravenelia comptula* Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Ravenelia corbuloides* J.F. Hennen & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Domínio desconhecido

***Ravenelia dentifera* J.F. Hennen & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Ravenelia dieteliana* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Ravenelia fimbriata* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Ravenelia geminipora* J.F. Hennen & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Ravenelia goyazensis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido

***Ravenelia henningsiana* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Ravenelia hieronymi* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Ravenelia idonea* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Ravenelia indigoferae* Tranzschel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Ravenelia lata* J.F. Hennen & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Ravenelia lonchocarpi* Lagerh. & Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Ravenelia macrocarpa* Syd. & P.Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Ravenelia microcystis* Pazschke**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Ravenelia microspora* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Ravenelia mimosae-sensitivae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Ravenelia pazschkeana* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Ravenelia pernigra* J.F. Hennen & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Ravenelia pileolarioides* Syd. & P.Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB); Domínio desconhecido
***Ravenelia pithecellobii* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Domínio desconhecido
***Ravenelia platensis* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Ravenelia rata* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Ravenelia rioensis* J.F. Hennen & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Ravenelia santos-costae* Dianese**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Domínio desconhecido
***Ravenelia septata* J.F. Hennen & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Ravenelia simplex* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Ravenelia spegazziniana* J.C. Lindq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Domínio desconhecido
***Ravenelia spiralis* J.F. Hennen & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Ravenelia sydowiana* Rick**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Ravenelia tessellata* J.F. Hennen & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido
***Ravenelia tortuosa* J.F. Hennen & Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Ravenelia uleana* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Domínio desconhecido

Skierka

2 espécies (1 endêmica)
***Skierka cristata* Mains**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Skierka divinopolensis* Dianese**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Sphaerophragmium

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sphaerophragmium acaciae* (Cooke) Magnus**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido
***Sphaerophragmium silveirae* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

Sphenospora

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Sphenospora kevorkianii* Linder**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Sphenospora mera* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Domínio desconhecido
***Sphenospora pallida* (G.Winter) Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido
***Sphenospora saphena* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Domínio desconhecido
***Sphenospora smilacina* Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PB), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

Spumula

1 espécie (não endêmica)
***Spumula debile* (P.Syd. & Syd.) Lohsomb.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

Tranzschelia

1 espécie (não endêmica)
***Tranzschelia discolor* (Fuckel) Tranzschel & Litvinov**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Uncol

1 espécie (não endêmica)
***Uncol diazii* Buriticá & P.A. Rod.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

Uredinopsis

1 espécie (não endêmica)
***Uredinopsis pteridis* Dietel & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

Uredo

73 espécies (41 endêmicas)
***Uredo agnostoica* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Uredo alagoinhensis* Urb.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA);
Domínio desconhecido
***Uredo alchorneae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);
Domínio desconhecido
***Uredo alemquerensis* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA);
Domínio desconhecido
***Uredo amapaensis* J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F & Sotão, H.M.P. 1996. Sida 17: 179.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA);
Domínio desconhecido
***Uredo amazonensis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);
Domínio desconhecido
***Uredo amazonica* (Syd.) J.W.Baxter**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC);
Domínio desconhecido
***Uredo anthurii* (Har.) Sacc.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Uredo baccharidicola* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

***Uredo bomfimensis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM);
Domínio desconhecido
***Uredo borreriae* (Henn.) F.Kern & Whetzel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (CE, PB), Sudeste (MG, SP, RJ);
Domínio desconhecido
***Uredo cajani* Syd. & P.Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Uredo carnosa* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Uredo cassiae-rugosae* Thurst.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido
***Uredo centrosemae* Viégas**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Uredo chrysophylli* Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA);
Domínio desconhecido
***Uredo chrysophyllicola* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Uredo confluens* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido
***Uredo consanguinea* Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Domínio desconhecido
***Uredo crotalariae-vitellinae* Rangel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido
***Uredo cypericola* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (CE); Domínio desconhecido
***Uredo cyrtantherae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Uredo dalbergiae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT, GO), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Uredo dioscoreicola* F.Kern**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);
Domínio desconhecido
***Uredo dombeyae* J.C. Lindq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Uredo eriosemae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Uredo eupatoriicola* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);
Domínio desconhecido
***Uredo gayanae* J.C. Lindq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Uredo glechonis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido
***Uredo goeldii* R.T.Almeida**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA);
Domínio desconhecido
***Uredo guarapiensis* Speg.**
Referência: Sotão H.M.P. 2007. Micologia: Avanços no Conhecimento 1: 127.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA);
Domínio desconhecido
***Uredo gynandrearum* Corda**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Uredo hypoxidis* (Bres.) Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido
***Uredo hyptidis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Domínio desconhecido

***Uredo ierensis* W.T. Dale**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB);
Domínio desconhecido
***Uredo illaudanda* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Uredo juruensis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Uredo kyllingiae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Uredo laeticolor* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Uredo lafoenseae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Uredo licaniae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO);
Domínio desconhecido
***Uredo longipedis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO);
Domínio desconhecido
***Uredo lueheae* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Domínio desconhecido
***Uredo lynchii* (Berk.) Plow.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido
***Uredo maceiensis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),
Nordeste (AL); Domínio desconhecido
***Uredo machaerii* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido
***Uredo mararyensis* Henn.**
Referência: Hennings, p. 1904. Hedwigia 43: 163.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP);
Domínio desconhecido
***Uredo microtheles* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Uredo mimosae-invisae* Viégas**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB);
Domínio desconhecido
***Uredo monsterae* Syd.**
Voucher: Sotão, H. 97-381 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Domínio desconhecido
***Uredo myrsines* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil Helen Sotão.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido
***Uredo neopustulata* Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido
***Uredo nicotianae* Anastasia et al.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Domínio desconhecido
***Uredo nidularii* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido
***Uredo nociviola* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Uredo oncidii* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Uredo palliduscula* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Uredo paulistana* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Uredo peribebuyensis* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido
***Uredo pithecolobii* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO);
Domínio desconhecido

***Uredo psychotriicola* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Uredo reissekiae* Syd. & P.Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido
***Uredo rolliniae* W.T. Dale**
Referência: Sotão H.M.P. 2007. Micologia: Avanços no Conhecimento 1: 127.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA);
Domínio desconhecido
***Uredo salviae* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC);
Domínio desconhecido
***Uredo seclusa* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido
***Uredo sparganophori* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Domínio desconhecido
***Uredo tenebrosa* H.S. Jacks.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR);
Domínio desconhecido
***Uredo tephrosiicola* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC);
Domínio desconhecido
***Uredo torulini* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Domínio desconhecido
***Uredo trichiliae* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido
***Uredo ulei* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);
Domínio desconhecido
***Uredo valentula* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido
***Uredo viegasii* Jorst.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

Uredopeltis

1 espécie (1 endêmica)
***Uredopeltis guettardae* Buriticá & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Domínio desconhecido

Uromyces

102 espécies (32 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)
***Uromyces actinostemonis* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido
***Uromyces alstroemeriae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Domínio desconhecido
***Uromyces anguriae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Domínio desconhecido
***Uromyces anthemophilus* Vestergr.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Domínio desconhecido
***Uromyces anthyllidis* J. Schröt.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Uromyces appendiculatus* Pers.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido
***Uromyces asclepiadis* Cooke**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido
***Uromyces aspiliae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido
***Uromyces bauhiniae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ);
Domínio desconhecido
***Uromyces belemensis* Albuq. & M.M. Figueiredo**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA);
Domínio desconhecido

***Uromyces bidenticola* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Uromyces bidentis* Lagerh.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, AL), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces blainvilleae* Berk.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces bomareae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces bonariensis* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Uromyces bradburyae* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Uromyces brasiliensis* Trotter**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Uromyces carthagenensis* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Uromyces castaneus* P.Syd & Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces celosiae* Dietel & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces celtidis* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Uromyces cestri* Mont.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces circumscriptus* Neger**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces cisneroanus* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces clarus* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Uromyces clignyii* Pat. & Har.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Uromyces cnidoscoli* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS); Domínio desconhecido

***Uromyces commelinae* Cooke**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

***Uromyces costaricensis* Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces crotalariae* (Arthur) J.W.Baxter**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces dactyloctenii* Wakef. & Hansf.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Uromyces desmodiicola* Jorst.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Uromyces desmodiicola* var. *desmodii* Almeida**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Uromyces desmodiicola* Jorst. var. *desmodiicola
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Uromyces dianthi* Pers.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Uromyces dietelianus* Pazschke**
Distribuição: nativa; não endêmica
Uromyces dietelianus* Pazschke var. *dietelianus
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Uromyces dietelianus* var. *nervicola* Almeida**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido
***Uromyces dolichosporus* Dietel & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Uromyces emmeorhizae* Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Uromyces eragrostidis* Tracy**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Uromyces euphorbiae* Cooke & Peck**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Uromyces floralis* Vestergr.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Uromyces floscopae* Syd. & P.Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PB); Domínio desconhecido
***Uromyces foveolatus* Juel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Uromyces geranii* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Uromyces goyazensis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP); Domínio desconhecido
***Uromyces hedysari-paniculati* (Schwein.) Farl.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Uromyces hemmendorfii* Vestergr.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Uromyces herterianus* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Uromyces heterantherae* P.Syd & Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Uromyces holmbergii* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Uromyces induratus* Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Uromyces insignis* P.Syd & Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Uromyces ipatingae* F.A.Ferreira & Y.Hirats.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Uromyces jatrophae* Dietel & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE), Sudeste (SP), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Uromyces lathyrinus* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Uromyces loranthi* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Uromyces manihoticola* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Uromyces manihotis* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces manihotis-catingae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Uromyces megalospermus* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido

***Uromyces mikaniae* Viégas**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Uromyces myrsines* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

***Uromyces neurocarpi* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces niteroyensis* Rangel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Uromyces novissimus* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Uromyces oblectaneus* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces occultus* J.C. Lindq.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Uromyces orbicularis* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Uromyces pegleriae* Pole-Evans *ex* Syd.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Uromyces peraffinis* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces pereskiae* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces perlebiae* Vestergr.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido

***Uromyces pisi* (DC.) G.H. Otth**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Uromyces platensis* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Uromyces polymniae* Dietel & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Uromyces pontederiae* Gerard**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

***Uromyces pratiae* Speg.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Uromyces psychotriae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido

***Uromyces purus* (Syd.) Cummins**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces ratus* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido

***Uromyces regius* Vestergr.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Uromyces rhynchosporae* Ellis**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Uromyces rumicis* (Schumach.) G.Winter**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido

***Uromyces scleriae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Uromyces setariae-italicae* Yoshino**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PB, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Uromyces silphii* Arthur**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Uromyces spermacoces* (Schwein.) M.A.Curtis**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Uromyces striatus* J. Schröt.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Uromyces tener* J. Schröt.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Uromyces tolerandus* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Domínio desconhecido
***Uromyces transversalis* G.Winter**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Uromyces trichoclines* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Uromyces trifolii-repentis* Liro**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Uromyces triquetrus* Cooke**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Uromyces uleanus* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido
***Uromyces unionensis* Viégas**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Domínio desconhecido
***Uromyces urbanianus* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Uromyces viciae-fabae* J. Schröt.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Uromyces vicinus* H.S. Jacks. & Holw.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Uromyces viçosensis* Almeida**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Uromyces viegasii* Almeida**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Uromyces vignae* Barclay**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, PE), Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Uromyces wulffiae* Henn.**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Domínio desconhecido
***Uromyces wulffiae-stenoglossae* Dietel**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, PB), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

Uromycladium

1 espécie (não endêmica)
***Uromycladium alpinum* McAlpine**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Uropyxis

1 espécie (não endêmica)
***Uropyxis rickiana* Magnus**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (SC); Domínio desconhecido

Ypsilospora
1 espécie (não endêmica)
***Ypsilospora tucumanensis* J.R. Hernández & J.F. Hennen**
Referência: Hennen, J.F. et al. 2005. Catalogue of the species of plant rust fungi (Uredinales) of Brazil, p. 1-490.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

RUSSULALES
Maria Alice Neves, Rosa Mara Borges da Silveira, Clarice Loguercio Leite, Marisa Campos Santana, Elisandro Ricardo Drechsler-Santos
18 gêneros, 46 espécies (6 endêmicas)

Aleurodiscus
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Aleurodiscus aurantius* (Pers.) J.Schröt.**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 13.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Aleurodiscus mirabilis* (Berk. & M.A.Curtis) Höhn.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 57.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Amylosporus
1 espécie (não endêmica)
***Amylosporus bracei* (Murrill) A.David & Rajchenb.**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

Asterostroma
6 espécies (3 endêmicas)
***Asterostroma cervicolor* (Berk. & M.A.Curtis) Massee**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 25.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Asterostroma chromoluteum* Rick**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 25.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Asterostroma fulvum* Romell**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Asterostroma muscicola* (Berk. & M.A.Curtis) Massee**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 7.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Asterostroma olivaceum* Rick**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 26.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Asterostroma sordidum* Rick**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 26.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Auriscalpium
1 espécie (não endêmica)
***Auriscalpium villipes* (Lloyd) Snell & E.A. Dick**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004. Acta botanica 18: 976.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

Dentipellis
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Dentipellis dissita* (Berk. & Cooke) Maas Geest.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Dentipellis fragilis* (Pers.) Donk**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Dentipellis separans* (Peck) Donk**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Duportella
1 espécie (não endêmica)
***Duportella kuehneri* (Boidin & Lanq.) Hjortstam**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Gloeodontia
1 espécie (não endêmica)
***Gloeodontia discolor* (Berk. & M.A.Curtis) Boidin**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004. Acta botanica 18: 976.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE); Domínio desconhecido

Gloiothele
1 espécie (não endêmica)
***Gloiothele lactescens* (Berk.) Hjortstam**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2007. Fungal Diversity 25: 52.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Lachnocladium
6 espécies (1 endêmica)
***Lachnocladium brasiliense* (Lév.) Pat.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 26.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Lachnocladium furcellatum* (Fr.) Pat.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 26.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Lachnocladium hamatum* Henn.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Lachnocladium moelleri* Henn.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 26.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Lachnocladium schweinfurthianum* Henn.**
Referência: Gibertoni, T.B. et al. 2004. Acta botanica 18: 977.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE), Sul (SC); Mata Atlântica
***Lachnocladium ulei* Henn.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 26.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

Lactarius

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Lactarius deliciosus* (L.) Gray**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Lactarius rufus* (Scop.) Fr.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Laxitextum

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Laxitextum bicolor* (Pers.) Lentz.**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 5.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Laxitextum incrustatum* Hjortstam & Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Peniophora

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Peniophora albobadia* (Schwein.) Boidin**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Peniophora incarnata* (Pers.) P.Karst.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 36.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Domínio desconhecido

Russula

1 espécie (não endêmica)
***Russula consobrina* (Fr.) Fr.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Scytinostroma

8 espécies (nenhuma endêmica)
***Scytinostroma albocinctum* (Berk. & Broome) Boidin & Lanq.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Scytinostroma duriusculum* (Berk. & Broome) Donk**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (RN, PB, PE, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Scytinostroma fulvum* (Berk. & M.A.Curtis) Hjortstam**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica
***Scytinostroma galactinum* (Fr.) Donk**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 26.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Scytinostroma hemidichophyticum* Pouzar**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 7.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Scytinostroma odoratum* (Fr.) Donk**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 7.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Scytinostroma portentosum* (Berk. & M.A.Curtis) Donk**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 7.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Scytinostroma rhizomorpharum* S.S. Rattan**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 7.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Steccherichum

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Steccherichum isabellinum* Corner**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 3.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Steccherichum seriatum* (Lloyd) Maas Geest.**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

Stereum
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Stereum hirsutum* (Willd.) Pers.**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 13.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Stereum ochraceo-flavum* (Schw.) Sacc.**
Referência: Groposo, C. & Loguercio-Leite, C. 2005. Mycotaxon 92: 8.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Stereum ostrea* (Blume & T.Nees) Fr.**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 13.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sul (SC); Caatinga, Mata Atlântica

Wrightoporia
3 espécies (1 endêmica)
***Wrightoporia avellanea* (Bres.) Pouzar**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (SC); Amazônia
***Wrightoporia cremea* Ryvarden**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108: 3.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR); Amazônia
***Wrightoporia porilacerata* Log.-Leite et al.**
Referência: Drechsler-Santos, R.E. et al. 2008. Mycotaxon 103: 15.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

Xylobolus
1 espécie (1 endêmica)
***Xylobolus frustulatus* (Pers.) Boidin**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 58.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

THELEPHORALES
Tatiana B. Gibertoni, Elisandro Ricardo Drechsler-Santos, Juliano M. Baltazar
2 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica)

Thelephora
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Thelephora dentosa* Berk. & Curt.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Thelephora griseozonata* Cooke**
Referência: Bononi, V.L.R. et al. 2008. Hoehnea 35: 489-511.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal
***Thelephora paraguayensis* Corner**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Tomentella
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Tomentella aurantiaca* Pat.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tomentella ferruginea* (Pers.) Pat.**
Voucher: Bononi, V.L.R. 142194 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Cerrado
***Tomentella galzinii* Bourdot**
Voucher: Bononi, V.L.R. 142212 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Tomentella subclavigera* Litsch.**
Voucher: Bononi, V.L.R. 141263 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

TRECHISPORALES
Tatiana B. Gibertoni, Juliano M. Baltazar, Allyne Christina Gomes Silva
4 gêneros, 9 espécies (1 endêmica)

Brevicellicium
1 espécie (não endêmica)
***Brevicellicium olivascens* (Bres.) K.H.Larss. & Hjortstam**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

Hydnodon
1 espécie (não endêmica)
***Hydnodon thelephorum* (Lév.) Banker**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

Subulicystidium
1 espécie (não endêmica)
***Subulicystidium longisporum* (Pat.) Parmasto**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Trechispora
6 espécies (1 endêmica)
***Trechispora farinacea* (Pers.) Liberta**
Referência: Gomes-Silva, A.C. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 108, pp. 319–332.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Trechispora mollusca* (Pers.) Liberta**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Trechispora nivea* (Pers.) K.H.Larss.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Trechispora regularis* (Murrill) Liberta**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Trechispora rigida* (Berk.) K.H.Larss.**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Trechispora thelephora* (Lév.) Ryvarden**
Referência: Baltazar, J.M. & Gibertoni, T.B. 2009. Mycotaxon 109: 439-442.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PB, PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

TREMELLALES

Rosa Mara Borges da Silveira
1 gênero, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Tremella

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Tremella fibulifera* Möller**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Tremella fuciformis* Berk.**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Tremella philippinensis* Lloyd**
Referência: Sobestiansky, G. 2005. Brazilian Archives of Biology and Technology 48: 437-457.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

UROCYSTIDIALES

Aníbal Alves de Carvalho Jr.
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Doassansiopsis

1 espécie (não endêmica)
***Doassansiopsis deformans* (Setch.) Dietel**
Referência: Soares, D.J. et al. 2009. Mycologia 101: 401-416.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

BLASTOCLADIOMYCOTA

6 gêneros, 17 espécies (nenhuma endêmica)

BLASTOCLADIALES

Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli, José de Ribamar de Sousa Rocha
6 gêneros, 17 espécies (nenhuma endêmica)

Allomyces

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Allomyces anomalus* R.Emers.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi 17-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Allomyces arbusculus* E.J.Butler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Allomyces macrogynus* (R.Emers.) R.Emers.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Allomyces moniliformis* Coker & Braxton**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Allomyces neomoniliformis* Indoh**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

Blastocladia

7 espécies (nenhuma endêmica)
***Blastocladia globosa* Kanouse**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381568)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Blastocladia gracilis* Kanouse**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 19.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Blastocladia incrassata* Indoh**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 19.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Blastocladia pringsheimii* Reinsch**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381567)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Blastocladia prolifera* Minden**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 19.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Blastocladia ramosa* Thaxt.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 19.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Blastocladia sparrowii* Indoh**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Catenaria
1 espécie (não endêmica)
***Catenaria anguillulae* Sorokin**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Catenophlyctis
1 espécie (não endêmica)
***Catenophlyctis variabilis* (Karling) Karling**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381565)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, PE), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Coelomomyces
1 espécie (não endêmica)
***Coelomomyces ciferri* Leão**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Physoderma
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Physoderma hydrocotylidis* Viégas & Teixeira**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Physoderma maydis* (Miyabe) Miyabe**
Referência: Mendes, M.A.S. & Urben, A.F. 2009. Fungos relatados em plantas no Brasil, Laboratório de Quarentena Vegetal.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

CHYTRIDIOMYCOTA
30 gêneros, 112 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

CHYTRIDIALES
Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli, José de Ribamar de Sousa Rocha
19 gêneros, 64 espécies (nenhuma endêmica)

Catenochytridium
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Catenochytridium carolinianum* Berdan**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 32.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Catenochytridium hemicystii* J.S.Knox**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 32.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Catenochytridium kevorkianii* Sparrow**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 32.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, PE), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Chytriomyces
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Chytriomyces annulatus* Dogma**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Chytriomyces appendiculatus* Karling**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381564)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Chytriomyces aureus* Karling**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381563)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Chytriomyces hyalinus* Karling**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381570)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Chytriomyces spinosus* Fay**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381571)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Chytriomyces stellatus* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 22.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Cladochytrium
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Cladochytrium crassum* Hillegas**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Cladochytrium granulatum* (Karling) Sparrow**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 30.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Cladochytrium hyalinum* Berdan**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Cladochytrium replicatum* Karling**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381556)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (PI, CE, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cladochytrium setigerum* Karling**
Voucher: Nascimento, C.A. s.n. (SP 381619)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Cladochytrium tenue* Nowak.**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381581)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Cylindrochytridium

1 espécie (não endêmica)
***Cylindrochytridium johnstonii* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 22.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

Diplophlyctis

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Diplophlyctis amazonensis* (Karling) Sparrow**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 34.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Diplophlyctis asteroidea* Dogma**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381578)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Diplophlyctis complicata* (Willoughby) Dogma**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Diplophlyctis intestina* (Schenk.) J.Schröt.**
Referência: Nascimento, C.A. & Pires-Zottarelli, C.L.A. 2009. Acta botanica 23: 470.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Diplophlyctis sarcoptoides* (H.E.Petersen) Dogma**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381578)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Endochytrium

1 espécie (não endêmica)
***Endochytrium operculatum* (De Wild) Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Entophlyctis

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Entophlyctis lobata* Willoughby & Townley**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI); Amazônia, Cerrado
***Entophlyctis luteolus* Longcore**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381557)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Nowakowskiella

7 espécies (nenhuma endêmica)
***Nowakowskiella elegans* (Nowak.) J.Schröt.**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381559)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PI, PB, PE), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Nowakowskiella elongata* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 30.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
***Nowakowskiella hemisphaerospora* Shanor**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 30.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Nowakowskiella macrospora* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 30.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Nowakowskiella multispora* Karling**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381582)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Nowakowskiella profusa* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 30.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Nowakowskiella ramosa* E.J. Butler**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 31.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Phlyctochytrium

9 espécies (nenhuma endêmica)
***Phlyctochytrium aureliae* Ajello**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381572)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Phlyctochytrium closterii* (Karling) Sparrow**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 22.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Phlyctochytrium furcatum* Sparrow**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 23.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Phlyctochytrium hallii* Couch**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 23.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Phlyctochytrium mangrovei* Ulken**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 23.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Phlyctochytrium mucronatum* Canter**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 23.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PI); Cerrado
***Phlyctochytrium nematodeae* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 23.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RO); Amazônia
***Phlyctochytrium planicorne* G.F. Atk.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 23.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Phlyctochytrium reinboldtiae* Persiel**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 23.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

Podochytrium

1 espécie (não endêmica)
***Podochytrium clavatum* Pfitzer**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 23-24pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (PI); Amazônia, Cerrado

Polychytrium

1 espécie (não endêmica)
***Polychytrium aggregatum* Ajello**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381558)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Rhizidium

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhizidium brasiliensis* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 24.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),
Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhizidium chitinophilum* Sparrow**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 24.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Rhizidium laeve* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 24.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Rhizidium nowakowskii* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 24.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Amazônia
***Rhizidium verrucosum* Karling**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381569)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Rhopalophlyctis

1 espécie (não endêmica)
***Rhopalophlyctis sarcoptoides* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Amazônia

Septochytrium

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Septochytrium macrosporum* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 31.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Septochytrium marilandicum* Karling**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381560)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Septochytrium plurilobulum* Johanson**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 31.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO);
Amazônia
***Septochytrium variabile* Berdan**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 31-32pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Septochytrium willoughbyi* Dogma**
Voucher: Nascimento, C.A. s.n. (SP 381622)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
Nordeste (PI), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica

Septosperma

1 espécie (não endêmica)
***Septosperma rhizophydii* Whiffen *ex* W.H.Blackw. & M.J.Powell**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381577)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

Siphonaria
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Siphonaria petersenii* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Siphonaria sparrowii* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Solutoparies
1 espécie (não endêmica)
***Solutoparies pythii* Whiffen *ex* W.H.Blackw. & M.J.Powell**
Referência: Nascimento, C.A. & Pires-Zottarelli, C.L.A. 2009. Acta botanica 23: 465.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Sparrowia
1 espécie (não endêmica)
***Sparrowia subcruciformes* Dogma**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Synchytrium
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Synchytrium australe* Speg.**
Referência: Figueiredo, M.B. et al. 2007. Summa Phytopathologica 33: 195-198.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Synchytrium desmondii* Munas.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 34.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Synchytrium echii* Speg.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 34.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 34.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Synchytrium phaseoli* W.Weston**
Referência: Farr, D.F. & Rossman, A.Y. 2009. Fungal Databases, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Synchytrium stellariae* Fuckel**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 34.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

INCERTAE SEDIS
Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli
1 gênero, 5 espécies (nenhuma endêmica)

Olpidium
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Olpidium brassicae* (Woronin) P.A.Dang.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Olpidium granulatum* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Olpidium rhizophlyctidis* Sparrow**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Olpidium rotiferum* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Olpidium utriculiforme* Scherff.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

LOBULOMYCETALES
Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Lobulomyces
1 espécie (não endêmica)
***Lobulomyces poculatus* (Willoughby & Townley) D.R.Simmons**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 22.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

MONOBLEPHARIDALES
Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli
3 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica)

Gonapodya
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Gonapodya polymorpha* Thaxt.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 35.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Gonapodya prolifera* (Cornu) A.Fisch.**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381575)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Monoblepharella
1 espécie (não endêmica)
***Monoblepharella mexicana* Shanor**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 35.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

Monoblepharis
1 espécie (não endêmica)
***Monoblepharis regignens* Lagerh.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 36.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

RHIZOPHYDIALES
Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli, José de Ribamar de Sousa Rocha
2 gêneros, 24 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

Batrachochytrium
1 espécie (não endêmica)
***Batrachochytrium dendrobatidis* Longcore et al.**
Referência: Toledo et al. 2006. South American Journal of Herpetology 1: 185-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Rhizophydium
23 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Rhizophydium amoebae* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 24.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Rhizophydium anatropum* (A.Braun) Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 24.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Rhizophydium apiculatum* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 24.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Rhizophydium brevipes* G.F. Atk.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rhizophydium brevipes* G.F. Atk. var. *brevipes
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 25.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhizophydium bullatum* Sparrow**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 24.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Cerrado
***Rhizophydium carpophilum* Zopf**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 25.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhizophydium chitinophilum* Antik.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 25.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Rhizophydium condylosum* Karling**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381569)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Rhizophydium conicum* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 25.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhizophydium coronum* A.M.Hanson**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381553)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Rhizophydium elyense* Sparrow**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381574)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhizophydium gibbosum* (Zopf) A.Fisch.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Rhizophydium globosum* (A.Braun) Rabenh.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rhizophydium hyperparasiticum* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Rhizophydium keratinophilum* Karling**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381562)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhizophydium macroporosum* Karling**
Voucher: Nascimento, C.A. s.n. (SP 381616)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Rhizophydium mycetophagum* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Rhizophydium pollinis-pini* (A.Braun) Zopf**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PI); Amazônia, Cerrado
***Rhizophydium sphaerocarpum* (Zopf) A.Fisch.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007. Brazilian zoosporic fungi, p. 27.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Rhizophydium sphaerotheca* Zopf**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381579)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PI, PE), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhizophydium spinosum* Willoughby**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 27.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO);
Amazônia
***Rhizophydium stipitatum* Sparrow**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381580)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (PI), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica
***Rhizophydium zoophthorum* (P.A.Dang.) Fisch.**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO);
Amazônia

SPIZELLOMYCETALES

Carmen Lidia Amorim Pires-Zottarelli
4 gêneros, 14 espécies (nenhuma endêmica)

Karlingia

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Karlingia dubia* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Karlingia granulata* Karling**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381561)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Karlingia hyalina* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 37.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Karlingia rosea* (De Bary & Woronin) Johanson**
Voucher: Pires-Zottarelli, C.L.A. s.n. (SP 381573)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica
***Karlingia spinosa* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 38.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Rhizophlyctis

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhizophlyctis chitinophila* (Karling) Sparrow**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 39.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Cerrado, Mata Atlântica
***Rhizophlyctis fusca* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 39.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB);
Domínio desconhecido
***Rhizophlyctis petersenii* Sparrow**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 39.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),
Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Rhizophlyctis serpentina* Dogma**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 39.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO);
Amazônia

Rozella

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Rozella allomycis* F.K.Faust**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 39.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Rozella cladochytrii* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi 39-40pp.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Rozella endochytrii* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 40.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Rozella rhizophydii* Karling**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 40.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Spizellomyces

1 espécie (não endêmica)
***Spizellomyces punctatus* (W.J.Koch) D.J.S.Barr**
Referência: Milanez, A.I. et al. 2007.
Brazilian zoosporic fungi, p. 39.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

GLOMEROMYCOTA

15 gêneros, 109 espécies (8 endêmicas)

ARCHAEOSPORALES

**Bruno Tomio Goto, Adriana Mayumi Yano-Melo,
Gladstone Alves da Silva, Leonor Costa Maia**
2 gêneros, 5 espécies (1 endêmica)

Ambispora

4 espécies (1 endêmica)
***Ambispora appendicula* (Spain et al.) C.Walker**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e
caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
***Ambispora brasiliensis* B.T.Goto et al.**
Referência: Goto, B.T. et al. 2008. Mycotaxon 105: 11-18.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ambispora gerdemannii* (S.L.Rose et al.) C.Walker et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008.
Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB), Sudeste; Caatinga, Cerrado
***Ambispora jimgerdemannii* (Spain et al.) C.Walker**
Referência: Moreira-Souza et al. 2003.
Mycorrhiza 13: 211-215.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica

Archaeospora

1 espécie (não endêmica)
***Archaeospora trappei* (R.N.Ames & Linderman) J.B.Morton & D.Redecker *emend*. Spain**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008.
Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (AM), Nordeste (PE); Amazônia, Caatinga

DIVERSISPORALES

Bruno Tomio Goto, Adriana Mayumi Yano-Melo, Gladstone Alves da Silva, Leonor Costa Maia
11 gêneros, 59 espécies (6 endêmicas)

Acaulospora

21 espécies (nenhuma endêmica)
***Acaulospora bireticulata* F.M.Rothwell & Trappe**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Acaulospora capsicula* Blaszk.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008.
Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, p. 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (RS); Domínio desconhecido
***Acaulospora delicata* C. Walker**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Acaulospora denticulata* Sieverd. & S. Toro**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (AL); Caatinga
***Acaulospora dilatata* J.B. Morton**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008.
Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Domínio desconhecido
***Acaulospora elegans* Trappe & Gerd.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE); Caatinga
***Acaulospora excavata* Ingleby & C.Walker**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Acaulospora foveata* Trappe & Janos**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Caatinga
***Acaulospora koskei* Blaszk.**
Referência: Goto, B.T. et al. 2008. Acta botanica 22: 579-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica
***Acaulospora lacunosa* J.B. Morton**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, Mata Atlântica
***Acaulospora laevis* Gerd. & Trappe**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado
***Acaulospora longula* Spain & N.C. Schenck**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
***Acaulospora mellea* Spain & N.C. Schenck**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, AL), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Acaulospora morrowiae* Spain & N.C. Schenck**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE); Amazônia, Caatinga
***Acaulospora myriocarpa* Spain et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008.
Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Cerrado
***Acaulospora rehmii* Sieverd. & S.Toro**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Acaulospora rugosa* J.B. Morton**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008.
Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (AL); Caatinga
***Acaulospora scrobiculata* Trappe**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP), Sul (RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Acaulospora spinosa* C. Walker & Trappe**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
***Acaulospora tuberculata* Janos & Trappe**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE); Amazônia, Caatinga
***Acaulospora undulata* Sieverd.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cetraspora

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cetraspora gilmorei* (Trappe & Gerd.) Oehl et al.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
***Cetraspora pellucida* (T.H.Nicolson & N.C.Schenck) Oehl et al.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado

Dentiscutata

6 espécies (2 endêmicas)
***Dentiscutata biornata* (Spain et al.) Sieverd. et al.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
***Dentiscutata cerradensis* (Spain & J.Miranda) Sieverd. et al.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sul (RS); Caatinga
***Dentiscutata hawaiiensis* (Koske & Gemma) Sieverd. et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Dentiscutata nigra* (J.F.Redhead) Sieverd. et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Dentiscutata reticulata* (Koske et al.) Sieverd. et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Cerrado
***Dentiscutata scutata* (C.Walker & Dieder.) Sieverd. et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; Domínio desconhecido

Diversispora

1 espécie (não endêmica)
***Diversispora spurca* (C.M.Pfeiff. et al.) C.Walker & Schuessler**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Fuscutata

2 espécies (1 endêmica)
***Fuscutata heterogama* Oehl et al.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado
***Fuscutata rubra* (Stürmer & J.B.Morton) Oehl et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Morton, J.B. 1999. Mycological Research 103: 949-954.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido

Gigaspora

6 espécies (1 endêmica)
***Gigaspora albida* N.C.Schenck & G.S.Sm.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
Gigaspora decipiens* I.R.Hall & L.K. *Abbott
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
***Gigaspora gigantea* (T.H.Nicolson & Gerd.) Gerd. & Trappe**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste; Cerrado
***Gigaspora margarita* W.N. Becker & I.R. Hall**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Gigaspora ramisporophora* Spain et al.**
Referência: Spain, J. et al. 1989. Mycotaxon 34: 667-677.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
***Gigaspora rosea* T.H. Nicolson & N.C. Schenck**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Sudeste; Cerrado

Kuklospora

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Kuklospora colombiana* (Spain & N.C.Schenck) Oehl & Sieverd.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB, PE, AL), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado

***Kuklospora kentinensis* (C.G.Wu & Y.S.Liu) Oehl & Sieverd.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, AL); Caatinga

Pacispora

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Pacispora chimonobambusae* (C.G.Wu & Y.S.Liu) Sieverd. & Oehl *ex* C.Walker et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pacispora scintillans* (SL.Rose & Trappe) Sieverd. & Oehl *ex* C. Walker et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste; Cerrado

Quatunica

1 espécie (não endêmica)

***Quatunica erytropa* (Koske & C.Walker) F.A.Souza et al.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, Mata Atlântica

Racocetra

9 espécies (1 endêmica)

***Racocetra castanea* (C.Walker) Oehl et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB); Mata Atlântica

***Racocetra coralloidea* (Trappe et al.) Oehl et al.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Racocetra fulgida* (Koske & C.Walker) Oehl et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (SP); Cerrado

***Racocetra gregaria* (N.C.Schenck & T.H.Nicolson) Oehl et al.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Amazônia, Caatinga

***Racocetra intraornata* B.T. Goto & Oehl**
Referência: Goto, B.T. et al. 2009. Mycotaxon 109: 483-491.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Caatinga, Mata Atlântica

***Racocetra minuta* (Ferrer & R.A.Herrera) Oehl et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Racocetra persica* (Koske & C.Walker) Oehl et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Racocetra verrucosa* (Koske & C.Walker) Oehl et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Racocetra weresubiae* (Koske & C.Walker) Oehl et al.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE); Amazônia, Caatinga

Scutellospora

6 espécies (1 endêmica)

***Scutellospora aurigloba* (I.R.Hall) C.Walker & F.E. Sanders**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, AL), Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Scutellospora calospora* (T.H.Nicolson & Gerd.) C.Walker & F.E. Sanders**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

***Scutellospora dipapillosa* (C.Walker & Koske) C.Walker & F.E. Sanders**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste; Cerrado

***Scutellospora nodosa* Blaszk.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Scutellospora pernambucana* Oehl et al.**
Referência: Silva et al. 2008. Mycotaxon 106: 361-370.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, Mata Atlântica

***Scutellospora tricalypta* (R.A.Herrera & Ferrer) C. Walker & F.E.Sanders**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste; Cerrado

GLOMERALES

Bruno Tomio Goto, Adriana Mayumi Yano-Melo, Gladstone Alves da Silva, Leonor Costa Maia

1 gênero, 43 espécies (nenhuma endêmica)

Glomus

43 espécies (nenhuma endêmica)

***Glomus aggregatum* N.C.Schenck & G.S.Sm.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Glomus albidum* C.Walker & L.H.Rhodes**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Glomus ambisporum* G.S.Sm. & N.C.Schenck**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (AL); Caatinga, Mata Atlântica

***Glomus australe* (Berck.) S.M.Berch**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia

***Glomus brohultii* Sieverd. & Herrera**
Referência: Herrera-Peraza et al. 2003. Journal of Applied Botany 77: 37-40.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Glomus caledonium* (T.H.Nicolson & Gerd.) Trappe & Gerd.**
Referência: Caproni, A.L. et al. 2003. Pesq. Agropecu. Brasil. 38: 937-945.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Glomus claroideum* N.C.Schenck & G.S. Sm.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Glomus clarum* T.H. Nicolson & N.C. Schenck**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

***Glomus clavisporum* (Trappe) R.T. Almeida & N.C.Schenck**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Glomus constrictum* Trappe**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste; Caatinga

***Glomus coremioides* (Berk. & Broome) D.Redecker & J.B.Morton**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Glomus deserticola* Trappe et al.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Glomus diaphanum* J.B. Morton & C. Walker**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

***Glomus etunicatum* W.N. Becker & Gerd.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado

***Glomus fasciculatum* (Thaxt.) Gerd. & Trappe**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado

***Glomus formosanum* C.G.Wu & Z.C.Chen**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Glomus fuegianum* (Speg.) Trappe & Gerd.**
Referência: Goto, B.T. & Maia, L.C. 2005. Acta botanica 19: 633-637.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Glomus fulvum* (Berk. & Broome) Trappe & Gerd.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste; Cerrado

***Glomus geosporum* (T.H.Nicolson & Gerd.) C.Walker**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado

***Glomus globiferum* Koske & C.Walker**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Mata Atlântica

***Glomus glomerulatum* Sieverd.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sul (RS); Amazônia, Caatinga

***Glomus halonatum* S.L. Rose & Trappe**
Referência: Carrenho, R. et al. 2008. Tree and Forest Science and Biotechnology 2: 57-67.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

***Glomus heterosporum* G.S. Sm. & N.C. Schenck**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Mata Atlântica

***Glomus hoi* S.M. Berch & Trappe**
Referência: Caproni, A.L. et al. 2003. Pesq. Agropecu. Brasil. 38: 937-945.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Glomus intraradices* N.C. Schenck & G.S. Sm.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE); Caatinga, Cerrado

***Glomus invermaium* I.R. Hall**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

***Glomus lacteum* S.L. Rose & Trappe**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Glomus macrocarpum* Tul. & C. Tul.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Glomus magnicaule* I.R. Hall**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Glomus microaggregatum* Koske et al.**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sul (RS); Amazônia, Caatinga

***Glomus microcarpum* Tul. & C. Tul.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Glomus monosporum* Gerd. & Trappe**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Glomus mosseae* (T.H.Nicolson & Gerd.) Gerd. & Trappe**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); Caatinga

***Glomus multicaule* Gerd. & B.K. Bakshi**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Glomus nanolumem* Koske & Gemma**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Glomus pansihalos* S.M. Berch & Koske**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Glomus reticulatum* Bhattacharjee & Mukerji**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Glomus rubiforme* (Gerd. & Trappe) R.T.Almeida & N.C.Schenck**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PB); Amazônia, Mata Atlântica

***Glomus sinuosum* (Gerd. & B.K.Bakshi) R.T.Almeida & N.C. Schenck**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Glomus taiwanense* (C.G.Wu & Z.C.Chen) R.T.Almeida & N.C.Schenck *ex* Y.J.Yao**
Referência: Goto, B.T. & Maia, L.C. 2005. Acta botanica 19: 633-637.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, AL); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Glomus tenue* (Greenall) I.R.Hall**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido

***Glomus tortuosum* N.C. Schenck & G.S. Sm.**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Glomus versiforme* (P.Karst.) S.M. Berch**
Referência: Stürmer, S.L. & Siqueira, J.O. 2008. Soil Biodiversity in Amazonian and Other Brazilian Ecosystems, 537-583.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

PARAGLOMERALES
Bruno Tomio Goto
1 gênero, 2 espécies (1 endêmica)

Paraglomus
2 espécies (1 endêmica)
***Paraglomus brasilianum* (Spain & J.Miranda) J.B.Morton & D.Redecker**
Referência: Spain & Miranda 1996. Mycotaxon 50: 137-142.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Paraglomus occultum* (C.Walker) J.B.Morton & D.Redecker**
Referência: Maia, L.C. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 109-126.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

ZYGOMYCOTA
26 gêneros, 85 espécies (nenhuma endêmica),
14 variedades (nenhuma endêmica)

DIMARGARITALES
André Luiz C. M de A. Santiago
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Dispira
1 espécie (não endêmica)
***Dispira cornuta* Tiegh.**
Referência: Viriato, A. & Trufem, S.F.B. 1985. Rickia 12: 147-154.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica

ENTOMOPHTHORALES
André Luiz C. M de A. Santiago
3 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica)

Conidiobolus
1 espécie (não endêmica)
***Conidiobolus coronatus* (Costatin) A.Batko**
Referência: Todano et al. 2005. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 38: 188-190.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Massospora
1 espécie (não endêmica)
***Massospora spinosa* Cif. et al.**
Referência: Trufem, S.F.B. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 97-107.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Neozygites
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Neozygites floridana* (Weiser & Muma) Remaud. & S. Keller**
Referência: Roggia, S. et al. 2009. Pesq. Agropecu. Brasil. 44: 107-110.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Neozygites fumosa* (Speare) Remaud. & S.Keller**
Referência: Júnior et al. 1997. Journal of Invertebrate Pathology 69: 276-278.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

MORTIERELLALES
André Luiz C. M. de A. Santiago
1 gênero, 10 espécies (nenhuma endêmica),
1 variedade (não endêmica)

Mortierella
10 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Mortierella alpina* Peyronel**
Referência: Upadhyay, H.P. 1967. Mycopathologia et Mycologia Applicata 31: 49-62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Mortierella ambigua* B.S. Mehrotra**
Referência: Upadhyay, H.P. 1967. Mycopathologia et Mycologia Applicata 31: 49-62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Mortierella elongata* Linnem.**
Referência: Upadhyay, H.P. 1967. Mycopathologia et Mycologia Applicata 31: 49-62.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Mortierella gamsii* Milko**
Referência: Upadhyay, H.P. 1967. Mycopathologia et Mycologia Applicata 31: 49-62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Mortierella longicollis* Dixon-Stew.**
Referência: Batista, A.C. et al. 1967. Atas Inst. Micol. Univ. Pernambuco 4: 171-174.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Mortierella microspora* E. Wolf**
Referência: Upadhyay, H.P. 1967. Mycopathologia et Mycologia Applicata 31: 49-62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Mortierella oligospora* Björl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mortierella oligospora* var. *minima* E. Wolf**
Referência: Upadhyay, H.P. 1967. Mycopathologia et Mycologia Applicata 31: 49-62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Mortierella parvispora* Linnem.**
Referência: Upadhyay, H.P. 1967. Mycopathologia et Mycologia Applicata 31: 49-62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

***Mortierella polycephala* Coem.**
Referência: Upadhyay, H.P. 1967. Mycopathologia et Mycologia Applicata 31: 49-62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); Domínio desconhecido
***Mortierella subtilissima* Oudem.**
Referência: Upadhyay, H.P. 1967. Mycopathologia et Mycologia Applicata 31: 49-62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

MUCORALES

André Luiz C. M. de A. Santiago
19 gêneros, 64 espécies (nenhuma endêmica), 13 variedades (nenhuma endêmica)

Absidia

4 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Absidia cylindrospora* Hagem**
Referência: Santiago, A.L.C.M.A. & Souza-Motta, C.M. 2006. Acta botanica 20: 641-647.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Absidia pseudocylindrospora* Hesselt. & J.J. Ellis**
Referência: Lira, N.P. 1971. Boletim do Instituto de Micologia da Universidade de Recife 657: 1-6.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica
***Absidia repens* Tiegh.**
Referência: Trufem, S.F.B. 1981. Rickia 9: 99-106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Absidia spinosa* Lendn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Absidia spinosa* Lendn. var. *spinosa
Referência: Trufem, S.F.B. 1981. Rickia 9: 99-106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Actinomucor

1 espécie (não endêmica)
***Actinomucor elegans* (Eidam) C.R.Benj. & Hesselt.**
Referência: Upadhyay, H.P. 1967. Mycopathologia et Mycologia Applicata 31: 49-62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

Apophysomyces

1 espécie (não endêmica)
***Apophysomyces elegans* P.C.Misra et al.**
Voucher: Santiago, A.L.C.M.A. 6169 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Backusella

1 espécie (não endêmica)
***Backusella lamprospora* (Lendn.) Benny & R.K. Benj.**
Referência: Schoenlein-Crusius, I.H. et al. 2006. Brazilian Journal of Microbiology 37: 267-275.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Circinella

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Circinella angarensis* (Schostak.) Zycha**
Referência: Trufem, S.F.B. 1981. Rickia 9: 113-120.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Circinella minor* Lendn.**
Referência: Trufem, S.F.B. & Viriato, A. 1985. Rickia 12: 113-123.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Circinella muscae* (Sorokïn) Berl. & De Toni**
Referência: Trufem, S.F.B. 1981. Rickia 9: 113-120.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Circinella rigida* G. Sm.**
Referência: Trufem, S.F.B. 1981. Rickia 9: 13-120.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Circinella simplex* Tiegh.**
Referência: Trufem, S.F.B. 1981. Rickia 9: 13-120.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Circinella umbellata* Tiegh. & G. Le Monn.**
Referência: Trufem, S.F.B. & Viriato, A. 1985. Rickia 12: 113-123.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

Cunninghamella

4 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Cunninghamella blakesleeana* Lendn.**
Referência: Trufem et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 97-107.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Cunninghamella echinulata* (Thaxt.) Thaxt. *ex* Blakeslee**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
***Cunninghamella echinulata* var. *verticilatta* (F.S.Paine) R.Y.Zheng & G.Q.Chen**
Referência: Trufem et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, APNE 97-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); Caatinga
***Cunninghamella elegans* Lendn.**
Referência: Trufem et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 97-107.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica
***Cunninghamella phaeospora* Boedijn**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cunninghamella phaeospora* Boedijn var. *phaeospora
Referência: Souza et al. 2008. Mycotaxon 106: 273-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Gilbertella

1 espécie (não endêmica)
***Gilbertella persicaria* (E.D. Eddy) Hesselt.**
Referência: Santiago, A.L.C.M.A. & Cavalcanti, M.A.Q. 2007. Mycotaxon 102: 333-337.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica

Gongronella

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Gongronella butleri* (Lendn.) Peyronel & dal Vesco**
Referência: Upadhyay, H.P. 1969. Nova Hedwigia 17: 65-73.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, Mata Atlântica

***Gongronella lacrispora* Hesselt. & J.J. Ellis**
Referência: Upadhyay, H.P. 1969. Nova Hedwigia 17: 65-73.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Lichtheimia

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Lichtheimia blakesleeana* (Lendn.) K.Hoffm. et al.**
Referência: Santiago, A.L.C.M.A. & Souza-Motta, C.M. 2006. Acta botanica 20: 641-647.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Lichtheimia corymbifera* (Cohn) Vuill.**
Referência: Santiago, A.L.C.M.A. & Souza-Motta, C.M. 2008. Brazilian Journal of Microbiology 39: 698-700.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE); Mata Atlântica

***Lichtheimia hyalospora* (Saito) K.Hoffm. et al.**
Referência: Santiago, A.L.C.M.A. & Souza-Motta, C.M. 2006. Acta botanica 20: 641-647.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Lichtheimia ramosa* (Zopf) Vuill.**
Referência: Santiago, A.L.C.M.A. & Souza-Motta, C.M. 2008. Brazilian Journal of Microbiology 39: 698-700.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Mucor

23 espécies (nenhuma endêmica)

***Mucor amphibiorum* Schipper**
Referência: Santiago, A.L.C.M.A. & Souza-Motta, C.M. 2008. Brazilian Journal of Microbiology 39: 698-700.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Mucor bacilliformis* Hesselt.**
Referência: Upadhyay, H.P. 1967. Mycopathologia et Mycologia Applicata 31: 49-62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Mucor bainieri* B.S. Mehrotra & Baijal**
Referência: Souza et al. 2008. Mycotaxon 106: 273–288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Mucor circinelloides* Tiegh.**
Referência: Alves et al. 2002. Revista Brasil. Bot. 25: 147-160.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Mucor fragilis* Bainier**
Referência: Trufem, S.F.B. 1981. Rickia 9: 81-91.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Mucor fuscus* Bainier**
Referência: Trufem, S.F.B. 1981. Rickia 9: 81-91.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mucor genevensis* Lendn.**
Referência: Alves et al. 2002. Revista Brasil. Bot. 25: 147-160.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Mucor guilliermondii* Nadson & Philippov**
Referência: Santiago, A.L.C.M.A. et al. 2008. Mycotaxon 106: 103-108.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Mucor hiemalis* Wehmer**
Referência: Santiago, A.L.C.M.A. & Souza-Motta, C.M. 2008. Brazilian Journal of Microbiology 39: 698-700.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Cerrado

***Mucor minutus* (Baijal & B.S. Mehrotra) Schipper**
Referência: Schoenlein-Crusius, I.H. et al. 2006. Brazilian Journal of Microbiology 37: 267-275.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mucor mousanensis* Baijal & B.S. Mehrotra**
Referência: Schoenlein-Crusius, I.H. et al. 1996. Brazilian Journal of Microbiology 37: 267-275.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mucor mucedo* Fresen.**
Referência: Trufem, S.F.B. & Viriato, A. 1985. Rickia 12: 113-123.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mucor orodatus* Treschew**
Referência: Trufem, S.F.B. 1981. Rickia 9: 81-91.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mucor piriformis* A. Fisch.**
Referência: Trufem, S.F.B. 1981. Rickia 9: 81-91.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mucor plumbeus* Bonord.**
Referência: Trufem, S.F.B. 1984. Rickia 11: 53-64.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mucor prayagensis* B.S. Mehrotra & Nand *ex* Schipper**
Referência: Schoenlein-Crusius, I.H. et al. 2006. Brazilian Journal of Microbiology 37: 267-275.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mucor racemosus* Fresen.**
Referência: Schoenlein-Crusius, I.H. et al. 2006. Brazilian Journal of Microbiology 37: 267-275.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mucor ramosissimus* Samouts.**
Referência: Schoenlein-Crusius, I.H. et al. 2006. Brazilian Journal of Microbiology 37: 267-275.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mucor saturninus* Hagem**
Referência: Schoenlein-Crusius, I.H. et al. 2006. Brazilian Journal of Microbiology 37: 267-275.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mucor suhagiensis* M.D. Mehrotra**
Referência: Trufem, S.F.B. 1981. Rickia 9: 81-91.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mucor variabilis* A.K. Sarbhoy**
Referência: Schoenlein-Crusius, I.H. et al. 2006. Brazilian Journal of Microbiology 37: 244-252.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Mucor variosporus* Schipper**
Referência: Alves et al. 2002. Revista Brasil. Bot. 25: 147-160.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Mucor zonatus* Milko**
Referência: Schoenlein-Crusius, I.H. et al. 2006. Brazilian Journal of Microbiology 37: 267-275.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Mycotypha
1 espécie (não endêmica)
***Mycotypha microspora* Fenner**
Voucher: Santiago, A.L.C.M.A. 6170 (URM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Parasitella
1 espécie (não endêmica)
***Parasitella parasitica* (Bainier) Syd.**
Referência: Schoenlein-Crusius, I.H. et al. 2006. Brazilian Journal of Microbiology 37: 267-275.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Phycomyces
1 espécie (não endêmica)
***Phycomyces blakesleeanus* Burgeff**
Referência: Trufem, S.F.B. & Viriato, A. 1985. Rickia 12: 113-123.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Pilaira
1 espécie (não endêmica)
***Pilaira anomala* (Ces.) J. Schröt**.
Referência: Trufem, S.F.B. 1984. Rickia 11: 53-64.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica

Pilobolus
5 espécies (nenhuma endêmica), 7 variedades (nenhuma endêmica)
***Pilobolus crystallinus* (F.H. Wigg.) Tode**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pilobolus crystallinus* var. *kleinii* (Tiegh.) R.Y.Zheng & G.Q.Chen**
Referência: Santiago et al. 2008. Mycotaxon 104: 111-122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
Pilobolus crystallinus* (F.H. Wigg.) Tode var. *crystallinus
Referência: Santiago et al. 2008. Mycotaxon 104: 111-122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Pilobolus crystallinus* var. *hyalosporus* (Boedijn) F.M. Hu & R.Y. Zheng**
Referência: Santiago et al. 2008. Mycotaxon 104: 111-122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Pilobolus lentiger* Corda**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pilobolus lentiger* Corda var. *lentiger
Referência: Santiago et al. 2008. Mycotaxon 104: 111-122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Pilobolus lentiger* var. *minutus* (Speg.) R.Y.Zheng & G.Q.Chen**
Referência: Santiago et al. 2008. Mycotaxon 104: 111-122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Pilobolus longipes* Tiegh.**
Referência: Santiago et al. 2008. Mycotaxon 104: 111-122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Pilobolus oedipus* Mont.**
Referência: Viriato, A. & Trufem, S.F.B. 1985. Rickia 12: 77-88.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Pilobolus roridus* (Bolton) Pers.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pilobolus roridus* (Bolton) Pers. var. *roridus
Referência: Santiago et al. 2008. Mycotaxon 104: 111-122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Pilobolus roridus* var. *umbonatus* (Buller) F.M. Hu & R.Y. Zheng**
Referência: Santiago et al. 2008. Mycotaxon 104: 111-122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Poitrasia
1 espécie (não endêmica)
***Poitrasia circinans* (H.Nagan. & N.Kawak.) P.M.Kirk**
Referência: Schoenlein-Crusius, I.H. et al. 2006. Brazilian Journal of Microbiology 37: 267-275.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Rhizopus
4 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Rhizopus arrhizus* A.Fisch.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
Rhizopus arrhizus* A. Fisch. var. *arrhizus
Referência: Santiago, A.L.C.M.A. & Souza-Motta, C.M. 2006. Acta botanica 20: 641-647.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhizopus homothallicus* Hesselt. & J.J. Ellis**
Referência: Luna, E. A. & Cordeiro-Neto, F. 1971. Instituto de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco 564: 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Mata Atlântica
***Rhizopus microsporus* Tiegh.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
***Rhizopus microsporus* var. *chinensis* (Saito) Chipper & Stalpers**
Referência: Trufem, S.F.B. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 97-107.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (SE); Caatinga

Rhizopus microsporus* Tiegh. var. *microsporus
Referência: Trufem, S.F.B. et al. 2006. Diversidade e caracterização dos fungos do semi-árido brasileiro, 97-107.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Rhizopus stolonifer* (Ehrenb.) Vuill**
Referência: Trufem, S.F.B. 1981. Rickia 9: 99-106.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA, PB), Sudeste (SP); Domínio desconhecido

Syncephalastrum
1 espécie (não endêmica)
***Syncephalastrum racemosum* Cohn. *ex* J.Schröt.**
Referência: Santiago, A.L.C.M.A. & Souza-Motta, C.M. 2006. Acta botanica 20: 641-647.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica

Zygorhynchus
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Zygorhynchus heterogamus* (Vuill.) Vuill.**
Referência: Schoenlein-Crusius, I.H. et al. 2006. Brazilian Journal of Microbiology 37: 244-252.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Zygorhynchus moelleri* Vuill.**
Referência: Schoenlein-Crusius, I.H. et al. 2006. Brazilian Journal of Microbiology 37: 244-252.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

ZOOPAGALES
Andre Luiz C. M de A. Santiago
2 gêneros, 6 espécies (nenhuma endêmica)

Piptocephalis
1 espécie (não endêmica)
***Piptocephalis repens* Tiegh. & G. Le Monn.**
Referência: Trufem, S.F.B. 1984. Rickia 11: 53-64.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Syncephalis
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Syncephalis asymmetrica* Tiegh. & G. Le Monn.**
Referência: Viriato, A. & Trufem, S.F.B. 1985. Rickia 12: 147-154.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Syncephalis cornu* Tiegh. & G. Le Monn.**
Referência: Trufem, S.F.B. 1984. Rickia 11: 53-64.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Syncephalis penicillata* Indoh**
Referência: Viriato, A. & Trufem, S.F.B. 1985. Rickia 12: 147-154.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Syncephalis sphaerica* Tiegh.**
Referência: Viriato, A. & Trufem, S.F.B. 1985. Rickia 12: 147-154.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Syncephalis tengi* S.H. Ou**
Referência: Trufem, S.F.B. 1984. Rickia 11: 53-64.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

ALGAS

Coordenadores: Mariângela Menezes e Carlos Eduardo de Mattos Bicudo
828 gêneros, 3.496 espécies (52 endêmicas), 8 subespécies (nenhuma endêmica),
970 variedades (37 endêmicas)

BACILLARIOPHYCEAE

Enide Eskinazi-Leça, Maria da Glória Gonçalves da Silva Cunha, Marilene Felipe Santiago, Gislayne Cristina Palmeira Borges, Jucicleide Cabral de Lima, Marcos Honorato da Silva, Emerson de Paula Lima, Mariângela Menezes
162 gêneros, 887 espécies (5 endêmicas), 321 variedades (nenhuma endêmica)

Achnanthes Bory

14 espécies (nenhuma endêmica), 6 variedades (nenhuma endêmica)

***Achnanthes acares* Hohn & Hellerman**
Distribuição: nativa; não endêmica

Achnanthes acares* Hohn & Hellerman var. *acares
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009.
Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica; epicontinental

***Achnanthes brevipes* C.Agardh**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Achnanthes brevipes* var. *angustata* (W.Greg.) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006.
Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); marinho

***Achnanthes brevipes* var. *intermedia* (Kütz.) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008.
Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),
Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho

***Achnanthes brevipes* var. *parvula* (Kütz.) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008.
Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); marinho

***Achnanthes coarctata* (Bréb.) Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006.
Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); marinho

***Achnanthes curvirostrum* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006.
Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); marinho

***Achnanthes elata* (Leud.-Fortm.) Gandhi**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006.
Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); marinho

***Achnanthes fimbriata* (Grunow) R.Ross**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006.
Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); marinho

***Achnanthes inflata* (Kütz.) Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006.
Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul
(PR); Domínio desconhecido; epicontinental, marinho



***Achnanthes leontopithecus-rosalia* J.C.Costa**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Achnanthes longipes* C.Agardh**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Achnanthes oblongella* Oestrup**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Achnanthes parvula* (Kütz.) Cleve**
Referência: Azevedo, A.C.G. & Cutrim, M.V.J. 2000. Boletim do Laboratório de Hidrobiologia 13: 1-17.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); marinho
***Achnanthes pulchra* C.Zimm.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Achnanthes rupestoides* Hohn**
Distribuição: nativa; não endêmica
Achnanthes rupestoides* Hohn var. *rupestoides
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Achnanthes ventralis* (Krasske) Lange-Bert.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Achnanthidium Kütz.

7 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Achnanthidium affine* (Grunow) Czarn.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Achnanthidium biasolettianum* (Grunow) Round & Bukht.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Achnanthidium exiguum* (Grunow) Czarn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Achnanthidium exiguum* var. *constrictum* (Torka) Andresen et al.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Achnanthidium lanceolatum* Bréb. *ex* Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Achnanthidium microcephalum* Kütz.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Achnanthidium minutissimum* (Kütz.) Czarn.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Achnanthidium tenera* Hust.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Actinella Lewis

9 espécies (1 endêmica)
***Actinella brasiliensis* Grunow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Actinella curvatula* Kociolek**
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Actinella eunotioides* Hust.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Actinella guianensis* Grunow**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2009. Acta Limn. Bras. 2(2): 227-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Actinella leontopithecus-rosalia* J.C.Costa**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Actinella mirabilis* (Eulenst. *ex* Grunow) Grunow**
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Actinella peronioides* Hust.**
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Actinella robusta* Hust.**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2009. Acta Limn. Bras. 2(2): 227-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Actinella siolii* Hust.**
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

Actinocyclus Ehrenb.

10 espécies (nenhuma endêmica), 6 variedades (nenhuma endêmica)

***Actinocyclus alienus* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Actinocyclus australis* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Actinocyclus cholnokyi* VanLand.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Actinocyclus curvatulus* C.Janisch**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Actinocyclus divisus* (Grunow) Hust.**
Referência: Paiva, R.S. et al. 2006. Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 1(2): 133-146.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Actinocyclus normanii* (W.Greg.) Hust.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Actinocyclus normanii* (Gregory) Hustedt var. *normanii
Referência: Ludwig, T.A.V. et al. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 97-106. Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Actinocyclus octonarius* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Actinocyclus octonarius* var. *crassus* (W.Sm.) Hendey**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho

Actinocyclus octonarius* Ehrenb. var. *octonarius
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Actinocyclus octonarius* var. *ralfsii* (W.Sm.) Hendey**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Actinocyclus octonarius* var. *tenellus* (W.Sm.) Hust.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Actinocyclus platensis* Müll.Melch.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Actinocyclus subtilis* (W.Greg.) Ralfs**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho

***Actinocyclus tenelus* (Bréb.) Hust.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Actinoptychus Ehrenb.

9 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)

***Actinoptychus adriaticus* Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Actinoptychus adriaticus* var. *pumila* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Actinoptychus campanulifer* A.W.F.Schmidt**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Actinoptychus crepido* A.W.F.Schmidt**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Actinoptychus glabratus* (Grunow) Van Heurck**
Distribuição: nativa; não endêmica

Actinoptychus glabratus* (Grunow) Van Heurck var. *glabratus
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Actinoptychus ranunculus* Brun**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Actinoptychus senarius* Ehrenb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Actinoptychus splendens* (Shadbolt) Ralfs**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Actinoptychus turgidus* Tèmpere & Brun**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Actinoptychus vulgaris* Schumann**
Distribuição: nativa; não endêmica

Actinoptychus vulgaris* Schumann var. *vulgaris
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sul (PR, SC, RS); marinho

Amphipleura Kütz.

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Amphipleura pellucida* (Kütz.) Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Amphipleura pellucida* (Kütz.) Kütz. var. *pellucida
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho

Amphiprora Kütz.

3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Amphiprora conspicua* Grev.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Amphiprora gigantea* Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Amphiprora gigantea* var. *sulcata* (O'Meara) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Amphiprora pulchra* Bailey**
Distribuição: nativa; não endêmica

Amphiprora pulchra* Bailey var. *pulchra
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (SP); marinho

Amphora Ehrenb. *ex* Kütz.

31 espécies (nenhuma endêmica), 7 variedades (nenhuma endêmica)

***Amphora acuta* W.Greg.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Amphora acuta* W.Greg. var. *acuta
Referência: Leão, B.M. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho

***Amphora acutiuscula* Kütz.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); marinho

***Amphora angusta* W.Greg.**
Referência: Costa, M.M.S. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 713-719.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Amphora arenaria* Donkin**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Amphora bigibba* Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Amphora bigibba* var. *capitata* Hagelst.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Amphora caroliniana* Giffen**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Amphora coffeaeformis* (C.Agardh) Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Amphora coffeaeformis* var. *borealis* (Kütz.) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Amphora commutata* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho

***Amphora copulata* (Kütz.) Schoeman & Archibald**
Distribuição: nativa; não endêmica

Amphora copulata* (Kütz.) Schoeman & Archibald var. *copulata
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Amphora costata* W.Sm.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Amphora crassa* W.Greg.**
Referência: Leão, B.M. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho

***Amphora decussata* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Amphora exigua* W.Greg.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Amphora fluminensis* Grunow**
Referência: Leão, B.M. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho

***Amphora granulata* W.Greg.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Amphora hyalina* Kütz.**
Referência: Leão, B.M. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido; epicontinental, marinho

***Amphora javanica* A.W.F.Schmidt**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Amphora laevis* W.Greg.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Amphora lineolata* Ehrenb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Amphora marina* (W.Sm.) Van Heurck**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Amphora obtusa* W.Greg.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho
***Amphora ostrearia* Bréb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Amphora ostrearia* var. *lineata* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
Amphora ostrearia* Bréb. var. *ostrearia
Referência: Leão, B.M. et al. 2009. Acta Bot. Brasil. 22(3): 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho
***Amphora ovalis* (Kütz.) Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Amphora ovalis* (Kütz.) Kütz. var. *ovalis
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Amphora proteoides* Hust.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Amphora proteus* W.Greg.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Amphora salina* W.Sm.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Amphora sulcata* (Bréb.) Cleve**
Referência: Leão, B.M. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho
***Amphora tumida* Hust.**
Referência: Garcia, M. & Souza, V.F. 2008. Iheringia, Bot. 63(1): 139-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); marinho
***Amphora turgida* W.Greg.**
Referência: Leão, B.M. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Amphora veneta* Kütz.**
Referência: Leão, B.M. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Amphora wisei* (Salah) Simonsen**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Anaulus Ehrenb.

1 espécie (não endêmica)
***Anaulus australis* Drebes & Schulz**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Anorthoneis Grunow

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Anorthoneis eurystoma* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Anorthoneis excentrica* (Donkin) Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Anorthoneis hyalina* Hust.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

Arachnoidiscus H.Deane *ex* G.Shadbolt

1 espécie (não endêmica)
***Arachnoidiscus ehrenbergii* Bailey *ex* Ehrenb.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Ardissonia De Not.

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Ardissonia formosa* (Hantzsch) Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Ardissonia fulgens* (Grev.) Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ardissonia fulgens* var. *gigantea* (Lobarz.) Rabenh.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Asterionella Hassall
1 espécie (não endêmica)
***Asterionella formosa* Hassall**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho

Asterionellopsis Round
1 espécie (não endêmica)
***Asterionellopsis glacialis* (Castracane) Round**
Referência: Honorato da Silva, M. et al. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(2): 355-368.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Asteromphalus Ehrenb.
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Asteromphalus arachne* (Bréb.) Ralfs**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Asteromphalus elegans* Grev.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Asteromphalus flabellatus* (Bréb.) Grev.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Asteromphalus heptactis* (Bréb.) Ralfs**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Asteromphalus hookerii* Ehrenb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Asteromphalus sarcophagus* G.C.Wall.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Asteroplanus Gardner & R.M.Crawford
1 espécie (não endêmica)
***Asteroplanus karianus* (Grunow) Gardner & R.M.Crawford**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido

Aulacodiscus Ehrenb.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Aulacodiscus argus* (Ehrenb.) A.W.F.Schmidt**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Aulacodiscus crux* Ehrenb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Aulacoseira Thwaites
14 espécies (nenhuma endêmica), 12 variedades (nenhuma endêmica)
***Aulacoseira agassizii* (Ostenf.) Simonsen**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aulacoseira agassizii* (Ostenf.) Simonsen var. *agassizii
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Aulacoseira agassizii* var. *malayensis* (Hust.) Simonsen**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Aulacoseira alpigena* (Grunow) Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aulacoseira alpigena* (Grunow) Krammer var. *alpigena
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Aulacoseira ambigua* (Grunow) Simonsen**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aulacoseira ambigua* (Grunow) Simonsen var. *ambigua
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aulacoseira crenulata* (Ehrenb.) Thwaites**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aulacoseira crenulata* (Ehrenb.) Thwaites var. *crenulata
Referência: Ludwig, T.A.V. et al. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 97-106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Aulacoseira distans* (Ehrenb.) Simonsen**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Aulacoseira granulata* (Ehrenb.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Aulacoseira granulata* var. *angustissima* O.F.Müller**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA, RN, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Aulacoseira granulata* (Ehrenb.) Ralfs var. *granulata
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Aulacoseira granulata* var. *valida* (Hust.) Simonsen**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aulacoseira herzogii* (Lemmerm.) Simonsen**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Aulacoseira italica* (Ehrenb.) Simonsen**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aulacoseira italica* (Ehrenb.) Simonsen var. *italica
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2001. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aulacoseira italica* var. *tenuis* (Kütz.) Simonsen**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Aulacoseira lacustris* (Grunow) Krammer**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Aulacoseira lyrata* (Ehrenb.) R.Ross**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Aulacoseira muzzanensis* (Meister) Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aulacoseira muzzanensis* (Meister) Krammer var. *muzzanensis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aulacoseira nyassensis* (O.F.Müller) Simonsen**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Aulacoseira nyassensis* var. *victoriae* (O.F.Müller) Simonsen**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Aulacoseira pseudogranulata* (Cleve) Simonsen**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aulacoseira tenella* (Nygaard) Simonsen**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2006. Iheringia, Bot. 61(1-2): 105-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Auliscus Ehrenb.

3 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Auliscus pruinosus* Bailey**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sul (SC); marinho
***Auliscus punctatus* Bailey**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (SC); marinho
***Auliscus sculptus* (W.Sm.) Ralfs**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

Bacillaria Gmelin

1 espécie (não endêmica)
***Bacillaria paxillifer* (O.F.Müller) Hendey**
Referência: Honorato da Silva, M. et al. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(2): 355-368.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

Bacteriastrum Shadbolt

6 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Bacteriastrum comosum* Pavill.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Bacteriastrum delicatulum* Cleve**
Referência: Paiva, R.S. et al. 2006. Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 1(2): 133-146.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Bacteriastrum elegans* Pavill.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Bacteriastrum elongatum* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Bacteriastrum furcatum* Shadbolt**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Bacteriastrum hyalinum* Lauder**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Bacteriastrum hyalinum* var. *princeps* (Castracane) Ikari**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho

Bellerochea Van Heurck *emend.* Stosch
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Bellerochea horologicales* Sotsch**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Bellerochea malleus* (Brightw.) Van Heurck**
Referência: Honorato da Silva, M. et al. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(2): 355-368.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho

Berkeleya Grev.
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Berkeleya scopulorum* (Bréb. *ex* Kütz.) Cox**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Berkeleya scopulorum* var. *belgica* (Van Heurck)**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Biddulphia Gray
9 espécies (nenhuma endêmica)
***Biddulphia alternans* (Bailey) Van Heurck**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Biddulphia antediluviana* (Ehrenb.) Van Heurck**
Distribuição: nativa; não endêmica; marinho
***Biddulphia biddulphiana* W.Sm.**
Referência: Costa, M.M.S. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 713-719.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Biddulphia dubia* (Brightw.) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); marinho
***Biddulphia obtusa* (Kütz.) Ralfs**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (SC); marinho
***Biddulphia reticulata* Roper**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Biddulphia reticulum* (Ehrenb.) Boyer**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Biddulphia tridens* (Ehrenb.) Ehrenb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE, AL), Sudeste (ES, SP), Sul (PR); marinho
***Biddulphia tuomeyii* (Bailey) Roper**
Referência: Sousa, E.B. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 626-636.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (SP); marinho

Biremis D.G.Mann & Cox
1 espécie (não endêmica)
***Biremis circumtexta* (F.Meister *ex* Hust.) Witkowski & Lange-Bert.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Bleakeleya Round
1 espécie (não endêmica)
***Bleakeleya notata* (Grunow) Round**
Referência: Honorato da Silva, M. et al. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(2): 355-368.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP); marinho

Brachysira Kütz.
10 espécies (nenhuma endêmica), 8 variedades (nenhuma endêmica)
***Brachysira apiculata* (Boyer) Lange-Bert. & Moser**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Brachysira brebissonii* R.Ross**
Distribuição: nativa; não endêmica
Brachysira brebissonii* R.Ross var. *brebissonii
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Brachysira exilis* (Kütz.) Round & D.G.Mann**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Brachysira inamoena* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2006. Iheringia, Bot. 61(1-2): 105-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Brachysira kuntzei* (Reichelt) Metzeltin & Lang.-Bert.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Brachysira kuntzei* (Reichelt) Metzeltin & Lang.-Bert. var. *kuntzei
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Brachysira neoxilis* Lange-Bert. & Moser**
Distribuição: nativa; não endêmica
Brachysira neoxilis* Lange-Bert. & Moser var. *neoxilis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Brachysira rostrata* (Krasske) Metzeltin & Lange-Bert.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Brachysira rostrata* (Krasske) Metzeltin & Lange-Bert. var. *rostrata
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Brachysira serians* (Bréb.) Round & D.G.Mann**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Brachysira serians* var. *acuta* (Hust.) P.B.Ham.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Brachysira serians* var. *brachysira* (Bréb.) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
Brachysira serians* (Bréb.) Round & D.G.Mann var. *serians
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Brachysira subrostrata* Lange-Bert. & Moser**
Distribuição: nativa; não endêmica
Brachysira subrostrata* Lange-Bert. & Moser var. *subrostrata
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Brachysira vitrea* (Grunow) R.Ross**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Caloneis Cleve

11 espécies (nenhuma endêmica), 7 variedades (nenhuma endêmica)
***Caloneis bacillaris* (W.Greg.) Cleve**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Caloneis bacillaris* var. *cuneata* (Kolbe & Willi Krieg.) Cleve**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Caloneis bacillum* (Grunow) Cleve**
Distribuição: nativa; não endêmica
Caloneis bacillum* (Grunow) Cleve var. *bacillum
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Caloneis bivittata* (Pant.) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Caloneis butantana* Krasske**
Referência: Delgado, S.M. & Souza, M.G.M. 2007. Acta Bot. Brasil. 21(4): 767-776.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado; epicontinental
***Caloneis guadalupensis* Manguin**
Distribuição: nativa; não endêmica
Caloneis guadalupensis* Manguin var. *guadalupensis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Caloneis holstii* (Cleve) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Caloneis hyalina* Hust.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Caloneis hyalina* Hust. var. *hyalina
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Caloneis leptosoma* (Grunow) Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Caloneis leptosoma* (Grunow) Krammer var. *leptosoma
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Caloneis oregonica* (Ehrenb.) R.M.Patrick**
Distribuição: nativa; não endêmica
Caloneis oregonica* (Ehrenb.) R.M.Patrick var. *oregonica
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Caloneis oregonica* var. *quadrilineata* (Grunow *ex* Cleve) R.M.Patrick**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Caloneis permagna* (Bailey) Cleve**
Referência: Honorato da Silva, M. et al. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(2): 355-368.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Caloneis westii* (W.Sm.) Hendey**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Calyptrella Hernández-Becerril & Meave del Castillo

1 espécie (não endêmica)
***Calyptrella robusta* (Norman) Hernández-Becerril & Meave del Castillo**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Campylodiscus Ehrenb. *ex* Kütz.
8 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Campylodiscus angularis* W.Greg.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Campylodiscus clypeus* (Ehrenb.) Ehrenb. *ex* Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Campylodiscus clypeus* (Ehrenb.) Ehrenb. *ex* Kütz. var. *clypeus
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); marinho
***Campylodiscus daemelianus* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Campylodiscus decorus* Bréb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Campylodiscus ecclesianus* Grev.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho
***Campylodiscus fastuosus* Ehrenb.**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); marinho
***Campylodiscus guarujanus* C.Zimm.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Campylodiscus innominatus* R.Ross & Abdin**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Campyloneis Grunow
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Campyloneis curvirotunda* Tempère & Brun**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Campyloneis grevillei* (W.Sm.) Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Campyloneis maxima* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); marinho

Campylosira Grunow *ex* Van Heurck
1 espécie (não endêmica)
***Campylosira cymbelliformis* (A.W.F.Schmidt) Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Capartogramma Kuff.
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Capartogramma crucicula* (Grunow *ex* Cleve) R.Ross**
Distribuição: nativa; não endêmica
Capartogramma crucicula* (Grunow *ex* Cleve) Ross var. *crucicula
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Catacombas D.M.Willians & Round
1 espécie (não endêmica)
***Catacombas gaillonii* (Bory) D.M.Williams & Round**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho

Cerataulina H.Perag. *ex* Schütt
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cerataulina dentata* Hasle**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Cerataulina pelagica* (Cleve) Hendey**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho

Cerataulus Ehrenb.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cerataulus smithii* Ralfs**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Cerataulus turgidus* (Ehrenb.) Ehrenb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

Chaetoceros Ehrenb.
47 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Chaetoceros abnormis* Proshk.-Lavr.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros aequatorialis* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho

***Chaetoceros affinis* Lauder**
Referência: Honorato da Silva, M. et al. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(2): 355-368.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros anastomosans* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Chaetoceros apendiculatus* Müll.Melch.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Chaetoceros atlanticus* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Chaetoceros borealis* Bailey**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Sudeste (ES, SP), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros brevis* Schüt**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros coarctatus* Lauder**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PE, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros concavicornis* Manguin**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros confertus* Müll.Melch.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Chaetoceros constrictus* Gran**
Referência: Sousa, E.B. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 626-636.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Chaetoceros contortus* Schütt**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Chaetoceros convolutus* (Castracane) H.Perag.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Chaetoceros costatus* Pavill.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros curvisetus* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Chaetoceros dadayi* Pavill.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido
***Chaetoceros danicus* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros debilis* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros decipiens* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros didymus* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chaetoceros didymus* var. *protuberans* (Lauder) Gran & Yendo**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Chaetoceros diversus* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros eibenii* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Chaetoceros furcellatus* Bailey**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Chaetoceros holsaticum* Schütt**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Chaetoceros laciniosus* Schütt**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros laeve* Leud.-Fortm.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Chaetoceros lauderi* Ralfs**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros lorenzianus* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Chaetoceros messanensis* (Castracane) H.Perag.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); marinho
***Chaetoceros neglectus* Karsten**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); marinho
***Chaetoceros neogracile* VanLand.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); marinho
***Chaetoceros pelagicum* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Chaetoceros pendulus* Karsten**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros perpusillus* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); marinho
***Chaetoceros peruvianus* Brightw.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Chaetoceros pseudocurvisetus* Manguin**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros radicans* Schütt**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros rostratus* Lauder**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Chaetoceros schuetti* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho
***Chaetoceros similis* Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Chaetoceros simplex* Ostenf.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Chaetoceros socialis* Lauder**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros subtilis* Cleve**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chaetoceros subtilis* var. *abnormis* (Proshk.-Lavr.) Proshk.-Lavr.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Chaetoceros tenuissimus* Meunier**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Chaetoceros tetrastichon* Cleve**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE), Sudeste (SP); marinho
***Chaetoceros tortissimus* Gran**
Referência: Sousa, E.B. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 626-636.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (ES, SP); marinho

Climacodium Grunow

1 espécie (não endêmica)
***Climacodium frauenfeldianum* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho

Climacosphenia Ehrenb.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Climacosphenia elongata* Mereschk.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Climacosphenia moniligera* Ehrenb.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); marinho

Cocconeis Ehrenb.

21 espécies (nenhuma endêmica), 16 variedades (nenhuma endêmica)

***Cocconeis costata* W.Greg.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Cocconeis costata* var. *kerguelensis* (Petit) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Cocconeis debesi* Hust.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido

***Cocconeis diminuta* Pantocsek**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho

***Cocconeis dirupta* W.Greg.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Cocconeis dirupta* W.Greg. var. *dirupta
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Cocconeis dirupta* var. *flexella* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Cocconeis disculoides* Hust.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho

***Cocconeis disculus* (Schum.) Cleve**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Cocconeis disculus* var. *diminuta* (Pant.) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Cocconeis disculus* (Schum.) Cleve var. *disculus
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Cocconeis distans* W.Greg.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sul (PR, RS); marinho

***Cocconeis feuerbomi* Hust.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Cocconeis feuerbomi* Hust. var. *feuerbomi
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Cocconeis fluviatilis* Wallace**
Distribuição: nativa; não endêmica

Cocconeis fluviatilis* Wallace var. *fluviatilis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido; epicontinental

***Cocconeis gibberula* (Grunow) Hust.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Cocconeis grata* A.W.F.Schmidt**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Cocconeis heteroidea* Hantzsch**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Cocconeis heteroidea* var. *curvirotunda* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Cocconeis heteroidea* Hantzsch var. *heteroidea
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Cocconeis lineata* (Ehrenb.) Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Cocconeis neodiminuta* Krammer**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Cocconeis neothumensis* Krammer**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho

***Cocconeis pellucida* (Hantzsch) Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Cocconeis pinnata* W.Greg. *ex* Grev.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

***Cocconeis placentula* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Cocconeis placentula* var. *acuta* Meister**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Cocconeis placentula* var. *euglypta* (Ehrenb.) Grunow**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Cocconeis placentula* var. *lineata* (Ehrenb.) Van Heurck**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Cocconeis placentula* var. *pseudolineata* Geitler**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Cocconeis pseudodisruptoides* Foged**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Cocconeis pseudomarginata* W.Greg.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Cocconeis scutellum* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cocconeis scutellum* var. *adjuncta* A.W.F.Schmidt**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; ambiente desconhecido
***Cocconeis scutellum* var. *distans* (W.Greg.) Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Cocconeis scutellum* var. *riparia* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Corethron (Castracane) H.Perag.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Corethron criophilum* (Castracane) H.Perag.**
Referência: Scarpati, S.L.R. 2004. Variação temporal e espacial da comunidade fitoplanctônica em área de maricultura no sul do Espirito Santo (Anchieta – ES). Monografia de Bacharelado, Universidade Federal do Espírito Santo. p. 55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho
***Corethron pennatum* (Grunow) Ostenf.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Coscinodiscus Ehrenb.

22 espécies (nenhuma endêmica), 11 variedades (nenhuma endêmica)
***Coscinodiscus apiculatus* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Coscinodiscus apiculatus* var. *ambigua* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
Coscinodiscus apiculatus* Ehrenb. var. *apiculatus
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (PR); marinho
***Coscinodiscus asteromphalus* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Coscinodiscus asteromphalus* Ehrenb. var. *asteromphalus
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Coscinodiscus asteromphalus* var. *pabellanica* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); marinho
***Coscinodiscus brasiliensis* Müll.Melch.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Coscinodiscus californicus* Grev.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Coscinodiscus californicus* var. *ecostatus* A.W.F.Schmidt**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Coscinodiscus concinnus* W.Sm.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Coscinodiscus gigas* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Coscinodiscus gigas* Ehrenb. var. *gigas
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Coscinodiscus granii* Gough**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PE, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Coscinodiscus hanckii* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Coscinodiscus heteroporus* Ehrenb.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); marinho
***Coscinodiscus jonesianus* (Grev.) Ostenf.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Coscinodiscus kurzii* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Coscinodiscus marginatus* Ehrenb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Coscinodiscus obscurus* A.W.F.Schmidt**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Coscinodiscus oculus-iridis* (Ehrenb.) Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Coscinodiscus oculus-iridis* var. *loculifera* Rattray**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); marinho
Coscinodiscus oculus-iridis* (Ehrenb.) Ehrenb. var. *oculus-iridis
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Coscinodiscus perforatus* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Coscinodiscus perforatus* var. *cellulosa* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); marinho
***Coscinodiscus perforatus* var. *pavillardii* (Forti) Hust.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Coscinodiscus punctiger* (Castracane) H.Perag.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Coscinodiscus radiatus* Ehrenb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, RN, PE, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Coscinodiscus robustus* Grev.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Coscinodiscus robustus* var. *kittoniana* Rattray**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Coscinodiscus subconcavus* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Coscinodiscus symmetricus* Grev.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Coscinodiscus variabilis* Frenguelli**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Coscinodiscus wailesii* Gran & Angst**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho

Cosmioneis D.G.Mann & Stickle

1 espécie (não endêmica)
***Cosmioneis pusilla* (W.Sm.) D.G.Mann & Stickle**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica; ambiente desconhecido

Craticula Grunow

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Craticula halophila* (Grunow) D.G.Mann**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Craticula perrotettii* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Ctenophora (Grunow) D.M.Williams & Round

1 espécie (não endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Ctenophora pulchella* (Ralfs) D.M.Willians & Round**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ctenophora pulchella* var. *lanceolata* (O'Meara) Bukhtiyarova**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
Ctenophora pulchella* (Ralfs) Williams & Round var. *pulchella
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Cyclotella (Kütz.) Bréb.

7 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)
***Cyclotella atomus* Hust.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(4): 1101-1113.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Cyclotella baltica* (Grunow) Håk.**
Referência: Ribeiro, F.C.P. et al. 2008. Rodriguésia 59(2): 309-324.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP); marinho
***Cyclotella choctawhatcheeana* Prasad**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(4): 1101-1113.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Cyclotella kuetzingiana* Thwaites**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cyclotella kuetzingiana* Thwaites var. *kuetzingiana
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Cyclotella litoralis* Lange & Syvertsen**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Cyclotella meneghiniana* Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cyclotella meneghiniana* Kütz. var. *meneghiniana
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido; epicontinental
***Cyclotella stylorum* Brightw.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Cylindrotheca Rabenh.

1 espécie (não endêmica)
***Cylindrotheca closterium* (Ehrenb.) Lewin & Reimann**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PB, PE, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido; epicontinental

Cymatosira Grunow

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Cymatosira adaroi* Azpeitia**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Cymatosira belgica* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); marinho
***Cymatosira lorenziana* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Cymbella C.Agardh

10 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Cymbella affinis* Kütz.**
Referência: Oliveira, M.A. et al. 2002. Acta Bot. Brasil. 16(2): 151-160.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Cymbella amphioxys* (Kütz.) Grunow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cymbella angustata* (W.Sm.) Cleve**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cymbella aspera* (Ehrenb.) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Cymbella capitata* C.Zimm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cymbella cymbiformis* C.Agardh**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cymbella cymbiformis* C.Agardh var. *cymbiformis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Cymbella lanceolata* (Ehrenb.) Kirchner**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido; epicontinental
***Cymbella similis* Krasske**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cymbella tumida* (Bréb. ex Kütz.) Van Heurck**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cymbella tumida* (Bréb. ex Kütz.) Van Heurck var. *tumida
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Cymbella turgida* W.Greg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Dactyliosolen (Castracane) H.Perag.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Dactyliosolen fragilissimus* (Bergon) Hasle**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho

***Dactyliosolen phuketensis* (Sundström) Hasle**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Delphineis Andrews
1 espécie (não endêmica)
***Delphineis surirella* (Ehrenb.) Andrews**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Denticella Ehrenb.
1 espécie (não endêmica)
***Denticella seticulosa* (Grev.) Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Denticula Ehrenb.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Denticula antillarum* Cleve & Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Denticula dusenii* Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Denticula elegans* Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Desmogonium Ehrenb.
1 espécie (não endêmica)
***Desmogonium guianense* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

Detonula Schütt *ex* De Toni
1 espécie (não endêmica)
***Detonula pumila* (Castracane) Schütt**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho

Diadesmis Kütz.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Diadesmis brekkaensis* (J.B.Petersen) D.G.Mann**
Referência: Oliveira, M.A. et al. 2002. Acta Bot. Brasil. 16(2): 151-160.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Diadesmis confervacea* Kütz.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Diadesmis contenta* (Grunow) D.G.Mann**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Diatoma Bory
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Diatoma tenuis* C.Agardh**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Diatoma vulgare* Bory**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Dicladia Ehrenb.
1 espécie (não endêmica)
***Dicladia capreolus* Ehrenb.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Dimeregramma (Shadbolt) Ralfs
43 espécies (nenhuma endêmica)
***Dimeregramma marinum* (W.Greg.) Ralfs *ex* A.Pritch.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Dimeregramma minor* (W.Greg.) Ralfs**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sul (PR, RS); marinho
***Dimeregramma rostratum* Hust.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); marinho

Diploneis Ehrenb. *ex* Cleve
17 espécies (nenhuma endêmica)
***Diploneis bomboides* (A.W.F.Schmidt) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Diploneis bombus* (Ehrenb.) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido; epicontinental
***Diploneis chersonensis* (Grunow) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Diploneis coffaeiformis* (A.W.F.Schmidt) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho

***Diploneis crabro* Ehrenb.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Diploneis elliptica* (Kütz.) Cleve**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Diploneis fusca* (W.Greg.) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Diploneis gruendleri* (A.W.F.Schmidt) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Diploneis interrupta* (Kütz.) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Diploneis litoralis* (Donkin) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Diploneis nitescens* (W.Greg.) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Diploneis ovalis* (Hilse) Cleve**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Diploneis pseudovalis* Hust.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Diploneis smithii* (Bréb.) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Diploneis splendida* (W.Greg.) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido
***Diploneis subovalis* Cleve**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Diploneis weissflogii* (A.W.F.Schmidt) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho

Discostella Houk & Klee

2 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Discostella pseudostelligera* (Hust.) Houk & Klee**
Distribuição: nativa; não endêmica
Discostella pseudostelligera* (Hust.) Houk & Klee var. *pseudostelligera
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Discostella stelligera* (Cleve & Grunow) Houk & Klee**
Distribuição: nativa; não endêmica
Discostella stelligera* (Cleve & Grunow) Houk & Klee var. *stelligera
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Ditylum Bailey

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Ditylum brightwellii* (West) Grunow**
Referência: Sousa, E.B. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 626-636.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Ditylum sol* (Grunow) De Toni**
Referência: Sousa, E.B. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 626-636.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho

Encyonema Kütz.

11 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Encyonema gracile* Ehrenb.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Encyonema lacustre* (C.Agardh) D.G.Mann**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Encyonema lunatum* (W.Sm.) Van Heurck**
Distribuição: nativa; não endêmica
Encyonema lunatum* (W.Sm.) Van Heurck var. *lunatum
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Encyonema mesianum* (Cholnoky) D.G.Mann**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica; epicontinental

***Encyonema minutum* (Hilse *ex* Rabenh.) D.G.Mann**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Encyonema neomesianum* Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Encyonema neomesianum* Kütz. var. *neomesianum
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Encyonema perpusillum* (A.Cleve) D.G.Mann**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Encyonema prostratum* (Ber.) Kütz.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Encyonema silesiacum* (Bleisch) D.G.Mann**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Encyonema turgidum* (W.Greg.) Grunow *ex* A.W.F.Schmidt**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Encyonema ventricosum* (C.Agardh) Grunow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Encyonopsis Krammer

4 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Encyonopsis frequentis* Krammer**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2009. Acta Limn. Bras. 2(2): 227-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Encyonopsis microcephala* (Grunow) Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Encyonopsis microcephala* (Grunow) Krammer var. *microcephala
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Encyonopsis spicula* (Hust.) Krammer**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Encyonopsis subcapitata* Krammer**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2006. Iheringia, Bot. 61(1-2): 105-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Endictya Ehrenb.

1 espécie (não endêmica)
***Endictya oceanica* Ehrenb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Entomoneis Ehrenb.

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Entomoneis alata* (Ehrenb.) Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Entomoneis alata* var. *pulchra* (Bailey) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); marinho

Eolimna Lange-Bert. & W.Schiller *in* W.Schiller & Lange-Bert.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Eolimna minima* (Grunow) Lange-Bert.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eolimna subminuscula* (Manguin) Lange-Bert. & W.Schiller**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Epithemia Bréb.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Epithemia adnata* (Kütz.) Bréb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Epithemia turgida* (Ehrenb.) Kütz.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho

Eucampia Ehrenb.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Eucampia antarctica* (Castracane) Mangin**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); marinho
***Eucampia cornuta* (Cleve) Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Eucampia zodiacus* Ehrenb.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho

Eunotia Ehrenb.

63 espécies (1 endêmica), 38 variedades (nenhuma endêmica)

***Eunotia arcus* Ehrenb.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Eunotia asterionelloides* Hust.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Eunotia asterionelloides* Hust. var. *asterionelloides
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Eunotia augusta* (Grunow) Berg**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Eunotia auriculata* Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica

Eunotia auriculata* Grunow var. *auriculata
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Eunotia biceps* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Eunotia bidentula* W.Sm.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Eunotia bigibba* Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Eunotia bigibba* Kütz. var. *bigibba
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Eunotia bigibba* var. *pumila* Grunow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Eunotia camelus* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Eunotia camelus* Ehrenb. var. *camelus
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Eunotia camelus* var. *denticulata* Grunow**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Eunotia convexa* Hust.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Eunotia curvula* Hust.**
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Eunotia dacostae* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2009. Acta Limn. Bras. 2(2): 227-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Eunotia depressa* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Eunotia didyma* Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica

Eunotia didyma* Grunow var. *didyma
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Eunotia didyma* var. *gibbosa* (Grunow) Hust.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Eunotia didyma* var. *media* Hust.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Eunotia diodon* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Eunotia diodon* Ehrenb. var. *diodon
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Eunotia faba* (Ehrenb.) Grunow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Eunotia falcifera* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Espejo-Serena, A. & López-Ferrari, A.R. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Eunotia femoriformis* (R.M.Patrick) Hust.**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2009. Acta Limn. Bras. 2(2): 227-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Eunotia flexuosa* (Bréb.) Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia georgii* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Eunotia gibbosa* Grunow**
Referência: Espejo-Serena, A. & López-Ferrari, A.R. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Eunotia gracilis* (Ehrenb.) Rabenh.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia incisa* W.Greg.**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2009. Acta Limn. Bras. 2(2): 227-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia indica* Grunow**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia intermedia* (Krasske *ex* Hust.) Nörpel & Lange-Bert.**
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia; epicontinental
***Eunotia itapuana* Torgan**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Eunotia januarii* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia lunaris* (Ehrenb.) Bréb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eunotia lunaris* (Ehrenb.) Bréb. var. *lunaris
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia maior* (W.Sm.) Rabenh.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia minor* (Kütz.) Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia monodon* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eunotia monodon* var. *bidens* (W.Greg.) Hust.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia monodon* var. *constricta* Hust.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia naegelii* Migula**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia paludosa* Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eunotia paludosa* Grunow var. *paludosa
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia papilio* (Ehrenb.) Grunow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia parallela* Ehrenb.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia parasiolii* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia pectinalis* (Kütz.) Rabenh.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eunotia pectinalis* var. *didymodon* (Grunow) Berg**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia pectinalis* var. *minor* (Kütz.) Rabenh.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia pectinalis* var. *rostrata* Germain**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia pectinalis* var. *undulata* (Ralfs) Rabenh.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia praerupta* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Eunotia praerupta* var. *bidens* (Ehrenb.) Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia praerupta* var. *inflata* Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
Eunotia praerupta* Ehrenb. var. *praerupta
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia praerupta* var. *tridentada* (Ehrenb.) Freng.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Eunotia pseudoindica* Freng.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eunotia pseudoindica* var. *bigibba* (Freng.) Luchini & Verona**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Pampa; epicontinental
Eunotia pseudoindica* Freng. var. *pseudoindica
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia pseudoserra* De Oliveira & Steinitz-Kannan**
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Eunotia pyramidata* Hust.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eunotia pyramidata* var. *monodon* Krasske**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia pyramidata* var. *undulata* Freng.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Eunotia pyramidata* var. *ventralis* Krasske**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia quaternaria* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia quinaria* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia rabenhorstii* Cleve & Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eunotia rabenhorstii* var. *monodon* Cleve & Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Eunotia rabenhorstii* Cleve & Grunow var. *rabenhorstii
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia rabenhorstii* var. *triodon* Cleve & Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia repens* Berg**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia rhomboidea* Hust.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eunotia rhomboidea* Hust. var. *rhomboidea
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia robusta* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eunotia robusta* var. *tetraedron* (Ehrenb.) Ralfs**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Eunotia rostellata* Hust. *ex* R.M.Patrick**
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Eunotia schneideri* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia schwickerdtii* Cholnoky**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia septentrionalis* Oestrup**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia serra* Ehrenb.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia steineckei* Peterson**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Eunotia subrobusta* Hust.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia sudetica* O.F.Müller**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia synedraeformis* Hust.**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2009. Acta Limn. Bras. 2(2): 227-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Eunotia tecta* Krasske**
Distribuição: nativa; não endêmica
Eunotia tecta* Krasske var. *tecta
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia tridentula* Ehrenb.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia trigibba* Hust.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eunotia trigibba* var. *abrupta* Hust.**
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
Eunotia trigibba* Hust. var. *trigibba
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Eunotia valida* Hust.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia vanheurckii* R.M.Patrick**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Eunotia veneris* (Kütz.) De Toni**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Eunotia veneris* var. *exsecta* Cleve**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
Eunotia veneris* (Kütz.) De Toni var. *veneris
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Eunotia ventriosa* R.M.Patrick**
Referência: Ferrari et al. 2007. Acta Amazonica 37(1): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Eunotia zygodon* Ehrenb.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Eunotogramma Weisse

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Eunotogramma dubium* Hust.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Eunotogramma variabile* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Eupodiscus Bailey

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Eupodiscus antiquus* (Cox) Hanna**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); marinho
***Eupodiscus radiatus* Bailey**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Fallacia Stickle & D.G. Mann

7 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Fallacia bioculata* (Grunow *ex* A.W.F.Schmidt) D.G.Mann**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Fallacia fracta* (Hust. *ex* Simonsen) D.G.Mann**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Fallacia insociabilis* (Krasske) D.G.Mann**
Distribuição: nativa; não endêmica
Fallacia insociabilis* (Krasske) D.G.Mann var. *insociabilis
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Fallacia monoculata* (Hust.) D.G.Mann**
Distribuição: nativa; não endêmica
Fallacia monoculata* (Hust.) D.G.Mann var. *monoculata
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Fallacia pygmaea* (Kütz.) Stickle & D.G.Mann**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Fallacia tenera* Hust.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Fallacia teneroides* (Hust.) D.G.Mann**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Fragilaria Lyngb.

7 espécies (nenhuma endêmica), 9 variedades (nenhuma endêmica)
***Fragilaria capucina* Desm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Fragilaria capucina* var. *amphicephala* (Kütz.) Lange-Bert. *ex* Buktyiarova**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
Fragilaria capucina* Desmazières var. *capucina
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Fragilaria capucina* var. *fragilarioides* (Grunow) Ludwig & Flores**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Fragilaria capucina* var. *gracilis* (Östrup) Hust.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Fragilaria capucina* var. *vaucheriae* (Kütz.) Lange-Bert.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Fragilaria danica* (Kütz.) Lange-Bert.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Fragilaria delicatissima* (W.Sm.) Lang.-Bert.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Fragilaria delicatissima* (W.Sm.) Lang.-Bert. var. *delicatissima
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido; epicontinental
***Fragilaria fragilarioides* (Grunow) Cholnoky**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2006. Iheringia, Bot. 61(1-2): 105-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Fragilaria javanica* Hust.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Fragilaria javanica* Hust. var. *javanica
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Fragilaria radians* (Kütz.) D.M.Willians & Round**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Fragilaria rumpens* (Kütz.) Carlson**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Fragilaria rumpens* var. *familiaris* (Kütz.) Hust.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Fragilaria rumpens* (Kütz.) Carlson var. *rumpens
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Fragilariforma D.M.Willians & Round

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Fragilariforma virescens* (Ralfs) D.M.Willians & Round**
Distribuição: nativa; não endêmica
Fragilariforma virescens* (Ralfs) Williams & Round var. *virescens
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Fragilariopsis Hust. *in* A.W.F.Schmidt

1 espécie (não endêmica)
***Fragilariopsis doliolus* (G.C.Wall.) Medlin & Sims**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Frickea G.Heiden

1 espécie (não endêmica)
***Frickea lewisiana* (Grev.) G.Heiden**
Referência: Honorato da Silva, M. et al. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(2): 355-368.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Frustulia Rabenh.

6 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Frustulia crassinervia* (Bréb.) J.C.Costa**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Frustulia rhomboides* (Ehrenb.) De Toni**
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido; epicontinental
***Frustulia saxonica* Rabenh.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Frustulia saxonica* Rabenh. var. *saxonica
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Frustulia vitrea* Oestrup**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Frustulia vulgaris* (Thwaites) De Toni**
Distribuição: nativa; não endêmica
Frustulia vulgaris* (Thwaites) De Toni var. *vulgaris
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Frustulia weinholdii* Hust.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Glyphodesmis Grev.

1 espécie (não endêmica)
***Glyphodesmis eximia* Grev.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho

Gomphonema Ehrenb.

10 espécies (nenhuma endêmica), 16 variedades (nenhuma endêmica)
***Gomphonema acuminatum* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Gomphonema acuminatum* Ehrenb. var. *acuminatum
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Gomphonema acuminatum* var. *augur
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gomphonema acuminatum* var. *brebissonii* (Kütz.) Cleve**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Gomphonema acuminatum* var. *coronata* (Ehrenb.) W.Sm.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gomphonema affine* Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Gomphonema affine* Kütz. var. *affine
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gomphonema affine* var. *insigne* (W.Greg.) Andrews**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gomphonema agnitum* Hust.**
Referência: Ribeiro, F.C.P. et al. 2008. Rodriguésia 59(2): 309-324.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia; epicontinental
***Gomphonema archaevibrio* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Gomphonema archaevibrio* var. *cuneata* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2009. Acta Limn. Bras. 2(2): 227-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Gomphonema augur* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Gomphonema augur* Ehrenb. var. *augur
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gomphonema augur* var. *turris* (Ehrenb.) Lange-Bert.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Gomphonema brasiliense* Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica
Gomphonema brasiliense* Grunow var. *brasiliense
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Gomphonema brasiliense* var. *demerarae* Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; ambiente desconhecido
***Gomphonema clavatoides* H.P.Gandhi**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gomphonema gibberum* Hust.**
Referência: Ribeiro, F.C.P. et al. 2008. Rodriguésia 59(2): 309-324.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia; epicontinental
***Gomphonema gracile* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Gomphonema gracile* Ehrenb. var. *gracile
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gomphonema gracile* var. *lanceolata* Kütz.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Gomphonema parvulum* (Kütz.) Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Gomphonema parvulum* var. *lanceolata* Grunow**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gomphonema parvulum* var. *micropus* (Kütz.) Cleve**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Gomphonema parvulum* (Kütz.) Kütz. var. *parvulum
Referência: Raupp, S.V. et al. 2006. Iheringia, Bot. 61(1-2): 105-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Gomphosphenia Lange-Bert.

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Gomphosphenia grove* Lange-Bert.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Gomphosphenia grove* var. *lingulata* (Hust.) Lange-Bert.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Gomphosphenia reicheltii* (M.Schmidt) Lang.- Bert.**
Referência: Ribeiro, F.C.P. et al. 2008. Rodriguésia 59(2): 309-324.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia; epicontinental

Goniothecium Ehrenb.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Goniothecium gastridium* Ehrenb.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Goniothecium hispidum* Ehrenb.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Grammatophora Ehrenb.

9 espécies (nenhuma endêmica)
***Grammatophora angulosa* Ehrenb.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Grammatophora flexuosa* Grunow**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho
***Grammatophora gibberula* Kütz.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Grammatophora hamulifera* Kütz.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PE, AL), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Grammatophora marina* (Lyngb.) Kütz.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PE, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido
***Grammatophora maxima* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); marinho
***Grammatophora oceanica* Ehrenb.**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PB, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido
***Grammatophora serpentina* Ehrenb.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Grammatophora undulata* Ehrenb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); marinho

Guinardia H.Perag.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Guinardia cylindrus* (Cleve) Hasle**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sul (PR); marinho
***Guinardia delicatula* (Cleve) Hasle**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho
***Guinardia flaccida* (Castracane) H.Perag.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho

***Guinardia striata* (Stolterfoth) Hasle**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Gyrosigma Hassall

16 espécies (nenhuma endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)
***Gyrosigma acuminatum* (Kütz.) Rabenh.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gyrosigma attenuatum* (Kütz.) Rabenh.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gyrosigma balticum* (Ehrenb.) Rabenh.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido; epicontinental
***Gyrosigma distortum* (W.Sm.) Griffith & Henfrey**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Gyrosigma distortum* var. *parkeri* (Harrison) Cleve**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gyrosigma exilis* (Grunow) Reimer**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gyrosigma eximium* (Thwaites) Boyer**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Pampa; epicontinental
***Gyrosigma exoticum* Cholnoky**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Gyrosigma fasciola* (Ehrenb.) Griffith & Henfr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Gyrosigma fasciola* var. *arcuatum* (Donkin) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Gyrosigma fasciola* var. *sulcata* (Grunow) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Gyrosigma hippocampus* (Ehrenb.) Hassal**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Gyrosigma littorale* (W.Sm.) Griffith & Henfrey**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Gyrosigma macrum* (W.Sm.) Griffith & Henfrey**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gyrosigma rectum* (Donkin) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Gyrosigma scalproides* (Rabenh.) Cleve**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Gyrosigma spencerii* (Quekett) Griffith & Henfrey**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Gyrosigma spencerii* var. *curvula* (Grunow) Reimer**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Gyrosigma spencerii* (Quekett) Griffi th & Henfrey var. *spencerii
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gyrosigma strigile* (W.Sm.) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Gyrosigma temperei* Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Hantzschia Grunow

3 espécies (nenhuma endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)
***Hantzschia amphioxys* (Ehrenb.) Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica
Hantzschia amphioxys* var. *amphyoxis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Hantzschia amphioxys* var. *capitata* O.F.Müller**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Hantzschia amphioxys* var. *gracilis* Hust.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Hantzschia amphioxys* var. *maior* Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Hantzschia amphioxys* var. *xerophila* Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Hantzschia elongata* (Hantzsch) Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Hantzschia virgata* (Roper) Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Haslea Simonsen

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Haslea crucigera* (W.Sm.) Simonsen**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Haslea wawrikae* (Hust.) Simonsen**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Helicotheca Ricard

1 espécie (não endêmica)
***Helicotheca tamesis* (Shrubsole) Ricard**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho

Hemiaulus Heiberg

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Hemiaulus hauckii* Grunow *ex* Van Heurck**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho
***Hemiaulus indicus* Karsten**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); marinho
***Hemiaulus membranaceus* Cleve**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (RN, PE, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Hemiaulus sinensis* Grev.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Hemidiscus G.C.Wall.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hemidiscus cuneiformis* G.C.Wall.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Hemidiscus ovalis* (Gersonde) D.M.Harwood & T.Maruyama**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Hippodonta Lange-Bert. et al.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hippodonta capitata* (Ehrenb.) Lange-Bert.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Hippodonta hungarica* (Grunow) Lange-Bert.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Hyalodiscus Ehrenb.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hyalodiscus scoticus* (Kütz.) Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); marinho
***Hyalodiscus stelliger* Bailey**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); marinho

Hyalosynedra D.M.Willians & Round
1 espécie (não endêmica)
***Hyalosynedra laevigata* (Grunow) D.M.Williams & Round**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Hydrosera G.C.Wall.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hydrosera triquetra* G.D.Wall.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Hydrosera whampoensis* (Schwartz) Deby**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica; epicontinental

Isthmia C.Agardh
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Isthmia enervis* Ehrenb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido
***Isthmia minima* Harv. & Bailey**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Isthmia nervosa* Kütz.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Lauderia Cleve
1 espécie (não endêmica)
***Lauderia annulata* Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

Lemnicola Round & Basson
1 espécie (não endêmica)
***Lemnicola hungarica* (Grunow) Round & Basson**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Leptocylindrus Cleve
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Leptocylindrus danicus* Cleve**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Leptocylindrus mediterraneus* (H.Perag.) Hasle**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Leptocylindrus minimus* Gran**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Licmophora C.Agardh
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Licmophora lyngbyei* (Kütz.) Grunow *ex* Van Heurck**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); marinho
***Licmophora tincta* (C.Agardh) Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Lioloma Hasle *in* Hasle & Syvertsen
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Lioloma delicatum* (Cupp) Hasle**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Lioloma elongatum* (Grunow) Hasle**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Lioloma pacificum* (Cupp) Hasle**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Liparogyra Ehrenb.
1 espécie (não endêmica)
***Liparogyra spiralis* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Lithodesmium Ehrenb.
1 espécie (não endêmica)
***Lithodesmium undulatum* Ehrenb.**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Luticola D.G.Mann
4 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Luticola mutica* (Kütz.) D.G.Mann**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1990. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Luticola muticoides* (Hust.) D.G.Mann**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Luticola nivalis* (Ehrenb.) D.G.Mann**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Luticola undulata* (Hilse) D.G.Mann**
Distribuição: nativa; não endêmica
Luticola undulata* (Hilse) D.G.Mann var. *undulata
Referência: Raupp, S.V. et al. 2006. Iheringia, Bot. 61(1-2): 105-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Lyrella Karajeva

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Lyrella clavata* (W.Greg.) D.G.Mann**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP); marinho
***Lyrella cohnii* (Hilse) Lange-Bert.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Lyrella hennedyi* (W.Sm.) Stickle & D.G.Mann**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido
***Lyrella lyra* (Ehrenb.) Karajeva**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE, BA, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

Martyana Round

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Martyana martyi* (Hérib.) Round**
Distribuição: nativa; não endêmica
Martyana martyi* (Hérib.) Round var. *martyi
Referência: Brassac, N.M.& Ludwig, T.A. 2003. Rev. bras. bot. 26(3): 311-318.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Mastogloia Thwaites *ex* W.Sm.

7 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Mastogloia apiculata* W.Sm.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); marinho
***Mastogloia binotata* (Grunow) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Mastogloia brauni* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); marinho
***Mastogloia decussata* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); marinho
***Mastogloia exigua* Lewis**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Mastogloia fimbriata* (Brightw.) Cleve**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Mastogloia smithii* Thwaites**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mastogloia smithii* var. *pusilla* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
Mastogloia smithii* Thwaites var. *smithii
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Melosira C.Agardh

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Melosira borreri* Grev.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Melosira lineata* (Dillwyn) C.Agardh**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Melosira moniliformis* (O.F.Müller) C.Agardh**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Melosira octogona* A.W.F.Schmidt**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Melosira setosa* Grev.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido; epicontinental

***Melosira varians* C.Agardh**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Meuniera P.C.Silva

1 espécie (não endêmica)
***Meuniera membranacea* (Cleve) P.C.Silva**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); marinho

Navicula Bory

48 espécies (nenhuma endêmica), 16 variedades (nenhuma endêmica)
***Navicula angusta* Grunow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Navicula atomus* (Kütz.) Grunow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula bacilliformis* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula bottnica* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula bullata* Norman**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula capitatoradiata* Germain**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Navicula cari* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Navicula cari* Ehrenb. var. *cari
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula cincta* (Ehrenb.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Navicula cincta* (Ehrenb.) Ralfs var. *cincta
Referência: Raupp, S.V. et al. 2006. Iheringia, Bot. 61(1-2): 105-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Navicula confervacea* (Kütz.) Grunow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula cryptocephala* Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Navicula cryptocephala* Kütz. var. *cryptocephala
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Navicula cryptotenella* Lange-Bert.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Navicula cryptotenella* Lange-Bert. var. *cryptotenella
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Navicula dariana* A.W.F.Schmidt**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula dicephala* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Navicula dicephala* Ehrenb. var. *dicephala
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula didyma* (Ehrenb.) Kütz.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula dutoitana* Cholnoky**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula eximia* (Grunow) Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula flammarionensis* VanLand.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Navicula floridae* Brun**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Navicula forcipata* Grev.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Navicula forcipata* var. *versicolor* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Navicula gracilis* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Navicula gracilis* Ehrenb. var. *gracilis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula grimmei* Krasske**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula guarujana* C.Zimm.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Navicula guluensis* Giffen**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula insulsa* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2006. Iheringia, Bot. 61(1-2): 105-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Navicula kriegeri* Krasske**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula latiuscula* Kütz.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (SP); marinho
***Navicula liber* (W.Sm.) H.Perag.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Navicula liber* var. *umbilicata* H.Perag.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Navicula longa* (W.Greg.) Ralfs *ex* A.Pritch.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Navicula minuscula* Grunow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula pennata* A.W.F.Schmidt**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Navicula pseudoarvensis* Hust.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Navicula pseudoarvensis* Hust. var. *pseudoarvensis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula pseudobryophila* Hust.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Navicula pseudobryophila* Hust. var. *pseudobryophila
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula radiosa* Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Navicula radiosa* Kütz. var. *radiosa
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula radiosa* var. *tenella* (Bréb. *ex* Kütz.) Grunow**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula rhynchocephala* Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Navicula rostellata* Kütz.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Navicula salinicola* Hust.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula schonfeldii* Hust.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula schroeterii* Meister**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Navicula schroeterii* var. *maister* Krammer & Lange-Bert.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
Navicula schroeterii* Meister var. *schroeterii
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula semen* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula subcarinata* (Grunow *ex* A.W.F.Schmidt) Hendey**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Navicula subplacentula* Hust.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula symmetrica* R.M.Patrick**
Distribuição: nativa; não endêmica
Navicula symmetrica* R.M.Patrick var. *symmetrica
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Navicula tenelloides* Hust.**
Referência: Oliveira, M.A. et al. 2002. Acta Bot. Brasil. 16(2): 151-160.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Navicula tridentula* Krasske**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula trigonocephala* (Ehrenb.) Ralfs**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Navicula tubulosa* Brun**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Navicula veneta* Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Navicula viridula* (Kütz.) Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido; epicontinental

Neidium Pfitzer

10 espécies (nenhuma endêmica), 10 variedades (nenhuma endêmica)
***Neidium affine* (Ehrenb.) Pfitzer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Neidium affine* (Ehrenb.) Pfitzer var. *affine
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Neidium affine* var. *amphirhynchus* (Ehrenb.) Cleve**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Neidium affine* var. *longiceps* (W.Greg.) Cleve**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Neidium bisulcatum* (Lagerst.) Cleve**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Neidium bisulcatum* var. *baicalensis* (Skvortzov & Meyer) Reimer**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Neidium bisulcatum* (Lagerst.) Cleve var. *bisulcatum
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Neidium dilatatum* (Ehrenb.) Cleve**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Neidium gracile* Hust.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Neidium hercynicum* A.Mayer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Neidium hercynicum* A.Mayer var. *hercynicum
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Neidium iridis* (Ehrenb.) Cleve**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Neidium iridis* var. *amphigomphus* (Ehrenb.) A.Mayer**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Neidium iridis* var. *ampliatum* (Ehrenb.) Cleve**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
Neidium iridis* (Ehrenb.) Cleve var. *iridis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Neidium iridis* var. *subampliatum* (Grunow) Cleve-Euler**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Neidium javanicum* Hust.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Neidium maximum* (Cleve) Meister**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Neidium minutissimum* Krasske**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Neidium productum* (W.Sm.) Cleve**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Neocalyptrella Hernández-Becerril & Meave del Castillo

1 espécie (não endêmica)
***Neocalyptrella robusta* (Norman *ex* Ralfs) Hernández-Becerril & Meave del Castillo**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Nitzschia Hassall

35 espécies (nenhuma endêmica), 14 variedades (nenhuma endêmica)
***Nitzschia acicularis* (Kütz.) W.Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Nitzschia acicularis* (Kütz.) W.Sm. var. *acicularis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 1990. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Nitzschia acicularis* var. *closterioides* Grunow**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Nitzschia amphibia* Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1990. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia angularis* W. Sm.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Nitzschia austriaca* Hust.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Nitzschia bilobata* W. Sm.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Nitzschia brevissima* Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Nitzschia brevissima* var. *terricola* (Lund) Ludwig**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2006. Iheringia, Bot. 61(1-2): 105-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia clausii* Hantzsch**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Nitzschia dissipata* (Kütz.) Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho
***Nitzschia fasciculata* Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE), Sul (PR, SC); marinho
***Nitzschia gandersheimiensis* Krasske**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1990. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Nitzschia gracilis* Hantzsch**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia insignis* W. Greg.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Nitzschia intermedia* Hantzsch**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia linearis* (C.Agardh) W. Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Nitzschia linearis* (C.Agardh) W.Sm. var. *linearis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Nitzschia linearis* var. *vitrea* (G.Norman) Hust.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia longissima* (Bréb.) Ralfs**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PE, BA), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Nitzschia lorenziana* Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Nitzschia lorenziana* var. *incerta* Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia microcephala* Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia nana* Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Nitzschia obtusa* W. Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Nitzschia obtusa* var. *nana* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Nitzschia obtusa* var. *scalpelliformis* Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia palea* (Kütz.) W.Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Nitzschia palea* var. *debilis* Grunow**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Nitzschia palea* (Kütz.) W. Sm. var. *palea
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia paleaceae* Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia pusilla* Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia recta* Hantzsch**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia scalpelliformis* (Grunow) Grunow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Nitzschia serrata* Manguin**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Nitzschia sigma* (Kütz.) W.Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Nitzschia sigma* var. *rigidula* (H.Perag. & Perag.) Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Nitzschia sigma* var. *sigmatella* (W.Greg.) Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Nitzschia sigmoidea* (Nitzsch) W. Sm.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Nitzschia sublinearis* Hust.**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2006. Iheringia, Bot. 61(1-2): 105-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia terrestris* (J.B.Petersen) Hust.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia thermalis* (Ehrenb.) Auersw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Nitzschia thermalis* var. *minor* Hilse**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
Nitzschia thermalis* (Ehrenb.) Auersw. var. *thermalis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Nitzschia tubicola* Grunow**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Nitzschia ventricosa* Kitton**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Nitzschia vermicularis* (Kütz.) Hantzsch**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Nitzschia vidovichii* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); marinho
***Nitzschia vivax* W. Sm.**
Referência: Leão, B.M. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Odontella C.Agardh

10 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Odontella aurita* (Lyngb.) C.Agardh**
Distribuição: nativa; não endêmica
Odontella aurita* (Lyngb.) C.Agardh var. *aurita
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (MA, RN, PB, PE, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido; epicontinental

***Odontella aurita* var. *obtusa* (Kütz.) Hust.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (RS); marinho
***Odontella dubia* (Brightw.) Chávez & Baumgartner**
Referência: Costa, M.M.S. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 713-719.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); marinho
***Odontella granulata* (Ropper) R.Ross**
Referência: Paiva, R.S. et al. 2006. Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 1(2): 133-146.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Odontella longicruris* (Grev.) Hoban**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Odontella mobiliensis* (Bailey) Grunow**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Odontella obtusa* Kütz.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Odontella regia* (M.Schultze) Simonsen**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PB, PE), Sudeste (ES, SP), Sul (RS); marinho
***Odontella rhombus* (Ehrenb.) Kütz.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido
***Odontella sinensis* (Grev.) Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Odontella turgida* (Ehrenb.) De Toni**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Orthoseira Thwaites

3 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Orthoseira dendroteres* (Ehrenb.) R.M.Crawford**
Distribuição: nativa; não endêmica
Orthoseira dendroteres* (Ehrenb.) R.M.Crawford var. *dendroteres
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Orthoseira epidendron* (Ehrenb.) R.M.Crawford**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Orthoseira roeseana* (Rabenh.) O'Meara**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Palmerina Hasle

1 espécie (não endêmica)
***Palmerina hardmaniana* (Grev.) Hasle**
Referência: Garcia, M. & Odebrecht, C. 2008. Biota Neotrop. 8(2): 85-90.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); marinho

Paralia Heiberg

1 espécie (não endêmica)
***Paralia sulcata* (Ehrenb.) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Petrodictyon D.G.Mann

1 espécie (não endêmica)
Petrodictyon gemma (Ehrenb.) D.G.Mann
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (ES, SP), Sul (SC, RS); marinho

Petroneis A.J.Stickle & D.G.Mann

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Petroneis marina* (Ralfs *ex* Pritchard) D.G.Mann**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Petroneis plagiostoma* (Grunow) D.G.Mann**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Phaeodactylum Bohlin

1 espécie (não endêmica)
***Phaeodactylum tricornutum* Bohlin**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Pinnularia Ehrenb.

50 espécies (1 endêmica), 32 variedades (nenhuma endêmica)
***Pinnularia acrosphaeria* (Bréb.) W.Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia acrosphaeria* (Bréb.) W.Sm. var. *acrosphaeria
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia aestuarii* Cleve**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Pinnularia amazonica* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Delgado, S.M. & Souza, M.G.M. 2007. Acta Bot. Brasil. 21(4): 767-776.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado; epicontinental
***Pinnularia amblys* Hohn & Hellerman**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia angusta* (Cleve) Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia angusta* (Cleve) Krammer var. *angusta
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia biceps* W. Greg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia biceps* Gregory var. *biceps
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia borealis* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia borealis* Ehrenb. var. *borealis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia borealis* var. *rectangularis* G.W.F.Carlson**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Pinnularia borealis* var. *subislandica* Krammer**
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia brauniana* (Grunow) Mills**
Referência: Delgado, S.M. & Souza, M.G.M. 2007. Acta Bot. Brasil. 21(4): 767-776.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia brebissonii* (Kütz.) Rabenh.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia brebissonii* (Kütz.) Rabenh. var. *brebissonii
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Pinnularia caloneiformis* Hust.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia cardinalis* (Ehrenb.) W.Sm.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia clericii* Frenguelli**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia crucifera* Cleve**
Referência: Delgado, S.M. & Souza, M.G.M. 2007. Acta Bot. Brasil. 21(4): 767-776.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia decrescens* (Grunow) Krammer**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia divergens* W.Sm.**
Referência: Paiva, R.S. et al. 2006. Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 1(2): 133-146.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (RN), Centro-Oeste (GO), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Pinnularia divergentissima* Grunow**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Pinnularia eburnea* Zanon**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia episcopalis* Cleve**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia gentilis* (Donkin) Cleve**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia gentilis* (Donkin) Cleve var. *gentilis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia gibba* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia gibba* Ehrenb. var. *gibba
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia gibba* var. *sancta* (Grunow *ex* Cleve) Meister**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia graciloides* Hust.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Pinnularia hambergii* (Hust.) Brander**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia hemiptera* (Kütz.) Rabenh.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Pinnularia latarea* Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia latarea* Krammer var. *latarea
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia legumen* (Ehrenb.) Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Domínio desconhecido; epicontinental
***Pinnularia leontopithecus-rosalia* J.C.Costa**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia luculenta* (A.W.F.Schmidt) Cleve**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia macilenta* (Ehrenb.) Ehrenb.**
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia major* (Kütz.) Rabenh.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia meridiana* Metzeltin & Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia meridiana* Metzeltin & Krammer var. *meridiana
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia meridiana* var. *parallela* Metzeltin & Krammer**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia mesolepta* (Ehrenb.) W.Sm.**
Referência: Oliveira, M.A. et al. 2002. Acta Bot. Brasil. 16(2): 151-160.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Pinnularia microstauron* (Ehrenb.) Cleve**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pinnularia microstauron* var. *angusta* Krammer**
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Pinnularia microstauron* (Ehrenb.) Cleve var. *microstauron
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia nobilis* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Pinnularia nodosa* (Ehrenb.) W.Sm.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido; epicontinental
***Pinnularia obscura* Krasske**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia obscura* Krasske var. *obscura
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia parvulissima* Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia parvulissima* Krammer var. *parvulissima
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia ruttneri* Hust.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia schoenfelderi* Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia schoenfelderi* Krammer var. *schoenfelderi
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia schroeterae* Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pinnularia schroeterae* var. *eliptica* Krammer**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2009. Acta Limn. Bras. 2(2): 227-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Pinnularia septentrionalis* Krammer**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Pinnularia similis* Hust.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia similis* Hust. var. *similis
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia stauroptera* (Grunow) Rabenh.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; ambiente desconhecido
***Pinnularia stomatophora* (Grunow) Cleve**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia subanglica* Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia subanglica* Krammer var. *subanglica
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia subcapitata* W. Greg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pinnularia subcapitata* var. *elongata* Krammer**
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia subcapitata* var. *semicruciata* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
Pinnularia subcapitata* W. Greg. var. *subcapitata
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Pinnularia subcapitata* var. *subrostrata* Krammer**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Pinnularia subgibba* Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pinnularia subgibba* var. *capitata* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2009. Acta Limn. Bras. 2(2): 227-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
Pinnularia subgibba* Krammer var. *subgibba
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia subgibba* var. *undulata* Krammer**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia tabellaria* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia variarea* Metzeltin & Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia variarea* Metzeltin & Krammer var. *variarea
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia viridiformis* Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pinnularia viridiformis* var. *minor* Krammer**
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
Pinnularia viridiformis* Krammer var. *viridiformis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pinnularia viridis* (Nitzsch) Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pinnularia viridis* (Nitzsch) Ehrenb. var. *viridis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Placoneis Mereschk.

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Placoneis clementis* (Grunow) Cox**
Referência: Oliveira, M.A. et al. 2002. Acta Bot. Brasil. 16(2): 151-160.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Placoneis elginensis* (W.Greg.) Cox**
Referência: Oliveira, M.A. et al. 2002. Acta Bot. Brasil. 16(2): 151-160.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido; epicontinental
***Placoneis exigua* (W.Greg.) Mereschk.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (PR); Domínio desconhecido; epicontinental
***Placoneis paraelginensis* Lange-Bert.**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2006. Iheringia, Bot. 61(1-2): 105-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Placoneis pseudanglica* (Lange-Bert.) Cox**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2006. Iheringia, Bot. 61(1-2): 105-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Plagiogramma Grev.

3 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Plagiogramma obesum* Grev.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Plagiogramma pulchellum* Grev.**
Referência: Costa, M.M.S. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 713-719.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE), Sul (SC, RS); marinho

***Plagiogramma staurophorum* (W.Greg.) Heiberg**
Distribuição: nativa; não endêmica

Plagiogramma staurophorum* var. *robustum
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Planothidium Round & Bukhti.

7 espécies (nenhuma endêmica), 7 variedades (nenhuma endêmica)

***Planothidium biporomum* (Hohn & Hellerman) Lange-Bert.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Planothidium biporomum* (Hohn & Hellerman) Lange-Bertalot var. *biporomum
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2001. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Planothidium dubium* (Grunow) Round & Bukht.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Planothidium dubium* (Grunow) Round & Bukht. var. *dubium
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Planothidium ellipticum* (Cleve) Round & Bukht.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Planothidium hauckianum* (Grunow) Round & Bukht.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Planothidium hauckianum* (Grunow) Round & Bukhtiyarova var. *hauckianum
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Planothidium hauckianum* var. *rostratum* (Schulz *ex* Hust.) Andresen et al.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Planothidium heteromorphum* (Grunow) Lange-Bert.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Planothidium heteromorphum* (Grunow) Lange-Bert. var. *heteromorphum
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Planothidium lanceolatum* (Bréb.) Round & Bukht.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Planothidium lanceolatum* (Bréb.) Round & Bukht. var. *lanceolatum
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica; epicontinental

***Planothidium salvadorianum* (Hust.) Lange-Bert.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Planothidium salvadorianum* (Hust.) Lange-Bert. var. *salvadorianum
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Pleurosigma W.Sm.

9 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Pleurosigma acutum* Müll.Melch.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Pleurosigma angulatum* (Queckett) W.Sm.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho

***Pleurosigma delicatulum* W.Sm.**
Referência: Leão, B.M. et al. 2009. Acta Bot. Brasil. 22(3): 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (RS); marinho

***Pleurosigma diminutum* Grunow**
Referência: Leão, B.M. et al. 2009. Acta Bot. Brasil. 22(3): 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho

***Pleurosigma elongatum* W.Sm.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho

***Pleurosigma formosum* W.Sm.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho

***Pleurosigma intermedium* W.Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Pleurosigma intermedium* var. *mauritiana* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho

***Pleurosigma naviculaceum* Bréb.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido

***Pleurosigma normanii* Ralfs**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho

Pleurosira (Ehrenb.) Compère

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Pleurosira laevis* (Ehrenb.) Compère**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido; epicontinental
***Pleurosira socotrensis* (Kitton) Compère**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pleurosira socotrensis* var. *pangeroni* (Leud.-Fortm.) Compère**
Referência: Ludwig, T.A.V. et al. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 97-106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (RS); Pampa; epicontinental

Podosira Ehrenb.

1 espécie (não endêmica)
***Podosira stelligera* (Bailey) D.G.Mann**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

Proboscia Sundström

1 espécie (não endêmica)
***Proboscia alata* (Brightw.) Sündstrom**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Psammodictyon D.G.Mann

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Psammodictyon panduriforme* (W.Greg.) D.G.Mann**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Psammodictyon panduriforme* var. *minor* (Grunow) Haworth & Kelly**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Pseudo-nitzschia H. Perag. *in* H. Perag. & M. Perag.

7 espécies (1 endêmica)
***Pseudo-nitzschia brasiliana* Lundholm et al.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2005. Atlantica 27(2): 139-145.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Pseudo-nitzschia calliantha* Lundholm et al.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Pseudo-nitzschia delicatissima* (Cleve) G.Heiden**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Pseudo-nitzschia fraudulenta* (Cleve) Hasle**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Pseudo-nitzschia multistriata* (Takano) Takano**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Pseudo-nitzschia pungens* (Grunow *ex* Cleve) Hasle**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP); marinho
***Pseudo-nitzschia seriata* (Cleve) H.Perag.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP); marinho

Pseudostaurosira D.M.Willians & Round

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Pseudostaurosira brevistriata* (Grunow) D.M.Williams & Round**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pseudostaurosira brevistriata* (Grunow) Williams & Round var. *brevistriata
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Raphoneis Ehrenb.

1 espécie (não endêmica)
***Raphoneis amphiceros* (Ehrenb.) Ehrenb.**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PE, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Rhabdonema Kütz.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhabdonema adriaticum* Kütz.**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Rhabdonema arcuatum* (Lyngb.) Kütz.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Rhizosolenia Brightw.

8 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Rhizosolenia acuminata* (H.Perag.) H.Perag.**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho

***Rhizosolenia bergonii* H.Perag.**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido
***Rhizosolenia castracanei* H. Perag.**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Rhizosolenia hebetata* Bailey**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Rhizosolenia hyalina* Ostenf.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Rhizosolenia imbricata* Brightw.**
Distribuição: nativa; não endêmica; marinho
***Rhizosolenia setigera* Brightw.** Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Rhizosolenia styliformis* Brightw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Rhizosolenia styliformis* var. *latissima* Brightw.**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (RS); marinho

Rhopalodia F.O.Müller

3 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)
***Rhopalodia gibba* (Ehrenb.) O.F.Müll.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rhopalodia gibba* (Ehrenb.) O.F.Müll. var. *gibba
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Rhopalodia gibba* var. *ventricosa* (Kütz.) H.Perag. & Perag.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Rhopalodia gibberula* (Ehrenb.) O.F.Müll.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Rhopalodia gibberula* var. *producta* (Grunow) O.F.Müll.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Rhopalodia gibberula* var. *vanheurckii* O.F.Müll.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Rhopalodia musculus* (Kütz.) O.F.Müller**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Rossithidium Round & Bukht.

1 espécie (não endêmica)
***Rossithidium pusillum* (Grunow) Round & Bukht.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Schizonema C.Agardh

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Schizonema domingense* Kuntze**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Schizonema liebmannii* Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Sellaphora Mereschk.

7 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Sellaphora bacillum* (Ehrenb.) D.G.Mann**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Sellaphora densistriata* (Lange-Bert. & Metzeltin) Lange-Bert. & Metzeltin**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sellaphora densistriata* (Lange-Bert. & Metzeltin) Lange-Bert. & Metzeltin var. *densistriata
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Sellaphora nyassensis* (O.F.Muller) D.G. Mann**
Referência: Delgado, S.M. & Souza, M.G.M. 2007. Acta Bot. Brasil. 21(4): 767-776.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado; epicontinental
***Sellaphora pseudopupula* (Krasske) Lange-Bert.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sellaphora pseudopupula* (Krasske) Lange-Bert. var. *pseudopupula
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Sellaphora pupula* (Kütz.) Mereschk.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Sellaphora rectangularis* (W.Greg.) Lang.-Bert. & Metzeltin**
Referência: Delgado, S.M. & Souza, M.G.M. 2007. Acta Bot. Brasil. 21(4): 767-776.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Sellaphora seminulum* (Grunow) D.G. Mann**
Referência: Souza, M.G.M. & Senna, P.A.C. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(3): 618-629.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Skeletonema Grev.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Skeletonema costatum* (Grev.) Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Skeletonema tropicum* Cleve**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Stauroneis Ehrenb.

6 espécies (nenhuma endêmica), 6 variedades (nenhuma endêmica)
***Stauroneis acuta* W. Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Stauroneis acuta* W.Sm. var. *acuta
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Stauroneis acuta* var. *terryana* Tempère**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido; epicontinental
***Stauroneis anceps* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Stauroneis anceps* Ehrenb. var. *anceps
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Stauroneis anceps* var. *linearis* (Ehrenb.) Brun**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Stauroneis gracilis* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Stauroneis obtusa* Lagerst.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Stauroneis phoenicenteron* (Nitzsch) Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Stauroneis phoenicenteron* var. *nobilis* (Schum.) Sabelina**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
Stauroneis phoenicenteron* (Nitzsch) Ehrenb. var. *phoenicenteron
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Stauroneis tenera* Hust.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Staurosira Ehrenb.

4 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Staurosira construens* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Staurosira construens* Ehrenb. var. *construens
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurosira crassa* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Ribeiro, F.C.P. et al. 2008. Rodriguésia 59(2): 309-324.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia; epicontinental
***Staurosira obtusa* (Hust.) Garcia**
Referência: Ribeiro, F.C.P. et al. 2008. Rodriguésia 59(2): 309-324.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia; epicontinental
***Staurosira venter* (Ehrenb.) H.Kobayasi**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Staurosirella D.M.Willians & Round

2 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Staurosirella leptostauron* (Ehrenb.) D.M.Willians & Round**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Staurosirella leptostauron* var. *dubia* (Grunow) Edlund**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Staurosirella leptostauron* (Ehrenb.) D.M.Willians & Round var. *leptostauron
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurosirella pinnata* (Ehrenb.) D.M.Willians & Round**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

Stenopterobia Bréb.

5 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Stenopterobia curvula* (W. Sm.) Krammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Stenopterobia curvula* (W. Sm.) Krammer var. *curvula
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Stenopterobia delicatissima* (Lewis) Bréb. *ex* Van Heurck**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1990. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Stenopterobia densestriata* (Hust.) Krammer**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Stenopterobia intermedia* (Lewis) Van Heurck**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Stenopterobia planctonica* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2009. Acta Limn. Bras. 2(2): 227-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

Stephanodiscus Ehrenb.

3 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Stephanodiscus astraea* (Ehrenb.) Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Stephanodiscus hantzschii* Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica
Stephanodiscus hantzschii* Grunow var. *hantzschii
Referência: Ludwig, T.A.V. et al. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 97-106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Stephanodiscus lucens* Hust.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Stephanopyxis (Ehrenb.) Ehrenb.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Stephanopyxis palmeriana* (Grev.) Grunow**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Stephanopyxis turris* (Grev.) Ralfs *ex* A.Pritch.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho

Striatella C.Agardh

1 espécie (não endêmica)
***Striatella unipunctata* (Lyngb.) C. Agardh**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE), Sudeste (SP); marinho

Surirella Turpin

24 espécies (nenhuma endêmica), 11 variedades (nenhuma endêmica)
***Surirella angusta* Kütz.**
Referência: Burliga, A.L. et al. 2005. Acta Sci. Biol. Sci. 27(4): 415-421.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica; epicontinental
***Surirella biseriata* Bréb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Surirella biseriata* Bréb. var. *biseriata
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Surirella biseriata* var. *constricta* (Ehrenb.) Grunow**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Surirella braunii* Hust.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Surirella chilensis* C. Janisch**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Surirella chilensis* var. *tumida* Hust.**
Referência: Torgan, L.C. & Weber, A.S. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(2): 393-398.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Surirella davidsonii* A.W.F. Schmidt**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Surirella didyma* Kütz.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Surirella fastuosa* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Surirella fastuosa* var. *cuneata* (A.W.F.Schmidt) H.Perag. & Perag.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Surirella febigerii* Lewis**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Surirella grossestriata* Hust.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Surirella gruendleri* C. Janisch**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Surirella heidenii* Hust.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Surirella kittoni* A.W.F. Schmidt**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Surirella linearis* W. Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Surirella linearis* var. *constricta* Grunow**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Surirella linearis* var. *elliptica* O.F. Müller**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Surirella linearis* W. Sm. var. *linearis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Surirella minuta* Bréb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Surirella minuta* var. *peduliformis* Freng.**
Referência: Torgan, L.C. & Weber, A.S. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(2): 393-398.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Surirella nobilis* W. Sm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Surirella ovalis* Bréb.**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido; epicontinental
***Surirella praeclare* A.W.F. Schmidt**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Surirella recedens* A.W.F. Schmidt**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); marinho
***Surirella robusta* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Surirella robusta* Ehrenb. var. *robusta
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica; epicontinental
S***urirella rorata* Freng.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Surirella rumrichorum* Metzeltin & Lang.-Bert.**
Referência: Torgan, L.C. & Weber, A.S. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(2): 393-398.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Surirella spiralis* Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Surirella splendida* (Ehrenb.) Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Surirella tenera* W. Greg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Surirella tenera* var. *nervosa* A.W.F. Schmidt**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Surirella tenera* var. *splendidula* A.W.F. Schmidt**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Synedra Ehrenb.

4 espécies (nenhuma endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)
***Synedra arcus* Kütz.**
Referência: Raupp, S.V. et al. 2009. Acta Limn. Bras. 2(2): 227-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Synedra crystallina* (C. Agardh) Kütz.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); marinho

***Synedra filiformis* Grunow**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Synedra filiformis* var. *exilis* Cleve**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
Synedra filiformis* Grunow var. *filiformis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Synedra goulardii* Bréb.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Synedropsis Hasle et al.

1 espécie (1 endêmica)
***Synedropsis roundii* Torgan et al.**
Referência: Melo, S. et al. 2003. Phycologia 42: 71-79.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Tabellaria Ehrenb. *ex* Kütz.

1 espécie (não endêmica)
***Tabellaria fenestrata* (Lyngb.) Kütz.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Tabularia (Kütz.) D.M.Willians & Round

1 espécie (não endêmica)
***Tabularia investiens* (W.Sm.) D.M.Willians & Round**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Terpsinoe Ehrenb.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Terpsinoe americana* (Bailey) Ralfs**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Terpsinoe musica* Ehrenb.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Thalassionema Perag.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Thalassionema frauenfeldii* (Grunow) Hallegr.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Thalassionema nitzschioides* (W.Greg.) Mereschk.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

Thalassiosira Cleve

12 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)
***Thalassiosira decipiens* (Grunow) Jørgensen**
Referência: Garcia, M. & Odebrecht, C. 2009. Biota Neotrop. 9(2): 239-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, SE), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Thalassiosira eccentrica* (Ehrenb.) Cleve**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Thalassiosira eccentrica* var. *micropora* Grunow**
Referência: Garcia, M. & Odebrecht, C. 2009. Biota Neotrop. 9(2): 239-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido
***Thalassiosira hendeyi* Hasle & Fryxell**
Referência: Garcia, M. & Odebrecht, C. 2009. Biota Neotrop. 9(2): 239-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE), Sudeste (SP), Sul (RS); marinho
***Thalassiosira leptopus* (Grunow *ex* Van Heurck) Hasle & Fryxell**
Referência: Garcia, M. & Odebrecht, C. 2009. Biota Neotrop. 9(2): 239-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Thalassiosira oestrupii* (Ostenf.) Hasle**
Distribuição: nativa; não endêmica
Thalassiosira oestrupii* (Ostenf.) Hasle var. *oestrupii
Referência: Garcia, M. & Odebrecht, C. 2009. Biota Neotrop. 9(2): 239-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sul (PR, SC, RS); marinho
***Thalassiosira oestrupii* var. *venrickae* Fryxell & Hasle**
Referência: Garcia, M. & Odebrecht, C. 2009. Biota Neotrop. 9(2): 239-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Thalassiosira pacifica* Gran & Angst**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Thalassiosira punctigera* (Castracane) Hasle**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2004. GloBallast Monograph Series 16:1-132.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Thalassiosira rotula* Meunier**
Referência: Garcia, M. & Odebrecht, C. 2009. Biota Neotrop. 9(2): 239-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho

***Thalassiosira simonsenii* Hasle & Fryxell**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Thalassiosira subtilis* (Ostenf.) Gran**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Thalassiosira subtilis* var. *maxima* Ferrario**
Referência: Garcia, M. & Odebrecht, C. 2009. Biota Neotrop. 9(2): 239-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Thalassiosira tumida* (Janisch) Hasle**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Thalassiosira weissflogii* (Grunow) Fryxell & Hasle**
Referência: Garcia, M. & Odebrecht, C. 2009. Biota Neotrop. 9(2): 239-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Domínio desconhecido; epicontinental

Toxarium Bailey

1 espécie (não endêmica)
***Toxarium undulatum* Bailey**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho

Trachyneis Cleve

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Trachyneis aspera* (Ehrenb.) Cleve**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachyneis aspera* var. *intermedia* (Grunow) Cleve**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

Trachysphenia Petit

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Trachysphenia australis* Petit**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachysphenia australis* var. *rostelata* Hust.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Triceratium Ehrenb.

11 espécies (nenhuma endêmica)
***Triceratium bergonii* Tempère & Brun**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Triceratium biquadratum* C. Janisch**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP); marinho
***Triceratium contortum* Shadbolt**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Triceratium distictum* Barker & Meakin**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Triceratium dubium* Brightw.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Triceratium favus* Ehrenb.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Triceratium formosum* Brightw.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Triceratium moreirae* Fernandes & Souza-Mosimann**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Triceratium patagonicum* A.W.F.Schmidt**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2008. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Triceratium pentacrinus* (Ehrenb.) G.C.Wall.**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Triceratium reticulum* Ehrenb.**
Referência: Paiva, R.S. et al. 2006. Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 1(2): 133-146.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Trigonium Cleve

1 espécie (não endêmica)
***Trigonium alternans* (Bailey) D.G.Mann**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Tryblionella W.Sm.

15 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Tryblionella acuminata* W. Sm.**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Tryblionella acuta* (Cleve) D.G. Mann**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Tryblionella circumsuta* (Bailey) D.G. Mann**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Tryblionella coarctata* (Grunow) D.G. Mann**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); marinho
***Tryblionella compressa* (Bailey) Poulin**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. & Eskinazi-Leça, E. 1990. Catálogo das diatomáceas (Bacillariophyceae) da plataforma continental de Pernambuco. Recife: SUDENE. 318 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Tryblionella debilis* Arnott**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Tryblionella granulata* (Grunow) D.G.Mann**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tryblionella granulata* var. *hyalina* (Amosée) D.G.Mann**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); marinho
***Tryblionella hungarica* (Grunow) D.G. Mann**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Tryblionella lanceola* (Grunow) Round & Basson**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Tryblionella levidensis* W. Sm.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Tryblionella littoralis* (Grunow) D.G. Mann**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho
***Tryblionella marginulata* (Grunow) D.G. Mann**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Tryblionella perversa* (Grunow) D.G. Mann**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Tryblionella punctata* W. Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tryblionella punctata* var. *coarctata* (Grunow) Diog-Ramos**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Tryblionella victoriae* Grunow**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Sér. Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Trybliоptychus Hendey

1 espécie (não endêmica)
***Trybliоptychus cocconeiformis* (Grunow) Hendey**
Referência: Procopiak, L.K. et al. 2006. Biota Neotrop. 6(3): 1-28.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); marinho

Ulnaria Kütz.

3 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Ulnaria acus* (Kütz.) M. Aboal**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Ulnaria contracta* (Östrup) Morales & Vis**
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Ulnaria ulna* (Nitzsch) Compère**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ulnaria ulna* var. *amphirhynchus* (Ehrenb.) Aboal**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Ulnaria ulna* var. *oxyrhynchus* (Kütz.) M.Aboal**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Ulnaria ulna* (Nitzsch) Compère var. *ulna
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Sér. Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Urosolenia Round & R.M.Crawford

2 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Urosolenia eriensis* (H.L.Sm.) Round & R.M.Crawford**
Distribuição: nativa; não endêmica
Urosolenia eriensis* (H.L. Sm.) Round & R.M.Crawford var. *eriensis
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Urosolenia eriensis* var. *morsa* (W.West & G.S.West) Bukht.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 1999. Iheringia, Bot. 52: 89-144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Urosolenia longiseta* (O. Zacharias) Edlung & Stoermer**
Referência: Tremarin, P.I. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 79-107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

CHAROPHYCEAE

Andréa de Araújo, Norma Catarina Bueno, Thamis Meurer, Carlos Eduardo de Mattos Bicudo
35 gêneros, 419 espécies (11 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica), 278 variedades (19 endêmicas)

Actinotaenium (Nägeli) Teiling

9 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Actinotaenium capax* (Joshua) Teiling**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Actinotaenium capax* var. *minus* (Schmidle) Teiling**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Actinotaenium cucurbitinum* (Bisset) Teiling**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Actinotaenium curtum* (Bréb.) Teiling *ex* Růžička & Pouzar**
Distribuição: nativa; não endêmica
Actinotaenium curtum* (Bréb.) Teiling *ex* Růžička & Pouzar var. *curtum
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Actinotaenium globosum* (Bulnh.) K. Först.**
Referência: Felisberto, S.A. & Rodrigues, L. 2008. Hoehnea 35(2): 235-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Actinotaenium inconspicuum* (West & G.S.West) Teiling**
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Actinotaenium perminutum* (G.S.West) Teil**
Referência: Nogueira, I.S. & Leandro-Rodrigues, N.C. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(3): 377-395.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Actinotaenium rufescens* (Cleve) Teiling**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Actinotaenium subglobosum* (Nordst.) Teiling**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Actinotaenium wollei* (W. West & G.S. West) Teiling**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Bambusina Kütz. *ex* Kütz.

1 espécie (não endêmica)
***Bambusina borreri* (Ralfs) Cleve**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Chara L.

23 espécies (nenhuma endêmica), 7 variedades (2 endêmicas)
***Chara angolensis* A. Braun**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1969. Nova Hedwigia 17: 1-14.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica; epicontinental
***Chara braunii* Gmelin**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chara braunii* var. *brasiliensis* R.M.T. Bicudo**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1979. Rickia 8: 17-26.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Chara braunii* Gmelin var. *braunii
Referência: Bicudo, R.M.T. 1979. Rickia 8: 17-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Chara bulbillifera* (Donterberg) A. Garcia**
Referência: Prado, J.F. 2003. Characeae do Rio Grande do Sul, Brasil.Tese de Doutorado. Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 233 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Chara compressa* Kunth**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1972. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo – O gênero Chara (Charophyceae) no Brasil. 229 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado; epicontinental
***Chara diaphana* (Meyen) R.M.T.Bicudo**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1972. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo – O gênero Chara (Charophyceae) no Brasil. 229 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Chara drouetii* R.D. Wood**
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido; epicontinental
***Chara fibrosa* C. Agardh *ex* Bruzelius *emend*. R.D. Wood**
Distribuição: nativa; não endêmica

Chara fibrosa* C. Agardh *ex* Bruzelius *emend.* R.D. Wood var. *fibrosa
Referência: Bicudo, R.M.T. 1972. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo – O gênero Chara (Charophyceae) no Brasil. 229 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental

***Chara fibrosa* var. *hydropitys* (Rchb.) R.D. Wood *emend.* R.D.Wood**
Referência: Bueno, N.C. et al. 2009. Rev. bras. bot. 32(4): 759-774.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Chara fibrosa* var. *vitalii* R.M.T. Bicudo**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1972. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo – O gênero Chara (Charophyceae) no Brasil. 229 p.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica; epicontinental

***Chara foliolosa* Mullenberg *ex* Willd.**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1972. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo – O gênero Chara (Charophyceae) no Brasil. 229 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica; epicontinental

***Chara formosa* Robinson**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1972. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo – O gênero Chara (Charophyceae) no Brasil. 229 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

***Chara globularis* Thuillier *emend.* R.D. Wood**
Referência: Prado, J.F. 2003. Characeae do Rio Grande do Sul, Brasil. Tese de Doutorado. Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 233 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Chara guairensis* R.M.T. Bicudo**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1972. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo –O gênero Chara (Charophyceae) no Brasil. 229 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Chara haitensis* Turpin**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1972. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo – O gênero Chara (Charophyceae) no Brasil. 229 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica; epicontinental

***Chara hispida* L. *emend.* R.D.Wood**
Distribuição: nativa; não endêmica

Chara hispida* var. *baltica* (Bruzelius) R.D.Wood *emend.
Referência: Bicudo, R.M.T. 1972. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo – O gênero Chara (Charophyceae) no Brasil. 229 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica; epicontinental

***Chara hornemannii* Wallman *emend.* R.D. Wood**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1972. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo – O gênero Chara (Charophyceae) no Brasil. 229 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chara indica* Bertero *ex* Spreng.**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1972. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo – O gênero Chara (Charophyceae) no Brasil. 229 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica; epicontinental

***Chara kenoyeri* Howe**
Referência: Bicudo, C.E.M. et al. 2009. Rev. bras. bot. 32(4): 735-750.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Chara martiana* Wallman**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1974. Rickia 6: 127-189.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Chara pseudohydropitys* Imahori**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1972. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo – O gênero Chara (Charophyceae) no Brasil. 229 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica; epicontinental

***Chara rusbyana* Howe**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1974. Rickia 6: 127-189.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Chara socotrensis* Nordst.**
Referência: Bueno, N.C. et al. 2009. Rev. bras. bot. 32(4): 735-750.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Chara vitalii* R.M.T. Bicudo**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1979. Phycologia 18(1): 89-92.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES); Mata Atlântica; epicontinental

***Chara vulgaris* L. *emend.* R.D. Wood**
Distribuição: nativa; não endêmica

Chara vulgaris* L. *emend.* R.D. Wood var. *vulgaris
Referência: Bicudo, R.M.T. 1972. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo – O gênero Chara (Charophyceae) no Brasil. 229 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Chara zeylanica* Klein *ex* Willd.**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1974. Rickia 6: 127-189.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

Closterium Nitsch *ex* Ralfs

37 espécies (nenhuma endêmica), 32 variedades (nenhuma endêmica)

***Closterium abruptum* W. West**
Distribuição: nativa; não endêmica

Closterium abruptum* W.West var. *abruptum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Closterium acerosum* (Schrank) Ehrenb. *ex* Ralfs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Closterium aciculare* T. West**
Distribuição: nativa; não endêmica

Closterium aciculare* T.West var. *aciculare
Referência: Keppeler, E.C. et al. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(4): 687-691.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia; epicontinental

***Closterium acutum* Bréb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Closterium acutum* Bréb. var. *acutum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Closterium acutum* var. *variabile* (Lemmerm.) Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Closterium baillyanum* (Bréb.) Bréb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Closterium baillyanum* (Bréb.) Bréb. var. *baillyanum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Closterium calosporum* Wittr.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Closterium closterioides* (Ralfs) Louis & Peeters**
Distribuição: nativa; não endêmica

Closterium closterioides* (Ralfs) Louis & Peeters var. *closterioides
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Closterium costatum* Corda *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Closterium costatum* var. *dilatatum* (West & West) Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Closterium cynthia* De Not.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Closterium cynthia* var. *minutum* Kanetsuna**
Referência: Kanetsuna, Y. 2004. Phycol. Res. 52: 160-–167.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado; epicontinental

***Closterium dianae* Ehrenb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Closterium dianae* var. *arcuatum* (Bréb.) Rabenh.**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Closterium dianae* var. *brevius* (Petkov) Willi Krieg.**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Closterium dianae* var. *minus* Hieron.**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Closterium eboracense* Turner**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Closterium ehrenbergii* Menegh. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

Closterium ehrenbergii* Menegh. *ex* Ralfs var. *ehrenbergii
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental

***Closterium exiguum* West & G.S. West**
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Closterium gracile* Bréb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

Closterium gracile* Bréb. *ex* Ralfs var. *gracile
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Closterium incurvum* Bréb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Closterium incurvum* Bréb. var. *incurvum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido; epicontinental

***Closterium intermedium* Ralfs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Closterium jenneri* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

Closterium jenneri* Ralfs var. *jenneri
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Closterium juncidum* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Closterium juncidum* var. *elongatum* Roy**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
Closterium juncidum* Ralfs var. *juncidum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Closterium kuetzingii* Bréb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Closterium kuetzingii* Bréb. var. *kuetzingii
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sul (RS); Amazônia; epicontinental
***Closterium kuetzingii* var. *laeve* (Raciborski) Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Closterium leibleinii* Kütz. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Closterium leibleinii* Kütz. *ex* Ralfs var. *leibleinii
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Closterium lineatum* Ehrenb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Closterium lineatum* Ehrenb. *ex* Ralfs var. *lineatum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia; epicontinental
***Closterium lunula* (Müller) Nitzsch *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Closterium lunula* var. *biconvexum* Schmidle**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Closterium moniliferum* (Bory) Ehrenb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Closterium moniliferum* (Bory) Ehrenb. *ex* Ralfs var. *moniliferum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Closterium moniliferum* var. *nasutum* M.F. Rich**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Closterium navicula* (Bréb.) Lütkem.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Closterium navicula* var. *inflatum* (West & G.S.West) Croasdale**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
Closterium navicula* (Bréb.) Lütkem. var. *navicula
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Closterium nematodes* Joshua**
Distribuição: nativa; não endêmica
Closterium nematodes* Joshua var. *nematodes
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Closterium oncosporum* Nordst.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Closterium parvulum* Nägeli**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Closterium porrectum* Nordst.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Closterium pritchardianum* Archer**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Closterium pusillum* Hantzsch**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Closterium pusillum* var. *maius* Raciborski**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Closterium pusillum* var. *minor* V.Allorge & P.Allorge**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Closterium ralfsii* Bréb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Closterium ralfsii* var. hybridum Rabenh.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Closterium rostratum* Ehrenb. *ex* Ralfs**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Closterium setaceum* Ehrenb. *ex* Ralfs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Closterium tortum* Griffiths**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Closterium toxon* W. West**
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Closterium tumidum* L.N. Johnson**
Distribuição: nativa; não endêmica
Closterium tumidum* L.N. Johnson var. *tumidum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Closterium turgidum* Ehrenb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Closterium turgidum* var. *giganteum* (Nordst.) De Toni**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Cosmarium Corda

105 espécies (6 endêmicas), 82 variedades (16 endêmicas)
***Cosmarium abbreviatum* Raciborski**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium abbreviatum* var. *minus* (West & G.S.West) Willi Krieg. & Gerloff**
Referência: Felisberto, S.A. & Rodrigues, L. 2008. Hoehnea 35(2): 235-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Cosmarium amoenum* Bréb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium amoenum* var. *constrictum* Scott & Grönblad**
Referência: Felisberto, S.A. & Rodrigues, L. 2008. Hoehnea 35(2): 235-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Cosmarium arctoum* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium arctoum* Nord. var. *arctoum
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium basituberculatum* Borge**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium bioculatum* Bréb.**
Referência: Felisberto, S.A. & Rodrigues, L. 2008. Hoehnea 35(2): 235-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium bireme* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium bireme* var. *huzelii* K. Först.**
Referência: Silva, S.R.V.F. & Cecy, I.I.T. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 13-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Cosmarium blyttii* Wille**
Referência: Felisberto, S.A. & Rodrigues, L. 2005. Rev. bras. bot. 28(2): 241-254.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium botrytis* (Menegh.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium botrytis* (Menegh.) Ralfs var. *botrytis
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium broomei* Thwaites *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium broomei* var. *obliqua* Wille**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium candianum* Delponte**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium candianum* var. *messikommeri* (Willi Krieg. & Gerloff) Sophia**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium clepsydra* Nordst.**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Cosmarium comissurale* Bréb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium comissurale* var. *crassum* Nordst.**
Referência: Felisberto, S.A. & Rodrigues, L. 2008. Hoehnea 35(2): 235-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Amazônia, Cerrado; epicontinental
***Cosmarium connatum* (Bréb.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium connatum* var. *minus* Wolle**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium contractum* Kirchner**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium contractum* Kirchner var. *contractum
Referência: Martins, D.V. & Bicudo, C.E.M. 1987. Rev. Brasil. Biol. 47(1-2):1-16.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia; epicontinental

***Cosmarium contractum* var. *maximum* West & G.S. West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium contractum* var. *minutum* (Delponte) Coesel**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium contractum* var. *rotundatum* Borge**
Referência: Forster, K. 1974. Amazoniana 2(2): 135-242.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Cosmarium cucurbita* Bréb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium cucurbita* var. *robustum* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium denticulatum* Borge**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium denticulatum* var. *ovale* Grönblad**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Cosmarium depressum* (Nägeli) P. Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium depressum* var. *elevatum* Borge**
Referência: Forster, K. 1974. Amazoniana 2(2): 135-242.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium dichondrum* West & G.S. West**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium dichondrum* var. *tumidum* Borge**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Cosmarium elegantissimum* P. Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium elegantissimum* P. Lundell var. *elegantissimum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium excavatum* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium excavatum* Nordst. var. *excavatum
Referência: Börge, O. 1918. Ark. Bot. 15(13): 1-108.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (RS); Amazônia, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Cosmarium exiguum* Archer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium exiguum* Archer var. *exiguum
Referência: Gronblad, R. 1945. Acta Soc. Sci. Fenn. 2(6): 1-43.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium floridanum* (West & G.S.West) Lütkem.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium floridanum* var. *brasiliense* Grönblad**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium fontigenum* Nordst.**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Cosmarium formosulum* Hoff**
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Pampa; epicontinental
***Cosmarium furcatospermum* W. West & G.S. West**
Referência: Martins, D.V. & Bicudo, C.E.M. 1987. Rev. Brasil. Biol. 47(1-2):1-16.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium furcatum* K. Först.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium galeritum* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium galeritum* Nordst. var. *galeritum
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido; epicontinental
***Cosmarium galeritum* var. *subtumidum* Borge**
Referência: Börge, O. 1903. Ark. Bot. 1: 71-138.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium gemminatum* P. Lundell**
Distribuição: nativa; endêmica
***Cosmarium gemminatum* var. *scottii* K. Först.**
Referência: Forster, K. 1969. Amazoniana 2(1-2): 5-116.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido; epicontinental
***Cosmarium globosum* Bulnh.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium granatum* Bréb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium granatum* var. *concavum* Lagerh.**
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Cosmarium granatum* Bréb. *ex* Ralfs var. *granatum
Referência: Silva, S.R.V.F. & Cecy, I.I.T. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 13-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Amazônia, Cerrado; epicontinental

***Cosmarium hammeri* Reinsch**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium hammeri* var. *protuberans* West & G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium hetangulare* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium hetangulare* var. *brasiliense* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium humile* (Gay) Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium humile* var. *glabrum* Gutw.**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Cosmarium impressulum* Elfving**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium impressulum* Elfving var. *impressulum
Referência: Silva, S.R.V.F. & Cecy, I.I.T. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 13-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Cosmarium itatiayae* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium kolkwitzii* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium laeve* Rabenh.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium laeve* Rabenh. var. *laeve
Referência: Silva, S.R.V.F. & Cecy, I.I.T. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 13-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Cosmarium lagoense* (Nordst.) Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium lagoense* var. *amoebum* K.Först.**
Referência: Forster, K. 1964. Hydrobiologia 23(3-4): 321-505.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado; epicontinental
***Cosmarium levinotabile* Croasdale**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium levinotabile* var. *heterocrenatum* (West & G.S.West) Croasdale**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Cosmarium majae* Strøm**
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium margaritatum* (P. Lundell) Roy & Bisset**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium margaritatum* (P. Lundell) Roy & Bisset var. *margaritatum
Referência: Forster, K. 1963. Rev. Algol. 7(1): 38-92.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia; epicontinental
***Cosmarium maximum* (Børgesen) W.West & G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium meneghinii* Bréb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium minimum* W. West & G.S. West**
Referência: Felisberto, S.A. & Rodrigues, L. 2008. Hoehnea 35(2): 235-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Cosmarium moerlianum* Lütkem.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Cosmarium moerlianum* var. *brasiliense* Borge**
Referência: Börge, O. 1918. Ark. Bot. 15(13): 1-108.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium moniliforme* (Turpin) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium moniliforme* (Turpin) Ralfs var. *moniliforme
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium montrealense* Croasdale**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia; epicontinental
***Cosmarium nitidulum* De Not.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium nymannianum* Grunow**
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium obliquum* Nordst.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium obsoletum* (Hantzsch) Reinsch**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium obsoletum* (Hantzsch) Reinsch var. *obsoletum
Referência: Forster, K. 1969. Amazoniana 2(1-2): 5-116.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

***Cosmarium obtusatum* Schmidle**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium obtusatum* Schmidle var. *obtusatum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium ocellatum* B. Eichler & Gutw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium ocellatum* var. *incrassatum* West & G.S. West**
Referência: Gronblad, R. 1945. Acta Soc. Sci. Fenn. 2(6): 1-43.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia; epicontinental
***Cosmarium oncosporum* Nordst.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium ornatum* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium ornatum* Ralfs var. *ornatum
Referência: Franceschini, I.M. 1992. Biblioth. Phycol. 92: 1-81.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Cosmarium ornatum* var. *pseudolagoense* K.Först. & Eckert**
Referência: Forster, K. 1964. Hydrobiologia 23(3-4): 321-505.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium orthostichum* P. Lundell**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
***Cosmarium orthostichum* var. *pumilum* P. Lundell**
Referência: Forster, K. 1969. Amazoniana 2(1-2): 5-116.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Cosmarium pachydermum* P. Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium pachydermum* P. Lundell var. *pachydermum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2003. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium phaseolus* Bréb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium phaseolus* var. *elevatum* Nordst.**
Referência: Silva, S.R.V.F. & Cecy, I.I.T. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 13-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental
Cosmarium phaseolus* Bréb. var. *phaseolus
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium porrectum* Nordst.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium protractum* (Nägeli) de Bary**
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium pseudoamoenum* Wille**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium pseudoamoenum* Wille var. *pseudoamoenum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium pseudobroomei* Wolle**
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium pseudoconnatum* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium pseudoconnatum* Nordst. var. *pseudoconnatum
Referência: Bicudo, C.E.M. 1969. Nova Hedwigia 17(1-4): 443-549.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Cosmarium pseudoexiguum* Raciborski**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium pseudoexiguum* Raciborski var. *pseudoexiguum
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium pseudoprotuberans* Kirchner**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium pseudoprotuberans* var. *alpinum* Raciborski**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium pseudopyramidatum* Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium pseudopyramidatum* var. *borgei* Willi Krieg. & Gerloff**
Referência: Krieger,W. & Gerloff, J. 1965. Die Gattung Cosmarium. Weinheim: J. Cramer 2: 113-240.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), S udeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
Cosmarium pseudopyramidatum* Lundell var. *pseudopyramidatum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Cosmarium pseudopyramidatum* var. *rotundatum* Willi Krieg. & Gerloff**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia; epicontinental

***Cosmarium pseudotaxichondrum* Nordst.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium pseudovariolatum* Grönblad**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium pseudovariolatum* var. *incrassatum* (Scott & Grönblad) Kanetsuna**
Referência: Kanetsuna, Y. 2004. Phycol. Res. 52: 160-–167.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal; epicontinental
***Cosmarium pseudovariolatum* var. *major* Kanetsuna**
Referência: Kanetsuna, Y. 2004. Phycol. Res. 52: 160-–167.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal; epicontinental
***Cosmarium pseudowenbaerense* Kouwets**
Referência: Silva, S.R.V.F. & Cecy, I.I.T. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 13-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Cosmarium punctulatum* Bréb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium punctulatum* Bréb. var. *punctulatum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Domínio desconhecido; epicontinental
***Cosmarium pyramidatum* Bréb.**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium quadrifarium* P. Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium quadrifarium* P. Lundell var. *quadrifarium
Referência: Silva, S.R.V.F. & Cecy, I.I.T. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 13-26.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Cosmarium quadrum* P. Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium quadrum* var. *minus* Nordst.**
Referência: Börge, O. 1918. Ark. Bot. 15(13): 1-108.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
Cosmarium quadrum* P. Lundell var. *quadrum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Cosmarium quinarium* P. Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium quinarium* var. *brasiliense* K. Först.**
Referência: Silva, S.R.V.F. & Cecy, I.I.T. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 13-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Cosmarium ralfsii* Bréb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium ralfsii* Bréb. var. *ralfsii
Referência: Bicudo, C.E.M. 1969. Nova Hedwigia 17(1-4): 443-549.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium ralfsii* var. *skvortzovii* C.E.M.Bicudo**
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium rectangulare* Grunow**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium regnellii* Wille**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium regnellii* var. *pseudoregnellii* (Messik.) Willi Krieg. & Gerloff**
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
Cosmarium regnellii* Wille var. *regnellii
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Cosmarium regnesii* Reinsch**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium regnesii* Reinsch var. *regnesii
Referência: Felisberto, S.A. & Rodrigues, L. 2008. Hoehnea 35(2): 235-254.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Cosmarium regulare* Schmidle**
Referência: Aprile, F.M. & Mera, P.A.S. 2007. Braz. J. Aquat. Sci. Technol. 11(2):1-14.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado; epicontinental
***Cosmarium reniforme* (Ralfs) Archer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium reniforme* (Ralfs) Archer var. *reniforme
Referência: Forster, K. 1969. Amazoniana 2(1-2): 5-116.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sul (PR); Amazônia, Cerrado; epicontinental
***Cosmarium retusiforme* (Wille) Gutw.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium securiforme* Borge**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
***Cosmarium securiforme* var. *brasiliense* Grönblad**
Referência: Forster, K. 1964. Hydrobiologia 23(3-4): 321-505.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado; epicontinental
***Cosmarium sexangulare* P. Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium sexangulare* var. *minus* Roy & Bisset**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cosmarium simplicius* (W.West & G.S.West) Grönblad**
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Cosmarium simulum* Borge**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cosmarium speciosum* P. Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Cosmarium speciosum* var. *simplex* Nordst.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cosmarium sphagnicolum* W.West & G.S.West**
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Cosmarium sphalerostichum* Nordst.**
Distribuição: nativa; endêmica

Cosmarium sphalerostichum* Nordst. var. *sphalerostichum
Referência: Forster, K. 1963. Rev. Algol. 7(1): 38-92.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia; epicontinental

***Cosmarium sublobatum* (Bréb.) Archer**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Cosmarium sublobatum* var. *brasiliense* Borge**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Cosmarium subretusiforme* W.West & G.S.West**
Referência: Thomasson, K. 1971. Mem. Inst. R. Sci. Nat. Belg., Sér. 2, 86: 1-57.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Cosmarium subspeciosum* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Cosmarium subspeciosum* Nordst. var. *subspeciosum
Referência: Silva, S.R.V.F. & Cecy, I.I.T. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 13-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (PR); Cerrado; epicontinental

***Cosmarium subspeciosum* var. *validius* Nordst.**
Referência: Silva, S.R.V.F. & Cecy, I.I.T. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 13-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (PR); Cerrado; epicontinental

***Cosmarium subtumidum* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Cosmarium subtumidum* var. *minutum* (Willi Krieg.) Willi Krieg. & Gerloff**
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Cosmarium taxichondrum* P. Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Cosmarium taxichondrum* var. *yamagishii* Kanetsuna**
Referência: Kanetsuna, Y. 2004. Phycol. Res. 52: 160-–167.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cosmarium tenue* Archer**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cosmarium tetraophtalmum* (Kütz.) Ralfs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cosmarium tinctum* Ralfs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cosmarium triangulare* Borge**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Cosmarium trilobulatum* Reinsch**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Cosmarium trilobulatum* var. *abscissum* (Schmidle) Willi Krieg. & Gerloff**
Referência: Silva, S.R.V.F. & Cecy, I.I.T. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 13-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental

***Cosmarium trilobulatum* var. *transvaalense* Willi Krieg. & Gerloff**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Cosmarium trilobulatum* Reinsch var. *trilobulatum
Referência: Camargo, J.C. et al. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 25-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Cosmarium trinodulum* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Cosmarium trinodulum* var. *brasiliense* Borge**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cosmarium undulatum* Corda *ex* Ralfs**
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Cosmarium variolatum* P. Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Cosmarium variolatum* var. *rotundatum* (Willi Krieg.) Messik.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cosmarium venustum* (Bréb.) Archer**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cosmarium venustum* var. *euastroides* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium vexatum* W.West**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium vexatum* W.West var. *vexatum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium wembaerense* Schmidle**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cosmarium zonatum* P. Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cosmarium zonatum* P. Lundell var. *zonatum
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Cylindrocystis Menegh. *ex* Ralfs

1 espécie (não endêmica)
***Cylindrocystis brebissonii* Menegh.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Desmidium C.Agardh *ex* Ralfs

7 espécies (nenhuma endêmica), 9 variedades (nenhuma endêmica)
***Desmidium aptogonum* Bréb. *ex* Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Desmidium aptogonum* var. *acutius* Nordst.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmidium baileyi* (Ralfs) Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmidium baileyi* (Ralfs) Nordst. var. *baileyi
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmidium cylindricum* Grev. *ex* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmidium cylindricum* Grev. *ex* Nordst. var. *cylindricum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmidium graciliceps* (Nordst.) Lagerh.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmidium graciliceps* (Nordst.) Lagerh. var. *graciliceps
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Desmidium laticeps* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Desmidium laticeps* var. *quadrangulare* Nordst.**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 9 171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmidium quadratum* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmidium quadratum* Nordst. var. *quadratum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmidium swartzii* (C.Agardh) C.Agardh *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Desmidium swartzii* var. *amblyodon* (Itzigs.) Rabenh.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Desmidium swartzii* var. *quadrangulatum* (Ralfs) Roy & Bisset**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
Desmidium swartzii* (C.Agardh) C.Agardh *ex* Ralfs var. *swartzii
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Docidium Bréb. *ex* Ralfs

1 espécie (não endêmica)
***Docidium baculum* Bréb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Euastrum Ehrenb. *ex* Ralfs

37 espécies (1 endêmica), 27 variedades (nenhuma endêmica)
***Euastrum abruptum* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum abruptum* var. *lagoense* (Nordst.) Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum angolense* (West & G.S.West) Willi Krieg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum angolense* var. *brasiliense* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Euastrum ansatum* Ehrenb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euastrum ansatum* Ehrenb. *ex* Ralfs var. *ansatum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum arciferum* Borge**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum arciferum* var. *mediolaeve* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum attenuatum* Wolle**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum attenuatum* var. *saitoi* Kanetsuna**
Referência: Kanetsuna, Y. 2004. Phycol. Res. 52: 160-167.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado; epicontinental
***Euastrum binale* (Turpin) Ehrenb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum binale* var. *borgei* Scott**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum brasiliense* Borge**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euastrum brasiliense* Borge var. *brasiliense
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum brasiliense* var. *convergens* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum crameri* Raciborski**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum decemgibbosum* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum denticulatum* (Kirchner) Gay**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum didelta (*Turpin) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum didelta* var. *quadriceps* (Nordst.) Willi Krieg.**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia; epicontinental
***Euastrum doliforme* West & G.S.West**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum doliforme* var. *montanum* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum dubium* Nägeli**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum dubium* var. *tritum* West & G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum elegans* (Bréb.) Kütz. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euastrum elegans* (Bréb.) Kütz. *ex* Ralfs var. *elegans
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Euastrum fissum* W.West & G.S. West**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Euastrum gayanum* De Toni**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum gayanum* var. *angulatum* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum gemmatum* (Bréb.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euastrum gemmatum* (Bréb.) Ralfs var. *gemmatum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Euastrum giganteum* (Wood) Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum giganteum* var. *brasiliense* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum giganteum* var. *latum* Taylor**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum humbetii* Bourr. & Leboine**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum humbetii* var. *brasiliense* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum hypochondrum* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euastrum hypochondrum* Nordst. var. *hypochondrum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Euastrum insulare* (Wittr.) Roy**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum insulare* var. *silesiacum* (Grönblad) Willi Krieg.**
Referência: Kanetsuna, Y. 2004. Phycol. Res. 52: 60-167.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal; epicontinental
***Euastrum latipes* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euastrum latipes* Nordst. var. *latipes
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum luetkemuelleri* F. Ducell.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum luetzelburgii* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Euastrum membraniporum* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum mononcylum* (Nordst.) Raciborski**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum mononcylum* var. *borgei* Grönblad**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum pinge* Elfving**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum pinge* var. *brasiliense* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum quebecense* Irénée-Marie**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Euastrum rectangulare* F.E.Fritsch & M.F.Rich**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Euastrum sinuosum* Lenorm. *ex* Archer**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum spinulosum* Delponte**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum spinulosum* var. *inermius* (Nordst.) C.Bernard**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum subintegrum* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum subintegrum* var. *brasiliense* Grönblad**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Amazônia; epicontinental
***Euastrum sublobatum* Bréb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum sublobatum* var. *obtusatum* (Gutw.) Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum subtrilobulatum* K.Först. & Eckert**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum subtrilobulatum* var. *laeve* K.Först. & Eckert**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euastrum validum* W. West & G.S. West**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euastrum validum* var. *glabrum* Willi Krieg.**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Euastrum verrucosum* Ehrenb. *ex* Ralfs**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Euastrum vitalianum* C.E.M.Bicudo & R.M.T.Bicudo**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Gonatozygon de Bary

2 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Gonatozygon monotaenium* de Bary**
Distribuição: nativa; não endêmica
Gonatozygon monotaenium* de Bary var. *monotaenium
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Gonatozygon monotaenium* var. *pilosellum* Nordst.**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8 2(2): 135-242.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Gonatozygon pilosum* Wolle**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Haplotaenium T.Bando

1 espécie (não endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Haplotaenium minutum* (Ralfs) T.Bando**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Haplotaenium minutum* var. *gracile* (Wille) T.Bando**
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido; epicontinental

Haplotaenium minutum* (Ralfs) T.Bando var. *minutum
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido; epicontinental

Heimansia Coesel

1 espécie (não endêmica)

***Heimansia pusilla* (Hilse) Coesel**
Referência: Aráujo, A. & Bicudo, C.E.M. 2006. Hoehnea 33(2): 219-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Hyalotheca Ehrenb. *ex* Ralfs

3 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Hyalotheca dissiliens* (G.M.Sm.) Bréb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

Hyalotheca dissiliens* (G.M.Sm.) Bréb. *ex* Ralfs var. *dissiliens
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental

***Hyalotheca laevicincta* Taylor**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

***Hyalotheca mucosa* (Mertens) Ehrenb. *ex* Ralfs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

Mesotaenium Nägeli

3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Mesotaenium degreyii* Turner**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Mesotaenium degreyii* var. *breve* W.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Mesotaenium macrococcum* (Kütz.) Roy & Bisset**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Mesotaenium macrococcum* var. *minus* (de Bary) Compère**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Mesotaenium mirificum* Archer**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Micrasterias C.Agardh *ex* Ralfs

23 espécies (nenhuma endêmica), 24 variedades (1 endêmica)

***Micrasterias abrupta* West & G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias americana* (Ehrenb.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Micrasterias americana* var. *boldtii* Gutw.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias apiculata* (Ehrenb.) Menegh. *ex* Ralfs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias arcuata* Bailey**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias borgei* Willi Krieg.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Micrasterias borgei* Willi Krieg. var. *borgei
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias borgei* var. *multidentata* Willi Krieg.**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Micrasterias conferta* P.Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Micrasterias conferta* var. *hamata* Wolle**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias crux-melitensis* (Ehrenb.) Hassal *ex* Ralfs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias denticulata* Bréb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Micrasterias denticulata* var. *granulosa* Irinée-Marie**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias excavata* (Nordst.) C.E.M.Bicudo & Sormus**
Distribuição: nativa; não endêmica

Micrasterias excavata* (Nordst.) C.E.M.Bicudo & Sormus var. *excavata
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias furcata* C.Agardh *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

Micrasterias furcata* C.Agardh *ex* Ralfs var. *furcata
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia; epicontinental

***Micrasterias furcata* var. *pseudocrux* (Grönblad) C.E.M.Bicudo & Sormus**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias integra* Nordst.**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias jenneri* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Micrasterias jenneri* var. *simplex* W.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias laticeps* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Micrasterias laticeps* var. *acuminata* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias laticeps* var. *aequilobata* (Borge) Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Micrasterias laticeps* Nordst. var. *laticeps
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias mahabuleshwarensis* Hobson**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Micrasterias mahabuleshwarensis* var. *amazonensis* K.Först.**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Micrasterias pinnatifida* (Kütz.) *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

Micrasterias pinnatifida* (Kützing) *ex* Ralfs var. *pinnatifida
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias quadridentata* (Nordst.) Grönblad**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias radians* Turner**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias radiosa* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Micrasterias radiosa* var. *elegantior* (West) Croasdale**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Micrasterias radiosa* Ralfs var. *radiosa
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia; epicontinental

***Micrasterias rotata* (Grev.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

Micrasterias rotata* (Greville) Ralfs var. *rotata
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia; epicontinental

***Micrasterias simplex* Børgesen**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Micrasterias simplex* var. *kriegeri* Sormus**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Micrasterias simplex* Børgesen var. *simplex
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias torreyi* Bailey *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Micrasterias torreyi* var. *nordstedtiana* (Hieron.) Schmidle**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias tropica* Nordst.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias truncata* (Corda) Bréb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Micrasterias truncata* var. *crenata* (Bréb.) Reinsch**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Micrasterias truncata* var. *neodamensis* (Braun) Dick**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Micrasterias truncata* var. *pusilla* G.West**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
Micrasterias truncata* (Corda) Bréb. *ex* Ralfs var. *truncata
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Mougeotia C.Agardh

7 espécies (nenhuma endêmica)
***Mougeotia abnormis* Kisselev**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Mougeotia ellipsoidea* (West & G.S. West) Czurda**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Mougeotia mysorense* Iyengar**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Mougeotia parvula* Hassall**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Mougeotia rava* Transeau**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Mougeotia varians* (Witt.) Czurda**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Mougeotia virescens* (Hassall) Borge**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Netrium (Nägeli) Itzisohn & Rothe

3 espécies (nenhuma endêmica), 7 variedades (nenhuma endêmica)
***Netrium digitus* (Ehrenb.) W.Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Netrium digitus* (Ehrenb.) W.Sm. var. *digitus
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Netrium digitus* var. *lamellosum* (Bréb.) Grönblad**
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Netrium digitus* var. *naegelli* (Bréb.) Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Netrium digitus* var. *parvum* Borge**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Netrium interruptum* (Bréb.) Lütkem.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Netrium interruptum* var. *minor* (Borge) Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Netrium oblongum* (de Bary) Lütkem.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Netrium oblongum* var. *cylindricum* West & West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
Netrium oblongum* (de Bary) Lütkem. var. *oblongum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Nitella C.Agardh

19 espécies (3 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica), 11 variedades (nenhuma endêmica)
***Nitella acuminata* A.Braun *ex* Wallman *emend.* R.D.Wood**
Referência: Bicudo, R.M.T. 1969. Nova Hedwigia 17: 1-14.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Nitella arechavaletae* Spegazzini**
Referência: Prado, J.F. 2003. Characeae do Rio Grande do Sul, Brasil.Tese de Doutorado. Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 233 p.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Nitella blankinshipii* T.F.Allen**
Referência: Picelli-Vicentin, M.M. et al. 2004. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 5: Charophyceae. 124 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Nitella cernua* A.Braun**
Referência: Bicudo, R.M.T. & Yamaoka, D.M. 1978. Acta Biol. Paran. 7: 77-98.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Nitella clavata* Kütz.**
Referência: Bicudo, R.M.T. & Yamaoka, D.M. 1978. Acta Biol. Paran. 7: 77-98.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Nitella flexilis* (L.) C.Agardh**
Referência: Bicudo, R.M.T. & Yamaoka, D.M. 1978. Acta Biol. Paran. 7: 77-98.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica; epicontinental

***Nitella furcata* (Roxburgh *ex* Bruzelius) C.Agardh *emend.* R.D.Wood**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Nitella furcata* subsp. *flagellifera* (J.Groves & G.O.Allen) R.D.Wood**
Referência: Bueno, N.C. & Bicudo, C.E.M. 1997. Hoehnea 24(2): 29-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Nitella furcata* subsp. *flagelliformis* (A.Braun) R.D.Wood**
Referência: Picelli-Vicentin, M.M. et al. 2004. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 5: Charophyceae. 124 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Nitella furcata* (Roxburgh *ex* Bruzelius) C.Agardh *emend.* R.D.Wood var. *furcata
Referência: Prado, J.F. 2005. Characeae do Rio Grande do Sul, Brasil.Tese de Doutorado. Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 233 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Nitella furcata* var. *mucronata* (A.Braun) R.D.Wood**
Referência: Bueno, N.C. & Bicudo, C.E.M. 1997. Hoehnea 24(2): 29-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Nitella furcata* var. *ogivalis* (J.Groves & Stephens) R.D.Wood**
Referência: Picelli-Vicentin, M.M. et al. 2004. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 5: Charophyceae. 124 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Nitella furcata* var. *orientalis* (T.F.Allen) R.D.Wood**
Referência: Astorino, H.A.B. 1983. Charophyceae do estado do Rio Grande do Sul: uma contribuição ao seu inventário. Dissertação de Mestrado. Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista. 108 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Nitella furcata* var. *sieberi* (A.Braun) R.D.Wood**
Referência: Bueno, N.C. & Bicudo, C.E.M. 1997. Hoehnea 24(2): 29-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Nitella gollmeriana* A.Braun**
Referência: Bicudo, R.M.T. & Yamaoka, D.M. 1978. Acta Biol. Paran. 7: 77-98.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Nitella gracilis* (J.E.Sm.) C.Agardh *emend.* R.D.Wood**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Nitella gracilis* var. *havaiensis* (Nordst.) R.D.Wood**
Referência: Astorino, H.A.B. 1983. Charophyceae do estado do Rio Grande do Sul: uma contribuição ao seu inventário. Dissertação de Mestrado. Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista. 108 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido; epicontinental

***Nitella greeni* (R.D.Wood) R.D.Wood**
Referência: Bicudo, R.M.T. & Yamaoka, D.M. 1978. Acta Biol. Paran. 7: 77-98.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Nitella hyalina* (DC.) C.Agardh**
Distribuição: nativa; não endêmica

Nitella hyalina* (DC.) C.Agardh var. *hyalina
Referência: Prado, J.F. & Baptista, L.R.M. 2005. Iheringia, Bot. 60(2): 259-268.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental

***Nitella hyalina* var. *maxima* (A.Braun *ex* Migula) R.D.Wood**
Referência: Prado, J.F. & Baptista, L.R.M. 2005. Iheringia, Bot. 60(2): 259-268.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental

***Nitella leptostachys* A.Braun *emend.* R.D.Wood**
Distribuição: nativa; não endêmica

Nitella leptostachys* A.Braun *emend.* R.D.Wood var. *leptostachys
Referência: Picelli-Vicentin, M.M. et al. 2004. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 5: Charophyceae. 124 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Nitella opaca* (Bruzelius) C.Agardh**
Referência: Bicudo, R.M.T. & Yamaoka, D.M. 1978. Acta Biol. Paran. 7: 77-98.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental

***Nitella praelonga* A.Braun**
Referência: Vieira Jr, J. et al. 2002. Hoehnea 29(3): 249-266.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Nitella rosa-mariae* Picelli-Vicentim**
Referência: Picelli-Vicentin, M.M. et al. 2004. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 5: Charophyceae. 124 p.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Nitella subglomerata* A.Braun**
Referência: Bueno, N.C. & Bicudo, C.E.M. 1997. Hoehnea 24(2): 29-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Nitella tenuissima* (Desv.) Kütz. *emend.* R.D.Wood**
Distribuição: nativa; não endêmica
Nitella tenuissima* (Desvaux) Kütz. *emend.* R.D.Wood var. *tenuissima
Referência: Vieira Jr, J. et al. 2002. Hoehnea 29(3): 249-266.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (RS); Domínio desconhecido; epicontinental
***Nitella tolypelloides* Picelli-Vicentim**
Referência: Picelli-Vicentin, M.M. et al. 2004. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 5: Charophyceae. 124 p.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Nitella translucens* (Pers.) C.Agardh *emend.* R.D.Wood**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Nitella translucens* subsp. *sublucens* (T.F.Allen) Corillion *ex* R.D.Wood**
Referência: Vieira Jr, J. et al. 2002. Hoehnea 29(3): 249-266.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Nitella translucens* var. *axillaris* (A.Braun) R.D.Wood**
Referência: Bueno, N.C. & Bicudo, C.E.M. 1997. Hoehnea 24(2): 29-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

Octacanthium (Hansg.) Compère

4 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Octacanthium bifidum* (Bréb.) Compère**
Referência: Faustino, S.M.M. & Bicudo, C.E.M. 2003. Biota Neotrop. 3(1): 1-7.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Octacanthium controversum* (West & G.S.West) Compère**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Octacanthium controversum* var. *mamillatum* (C.E.M.Bicudo & R.M.T.Bicudo) Sophia & C.E.M.Bicudo**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Octacanthium mucronulatum* (Nordst.) Compère**
Distribuição: nativa; não endêmica
Octacanthium mucronulatum* (Nordst.) Compère var. *mucronulatum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia; epicontinental
***Octacanthium octocorne* (Ralfs) Compère**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Onychonema G.C.Wall.

1 espécie (não endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Onychonema laeve* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Onychonema laeve* Nordst. var. *laeve
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Onychonema laeve* var. *latum* West & G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Penium Bréb. *ex* Ralfs *in* Ralfs

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Penium margaritaceum* (Ehrenb.) Bréb. *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Penium margaritaceum* (Ehrenb.) Bréb. *ex* Ralfs var. *margaritaceum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental

Phymatodocis Nordst.

1 espécie (não endêmica)
***Phymatodocis nordstedtiana* Wolle**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Pleurotaenium Nägeli

13 espécies (nenhuma endêmica), 11 variedades (nenhuma endêmica)
***Pleurotaenium baculoides* (Roy & Bisset) Playfair**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pleurotaenium caldense* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pleurotaenium caldense* Nordst. var. *caldense
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pleurotaenium cylindricum* (Turner) Schmidle**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pleurotaenium cylindricum* var. *stuhlmannii* (Hieron.) Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pleurotaenium ehrenbergii* (Bréb. *ex* Ralfs) Delponte**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pleurotaenium ehrenbergii* var. *crassum* (Wittr.) Nordst.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
Pleurotaenium ehrenbergii* (Bréb. *ex* Ralfs) Delponte var. *ehrenbergii
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido; epicontinental

***Pleurotaenium ehrenbergii* var. *undulatum* Schaarschmidt**
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido; epicontinental
***Pleurotaenium laevigatum* Borge**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Pleurotaenium maskellii* Suxena & Venkateswarlu**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica (2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido; epicontinental
***Pleurotaenium nodosum* (Bailey) P.Lundell**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pleurotaenium nodosum* var. *gutwinskii* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Pleurotaenium nodulosum* (Bréb.) de Bary**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Pleurotaenium subalternans* Borge**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Pleurotaenium subundulatum* Borge**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pleurotaenium subundulatum* var. *coroniferum* Borge**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Pleurotaenium trabecula* (Ehrenb.) *ex* Nägeli**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pleurotaenium trabecula* var. *elongatum* Cedergr.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Pleurotaenium trabecula* var. *rectum* (Delponte) W.West & G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
Pleurotaenium trabecula* (Ehrenb.) *ex* Nägeli var. *trabecula
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Pleurotaenium truncatum* (Bréb.) Nägeli**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pleurotaenium truncatum* var. *crassum* Boldt**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Pleurotaenium verrucorum* (Bailey) P.Lundell**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

Sphaerozosma Corda

1 espécie (não endêmica)
***Sphaerozosma luetzelburgianum* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Spirogyra Link

33 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Spirogyra angolensis* Welw.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Spirogyra baileyi* Schmidle**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Spirogyra columbiana* Czurda**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Spirogyra communis* (Hassall) Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Spirogyra corrugata* Transeau**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Spirogyra crassa* Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Spirogyra decimina* (O.F.Müll.) Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Spirogyra distenta* Transeau**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra dubia* Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra ellipsospora* Transeau**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra elongata* (Ber.) Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra flavescens* (Hassall) Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra fuellebornii* Schmidle**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra hyalina* Cleve**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra inflata* (Vaucher) Kütz.**
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Spirogyra insignis* (Hassall) Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra irregularis* Nägeli**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra juergensii* Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra longata* (Vaucher) Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra neglecta* (Hassall) Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra nitida* (Dillwyn) Link**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra pulchifigurata* Jao**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra quadrilaminata* Jao**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra quinina* Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra setiformis* (Roth) Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra smithii* Transeau**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra subreticulata* F.E.Fritsch**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra subsalsa* Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra tenuissima* (Hassall) Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra trochainii* Gauthier-Lièvre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra tropica* Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Spirogyra tropica* var. *articulis-brevioribus* Zeller**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra turfosa* Gay**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Spirogyra verrucogranulata* I.C.A.Dias & C.E.M.Bicudo**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Spirotaenia Bréb. *ex* Ralfs

1 espécie (não endêmica)
***Spirotaenia condensata* (Bréb.) Ralfs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Spondylosium Bréb. *ex* Kütz.

4 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Spondylosium desmidiiforme* (Borge) G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Spondylosium planum* (Wolle) W.West & G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Spondylosium pulchellum* (W.Archer) Rabenh.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Spondylosium pulchellum* (Archer) Rabenh. var. *pulchellum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Spondylosium pulchrum* (Bailey) Archer**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Spondylosium pulchrum* var. *constrictum* (Wolle) West & G.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
Spondylosium pulchrum* (Bailey) Archer var. *pulchrum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

Staurastrum (Meyen) Ralfs

46 espécies (nenhuma endêmica), 31 variedades (nenhuma endêmica)
***Staurastrum alternans* Bréb.**
Referência: Felisberto, S.A. & Rodrigues, L. 2008. Hoehnea 35(2): 235-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Staurastrum anatinum* Cooke & Wills**
Distribuição: nativa; não endêmica
Staurastrum anatinum* Cooke & Wills var. *anatinum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum chaetoceras* (Schoeder) G.M. Sm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum claviferum* (Delponte) W.West & G.S.West**
Referência: Felisberto, S.A. & Rodrigues, L. 2008. Hoehnea 35(2): 235-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental
***Staurastrum cosmarioides* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Staurastrum cosmarioides* Nordst. var. *cosmarioides
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum cosmarioides* var. *tropicum* (Lagerh.) Borge**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum curvimarginatum* Scott & Grönblad**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Staurastrum dilatatum* (Ehrenb.) Ralfs**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum disputatum* W.West & G.S.West**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Staurastrum disputatum* var. *sinense* (Lütkem.) West & G.S.West**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Staurastrum distentum* Wolle**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum donnelli* Wolle**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Staurastrum donnelli* var. *erectum* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum erostellum* West & G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum floriferum* W.West & G.S.West**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum furcatum* (Ehrenb.) Bréb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum gladiosum* Turner**
Distribuição: nativa; não endêmica
Staurastrum gladiosum* Turner var. *gladiosum
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Staurastrum gracile* Ralfs *ex* Ralfs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum grallatorium* Nordst.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum hantzschii* Reinsch**
Referência: Felisberto, S.A. & Rodrigues, L. 2008. Hoehnea 35(2): 235-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum hexacerum* (Ehrenb.) Wittr**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum hirsutum* (Ehrenb.) Ralfs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum hystrix* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Staurastrum hystrix* var. *robustum* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum inversenii* Nygaard**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Staurastrum inversenii* var. *americanum* Scott & Grönblad**
Referência: Nogueira, I.S. & Leandro-Rodrigues, N.C. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(3): 377-395.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental
***Staurastrum laeve* Ralfs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum leptocladum* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Staurastrum leptocladum* var. *cornutum* Wille**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
Staurastrum leptocladum* Nordst. var. *leptocladum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum lunatum* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Staurastrum lunatum* Ralfs var. *lunatum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum margaritaceum* (Ehrenb.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Staurastrum margaritaceum* (Ehrenb.) Ralfs var. *margaritaceum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Staurastrum minnesotense* Wolle**
Distribuição: nativa; não endêmica
Staurastrum minnesotense* Wolle var. *minnesotense
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Staurastrum muticum* (Bréb.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Staurastrum muticum* var. *depressum* Nordst.**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
Staurastrum muticum* (Bréb.) Ralfs var. *muticum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Staurastrum orbiculare* (Ehrenb.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Staurastrum orbiculare* (Ehrenb.) Ralfs var. *orbiculare
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Staurastrum orbiculare* var. *ralfsii* West & G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum paradoxum* Meyen**
Distribuição: nativa; não endêmica
Staurastrum paradoxum* Meyen var. *paradoxum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Staurastrum paulense* Børgesen**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Staurastrum paulense* var. *ornatum* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum pinnatum* Turner**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Staurastrum pinnatum* var. *floridense* Scott & Grönblad**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum pinnatum* var. *reductum* Willi Krieg.**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum punctulatum* (Bréb.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

Staurastrum punctulatum* (Bréb.) Ralfs var. *punctulatum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Staurastrum quadrangulare* (Bréb.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Staurastrum quadrangulare* var. *contectum* (Turner) Grönblad**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Staurastrum quadrangulare* var. *longispinum* Børgesen**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Staurastrum quadrangulare* (Bréb.) Ralfs var. *quadrangulare
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Staurastrum quadricornutum* Roy & Bisset**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Staurastrum rotula* Nordst.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum sebaldi* Reinsch**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Staurastrum sebaldi* var. *ornatum* Nordst.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum serriforme* Børgesen**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum setigerum* Cleve**
Referência: Felisberto, S.A. & Rodrigues, L. 2008. Hoehnea 35(2): 235-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental

***Staurastrum sexangulare* (Bulnh.) Rabenh.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Staurastrum sexangulare* var. *brasiliense* Grönblad**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum subcruciatum* Cooke & Wills**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum subpolymorphum* Borge**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum teliferum* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Staurastrum teliferum* var. *pecten* (Perty) Grönblad**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum tetracerum* (Kütz.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica

Staurastrum tetracerum* (Kütz.) Ralfs var. *tetracerum
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum trifidum* Nordst.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Staurastrum trifidum* var. *inflexum* West & G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum trihedrale* Wolle**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Staurastrum trihedrale* var. *glabrum* Taft**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurastrum volans* W.West & G.S.West**
Referência: Keppeler, E.C. et al. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(4): 687-691.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia; epicontinental

Staurodesmus Teiling

17 espécies (nenhuma endêmica), 10 variedades (nenhuma endêmica)

***Staurodesmus brevispina* (Bréb.) Croasdale**
Distribuição: nativa; não endêmica

Staurodesmus brevispina* (Bréb.) Croasdale var. *brevispina
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Staurodesmus connatus* (P.Lundell) Thomasson**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurodesmus convergens* (Ehrenb.) Teiling**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Staurodesmus convergens* var. *laportei* Teiling**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Staurodesmus croasdale* Teiling**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurodesmus cuspidatus* (Bréb.) Teiling**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Staurodesmus cuspidatus* var. *curvatus* (W.West) Teiling**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

***Staurodesmus dejectus* (Bréb.) Teiling**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Staurodesmus dejectus* var. *apiculatus* (Bréb.) Teiling**
Referência: Felisberto, S.A. & Rodrigues, L. 2008. Hoehnea 35(2): 235-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado; epicontinental

***Staurodesmus dickei* (Ralfs) Lillieroth**
Distribuição: nativa; não endêmica

Staurodesmus dickei* (Ralfs) Lillieroth var. *dickei
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurodesmus dickei* var. *maximus* (West & G.S.West) Thomasson**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Staurodesmus dickei* var. *rhomboideus* (West & G.S.West) Lillieroth**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurodesmus extensus* (Borge) Teiling**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurodesmus incus* (Bréb.) Teiling**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurodesmus lobatus* (Børgesen) Bourr.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Staurodesmus lobatus* var. *ellipticus* (Fritsh & Rich) Teiling**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

***Staurodesmus mamillatus* (Nordst.) Teiling**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurodesmus phimus* (Turner) Thomasson**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurodesmus spencerianus* (Maskell) Teiling**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurodesmus spetsbergensis* (Nordst.) Teiling**
Distribuição: nativa; não endêmica

Staurodesmus spetsbergensis* (Nordst.) Teiling var. *spetsbergensis
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Staurodesmus subulatus* (Kütz.) Thomasson**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurodesmus triangularis* (Lagerh.) Teiling**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Staurodesmus triangularis* var. *subparallelus* (G.M.Sm.) Teiling**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Staurodesmus validus* (West & G.S.West) Thomasson**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8: 17-26.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Teilingia Bourr.
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Teilingia granulata* (Roy & Bisset) Bourr. *ex* Compère**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Teilingia wallichii* (Jacobsen) Bourr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Teilingia wallichii* var. *borgei* (Grönblad) K.Först.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Temnogametum W.West & G.S.West
1 espécie (não endêmica)
***Temnogametum uleanum* (Möbius) Wille**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Tetmemorus Ralfs *ex* Ralfs
3 espécies (nenhuma endêmica), 7 variedades (nenhuma endêmica)
***Tetmemorus brebissonii* (Menegh.) Ralfs *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tetmemorus brebissonii* (Menegh.) Ralfs *ex* Ralfs var. *brebissonii
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Tetmemorus granulatus* (Bréb.) Ralfs *ex* Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tetmemorus granulatus* var. *attenuatus* W.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetmemorus granulatus* var. *elongatus* Willi Krieg.**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
Tetmemorus granulatus* (Brébisson) Ralfs *ex* Ralfs var. *granulatus
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetmemorus laevis* (Kütz.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tetmemorus laevis* var. *borgei* K.Först.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
Tetmemorus laevis* (Kütz.) Ralfs var. *laevis
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Tetmemorus laevis* var. *minutus* (de Bary) Willi. Krieg.**
Referência: Sophia, M.G. et al. 2005. Iheringia, Bot. 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Xanthidium Ehrenb. *ex* Ralfs
5 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Xanthidium antilopaeum* (Bréb.) Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Xanthidium antilopaeum* var. *triquetrum* P.Lundell**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Xanthidium concinum* Archer**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Xanthidium forcipatum* Borge**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Xanthidium octocorne* (Ehrenb.) Ralfs**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Xanthidium trilobum* Nordst.**
Referência: Lopes, M.R.M. & Bicudo, C.E.M. 2002. Acta Amazonica 33(2): 167-212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

Zygnema C.Agardh
1 espécie (não endêmica)
***Zygnema gangeticum* Rao**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Zygogonium Kütz.
1 espécie (não endêmica)
***Zygogonium ericetorum* Kütz.**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001. Mus. Nac. Série Livros 8:171-200
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

CHLOROPHYCEAE

Mariângela Menezes

88 gêneros, 319 espécies (2 endêmicas), 80 variedades (nenhuma endêmica)

Actinastrum Lagerh.

1 espécie (não endêmica)

***Actinastrum aciculare* Playfair**

Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Ankistrodesmus Corda

9 espécies (nenhuma endêmica)

***Ankistrodesmus bernadii* Komárek**

Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Ankistrodesmus densus* Korshikov**

Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

***Ankistrodesmus falcatus* (Corda) Ralfs**

Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

***Ankistrodesmus fasciculatus* (Lundb.) Komárk.-Legn.**

Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

***Ankistrodesmus fusiformis* Corda**

Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Ankistrodesmus gracilis* (Reinsch) Korshikov**

Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

***Ankistrodesmus spiralis* (Turner) Lemmerm.**

Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

***Ankistrodesmus tortus* Komárek & Comas**

Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

***Ankistrodesmus turneri* (West & G.S.West) Komárek & Comas**

Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Apodocloris Komárek

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Apodocloris polymorpha* (H.W.Bisch. & Bold) Komárek**

Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Apodocloris simplicissima* (Korshikov) Komárek**

Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Botryococcus Kütz.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Botryococcus braunii* Kütz.**

Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA, RN), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Botryococcus terribilis* Komárek & Marvan**

Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Carteria Diesing *emend.* Francé

10 espécies (1 endêmica)

***Carteria globulosa* Pascher**

Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Carteria hiemale* Skvortzov *ex* C.E.M.Bicudo**

Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Carteria lohammari* Skuja**

Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Carteria lunzensis* Pascher & Jahoda**

Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Carteria multifilis* (Fres.) Dill**

Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Carteria plana* Pascher**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Carteria platyrhyncha* Ettl**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Carteria polychloris* Pascher**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Carteria sanpaulensis* Skvortzov *ex* C.E.M.Bicudo**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Carteria wisconsinensis* Huber-Pestalozzi**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Catenococcus Hindák
1 espécie (não endêmica)
***Catenococcus tortuosus* Hindák**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Cephalomonas Higginbotam
1 espécie (não endêmica)
***Cephalomonas granulata* Higginbotam**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Characium A.Braun
9 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Characium acuminatum* A.Braun**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Characium cucurbitinum* Jao**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Characium ensiforme* Hermann**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Characium hindakii* Lee & Bold**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Characium obesum* W.R.Taylor**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Characium ornithocephalum* A.Braun**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Characium ornithocephalum* var. *adolescens* Printz**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
Characium ornithocephalum* A. Braun var. *ornithocephalum
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Characium ornithocephalum* var. *pringsheimii* (A.Braun) Komárek**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Characium rostratum* Reinh. *ex* Printz**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Characium strictum* A.Braun**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Characium transvaalense* Cholnoky**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Chlamydomonas Ehrenb.
27 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Chlamydomonas actinochloris* Deason & Bold**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Chlamydomonas agloëformis* Pascher**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Chlamydomonas debaryana* Gorosch.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Chlamydomonas debaryana* var. *micropapillata* Gerloff**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas epibiotica* Ettl**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas globosa* Snow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas gloeopara* Rhode & Skuja**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas gracilis* Snow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas lunata* Pascher & Jahoda**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas microscopica* G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas microsphaerella* Pascher & Jahoda**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas minutissima* Korshikov**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas monoica* Strehlow**
Distribuição: nativa; não endêmica

Chlamydomonas monoica* Strehlow var. *monoica
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas parisii* Bourr.**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas pertyii* Gorosch.**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas planctogloea* Skuja**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas pseudopertusa* Ettl**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas pseudotarda* Bourr.**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas pulvisculus* O.F.Müller**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

C***hlamydomonas rattuli* Korshikov**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas reinhardtii* P.A.Dang.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas sagittula* Skuja**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas simplex* Pascher**
Distribuição: nativa; não endêmica

Chlamydomonas simplex* Pascher var. *simplex
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas sordida* Ettl**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas tetravaculata* Ettl**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas tremulans* Skuja**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas typhlos* Gerloff**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Chlamydomonas virgata* Pascher**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Chlorella Beij.

5 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Chlorella homosphaera* Skuja**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Chlorella kessleri* (Gickelh.) Bourr.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Chlorella minutissima* (Gickelh.) Bourr.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental
***Chlorella oocystoides* Hindák**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental
***Chlorella vulgaris* Beij.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chlorella vulgaris* var. *autotrophica* (Shihira & Krauss) Fott & Nováková**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Chlorogonium Ehrenb.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Chlorogonium fusiforme* Matwienko**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Chlorogonium gracile* Matvienko**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Chlorogonium heimii* Bourr.**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Chlorogonium hiemale* J.Schiller**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Chlorolobium Korshikov

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Chlorolobium braunii* (Nägeli) Komárek**
Referência: Silva, L.H.S. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(2): 281-303.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Chlorolobium saxatile* (Komárk.-Legn.) Komárek**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Chloromonas Gobi *emend.* Wille

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Chloromonas frigida* (Skuja) Gerloff & Ettl**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Chloromonas pumilio* Ettl**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Chodatellopsis Korshikov

1 espécie (não endêmica)
***Chodatellopsis elliptica* Korshikov**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Choricystis (Skuja) Fott

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Choricystis komarekii* Comas**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Choricystis minor* (Skuja) Fott**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Choricystis minor* var. *gallica* (Bourr.) Komárek**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Closteriopsis Lemmerm.

3 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Closteriopsis acicularis* (G.M.Sm.) Belcher & Swale**
Distribuição: nativa; não endêmica
Closteriopsis acicularis* (G.M.Sm.) Belcher & Swale var. *acicularis
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Closteriopsis acicularis* var. *africana* Hindák**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Closteriopsis longissima* (Lemmerm.) Lemmerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
C***losteriopsis longissima* var. *tropica* W.West & G.S.West**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Closteriopsis scolia* Comas**
Referência: Silva, C.A., Train, S. & Rodrigues, L.C. 2001. Acta Sci. Biol. Sci. 23(2): 283-290.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Coccomonas Stein

1 espécie (não endêmica)
***Coccomonas orbicularis* Stein**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Coelastrum Nägeli

9 espécies (nenhuma endêmica), 6 variedades (nenhuma endêmica)
***Coelastrum astroideum* De Not.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Coelastrum astroideum* De Not. var. *astroideum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Coelastrum cambricum* Archer**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Coelastrum cambricum* var. *cristata* Kammerer**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul; Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
C***oelastrum microporum* Nägeli**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (RN, PB, PE), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Coelastrum polychordum* (Korshikov) Hindák**
Distribuição: nativa; não endêmica
Coelastrum polychordum* (Korshikov) Hindák var. *polychordum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Coelastrum proboscideum* Bohlin**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Coelastrum pseudomicroporum* Korshikov**
Distribuição: nativa; não endêmica
C***oelastrum pseudomicroporum* Korshikov var. *pseudomicroporum***
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Coelastrum pulchrum* Schmidle**
Distribuição: nativa; não endêmica
Coelastrum pulchrum* Schmidle var. *pulchrum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Coelastrum reticulatum* (P.A.Dang.) Senn**
Distribuição: nativa; não endêmica
Coelastrum reticulatum* (P.A.Dang.) Senn var. *reticulatum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Coelastrum sphaericum* Nägeli**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Coenochloris Korshikov

7 espécies (nenhuma endêmica)
***Coenochloris asymmetrica* Hindák**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Coenochloris granulata* Krienitz**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Coenochloris hindakii* Komárek**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Coenochloris pelagica* (Teiling) Fott**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental
***Coenochloris piscinalis* Fott**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Coenochloris planoconvexa* Hindák**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Coenochloris polycocca* (Korsikov) Hindák**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Coenocystis Korshikov
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Coenocystis asymmetrica* Komárek**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental
***Coenocystis hindakii* Stein**
Referência: Vercelino, I. S. & Bicudo, D.C. 2006. Rev. bras. bot. 29(3): 363-377.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
Coenocystis subcylindrica Korshikov
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (RN), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica; epicontinental

Coronastrum R.H.Thomps.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Coronastrum aestivale* R.H.Thomps.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Coronastrum ellipsoideum* Fott**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Crucigenia Morren
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Crucigenia fenestrata* (Schmidle) Schmidle**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Crucigenia quadrata* Morren**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN, PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica; epicontinental
***Crucigenia rectangularis* (Nägeli) Komárek**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Crucigenia tetrapedia* (Kirchner) West & G.S.West**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Crucigeniella Lemmerm.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Crucigeniella apiculata* (Lemmerm.) Komárek**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Crucigeniella pulchra* (W.West & G.S.West) Komárek**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Cylindrocapsa Reinsch
1 espécie (não endêmica)
***Cylindrocapsa conferta* West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Desmodesmus An et al.
17 espécies (nenhuma endêmica), 17 variedades (nenhuma endêmica)
***Desmodesmus abundans* (Kirchner) E.Hegewald**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus armatus* (Chodat) E.Hegewald**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Desmodesmus armatus* var. *bicaudatus* (Guglielm.) E.Hegewald**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus armatus* var. *boglariensis* Hortob.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus brasiliensis* (Bohlin) E.Hegewald**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus communis* (E.Hegewald) E.Hegewald**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmodesmus communis* (E.Hegewald) E.Hegewald var. *communis
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus denticulatus* (Lagerh.) An et al.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmodesmus denticulatus* (Lagerh.) An et al. var. *denticulatus
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus denticulatus* var. *linearis* (Hansg.) E.Hegewald**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Desmodesmus dispar* (Bréb.) E.Hegewald**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmodesmus dispar* (Bréb.) E.Hegewald var. *dispar
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus hystrix* (Lagerh.) E.Hegewald**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmodesmus hystrix* (Lagerh.) E.Hegewald var. *hystrix
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus intermedius* (Chodat) E.Hegewald**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Desmodesmus intermedius* var. *acutispinus* (Roll) E.Hegewald**
Referência: Moresco, C. & Bueno, N.C. 2007. Acta Sci. Biol. Sci. 29(3): 289-296.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
Desmodesmus intermedius* (Chodat) E.Hegewald var. *intermedius
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus komarekii* (E.Hegewald) E.Hegewald**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmodesmus komarekii* (E.Hegewald) E.Hegewald var. *komarekii
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus lefevrei* (Deflandre) An et al.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Desmodesmus lefevrei* var. *muzzanensis* (Hub.-Pest.) Friedl & E.Hegewald**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental
***Desmodesmus maximus* (West & G.S.West) E.Hegewald**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental
***Desmodesmus opoliensis* (Richter) E.Hegewald**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Desmodesmus opoliensis* var. *alatus* (Dedus.) E.Hegewald**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus opoliensis* var. *carinatus* (Lemmerm.) E.Hegewald**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus opoliensis* var. *mononensis* (Chodat) E.Hegewald**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
Desmodesmus opoliensis* (Richter) E.Hegewald var. *opoliensis
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Desmodesmus pannonicus* (Hortob.) E.Hegewald**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmodesmus pannonicus* (Hortob.) E.Hegewald var. *pannonicus
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Desmodesmus perforatus* (Lemmerm.) E.Hegewald**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus protuberans* (F.E.Fritsch & M.F.Rich) E.Hegewald**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Desmodesmus serratus* (Corda) An et al.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Desmodesmus spinosus* (Chodat) E.Hegewald**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmodesmus spinosus* (Chodat) E.Hegewald var. *spinosus
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Diacanthos Korshikov

1 espécie (não endêmica)
***Diacanthos belenophorus* Korshikov**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Dicellula Swirenko

1 espécie (não endêmica)
***Dicellula geminata* (Printz) Korshikov**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

Dichotomococcus Korshikov
1 espécie (não endêmica)
***Dichotomococcus curvatus* Korshikov**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Dicloster Jao et al.
1 espécie (não endêmica)
***Dicloster acuatus* Jao et al.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Dictyosphaerium Nägeli
5 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Dictyosphaerium chlorelloides* (Naumann) Komárek & Perman**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Dictyosphaerium ehrenbergianum* Nägeli**
Referência: Keppeler, E.C. et al. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(4): 687-691.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (MA, PB), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica; epicontinental
***Dictyosphaerium elegans* H.Bachmann**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Dictyosphaerium pulchellum* H.C.Wood**
Distribuição: nativa; não endêmica
Dictyosphaerium pulchellum* H.C.Wood var. *pulchellum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Dictyosphaerium tetrachotomum* Printz**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Dictyosphaerium tetrachotomum* var. *fallax* Komárek**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Didymocystis Korshikov
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Didymocystis bicellularis* (Chodat) Komárek**
Referência: Vercelino, I. S. & Bicudo, D.C. 2006. Rev. bras. bot. 29(3): 363-377.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Domínio desconhecido; epicontinental
***Didymocystis fina* Komárek**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Didymocystis inermis* (Fott) Fott**
Referência: Delazari-Barroso, A. et al. 2007. Hoehnea 34(2): 211-229.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES); Mata Atlântica; epicontinental
***Didymocystis lineata* Korshikov**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Didymocystis planctonica* Korshikov**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Dimorphococcus A.Braun
1 espécie (não endêmica)
***Dimorphococcus lunatus* A.Braun**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Dispora Printz
1 espécie (não endêmica)
***Dispora globosa* C.E.M.Bicudo & R.M.T.Bicudo**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Echinosphaeridium Lemmerm.
1 espécie (não endêmica)
***Echinosphaeridium nordstedtii* Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Eudorina Ehrenb.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Eudorina elegans* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), Nordeste (MA, PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Eudorina illinoisensis* (Kof.) Pascher**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Eudorina unicocca* G.M.Sm.**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

Eutetramorus Walton
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Eutetramorus fottii* (Hindák) Komárek**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Eutetramorus planctonicus* (Korshikov) Bourr.**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Eutetramorus tetrasporus* Komárek**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental

Franceia Lemmerm.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Franceia amphitricha* (Lagerh.) E.Hegewald**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Franceia echidina* (Bohlin) Bourr.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Franceia javanica* (C.Bernard) Hortob.**
Referência: Silva, L.H.S. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(2): 281-303.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Glaucocystis Itzigs. *in* Rabenh.
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Glaucocystis nostochinearum* Itzigs.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Glaucocystis nostochinearum* Itzigs. var. *nostochinearum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Gloeocystis Nägeli
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Gloeocystis ampla* (Kütz.) Lagerh.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Gloeocystis gigas* (Kütz.) Lager.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Gloeocystis vesiculosa* Nägeli**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Gloeomonas G.A.Klebs
2 espécies (1 endêmica)
***Gloeomonas mamillosa* Menezes**
Referência: Menezes, M. 1996. Arch. Protistenk. 147: 101-105.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Gloeomonas tubulosa* (Pasher & Jahoda) Ettl**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Golenkinia Chodat
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Golenkinia paucispina* West & G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Golenkinia radiata* Chodat**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Gonium O.F.Müller
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Gonium formosum* Pascher**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Gonium multicoccum* Pocock**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Gonium pectorale* O.F.Müller**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Granulocystopsis Hindák
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Granulocystopsis coronata* (Lemmerm.) Hindák**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental
***Granulocystopsis pseudocoronata* (Korshikov) Hindák**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental

Haematococcus C.Agardh *emend.* Flotow
3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Haematococcus capensis* Pocock**
Distribuição: nativa; não endêmica
Haematococcus capensis* Pocock var. *capensis
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Haematococcus droebakensis* Wollenweider**
Distribuição: nativa; não endêmica
Haematococcus droebakensis* Wollenweider var. *droebakensis
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Haematococcus pluvialis* Flotow *emend.* Wille**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Hydrodictyon Röth
1 espécie (não endêmica)
***Hydrodictyon reticulatum* (L.) Lagerh.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental

Kirchneriella Schmidle
8 espécies (nenhuma endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)
***Kirchneriella aperta* Teiling**
Distribuição: nativa; não endêmica
Kirchneriella aperta* Teiling var. *aperta
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Kirchneriella contorta* (Schmidle) Bohlin**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Kirchneriella contorta* var. *elongata* (G.M.Sm.) Komárek**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Kirchneriella dianae* (Bohlin) Comas**
Distribuição: nativa; não endêmica
Kirchneriella dianae* (Bohlin) Comas var. *dianae
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Kirchneriella dianae* var. *major* (Korsikov) Comas**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Kirchneriella irregularis* (G.M.Sm.) Korshikov**
Distribuição: nativa; não endêmica
Kirchneriella irregularis* (G.M. Smith) Korshikov var. *irregularis
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Kirchneriella lunaris* (Kirchner) Möbius**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Kirchneriella microscopica* Nygaard**
Referência: Silva, L.H.S. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(2): 281-303.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Kirchneriella obesa* (West & G.S.West) Schmidle**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Kirchneriella roselata* Hindák**
Referência: Silva, L.H.S. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(2): 281-303.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Komarekia Fott
1 espécie (não endêmica)
***Komarekia lauterbournii* (Schmidle) Fott**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Lagerheimia Chodat
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Lagerheimia ciliata* (Lagerh.) Chodat**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Lagerheimia citriformis* (Snow) Collins**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Lagerheimia longiseta* (Lemmerm.) Printz**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Lagerheimia subsalsa* Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Lagerheimia tetraedriensis* Roll**
Referência: Silva, L.H.S. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(2): 281-303.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Lobomonas P.A.Dang.
1 espécie (não endêmica)
***Lobomonas tubulata* Menezes**
Referência: Menezes, M. 1996. Arch. Protistenk. 147: 101-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

Micractinium Fres.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Micractinium bornhemiense* (W.Conrad) Korshikov**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Micractinium crassisetum* Hortob.**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Micractinium parvum* Hindák**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Micractinium pusillum* Fres.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Monactinus Corda
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Monactinus simplex* (Meyen) Corda**
Distribuição: nativa; não endêmica
Monactinus simplex* (Meyen) Corda var. *simplex
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Monoraphidium Komárk.-Legn.
14 espécies (nenhuma endêmica)
***Monoraphidium arcuatum* (Korshikov) Hindák**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Monoraphidium caribeum* Hindák**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Monoraphidium circinale* (Nygaard) Nygaard**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Monoraphidium contortum* (Thur.) Komárk.-Legn.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Monoraphidium convolutum* (Corda) Komárk.-Legn.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Monoraphidium griffithii* (Berk.) Komárk.-Legn.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN, PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Monoraphidium irregulare* (G.M.Sm.) Komárk.-Legn.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Monoraphidium komarkovae* Nygaard**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Monoraphidium minutum* (Nägeli) Komárkova**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Monoraphidium mirabile* (West & G.S.West) Pankow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Monoraphidium nanum* (Ettl) Hindák**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Monoraphidium pusillum* (Printz) Komárk.-Legn.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Monoraphidium saxatile* Komárk.-Legn.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Monoraphidium tortile* (W.West & G.S.West) Komárk.-Legn.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

Neochloris Starr
1 espécie (não endêmica)
***Neochloris pseudostigmata* H.W.Bisch. & Bold**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Nephrochlamys Korshikov
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Nephrochlamys allanthoidea* Korshikov**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Nephrochlamys danica* Komárek**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Nephrochlamys subsolitaria* (West) Korshikov**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Nephrochlamys willeana* (Printz) Korshikov**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Nephrocytium Nägeli
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Nephrocytium agardhianum* Nägeli**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Domínio desconhecido; epicontinental
***Nephrocytium perseverans* Printz**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Nephrocytium schilleri* (Kammerer) Comas**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Oocystis A.Braun
11 espécies (nenhuma endêmica)
***Oocystis borgei* Snow**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Oocystis elliptica* West & G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Oocystis lacustris* Chodat**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), Nordeste (RN, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Oocystis marssonii* Lemmerm.**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Oocystis naegelii* A.Braun**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental
***Oocystis nephrocystioides* Fott & Cado**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Oocystis pusilla* Hansgirg**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Oocystis rhomboidea* Fott**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ); Cerrado; epicontinental
***Oocystis solitaria* Witt.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Oocystis submarina* Lagerh.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Oocystis tainoensis* Komárek**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Pachycladella P.C.Silva
1 espécie (não endêmica)
***Pachycladella umbrina* (G.M.Sm.) P.C.Silva**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Pandorina Bory
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pandorina morum* (O.F.Müller) Bory**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Pandorina smithii* Chodat**
Referência: Bicudo, C.E.M. 2004. Rev. bras. bot. 27(1): 85-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Parapediastrum E.Hegewald
1 espécie (não endêmica)
***Parapediastrum biradiatum* (Meyen) E.Hegewald**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Pediastrum Meyen
4 espécies (nenhuma endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)
***Pediastrum angulosum* (Ehrenb.) Menegh.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pediastrum angulosum* (Ehrenb.) Menegh. var. *angulosum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pediastrum boryanum* (Turpin) Menegh.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pediastrum boryanum* (Turpin) Menegh. var. *boryanum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pediastrum duplex* Meyen**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pediastrum duplex* Meyen var. *duplex
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Pediastrum duplex* var. *punctatum* (Willi Krieg.) Parra**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Pediastrum tetras* (Ehrenb.) Ralfs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Pediastrum tetras* (Ehrenb.) Ralfs var. *tetras
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Phacotus Perty
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phacotus lenticularis* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Phacotus minusculus* Bourr.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Pleodorina Shaw
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pleodorina californica* Shaw**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pleodorina sphaerica* Iyengar**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

Polyedriopsis Schmidle
1 espécie (não endêmica)
***Polyedriopsis spinulosa* (Schmidle) Schmidle**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Pteromonas Seligo
3 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Pteromonas aequiciliata* (Gickelh.) Bourr.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pteromonas angulosa* Lemmerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pteromonas angulosa* var. *obtusa* Skvortzov**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Pteromonas pseudoangulosa* L. Peterfi**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Quadricoccus Fott
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Quadricoccus ellipticus* Hortob.**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental
***Quadricoccus laevis* Fott**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental

Quadrigula Printz
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Quadrigula jolyi* C.E.M.Bicudo & R.M.T.Bicudo**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Quadrigula pfitzeri* (Schröd.) G.M.Sm.**
Referência: Silva, L.H.S. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(2): 281-303.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Radiococcus Schmidle
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Radiococcus nimbatus* (De Wild.) Schmidle**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Radiococcus planctonicus* A.Lund**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental

Raphidocelis Hindák
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Raphidocelis contorta* (Schmidle) Marvan et al.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Raphidocelis contorta* (Schmidle) Marvan et al. var. *contorta
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental
***Raphidocelis subcaptata* (Korshikov) Marvan et al.**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental

Scenedesmus Meyen
25 espécies (nenhuma endêmica), 19 variedades (nenhuma endêmica)
***Scenedesmus acuminatus* (Lagerh.) Chodat**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Scenedesmus acuminatus* var. *elongatus* G.M.Sm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus acutus* Meyen**
Distribuição: nativa; não endêmica
Scenedesmus acutus* Meyen var. *acutus
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus acutus* var. *alternans* Hortob.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus arcuatus* (Lemmerm.) Lemmerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Scenedesmus arcuatus* var. *platydiscus* G.M.Sm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus asymmetricus* (Schröd.) Chodat**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Scenedesmus asymmetricus* var. *multispinosus* Hortob.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus baculiformis* Chodat**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus bijugus* (Turpin) Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Scenedesmus bijugus* (Turpin) Kütz. var. *bijugus
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus bijugus* var. *disciformis* (Chodat) Leite**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus caudato-aculeolatus* Chodat**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus dimorphus* (Turpin) Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Scenedesmus ecornis* (Ehrenb.) Chodat**
Referência: Moresco, C. & Bueno, N.C. 2007. Acta Sci. Biol. Sci. 29(3): 289-296.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Scenedesmus graevenitzii* (C.Bernard) Kof.**
Referência: Moresco, C. & Bueno, N.C. 2007. Acta Sci. Biol. Sci. 29(3): 289-296.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Scenedesmus granulatus* West & G.S.West**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus gutwinskii* Chodat**
Distribuição: nativa; não endêmica
Scenedesmus gutwinskii* Chodat var. *gutwinskii
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus gutwinskii* var. *heterospina* Bulnh.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Scenedesmus heteracanthus* Gonzalez-Guerrero**
Distribuição: nativa; não endêmica
Scenedesmus heteracanthus* Gonzalez-Guerrero var. *heteracanthus
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus incrassatulus* Bohlin**
Distribuição: nativa; não endêmica
Scenedesmus incrassatulus* var. *incrassulatus
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus indicus* Philipose**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus javanensis* Chodat**
Distribuição: nativa; não endêmica
Scenedesmus javanensis* Chodat var. *javanensis
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus magnus* Meyen**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Scenedesmus obliquus* (Turpin) Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Scenedesmus obliquus* (Turpin) Kütz. var. *obliquus
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus obtusus* Meyen**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus ovalternus* Chodat**
Distribuição: nativa; não endêmica
Scenedesmus ovalternus* Chodat var. *ovalternus
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus parisiensis* Chodat**
Referência: Moresco, C. & Bueno, N.C. 2007. Acta Sci. Biol. Sci. 29(3): 289-296.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus regularis* Swirenko**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus securiformis* Playfair**
Referência: Moresco, C. & Bueno, N.C. 2007. Acta Sci. Biol. Sci. 29(3): 289-296.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus tetradesmiformis* (Wołłosz.) Chodat**
Referência: Moresco, C. & Bueno, N.C. 2007. Acta Sci. Biol. Sci. 29(3): 289-296.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Scenedesmus verrucosus* Roll**
Distribuição: nativa; não endêmica
Scenedesmus verrucosus* Roll var. *verrucosus
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Schroederia Lemmerm.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Schroederia setigera* (Schröd.) Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Schroederia spiralis* (Printz) Korsikov**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Scotiellopsis Vinatzer

1 espécie (não endêmica)
***Scotiellopsis terrestris* (Reisigl) Puncoch. & Kalina**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Selenastrum Reinsch
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Selenastrum gracile* Reinsch**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Selenastrum rinoi* Komárek & Comas**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Selenochloris Pascher
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Selenochloris lobata* (J.Schiller) Pascher**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Selenochloris stigmatophora* (Korsikóv) Ettl**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Siderocelis (Naumann) Fott
1 espécie (não endêmica)
***Siderocelis ornata* (Fott) Fott**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Sorastrum Kütz.
2 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Sorastrum americanum* (Bohlin) Schmidle**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sorastrum americanum* (Bohlin) Schmidle var. *americanum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Sorastrum spinulosum* Nägeli**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sorastrum spinulosum* Nägeli var. *spinulosum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Sphaerocystis Chodat
1 espécie (não endêmica)
***Sphaerocystis schroeterii* Chodat**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

Spondylomorum Ehrenb.
1 espécie (não endêmica)
***Spondylomorum quaternariam* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Tetradesmus Chodat
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Tetradesmus lunatus* Korshikov**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetradesmus wisconsinensis* G.M.Sm.**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental

Tetraedron Kütz.
14 espécies (nenhuma endêmica), 7 variedades (nenhuma endêmica)
***Tetraedron caudatum* (Corda) Hansg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tetraedron caudatum* (Corda) Hansg. var. *caudatum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedron glabrum* (Roll) Ahlstrom & Tiffany**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedron gracile* (Reinsch) Hansg.**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedron hemisphaericum* Skuja**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedron incus* (Teiling) G.M.Sm.**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedron lobulatum* (Nägeli) Hansg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tetraedron lobulatum* var. *triangulare* Playfair**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedron minimum* (A.Braun) Hansg.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Tetraedron minimum* (A.Braun) Hansg. var. *minimum
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedron minimum* var. *scrobiculatum* Lagerh.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedron planctonicum* G.M.Sm.**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido; epicontinental
***Tetraedron quadrilobatum* G.M.Sm.**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedron regulare* Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tetraedron regulare* var. *granulata* Prescott**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
Tetraedron regulare* Kützing var. *regulare
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedron triangulare* Korshikov**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedron trigonum* (Nägeli) Hansg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tetraedron trigonum* (Nägeli) Hansg. var. *trigonum
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Tetraedron trilobulatum* (Reinsch) Hansg.**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedron tumidulum* (Reinsch) Hansg.**
Referência: Fernandes, S. & Bicudo, C.E.M. 2009. Hoehnea 36(1): 173-191.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Tetrallantos Teiling

1 espécie (não endêmica)
***Tetrallantos lagerheimii* Teiling**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Tetrastrum Chodat

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Tetrastrum elegans* Playfair**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Tetrastrum glabrum* (Roll) Ahlstrom & Tiffany**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Tetrastrum heteracanthum* (Nordst.) Chodat**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetrastrum komarekii* Hindák**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Tetrastrum staurogeniaeforme* (Schröd.) Lemmerm.**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Tetrastrum triangulare* (Chodat) Komárek**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Thorakochloris Pascher

1 espécie (não endêmica)
***Thorakochloris planktonica* Fott**
Referência: Nogueira, I.S. & Oliveira, J.E. 2009. Iheringia, Bot. 64(2): 123-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Thorakomonas Korshikov

1 espécie (não endêmica)
***Thorakomonas phacotoides* G.M.Sm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Treubaria C.Bernard

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Treubaria crassispina* G.M.Sm.**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Treubaria euryacantha* (Schmidle) Korshikov**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Treubaria schimidlei* (Schröd.) Fott & Kovacik**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Treubaria triappendiculata* C.Bernard**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Vitreochlamys Batko
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Vitreochlamys cylindrica* (Skuja) Maidana & Vigna**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Vitreochlamys fluviatilis* (Stein) Batko**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Vitreochlamys lefevrei* (Bourr.) Menezes & C.E.M.Bicudo**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

Volvox (L.) Ehrenb.
1 espécie (não endêmica)
***Volvox aureus* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Volvulina Playfair
1 espécie (não endêmica)
***Volvulina steinii* Playfair**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

Westella De Wildeman
1 espécie (não endêmica)
***Westella botryoides* (West) De-Wildemann**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

CHRYSOPHYCEAE
Mariângela Menezes
17 gêneros, 43 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Bitrichia Wołłosz.
1 espécie (1 endêmica)
***Bitrichia amazonica* Menezes & Huszar**
Referência: Menezes, M. & Huszar, V.L.M. 1997. Algol. Stud. 85: 13-22.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia; epicontinental

Chromulina Cienk.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Chromulina elegans* Doflein**
Referência: Bicudo, C.E.M. et al. 2003. Hoehnea 30: 127-153.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Chromulina pygmaea* Nygaard**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Chromulina truncata* W.Conrad**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Chrysococcus G.A.Klebs
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Chrysococcus biporus* Skuja**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Chrysococcus punctiformis* Pascher**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Chrysococcus radians* W.Conrad**
Referência: Bicudo, C.E.M. et al. 2003. Hoehnea 30: 127-153.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Chrysococcus rufescens* G.A.Klebs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Chrysopyxis Stein
1 espécie (não endêmica)
***Chrysopyxis colligera* Scherffel**
Referência: Bicudo, C.E.M. et al. 2003. Hoehnea 30: 127-153.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Cyclonexis Stokes
1 espécie (não endêmica)
***Cyclonexis erinus* Jane**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Derepyxis Stokes
1 espécie (não endêmica)
***Derepyxis amphora* Stokes**
Referência: Bicudo, C.E.M. et al. 2003. Hoehnea 30: 127-153.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Dinobryon Ehrenb.
6 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Dinobryon bavaricum* Imhof**
Referência: Granado, D.C. et al. 2009. Hoehnea 36(1): 113-129.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Dinobryon belgica* Meunier**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Dinobryon cylindricum* Imhof *ex* Ahlstron**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido; epicontinental
***Dinobryon divergens* Imhof**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
***Dinobryon divergens* var. *schauinslandii* (Lemmerm.) Brunnth.**
Referência: Tucci, A. et al. 2006. Hoehnea 33(2): 147-175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Dinobryon elegantissimum* (Korshikov) Bourr.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Dinobryon sertularia* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Dinobryon sertularia* Ehrenberg var. *sertularia
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Kephyrion Pascher
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Kephyrion ovale* (Lackey) Hub.-Pest.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Kephyrion rubri-claustri* W.Conrad**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Lagynion Pascher
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Lagynion ampullaceum* (Stokes) Pascher**
Referência: Bicudo, C.E.M. et al. 2003. Hoehnea 30: 127-153.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Lagynion macrotrachellum* (Stokes) Pascher**
Referência: Bicudo, C.E.M. et al. 2003. Hoehnea 30: 127-153.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Monosiga Kent
2 espécies (1 endêmica)
***Monosiga brevipes* Saville-Kent**
Referência: Bicudo, C.E.M. et al. 2003. Hoehnea 30: 127-153.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Monosiga skvortzovii* D.C.Bicudo**
Referência: Bicudo. D.C. 1984. Rickia 10: 51.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Ochromonas Vysostskii
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Ochromonas danica* E.G.Pringsh.**
Referência: Bicudo, C.E.M. et al. 2003. Hoehnea 30: 127-153.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Ochromonas mutabilis* G.A.Klebs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Ochromonas ovalis* Doflein**
Referência: Bicudo, C.E.M. et al. 2003. Hoehnea 30: 127-153.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Paraphysomonas De Saedeleer
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Paraphysomonas butcheri* Pennick Clarke**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Paraphysomonas caelifrica* Preisig & Hibberd**
Referência: Wujek, D.E. & Bicudo, C.E.M. 1993. Nova Hedwigia 56:247-257.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Paraphysomonas corynephora* Preisig & Hibberd**
Referência: Franceschini, I.M. & Kristiansen, J. 2004. Algol. Stud. 111: 63-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental
***Paraphysomonas foraminifera* Lucas**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Paraphysomonas homolepis* Preisig & Hibberd**
Referência: Franceschini, I.M. & Kristiansen, J. 2004. Algol. Stud. 111: 63-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental
***Paraphysomonas imperforata* Lucas**
Referência: Wujek, D.E. & Bicudo, C.E.M. 1993. Nova Hedwigia 56:247-257.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental, marinho
***Paraphysomonas vestita* (Stokes) De Saedeleer**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih. Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental, marinho

Pseudokephyrion Pascher
1 espécie (não endêmica)
***Pseudokephyrion tatricum* (Juris) Starmach**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008. Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental

Rhizochrysis Pascher
1 espécie (não endêmica)
***Rhizochrysis schefferlii* Pascher**
Referência: Giani, A. et al. 1999. Rev. bras. bot. 22(2): 107-116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica; epicontinental

Salpingoeca Clark
2 espécies (1 endêmica)
***Salpingoeca caudiculata* D.C. Bicudo & C.E.M. Bicudo**
Referência: Bicudo, C.E.M. et al. 2003. Hoehnea 30: 127-153.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Salpingoeca clarkii* Stein**
Referência: Bicudo, C.E.M. et al. 2003. Hoehnea 30: 127-153.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Sphaleromantis Pascher
1 espécie (não endêmica)
***Sphaleromantis ochraceae* Pascher**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Spiniferomonas E.Takah. *emend*. Nicholls
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Spiniferomonas abei* E.Takah.**
Referência: Wujek, D.E. & Bicudo, C.E.M. 1993. Nova Hedwigia 56:247-257.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Spiniferomonas annulata* (Kristiansen & Tong) Wujek & C.E.M. Bicudo**
Referência: Wujek, D.E. & Bicudo, C.E.M. 1993. Nova Hedwigia 56:247-257.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Spiniferomonas bourrellyi* E. Takah. *emend*. Nicholls**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih. Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Spiniferomonas coronacircumspina* (Wujek & Kristiansen) Nicholls**
Referência: Wujek, D.E. & Bicudo, C.E.M. 1993. Nova Hedwigia 56:247-257.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Spiniferomonas trioralis* E.Takah. *emend*. Nicholls**
Referência: Franceschini, I.M. & Kristiansen, J. 2004. Algol. Stud. 111: 63-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental

CRYPTOPHYCEAE
Mariângela Menezes, Carlos Eduardo de Mattos Bicudo
9 gêneros, 35 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Chilomonas Ehrenb.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Chilomonas cryptomonadoides* Skuja**
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae. 144 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Chilomonas insignis* (Skuja) Javorn.**
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae. 144 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Chilomonas oblonga* Pascher**
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae. 144 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Chilomonas paramaecium* Ehrenb.**
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae. 144 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Chroomonas Hansg.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Chroomonas coerulea* (Geitler) Skuja**
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae. 144 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Chroomonas nordstedtii* Hansg.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Cryptomonas Ehrenb.

18 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Cryptomonas anas* Javorn.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas brasiliensis* A.A.J.Castro et al.**
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae 144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Cryptomonas claviformis* C.E.M.Bicudo**
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae 144.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas curvata* Ehrenb. *emend*. Penard**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas cylindrica* Ehrenb.**
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae 144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas erosa* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Cryptomonas erosa* Ehrenb. var. *erosa
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae 144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas gracilis* Skuja**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas lobata* Korshikov**
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae 144.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas marssonii* Skuja**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas obovata* Skuja**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas ovata* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Cryptomonas ozolini* Skuja**
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae. 144 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas parapyrenoidifera* Skuja**
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae. 144 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas phaseolus* Skuja**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas platyuris* Skuja**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas pyrenoidifera* Geitler**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas tenuis* Pascher**
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae. 144 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

***Cryptomonas tetrapyrenoidosa* Skuja**
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae. 144 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Hemiselmis Parke

1 espécie (não endêmica)

***Hemiselmis simplex* Butcher**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Komma Hill

1 espécie (não endêmica)

***Komma caudata* (Geitler) Hill**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

Protocryptomonas Skvortzov *ex* C.E.M.Bicudo & Picelli-Vicentin

1 espécie (não endêmica)

***Protocryptomonas ellipsoidea* Skvortzov *ex* C.E.M.Bicudo & Picelli-Vicentin**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Pseudocryptomonas C.E.M.Bicudo & Tell
3 espécies (2 endêmicas)
***Pseudocryptomonas americana* C.E.M.Bicudo & Tell**
Referência: Bicudo, C.E.M. & Tell, G. 1988. Nova Hedwigia 46: 407.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Pseudocryptomonas parrae* C.E.M.Bicudo & Tell**
Referência: Bicudo, C.E.M. & Tell, G. 1988. Nova Hedwigia 46: 407.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Pseudocryptomonas subcylindrica* C.E.M.Bicudo & Tell**
Referência: Bicudo, C.E.M. & Tell, G. 1988. Nova Hedwigia 46: 407.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Rhodomonas Karsten
4 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Rhodomonas lacustris* Pascher & Rutner**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rhodomonas lacustris* Pascher & Rutner var. *lacustris
Referência: Castro, A.A.J. & Bicudo, C.E.M. 2007. Flora Ficológica do Estado de São Paulo 11: Cryptophyceae. 144 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Rhodomonas minuta* Skuja**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Rhodomonas salina* (Wislouch) Hill & Wetherbee**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); marinho
***Rhodomonas stigmatica* (Wislouch) Hill**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Teleaulax Hill
1 espécie (não endêmica)
***Teleaulax acuta* (Butcher) Hill**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

CYANOPHYCEAE
Vera Regina Werner
89 gêneros, 208 espécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

Ammatoidea W.West & G.S.West
1 espécie (não endêmica)
***Ammatoidea murmanica* Petrov**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 371463)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Anabaena Bory *ex* Bornet & Flahault
8 espécies (1 endêmica)
***Anabaena circinalis* Rabenh. *ex* Bornet & Flahault**
Referência: Werner, V.R. & Laughinghouse IV, H.D. 2009. Nova Hedwigia 89(1-2): 17-47.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PB), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Anabaena crassa* (Lemmerm.) Komárk.-Legn. & Cronberg**
Voucher: s.col. s.n. (HAS 15740, HAS 106591, HAS 107065)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Anabaena flos-aquae* Bréb. *ex* Bornet & Flahault**
Voucher: s.col. s.n. (HAS 106667)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Anabaena mendotae* Trelease**
Voucher: s.col. s.n. (HAS 104656)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Anabaena mucosa* Komárk.-Legn. & Eloranta**
Voucher: Werner, V.R. s.n. (HAS 7191, HAS 7194)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Anabaena nygaardii* Cronberg & Komárek**
Voucher: s.col. s.n. (HAS 106305)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Anabaena oumiana* M.Watan.**
Voucher: s.col. s.n. (HAS 106527, HAS 106666, HAS 106990)
Distribuição: subespontânea; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Anabaena spiroides* Klebahn**
Voucher: s.col. s.n. (HAS 26845, HAS 106195, HAS 106987)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Anabaenopsis (Wołłosz.) V.V.Miller
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Anabaenopsis cunningtonii* Taylor**
Voucher: Santos, K.R.S. s.n. (SP 390914)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal; epicontinental
***Anabaenopsis elenkini* Miller**
Voucher: Santos, K.R.S. s.n. (SP 390907)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

Aphanizomenon Morren *ex* Bornet & Flahault
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Aphanizomenon gracile* Lemmerm.**
Voucher: Chomenko, L. s.n. (HAS 6092, 6094)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aphanizomenon manguinii* Bourr.**
Referência: Komárek, J. et al. 2001. Algol. Stud. 103: 9-29.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga; epicontinental

Aphanocapsa Nägeli
10 espécies (nenhuma endêmica)
***Aphanocapsa conferta* (W.West & G.S.West) Komárk.-Legn. & Cronberg**
Voucher: Werner, V.R. s.n. (HAS 34680)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aphanocapsa cumulus* Komárek & Cronberg**
Referência: Komárek, J. et al. 2001. Algol. Stud. 103: 9-29.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga; epicontinental
***Aphanocapsa delicatissima* W.West & G.S.West**
Voucher: Komárek, J. s.n. (SP 355896)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aphanocapsa elachista* W.West & G.S.West**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355902)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aphanocapsa holsatica* (Lemmerm.) Cronberg & Komárek**
Voucher: Carvalho, M.C. s.n. (SP 355903)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aphanocapsa incerta* (Lemmerm.) Cronberg & Komárek**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355905)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aphanocapsa koordersi* Ström**
Voucher: Carvalho, M.C. s.n. (SP 355906)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aphanocapsa litoralis* (Hansg.) Komárek & Anagn.**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 365637)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Aphanocapsa nubilum* Komárek & Kling**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355910)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Aphanocapsa reinboldii* (Richter) Komárek & Anagn.**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 371448)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Aphanothece Nägeli
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Aphanothece comasii* Komárk.-Legn. & Tavera**
Voucher: Werner, V.R. s.n. (HAS 7209)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aphanothece conglomerata* Rich**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355959)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aphanothece minutissima* Komárk.-Legn. & Cronberg**
Voucher: Werner, V.R. s.n. (HAS 7179)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aphanothece smithii* Komárk.-Legn. & Cronberg**
Voucher: Carvalho, M.C. s.n. (SP 365631)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Aphanothece variabilis* (J.Schiller) Komárek**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 365637)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental, marinho
***Aphanothece zulanirae* Werner & Sant'Anna**
Voucher: Rosa, Z.M. s.n. (HAS 26042)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sul (RS); Pampa; epicontinental

Arthrospira Stizenb. *ex* Gomont
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Arthrospira platensis* (Nordst.) Gomont**
Voucher: Santos, K.R.S. s.n. (SP 390917)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal; epicontinental
***Arthrospira santannae* Komárek & Komárk.-Legn.**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355964)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Arthrospira skujae* Magrin et al.**
Voucher: Magrin, A.G.E. s.n. (SP 294687)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RO), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

Asterocapsa Chu
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Asterocapsa divina* Komárek**
Voucher: Faccini, A. s.n. (SP 371291)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Asterocapsa submersa* M.T.P. Azevedo et al.**
Voucher: s.col. s.n. (SP 355747)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Bacularia Borzi
1 espécie (não endêmica)
***Bacularia gracilis* Komárek**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355900)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado; epicontinental

Blennothrix Kütz. *ex* Anagn. & Komárek
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Blennothrix glutinosa* (Gomont *ex* Gomont) Anagn. & Komárek**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 365641)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Blennothrix komarekii* Branco & Montejano**
Voucher: Vis-Chiason, M. s.n. (SJRP 28233)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Blennothrix lyngbyacea* (Gomont) Anagn. & Komárek**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 365641)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ); marinho

Borzia Cohn *ex* Gomont
1 espécie (não endêmica)
***Borzia trilocularis* Cohn *ex* Gomont**
Referência: Bicudo, C.E.M. 1985. Algol. Stud. 41: 489-493.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Brachytrichia Zanardini *ex* Bornet & Flahault
1 espécie (não endêmica)
***Brachytrichia quoyi* Bornet & Flahault**
Voucher: Horta, P. s.n. (SP 365643)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental, marinho

Brasilonema Fiore et al.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Brasilonema bromeliae* Fiore et al.**
Voucher: s.col. s.n. (BRNM 1332)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Brasilonema octagenarum* Aguiar et al.**
Voucher: s.col. s.n. (BRNM HY 1416)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Sudeste (MG); Mata Atlântica; epicontinental

Calothrix C.Agardh *ex* Bornet & Flahault
1 espécie (não endêmica)
***Calothrix crustaceae* Thur. *ex* Bornet & Flahault**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 365641)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ); marinho

Camptylonemopsis Desikachary
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Camptylonemopsis epibryos* Komárek**
Referência: Komárek, J. 2003. Preslia 75: 223-232.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Camptylonemopsis sennae* Komárek**
Referência: Komárek, J. 2003. Preslia 75: 223-232.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Capsosira Bornet & Flahault
1 espécie (não endêmica)
***Capsosira brasiliensis* Sant'Anna & S.M.F.Silva**
Voucher: Necchi-Júnior, O. s.n. (SP 187181)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Chamaecalyx Komárek & Anagn.
1 espécie (não endêmica)
***Chamaecalyx leibleiniae* (Reinsch) Komárek & Anagn.**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 371451, SP 371454)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); marinho

Chroococcidiopsis Geitler
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Chroococcidiopsis cubana* Komárek & Hindák**
Voucher: s.col. s.n. (SP 238947)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental, marinho
***Chroococcidiopsis fissurarum* (Erceg.) Komárek & Anagn.**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 371427)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); marinho

Chroococcus Nägeli
10 espécies (nenhuma endêmica)
***Chroococcus dispersus* (Keissl.) Lemmerm.**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355897)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Chroococcus distans* (G.M.Sm.) Komárk.-Legn. & Cronberg**
Voucher: Azevedo, M.T.P. s.n. (SP 355898)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Chroococcus limneticus* Lemmerm.**
Voucher: Carvalho, M.C. s.n. (SP 355906)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Chroococcus microscopicus* Komárk.-Legn. & Cronberg**
Voucher: Cardoso, L.S. s.n. (HAS 104343)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Chroococcus minimus* (Keissl.) Lemmerm.**
Voucher: Cardoso, L.S. s.n. (HAS 104352)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Chroococcus minor* (Kütz.) Nägeli**
Voucher: Werner, V.R. s.n. (HAS 7210)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA,
AM), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Chroococcus minutus* (Kütz.) Nägeli**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 336725)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Chroococcus mipitanensis* (Wołłosz.) Geitler**
Voucher: Rodrigues, S.C. s.n. (HAS 26845)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Chroococcus nanoplankticus* M.T.P. Azevedo et al.**
Voucher: s.col. s.n. (SP 355746)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Chroococcus turgidus* (Kütz.) Nägeli**
Voucher: Kremer, L.M. s.n. (HAS 6109)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Coelomoron Buell
1 espécie (não endêmica)
***Coelomoron tropicale* Senna et al.**
Voucher: Peres, A.C. s.n. (SP 294686)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

Coelosphaerium Nägeli
1 espécie (não endêmica)
***Coelosphaerium evidenter-marginatum* M.T.P. Azevedo & Sant'Anna**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355908)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Cuspidothrix Rajan. et al.
1 espécie (não endêmica)
***Cuspidothrix tropicalis* (Horecká & Komárek) Rajan. et al.**
Voucher: Gemelgo, M.C.P. s.n. (SP 365616)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Cyanoaggregatum Werner et al.
1 espécie (não endêmica)
***Cyanoaggregatum brasiliense* Werner et al.**
Voucher: Werner, V.R. s.n. (HAS 6897)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Cyanoarbor Wang
1 espécie (não endêmica)
***Cyanoarbor violascens* Branco et al.**
Voucher: s.col. s.n. (SP 355736)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (SP); Cerrado; epicontinental

Cyanodermatium Geitler
1 espécie (não endêmica)
***Cyanodermatium gonzaliensis* H.Leon-Tejera et al.**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 365641)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Cyanodictyon Pascher
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cyanodictyon iac* Cronberg & Komárek**
Voucher: Carvalho, M.C. s.n. (SP 365631)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido; epicontinental
***Cyanodictyon tropicalis* Senna et al.**
Voucher: Delazari, A. s.n. (SP 294970)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (ES); Mata Atlântica; epicontinental

Cyanostylon Geitler
1 espécie (não endêmica)
***Cyanostylon gelatinosus* M.T.P. Azevedo & Sant'Anna**
Referência: Azevedo, M.T.P. & Sant'Anna, C.L. 1994. Algol. Stud. 75: 75-78.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (SP); marinho

Cylindrospermopsis (G.S.West) Wołłosz. & V.V.Miller
1 espécie (não endêmica)
***Cylindrospermopsis raciborskii* (G.S.West) Wołłosz. & V.V.Miller**
Referência: Komárková, J. et al. 1999. Algol. Stud. 94: 207-222.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

Cylindrospermum Kütz. *ex* Bornet & Flahaut
1 espécie (não endêmica)
***Cylindrospermum muscicola* Kütz.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Dasygloea Thwaites *ex* Gomont
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Dasygloea brasiliensis* (Senna & Ferreira) Senna & Komárek**
Voucher: Senna, P.A.C. s.n. (UB 0006)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Centro-Oeste (DF); Cerrado; epicontinental
***Dasygloea terrestris* (M.T.P. Azevedo) Senna & Komárek**
Referência: Senna, P.A.C. & Komárek, J. 1998. Algol. Stud. 88: 1-16.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Doliocatella Geitler
1 espécie (não endêmica)
***Doliocatella formosa* Geitler**
Referência: Branco, C.C.Z. & Necchi-Junior, O. 1999. Nova Hedwigia 68(3-4): 393-397.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

Epigloeosphaera Komárková
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Epigloeosphaera brasilica* M.T.P. Azevedo et al.**
Voucher: s.col. s.n. (SP 355737)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Epigloeosphaera glebulenta* (Zalessky) Komárk.-Legn.**
Voucher: Carvalho, M.C. s.n. (SP 365632)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Eucapsis Clem. & Schantz
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Eucapsis densa* M.T.P. Azevedo et al.**
Voucher: s.col. s.n. (SP 355744)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado; epicontinental

***Eucapsis parallelopipedon* (Schmidle) Komárek & Hindák**
Referência: Azevedo, M.T.P. et al. 2003. Hoehnea 30(3): 285-295.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Geitlerinema (Anagn. & Komárek) Anagn.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Geitlerinema amphibium* (C.Agardh *ex* Gomont) Anagn.**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355910)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Geitlerinema splendidum* (Grev. *ex* Gomont) Anagn.**
Voucher: Gemelgo, M.C.P. s.n. (SP 365619)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Geitlerinema unigranulatum* (R.N.Singh) Komárek & Azevedo**
Voucher: Gemelgo, M.C.P. s.n. (SP 365618)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Gloeocapsa Kütz.

1 espécie (não endêmica)
***Gloeocapsa deusta* (Menegh.) Kütz.**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 371459)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Gloeocapsopsis Geitler *ex* Komárek

1 espécie (não endêmica)
***Gloeocapsopsis crepidinum* (Thruret) Geitler *ex* Komárek**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 365637)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (SP); marinho

Gloeothece Nägeli

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Gloeothece filiformis* Sant'Anna et al.**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 188411)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Gloeothece samoensis* Wille**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
***Gloeothece samoensis* var. *maior* Wille**
Referência: Branco, L.H.Z. et al. 2009. Cryptogamie, Algol. 30(1):143.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Gloeotrichia C.Agardh *ex* Bornet & Flahault

1 espécie (não endêmica)
***Gloeotrichia natans* Rabenh. *ex* Bornet & Flahault**
Voucher: Werner, V.R. s.n. (HAS 25775, HAS 25777)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal; epicontinental

Gomphosphaeria Kütz.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Gomphosphaeria aponina* Kütz.**
Voucher: Werner, V.R. s.n. (HAS 7215)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Gomphosphaeria salina* Komárek & Hindák**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 371459)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental, marinho

Hormothece Jao

1 espécie (não endêmica)
***Hormothece geitleriana* M.T.P. Azevedo & Sant'Anna**
Referência: Azevedo, M.T.P. & Sant'Anna, C.L. 1994. Algol. Stud. 75: 79-83.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Hydrocoryne Schwabe *ex* Bornet & Flahault

1 espécie (não endêmica)
***Hydrocoryne spongiosa* Schwabe *ex* Bornet & Flahault**
Voucher: Fujii, M.T. s.n. (SP 365639)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Jaaginema Anagn. & Komárek

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Jaaginema geminatum* (Menegh. *ex* Gomont) Anagn. & Komárek**
Voucher: s.col. s.n. (UB 1201, UB 1261)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Jaaginema pseudogeminatum* (Schmidle) Anagn. & Komárek**
Voucher: Rosa, Z.M. s.n. (HAS 25841)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Jaaginema quadripunctulatum* (Brühl & Biswas) Anagn. & Komárek**
Voucher: s.col. s.n. (UB 750)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Jaaginema subtilissimum* (Kütz. De Toni) Anagn. & Komárek**
Voucher: Santos, K.R.S. s.n. (SP 390913)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

Johannesbaptistia De Toni

1 espécie (não endêmica)
***Johannesbaptistia pellucida* (Dickie) W.R.Taylor & Drouet**
Voucher: Yano, O. s.n. (SP 139768)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental, marinho

Kyrtuthrix Erceg.
1 espécie (não endêmica)
***Kyrtuthrix maculans* (Gomont) Umezaki**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 365640)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho

Leibleinia (Gomont) Hoffmann
3 espécies (1 endêmica)
***Leibleinia gracilis* (Gomont) Anagn. & Komárek**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 371446)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Leibleinia nordgaardii* (Wille) Anagn. & Komárek**
Referência: Branco, L.H.Z. et al. 1997. Algol. Stud. 84: 39-52.
Distribuição: subespontânea; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental, marinho
***Leibleinia pellucida* (Umezaki) Branco et al.**
Voucher: s.col. s.n. (HDB 1541, HDB 1560)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental, marinho

Lemmermaniella Geitler
1 espécie (não endêmica)
***Lemmermaniella obesa* M.T.P. Azevedo et al.**
Referência: Azevedo, M.T.P. et al. 1999. Algol. Studies. 94:45-61.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

Leptolyngbya Anagn. & Komárek
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Leptolyngbya crosbyana* (Tilden) Anagn. & Komárek**
Referência: Nogueira, N.M.C. & Ferreira-Correia, M.M. 2001. Baz. J. Biol. 61(3): 347-356.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia; epicontinental
***Leptolyngbya lagerheimii* (Gomont) Anagn. & Komárek**
Referência: Branco, L.H.Z. et al. 1997. Algol. Stud. 84: 39-52.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Leptolyngbya marina* (Gardner) Anagn.**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 371448)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Leptolyngbya perelegans* (Lemmerm.) Anagn. & Komárek**
Referência: Branco, L.H.Z. et al. 1997. Algol. Stud. 84: 39-52.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Leptolyngbya valderiana* (Gomont) Anagn. & Komárek**
Referência: Branco, L.H.Z. et al. 2009. Cryptogamie, Algol. 30(1): 148.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Limnothrix Meffert
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Limnothrix bicudoi* M.T.P. Azevedo et al.**
Referência: Azevedo, M.T.P. et al. 2003. Algol. Stud. 109: 93-102.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (MG); Mata Atlântica; epicontinental
***Limnothrix planctonica* (Wołłosz.) M.-E.Meffert**
Voucher: Gemelgo, M.C.P. s.n. (SP 365618)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Lyngbya C.Agardh *ex* Gomont
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Lyngbya aestuarii* Liebman *ex* Gomont**
Voucher: s.col. s.n. (HDB 1533, HDB 1552)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental, marinho
***Lyngbya confervoides* C. Agardh *ex* Gomont**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 365637)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Lyngbya majuscula* Gomont**
Voucher: Santos, D.P. s.n. (SP 371437)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP); marinho
***Lyngbya robusta* (Parakutty) Komárek & Komárková**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355892)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido; epicontinental
***Lyngbya semiplena* J. Agardh *ex* Gomont**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 365638, SP 365640, SP 365641)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental, marinho

Merismopedia Meyen
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Merismopedia convoluta* Bréb.**
Voucher: Werner, V.R. s.n. (HAS 7189)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Merismopedia elegans* A. Braun**
Voucher: Werner, V.R. s.n. (HAS 104171)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Merismopedia glauca* (Ehrenb.) Kütz.**
Voucher: Komárek, J. s.n. (SP 355909)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Merismopedia mediterranea* Nägeli**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 365641)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; S udeste (SP, RJ); marinho
***Merismopedia punctata* Meyen**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355900)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Merismopedia tenuissima* Lemmerm.**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355908)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Microchaete Thur. *ex* Bornet & Flahault

1 espécie (não endêmica)
***Microchaete aeruginea* Batters**
Voucher: Fujii, M.T. s.n. (SP 365639)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Microcoleus Desm. *ex* Gomont

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Microcoleus amplus* Gardner**
Referência: Branco, L.H.Z. et al. 2009. Cryptogamie, Algol. 30(1):144.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Microcoleus chthonoplastes* Thur. *ex* Gomont**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 365637)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul; Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental, marinho

Microcrocis P.Richter

1 espécie (não endêmica)
***Microcrocis pulchella* (Buell) Geitler**
Voucher: Werner, V.R. s.n. (HAS 25775)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Microcystis Kütz. *ex* Lemmerm.

8 espécies (nenhuma endêmica)
***Microcystis aeruginosa* (Kütz.) Kütz.**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 336724)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PB), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Microcystis botrys* Teiling**
Voucher: Mercante, T.C. s.n. (SP 355956)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado; epicontinental
***Microcystis flos-aquae* (Wittr.) Kirchner**
Voucher: Werner, V.R. s.n. (HAS 7172)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Microcystis novacekii* (Komárek) Compère**
Voucher: Carvalho, M.C. s.n. (SP 355904)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Microcystis panniformis* Komárek et al.**
Voucher: s.col. s.n. (SP 336046)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Microcystis protocystis* Crow**
Referência: Komárek, J. et al. 2002. Cryptogamie, Algol. 23(2):161-165.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Microcystis smithii* Komárek & Anagn.**
Voucher: Werner, V.R. s.n. (HAS 104195)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Microcystis wesenbergii* (Komárek) Komárek**
Voucher: Azevedo, M.T.P. s.n. (SP 55896)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Myxosarcina Printz

1 espécie (não endêmica)
***Myxosarcina gloeocapsoides* (Setchell & Gardner) Komárek & Anagn.**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 371556)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Nodularia Mertens *ex* Bornet & Flahault

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Nodularia spumigena* Mertens *ex* Bornet & Flahault**
Voucher: Oliveira, M. s.n. (HAS 16129)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Nodularia willei* Gardner**
Referência: Sant'Anna, C.L. 1991. Algol. Stud. 64: 27-545.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido; epicontinental

Nostoc Vaucher *ex* Bornet & Flahault

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Nostoc alatosporum* Sant'Anna et al.**
Voucher: Branco, L.H.Z. s.n. (SP 365630)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (SP); Cerrado; epicontinental
***Nostoc humifusum* Carmich. *ex* Bornet & Flahault**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9: 1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Nostoc interbryum* Sant'Anna et al.**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 365670)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Nostoc viride* Sant'Anna et al.**
Voucher: Branco, L.H.Z. s.n. (SP 365629)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (SP); Cerrado; epicontinental

Oscillatoria Vaucher *ex* Gomont

1 espécie (não endêmica)
***Oscillatoria nigro-viridis* Thwaites *ex* Gomont**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 365637)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental, marinho

Phormidium Kütz. *ex* Gomont
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Phormidium allorgei* (Frémy) Anagn.**
Referência: Branco, L.H.Z. 2004. Algol. Stud. 11: 101-116.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado; epicontinental
***Phormidium corallinae* (Gomont *ex* Gomont) Anagn. & Komárek**
Voucher: s.col. s.n. (HDB 1569)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AM); Domínio desconhecido; epicontinental
***Phormidium gracile* (Gomont) Anagn.**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 371428)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Phormidium holdenii* (Forti) Anagn.**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 371431)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Phormidium irrigum* (Kütz. *ex* Gomont) Anagn. & Komárek**
Voucher: Santos, K.R.S. s.n. (SP 390923)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal; epicontinental
***Phormidium penicillatum* Gomont**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 365637)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Phormidium tergestinum* (Gomont) Anagn. & Komárek**
Voucher: Santos, K.R.S. s.n. (SP 390923)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Pampa, Pantanal; epicontinental

Planktolyngbya Anagn. & Komárek
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Planktolyngbya contorta* (Lemmerm.) Anagn. & Komárek**
Voucher: Ferraz, G.C. s.n. (HAS 16154, HAS16156)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido; epicontinental
***Planktolyngbya limnetica* (Lemmerm.) Komárk.-Legn. & Cronberg**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355910)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Domínio desconhecido; epicontinental

Planktothrix Anagn. & Komárek
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Planktothrix agardhii* (Gomont) Anagn. & Komárek**
Voucher: Melcher, S.S. s.n. (SP 365622)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Pantanal; epicontinental
***Planktothrix isothrix* (Skuja) Komárek & Komárková**
Voucher: Santos, K.R.S. s.n. (SP 390923)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

Pleurocapsa Thur. *in* Hauck
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pleurocapsa crepidinum* Collins**
Voucher: Amado-Filho, G.M. s.n. (SP 365641)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Pleurocapsa fluviatilis* Lagerh.**
Referência: Branco, C.C.Z. & Necchi-Junior, O. 1996. Algol. Stud. 80: 35-57.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Porphyrosiphon Kütz. *ex* Gomont
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Porphyrosiphon luteus* (Gomont) Anagn. & Komárek**
Referência: Branco, L.H.Z. et al. 1997. Algol. Stud. 84: 39-52.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental, marinho
***Porphyrosiphon martensianus* (Menegh. *ex* Gomont) Anagn. & Komárek**
Referência: Branco, L.H.Z. 2004. Algol. Stud. 11: 101-116.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Porphyrosiphon notarisii* Kütz. *ex* Gomont**
Referência: Branco, L.H.Z. et al. 2009. Cryptogamie, Algol. 30(1): 146.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Pseudanabaena Lauterborn
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Pseudanabaena catenata* Lauterborn**
Voucher: Gemelgo, M.C.P. s.n. (SP 365619)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Pseudanabaena galeata* Böcher**
Voucher: CETESB s.n. (SP 365635)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Pseudanabaena limnetica* (Lemmerm.) Komárek**
Voucher: Santos, K.R.S. s.n. (SP 390914)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Pseudanabaena mucicola* (Naumann & Hub.-Pest.) Schwabe**
Voucher: Gemelgo, M.C.P. s.n. (SP 365617)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Pseudanabaena voronichinii* Anagn.**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355962)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Pseudocapsa Erceg.
1 espécie (não endêmica)
***Pseudocapsa maritima* Komárek**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 371446)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Pulvinularia Borzi
1 espécie (não endêmica)
***Pulvinularia suecica* Borzi**
Referência: Branco, L.H.Z. et al. 2010.
Nova Hedwigia 90(1-2): 95-104.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica; epicontinental

Radiocystis Skuja
1 espécie (não endêmica)
***Radiocystis fernandoi* Komárek & Komárk.-Legn.**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 355910)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Raphidiopsis F.E.Fritsch & M.F.Rich
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Raphidiopsis brookii* Hill**
Voucher: Gemelgo, M.C.P. s.n. (SP 365618)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Raphidiopsis indica* Singh**
Referência: Sant'Anna, C.L. 2001. Algol. Stud. 64: 527-545.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Raphidiopsis mediterranea* Skuja**
Voucher: CETESB s.n. (SP 365635)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

Rhabdoderma Schmidle & Lauterborn
1 espécie (não endêmica)
***Rhabdoderma sancti-pauli* M.T.P. Azevedo et al.**
Referência: Azevedo, M.T.P. et al. 2003.
Hoehnea 30(3): 286-288.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Rhabdogloea Schröder
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhabdogloea brasilica* M.T.P.Azevedo & Kovácik**
Referência: Azevedo, M.T.P. & Kovácik, L. 1996.
Algol. Stud. 83: 83-92.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Rhabdogloea ellipsoidea* Schröder**
Voucher: Komárek, J. s.n. (SP 355964)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Rivularia C.Agardh *ex* Bornet & Flahault
1 espécie (não endêmica)
***Rivularia atra* Roth**
Voucher: Fujii, M.T. s.n. (SP 365639)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); marinho

Romeria Koczw.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Romeria caruaru* Komárek et al.**
Voucher: Santos, K.R.S. s.n. (SP 390917)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Nordeste (PE), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Pampa; epicontinental
***Romeria gracilis* (Koczw.) Koczw. *ex* Geitler**
Voucher: Tucci, A. s.n. (SP 365415, SP 365421)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Romeria hieroglyphica* Komárek & Komárk.-Legn.**
Voucher: Komárek, J. s.n. (SP 355744)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Sudeste (SP); Cerrado; epicontinental
***Romeria victoriae* Komárek & Cronberg**
Voucher: Santos, K.R.S. s.n. (SP 390922)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Centro-Oeste (MS); Pantanal; epicontinental

Schizothrix Kütz. *ex* Gomont
1 espécie (1 endêmica)
***Schizothrix arenaria* Gomont**
Referência: Branco, L.H.Z. et al. 1997. Algol. Stud. 84:39-52.
Distribuição: subespontânea; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental

Scytonema C.Agardh *ex* Bornet & Flahault
9 espécies (nenhuma endêmica)
***Scytonema arcangeli* Bornet & Flahault**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 187562)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (MA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Scytonema bewsii* F.E. Fritsch**
Voucher: Vital, D.M. s.n. (SP 113567, SP 113499)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Scytonema capitaum* Gardner**
Voucher: Vital, D.M. s.n. (SP 187567)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Scytonema coactile* Mont.**
Voucher: Vital, D.M. s.n. (SP 113696, SP 114545)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PB), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Scytonema fritschii* Ghose**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 187572, SP 187573, SP 187575)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Scytonema guyanense* (Mont.) Bornet & Flahault**
Voucher: Paula, E.J. de s.n. (SP 187577)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Norte (AM), Nordeste (CE), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga; epicontinental
***Scytonema hofmannii* C. Agardh *ex* Bornet & Flahault**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001.
Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Scytonema insulare* Sant'Anna**
Voucher: Vital, D.M. s.n. (SP 164817)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Scytonema siculum* Borzi *ex* Bornet & Flahault**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 365637)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Sirocoleum Kütz. *ex* Gomont

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sirocoleum guyanense* Kütz. *ex* Gomont**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 371457)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Sirocoleum kurzii* Gomont**
Voucher: Sant'Anna, C.L. s.n. (SP 371446)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Snowella Elenkin

1 espécie (não endêmica)
***Snowella lacustris* (Chodat) Komárek & Hindák**
Voucher: Melcher, S.S. s.n. (SP 365620)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Sphaerocavum M.T.P.Azevedo & Sant'Anna

1 espécie (não endêmica)
***Sphaerocavum brasiliense* M.T.P.Azevedo & Sant'Anna**
Voucher: s.col. s.n. (SP 336724)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Spirulina Turpin *ex* Gomont

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Spirulina labyrinthiformis* Kütz. *ex* Gomont**
Voucher: Fujii, M.T. s.n. (SP 365639)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Spirulina major* Kütz. *ex* Gomont**
Referência: Branco, L.H.Z. et al. 1997. Algol. Stud. 84:39-52.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental, marinho
***Spirulina subsalsa* Oerst. *ex* Gomont**
Voucher: s.col. s.n. (SP 187400)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental, marinho
***Spirulina subtilissima* Kütz. *ex* Gomont**
Voucher: Santos, K.R.S. s.n. (SP 390916)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (RS); Pampa, Pantanal; epicontinental

Stanieria Komárek & Anagn.

1 espécie (não endêmica)
***Stanieria sphaerica* (Setchell & Gardner) Anagn. & Pantazidou**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 371449)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho

Stichosiphon Geitler

1 espécie (não endêmica)
***Stichosiphon mangle* Branco et al.**
Voucher: Branco, L.H.Z. s.n. (SP 238951)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental, marinho

Stigonema C.Agardh *ex* Bornet & Flahault

1 espécie (não endêmica)
***Stigonema gracile* Silva & Sant'Anna**
Voucher: s.col. s.n. (SP 187567)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Symploca Kütz. *ex* Gomont

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Symploca atlantica* Gomont**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 365637)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Symploca hydnoides* Gomont**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 365637)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Symplocastrum (Gomont) Kirchner

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Symplocastrum corticiculum* Branco et al.**
Voucher: s.col. s.n. (SJRP 26907)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (SP); Cerrado; epicontinental
***Symplocastrum parallelum* Branco et al.**
Voucher: s.col. s.n. (SP 365626)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Symplocastrum purpurascens* (Gomont) Anagn.**
Referência: Branco, L.H.Z. et al. 2009. Cryptogamie, Algol. 30(1):148.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Mata Atlântica; epicontinental
***Symplocastrum selvaticum* Branco et al.**
Voucher: s.col. s.n. (SJRP 26908)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Synechococcus Nägeli

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Synechococcus nidulans* (Pringsh.) Komárek**
Voucher: Gemelgo, M.C.P. s.n. (SP 365619)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido; epicontinental
***Synechococcus sigmoideus* (Moore & Carter) Komárek**
Voucher: Santos, K.R.S. s.n. (SP 390917)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal; epicontinental

Synechocystis Sauv.

1 espécie (não endêmica)
***Synechocystis aquatilis* Sauv.**
Voucher: Santos, K.R.S. s.n. (SP 390917)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

Trichocoleus Anagn.
1 espécie (não endêmica)
***Trichocoleus tenerrimus* (Gomont) Anagn.**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 365637)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (MA, CE), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia,
Caatinga, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental, marinho

Woronichinia Elenkin
1 espécie (não endêmica)
***Woronichinia naegeliana* (Unger) Elenkin**
Voucher: Gemelgo, M.C.P. s.n. (SP 365616)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Xenococcus Thur.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Xenococcus pallidus* (Hansg.) Komárek & Anagn.**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 365640)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP); marinho
***Xenococcus pyriformis* Setchell & Gardner**
Voucher: s.col. s.n. (HDB 1536, HDB 1566)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (MA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica;
epicontinental, marinho
***Xenococcus schousboei* Thur.**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 371421)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido;
epicontinental, marinho

Yonedaella Umezaki
1 espécie (não endêmica)
***Yonedaella lithophila* (Erceg.) Umezaki**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 365640)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (PE), Sudeste (SP); marinho

DICTYOCHOPHYCEAE
Mariângela Menezes
2 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica)

Dictyocha Ehrenb.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Dictyocha cruz* Ehrenb.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2004.
GloBallast Monograph Series 16:1-132.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Dictyocha fibula* Ehrenb.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2004.
GloBallast Monograph Series 16:1-132.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Dictyocha speculum* Ehrenb.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2004.
GloBallast Monograph Series 16:1-132.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Octactis J.Schiller
1 espécie (não endêmica)
***Octactis octonaria* (Ehrenb.) Hovasse**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008.
Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

DINOPHYCEAE
Clarisse Odebrecht
65 gêneros, 374 espécies (nenhuma endêmica),
2 variedades (nenhuma endêmica)

Akashiwo G.Hansen & Moestrup
1 espécie (não endêmica)
***Akashiwo sanguinea* (Hirasaka) G.Hansen & Moestrup**
Referência: Fujita, C.C. & Odebrecht, C. 2007.
Atlantica 29(2): 93-106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido;
epicontinental, marinho

Alexandrium Halim *emend.* Balech
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Alexandrium fraterculus* (Balech) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências,
Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Alexandrium minutum* Halim**
Referência: Menezes, M. et al. 2007.
Harmful Algae News 34: 7-9.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Alexandrium tamarense* (Lebour) Balech**
Referência: Persich, G.R. & Garcia, V.M.T. 2003.
Atlantica 25(2): 123-133.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

Amphidinium Clap. & J.Lachm.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Amphidinium crassum* Lohmann**
Referência: Seeliger, U. et al. 1998. Os ecossistemas
costeiro e marinho do extremo sul do Brasil. Rio Grande:
Ecoscientia. 341 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Amphidinium lanceolatum* Schröder**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the
Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of
Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Amphidinium operculatum* Clap. & J.Lachm.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the
Caribbean Sea and adjacent areas. Florida:
University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Amphidinium turbo* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the
Caribbean Sea and adjacent areas. Florida:
University of Miami Press, Coral Gables. 145 p..
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (RN); marinho

Amphisolenia Stein
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Amphisolenia bidentata* Schröder**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série
Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Amphisolenia bifurcata* G.Murray & F.Whitting**
Referência: Passavante, J.Z.O. et al. 1982. Trab. Inst. Oceanogr. Univ. Fed. Pernambuco 17: 47-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sul (RS); marinho
***Amphisolenia clavipes* Kof.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Amphisolenia globifera* Stein**
Referência: Brandini, F.P. 1988. Ciência e Cultura 40(4): 334-341.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Amphisolenia palmata* Stein**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Amphisolenia schauinslandi* Lemmerm.**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Amphisolenia thrinax* Schütt**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); marinho

Blepharocysta Ehrenb.

1 espécie (não endêmica)
***Blepharocysta splendor-maris* (Ehrenb.) Ehrenb.**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1):3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, RN), Sul (SC); marinho

Brachidinium F.J.R.Taylor

1 espécie (não endêmica)
***Brachidinium capitatum* F.J.R.Taylor**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Bysmatrum M.A.Faust & Steid.

1 espécie (não endêmica)
***Bysmatrum subsalsum* (Ostenf.) M.A.Faust & Steid.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Calciodinellum Deflandre

1 espécie (não endêmica)
***Calciodinellum albatrosianum* (Kamptner) Janofske & Karwath**
Referência: Gottschling, M. et al. 2005. Eur. J. Phycol. 40(2): 207-220.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (CE, PE); marinho

Centrodinium Kof.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Centrodinium biconicum* (G.Murray & F.Whitting) F.J.R. Taylor**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Centrodinium intermedium* Pavill.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Centrodinium pavillardii* F.J.R.Taylor**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Centrodinium punctatum* (Cleve) Taylor**
Referência: Brandini, F.P. 1988. Ciência e Cultura 40(4): 334-341.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); marinho

Ceratocorys Stein

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Ceratocorys armata* (F.Schütt) Kof.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Ceratocorys gourreti* Paulsen**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ); marinho
***Ceratocorys horrida* Stein**
Referência: Brandini, F.P. 1988. Ciência e Cultura 40(4): 334-341.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, CE, RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

Citharistes Stein

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Citharistes apsteinii* Schütt**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES), Sul (RS); marinho
***Citharistes regius* Stein**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

Cladopyxis Stein

1 espécie (não endêmica)
***Cladopyxis brachiolata* Stein**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Cochlodinium Schütt

6 espécies (nenhuma endêmica)

***Cochlodinium cavatum* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho

***Cochlodinium constrictum* (Schütt) Lemmerm.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho

***Cochlodinium faurei* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); marinho

***Cochlodinium pirum* (Schütt) Lemmerm.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho

***Cochlodinium schuetti* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho

***Cochlodinium virescens* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN); marinho

Corythodinium Loebl. & A.R.Loebl.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Corythodinium belgicae* (Meunier) F.J.R.Taylor**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, RN, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

***Corythodinium diploconus* (Stein) F.J.R.Taylor**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Cystodinium G.A.Klebs

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Cystodinium bataviense* G.A.Klebs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

***Cystodinium cornifax* (J.Schiller) G.A.Klebs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Dinophysis Ehrenb.

42 espécies (nenhuma endêmica)

***Dinophysis acuminata* Clap. & J.Lachm.**
Referência: Kremer, L.M. & Rosa, Z. M. 1982. Iheringia, Bot. 30: 3-35.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Dinophysis amandula* (Balech) Sournia**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Sudeste (RJ), Sul (RS); marinho

***Dinophysis amphora* Balech**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados da ordem Dinophysiales no sul do Brasil (inverno 2005, verão 2007). III Congresso Brasileiro de Oceanografia, I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza (CE). CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Dinophysis apicata* (Kof. & Skogsb.) Abé vel Balech**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho

***Dinophysis argus* (Stein) Abé vel Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

***Dinophysis balechii* Norris & Berner**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); marinho

***Dinophysis brevisulcus* Tai & Skogsberg**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados da ordem Dinophysiales no sul do Brasil (inverno 2005, verão 2007). III Congresso Brasileiro de Oceanografia, I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza (CE). CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Dinophysis capitulata* Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Dinophysis caudata* Saville-Kent**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Dinophysis circumsutum* (Karsten) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho

***Dinophysis cuneus* (Schütt) Abé vel Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (ES); marinho

***Dinophysis diegensis* Kof.**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Dinophysis doryphora* (Stein) Abé vel Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho

***Dinophysis dubia* Balech**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados da ordem. Dinophysiales no sul do Brasil (inverno 2005, verão 2007). III Congresso Brasileiro de Oceanografia, I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza (CE). CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Dinophysis exigua* Kof. & Skogsb.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, RN, BA), Sudeste (ES), Sul (RS); marinho

***Dinophysis fortii* Pavill.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (RN, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); marinho

***Dinophysis hastata* Stein**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); marinho

***Dinophysis hindmarchii* (G.Murray & F.Whitting) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho

***Dinophysis laevis* Clap. & J.Lachm.**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados da ordem Dinophysiales no sul do Brasil (inverno 2005, verão 2007). III Congresso Brasileiro de Oceanografia, I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza (CE). CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Dinophysis microstrigiliformis* Abé**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados da ordem Dinophysiales no sul do Brasil (inverno 2005, verão 2007). III Congresso Brasileiro de Oceanografia, I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza (CE). CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Dinophysis minuta* (Cleve) Balech**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados a 24 de maio de 2008. CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Dinophysis mitra* (Schütt) Abé vel Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho

***Dinophysis mucronata* (Kof. & Skogsb.) Sournia**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados da ordem Dinophysiales no sul do Brasil (inverno 2005, verão 2007). III Congresso Brasileiro de Oceanografia, I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza (CE). CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Dinophysis nias* Karsten**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados da ordem Dinophysiales no sul do Brasil (inverno 2005, verão 2007). III Congresso Brasileiro de Oceanografia, I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza (CE). CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Dinophysis odiosa* (Pavill.) Tai & Skogsb.**
Referência: Kremer, L.M. & Rosa, Z. M. 1982. Iheringia, Bot. 30: 3-35.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES), Sul (RS); marinho

***Dinophysis operculoides* (Schütt) Balech**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados da ordem Dinophysiales no sul do Brasil (inverno 2005, verão 2007). III Congresso Brasileiro de Oceanografia, I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza (CE). CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Dinophysis ovata* Clap. & J.Lachm.**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados da ordem Dinophysiales no sul do Brasil (inverno 2005, verão 2007). III Congresso Brasileiro de Oceanografia, I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza (CE). CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Dinophysis parvula* (Schütt) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho

***Dinophysis pulchella* (Lebour) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

***Dinophysis punctata* Jørgensen**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho

***Dinophysis pusilla* Jørgensen**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados da ordem Dinophysiales no sul do Brasil (inverno 2005, verão 2007). III Congresso Brasileiro de Oceanografia, I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza (CE). CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Dinophysis rapa (*Stein) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Dinophysis rotundata* Clap. & J.Lachm.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Dinophysis schilleri* Sournia**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Dinophysis schroederi* Pavill.**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados da ordem Dinophysiales no sul do Brasil (inverno 2005, verão 2007). III Congresso Brasileiro de Oceanografia, I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza (CE). CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Dinophysis schuettii* G.Murray & F.Whitting**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho
***Dinophysis scrobiculata* Balech**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados da ordem Dinophysiales no sul do Brasil (inverno 2005, verão 2007). III Congresso Brasileiro de Oceanografia, I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza (CE). CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Dinophysis similis* Kof. & Skogsb.**
Referência: Haraguchi, L. & Odebrecht, C. 2008. Riqueza de espécies, distribuição espacial e sazonal de dinoflagelados da ordem Dinophysiales no sul do Brasil (inverno 2005, verão 2007). III Congresso Brasileiro de Oceanografia, I Congresso Ibero-Americano de Oceanografia, Fortaleza (CE). CD.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Dinophysis sphaerica* Stein**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Dinophysis tripos* Gourret**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Dinophysis truncata* Cleve**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto E spañol de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Dinophysis uracantha* Stein**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

Diplopsalis Bergh

1 espécie (não endêmica)
***Diplopsalis lenticula* Bergh**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p..
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Sudeste; marinho

Diplopsalopsis Meunier *emend*. Balech

1 espécie (não endêmica)
***Diplopsalopsis bomba* (Stein) Dodge & Toriumi**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); marinho

Durinskia Carty & Cox

1 espécie (não endêmica)
***Durinskia baltica* (Levander) Carty & Cox**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9: 1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental, marinho

Glenodinium Ehrenb.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Glenodinium cinctum* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Glenodinium inaequale* Chodat**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Glochidinium Børgesen

1 espécie (não endêmica)
***Glochidinium penardiforme* (Lindemann) Boltovskoy**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Goniodoma Stein

1 espécie (não endêmica)
***Goniodoma polyedricum* (C.H.G.Pouchet) Jørgensen**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Gonyaulax Diesing

15 espécies (nenhuma endêmica)
***Gonyaulax apiculata* (Penard) Entz**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p..
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho

***Gonyaulax birostris* Stein**
Referência: Brandini, F.P. 1988. Ciência e Cultura 40(4): 334-341.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Gonyaulax diegensis* Kof.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN); marinho
***Gonyaulax digitale* (C.H.G.Pouchet) Kof.**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Gonyaulax fragilis* (F.Schütt) Kof.**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP), Sul (SC); marinho
***Gonyaulax kofoidii* Pavill.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Gonyaulax monacantha* Pavill.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Gonyaulax nigricans* (J.Schiller) Balech**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, RN); marinho
***Gonyaulax pacifica* Kof.**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sul (RS); marinho
***Gonyaulax polygramma* Stein**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, RN), Sul (SC, RS); marinho
***Gonyaulax scrippsae* Kof.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, RN); marinho.
***Gonyaulax sphaeroidea* Kof.**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Gonyaulax spinifera* (Clap. & Lachm.) Diesing**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN); marinho
***Gonyaulax turbynei* G.Murray & F.Whitting**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Gonyaulax verior* Sournia**
Referência: Persich, G.R. & Garcia, V.M.T. 2003. Atlantica 25(2): 123-133.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); marinho

Gymnodinium Stein *emend.* G. Hansen & Moestrup

25 espécies (nenhuma endêmica)
***Gymnodinium aeruginosum* Stein**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9: 1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Gymnodinium auratum* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Gymnodinium catenatum* Graham**
Referência: Mafra Jr, L.L. et al. 2006. Braz. J. Oceanogr. 54(1-2): 107-121.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Gymnodinium caudatum* Prescott**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. et al. 1987/1989. T rab. Inst. Oceanogr. Univ. Fed. Pernambuco. 20: 35-52.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido
***Gymnodinium coeruleum* Dogiel**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Gymnodinium conicum* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Gymnodinium costatum* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Gymnodinium flavum* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho

***Gymnodinium fuscum* (Ehrenb.) F.Stein**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Gymnodinium galaeforme* Matzenauer**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Gymnodinium gelbum* Kof.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, RN); marinho
***Gymnodinium gracile* Bergh**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre. 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); marinho
***Gymnodinium grammaticum* (C.H.G.Pouchet) Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, RN); marinho
***Gymnodinium incoloratum* W.Conrad & Kuff.**
Referência: Torgan, L.C. et al. 2003. Iheringia, Bot. 58(2): 227-250.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Gymnodinium latum* Skuja**
Referência: Torgan, L.C. et al. 2003. Iheringia, Bot. 58(2): 227-250.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Gymnodinium marinum* Saville-Kent**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); marinho
***Gymnodinium mirabile* Penard**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido
***Gymnodinium multistriatum* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Gymnodinium obesum* J. Schiller**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9: 1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Gymnodinium ochraceum* Kof.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Gymnodinium punctatum* C.H.G. Pouchet**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Gymnodinium rotundatum* G.A. Klebs**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido
***Gymnodinium scopulosum* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Gymnodinium simplex* (Lohmann) Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, RN); marinho
***Gymnodinium viride* Penard**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Gyrodinium Kof. & Swezy *emend.* G.Hansen & Moestrup

10 espécies (nenhuma endêmica)
***Gyrodinium falcatum* Kof. & Swezy**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Gyrodinium fissoides* Elbr.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Gyrodinium fusus* (Meunier) Akselman**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre. 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); marinho
***Gyrodinium grave* (Meunier) Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Gyrodinium herbaceum* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Gyrodinium nasutum* (Wulff) J.Schiller**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, RN); marinho

***Gyrodinium ochraceum* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho
***Gyrodinium prunus* (Wulff) Lebour**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN); marinho
***Gyrodinium pusillum* (J.Schiller) Kof. & Swezy**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Gyrodinium spirale* (Bergh) Kof. & Swezy**
Referência: Fujita, C.C. & Odebrecht, C. 2007. Atlantica 29(2): 93-106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

Heterocapsa Stein *emend.* Iwataki & Fukuyo

1 espécie (não endêmica)
***Heterocapsa rotundata* (Lohmann) G.Hansen**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); marinho

Heterodinium Kof.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Heterodinium angulatum* Kof. & J.R.Michener**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Heterodinium inaequale* (Kof.) J.Schiller**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Heterodinium mediterraneum* Pavill.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); marinho
***Heterodinium scrippsii* Kof.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho

Histioneis Stein

16 espécies (nenhuma endêmica)
***Histioneis crateriformis* Stein**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, BA), Sudeste (RJ); marinho
***Histioneis cymbalaria* Stein**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho
***Histioneis depressa* J. Schiller**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Histioneis elongata* Kof. & J.R. Michener**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES); marinho
***Histioneis highleyi* G.Murray & F. Whitting**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho
***Histioneis hyalina* Kof. & J.R.Michener**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Histioneis inclinata* Kof. & Skogsb.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Histioneis longicollis* Kof.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA); marinho
***Histioneis megalocopa* Stein**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15: 1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES), Sul (RS); marinho
***Histioneis milneri* G.Murray & F. Whitting**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho
***Histioneis mitchellana* G. Murray & F. Whitting**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15: 1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho
***Histioneis panaria* Kof. & Skogsb.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15: 1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Sudeste (ES); marinho
***Histioneis para* G.Murray & F. Whitting**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15: 1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho

***Histioneis striata* Kof. & J.R. Michener**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN), Sudeste (ES); marinho
***Histioneis tubifera* Böhm**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); marinho
***Histioneis vouckii* J. Schiller**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho

Lingulodinium D.Wall

1 espécie (não endêmica)
***Lingulodinium polyedra* (Stein) Dodge**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, RN, PE), Sul (SC); marinho

Lophodinium Lemmerm.

1 espécie (não endêmica)
***Lophodinium polylophum* (Daday) Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Mesoporos Lillick

1 espécie (não endêmica)
***Mesoporos perforatus* (Gran) Lillick**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, RN), Sudeste (SP); marinho

Micracanthodinium Deflandre

1 espécie (não endêmica)
***Micracanthodinium setiferum* (Lohmann) Deflandre**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Nematodinium Kof. & Swezy

1 espécie (não endêmica)
***Nematodinium torpedo* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); marinho

Neoceratium F.Gómez et al.

58 espécies (nenhuma endêmica)
***Neoceratium arietinum* (Cleve) F.Gómez et al.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15: 1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Neoceratium azoricum* (Cleve) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências, Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium belone* (Cleve) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências, Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium bigelowii* (Kof.) F.Gómez et al.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho
***Neoceratium breve* (Ostenf. & J.Schmidt) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências, Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Neoceratium candelabrum* (Ehrenb.) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências, Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Neoceratium carriense* (Gourret) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências, Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium cephalotum* (Lemmerm.) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005. Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho
***Neoceratium concilians* (Jørgensen) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005. Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul; marinho
***Neoceratium contortum* (Gourret) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005. Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium contrarium* (Gourret) F.Gómez et al.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho
***Neoceratium declinatum* (Karsten) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências, Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium deflexum* (Kof.) F.Gómez et al.**
Referência: Brandini, F.P. 1988. Ciência e Cultura 40(4): 334-341.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Neoceratium dens* (Ostenf. & J.Schmidt) F.Gómez et al.**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sul (RS); marinho
***Neoceratium digitatum* (Schütt) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005. Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (ES); marinho
***Neoceratium euarcuatum* (Jørgensen) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005. Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium extensum* (Gourret) F.Gómez et al.**
Referência: Kremer, L.M. & Rosa, Z. M. 1982. Iheringia, Bot. 30: 3-35.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium falcatiforme* (Jørgensen) F.Gómez et al.**
Referência: Brandini, F.P. 1988. Ciência e Cultura 40(4): 334-341.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); marinho
***Neoceratium falcatum* (Kof.) F.Gómez et al.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium furca* (Ehrenb.) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências, Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium fusus* (Ehrenb.) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências, Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium geniculatum* (Lemmerm.) F.Gómez et al.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, PE, BA); marinho
***Neoceratium gibberum* (Gourret) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências, Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium gravidum* (Gourret) F.Gómez et al.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP), Sul (PR); marinho
***Neoceratium hexacanthum* (Gourret) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências, Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium hircus* (Schröd.) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências, Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Neoceratium horridum* (Gran) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005. Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Neoceratium humile* (Jørgensen) F.Gómez et al.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Neoceratium incisum* (Karsten) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005. Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium inflatum* (Kof.) F.Gómez et al.**
Referência: Kremer, L.M. & Rosa, Z. M. 1982. Iheringia, Bot. 30: 3-35.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Neoceratium karstenii* (Pavill.) F.Gómez et al.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium kofoidii* (Jørgensen) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005. Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium lanceolatum* (Kof.) F.Gómez et al.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA); marinho
***Neoceratium limulus* (Gourret) F.Gómez et al.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho
***Neoceratium lineatum* (Ehrenb.) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências, Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium longirostrum* (Gourret) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005. Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Neoceratium longissimum* (Schröd.) F.Gómez et al.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

***Neoceratium lunula* (Schimper *ex* Karsten) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005.
Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP),
Nordeste (CE, RN, PE), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Neoceratium macroceros* (Ehrenb.) F.Gómez et al.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium massiliense* (Gourret) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências,
Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium minutum* (Jørgensen) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências,
Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); marinho
***Neoceratium paradoxides* (Cleve) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005.
Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP),
Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES), Sul (RS); marinho
***Neoceratium pavillardii* (Jørgensen) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005.
Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),
Sul (RS); marinho
***Neoceratium pentagonum* (Gourret) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005.
Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium platycorne* (Daday) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005.
Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE, BA); marinho
***Neoceratium porrectum* (Karsten) F.Gómez et al.**
Referência: Mayal, E.M. et al. 2009.
Braz. Arch. Biol.Technol. 52(3): 665-678.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); marinho
***Neoceratium praeolongum* (Lemmerm.) F.Gómez et al.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série
Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho
***Neoceratium pulchellum* (Schröd.) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências,
Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium ranipes* (Cleve) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências, Porto
Alegre 3: 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),
Sul (SC, RS); marinho
***Neoceratium reflexum* (Cleve) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005.
Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP),
Nordeste (RN, PE), Sudeste (ES); marinho
***Neoceratium schroeteri* (Schröd.) F.Gómez et al.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho
***Neoceratium setaceum* (Jørgensen) F.Gómez et al.**
Referência: Brandini, F.P. 1986. Nerítica 1(3): 9-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Neoceratium symmetricum* (Pavill.) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005.
Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP),
Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium tenue* (Ostenf. & J.Schmidt) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005.
Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Neoceratium teres* (Kof.) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências,
Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium trichoceros* (Ehrenb.) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências,
Porto Alegre 3(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium tripos* (O.F.Müller) F.Gómez et al.**
Referência: Cardoso, L.S. 1995. Biociências,
Porto Alegre 3(1): 3-41.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); marinho
***Neoceratium vultur* (Cleve) F.Gómez et al.**
Referência: Koening, M.L. & Lira, C.G. 2005.
Acta Bot. Brasil. 19(2): 391-397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP),
Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); marinho

Noctiluca Suriray *ex* Lamarck

1 espécie (não endêmica)
***Noctiluca scintillans* (Macartney) Kof. & Swezy**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências,
Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Ornithocercus Stein

6 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade
(não endêmica)
***Ornithocercus heteroporus* Kof.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Ornithocercus magnificus* Stein**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP), Nordeste (CE, RN, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Ornithocercus quadratus* Schütt**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ornithocercus quadratus* var. *simplex* Kof. & Skogsb.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Ornithocercus splendidus* Schütt**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sul (RS); marinho
***Ornithocercus steinii* Schütt**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho
***Ornithocercus thumii* (A.W.F.Schmidt) Kof. & Skogsb.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); marinho

Ostreopsis Schmidt

1 espécie (não endêmica)
***Ostreopsis ovata* Fukuyo**
Referência: Nascimento, S.M. et al. 2008. Harmful Algae News 37: 1-4.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); marinho

Oxhyrris Dujard.

1 espécie (não endêmica)
***Oxhyrris marina* Dujard.**
Referência: Odebrecht, C. 1988. Atlantica 10(1): 21-40.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); marinho

Oxyphysis Kof.

1 espécie (não endêmica)
***Oxyphysis oxytoxoides* Kof.**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Oxytoxum Stein

21 espécies (nenhuma endêmica)
***Oxytoxum caudatum* J. Schiller**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Oxytoxum constrictum* (Stein) Butschli**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Oxytoxum crassum* J. Schiller**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Oxytoxum curvatum* (Kof.) Kof.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Oxytoxum elegans* Pavill.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Oxytoxum gladiolus* Stein**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Oxytoxum laticeps J.* Schiller**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Oxytoxum milneri* G.Murray & F.Whitting**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Oxytoxum mitra* Stein**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Oxytoxum obliquum* J.Schiller**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Oxytoxum ovale* J. Schiller**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Oxytoxum pachyderme* J. Schiller *ex* F.J.R. Taylor**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Oxytoxum parvum* J. Schiller**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Oxytoxum reticulatum* (Stein) Schütt**
Referência: Faria, J.C. & Cunha, A.M. 1917. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 9(1): 68-93.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Oxytoxum robustum* Kof.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

***Oxytoxum sceptrum* (Stein) Schröder**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1):3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Oxytoxum scolopax* Stein**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Oxytoxum sphaeroideum* Stein**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Oxytoxum tesselatum* (Stein) Schütt**
Referência: Kremer, L.M. & Rosa, Z. M. 1982. Iheringia, Bot. 30(3):3-35.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Oxytoxum turbo* Kof.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Oxytoxum variabile* J. Schiller**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, RN), Sudeste (RJ); marinho

Palaeophalacroma J.Schiller

1 espécie (não endêmica)
***Palaeophalacroma unicinctum* J. Schiller**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

Parahistioneis Kof. & Skogsb.

1 espécie (não endêmica)
***Parahistioneis gascoyensis* H.C. Wood**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); marinho

Peridiniopsis Lemmerm.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Peridiniopsis amazonica* Meyer et al.**
Referência: Meyer, B. et al. 1997. Nova Hedwigia 65: 365-375.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Peridiniopsis cunningtonii* Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Fernandes, V.O. 1990. Acta Bot. Brasil. 4(2): 21-30.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Peridiniopsis oculatum* (Stein) Bourr.**
Referência: Franceschini, I.M. 1992. Biblioth. Phycol. 92: 1-80.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Peridinium Ehrenb.

9 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Peridinium africanum* Lemmerm.**
Referência: Delazari-Barroso, A. et al. 2007. Hoehnea 34(2): 211-229.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Peridinium gatunense* Nygaard**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Peridinium gatunense* var. *madagascariensis* Lefèvre**
Referência: Albuquerque, C.S. & Menezes, M. 1997. Hoehnea 24(2): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Cerrado; epicontinental
***Peridinium gutwinskii* Wołłosz.**
Referência: Delazari-Barroso, A. et al. 2007. Hoehnea 34(2): 211-229.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Peridinium incospicuum* Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Peridinium quinquecorne* Abé**
Referência: Proença, L.A. et al. 2006. Anais Simp. Lat.-Amer. Algas Nocivas 244.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); marinho
***Peridinium umbonatum* Stein**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Peridinium volzii* Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Peridinium willei* Huitfeld-Kaas**
Referência: Cardoso, L.S. & Torgan, L.C. 2007. Acta Bot. Brasil. 21(2): 411-419.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Peridinium wiscosinense* Eddy**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Phalacroma Stein
1 espécie (não endêmica)
Phalacroma favus
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte,
Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Podolampas Stein
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Podolampas bipes* Stein**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências,
Porto Alegre 6(1):3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Podolampas elegans* Schütt**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Podolampas palmipes* Stein**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências,
Porto Alegre 6(1):3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA, RN, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); marinho
***Podolampas spinifera* Okamura**
Referência: Kremer, L.M. & Rosa, Z. M. 1982.
Iheringia, Bot. 30(3): 3-35.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, RS); marinho

Polykrikos Bütschli
1 espécie (não endêmica)
***Polykrikos schwartzii* Bütschli**
Referência: Fujita, C.C. & Odebrecht, C. 2007.
Atlantica 29(2): 93-106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); marinho

Preperidinium Mangin
1 espécie (não endêmica)
***Preperidinium meunieri* (Pavill.) Elb.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates
of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida:
University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); marinho

Pronoctiluca Fabre-Domérgue
1 espécie (não endêmica)
***Pronoctiluca pelagica* Fabre-Domérgue**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série
Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA, RN, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Prorocentrum Ehrenb.
18 espécies (nenhuma endêmica)
***Prorocentrum arcuatum* Issel**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série
Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); marinho
***Prorocentrum balticum* (Lohmann) A.R.Loebl.**
Referência: Odebrecht, C. et al. 1995.
Harmful Algal Blooms. 213-218.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Prorocentrum compressum* (Bailey) Abé *ex* Dodge**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências,
Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Prorocentrum cordatum* (Ostenf.) Dodge**
Referência: Odebrecht, C. 1988. Atlantica 10(1): 21-40.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Prorocentrum donghaiense* D. Lu**
Referência: Islabão, C. A. 2008. Estudo do gênero
Prorocentrum na Plataforma Continental do Rio Grande
do Sul. Monografia de Especialização, Universidade
Federal do Rio Grande. p. 47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Prorocentrum emarginatum* Fukuyo**
Referência: Nascimento, S.M. et al. 2008.
Harmful Algae News 37: 1-4.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Prorocentrum fukuyoi* S. Murray & Y. Nagahama**
Referência: Nascimento, S.M. et al. 2009.
Anais 2 Cong. Brasil. Biol. Mar. CD.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); marinho
***Prorocentrum gracile* Schütt**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências,
Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); marinho
***Prorocentrum hoffmannianum* M.A. Faust**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); marinho
***Prorocentrum lima* (Ehrenb.) J.D. Dodge**
Referência: Nascimento, S.M. et al. 2008.
Harmful Algae News 37: 1-4.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); marinho
***Prorocentrum maximum* (Gourret) J. Schiller**
Referência: Brandini, F.P. 1985. Rev. Brasil.
Biol. 45(4): 687-694.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); marinho
***Prorocentrum micans* Ehrenb.**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências,
Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); marinho
***Prorocentrum obtusidens* J. Schiller**
Referência: Brandini, F.P. & Moraes, C.L.B. 1986.
Nerítica 1(3): 9-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); marinho
***Prorocentrum rhathymum* A.R. Loebl. et al.**
Referência: Nascimento, S.M. et al. 2008.
Harmful Algae News 37: 1-4.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

***Prorocentrum rostratum* Stein**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Prorocentrum scutellum* Schröder**
Referência: Islabão, C. A. 2008. Estudo do gênero Prorocentrum na Plataforma Continental do Rio Grande do Sul. Monografia de Especialização, Universidade Federal do Rio Grande. 288 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho
***Prorocentrum sigmoides* Böhm**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 15:1-288.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Prorocentrum triestinum* J.Schiller**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Protoceratium Bergh

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Protoceratium reticulatum* (Clap. & J.Lachm.) Bütschli**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1):3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Protoceratium spinulosum* (G.Murray & F.Whitting) J.Schiller**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Protoperidinium Bergh *emend*. Balech

58 espécies (nenhuma endêmica)
***Protoperidinium achromaticum* (Levander) Balech**
Referência: Torgan, L.C. et al. 2003. Iheringia, Bot. 58(2): 227-250.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Protoperidinium asymmetricum* (Karsten) Balech**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Protoperidinium avellana* (Meunier) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Protoperidinium bispinum* (J. Schiller) Balech**
Referência: Leão, B.M. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22: 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho
***Protoperidinium brevipes* (Paulsen) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Sul (SC); marinho
***Protoperidinium brochii* (Kof. & Swezy) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); marinho
***Protoperidinium cerasus* (Paulsen) Balech**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Protoperidinium claudicans* (Paulsen) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho
***Protoperidinium conicum* (Gran) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Protoperidinium crassipes* (Kof.) Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); marinho
***Protoperidinium cristatum* Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); marinho
***Protoperidinium depressum* (Bailey) Balech**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Protoperidinium diabolus* (Cleve) Balech**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Protoperidinium divaricatum* (Meunier) Parke & Dodge**
Referência: Silva-Cunha, M.G.G. et al. 1987/1989. Trab. Inst. Oceanogr. Univ. Fed. Pernambuco 20: 35-52.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); marinho
***Protoperidinium divergens* (Ehrenb.) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2004. GloBallast Monograph Series 16:1-132.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Protoperidinium excentricum* (Paulsen) Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho
***Protoperidinium globulus* (Stein) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Sul (SC); marinho

***Protoperidinium grande* (Kof.) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Protoperidinium granii* (Ostenf.) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); marinho

***Protoperidinium hirobis* (Abé) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

***Protoperidinium humile* (J.Schiller) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); marinho

***Protoperidinium inclinatum* (Balech) Balech**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); marinho

***Protoperidinium incognitum* Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Protoperidinium latispinum* (Mangin) Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sul (RS); marinho

***Protoperidinium leonis* (Pavill.) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); marinho

***Protoperidinium lipopodium* (Balech) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5: 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); marinho

***Protoperidinium longipes* Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); marinho

***Protoperidinium marielebouriae* (Paulsen) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2004. GloBallast Monograph Series 16: 1-132.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

***Protoperidinium minutum* (Kof.) A.R.Loebl.**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); marinho

***Protoperidinium mite* (Pavill.) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); marinho

***Protoperidinium oblongum* (Auriv.) Parke & Dodge**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2004. GloBallast Monograph Series 16:1-132.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

***Protoperidinium obtusum* (Karsten) Parke & J.D. Dodge**
Referência: Seeliger, U. et al. 1998. Os ecossistemas costeiro e marinho do extremo sul do Brasil. Rio Grande: Ecoscientia. 341 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (RJ); marinho

***Protoperidinium oceanicum* (Vanhöffen) Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); marinho

***Protoperidinium ovatum* C.H.G. Pouchet**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); marinho

***Protoperidinium oviforme* (P.A.Dangeard) Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Protoperidinium ovum* (J.Schiller) Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); marinho

***Protoperidinium parviventer* Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2004. GloBallast Monograph Series 16:1-132.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); marinho

***Protoperidinium pedunculatum* (Schütt) Balech**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA), Nordeste (MA, RN); marinho

***Protoperidinium pellucidum* Bergh *ex* Loebl. Jr. & A.R.Loeb.**
Referência: Villac, M.C. et al. 2008. Biota Neotrop. 8(3): 151-173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

***Protoperidinium pentagonum* (Gran) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Protoperidinium punctulatum* (Paulsen) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); marinho

***Protoperidinium pyriforme* (Paulsen) Balech**
Referência: Scarpati, S.L.R. 2004. Variação temporal e espacial da comunidade fitoplanctônica em área de maricultura no sul do Espirito Santo (Anchieta – ES). Monografia de Bacharelado, Universidade Federal do Espírito Santo. 55 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Protoperidinium pyrum* (Balech) Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Protoperidinium quarnerense* (Schröd.) Balech**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho
***Protoperidinium roseum* (Paulsen) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Protoperidinium simulum* (Paulsen) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2004. GloBallast Monograph Series 16: 1-132.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Protoperidinium sphaeroideum* (Mangin) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Protoperidinium steidingerae* Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Protoperidinium steinii* (Jørgensen) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Protoperidinium subcrassipes* Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Protoperidinium subinerme* (Paulsen) Loeblich III**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (RN), Sul (SC); marinho
***Protoperidinium symmetricum* (Halim) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2004. GloBallast Monograph Series 16:1-132.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Protoperidinium tristylum* (Stein) Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Protoperidinium tuba* (J.Schiller) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1997. Biociências, Porto Alegre 5(1): 3-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Protoperidinium variegatum* (Peters) Balech**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Protoperidinium venustum* (Matzenauer) Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (RS); marinho
***Protoperidinium vulgare* Balech**
Referência: Leão, B.M. et al. 2008. Acta Bot. Brasil. 22: 711-722.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho
***Protoperidinium wiesneri* (J.Schiller) Balech**
Referência: Balech, E. 1988. Los Dinoflagelados del Atlantico Sudoccidental. Publ. Espec. Instituto Español de Oceanografia, Madrid. 310 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Ptychodiscus Stein

1 espécie (não endêmica)
***Ptychodiscus noctiluca* Stein**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); marinho

Pyrocystis J.Murray *ex* Haeckel

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Pyrocystis fusiformis* (Wyville-Thomson *ex* Haeckel) Blackmann**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (CE, RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Pyrocystis gerbaultii* Pavill.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Pyrocystis lunula* (Schütt) Schütt**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2004. GloBallast Monograph Series 16:1-132.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Pyrocystis noctiluca* J. Murray *ex* Haeckel**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); marinho
***Pyrocystis obtusa* Pavill.**
Referência: Brandini, F.P. 1988. Ciência e Cultura 40(4): 334-341.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Pyrocystis robusta* Kof.**
Referência: Brandini, F.P. 1988. Ciência e Cultura 40(4): 334-341.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

Pyrophacus Stein
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pyrophacus horologium* Stein *emend.* Wall & Dale**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Pyrophacus steinii* (J.Schiller) Wall & Dale**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Schuettiella Balech
1 espécie (não endêmica)
***Schuettiella mitra* (Schütt) Balech**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); marinho

Scrippsiella Balech *ex* A.R.Loebl.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Scrippsiella spinifera* Honsell & Cabrini**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2004. GloBallast Monograph Series 16: 1-132.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Scrippsiella trochoidea* (Stein) Balech *ex* Loeblich III**
Referência: Cardoso, L.S. 1998. Biociências, Porto Alegre 6(1): 3-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); marinho

Spiraulax Kof. *emend.* Carbonell-Moore
1 espécie (não endêmica)
***Spiraulax jollifei* (G.Murray & F.Whitting) Kof.**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); marinho

Stylodinium G.A.Klebs
1 espécie (não endêmica)
***Stylodinium globosum* G.A. Klebs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

Tetradinium G.A.Klebs
1 espécie (não endêmica)
***Tetradinium javanicum* G.A. Klebs**
Referência: Albuquerque, C.S. & Menezes, M. 1997. Hoehnea 24(2): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

Thompsodinium Bourr.
1 espécie (não endêmica)
***Thompsodinium intermedium* (Thomps.) Bour.**
Referência: Cardoso, L.S. & Torgan, L.C. 2007. Acta Bot. Brasil. 21(2): 411-419.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Torodinium Kof. & Swezy
1 espécie (não endêmica)
***Torodinium robustum* Kof. & Swezy**
Referência: Brandini, F.P. & Fernandes, L.F. 1996. Rev. Bras. Oceanogr. 44(1): 69-80.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); marinho

Triposolenia Kof.
1 espécie (não endêmica)
***Triposolenia bicornis* Kof.**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Warnowia Lindemann
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Warnowia atra* (Kof. & Swezy) J. Schiller**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Warnowia violescens* Kof. & Swezy**
Referência: Wood, E.J.F. 1968. Dinoflagellates of the Caribbean Sea and adjacent areas. Florida: University of Miami Press, Coral Gables. 145 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); marinho

Woloszynskia R.H.Thompson
1 espécie (não endêmica)
***Woloszynskia neglecta* (Schill.) R.H.Thompson**
Referência: Cardoso, L.S. & Torgan, L.C. 2007. Acta Bot. Brasil. 2(2): 411-419.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

EUGLENOPHYCEAE
Sandra Maria Alves-da-Silva, Mariângela Menezes
20 gêneros, 311 espécies (13 endêmicas), 213 variedades (15 endêmicas)

Anisonema Dujard.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Anisonema acinus* Dujard.**
Referência: Cunha, A.M. 1913. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 5(2): 101-122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Anisonema emarginatum* Stokes**
Referência: Cardoso, M.B. 1979. Ficoflórula da Lagoa de Estabilização de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil, exclusive Bacillariophyceae, Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo. 230 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Astasia Dujard.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Astasia klebsii* Lemmerm.**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado; epicontinental
***Astasia margaritifera* Schmarda**
Referência: Cunha, A.M. 1913. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 5(2): 522-524.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Colacium Ehrenb.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Colacium sideropus* Skuja**
Referência: Beyruth, Z. 1996. Comunidades fitoplanctônicas da represa de Guarapiranga:1991-1992. Aspectos ecológicos, sanitários e subsídios para reabilitação da qualidade ambiental. Tese Doutorado, Universidade de São Paulo. 191 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Colacium vesiculosum* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Cryptoglena Ehrenb. *emend*. Kosmala & Zakrys

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cryptoglena pigra* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Cryptoglena skujae* Marin & Melkonian**
Referência: Alves-da-Silva & Bicudo, C.E. 2009. Rev. bras. bot. 32(2): 253-270.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Cyclidiopsis Korshikov

1 espécie (não endêmica)
***Cyclidiopsis acus* Korshikov**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Friedrich, F. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(4): 1076-1083.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Discoplastis Triemer

1 espécie (não endêmica)
***Discoplastis spathirhyncha* (Skuja) Triemer**
Referência: Uherkovich, G. 1981. Amazoniana 7(2): 191-219.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

Entosiphon Stein

8 espécies (nenhuma endêmica)
***Entosiphon danielli* Skvortzov & Noda**
Referência: Skvortzov, B.V. & Noda, M. 1968. J. Jap. Bot. 43(6): 164-168.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Entosiphon ellipticum* Skvortzov & Noda**
Referência: Skvortzov, B.V. & Noda, M. 1968. J. Jap. Bot. 43(6): 164-168.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Entosiphon limae* Skvortzov & Noda**
Referência: Skvortzov, B.V. & Noda, M. 1968. J. Jap. Bot. 43(6): 164-168.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Entosiphon longistriatum* Skvortzov & Noda**
Referência: Skvortzov, B.V. & Noda, M. 1698. J. Jap. Bot. 43(6): 164-168.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Entosiphon milanezii* Skvortzov & Noda**
Referência: Skvortzov, B.V. & Noda, M. 1968. J. Jap. Bot. 43(6): 164-168.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Entosiphon rotundatum* Skvortzov & Noda**
Referência: Skvortzov, B.V. & Noda, M. 1968. J. Jap. Bot. 43(6): 164-168.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Entosiphon subrotundatum* Skvortzov & Noda**
Referência: Skvortzov, B.V. & Noda, M. 1968. J. Jap. Bot. 43: 164-168.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Entosiphon sulcatum* (Dujard.) Stein**
Referência: Cunha, A.M. 1913. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 5(2): 101-122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental

Euglena Ehrenb.

41 espécies (nenhuma endêmica), 26 variedades (nenhuma endêmica)
***Euglena acus* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euglena acus* Ehrenb. var. *acus
Referência: Alves-da-Silva, S.M. et al. 2008. Iheringia, Bot. 63(1): 15-36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Euglena acus* var. *longissima* Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Euglena acus* var. *rigida* Hübner**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena agilis* H.J. Carter**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Euglena allorgei* Deflandre**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
Euglena allorgei* Deflandre var. *allorgei
Referência: Alves-da-Silva, S.M. 1988. Levantamento taxonômico e variação temporal das Euglenophyceae de um reservatório raso no município de Triunfo, Estado do Rio Grande do Sul. Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista. 481 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Euglena bonettoi* (Tell & Zalocar) Couté & Thérézien**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Crossetti, L.O. 1999. Hoehnea 26(1): 47-60.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Pampa, Pantanal; epicontinental
***Euglena cantabrica* E.G.Pringsh. *emend*. Zakrýs & Kosmala**
Referência: Cardoso, M.B. 1984. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (DF); Cerrado; epicontinental
***Euglena caudata* Hübner**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena clara* Skuja**
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado; epicontinental
***Euglena communis* Gojdics**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Euglena deses* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euglena deses* var. *intermedia* G.A.Klebs**
Referência: Alves-da-Silva & Bicudo, C.E. 2009. Hoehnea 29(2): 79-91.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Euglena ehrenbergii* G.A.Klebs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Euglena elastica* Prescott**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1994. Rev. Brasil. Biol. 54(2): 345-363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental
***Euglena gaumei* P.Allorge & M.Lefèvre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Hahn, A. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(1): 123-140.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Euglena geniculata* Schmitz *emend*. Zakrýs & Kosmala**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena gracilis* G.A.Klebs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena granulata* (G.A.Klebs) Schmitz**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena hemichromata* Skuja**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Hahn, A. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(1): 123-140.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Euglena laciniata* E.G. Pringsh.**
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado; epicontinental
***Euglena limnophila* Lemmerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euglena limnophila* Lemmerm. var. *limnophila
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Euglena limnophila* var. *minor* Drezep.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Euglena magnifica* E.G. Pringsh.**
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado; epicontinental
***Euglena minuta* Prescott**
Referência: Keppeler, E.C. et al. 2002. Rev. Brasil. Biol. 59(4): 679-686.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia; epicontinental
***Euglena mutabilis* Schmitz**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euglena mutabilis* Schmitz var. *mutabilis
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Euglena oxyuris* Schmarda**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euglena oxyuris* var. *charkowiensis* Bourr.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Hahn, A. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(1): 123-140.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Euglena oxyuris* var. *minor* Prescott**
Referência: Keppeler, E.C. et al. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(4): 679-686.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia; epicontinental
Euglena oxyuris* Schmarda var. *oxyuris
Referência: Alves-da-Silva, S.M. et al. 2008. Iheringia, Bot. 63(1): 15-36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Euglena polymorpha* P.A.Dang.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Euglena pringsheimii* Skvortzov**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
***Euglena pringsheimii* var. *armata* Skvortzov**
Referência: Skvortzov, B.V. 1967. Nova Hedwigia 14: 379-386.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
Euglena pringsheimii* Skvortzov var. *pringsheimii
Referência: Skvortzov, B.V. 1967. Nova Hedwigia 14: 379-386.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena pringsheimii* var. *punctato-striata* Skvortzov**
Referência: Skvortzov, B.V. 1967. Nova Hedwigia 14: 379-386.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena pringsheimii* var. *rubra* Skvortzov**
Referência: Skvortzov, B.V. 1967. Nova Hedwigia 14: 379-386.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena pringsheimii* var. *subconstricta* Skvortzov**
Referência: Skvortzov, B.V. 1967. Nova Hedwigia 14: 379-386.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena pringsheimii* var. *trichita* Skvortzov**
Referência: Skvortzov, B.V. 1967. Nova Hedwigia 14: 379-386.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena pringsheimii* var. *vacuolaria* Skvortzov**
Referência: Skvortzov, B.V. 1967. Nova Hedwigia 14: 379-386.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena proxima* P.A.Dang.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Euglena pusilla* Playfair**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
***Euglena pusilla* var. *longa* Playfair**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Euglena repulsans* J.Schiller *ex* Hub.-Pest.**
Referência: Alves-da-Silva & Bicudo, C.E. 2002. Hoehnea 29(2): 79-91.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Euglena rostrifera* L.P.Johnson**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. 1998. Levantamento taxonômico e variação temporal das Euglenophyceae de um reservatório raso no município de Triunfo, Estado do Rio Grande do Sul. Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista. 481 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Euglena sanguinea* Ehrenb.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Euglena sociabilis* P.A.Dang.**
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado; epicontinental
***Euglena spirogyra* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euglena spirogyra* var. *fusca* G.A.Klebs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Euglena spirogyra* var. *magnifica* Uherkovich**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Euglena spirogyra* var. *marchica* Lemmerm.**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
Euglena spirogyra* Ehrenberg var. *spirogyra
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Euglena splendens* P.A.Dang.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Euglena subehrenbergii* Skuja**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Euglena terricola* P.A.Dang.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena texta* (Dujard.) Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena tripteris* (Dujard.) G.A.Klebs**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euglena tripteris* (Dujard.) G.A.Klebs var. *tripteris
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Euglena tristella* Chu *emend*. Zakrýs & Kosmala**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena tuba* H.J.Carter *emend*. Philipose**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euglena tuba* var. *pseudotuba* (Hub.-Pest.) Philipose**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena variabilis* G.A.Klebs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Euglena velata* G.A.Klebs**
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado; epicontinental
***Euglena viridis* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euglena viridis* Ehrenb. var. *viridis
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Fortuna, J.R. 2006. Acta Bot. Brasil. 20(2): 411-422.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa; epicontinental

Eutreptia Perty

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Eutreptia lanowii* Steuer**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Eutreptia viridis* Perty**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Hyalophacus E.G.Pringsh.

1 espécie (não endêmica)
***Hyalophacus ocelatus* E.G.Pringsh.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 75-96.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Lepocinclis Perty

23 espécies (1 endêmica), 19 variedades (nenhuma endêmica)
***Lepocinclis acuta* Prescott**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Lepocinclis americana* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Lepocinclis autumnalis* Chu**
Referência: Menezes, M. & Fernandes, V.O. 1987. Rickia 14: 53-71.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal; epicontinental
***Lepocinclis boseensis* Xie et al.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Fortuna, J.R. 2006. Acta Bot. Brasil. 20(2): 411-422.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Lepocinclis capito* Wehrle**
Referência: Menezes, M. & Fernandes, V.O. 1989. Hoehnea 16: 35-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal; epicontinental

***Lepocinclis caudata* (A.M.Cunha) W.Conrad**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Lepocinclis claviformis* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Domínio desconhecido; epicontinental

***Lepocinclis cylindrica* (Korshikov) Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Ferraz, G.C. 1991. Hoehnea 18(1): 135-143.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Lepocinclis fusiformis* (H.J.Carter) Lemmerm. *emend.* W.Conrad**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Lepocinclis fusiformis* var. *amphirhynchus* Nygaard**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

Lepocinclis fusiformis* (H.J.Carter) Lemmerm. *emend.* W.Conrad var. *fusiformis
Referência: Alves-da-Silva, S.M. 1988. Levantamento taxonômico e variação temporal das Euglenophyceae de um reservatório raso no município de Triunfo, Estado do Rio Grande do Sul. Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista. 481 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Lepocinclis globosa* Francé**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Lepocinclis mammillata* A.M.Cunha**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Lepocinclis marssonii* Lemmerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Lepocinclis marssonii* var. *inflata* W.Conrad**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Lepocinclis *nayali* W.Conrad
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Lepocinclis ovum* (Ehrenb.) Lemmerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Lepocinclis ovum* var. *buetschlii* (Lemmerm.) Conrad**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

***Lepocinclis ovum* var. *caudata* Chu**
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado; epicontinental

***Lepocinclis ovum* var. *conica* P.Allorge & M.Lefèvre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

***Lepocinclis ovum* var. *deflandriana* (Ehrenb.) Lemmerm.**
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado; epicontinental

***Lepocinclis ovum* var. *dimidido-minor* Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Lepocinclis ovum* var. *globula* (Perty) Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Lepocinclis ovum* (Ehrenb.) Lemmerm. var. *ovum
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Lepocinclis paxilliformis* Playfair**
Referência: Menezes, M. et al. 1995. Hoehnea 22(1):1-15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado; epicontinental

***Lepocinclis piriformis* A.M. Cunha**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Lepocinclis playfairiana* Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Lepocinclis playfairiana* var. *striata* Conforti**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Fortuna, J.R. 2006. Acta Bot. Brasil. 20(2): 411-422.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Lepocinclis pseudo-ovum* W. Conrad**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

***Lepocinclis salina* F.E. Fritsch**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Lepocinclis salina* var. *caudata* Conforti**
Referência: Conforti, V. 2004. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Lepocinclis salina* var. *papulosa* W. Conrad**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Laitano, C.S. 1994. Iheringia, Bot. 45: 89-116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
Lepocinclis salina* F.E. Fritsch var. *salina
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Lepocinclis salina* var. *vallicauda* W. Conrad**
Referência: Conforti, V. 2004. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental
***Lepocinclis steinii* Lemmerm. *emend*. W. Conrad**
Distribuição: nativa; não endêmica
Lepocinclis steinii* Lemmermann *emend*. Conrad var. *steinii
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Lepocinclis steinii* var. *suecica* Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Lepocinclis teres* (Schmitz) Francé**
Distribuição: nativa; não endêmica
Lepocinclis teres* (Schmitz) Francé var. *teres
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Lepocinclis truncata* A.M.Cunha**
Distribuição: nativa; não endêmica
Lepocinclis truncata* A.M.Cunha var. *truncata
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Tamanaha, M. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(1): 145-163.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental
***Lepocinclis turbiniformis* Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

Menoidium Perty

4 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Menoidium gracile* Playfair**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Friedrich, F. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(4): 1076-1083.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Menoidium obtusum* E.G.Pringsh.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Friedrich, F. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(4): 1076-1083.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Domínio desconhecido; epicontinental
***Menoidium pellucidum* Perty**
Referência: Cunha, A.M. 1913. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 5(2): 522-524.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Menoidium tortuosum* (Stokes) Lemmerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Menoidium tortuosum* var. *playfairii* Bourr.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Friedrich, F. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(4): 1076-1083.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Monomorphina Mereschk. *emend*. Kosmala & Zakrys

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Monomorphina aenigmatica* (Drezep.) Nuldeman & Triemer *emend*. Kosmala & Zakrys**
Referência: Kosmala, S. et al. 2007. J. Phycol. 43: 171-185.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Monomorphina nordstedtii* (Lemmerm.) T.G.Popova**
Referência: Alves-da-Silva & Bicudo, C.E. 2009. Rev. bras. bot. 32(2): 253-270.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido; epicontinental
***Monomorphina pyrum* (Ehrenb.) Mereschk. *emend*. Kosmala & Zakrys**
Referência: Alves-da-Silva & Bicudo, C.E. 2009. Rev. bras. bot. 32(2): 253-270.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

Peranema Dujard.

1 espécie (não endêmica)
***Peranema trichophorum* (Ehrenb.) Stein**
Referência: Cunha, A.M. 1913. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 5(2): 522-524.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Petalomonas Stein

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Petalomonas mediocanellata* Stein**
Referência: Cunha, A.M. 1913. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 5(2): 101-122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Petalomonas platyrhyncha* Skuja**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. 1998. Levantamento taxonômico e variação temporal das Euglenophyceae de um reservatório raso no município de Triunfo, Estado do Rio Grande do Sul. Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista. 481 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Petalomonas steinii* G.A.Klebs**
Referência: Cunha, A.M. 1913. Mem. Inst. Oswaldo Cruz 5(2): 522-524.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Phacus Dujard.

67 espécies (5 endêmicas), 32 variedades (5 endêmicas)
***Phacus acuminatus* Stokes**
Distribuição: nativa; não endêmica
Phacus acuminatus* Stokes var. *acuminatus
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1994. Iheringia, Bot. 44: 45-83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PE), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Phacus acuminatus* var. *acuticauda* (Roll) Pochm.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. et al. 1991. Rev. Brasil. Biol. 51(4): 813-828.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Phacus acuminatus* var. *brasiliensis* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus acuminatus* var. *discifera* (Pochm.) Hub.-Pest.**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus acuminatus* var. *parvulus* Weik**
Referência: Albuquerque, C.S. & Menezes, M. 1997. Hoehnea 24(2): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia; epicontinental
***Phacus acuminatus* var. *variabilis* (Lemmerm.) Pochm.**
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (RS); Cerrado, Pampa; epicontinental
***Phacus alatus* G.A.Klebs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Phacus angulatus* Pochm.**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus ankylonoton* Pochm.**
Referência: Cecy, I.I.T. 1990. Arq. Biol. Tecnol. 33(1): 1-79.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Phacus anomalus* F.E.Fritsch & M.F.Rich**
Distribuição: nativa; não endêmica
Phacus anomalus* F.E.Fritsch & M.F.Rich var. *anomalus
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Phacus asymetricus* Sokoloff**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. et al. 2008. Iheringia, Bot. 63(1): 15-36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Phacus bacillifer* A.M.Cunha**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Phacus balatonicus* Hortob.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Phacus balatonicus* var. *minor* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus brackykentron* Pochm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Phacus brevicaudatus* (G.A.Klebs) Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Phacus caudatus* Hübner**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Phacus caudatus* var. *minor* Drezep.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1994. Iheringia, Bot. 44: 45-83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Phacus circumflexus* Pochm.**
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (RS); Cerrado, Pampa; epicontinental
***Phacus contortus* Bourr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Phacus contortus* var. *complicata* Bourr.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1994. Iheringia, Bot. 44: 45-83.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
Phacus contortus* Bourr. var. *contortus
Referência: Menezes, M. & Fernandes, V.O. 1989. Hoehnea 16: 35-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (SC); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Phacus curvicauda* Swirenko**
Distribuição: nativa; não endêmica
Phacus curvicauda* Swirenko var. *curvicauda
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Tamanaha, M. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(1): 145-163.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Domínio desconhecido; epicontinental

***Phacus dangeardi* Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Phacus denisii* P.Allorge & M.Lefèvre**
Referência: Menezes, M. et al. 1995. Hoehnea 22(1):1-15
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Phacus ephippioideus* D.C.Bicudo & C.E.M.Bicudo**
Referência: Xavier, M.B. 1993. Acta Limn. Bras. 6: 11-30.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Phacus ephippion* Pochm.**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Phacus formosus* Pochm.**
Referência: Menezes, M. et al. 1995. Hoehnea 22(1-2): 1-15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus gigas* A.M.Cunha**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Phacus glaber* (Deflandre) Pochm.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Iheringia, Bot. 59(4): 679-686.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Phacus granum* Drezep.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. et al. 1991. Rev. Brasil. Biol. 51(4): 813-828.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental
***Phacus gregusii* Hortob.**
Referência: Menezes, M. et al. 1995. Hoehnea 22(1-2): 1-15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus hamatus* Pochm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Phacus hamelii* P.Allorge & M.Lefèvre**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Phacus hispidula* Eichw.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Phacus horridus* Pochm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Phacus horridus* var. *major* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus ichthydion* Pochm.**
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (RS); Cerrado, Pampa; epicontinental
***Phacus incrassatus* (Deflandre) Pochm.**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus indicus* Skvortzov**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus inflexus* (Kisselev) Pochm.**
Referência: Menezes, M. & Fernandes, V.O. 1989. Hoehnea 16: 35-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Pampa, Pantanal; epicontinental
***Phacus lefevrei* Bourr.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Phacus lismorensis* Playfair**
Referência: Menezes, M. & Fernandes, V.O. 1989. Hoehnea 16: 35-55.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Amazônia, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Phacus longicauda* (Ehrenb.) Dujard.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Phacus longicauda* var. *attenuata* (Pochm.) Hub.-Pest.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Phacus longicauda* var. *insecta* Koczw.**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental
Phacus longicauda* (Ehrenb.) Dujard. var. *longicauda
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Phacus longicauda* var. *major* Swirenko**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Iheringia, Bot. 59(4): 679-686.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Phacus longicauda* var. *rotunda* Huber-Pestalozzi**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Phacus longicauda* var. *tortus* Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Phacus mangini* Lefèvre**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Phacus mangini* var. *inflata* Nygaard**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1994. Iheringia, Bot. 44: 45-83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Phacus margaritatus* Pochm.**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

***Phacus mariae* Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 75-96.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Phacus megapyrenoides* Roll**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 75-96.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Phacus minusculus* Pochm.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1994. Iheringia, Bot. 44: 45-83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Phacus minutus* (Playfair) Pochm.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1994. Iheringia, Bot. 44: 45-83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Phacus mirabilis* Pochm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Phacus onyx* Pochm.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Phacus onyx* Pochm. var. *onyx
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Laitano, C.S. 1994. Iheringia, Bot. 45: 89-116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Phacus onyx* var. *symetrica* Tell & Zalocar**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1994. Iheringia, Bot. 44: 45-83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Phacus orbicularis* Hübner**
Distribuição: nativa; não endêmica

Phacus orbicularis* Hübner var. *orbicularis
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Tamanaha, M. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(1): 145-163.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Phacus parvulus* G.A.Klebs**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Phacus platalea* Drezep.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Phacus platalea* var. *major* Poucques**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1994. Iheringia, Bot. 44: 45-83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Phacus platalea* var. *tiszae* Hortob.**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Phacus platyaulax* Pochm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Phacus pleuronectes* (O.F.Müller) Dujardin**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Phacus polytrophos* Pochm.**
Referência: Menezes, M. et al. 1995. Hoehnea 22(1):1-15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Pampa; epicontinental

***Phacus pseudobicarinatus* Alves-da-Silva & C.E.M.Bicudo**
Referência: Alves-da-Silva & Bicudo, C.E. 2009. Rev. Brasil. Biol. 32(2): 253-270.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Phacus pusillus* Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Phacus pygmaeus* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Phacus quinquemarginatus* T.L.Jahn & Shawhan**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus raciborskii* Drezep.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Phacus raciborskii* var. *longus* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. rop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental
***Phacus rodriguesiae* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental
***Phacus rostafinskii* Drezep.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Fortuna, J.R. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(3): 684-700.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Phacus segretii* P.Allorge & M.Lefèvre**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Phacus segretii* var. *major* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus sesquistortus* Pochm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Phacus sesquistortus* var. *multiannulatus* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus skujae* Skvortzov**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Laitano, C.S. 1994. Iheringia, Bot. 45: 89-116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Phacus stokesii* Lemmerm.**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
***Phacus stokesii* var. *minor* W.Conrad**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Phacus suecicus* Lemmerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Phacus suecicus* var. *inermis* Nygaard**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Phacus suecicus* var. *oidion* Pochm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Phacus suecicus* Lemmerm. var. *suecicus
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Phacus textus* Pochm.**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus trimarginatus* Allegre & Jahn**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1994. Iheringia, Bot. 44: 45-83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Phacus triqueter* (Ehrenb.) Dujard.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Phacus tropicalis* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Phacus undulatus* (Skvortzov) Pochm.**
Referência: Conforti, V. 1994. Rev. Hydrobiol. trop. 27(1): 3-21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental
***Phacus unguis* Pochm.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. et al. 1991. Rev. Brasil. Biol. 51(4): 813-828.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental
***Phacus wettsteini* Drezep.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1994. Iheringia, Bot. 44: 45-83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Rhabdomonas Fres.

1 espécie (não endêmica)
***Rhabdomonas incurva* Fres.**
Referência: Bittencourt-Oliveira, M.C. 1997. Hoehnea 24(1): 21-35.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

Scytomonas Stein

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Scytomonas pusilla* Stein**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Scytomonas pusilla* var. *sarmatica* Drezep.**
Referência: Bittencourt-Oliveira, M.C. 1997. Hoehnea 24(1): 21-35.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

Strombomonas Deflandre

46 espécies (5 endêmicas), 34 variedades (3 endêmicas)
***Strombomonas acuminata* (Schmarda) Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Strombomonas acuminata* var. *amphora* Playfair**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 47-60.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Strombomonas asymetrica* (Roll) T.G.Popova**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Strombomonas australica* (Playfair) Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

Strombomonas australica* (Playfair) Deflandre var. *australica
Referência: Menezes, M. & Fernandes, V.O. 1989. Hoehnea 16: 35-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal; epicontinental

***Strombomonas balvayi* Bourr. & Couté**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas borystheniensis* (Roll) T.G.Popova**
Distribuição: nativa; não endêmica

Strombomonas borystheniensis* (Roll) Popova var. *borystheniensis
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Tamanaha, M. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(1): 145-163.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental

***Strombomonas brasiliensis* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas brevicaudata* Conforti & Joo**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas carinata* Alves-da-Silva & C.E.M.Bicudo**
Referência: Alves-da-Silva & Bicudo, C.E. 2003. Acta Bot. Brasil. 17(1): 147-154.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Strombomonas chodatii* (Skvortzov) Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Cerrado, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Strombomonas confortii* Zalocar**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Strombomonas costata* Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

Strombomonas costata* Deflandre var. *costata
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Tamanaha, M. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(1): 145-163.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental

***Strombomonas cuneata* (Playfair) Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Strombomonas cylindrica* Conforti & Joo**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Strombomonas cylindrica* var. *minor* Conforti & Joo**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas deflandrei* (Roll) Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Strombomonas elegans* Conforti & Joo**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Strombomonas ensifera* (Daday) Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Strombomonas ensifera* var. *brasiliensis* Uherkovich**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas eurystoma* (Stein) T.G.Popova**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Strombomonas ferrazi* Alves-da-Silva & C.E.M.Bicudo**
Referência: Alves-da-Silva & Bicudo, C.E. 2003. Acta Bot. Brasil. 17(1): 147-154.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Strombomonas fluviatilis* (Lemmerm.) Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Strombomonas fluviatilis* var. *curvata* (Lemmerm.) Deflandre**
Referência: Franceschini, I.M. 1992. Biblioth. Phycol. 92: 1-81.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido; epicontinental

***Strombomonas fluviatilis* var. *elegans* Drezep.**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

Strombomonas fluviatilis* (Lemmerm.) Deflandre var. *fluviatilis
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Strombomonas fluviatilis* var. *levis* (Lemmerm.) Skvortzov**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Strombomonas fluviatilis* var. *major* Conforti**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Strombomonas fluviatilis* var. *rugosa* Prescott**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. et al. 1991. Rev. Brasil. Biol. 51(4): 813-828.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Strombomonas gibberosa* (Playfair) Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

Strombomonas gibberosa* (Playfair) Deflandre var. *gibberosa
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Tamanaha, M. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(1): 145-163.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental

***Strombomonas gibberosa* var. *longicollis* (Playfair) Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Strombomonas gibberosa* var. *major* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas girardiana* (Playfair) Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

Strombomonas girardiana* (Playfair) Deflandre var. *girardiana
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Tamanaha, M. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(1): 145-163.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Strombomonas girardiana* var. *triondulata* Tell & Zalocar**
Referência: Jati, S. & Train, S. 1994. Iheringia, Bot. 45: 117-142.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Strombomonas globulosa* Conforti & Joo**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Strombomonas jaculata* (Palmer) Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Strombomonas lanceolata* (Playfair) Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Strombomonas massartii* Hub.-Pest.**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas maxima* (Skvortzov) Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Strombomonas minuta* Conforti & Joo**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas morenensis* Balech & Dastugue**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Strombomonas napiformis* (Playfair) Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Strombomonas napiformis* var. *brevicollis* Playfair**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Strombomonas ovalis* (Playfair) Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Strombomonas planctonica* (Wołłosz.) T.G.Popova**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Strombomonas planctonica* var. *bucharica* (Kisselev) T.G.Popova**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas praeliaris* (Palmer) Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas quadrangularis* Menezes**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Strombomonas rotunda* (Playfair) Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

Strombomonas rotunda* (Playfair) Deflandre var. *rotunda
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Tamanaha, M. 2008. Acta Bot. Brasil. 22(1): 145-163.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

***Strombomonas scabra* (Playfair) Tell & Conforti**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Strombomonas scabra* var. *coberensis* (Deflandre) Tell & Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas scabra* var. *cordata* (Playfair) Tell & Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas scabra* var. *coronata* Conforti & Joo**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 1993. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Strombomonas scabra* var. *intermedia* (Yacubson) Tell & Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Strombomonas scabra* var. *labiata* (Hub.-Pest.) Tell & Conforti**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Iheringia, Bot. 59(1): 75-96.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Strombomonas scabra* var. *longicollis* (Playfair) Tell & Conforti**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Strombomonas scabra* var. *ovata* (Playfair) Tell & Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

Strombomonas scabra* (Playfair) Tell & Conforti var. *scabra
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Strombomonas schauinslandii* (Lemmerm.) Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Strombomonas simplex* Alves-da-Silva & C.E.M.Bicudo**
Referência: Alves-da-Silva & Bicudo, C.E. 2006. Algol. Stud. 119: 29-58.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Strombomonas tambowika* (Swirenko) Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas tellii* Zalocar**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas tetraptera* Balech & Dastugue**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Strombomonas tetraptera* var. *gallica* Bourr. & Couté**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Strombomonas treubii* (Wołłosz.) Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

Strombomonas treubii* (Wołłosz.) Deflandre var. *treubii
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Strombomonas triquetra* (Playfair) Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Strombomonas triquetra* var. *torta* Rino**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Bridi, F.C. 2004. Acta Bot. Brasil. 18(3): 555-572.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Strombomonas tuberosa* (Skvortzov) Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. Kurrle, I.L.P. 2009. Acta Bot. Brasil. 23(4): 944-955.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Strombomonas urceolata* (Stokes) Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Strombomonas vaseformis* Philipose**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Strombomonas verrucosa* (Daday) Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Strombomonas verrucosa* var. *genuina* Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(3): 187-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

Strombomonas verrucosa* (Daday) Deflandre var. *verrucosa
Referência: Alves-da-Silva, S.M. 1998. Levantamento taxonômico e variação temporal das Euglenophyceae de um reservatório raso no município de Triunfo, Estado do Rio Grande do Sul. Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista. 481 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa; epicontinental

***Strombomonas verrucosa* var. *zmiewika* (Swirenko) Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Trachelomonas Ehrenb.

100 espécies (2 endêmicas), 100 variedades (7 endêmicas)

***Trachelomonas abrupta* Swirenko *emend*. Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas abrupta* var. *arcuata* (Playfair) Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. rop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN); Amazônia, Caatinga; epicontinental

***Trachelomonas abrupta* var. *obesa* (Playfair) Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas acanthophora* Stokes**
Distribuição: nativa; não endêmica

Trachelomonas acanthophora* Stokes var. *acanthophora
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas acanthophora* var. *minor* Balech & Dastugue**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas acanthophora* var. *speciosa* Balech & Dastugue**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Avila, I.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas acanthostoma* Stokes**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas acanthostoma* var. *minor* Drezep.**
Referência: Giani, A. et al. 1999. Rev. bras. bot. 22(2): 107-116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica; epicontinental

***Trachelomonas affinis* Lemmerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas affinis* var. *levis* Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Trachelomonas allia *Drezep. emend*. Deflandre
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, DF), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas allorgei* Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas allorgei* var. *molesta* (Deflandre) Balech**
Referência: Menezes, M. & Fernandes, V.O. 1989. Hoehnea 16: 35-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas allorgei* var. *sparsispina* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas amazonensis* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas amphoriformis* O. Tafall**
Distribuição: nativa; não endêmica

Trachelomonas amphoriformis* O. Tafall var. *amphoriformis
Referência: Menezes, M. & Fernandes, V.O. 1989. Hoehnea 16: 35-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas amphoriformis* var. *granulosa* Couté & Iltis**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. 2007. Rev. bras. Bioc. 5(2): 522-524.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas amphoriformis* var. *spinosa* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas angustispina* Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas angustispina* var. *unicoronata* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas argentinensis* (Garcia de Emiliani) Conforti & Nudelmann**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Crossetti, L.O. 1999. Hoehnea 26(1): 47-60.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas armata* (Ehrenb.) Stein**
Distribuição: nativa; não endêmica

Trachelomonas armata* (Ehrenb.) Stein var. *armata
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Reis, J.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas armata* var. *duplex* Playfair**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

***Trachelomonas armata* var. *gordeievi* Skvortzov**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas armata* var. *litoralensis* Tell & Zalocar**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas armata* var. *longispina* Playfair *emend*. Deflandre**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Amazônia, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas armata* var. *sparsigranosa* Deflandre**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas armata* var. *steinii* Lemmerm. *emend*. Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido; epicontinental

***Trachelomonas aspera* A.M. Cunha**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Trachelomonas australica* (Playfair) Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas australica* var. *rectangularis* Deflandre**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas bacillifera* Playfair**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas bacillifera* var. *bacillicollis* Uherk.**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas bacillifera* var. *collifera* Huber-Pestalozzi**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas bacillifera* var. *globulosa* Playfair**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas bacillifera* var. *minima* Playfair**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Avila, I.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (DF), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas bacillifera* var. *ovalis* Playfair**
Referência: Franceschini, I.M. 1992. Biblioth. Phycol. 92: 1-81.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas bacillifera* var. *victoria* Tell & Zalocar**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Trachelomonas balechii* Tell**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. et al. 2008. Iheringia, Bot. 63(1): 15-36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas bernadinensis* W.Vischer *emend*. Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

Trachelomonas bernadinensis* W. Vischer *emend*. Deflandre var. *bernadinensis
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Trachelomonas bernardii* Wołłosz.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Trachelomonas bernardii* Wołłosz. var. *bernardii
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas bulla* Stein *emend*. Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

Trachelomonas bulla* Stein *emend*. Deflandre var. *bulla
Referência: Alves-da-Silva, S.M. et al. 2008. Iheringia, Bot. 63(1): 15-36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas bulla* var. *minor* Conforti**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1994. Iheringia, Bot. 44: 45-83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas caudata* (Ehrenb.) Stein**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Crossetti, L.O. 1999. Hoehnea 26(1): 47-60.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas cervicula* Stokes**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas charkowiensis* Swirenko**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas charkowiensis* var. *spinicollis* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas conica* Playfair**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (DF), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas cordata* (Drezep.) Deflandre**
Referência: Albuquerque, C.S. & Menezes, M. 1997. Hoehnea 24(2): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas crispa* Balech**
Referência: De-Lamonica-Friere, E.M. et al. 1992. Rev. Brasil. Biol. 52(1): 141-149.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Pampa, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas cupula* Deflandre**
Referência: Jati, S. & Train, S. 1994. Iheringia, Bot. 45: 117-142.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Trachelomonas curta* A.M. Cunha *emend*. Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

Trachelomonas curta* A.M.Cunha *emend*. Deflandre var. *curta
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas curta* var. *minima* Tell & Zalocar**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas curta* var. *punctata* Skvortzov**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas curta* var. *tubigera* Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas cylindracea* (Playfair) T.G.Popova**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Schüller-da-Silva, A. 2007. Acta Bot. Brasil. 21(2): 401-409.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas cylindrica* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Trachelomonas cylindrica* Ehrenb. var. *cylindrica
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Avila, I.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas cylindrica* var. *decollata* Playfair**
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado; epicontinental

***Trachelomonas dangeardiana* Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas dangeardiana* var. *glabra* (Playfair) Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Crossetti, L.O. 1999. Hoehnea 26(1): 47-60.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas dastuguei* Balech**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Amazônia, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas decora* Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Fernandes, V.O. 1989. Hoehnea 16: 35-55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Amazônia, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas dubia* Swirenko *emend*. Deflandre**
Referência: Freire de Góis, S.A. 1978. Rev. Nord. Biol. 1(1): 21-29.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica; epicontinental

***Trachelomonas duquei* Conforti & Nudelmann**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Schüller-da-Silva, A. 2007. Acta Bot. Brasil. 21(2): 401-409.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas dybowskii* Drezep.**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas echinata* A.M.Cunha**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas globularis* (Awerinzew) Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas gracilis* (Playfair) Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido; epicontinental

T***rachelomonas granulata* Swirenko *emend*. Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

Trachelomonas granulata* Swirenko *emend*. Deflandre var. *granulata
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Schüller-da-Silva, A. 2007. Acta Bot. Brasil. 21(2): 401-409.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas granulata* var. *poltavica* Swirenko**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Trachelomonas helvetica* Lemmerm. *emend*. Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Schüller-da-Silva, A. 2007. Acta Bot. Brasil. 21(2): 401-409.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas hemisphaerica* Garcia-de-Emiliani**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas hexangulata* Swirenko**
Distribuição: nativa; não endêmica
Trachelomonas hexangulata* Swirenko var. *hexangulata
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Trachelomonas hirta* A.M.Cunha**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas hirta* var. *duplex* Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas hirta* var. *obesa* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas hispida* (Perty) Stein *emend.* Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas hispida* var. *acuminata* Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Avila, I.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas hispida* var. *coronata* Lemmerm.**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas hispida* var. *crenulatocollis* (Maskell) Lemmerm.**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Trachelomonas hispida* var. *duplex* Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
Trachelomonas hispida* (Perty) Stein *emend.* Deflandre var. *hispida
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Trachelomonas hispida* var. *punctata* Lemmerm.**
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF); Cerrado, Pantanal; epicontinental
***Trachelomonas horrida* Palmer**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas horrida* var. *spinicollis* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas intermedia* P.A. Dang.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Trachelomonas intermedia* P.A.Dang. var. *intermedia
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Trachelomonas irregularis* Swirenko**
Referência: Menezes, M. et al. 1995. Hoehnea 22(1-2): 1-15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas janczewskii* Drezep.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas janczewskii* var. *minor* Drezep.**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas kellogii* Skvortzov *emend.* Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas kellogii* var. *effigurata* Skvortzov**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas kellogii* var. *nana* Balech**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas klebsii* Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas lacustris* Drezep.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Trachelomonas lacustris* Drezep. var. *lacustris
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas lefevrei* Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas lemmermannii* Wołłosz. *emend.* Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas lemmermannii* var. *acuminata* Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
Trachelomonas lemmermannii* Wołłosz. *emend.* Deflandre var. *lemmermannii
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas magdaleniana* Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Trachelomonas malum* W. Conrad**
Referência: Jati, S. & Train, S. 1994. Iheringia, Bot. 45: 117-142.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Trachelomonas megalacantha* A.M.Cunha**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas megalacantha* var. *crenulatocollis* Bourr.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Trachelomonas megalacantha* A.M.Cunha var. *megalacantha
Referência: De-Lamonica-Friere, E.M. et al. 1992. Rev. Brasil. Biol. 52(1): 141-149.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Pampa, Pantanal; epicontinental
***Trachelomonas minuscula* Drezep.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas minuscula* var. *glans* Balech**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Trachelomonas mirabilis* Swirenko**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas mirabilis* var. *minor* Woronichin**
Referência: Sant'Anna, C.L. et al. 1988. Rev. Brasil. Biol. 48(1): 83-102.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Trachelomonas molesta* Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Crossetti, L.O. 1999. Hoehnea 26(1): 47-60.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Pampa, Pantanal; epicontinental
***Trachelomonas naviculiformis* Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Fernandes, V.O. 1987. Rickia 14: 53-71.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste; Cerrado; epicontinental
***Trachelomonas nexilis* Palmer**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas oblonga* Lemmerm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas oblonga* var. *angustata* Huber-Pestalozzi**
Referência: Cecy, I.I.T. 1990. Arq. Biol. Tecnol. 33(1): 1-79.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Trachelomonas oblonga* var. *attenuata* Playfair**
Referência: Cecy, I.I.T. 1990. Arq. Biol. Tecnol. 33(1): 1-79.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
Trachelomonas oblonga* Lemmermann var. *oblonga
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas oblonga* var. *punctata* Lemmerm.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Trachelomonas oblonga* var. *truncata* Lemmerm.**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas obovata* Stokes *emend*. Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica
Trachelomonas obovata* Stokes *emend*. Deflandre var. *obovata
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Trachelomonas obtusa* Palmer**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas orenburgica* Swirenko**
Referência: Cecy, I.I.T. 1990. Arq. Biol. Tecnol. 33(1): 1-79.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Trachelomonas parvicollis* Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Trachelomonas planctonica* Swirenko**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas planctonica* var. *flexicolis* Balech**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
Trachelomonas planctonica* Swirenko var. *planctonica
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Pampa, Pantanal; epicontinental
***Trachelomonas pseudobulla* Swirenko**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Trachelomonas pseudofelix* Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. et al. 1991. Rev. Brasil. Biol. 51(4): 813-828.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas pulcherrima* Playfair**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas pulcherrima* var. *latior* Playfair**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Trachelomonas pulcherrima* var. *minor* Playfair**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas pulcherrima* var. *ovalis* Playfair**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas pulchra* Swirenko**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas pusilla* Playfair**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas pusilla* var. *punctata* Playfair**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas pustulosa* (Playfair) Hub.-Pest.**
Referência: Cecy, I.I.T. 1990. Arq. Biol. Tecnol. 33(1): 1-79.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Trachelomonas raciborskii* Wołłosz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas raciborskii* var. *incerta* Drezep.**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas raciborskii* var. *nova* Drezep.**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental
Trachelomonas raciborskii* Wołłosz. var. *raciborskii
Referência: Alves-da-Silva, S.M. et al. 2008. Iheringia, Bot. 63(1): 15-36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental
***Trachelomonas recticollis* (Playfair) Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Crossetti, L.O. 1999. Hoehnea 26(1): 47-60.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas robusta* (Swirenko) Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, DF), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Trachelomonas rotunda* (Swirenko) *emend*. Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Trachelomonas rugulosa* Stein *emend*. Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica
Trachelomonas rugulosa* Stein *emend*. Deflandre var. *rugulosa
Referência: Jati, S. & Train, S. 1994. Iheringia, Bot. 45: 117-142.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas sculpta* Balech**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas selecta* Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas selecta* var. *megaspina* Conforti**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas similis* Stokes**
Distribuição: nativa; não endêmica
Trachelomonas similis* Stokes var. *similis
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas similis* var. *spinosa* Huber-Pestalozzi**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental
***Trachelomonas similis* var. *verrucosa* Huber-Pestalozzi**
Referência: Cecy, I.I.T. 1990. Arq. Biol. Tecnol. 33(1): 1-79.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Trachelomonas spinigera* A.M.Cunha**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Trachelomonas spinosa* Stokes**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas spinosa* var. *hirsuta* Couté & Thèrezien**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas spirogyra* Balech**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas splendidissima* Middelhoek**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Schüller-da-Silva, A. 2007. Acta Bot. Brasil. 21(2): 401-409.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas stokesiana* Palmer**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. et al. 1991. Rev. Brasil. Biol. 51(4): 813-828.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas stokesii* Drezep. *emend*. Deflandre**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Crossetti, L.O. 1999. Hoehnea 26(1): 47-60.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

***Trachelomonas subglobosa* Playfair**
Referência: Cecy, I.I.T. 1990. Arq. Biol. Tecnol. 33(1): 1-79.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

***Trachelomonas superba* Swirenko *emend*. Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas superba* var. *duplex* (Deflandre) T.G.Popova**
Referência: Keppeler, E.C. et al. 2002. Rev. Brasil. Biol. 59(4): 679-686.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas superba* var. *inevoluta* Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas sydneyensis* Playfair**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas sydneyensis* var. *minima* Playfair**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas sydneyensis* var. *obesa* Playfair**
Referência: Uherkovich, G. & Schmidt, G.W. 1974. Amazoniana 2: 243-283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

Trachelomonas sydneyensis* var. *sidneyensis
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas triangularis* Playfair**
Referência: Cardoso, M.B. 1982. Levantamento das Euglenaceae pigmentadas do Distrito Federal, Brasil, Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 289 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado; epicontinental

***Trachelomonas tubulata* A.M.Cunha**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

***Trachelomonas umbilicophora* W.Conrad**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas umbilicophora* var. *deflandrei* W.Conrad**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido; epicontinental

***Trachelomonas varians* Deflandre**
Distribuição: nativa; não endêmica

Trachelomonas varians* Deflandre var. *varians
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Pampa, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas verrucosa* Stokes**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas verrucosa* var. *granulosa* (Playfair) W.Conrad & Van Meel**
Referência: Giani, A. et al. 1999. Rev. bras. bot. 22(2): 107-116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Trachelomonas verrucosa* Stokes var. *verrucosa
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

***Trachelomonas volvocina* Ehrenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas volvocina* var. *compressa* Deflandre**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia; epicontinental

***Trachelomonas volvocina* var. *derephora* W.Conrad**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas volvocina* var. *punctata* Playfair**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Torres, J.R. 1995. Iheringia, Bot. 46: 27-56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sul (RS); Amazônia, Pampa; epicontinental

***Trachelomonas volvocina* var. *scutella* J.Schiller**
Referência: Alves-da-Silva, S.M. & Laitano, C.S. 1994. Iheringia, Bot. 45: 89-116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa; epicontinental

Trachelomonas volvocina* Ehrenb. var. *volvocina
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas volvocinopsis* Swirenko**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Trachelomonas volvocinopsis* var. *punctata* (Skovortzov) Bourr.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Pampa, Pantanal; epicontinental

Trachelomonas volvocinopsis* Swirenko var. *volvocinopsis
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental

***Trachelomonas wermelii* Skvortzov**
Referência: Albuquerque, C.S. & Menezes, M. 1997. Hoehnea 24(2): 1-16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia; epicontinental
***Trachelomonas woycickii* Koczw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Trachelomonas woycickii* var. *pusilla* Drezep.**
Referência: Conforti, V. 1993. Rev. Hydrobiol. trop. 26(1): 3-18.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas zingeri* Roll**
Referência: Menezes, M. et al. 1995. Anais 2 Cong. Brasil. Biol. Mar. 4(1): 1-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Pampa; epicontinental
***Trachelomonas zorensis* Deflandre**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

PHAEOPHYCEAE

Maria Teresa Menezes Széchy, Joel Campos de Paula
48 gêneros, 94 espécies (2 endêmicas), 14 variedades (nenhuma endêmica)

Acinetospora Bornet

1 espécie (não endêmica)
***Acinetospora crinita* (Carmich. *ex* Harv.) Kornmann**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187708)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho

Ascocyclus Magnus

1 espécie (não endêmica)
***Ascocyclus hypneae* Børgesen**
Referência: Ugadim, Y. 1973. Port. Acta Biol. 12: 69-131.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Asterocladon D.G.Müller et al.

1 espécie (não endêmica)
***Asterocladon rhodochortonoides* (Børgesen) Uwai et al.**
Voucher: Mena, C.M.M. s.n. (R 205046)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); marinho

Asteronema (Delponte) W.West & G.S.West

1 espécie (não endêmica)
***Asteronema breviarticulatum* (J.Agardh) Ouriques & Bouzon**
Voucher: De Paula, J.C. s.n. (HRJ 9515)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Bachelotia (Bornet) Kuck. ex Hamel

1 espécie (não endêmica)
***Bachelotia antillarum* (Grunow) Gerloff**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187653)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Canistrocarpus De Paula & De Clerck

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Canistrocarpus cervicornis* (Kütz.) De Paula & De Clerck**
Voucher: De Paula, J.C. s.n. (HRJ 9005)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Canistrocarpus crispatus* (J.V.Lamour.) De Paula & De Clerck**
Voucher: De Paula, J.C. s.n. (HRJ 9565)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ); marinho

Carpomitra Kütz.

1 espécie (não endêmica)
***Carpomitra costata* (Stackh.) Batters**
Voucher: Programa Revizee s.n. (RFA 28729)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

Chnoospora J.Agardh

1 espécie (não endêmica)
***Chnoospora minima* (K.Hering) Papenfuss**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187526)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Colpomenia (Eulenst. *ex* Grunow) Grunow

1 espécie (não endêmica)
***Colpomenia sinuosa* (Roth) Derbès & Solier**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187581)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Dictyopteris J.V. Lamour.

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Dictyopteris delicatula* J.V.Lamour.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 22437)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Dictyopteris jamaicensis* W.R.Taylor**
Voucher: Villaça, R.C. s.n. (HRJ 9499)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Dictyopteris jolyana* E.C.Oliveira & R.P. Furtado**
Voucher: Pedrini, A.G. s.n. (HRJ 662)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Dictyopteris justii* J.V. Lamour.**
Voucher: Villaça, R.C. s.n. (HRJ 9128)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Dictyopteris plagiogramma* (Mont.) Vickers**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187602)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Dictyopteris polypodioides* (DC.) J.V. Lamour.**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 317865)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

Dictyota J.V.Lamour.
11 espécies (nenhuma endêmica)
***Dictyota bartayresiana* J.V. Lamour.**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 317632)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Dictyota caribaea* Hörnig & Schnetter**
Voucher: De Paula, J.C. s.n. (HRJ 8651)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Dictyota ciliolata* Sond. *ex* Kütz.**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187516)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Dictyota crenulata* J.Agardh**
Voucher: De Paula, J.C. s.n. (HRJ 9868)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Dictyota dolabellana* De Paula et al.**
Voucher: De Paula, J.C. s.n. (HRJ 10311)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); marinho
***Dictyota friabilis* Setchell**
Voucher: Villaça, R.C. s.n. (HRJ 9124)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (RJ); marinho
***Dictyota guineensis* (Kütz.) P. Crouan & H. Crouan**
Voucher: De Paula, J.C. s.n. (HRJ 10932)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (CE, PE, BA); marinho
***Dictyota menstrualis* (Hoyt) Schnetter et al.**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187607)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Dictyota mertensii* (Mart.) Kütz.**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 238936)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Dictyota pinnatifida* Kütz.**
Referência: Taylor, W.R. 1960. Marine algae of the eastern tropical and subtropical coasts of Americas. University of Michigan Press. 870 p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ); marinho
***Dictyota pulchella* Hörnig & Schnetter**
Voucher: Villaça, R.C. s.n. (HRJ 9122)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,
Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Ectocarpus Lyngb.
4 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Ectocarpus fasciculatus* Harv.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ectocarpus fasciculatus* Harv. var. *fasciculatus
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 317490)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES, RJ); marinho
***Ectocarpus fasciculatus* var. *pygmaeus* (Aresch.) Batters**
Referência: Yoneshigue, Y. & Figueiredo, M.A. de O. 1982. Vie et Milieu 33: 181-190.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Ectocarpus rallsiae* Vickers**
Referência: Yoneshigue, Y. & Figueiredo, M.A. de O. 1982. Vie et Milieu 33: 181-190.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); marinho
***Ectocarpus siliculosus* (Dillwyn) Lyngb.**
Referência: Coutinho, R. 1982. Taxonomia, distribuição, Crescimento sazonal, Reprodução e Biomassa das algas bentônicas no Estuário da lagoa dos Patos (RS). Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande do Sul. 71 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); marinho
***Ectocarpus variabilis* Vickers**
Referência: Joly, A.B. 1967. Arq. Est. Biol. Mar. Univ. Fed. Ceará 7: 87-90.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); marinho

Elachista Duby
1 espécie (não endêmica)
***Elachista minutissima* W.R. Taylor**
Voucher: Amado-Filho, G.M. s.n. (RB 200914)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ); marinho

Elachistiella V.Cassano et al.
1 espécie (não endêmica)
***Elachistiella leptonematoides* V.Cassano et al.**
Voucher: Moreira, F.M. s.n. (HRJ 9840)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho

Endarachne J.Agardh
1 espécie (não endêmica)
***Endarachne binghamiae* J.Agardh**
Voucher: De Paula, J.C. s.n. (HRJ 9795)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Feldmannia Hamel
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Feldmannia indica* (Sond.) Womersley & A.Bailey**
Voucher: De Paula, J.C. 10235 (HRJ 10235)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho
***Feldmannia irregularis* (Kütz.) Hamel**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187660)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Feldmannia lebelii* (Aresch. et al.) Hamel**
Referência: Oliveira Filho, E.C. & Ugadim, Y. 1974. Bol. Bot. Univ. São Paulo 2:71-91.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); marinho
***Feldmannia simplex* (H.Crouan & P.Crouan) Hamel**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187709)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Halopteris Kütz.
1 espécie (não endêmica)
***Halopteris filicina* (Gratel.) Kütz.**
Voucher: Amado-Filho, G.M. s.n. (RB 488201)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES); marinho

Hapalospongidion Saunders
1 espécie (não endêmica)
***Hapalospongidion macrocarpum* (Feldmann) León-Alvarez & Gonzalez-Gonzalez**
Referência: Yoneshigue, Y. 1985. Taxonomie et ecologie des algues marines dans la region de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brésil. Tese de Doutorado, L'Université D'Aix-Marseille II, Luminy. 466 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Hecatonema Sauv.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hecatonema floridanum* (W.R.Taylor) W.R.Taylor**
Voucher: Amado-Filho, G.M. s.n. (RB 200911)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); marinho
***Hecatonema terminale* (Kütz.) Kylin**
Referência: Yoneshigue, Y. 1985. Taxonomie et ecologie des algues marines dans la region de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brésil. Tese de Doutorado, L'Université D'Aix-Marseille II, Luminy. 466 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Herponema J.Agardh
1 espécie (não endêmica)
***Herponema tortugense* (W.R.Taylor) W.R.Taylor**
Voucher: Cordeiro-Marino, M. s.n. (SP 164026)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, AL); marinho

Hincksia J.E.Gray
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hincksia mitchelliae* (Harv.) P.C.Silva**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187673)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Hincksia onslowensis* (Amsler & Kapraun) P.C.Silva**
Voucher: Taouil, A. s.n. (HRJ 8292)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Hydroclathrus Bory
1 espécie (não endêmica)
***Hydroclathrus clathratus* (C. Agardh) M. Howe**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 318118)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Jolyna S.M.Guim.
1 espécie (não endêmica)
***Jolyna laminarioides* S.M. Guim.**
Voucher: Braga, M.R.A. s.n. (HRJ 538)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); marinho

Kuckuckia Kornmann
1 espécie (não endêmica)
***Kuckuckia spinosa* (Kütz.) Kuck.**
Referência: Yoneshigue, Y. & Figueiredo, M.A. de O. 1982. Vie et Milieu 33: 181-190.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Kuetzingiella Kornmann
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Kuetzingiella battersii* (Bornet) Kornmann**
Voucher: Cordeiro-Marino, M. s.n. (SP 164025)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho
***Kuetzingiella elachistaeformis* (Heydr.) M.S.Balakr. & Kinkar**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 317505)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Laminaria J.V.Lamour.
2 espécies (2 endêmicas)
***Laminaria abyssalis* A.B.Joly & E.C.Oliveira**
Voucher: Programa Revizee s.n. (RFA 28969)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho
***Laminaria brasiliensis* A.B.Joly & E.C.Oliveira**
Voucher: Programa Revizee s.n. (RFA 28972)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho

Levringia Kylin
1 espécie (não endêmica)
***Levringia brasiliensis* (Mont.) A.B.Joly**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187644)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Lobophora J.Agardh
1 espécie (não endêmica)
***Lobophora variegata* (J.V.Lamour.) Womersley *ex* E.C.Oliveira**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187686)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Myriactula Kuntze
1 espécie (não endêmica)
***Myriactula minor* (Farlow) W.R.Taylor**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 317877)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES); marinho

Myrionema Grev.
1 espécie (não endêmica)
***Myrionema strangulans* Grev.**
Voucher: Amado-Filho, G.M. s.n. (RB 200912)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES, RJ); marinho

Nemacystus Derbès & Solier
1 espécie (não endêmica)
***Nemacystus howei* (W.R.Taylor) Kylin**
Voucher: De Paula, J.C. s.n. (HRJ 9513)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Nereia Zanardini
1 espécie (não endêmica)
***Nereia filiformis* (J.Agardh) Zanardini**
Voucher: Programa Revizee s.n. (RFA 28727)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

Padina Adans.
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Padina antillarum* (Kütz.) Piccone**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 317511)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Padina boergesenii* Allender & Kraft**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 31499)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); marinho
***Padina gymnospora* (Kütz.) Sonder**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187801)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Padina pavonica* (L.) Thivy**
Referência: Taylor, W.R. 1960. Marine algae of the eastern tropical and subtropical coasts of Americas. University of Michigan Press. 234 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Padina profunda* S.Earle**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Biol. Cent.-Amer. Bot. 84.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho
***Padina sanctae-crucis* Børgesen**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 317520)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES), Sul (SC); marinho

Petalonia Derbès & Solier
1 espécie (não endêmica)
***Petalonia fascia* (O.F.Müller) Kuntze**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187645)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho

Protectocarpus Kornmann
1 espécie (não endêmica)
***Protectocarpus speciosus* (Bornet) Kuck.**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 318137)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); marinho

Pseudolithoderma Svedelius
1 espécie (não endêmica)
***Pseudolithoderma moreirae* Yonesh. & Boudour.**
Referência: Yoneshigue, Y. 1985. Taxonomie et ecologie des algues marines dans la region de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brésil. Tese de Doutorado, L'Université D'Aix-Marseille II, Luminy. 466 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Ralfsia (Bohlin) E.Hegewald
1 espécie (não endêmica)
***Ralfsia expansa* (J.Agardh) J.Agardh**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187650)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Rosenvingea Børgesen
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Rosenvingea intricata* (J.Agardh) Børgesen**
Voucher: Nunes, J.M. de C. 57587 (ALCB 57587)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Rosenvingea sanctae-crucis* Børgesen**
Voucher: De Paula, J.C. s.n. (HRJ 9656)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

Sargassum C. Agardh
10 espécies (nenhuma endêmica), 12 variedades (nenhuma endêmica)
***Sargassum cymosum* C.Agardh**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sargassum cymosum* C. Agardh var. *cymosum
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187747)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Sargassum cymosum* var. *nanum* E.de Paula & E.C.Oliveira**
Voucher: Paula, E.J. de s.n. (SPF 7915)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Sargassum filipendula* C. Agardh**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sargassum filipendula* C. Agardh var. *filipendula
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187720)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Sargassum filipendula* var. *laxum* J.Agardh**
Voucher: Paula, E.J. de s.n. (SPF 8006)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Sargassum filipendula* var. *montagnei* (Bailey) Grunow**
Voucher: Paula, E.J. de s.n. (SPF 7984)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Sargassum filipendula* var. *pinnatum* Grunow**
Voucher: Mena, C.M.M. s.n. (R 204973)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Sargassum furcatum* Kütz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Sargassum furcatum* var. *diversifolium* (Grunow) E.J. de Paula *ex* Yonesh.**
Voucher: Paula, E.J. de s.n. (SPF 7587)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); marinho
Sargassum furcatum* Kütz. var. *furcatum
Voucher: Paula, E.J. de s.n. (SPF 7562)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Sargassum furcatum* var. *humilis* (Grunow) E.J.de Paula *ex* Yonesh.**
Voucher: Paula, E.J. de s.n. (SPF 7573)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Sargassum hystrix* J. Agardh**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 317423)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); marinho

***Sargassum platycarpum* Mont.**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 317436)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Sargassum polyceratium* Mont.**
Voucher: Villaça, R.C. s.n. (HRJ 9135)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL); marinho
***Sargassum ramifolium* Kütz.**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 317450)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Sargassum rigidulum* Kütz.**
Voucher: De Paula, J.C. s.n. (HRJ 5863)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Sargassum stenophyllum* Martius**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187757)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Sargassum vulgare* C. Agardh**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Sargassum vulgare* var. *foliosissimum* (J.V.Lamour.) C.Agardh**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187758)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Sargassum vulgare* var. *nanum* E.J. de Paula**
Voucher: Paula, E.J. de s.n. (SPF 8088)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PB, BA), Sudeste (SP, RJ); marinho
Sargassum vulgare* C.Agardh var. *vulgare
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187722)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Scytosiphon C.Agardh

1 espécie (não endêmica)
***Scytosiphon lomentaria* (Lyngb.) Link**
Voucher: Baptista, L.R.M. s.n. (ICN 22631)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); marinho

Spatoglossum Kütz.

1 espécie (não endêmica)
***Spatoglossum schroederi* (C.Agardh) Kütz.**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187699)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

Sphacelaria Lyngb.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Sphacelaria brachygona* Mont.**
Voucher: Széchy, M.T.M. de s.n. (SP 187589)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Sphacelaria novae-hollandiae* Sonder**
Referência: Yoneshigue, Y. 1985. Taxonomie et ecologie des algues marines dans la region de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brésil. Tese de Doutorado, L'Université D'Aix-Marseille II, Luminy. 466 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Sphacelaria rigidula* Kütz.**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 318011)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Sphacelaria tribuloides* Menegh.**
Voucher: Crispino, L.M.B. s.n. (SP 318014)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho

Sporochnus C.Agardh

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sporochnus bolleanus* Mont.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 48244)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Sporochnus pedunculatus* (Huds.) C.Agardh**
Voucher: Programa Revizee s.n. (RFA 28759)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Stragularia clavata* (Harv.) G.Hamel**
Distribuição: nativa; não endêmica; marinho

Streblonema Derbès & Solier

1 espécie (não endêmica)
***Streblonema parasiticum* (Sauv.) Levring**
Referência: Joly, A.B. 1967. Arq. Est. Biol. Mar. Univ. Fed. Ceará 7: 87-90.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); marinho

Stypopodium Kütz.

1 espécie (não endêmica)
***Stypopodium zonale* (J.V.Lamour.) Papenf.**
Voucher: De Paula, J.C. s.n. (HRJ 8643)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho

Syringoderma Levring

1 espécie (não endêmica)
***Syringoderma abyssicola* (Setchell & N.L. Gardner) Levring**
Voucher: Programa Revizee s.n. (RFA 28703)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho

Turbinaria J.V.Lamour.

1 espécie (não endêmica)
***Turbinaria turbinata* (L.) Kuntze**
Referência: Taylor, W.R. 1960. Marine algae of the eastern tropical and subtropical coasts of Americas. University of Michigan Press. 870 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho

Zonaria C.Agardh

1 espécie (não endêmica)
***Zonaria tournefortii* (J.V.Lamour.) Mont.**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 317901)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho

PRASINOPHYCEAE

Mariângela Menezes
8 gêneros, 15 espécies (nenhuma endêmica)

Micromonas Manton & Parke

1 espécie (não endêmica)
***Micromonas pusilla* (Butcher) Manton & Parke**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

Monomastix Scherffel

1 espécie (não endêmica)
***Monomastix opisthostigma* Scherffel**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

Nephroselmis Stein

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Nephroselmis discoidea* Skuja**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Nephroselmis minuta* (N.Carter) Butcher**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Nephroselmis pyriformis* (N.Carter) Ettl**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

Pedinomonas Korshikov

1 espécie (não endêmica)
***Pedinomonas minutissima* Skuja**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Pseudoscourfieldia Manton

1 espécie (não endêmica)
***Pseudoscourfieldia marina* (Throndsen) Manton**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Pyramimonas Schmarda

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Pyramimonas disomata* Butcher**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Pyramimonas grossii* Parke**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); marinho
***Pyramimonas longicauda van* Meel *emend*. Inouye et al.**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Pyramimonas obovata* sensu Hallegraeff**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Pyramimonas orientalis* Butcher**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); marinho

Resultor Moestrup

1 espécie (não endêmica)
***Resultor mikron* (Throndsen) Moestrup**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Tetraselmis Stein

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Tetraselmis bichlora* (H.Ettl & O.Ettl.) Norris et al.**
Referência: Menezes, M. & Bicudo, C.E.M. 2008. Hoehnea 35(3): 435-468.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraselmis incisa* (Nygaard) Norris et al.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

PRYMNESIOPHYCEAE

Marli Bergesh
46 gêneros, 93 espécies (nenhuma endêmica)

Acanthoica Lohmann

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Acanthoica monospina* J.Schiller**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Acanthoica quattrospina* Lohmann**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Algirosphaera Schlauder *emend*. Norris

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Algirosphaera oryza* Schlauder**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Algirosphaera robusta* (Lohmann) Norris**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa;não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Anoplosolenia Deflandre
1 espécie (não endêmica)
***Anoplosolenia brasiliensis* (Lohmann) Deflandre**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Calcidiscus Kamptner
1 espécie (não endêmica)
***Calcidiscus leptoporus* (G.Murray & V.H.Blackman) Loebl. & Tappan**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Calciopappus Gaarder & Ramsfjell
1 espécie (não endêmica)
***Calciopappus caudatus* Gaarder & Ramsfjell**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Calciosolenia Gran
1 espécie (não endêmica)
***Calciosolenia murray* Gran**
Referência: Brandini, F.P. 1988. Ciência e Cultura 40(4): 334-341.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido; epicontinental, marinho

Calicasphaera Kleijne
1 espécie (não endêmica)
***Calicasphaera diconstricta* Kleijne**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Calyptrolithina Heimdal
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Calyptrolithina multipora* (Gaarder) R.E.Norris**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Calyptrolithina wettsteinii* (Kamptner) Kleijne**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); marinho

Calyptrolithophora Heimdal
1 espécie (não endêmica)
***Calyptrolithophora papillifera* (P.Halldal) Heimdal**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); marinho

Calyptrosphaera Lohmann
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Calyptrosphaera oblonga* Lohmann**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Calyptrosphaera sphaeroidea* J. Schiller**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1996. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Caneosphaera Gaarder
1 espécie (não endêmica)
***Caneosphaera molischii* (J.Schiller) Gaarder**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Domínio desconhecido; epicontinental

Ceratolithus Kamptner
1 espécie (não endêmica)
***Ceratolithus cristatus* Kamptner**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Chrysochromulina Lackey
18 espécies (nenhuma endêmica)
***Chrysochromulina adriatica* Leadb.**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina ahrengotii* Jensen & Moestrup**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

***Chrysochromulina apheles* Moestrup & Thomsen**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina bergenensis* Leadb.**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina brachycylindra* Hällfors & Thomsen**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina cymbium* Leadb. & Manton**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina elegans* Estep et al.**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina ephippium* Parke & Manton**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina kappa* Parke & Manton**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina latilepis* Manton**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina megacylindra* Leadb.**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina minor* Parke & Manton**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina parva* Lackey**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Chrysochromulina pringsheimii* Parke & Manton**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina pyramidosa* Thomsen**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina scutellum* Eikrem & Moestrup**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica); Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina simplex* Estep et al. *emend*. Birkhead & Pienaar**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Chrysochromulina spinifera* (Fournier) Pienaar & R.E.Norris**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

Corisphaera Kamptner
1 espécie (não endêmica)
***Corisphaera gracilis* Kamptner**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho

Coronosphaera Gaarder
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Coronosphaera binodata* (Kamptner) Gaarder**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Coronosphaera mediterranea* (Lohmann) Gaarder**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Corymbellus J.C.Green
1 espécie (não endêmica)
***Corymbellus aureus* J.C.Green**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

Cyrtosphaera Kleijne
1 espécie (não endêmica)
***Cyrtosphaera lecaliae* Kleijne**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); marinho

Dactylethra Gartner
1 espécie (não endêmica)
***Dactylethra pirus* Kamptner**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR, SC); marinho

Discosphaera Haeckel
1 espécie (não endêmica)
***Discosphaera tubifera* G. (Murray & V.H. Blackman) Ostenf.**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Emiliania Hay & Mohler
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Emiliania huxleyi* (Lohmann) Hay & Mohler**
Referência: Brandini, F.P. 1988. Ciência e Cultura 40(4): 334-341.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Emiliania huxleyi* var. *corona* (Okada & McIntyre) R.W. Jordan & J.R. Young**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho
***Emiliania huxleyi* var. *huxleyi* (Lohmann) Hay & Mohler**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Flosculosphaera R.W.Jordan & Kleijne

1 espécie (não endêmica)
***Flosculosphaera calceolariopsis* R.W. Jordan & Kleijne**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Gephyrocapsa Kamptner

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Gephyrocapsa ericsonii* McIntire & Bé**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Gephyrocapsa oceanica* Kamptner**
Referência: Brandini, F.P. & Fernandes, L.F. 1996. Rev. Bras. Oceanogr. 44(1): 69-80.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Gephyrocapsa ornata* Heimdal**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); marinho

Gladiolithus R.W.Jordan & A.H.L.Chamb.

1 espécie (não endêmica)
***Gladiolithus flabellatus* (P.Halldal & Markali) R.W.Jordan & A.H.L.Chamb.**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Halopappus Lohmann

1 espécie (não endêmica)
***Halopappus adriaticus* J. Schiller**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Hayaster Bukry

1 espécie (não endêmica)
***Hayaster perplexus* (Bramlette & W.R.Riedel) Buckry**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Helicosphaera Kamptner

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Helicosphaera carteri* var. *carteri* (Wall.) Kamptner**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Helicosphaera carteri* var. *hialina* (Gaarder) R.W.Jordan & J.R.Young**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Helicosphaera carteri* var. *wallichii* (Lohmann) Okada McIntyre**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Helladosphaera Kamptner

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Helladosphaera cornifera* (J.Schiller) Kamptner**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Helladosphaera pinaarii* R.E. Norris**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho

Homozygosphaera Deflandre
1 espécie (não endêmica)
***Homozygosphaera triarcha* P.Halldal & Markali**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Michaelsarsia Gran *emend.* Manton et al.
1 espécie (não endêmica)
***Michaelsarsia elegans* Gran *emend.* Manton et al.**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Oolithotus P.Reinh. *in* Cohen & P.Reinh.
1 espécie (não endêmica)
***Oolithotus antillarum* (Cohen) P.Reinh.**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Papposphaera Tangen
1 espécie (não endêmica)
***Papposphaera lepida* Tangen**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Periphyllophora Kamptner
1 espécie (não endêmica)
***Periphyllophora mirabilis* (J.Schiller) Kamptner**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Phaeocystis Lagerh.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phaeocystis globosa* Scherffel**
Referência: Proença, L.A. & Tamanaha, M.S. 2000. Anais 13 Sem. Nac. Oceanogr. 553-555.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); marinho
***Phaeocystis pouchetii* (Hariot) Lagerh.**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Polycrater Manton & Oates
1 espécie (não endêmica)
***Polycrater galapagensis* Manton & Oates**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Pontosphaera Lohmann
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pontosphaera discopora* J. Schiller**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Pontosphaera syracusana* Lohmann**
Referência: Brandini, F.P. 1988. Ciência e Cultura 40(4): 334-341.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste, Sul (SC, RS); marinho

Poricayiptra Kleijne
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Poricayiptra aurisinae* (Kamptner) Kleijne**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Poricayiptra gaarderae* (Borsetti & Cati) Kleijne**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Poricayiptra isselii* (Borsetti & Cati) Kleijne**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

***Poricayiptra magnaghii* (Borsetti & Cati) Kleijne**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Poritectolithus Kleijne

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Poritectolithus maximus* Kleijne**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Poritectolithus tyronus* Kleijne**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); marinho

Prymnesium Massart *ex* W.Conrad

1 espécie (não endêmica)
***Prymnesium parvum* N. Carter**
Referência: Bergesch, M. et al. 2008. Bot. Mar. 51: 35-50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

Reticulofenestra W.W.Hay et al.

1 espécie (não endêmica)
***Reticulofenestra sessilis* (Lohmann) R.W.Jordan & J.R.Young**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Rhabdosphaera Haeckel

1 espécie (não endêmica)
***Rhabdosphaera clavigera* var. *stylifera* (Lohmann) Kleijne & R.W.Jordan**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Scyphosphaera Lohmann

1 espécie (não endêmica)
***Scyphosphaera apsteinii* Lohmann**
Referência: Brandini, F.P. 1988. Ciência e Cultura 40(4): 334-341.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Syracolithus (Kamptner) Deflandre

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Syracolithus catilliferus* (Kamptner) Deflandre**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Syracolithus confusus* Kleijne**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Syracolithus quadriperforatus* (Kamptner) Gaarder**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho

Syracosphaera Lohmann

7 espécies (nenhuma endêmica)
***Syracosphaera halldalii* Gaarder *ex* R.W.Jordan & J.C.Green**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Syracosphaera histrica* Kamptner**
Referência: Tenenbaum, D.R. et al. 2007. Série Documentos REVIZEE/SCORE Central. p. 83-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Syracosphaera lamina* Lecal-Schlauder**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Syracosphaera molischii* J. Schiller**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Syracosphaera nodosa* Kamptner**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); marinho

***Syracosphaera pirus* P. Haldall & Markali**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Syracosphaera pulchra* Lohmann**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Umbellosphaera Paasche
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Umbellosphaera irregularis* Paasche**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Umbellosphaera tenuis* (Kamptner) Paasche**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Umbilicosphaera Lohmann
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Umbilicosphaera hulburtiana* Gaarder**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Umbilicosphaera sibogae* (Weber Bosse) Gaarder**
Referência: Brandini, F.P. & Fernandes, L.F. 1996. Rev. Bras. Oceanogr. 44(1): 69-80.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); marinho
***Umbilicosphaera sibogae* var. *sibogae* (Weber Bosse) Gaarder**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Zygosphaera Kamptner *emend.* Heimdal
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Zygosphaera bannockii* (Borsetti & Cati) Heimdal**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); marinho
***Zygosphaera hellenica* Kamptner**
Referência: Ribeiro, S.M.M.S. 1997. Caracterização taxonômica e ecológica das comunidades pico-, nano-, e microplanctônicas, superficial e profunda, da zona eufótica do Atlântico Sul. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 155 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho

RAPHIDOPHYCEAE
Mariângela Menezes
6 gêneros, 9 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

Chattonella Biecheler
1 espécie (não endêmica)
***Chattonella subsalsa* Biecheler**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Fibrocapsa Toriumi & Takano
1 espécie (não endêmica)
***Fibrocapsa japonica* Toriumi & Takano**
Referência: Mafra Jr, L.L. et al. 2006. Braz. J. Oceanogr. 54: 107-121.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); marinho

Gonyostomum Diesing
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Gonyostomum depressum* (Lauterborn) Lemmerm.**
Referência: Lemmermann, E. 1908. Krypt.-Fl. Brandenburg 3 (3): 482.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Gonyostomum semen* (Ehrenb.) Diensing**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Heterosigma Hada
1 espécie (não endêmica)
***Heterosigma akashiwo* (Hada) Hada**
Referência: Mafra Jr, L.L. et al. 2006. Braz. J. Oceanogr. 54: 107-121.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Merotrichia Mereschk.
1 espécie (não endêmica)
***Merotrichia bacillata* Mereschk.**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

Vacuolaria Cienk.
3 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Vacuolaria tropicalis* C.E.M. Bicudo & M.B.Cardoso**
Referência: Bicudo, C.E.M. & Cardoso, M.B. 1973. Eur. J. Phycol. 8: 339-342.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Vacuolaria virescens* Cienk.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Vacuolaria virescens* Cienk. var. *virescens
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Vacuolaria viridis* (P.A.Dang.) Senn**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica; epicontinental

RHODOPHYCEAE
Marcia Creed, Mutue Toyota Fujii, Maria Beatriz de Barros Barreto, Silvia Maria Pita de Beauclair Guimarães, Valéria Cassano, Sonia Maria Barreto Pereira, Maria de Fátima de Oliveira Carvalho, Samir Khader
153 gêneros, 402 espécies (6 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica), 14 variedades (2 endêmicas)

Acanthophora J.V.Lamour.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Acanthophora muscoides* (L.) Bory**
Voucher: Cocentino, A.L.M. s.n. (PEUFR 14073)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Acanthophora spicifera* (Vahl) Børgesen**
Voucher: Matos, S.M.G. s.n. (PEUFR 11440)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Acrochaetium Nägeli
15 espécies (nenhuma endêmica)
***Acrochaetium agardhiellae* A.B. Joly & Cord.-Mar.**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2002. Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco, Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, Recife. p. 97-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Acrochaetium avrainvilleae* Børgesen**
Referência: Pinheiro-Joventino, F. et al. 1998. Arq. Ciên. Mar. Fortaleza 31(1-2): 29-40.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); marinho
***Acrochaetium corymbiferum* (Thur.) Batters**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57805)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Domínio desconhecido; epicontinental
***Acrochaetium densum* (K.M.Drew) Papenf.**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009. Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Acrochaetium epispiculum* A.B. Joly & M. Cordeiro**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); marinho
***Acrochaetium flexuosum* Vickers**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Acrochaetium globosum* Børgesen**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Acrochaetium hallandicum* (Kylin) Hamel**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Acrochaetium hypneae* (Børgesen) Børgesen**
Referência: Taouil, A. & Yoneshigue-Valentin, Y. 2002. Rev. bras. bot. 25(4): 405-412.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Acrochaetium infestans* M.A.Howe & Hoyt**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho
***Acrochaetium liagorae* Børgesen**
Referência: Nunes, J.M.C. 2005. Rodofíceas marinhas bentônicas do estado da Bahia, Brasil. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 410 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho
***Acrochaetium microscopicum* (Nägeli *ex* Kütz.) Nägeli**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Acrochaetium phacelorhizum* Børgesen**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho
***Acrochaetium savianum* (Menegh.) Nägeli**
Referência: Szechy, M.T.M. et al. 2005. Acta Bot. Brasil. 19: 587-596.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Acrochaetium unipes* Børgesen**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES); marinho

Acrosorium Zanardini *ex* Kütz.
1 espécie (não endêmica)
***Acrosorium ciliolatum* (Harv.) Kylin**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

Acrothamnion J.Agardh
1 espécie (não endêmica)
***Acrothamnion butleriae* (Collins) Kylin**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 65103)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PB, PE, BA); marinho

Agardhiella F.Schmitz
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Agardhiella floridana* (Kylin) Gabrielson *ex* S.M.Guim. & E.C.Oliveira**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. & Oliveira, E.C. 1996. J. Phycol. 32: 656-668.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (ES, RJ); marinho
***Agardhiella ramosissima* (Harv.) Kylin**
Voucher: Miranda, M.A. s.n. (PEUFR 4421)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Agardhiella subulata* (C.Agardh) Kraft & M.J.Wynne**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Sudeste (ES, SP), Sul (SC); marinho

Aglaothamnion Feldm.-Maz.
8 espécies (nenhuma endêmica)
***Aglaothamnion borgesenii* (N.Aponte & D.L.Ballant.) L´Hardy-Halos & Rueness**
Referência: Oliveira , E.C. 1969. Bol. Bot. Univ. São Paulo 26: 1-277.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (ES), Sul; marinho
***Aglaothamnion cordatum* (Børgesen) Feldm.-Maz.**
Referência: Oliveira , E.C. 1969. Bol. Bot. Univ. São Paulo 26: 1-277.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Aglaothamnion diaphanum* L´Hardy-Halos & Maggs**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Aglaothamnion felipponei* (M.Howe) N.Aponte et al.**
Voucher: Torres, J. s.n. (PEUFR 39213)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Aglaothamnion halliae* (Collins) N.Aponte et al.**
Voucher: Torres, J. s.n. (PEUFR 39222)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Aglaothamnion hervey* (M.Howe) N.Aponte et al.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57680)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (BA); marinho
***Aglaothamnion tenuissimum* (Bonnem.) Feldm.-Maz.**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Aglaothamnion uruguayense* (W.R.Taylor) N.Aponte et al.**
Referência: Oliveira , E.C. 1969. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 26: 1-277.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Amansia J.V.Lamour.
1 espécie (não endêmica)
***Amansia multifida* J.V.Lamour.**
Voucher: Bandeira-Pedrosa, M.E. s.n. (PEUFR 449770)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho

Amphiroa J.V.Lamour.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Amphiroa anastomosans* Weber Bosse**
Voucher: Bandeira-Pedrosa, M.E. s.n. (PEUFR 9013)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Amphiroa beauvoisii* J.V.Lamour.**
Voucher: Bandeira-Pedrosa, M.E. s.n. (PEUFR 9015)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Amphiroa fragilissima* (L.) J.V.Lamour.**
Voucher: Bandeira-Pedrosa, M.E. s.n. (PEUFR 11455)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Amphiroa rigida* J.V.Lamour.**
Voucher: Bandeira-Pedrosa, M.E. s.n. (PEUFR 9032)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP); marinho
***Amphiroa vanbosseae* Me. Lemoine**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

Anotrichium Nägeli
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Anotrichium tenue* (C.Agardh) Nägeli**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 53384)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Anotrichium yagii* (Okamura) Baldock**
Referência: Horta, P.A. & Oliveira, E. C. 2000. Phycologia 39: 390-394.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); marinho

Antithamnion Nägeli
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Antithamnion antillanum* Børgesen**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57623)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Antithamnion villosum* (Kütz.) Athanas.**
Referência: Yoneshigue, Y. & Villaça, R.C. 1989. Cryptogamie, Algol. 10(1): 325-335.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Antithamnionella Lyle
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Antithamnionella atlantica* (E.C.Oliviera) C.W.Schneid.**
Referência: Oliveira , E.C. 1969. Bol. Bot. Univ. São Paulo 26: 1-277.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Antithamnionella boergesenii* (Cormaci & G.Furnari) Athanas.**
Referência: Yoneshigue, Y. 1985. Taxonomie et ecologie des algues marines dans la region de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brésil. Tese de Doutorado, L'Université D'Aix-Marseille II, Luminy. 466 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Antithamnionella breviramosa* (E.Y.Dawson) E.M.Woll.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57681)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Antithamnionella graeffei* (Grunow) Athanas.**
Referência: Oliveira , E.C. 1969. Bol. Bot. Univ. São Paulo 26: 1-277.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (ES, SP), Sul (SC); marinho

Apoglossum J.Agardh
1 espécie (não endêmica)
***Apoglossum gregarium* (E.Y.Dawson) M.J.Wynne**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Arthrocardia Decne.
1 espécie (não endêmica)
***Arthrocardia flabellata* (Kütz.) Manza**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Asparagopsis Mont.
1 espécie (não endêmica)
***Asparagopsis taxiformis* (Delile) Trevisan**
Voucher: Teixeira, G.C. s.n. (PEUFR 5024)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Asteromenia Huisman & AJ.K.Millar
1 espécie (não endêmica)
***Asteromenia peltata* (W.R.Taylor) Huisman & A.J.K.Millar**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho

Bangia Lyngb.
1 espécie (não endêmica)
***Bangia fuscopurpurea* (Dillwyn) Lyngb.**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009. Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); marinho

Bangiopsis F.Schmitz
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Bangiopsis dumontioides* (P.Crouan & H.Crouan) V.Krishnam.**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009. Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Bangiopsis subsimplex* (Mont.) F.Schmitz**
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 21(294): 5-393.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); marinho

Bostrychia Mont. *nom. cons.*
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Bostrychia calliptera* (Mont.) Mont.**
Voucher: Equipe Projeto Mangue s.n. (PEUFR 38017)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Bostrychia kelanensis* Grunow**
Referência: Fujii, M.T. et al. 1990. Hoehnea 17(2): 93-97.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Bostrychia montagnei* (Huds.) Mont.**
Voucher: Fortes, A.C.M. s.n. (PEUFR 17097)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); marinho
***Bostrychia moritziana* (Sond. *ex* Kütz.) J. Agardh**
Voucher: Equipe Projeto Mangue s.n. (PEUFR 38018)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Bostrychia pilulifera* Mont.**
Referência: Paula, E.J. et al. 1989. Insula 19: 95-114.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); marinho
***Bostrychia radicans* (Mont.) Mont.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Bostrychia tenella* (J.V.Lamour.) J.Agardh**
Voucher: Equipe Projeto Mangue s.n. (PEUFR 25582)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

Botryocladia (J.Agardh) Kylin
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Botryocladia occidentalis* (Børgesen) Kylin**
Voucher: Ferreira, M.V. s.n. (PEUFR 7825)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Botryocladia pyriformis* (Børgesen) Kylin**
Voucher: Bandeira-Pedrosa, M.E. s.n. (PEUFR 9074)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Botryocladia wynnei* D.L.Ballant.**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); marinho

Branchioglossum Kylin
1 espécie (não endêmica)
***Branchioglossum minutum* C.W.Schneid.**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); marinho

Bryocladia F.Schmitz
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Bryocladia cuspidata* (J.Agardh) De Toni**
Voucher: Menezes, G.A. s.n. (PEUFR 14220)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Bryocladia thyrsigera* (J.Agardh) F.Schmitz in Falkenb.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Bryothamnion Kütz.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Bryothamnion seaforthii* (Turner) Kütz.**
Voucher: Bandeira-Pedrosa, M.E. s.n. (PEUFR 449840)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Bryothamnion triquetrum* (S.G.Gmelin) M.Howe**
Voucher: Cocentino, A.L.M. s.n. (PEUFR 14121)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (RJ); marinho

Calliblepharis Kütz. *nom. cons.*
1 espécie (não endêmica)
***Calliblepharis fimbriata* (Grev.) Kütz.**
Referência: Yoneshigue, Y. 1985. Taxonomie et ecologie des algues marines dans la region de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brésil. Tese de Doutorado, L'Université D'Aix-Marseille II, Luminy. 466 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Callithamniella Feldm.-Maz.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Callithamniella flexilis* Baardseth**
Referência: Yoneshigue, Y. 1985. Taxonomie et ecologie des algues marines dans la region de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brésil. Tese de Doutorado, L'Université D'Aix-Marseille II, Luminy. 466 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Callithamniella tingitana* (Schousb. *ex* Bornet) Feldm.-Maz.**
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Bot. Univ. São Paulo 21(294): 5-393.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho

Callithamnion Lyngb.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Callithamnion callithamnioides* (A.B.Joly & Ugadim) M.J.Wynne**
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Bot. Univ. São Paulo 21(294): 5-393.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Callithamnion corymbosum* (Sm.) Lyngb.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 60700)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Callithamnion tetragonum* (With.) S.F.Gray**
Referência: Villaça, R. 1988. Le phytobenthos des biotopes sciaphiles dans la region d'uppwelling de Cabo Frio Brésil. Tese de Doutorado, L'Université D'Aix-Marseille II, Luminy. 219 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); marinho

Callophyllis Kütz.
1 espécie (não endêmica)
***Callophyllis microdonta* (Grev.) Falkenb.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho

Caloglossa (Harv.) G.Mertens
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Caloglossa leprieurii* (Mont.) G.Mertens**
Voucher: Equipe Projeto Mangue s.n. (PEUFR 38019)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Caloglossa ogasawaraensis* Okamura**
Referência: Fortes, A.C.M. & Pereira, S.M.B. 1994. Rev. Brasil. Biol. 54(3): 497-502.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

Catenella Grev.
1 espécie (não endêmica)
***Catenella caespitosa* (Withering) L.M.Irvine**
Voucher: Equipe Projeto Mangue s.n. (PEUFR 14305)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (ES); marinho

Centroceras Kütz.
1 espécie (não endêmica)
***Centroceras clavulatum* (C.Agardh) Mont.**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 48 (RB 420016)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Centrocerocolax A.B.Joly
1 espécie (1 endêmica)
***Centrocerocolax ubatubensis* A.B.Joly**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57578)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Ceramium Röth
19 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Ceramium affine* Setchell & N.L.Gardner**
Voucher: Fujii, M.T. 65 (RB 420018)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Ceramium brasiliense* A.B.Joly**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 41 (SP 187567)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Ceramium brevizonatum* H.E. Petersen**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ceramium brevizonatum* var. *caraibicum* H.E.Petersen & Børgesen**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 98 (RB 420031)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Ceramium cimbricum* H.E.Petersen**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
***Ceramium cimbricum subsp. flaccida* G.Furnari & Serio**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57807)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho
***Ceramium clarionense* Setchell & N.L.Gardner**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 76 (RB 420036)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Ceramium codii* (H.Richards) Mazoyer**
Referência: Barros-Barreto, M.B. de 2006. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro – Sistemática molecular da tribo Ceramieae Ceramiaceae, Rhodophyta) no Brasil. 160 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES); marinho
***Ceramium comptum* Børgesen**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 118 (RB 420041)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Ceramium corniculatum* Mont.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 53300)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); marinho
***Ceramium dawsonii* A.B.Joly**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 69 (RB 420050)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Ceramium deslongchampsii* Chauv. *ex* Duby**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. s.n. (RB 313323)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Ceramium diaphanum* (Lightfoot) Roth**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. s.n. (RB 313341)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); marinho
***Ceramium filicula* Harv. *ex* Womersley**
Voucher: Paradas, W. 17 (RB 420054)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Ceramium flaccidum* (Kütz.) Ardissone**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 51 (RB 420058)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Ceramium fujianum* Barros-Barreto & Maggs**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 46 (RB 420062)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES, SP, RJ); Domínio desconhecido; epicontinental
***Ceramium luetzelburgii* O.C.Schmidt**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ceramium luetzelburgii* var. *australe* A.B.Joly**
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 21(294): 5-393.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Domínio desconhecido; epicontinental, marinho
***Ceramium nitens* (C.Agardh) J.Agardh**
Voucher: Fujii, M.T. s.n. (RB 420066)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido
***Ceramium siliquosum* (Kütz.) Maggs & Hommers.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ceramium siliquosum* var. *lophophorum* (Feldm.-Maz.) Serio**
Voucher: Figueiredo, M.A.O. s.n. (RB 281809)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho
***Ceramium tenerrimum* (G.Mertens) Okamura**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 77 (RB 420068)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Ceramium vagans* P.C.Silva**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 126 (RB 420069)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); marinho

Champia Desv.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Champia feldmannii* Diaz-Pif.**
Voucher: Bandeira-Pedrosa, M.E. s.n. (PEUFR 11327)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Champia minuscula* A.B.Joly & Ugadim**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Champia parvula* (C.Agardh) Harv.**
Voucher: Bandeira-Pedrosa, M.E. s.n. (PEUFR 9054)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

***Champia salicornioides* Harv.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Champia vieillardii* Kütz.**
Voucher: Bandeira-Pedrosa, M.E. s.n. (PEUFR 9054)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Cheilosporum (Decne.) Zanardini

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cheilosporum cultratum* (Harv.) Aresch.**
Referência: Moura, C.W.N. 2000. Coralináceas com genículo (Rhodophyta, Corallinales) do litoral do Brasil. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 264 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Cheilosporum sagittatum* (J.V.Lamour.) Aresch.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho

Chondracanthus Kütz.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Chondracanthus acicularis* (Roth) Fredericq**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Chondracanthus teedei* (Mertens *ex* Roth) Fredericq**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Chondria C.Agardh

13 espécies (nenhuma endêmica)
***Chondria arcuata* Hollenb.**
Referência: Bacci, D.S. 2005. Estudos taxonômicos do gênero Chondria (Ceramiales, Rhodophyta) no litoral dos estados de São Paulo e Espírito Santo, Brasil. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 114 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP); marinho
***Chondria atropurpurea* Harv.**
Referência: Bacci, D.S. 2005. Estudos taxonômicos do gênero Chondria (Ceramiales, Rhodophyta) no litoral dos estados de São Paulo e Espírito Santo, Brasil. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 114 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); marinho
***Chondria capillaris* (Huds.) M.J.Wynne**
Referência: Bacci, D.S. 2005. Estudos taxonômicos do gênero Chondria (Ceramiales, Rhodophyta) no litoral dos estados de São Paulo e Espírito Santo, Brasil. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 114 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP); marinho
***Chondria collinsiana* M.A.Howe**
Referência: Bacci, D.S. 2005. Estudos taxonômicos do gênero Chondria (Ceramiales, Rhodophyta) no litoral dos estados de São Paulo e Espírito Santo, Brasil. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 114 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho
***Chondria dangeardii* E.Y.Dawson**
Referência: Bacci, D.S. 2005. Estudos taxonômicos do gênero Chondria (Ceramiales, Rhodophyta) no litoral dos estados de São Paulo e Espírito Santo, Brasil. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 114 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (ES); marinho
***Chondria dasyphylla* (Woodward) C.Agardh**
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 21(294): 5-393.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ); marinho
***Chondria decipiens* Kylin**
Referência: Yoneshigue, Y. 1985. Taxonomie et ecologie des algues marines dans la region de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brésil. Tese de Doutorado, L'Université D'Aix-Marseille II, Luminy. 466 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Chondria floridana* (F.S.Collins) M.A.Howe**
Referência: Bacci, D.S. 2005. Estudos taxonômicos do gênero Chondria (Ceramiales, Rhodophyta) no litoral dos estados de São Paulo e Espírito Santo, Brasil. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 114 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Chondria leptacremon* (Melvill *ex* G.Murray) De Toni**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho
***Chondria littoralis* Harv.**
Referência: Bacci, D.S. 2005. Estudos taxonômicos do gênero Chondria (Ceramiales, Rhodophyta) no litoral dos estados de São Paulo e Espírito Santo, Brasil. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 114 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho
***Chondria platyramea* A.B.Joly & Ugadim**
Referência: Bacci, D.S. 2005. Estudos taxonômicos do gênero Chondria (Ceramiales, Rhodophyta) no litoral dos estados de São Paulo e Espírito Santo, Brasil. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 114 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Chondria polyrhiza* F.S.Collins & Hervey**
Referência: Bacci, D.S. 2005. Estudos taxonômicos do gênero Chondria (Ceramiales, Rhodophyta) no litoral dos estados de São Paulo e Espírito Santo, Brasil. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 114 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

***Chondria sedifolia* Harv.**
Referência: Bacci, D.S. 2005. Estudos taxonômicos do gênero Chondria (Ceramiales, Rhodophyta) no litoral dos estados de São Paulo e Espírito Santo, Brasil. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 114 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, BA), Sudeste (ES, SP); marinho

Chondrophycus (Tokida & Saito) Garbary & J.T.Harper
1 espécie (1 endêmica)
***Chondrophycus furcatus* (Cord.-Mar. & M.T.Fujii) M.T.Fujii & Sentíes**
Referência: Fujii, M.T. & Sentíes, A.G. 2005. Monografias ficológicas Mexico: Universidad Autonoma Metropolitana 2: 69-135.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); marinho

Chrysymenia J.Agardh
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Chrysymenia enteromorpha* Harv.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); marinho
***Chrysymenia ventricosa* (J.V.Lamour.) J.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

Claudea J.V.Lamour.
1 espécie (não endêmica)
***Claudea elegans* J.V.Lamour.**
Referência: Nunes, J.M.C. 2005. Rodofíceas marinhas bentônicas do estado da Bahia, Brasil. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 410 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ); marinho

Coelarthrum Børgesen
1 espécie (não endêmica)
***Coelarthrum cliftonii* (Harv.) Kylin**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

Coelothrix Børgesen
1 espécie (não endêmica)
***Coelothrix irregularis* (Harv.) Børgesen**
Referência: Szechy, M.T.M. et al. 2005. Acta Bot. Brasil. 19: 587-596.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho

Compsothamnion (Nägeli) F.Schmitz
1 espécie (não endêmica)
***Compsothamnion thuyoides* (Sm.) F.Schmitz**
Voucher: Torres, J. s.n. (PEUFR 39358)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP); marinho

Corallophila Weber Bosse
1 espécie (1 endêmica)
***Corallophila atlantica* (A.B.Joly & Ugadim) R.E.Norris**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 146 (RB 420071)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho

Corynecladia J.Agardh
1 espécie (não endêmica)
***Corynecladia clavata* (Sond.) J.Agardh**
Voucher: Oliveira, E.C. s.n. (SPF 521185)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

Corynomorpha J.Agardh *nom. cons.*
1 espécie (não endêmica)
***Corynomorpha clavata* (Harv.) J.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES); marinho

Cottoniella Børgesen
1 espécie (não endêmica)
***Cottoniella filamentosa* (M.Howe) Børgesen**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Craspedocarpus F.Schmitz
1 espécie (não endêmica)
***Craspedocarpus jolyi* (E.C.Oliviera) C.W.Schneid.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Crouania J.Agardh
1 espécie (não endêmica)
***Crouania attenuata* (C.Agardh) J.Agardh**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 53390)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Crouanophycus Athanas.
1 espécie (não endêmica)
***Crouanophycus latiaxis* (I.A.Abbott) Athanas.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57637)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Domínio desconhecido; epicontinental

Cryptonemia J.Agardh
6 espécies (1 endêmica)
***Cryptonemia bengryi* W.R.Taylor**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 1990. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo - Rodofíceas marinhas bentônicas do estado do Espírito Santo: ordem Cryptonemiales. 275 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; marinho

***Cryptonemia crenulata* (J.Agardh) J.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 1990. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo - Rodofíceas marinhas bentônicas do estado do Espírito Santo: ordem Cryptonemiales. 275 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Cryptonemia delicatula* A.B.Joly & M.Cordeiro**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 1990. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo - Rodofíceas marinhas bentônicas do estado do Espírito Santo: ordem Cryptonemiales. 275 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Cryptonemia flabellifolia* Pinheiro-Joventino & E.C.Oliveira**
Referência: Pinheiro-joventino F. & Oliveira Filho E.C. 1977. Arq. Ciên. Mar. 17: 49-51.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Cryptonemia limensis* (Kütz.) J.A.Lewis**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 1990. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo - Rodofíceas marinhas bentônicas do estado do Espírito Santo: ordem Cryptonemiales. 275 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Cryptonemia seminervis* (C.Agardh) J.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 1990. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo - Rodofíceas marinhas bentônicas do estado do Espírito Santo: ordem Cryptonemiales. 275 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Cryptopleura Kütz.

1 espécie (não endêmica)
***Cryptopleura ramosa* (Huds.) Kylin *ex* L.Newton**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009. Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Dasya C.Agardh

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Dasya baillouviana* (S.G.Gmelin) Mont.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho
***Dasya brasiliensis* E.C.Oliveira & M.Braga**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Dasya corymbifera* J.Agardh**
Referência: Nunes, J.M.C. 2005. Rodofíceas marinhas bentônicas do estado da Bahia, Brasil. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 410 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); marinho
***Dasya elongata* Sonder**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho
***Dasya ocellata* (Gratel.) Harv.**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Dasya rigidula* (Kütz.) Ardissone**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); marinho

Dawsoniocolax A.B.Joly & Yam.-Tomita

1 espécie (não endêmica)
***Dawsoniocolax bostrychiae* (A.B.Joly & Yam.-Tomita) A.B.Joly & Yam.-Tomita**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Dichotomaria Lam.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Dichotomaria marginata* (J.Ellis & Sol.) Lamarck**
Voucher: Lucio, A.M. 34702 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Dichotomaria obtusata* (J.Ellis & Sol.) Lamarck**
Voucher: Nunes, J.M. de C. 17406 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Dictyurus (Bory) D.M.Williams & Round

1 espécie (não endêmica)
***Dictyurus occidentalis* J.Agardh**
Voucher: Pinheiro, F. s.n. (PEUFR 4395)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Digenea C.Agardh

1 espécie (não endêmica)
***Digenea simplex* (Wulfen) C.Agardh**
Voucher: Teixeira, G.C. s.n. (PEUFR 6314)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); marinho

Diplothamnion A.B.Joly & Yam.-Tomita

1 espécie (não endêmica)
***Diplothamnion tetrastichum* A.B.Joly & Yam.-Tomita**
Referência: Joly, A.B. et al. 1966. Rickia 159-181.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Dipterosiphonia F.Schmitz & Falkenb.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Dipterosiphonia dendritica* (C.Agardh) F.Schmitz**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP), Sul (SC); marinho
***Dipterosiphonia reversa* C.W.Schneid.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

***Dipterosiphonia rigens* (Shousboe *ex* C.Agardh) Falkenb.**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2002. Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco, Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, Recife. p. 97-124
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sul (SC); marinho

Dohrniella Funk
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (1 endêmica)
***Dohrniella antillara* (W.R.Taylor) Feldm.-Maz.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Dohrniella antillara* var. *brasiliensis* A.B.Joly & Ugadim**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57654)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP), Sul (SC); marinho

Enantiocladia Falkenb.
1 espécie (não endêmica)
***Enantiocladia duperreyi* (C.Agardh) Falkenb. in F.Schmitz**
Voucher: Araújo, M.S.V. s.n. (PEUFR 6084)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA); marinho

Erythrocladia Rosenv.
1 espécie (não endêmica)
***Erythrocladia pinnata* W.R.Taylor**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); marinho

Erythrotrichia Aresch.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Erythrotrichia carnea* (Dillwyn) J.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Erythrotrichia porphyroides* N.L.Gardner**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Fauchea Bory & Mont.
1 espécie (não endêmica)
***Fauchea hassleri* M.A.Howe & W.R.Taylor**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

Frikkiella M.J.Wynne & C.W.Schneid.
1 espécie (não endêmica)
***Frikkiella searlesii* M.J.Wynne & C.W.Schneid.**
Referência: Yoneshigue, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

Galaxaura J.V.Lamour.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Galaxaura comans* Kjellm.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho
***Galaxaura rugosa* (J.Ellis & Sol.) J.V.Lamour.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES); marinho

Ganonema K.C.Fan & Yung-C.Wang
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Ganonema dendroideum* (P.L.Crouan & H.M.Crouan) D.L.Ballantine & N.E.Aponte**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2002. Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco, Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, Recife. p. 97-124
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho
***Ganonema farinosum* (J.V.Lamour.) K.C.Fan & Y.C.Wang**
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 21(294): 5-393.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Ganonema pinnatum* (Harv.) Huisman**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2002. Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco, Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, Recife. p. 97-124
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); marinho

Gastroclonium Kütz. *nom. cons.*
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Gastroclonium ovatum* (Huds.) Papenf.**
Referência: Baptista, L.R.M. 1977. Bol. Inst. Bioci. Univ. Fed. Rio Grande do Sul 37: 1-244.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho
***Gastroclonium parvum* (Hollenb.) C.F.Chang & B.M.Xia**
Referência: Amado-Filho, G.M. et al. 2006. Braz. J. Oceanogr. 54: 225-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho

Gelidiella Feldmann & G.Hamel
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Gelidiella acerosa* (Forssk.) Feldmann & G. Hamel**
Voucher: Bandeira-Pedrosa, M.E. s.n. (PEUFR 40537)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Gelidiella hancockii* E.Y.Dawson**
Referência: Ugadim, Y. 1974. Bol. Bot. Univ. São Paulo 2: 93-137.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Gelidiella ligulata* E.Y.Dawson**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP); marinho
***Gelidiella sanctarum* Feldmann & G.Hamel**
Voucher: Nunes, J.M. de C. 65174 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (RN, BA); marinho

***Gelidiella setacea* (Feldmann) Feldmann & G.Hamel**
Referência: Oliveira Filho, E.C. & Ugadim, Y. 1976. Phycologia 15: 41-44.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); marinho
***Gelidiella taylori* A.B.Joly**
Referência: Joly, A.B. 1957. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 14: 3-199.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Gelidiella trinitatensis* W.R.Taylor**
Voucher: Ferreira, M. s.n. (PEUFR 8063)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Gelidiocolax N.L.Gardner

1 espécie (não endêmica)
***Gelidiocolax pustulata* E.C.Oliveira & Yonesh.**
Referência: Yoneshigue, Y. & Oliveira Filho, E.C 1984. J. Phycol. 20: 440-443.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho

Gelidiopsis F.Schmitz

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Gelidiopsis intricata* (C.Agardh) Vickers**
Referência: Joly, A.B. 1957. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 14: 3-199.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Gelidiopsis variabilis* (Grev. *ex* J.Agardh) F.Schmitz**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Gelidium J.V.Lamour.

8 espécies (nenhuma endêmica)
***Gelidium americanum* (W.R.Taylor) Santel.**
Referência: Ugadim, Y. 1985. Estudos taxonômicos de Gellidium e Pterocladia (Gelidiaeae-Nemaliales-Rhodophyta) do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 218 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PB), Sudeste (ES); marinho
***Gelidium coarctatum* Kütz.**
Referência: Ugadim, Y. 1985. Estudos taxonômicos de Gellidium e Pterocladia (Gelidiaeae-Nemaliales-Rhodophyta) do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 218 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); marinho
***Gelidium crinale* (Hare *ex* Turner) Gaillon**
Referência: Ugadim, Y. 1985. Estudos taxonômicos de Gellidium e Pterocladia (Gelidiaeae-Nemaliales-Rhodophyta) do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 218 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Gelidium floridanum* W.R.Taylor**
Referência: Ugadim, Y. 1985. Estudos taxonômicos de Gellidium e Pterocladia (Gelidiaeae-Nemaliales-Rhodophyta) do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 218 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Gelidium parvulum* Grev.**
Referência: Amado-Filho, G.M. 2006. Braz. J. Oceanogr. 54(4): 225-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Gelidium pusillum* (Stackh.) Le Jolis**
Referência: Ugadim, Y. 1985. Estudos taxonômicos de Gellidium e Pterocladia (Gelidiaeae-Nemaliales-Rhodophyta) do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 218 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Gelidium spinosum* (S.G.Gmelin) P.C.Silva**
Referência: Ugadim, Y. 1985. Estudos taxonômicos de Gellidium e Pterocladia (Gelidiaeae-Nemaliales-Rhodophyta) do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 218 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Gelidium torulosum* Kütz.**
Referência: Ugadim, Y. 1985. Estudos taxonômicos de Gellidium e Pterocladia (Gelidiaeae-Nemaliales-Rhodophyta) do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 218 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); marinho

Gloiocladia J.Agardh

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Gloiocladia iyoensis* (Okamura) R.E.Norris**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Gloiocladia iyoensis* var. *atlantica* (Searles) Horta**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Gracilaria Grev.

19 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Gracilaria armata* (C.Agardh) Grev.**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2002. Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco, Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, Recife. p. 97-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho
***Gracilaria birdiae* Palastino & E.C.Oliveira**
Referência: Plastino, E.M. & Oliveira, E.C. 2002. Phycologia 41: 389-396.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Gracilaria cearencis* (A.B.Joly & Pinheiro) A.B.Joly & Pinheiro**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2002. Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco, Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, Recife. p. 97-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA); marinho

***Gracilaria cervicornis* (Turner) J.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Gracilaria cuneata* Aresch.**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2002. Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco, Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, Recife. p. 97-124
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES); marinho
***Gracilaria curtissiae* J.Agardh**
Referência: Nunes, J.M.C. 2005. Rodofíceas marinhas bentônicas do estado da Bahia, Brasil. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 410 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), Sudeste (ES); marinho
***Gracilaria domingensis* (Kütz.) Sonder *ex* Dickie**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Gracilaria flabelliformis* (P.L.Crouan & H.M.Crouan) Fredericq & Gurgel**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Gracilaria flabelliformis* subsp. *simplex* Gurgel et al.**
Referência: Nunes, J.M.C. 2005. Rodofíceas marinhas bentônicas do estado da Bahia, Brasil. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 410 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); marinho
***Gracilaria galetensis* Gurgel et al.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. 57785 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho
***Gracilaria gracilis* (Stackh.) M.Steentoft**
Referência: Melo, C.O. et al. 2009. Anais 9 Cong. Ecol. 1-3.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB); marinho
***Gracilaria hayi* Gurgel et al.**
Referência: Carvalho, F.A.F. 1983. Bionomia bêntica do complexo recifal no litoral do estado da Paraíba, com ênfase nas macrófitas. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 184 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB); marinho
***Gracilaria intermedia* J.Agardh**
Referência: Nunes, J.M.C. 2005. Rodofíceas marinhas bentônicas do estado da Bahia, Brasil. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 410 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho
***Gracilaria isabellana* Gurgel et al.**
Referência: Nunes, J.M.C. 2005. Rodofíceas marinhas bentônicas do estado da Bahia, Brasil. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 410 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA); marinho
***Gracilaria mammillaris* (Mont.) M.A.Howe**
Referência: Nunes, J.M.C. 2005. Rodofíceas marinhas bentônicas do estado da Bahia, Brasil. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 410 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Gracilaria oliveirarum* Gurgel et al.**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2002. Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco, Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, Recife. p. 97-124
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB); marinho
***Gracilaria ornata* Aresch.**
Referência: Nunes, J.M.C. 2005. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo - Rodofíceas marinhas bentônicas do estado do Espírito Santo: ordem Cryptonemiales. 410 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (ES); marinho
***Gracilaria pauciramosa* (N.Rodriguez Rios) Bellorín et al.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. 52817 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); marinho
***Gracilaria smithsoniensis* Gurgel et al.**
Voucher: Lucio, A.M. 34745 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho
***Gracilaria tepocensis* (E.Y.Dawson) E.Y.Dawson**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho

Grallatoria M.Howe

1 espécie (não endêmica)
***Grallatoria reptans* M.Howe**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57614)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho

Grateloupia C.Agardh

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Grateloupia dichotoma* J.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Grateloupia doryphora* (Mont.) M.A.Howe**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Grateloupia filicina* (J.V.Lamour.) C.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Griffithsia C.Agardh

4 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (1 endêmica)
***Griffithsia caribaea* Mazoyer**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57653)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES); marinho
***Griffithsia globulifera* Harv. *ex* Kütz.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 60630)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); marinho

***Griffithsia radicans* Kütz.**
Referência: Taylor, W.R. 1960. Marine algae of the eastern tropical and subtropical coasts of Americas. University of Michigan Press. 870 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Griffithsia schousboei* Mont.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Griffithsia schousboei* var. *anastomosans* E.C.Oliveira**
Referência: Oliveira , E.C. 1969. Bol. Bot. Univ. São Paulo 26: 1-277.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); marinho

Grinnellia Harv.

1 espécie (não endêmica)
***Grinnellia americana* (C.Agardh) Harv.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

Gymnogongrus Mart.

1 espécie (não endêmica)
***Gymnogongrus griffithsiae* (Turner) Mart.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Gymnothamnion J.Agardh

1 espécie (não endêmica)
***Gymnothamnion elegans* (Schousb. *ex* C.Agardh) J.Agardh**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 49264)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho

Haliptilon (Decne.) Lindl.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Haliptilon cubense* (Mont. *ex* Kütz.) Garbary & H.W.Johansen**
Voucher: Nunes, J.M. de C. 57418 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Haliptilon subulatum* (J.Ellis & Sol.) Johans.**
Voucher: Lucio, A.M. 34682, 34683, 34684 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Halopithys Kütz.

1 espécie (não endêmica)
***Halopithys schottii* (W.R.Taylor) L.E.Phillips & De Clerck**
Voucher: Teixeira, G.C. s.n. (PEUFR 4958)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Haloplegma Mont.

1 espécie (não endêmica)
***Haloplegma duperreyi* Mont.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (aLCB 22255)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho

Halydictyon Zanardini

1 espécie (não endêmica)
***Halydictyon mirabile* Zanardini**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17:143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Halymenia C.Agardh

9 espécies (nenhuma endêmica)
***Halymenia brasiliana* S.M.Guim. & M.T.Fujii**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho
***Halymenia clathrata* E.C.Oliveira et al.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho
***Halymenia duchassaingii* (J.Agardh) Kylin**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2002. Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco, Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, Recife. 97-124 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); marinho
***Halymenia elongata* C.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Halymenia floresii* (Clemente & Rubio) C.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul; marinho
***Halymenia floridana* J.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Halymenia pseudofloresii* F.S.Collins & M.A.Howe**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (ES); marinho
***Halymenia rosea* M.Howe & W.R.Taylor**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Halymenia vinacea* M.Howe & W.R.Taylor**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho

Haraldia Feldmann

1 espécie (não endêmica)
***Haraldia tenuis* E.C.Oliveira**
Referência: Yoneshigue, Y. 1985. Taxonomie et ecologie des algues marines dans la region de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brésil. Tese de Doutorado, L'Université D'Aix-Marseille II, Luminy. 466 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho

Helminthocladia J.Agardh
1 espécie (não endêmica)
***Helminthocladia calvadosii* (J.V.Lamour. *ex* Duby) Setchell**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

Herposiphonia Nägeli
1 espécie (não endêmica)
***Herposiphonia bipinnata* M.A.Howe**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009.
Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho

Heterodasya A.B.Joly & E.C.Oliveira
1 espécie (não endêmica)
***Heterodasya mucronata* (Harv.) M.J.Wynne**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES); marinho

Heterosiphonia Mont.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Heterosiphonia crassipes* (Harv.) Falkenb.**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009.
Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Heterosiphonia crispella* (C.Agardh) M.J.Wynne**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009.
Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Heterosiphonia gibbesii* (Harv.) Falkenb.**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009.
Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Hildenbrandia Nardo
1 espécie (não endêmica)
***Hildenbrandia rubra* (Sommerf.) Menegh.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Hydrolithon Foslie
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Hydrolithon boergesenii* (Foslie) Foslie**
Referência: Figueiredo, M.A. & Steneck, R.S. 2002.
Proc. 9th Int. Coral Reef Sym. p. 493-498.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho
***Hydrolithon farinosum* (J.V.Lamour.) Penrose & Y.M.Chamberlain**
Referência: Ugadim, Y. 1975. Bol. Bot. Univ. São Paulo 3: 115-164.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Hydrolithon samoënse* (Foslie) Keats & Y.M.Chamberlain**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009.
Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Hydropuntia Mont.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hydropuntia cornea* (J.Agardh) M.J.Wynne**
Referência: Soriano, E.M. et al. 2001.
Bioresour.Technol. 77: 115- 120.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA); marinho
***Hydropuntia crassissima* (P.L. Crouan & H.M. Crouan) M.J. Wynne**
Voucher: Queiroz, E. 60617 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho

Hypnea J.V.Lamour.
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Hypnea cenomyce* J.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Hypnea cornuta* (Kütz.) J.Agardh**
Referência: Yoneshigue, Y. 1985. Taxonomie et ecologie des algues marines dans la region de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brésil. Tese de Doutorado, L'Université D'Aix-Marseille II, Luminy. 466 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Hypnea musciformis* (Wulfen) J.V.Lamour.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Hypnea nigrescens* Grev. *ex* J.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho
***Hypnea spinella* (C.Agardh) Kütz.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Hypnea valentiae* (Turner) Mont.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Hypnea volubilis* Searles**
Referência: Amado-Filho, G.M. et al. 2006.
Braz. J. Oceanogr. 54: 225-234.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ); marinho

Janczewskia Solms-Laubach
1 espécie (não endêmica)
***Janczewskia moriformis* Setchell**
Referência: Fujii, M.T. & Guimarães, S.M.P.B. 1999.
Phycologia 38: 1-7.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

Jania J.V.Lamour.
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Jania adhaerens* J.V.Lamour.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. 49269 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Sudeste
(ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Jania crassa* J.V.Lamour.**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009.
Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Jania prolifera* A.B.Joly**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009.
Rodriguésia 60(1): 25-47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Jania pumila* J.V.Lamour.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. 52941 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(MA, PI, CE, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); marinho
***Jania rubens* (L.) J.V.Lamour.**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009.
Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Jania ungulata* (Yendo) Yendo**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009.
Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Kallymenia J.Agardh
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Kallymenia limminghei* Mont.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES);
marinho
***Kallymenia westii* Ganesan**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste
(ES, RJ); marinho

Laurencia J.V.Lamour.
9 espécies (nenhuma endêmica)
***Laurencia aldingensis* Saito & Womersley**
Voucher: Cassano, V. s.n. (SP 399854)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (ES, RJ); marinho
***Laurencia caduciramulosa* Masuda & Kawag.**
Voucher: Cassano, V. s.n. (HRJ 10826)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); marinho
***Laurencia caraibica* P.C.Silva**
Voucher: Villaça, R.C. s.n. (SP 399940)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (RN, BA); marinho
***Laurencia catarinensis* Cord.-Mar. & M.T.Fujii**
Voucher: Cordeiro-Marino, M. s.n. (SP 164254)
Distribuição: nativa; não endêmica;
udeste (ES, RJ), Sul (SC); marinho
***Laurencia dendroidea* J.Agardh**
Voucher: Cassano, V. s.n. (SP 365436)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Laurencia intricata* J.V.Lamour.**
Referência: Fujii, M.T. & Sentíes, A.G. 2005.
Monografias ficológicas Mexico: Universidad
Autonoma Metropolitana 2: 69-135.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP), Sul (RS); marinho
***Laurencia oliveirana* Yonesh.**
Voucher: Yoneshigue, Y. s.n. (SPF 24767)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Laurencia translucida* M.T.Fujii & Cord.-Mar.**
Voucher: Fujii, M.T. s.n. (SP 255339)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Laurencia venusta* Yamada**
Referência: Fujii, M.T. et al. 2005.
Mus. Nac. Série Livros 10:527-536.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

Lejolisia Bornet
1 espécie (não endêmica)
***Lejolisia mediterranea* Bornet**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57736)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); marinho

Leptofauchea Kylin
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Leptofauchea brasiliensis* A.B.Joly**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17:143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); marinho
***Leptofauchea pacifica* E.Y.Dawson**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); marinho
***Leptofauchea rhodymenioides* W.R.Taylor**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste
(ES, RJ); marinho

Lithophyllum Phil.
8 espécies (nenhuma endêmica)
***Lithophyllum congestum* (Foslie) Foslie**
Referência: Figueiredo, M.A. & Steneck, R.S. 2002.
Proc. 9th Int. Coral Reef Sym. p. 493-498.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho
***Lithophyllum corallinae* (Crouan & Crouan) Heydr.**
Voucher: Amado-Filho, G.M. 454254 (SP 187567)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Lithophyllum depressum* A.B.Villas-Boas**
Voucher: Villas-Boas, A.B. 454263 (SP 187567)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES); marinho
Lithophyllum frondosum
Referência: Figueiredo, M.A. & Steneck, R.S. 2002.
Proc. 9th Int. Coral Reef Sym. p. 493-498.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?);
Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (SC); marinho

***Lithophyllum johansenii* Woelk. & Campbell**
Voucher: Villas-Boas, A.B. 454259 (SP 187567)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho
***Lithophyllum margaritae* (Hariot) Heydr.**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); marinho
***Lithophyllum pustulatum* (J.V.Lamour.) Foslie**
Referência: Oliveira , E.C. 1977. Algas marinhas bentônicas do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 407 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP); marinho
***Lithophyllum stictaeforme* (J.E.Aresch.) Hauck**
Voucher: Nunes, J.M. de C. 65194 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Lithothamnion Heydr.

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Lithothamnion brasiliense* Foslie**
Referência: Oliveira , E.C. 1977. Algas marinhas bentônicas do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 407 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Lithothamnion occidentale* (Foslie) Foslie**
Referência: Figueiredo, M.A. & Steneck, R.S. 2002. Proc. 9th Int. Coral Reef Sym. p. 493-498.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA); Domínio desconhecido; epicontinental
Lithothamnion polymorphum
Referência: Oliveira , E.C. 1977. Algas marinhas bentônicas do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 407 p.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sudeste (RJ); marinho
Lithothamnion sejunctum
Referência: Figueiredo, M.A. & Steneck, R.S. 2002. Proc. 9th Int. Coral Reef Sym. p. 493-498.
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Nordeste (BA); marinho
Lithothamnion superpositum
Referência: Oliveira , E.C. 1977. Algas marinhas bentônicas do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 407 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Lomentaria Lyngbye

1 espécie (não endêmica)
***Lomentaria corallicola* Børgesen**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009. Rodriguésia 60(1):39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Lophocladia F.Schmitz

1 espécie (não endêmica)
***Lophocladia trichoclados* (C.Agardh) F.Schmitz**
Referência: Nunes, J.M.C. 2005. Rodofíceas marinhas bentônicas do estado da Bahia, Brasil. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 410 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); marinho

Lophosiphonia Falkenb.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Lophosiphonia cristata* Falkenb.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho
***Lophosiphonia obscura* (C.Agardh) Falkenb.**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2002. Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco, Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, Recife. p. 97-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE); marinho

Meristotheca J.Agardh

1 espécie (não endêmica)
***Meristotheca echinocarpa* (J.E.Aresch.) E.J.Faye & M.Masuda**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2007. Ecosytems and sustainable development VI. Wit Press: Transactions on ecology and the enviromment 106: 185-294.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Sudeste (ES); marinho

Mesophyllum Marie Lemoine

1 espécie (não endêmica)
***Mesophyllum erubescens* (Folie) Me. Lemoine**
Voucher: Nunes, J.M. de C. 65196 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA); marinho

Murrayella F.Schmitz

1 espécie (não endêmica)
***Murrayella periclados* (C.Agardh) F.Schmitz**
Voucher: Fortes, A.C.M. s.n. (PEUFR 17106)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

Myriogramme Kylin

1 espécie (não endêmica)
***Myriogramme prostrata* (E.Y.Dawson et al.) M.J.Wynne**
Referência: Amado-Filho, G.M. et al. 2006. Braz. J. Oceanogr. 54(4): 225-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Nemalion Duby

1 espécie (não endêmica)
***Nemalion helminthoides* (Velley) Batters**
Referência: Cordeiro-Marino, M. 1978. Rickia 7: 1-243.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); marinho

Neogoniolithon (Foslie & M.A.Howe) Setchell & L.R.Mason

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Neogoniolithon accretum* (Foslie & M.A.Howe) Setchell & L.R.Mason**

Referência: Oliveira , E.C. 1977. Algas marinhas bentônicas do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 407 p.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido; epicontinental

***Neogoniolithon mamillare* (Harv.) Setch. & L.R.Mason**

Referência: Taylor, W.R. 1930. Revue Algologie 5: 1-35.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho

Neosiphonia M.-S. Kim & I.K.Lee

7 espécies (nenhuma endêmica)

***Neosiphonia ferulacea* (Suhr *ex* J.Agardh) S.M.Guim. & M.T.Fujii**

Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SPF 355472)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

***Neosiphonia gorgoniae* (Harv.) S.M.Guim. & M.T.Fujii**

Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SPF 355476)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

***Neosiphonia harveyi* (Bailey) M.S.Kim & I.K.Lee**

Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 355478)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES); marinho

***Neosiphonia saccorhiza* (Collins & Herv.) J.M.C.Nunes & S.M.Guim.**

Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 65209)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (RN, BA), Sudeste (RJ); marinho

***Neosiphonia sphaerocarpa* (Børgesen) M.S.Kim & I.K.Lee**

Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SPF 3555505)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

***Neosiphonia tepida* (Hollenb.) S.M.Guim. & M.T.Fujii**

Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SPF 318159)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

***Neosiphonia tongatensis* (Harv. *ex* Kütz.) M.S.Kim & I. K.Lee**

Voucher: Amado-Filho, G.M. s.n. (ALCB 53386)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); marinho

Neuroglossum Kütz.

1 espécie (não endêmica)

***Neuroglossum binderianum* Kütz.**

Referência: Yoneshigue, Y. 1985. Taxonomie et ecologie des algues marines dans la region de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brésil. Tese de Doutorado, L'Université D'Aix-Marseille II, Luminy. 466 p.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); marinho

Ochtodes J.Agardh

1 espécie (não endêmica)

***Ochtodes secundiramea* (Mont.) M.Howe**

Voucher: Pereira, S.M.B. s.n. (PEUFR 15719)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (ES); marinho

Ophidocladus Falkenb.

1 espécie (não endêmica)

***Ophidocladus simpliciusculus* (P.Crouan & H.Crouan) Falkenberg**

Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Osmundaria J.V.Lamour.

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Osmundaria melvillii* (J.Agardh) R.E.Norris**

Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

***Osmundaria obtusiloba* (C.Agardh) R.E.Norris**

Voucher: Silva, R.L. s.n. (PEUFR 7807)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho

***Osmundaria volubilis* (L.) R.E.Norris**

Referência: Pinheiro-Joventino, F. et al. 1998. Arq. Ciên. Mar. Fortaleza 31(1-2): 29-40.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); marinho

Osmundea Stackhouse

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Osmundea lata* (M.Howe & W.R.Taylor) Y.Yoneshigue-Valentin et al.**

Referência: Fujii, M.T. & Sentíes, A.G. 2005. Monografias ficológicas Mexico: Universidad Autonoma Metropolitana 2: 69-135.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

***Osmundea pinnatifida* (Huds.) Stackh.**

Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

Palisada K.W.Nam

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Palisada corallopsis* (Mont.) Sentíes et al.**

Referência: Fujii, M.T. & Sentíes, A.G. 2005. Monografias ficológicas Mexico: Universidad Autonoma Metropolitana 2: 69-135.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

***Palisada flagellifera* (J.Agardh) K.W.Nam**

Referência: Fujii, M.T. & Sentíes, A.G. 2005. Monografias ficológicas Mexico: Universidad Autonoma Metropolitana 2: 69-135.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

***Palisada perforata* (Bory) K.W.Nam**

Referência: Cassano, V. et al. 2009. Phycologia 48: 86-100.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

Parviphycus Santel.

1 espécie (não endêmica)

***Parviphycus tenuissimus* (Feldmann & G.Hamel) Santel.**

Referência: Szechy, M.T.M. et al. 2005. Acta Bot. Brasil. 9: 587-596.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); marinho

Petroglossum Hollenb.
1 espécie (não endêmica)
***Petroglossum undulatum* C.W.Schneid.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho

Peyssonnelia Decne.
9 espécies (nenhuma endêmica)
***Peyssonnelia armorica* (P.L.Crouan & H.M.Crouan) Weber-van Bosse**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP), Sul (PR); marinho
***Peyssonnelia boergesenii* Weber Bosse**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Peyssonnelia boudouresquei* Yonesh.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17:143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Peyssonnelia capensis* Mont.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. & Fujii, M.T. 1999.
Phycologia 38: 167-183.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Peyssonnelia inamoena* Pilg.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Peyssonnelia polymorpha* (Zanardini) F.Schmitz**
Referência: Joly, A.B. 1957. Bol. Fac. Fil. Ciênc.
Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 14: 1-199.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Peyssonnelia rosenvingei* F.Schmitz**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2002. Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco, Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, Recife. p. 97-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho
***Peyssonnelia simulans* Weber Bosse**
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Fac. Fil. Ciênc.
Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 21(294): 5-393.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB), Sudeste (SP); marinho
Peyssonnelia valentinii Yonesh. & Boudour.
Referência: Yoneshigue, Y. 1994. Vie et Milieu 34: 133-137.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); marinho

Phymatolithon Foslie
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phymatolithon calcareum* (Pall.) Adey & D.L.McKibbin**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia.
Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); marinho
***Phymatolithon masonianum* Wilks & Woelkerling**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia.
Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); marinho

Platysiphonia Børgesen
1 espécie (não endêmica)
***Platysiphonia delicata* (Clemente) Cremades**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Pleonosporium Nägeli
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Pleonosporium boergesenii* (A.B.Joly) R.E.Norris**
Referência: Joly, A.B. 1957. Bol. Fac. Fil. Ciênc.
Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 14: 1-199.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP); marinho
***Pleonosporium borreri* (J.E.Sm.) Nägeli**
Referência: Ugadim, Y. 1976. Bol. Bot. Univ.
São Paulo 4: 133-172.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Pleonosporium mexicanum* E.Y.Dawson**
Referência: Oliveira , E.C. 1969. Bol. Fac. Fil.
Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 26: 1-277.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Pneophyllum Kütz.
1 espécie (não endêmica)
***Pneophyllum fragile* Kütz.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot.
(São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho

Polysiphonia Grev.
7 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Polysiphonia decussata* Hollenb.**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 355480)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Polysiphonia denudata* (Dillwyn) Grev. *ex* Harv.**
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 21(294): 5-393.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Polysiphonia havanensis* Mont.**
Referência: Falcão, C. et al. 1992. Bot. Mar. 35: 257-364.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Polysiphonia howei* Hollenb.**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 355511)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Polysiphonia scopulorum* Harv.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica

***Polysiphonia scopulorum* var. *villum* (J.Agardh) Hollenberg**
Voucher: Figueiredo, M.A.O. s.n. (RB 281845)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Polysiphonia sertularioides* (Gratel.) J.Agardh**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 355473)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho
***Polysiphonia subtilissima* Mont.**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 355743)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho

Porphyra C.Agardh

6 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)
***Porphyra acanthophora* E.C.Oliveira & Coll**
Distribuição: nativa; não endêmica
Porphyra acanthophora* E.C.Oliveira & Coll var. *acanthophora
Referência: Oliveira Filho, E.C. de & Coll, J. 1975. Bot. Mar. 18: 191-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); marinho
***Porphyra acanthophora* var. *brasiliensis* E.C.Oliveira & Coll**
Referência: Oliveira Filho, E.C. de & Coll, J. 1975. Bot. Mar. 18: 191-197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); marinho
***Porphyra drewiana* Coll & E.C.Oliveira**
Referência: Coll, J. & Oliveira, E.C. 2001. Phycol. Res. 49: 67-72.
Distribuição: nativa; não endêmica; marinho
***Porphyra leucosticta* Thur.**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009. Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Porphyra pujalsii* Coll & E.C.Oliveira**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009. Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Porphyra roseana* M.Howe**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2008. Iheringia, Bot. 63(1): 129-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Porphyra spiralis* E.C.Oliveira & Coll**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Porphyra spiralis* var. *amplifolia* E.C.Oliveira & Coll**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009. Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
Porphyra spiralis* E.C.Oliveira & Coll var. *spiralis
Referência: Milstein, D. & Oliveira, M.C. 2005. Phycologia 44: 212-221.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); marinho

Predaea De Toni *fil.*

1 espécie (não endêmica)
***Predaea feldmannii* Børgesen**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

Pterocladiella Santel. & Hommers.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Pterocladiella bartlettii* (W.R.Taylor) Santel.**
Referência: Ugadim, Y. 1985. Estudos taxonômicos de Gellidium e Pterocladia (Gelidiaeae-Nemaliales-Rhodophyta) do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 218 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, RN, PB, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Pterocladiella caerulescens* (Kütz.) Santel. & Hommers.**
Referência: Ugadim, Y. 1985. Estudos taxonômicos de Gellidium e Pterocladia (Gelidiaeae-Nemaliales-Rhodophyta) do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 218 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Pterocladiella capillacea* (S.G.Gmelin) Santel. & Hommers.**
Referência: Ugadim, Y. 1985. Estudos taxonômicos de Gellidium e Pterocladia (Gelidiaeae-Nemaliales-Rhodophyta) do Brasil. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo. 218 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Pterosiphonia Falkenb.

3 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Pterosiphonia parasitica* (Huds.) Falkenb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pterosiphonia parasitica* var. *australis* A.B.Joly & Cord.-Mar.**
Referência: Cordeiro-Marino, M. 1978. Rickia 7: 1-243.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Pterosiphonia pennata* (C.Agardh) Falkenb.**
Referência: Cordeiro-Marino, M. 1978. Rickia 7: 1-243.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Pterosiphonia spinifera* (Kütz.) Ardré**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009. Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Pterothamnion Nägeli

1 espécie (não endêmica)
***Pterothamnion heteromorphum* (J.Agardh) Athanas. & Kraft**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Ptilothamnion Thur.
1 espécie (não endêmica)
***Ptilothamnion speluncarum* (F.S.Collins & Hervey) D.L.Ballant. & M.J.Wynne**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57711)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho

Rhodophyllis Kütz.
1 espécie (não endêmica)
***Rhodophyllis gracilarioides* M.A.Howe & W.R.Taylor**
Referência: Howe M.A. & Taylor W.R. 1931. Brittonia 1: 7-33.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Rhodymenia Grev.
3 espécies (nenhuma endêmica)
Rhodymenia delicatula
Referência: Amado-Filho, G.M. et al. 2006. Braz. J. Oceanogr. 54(4): 225-234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); marinho
***Rhodymenia divaricata* E.Y.Dawson**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho
***Rhodymenia pseudopalmata* (J.V.Lamour.) P.C.Silva**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

Sahlingia Kornmann
1 espécie (não endêmica)
***Sahlingia subintegra* (Rosenv.) Kornmann**
Referência: Cordeiro-Marino, M. 1978. Rickia 7: 1-243.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Scinaia Biv.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Scinaia complanata* (F.S.Collins) A.D.Cotton**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Scinaia furcellata* (Turner) J.Agardh**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia.
Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Scinaia halliae* (Setchell) Huisman**
Voucher: Guimarães, S.M.P.B. s.n. (SP 400065)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho

Sebdenia (J.Agardh) Berthold
1 espécie (não endêmica)
***Sebdenia flabellata* (J.Agardh) P.G.Parkinson**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Solieria J.Agardh
1 espécie (não endêmica)
***Solieria filiformis* (Kütz.) P.W.Gabrielson**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2007. Ecosytems and sustainable development VI. Wit Press: Transactions on ecology and the enviromment 106: 185-294.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Spermothamnion Aresch.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Spermothamnion investiens* (P.L.Crouan & H.M.Crouan) Vickers**
Referência: Oliveira , E.C. 1969. Anais 10 Reunião Bras. Ficol. 26: 1-277.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho
***Spermothamnion nonatoi* A.B.Joly**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 53377)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Spongoclonium Sonder
1 espécie (não endêmica)
***Spongoclonium caribaeum* (Børgesen) M.J.Wynne**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57718)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Sporolithon Heydr.
8 espécies (nenhuma endêmica)
***Sporolithon africanum* (Foslie) J.Afonso-Carrillo**
Referência: Tomita, N.Y. 1976. Contribuição ao conhecimento do gênero Sporolithon (Corallinaceae, Cryptonemiales) no Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas. 138 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); marinho
***Sporolithon australasicum* (Foslie) Yam.-Tomita *ex* M.J.Wynne**
Referência: Tomita, N.Y. 1976. Contribuição ao conhecimento do gênero Sporolithon (Corallinaceae, Cryptonemiales) no Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas. 138 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho
***Sporolithon dimotum* (Foslie & M.A.Howe) Yam.-Tomita *ex* M.J.Wynne**
Referência: Figueiredo, M.A. & Steneck, R.S. 2002. Proc. 9th Int. Coral Reef Sym. p. 493-498.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho
***Sporolithon episporum* (M.A.Howe) E.Y.Dawson**
Voucher: Nunes, J.M. de C. 65195 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP); marinho
***Sporolithon erythraeum* (Rothpletz) Kylin**
Referência: Tomita, N.Y. 1976. Contribuição ao conhecimento do gênero Sporolithon (Corallinaceae, Cryptonemiales) no Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas. 138 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); marinho

***Sporolithon howei* (Lemoine) Yam.-Tomita *ex* M.J.Wynne**
Referência: Tomita, N.Y. 1976. Contribuição ao conhecimento do gênero Sporolithon (Corallinaceae, Cryptonemiales) no Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas. 138 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho
***Sporolithon pacificum* E.Y.Dawson**
Referência: Tomita, N.Y. 1976. Contribuição ao conhecimento do gênero Sporolithon (Corallinaceae, Cryptonemiales) no Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas. 138 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES); marinho
***Sporolithon ptychoides* Heydr.**
Referência: Tomita, N.Y. 1976. Contribuição ao conhecimento do gênero Sporolithon (Corallinaceae, Cryptonemiales) no Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas. 138 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

Spyridia Harv.

3 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Spyridia clavata* Kütz.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 57633)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Spyridia filamentosa* (Wulfen) Harv.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Spyridia filamentosa* var. *refracta* (Wulfen) Harv.**
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 21(294): 5-393.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho
***Spyridia hypnoides* (Bory) Papenf.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Spyridia hypnoides* subsp. *complanata* (J.Agardh) M.J.Wynne**
Referência: Pinheiro-Joventino, F. et al. 1998. Arq. Ciên. Mar. Fortaleza 31(1-2): 29-40.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); marinho
***Spyridia hypnoides* var. *disticha* (Børgesen) G.W.Lawson & D.M.John**
Referência: Oliveira , E.C. 1969. Anais 10 Reunião Bras. Ficol. 26: 1-277.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

Spyridiocolax A.B.Joly & E.C.Oliveira

1 espécie (não endêmica)
***Spyridiocolax capixaba* A.B.Joly & E.C.Oliveira**
Referência: Oliveira , E.C. 1969. Anais 10 Reunião Bras. Ficol. 26: 1-277.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

Stenogramme Harv.

1 espécie (não endêmica)
***Stenogramme interrupta* (C.Agardh) Mont. *ex* Harv.**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Streblocladia F.Schmitz

1 espécie (não endêmica)
***Streblocladia corymbifera* (C.Agardh) Kylin**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009. Rodriguésia 60(1): 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); marinho

Stylonema Reinsch

1 espécie (não endêmica)
***Stylonema alsidii* (Zanardini) K.M.Drew**
Referência: Pereira, S.M.B. et al. 2007. Ecosytems and sustainable development VI. Wit Press: Transactions on ecology and the enviromment 106: 185-294.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

Taenioma J.Agardh

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Taenioma nanum* (Kütz.) Papenf.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP); marinho
***Taenioma perpusillum* (J.Agardh) J.Agardh**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Thuretia Decne.

1 espécie (não endêmica)
***Thuretia bornetii* Vickers**
Voucher: Melo, L.B.P. s.n. (PEUFR 14230)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES); marinho

Tiffaniella Doty & Meñez

1 espécie (não endêmica)
***Tiffaniella gorgonea* (Mont.) Doty & Meñez**
Voucher: Ugadim, Y. s.n. (ALCB 29883)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (ES); marinho

Titanoderma Nägeli

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Titanoderma bermudense* (Foslie & M.Howe) Woelk. et al.**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 138 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); marinho
***Titanoderma pustulatum* (J.V.Lamour.) Nägeli**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 138 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Titanophora (J.Agardh) Feldmann
1 espécie (não endêmica)
***Titanophora incrustans* (J.Agardh) Børgesen**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES);
Domínio desconhecido; epicontinental

Tricleocarpa Huisman & Borow.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Tricleocarpa cylindrica* (J.Ellis & Sol.) Huisman & Borow.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Tricleocarpa fragilis* (L.) Huisman & R.A.Towns.**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Wrangelia C.Agardh
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Wrangelia argus* (Mont.) Mont.**
Voucher: Nunes, J.M. de C. s.n. (ALCB 48399)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Wrangelia penicillata* (C.Agardh) C.Agardh**
Referência: Oliveira , E.C. 1969. Anais 10
Reunião Bras. Ficol. 26: 1-277.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

Wrightiella F.Schmitz
1 espécie (não endêmica)
***Wrightiella tumanowiczii* (Gatty *ex* Harv.) F.Schmitz**
Referência: Oliveira , E.C. 1969. Anais 10
Reunião Bras. Ficol. 343(26): 1-277.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(RN, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Wurdemannia Harv.
1 espécie (não endêmica)
***Wurdemannia miniata* (Spreng.) Feldmann & Hamel**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. 2006.
Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17: 143-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste
(ES, SP, RJ); marinho

SYNUROPHYCEAE
Mariângela Menezes
3 gêneros, 42 espécies (nenhuma endêmica),
15 variedades (1 endêmica)

Chrysodidymus Prowse
1 espécie (não endêmica)
***Chrysodidymus synuroides* Prowse**
Referência: Kristiansen, J. & Menezes, M. 1998.
Algol. Stud. 90: 97-118.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste
(SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

Mallomonas Perty
33 espécies (nenhuma endêmica), 12 variedades
(nenhuma endêmica)
***Mallomonas acaroides* Perty**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih.
Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas alpina* Pascher & Ruttner Asmund & Kristiansen**
Referência: Franceschini, I.M. et al. 2005.
Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 103-116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas annulata* (W.H.Bradley) K.Harris**
Referência: Franceschini, I.M. et al. 2005.
Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 103-116.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas areolata* Nygaard**
Referência: Franceschini, I.M. et al. 1996.
Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 103-116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas bronchartiana* Compère**
Referência: Kristiansen, J. & Menezes, M. 1998.
Algol. Stud. 90: 97-118.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia; epicontinental
***Mallomonas calceolus* W.H.Bradley**
Referência: Franceschini, I.M. & Kristiansen, J. 2004.
Algol. Stud. 111: 63-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas canina* Kristiansen**
Referência: Franceschini, I.M. & Kristiansen, J. 2004.
Algol. Stud. 111: 63-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);
Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas caudata* Ivanov *emend.* Willi Krieg.**
Referência: Franceschini, I.M. et al. 2005.
Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 103-116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste
(SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas corymbosa* Asmund & D.K.Hilliard**
Referência: Franceschini, I.M. et al. 1996.
Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 103-116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas crassisquama* (Asmund) Fott**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih.
Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste
(RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas cristata* Dürrschm.**
Referência: Franceschini, I.M. & Kristiansen, J. 2004.
Algol. Stud. 111: 63-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

***Mallomonas cyathellata* Wujek & Asmund**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mallomonas cyathellata* var. *chilensis* Dürrschm.**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih. Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas cyathellata* var. *keniana* Wujek & Asmund**
Referência: Franceschini, I.M. et al. 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 103-116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas elongata* Reverdin**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih. Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas favosa* K.H.Nicholls**
Referência: Franceschini, I.M. & Kristiansen, J. 2004. Algol. Stud. 111: 63-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas fenestrata* Cronberg & B.Hickel**
Referência: Kristiansen, J. & Menezes, M. 1998. Algol. Stud. 90: 97-118.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia; epicontinental
***Mallomonas gutatta* Wujek**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih. Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas lelymene* K.Harris & W.H.Bradley**
Referência: Franceschini, I.M. et al. 1996. Algol. Stud. 80: 59-85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas mangofera* K.Harris & W.H.Bradley**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mallomonas mangofera* Harris & Bradley var. *mangofera
Referência: Kristiansen, J. & Menezes, M. 1998. Algol. Stud. 90: 97-118.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas matvienkoae* (Matv.) Asmund & Kristiansen**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mallomonas matvienkoae* var. *grandis* Dürrschm. & Cronberg**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih. Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
Mallomonas matvienkoae* (Matvienko) Asmund & Kristiansen var. *matvienkoae
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih. Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas morrisonensis* Croome & P.A.Tyler**
Referência: Franceschini, I.M. & Kristiansen, J. 2004. Algol. Stud. 111: 63-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas multisetigera* Dürrschm.**
Referência: Franceschini, I.M. & Kristiansen, J. 2004. Algol. Stud. 111: 63-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas paludosa* Fott**
Referência: Franceschini, I.M. & Kristiansen, J. 2004. Algol. Stud. 111: 63-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas papillosa* K.Harris & W.H.Bradley**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mallomonas papillosa* var. *ellipsoidea* K.Harris**
Referência: Franceschini, I.M. & Kristiansen, J. 2004. Algol. Stud. 111: 63-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica; epicontinental
Mallomonas papillosa* Harris & Bradley var. *papillosa
Referência: Wujek, D.E. & Bicudo, C.E.M. 1993. Nova Hedwigia 56: 247-257.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas peronoides* (K.Harris) Momeu & L.S.Péterfi**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih. Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas pillula* K.Harris**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mallomonas pillula* var. *valdiviana* Dürrschm.**
Referência: Wujek, D.E. & Bicudo, C.E.M. 2004. Braz. J. Biol. 64(4): 915-918.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas portae-ferreae* L.S.Péterfi & Asmund**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mallomonas portae-ferreae* var. *reticulata* Gretz**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih. Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas prora* Dürrschm.**
Referência: Wujek, D.E. & Bicudo, C.E.M. 2004. Braz. J. Biol. 64(4): 915-918.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas punctifera* Korshikov**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mallomonas punctifera* var. *brasiliensis* Kristiansen & Menezes**
Referência: Kristiansen, J. & Menezes, M. 1998. Algol. Stud. 90: 97-118.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas rasilis* Dürrschm.**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih. Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica; epicontinental

***Mallomonas rhombica* Cronberg**
Referência: Wujek, D.E. & Bicudo, C.E.M. 1993.
Nova Hedwigia 56: 247-257.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas striata* Asmund**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mallomonas striata* var. *serrata* K.Harris & W.H.Bradley**
Referência: Franceschini, I.M. & Kristiansen, J. 2004.
Algol. Stud. 111: 63-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica; epicontinental
Mallomonas striata* Asmund var. *striata
Referência: Franceschini, I.M. et al. 1996.
Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 103-116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas teilingii* W.Conrad**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih.
Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica; epicontinental
***Mallomonas tonsurata* Teiling *emend.* Willi Krieg.**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih.
Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES), Sul (RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Synura Ehrenb. *emend.* Korshikov

8 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (1 endêmica)
***Synura australiensis* Playfair**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih.
Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste
(ES, SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Synura curtispina* (J.B.Petersen & J.B.Hansen) Asmund**
Referência: Franceschini, I.M. et al. 1996.
Algol. Stud. 80: 59-85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste
(SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Synura echinulata* Korshikov**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih.
Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP), Sul (SC, RS);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Synura mamillosa* E.Takah.**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih.
Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Sudeste (ES), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica;
epicontinental
***Synura petersenii* Korshikov**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Synura petersenii* var. *kufferathii* J.B.Petersen &
J.B.Hansen**
Referência: Kristiansen, J. & Menezes, M. 1998.
Algol. Stud. 90: 97-118.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia; epicontinental
Synura petersenii* Korshikov var. *petersenii
Referência: Kristiansen, J. & Menezes, M. 1998.
Algol. Stud. 90: 97-118.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Synura sphagnicola* (Korshikov) Korshikov**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih.
Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (RS); Mata Atlântica; epicontinental
***Synura spinosa* Korshikov**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Synura spinosa* var. *striata* Cronberg**
Referência: Menezes, M. et al. 2005. Beih.
Nova Hedwigia 128: 85-100.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM),
Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Synura uvella* Ehrenb. *emend.* Korshikov**
Referência: Franceschini, I.M. et al. 1996.
Algol. Stud. 80: 59-85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental

ULVOPHYCEAE

Carlos Wallace Nascimento Moura
49 gêneros, 170 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies
(nenhuma endêmica), 23 variedades (nenhuma endêmica)

Acetabularia J.V.Lamour.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Acetabularia caliculus* J.V.Lamour.**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009.
Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE,
BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Acetabularia crenulata* J.V.Lamour.**
Referência: Labanca, L. 1967-1969. Trab. Oceanogr.
Univ. Fed. Pernambuco 9(11): 325-435.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(RN, PB, PE, BA), Sudeste (SP); marinho
***Acetabularia myriospora* A.B.Joly & Cord.-Mar.**
Referência: Joly, A.B. et al. 1965. Arq. Est. Biol.
Mar. Univ. Fed. Ceará 5(2): 79-92.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho
***Acetabularia schenckii* K.Möbius**
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Fac. Fil. Ciênc.
Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 21(294): 5-393.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(PB, BA), Sudeste (SP, RJ); marinho

Acrochaete E.G.Pringsh.

1 espécie (não endêmica)
***Acrochaete viridis* (Reinke) R.Nielsen**
Referência: Barata, D. & Fujii, M.T. 2006.
Hoehnea 33: 359-370.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(RN, PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); marinho

Anadyomene J.V.Lamour.
6 espécies (1 endêmica)
***Anadyomene lacerata* D.S.Littler & Littler**
Referência: Littler, D.S. & Littler, M.M. 1991. J. Phycol. 27: 101-118.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); marinho
***Anadyomene linkiana* D.S.Littler & Littler**
Referência: Bravin, C.I. et. al. 1999. Hoehnea 26: 121-133.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Anadyomene pavonina* (J.Agardh) Wille**
Referência: Bravin, C.I. et. al. 1999. Hoehnea 26: 121-133.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Anadyomene rhizoidifera* A.B.Joly & S.Pereira**
Referência: Joly, A.B. & Pereira, S.M.B. 1973. Bol. Bot. Univ. São Paulo 1: 79-83.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); marinho
***Anadyomene saldanhae* A.B.Joly & E.C.Oliveira**
Referência: Joly, A.B. & Oliveira Filho, E.C. 1969. Phycos 7: 27-31.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Anadyomene stellata* (Wulfen) J.Agardh**
Referência: Pereira, S.M.B. & Accioly, M.C. 1998. Acta Bot. Brasil. 12: 25-52.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Avrainvillea Decne.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Avrainvillea elliottii* A.Gepp & E.Gepp**
Referência: Joly, A.B. et al. 1966. Rickia 2: 159-181.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Avrainvillea longicaulis* (Kütz.) G.Murray & Boodle**
Referência: Pereira, S.M.B. & Accioly, M.C. 1998. Acta Bot. Brasil. 12: 25-52.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES); marinho
Avrainvillea nigricans Decne.
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 21(294): 5-393.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Blastophysa Reinke
1 espécie (não endêmica)
***Blastophysa rhizopus* Reinke**
Referência: Oliveira Filho, E.C. & Ugadim, Y. 1974. Bol. Bot. Univ. São Paulo 2: 71-91.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

Blidingia Kylin
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Blidingia marginata* (J.Agardh) P.J.L.Dang.**
Referência: Ugadim, Y. 1973. Bol. Bot. Univ. São Paulo 1: 11-77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); marinho
***Blidingia minima* (Nägeli *ex* Kütz.) Kylin**
Referência: Reis-Santos, R.P 1992. Hoehnea 19(1-2): 139-142.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); marinho

Bolbocoleon E.G.Pringsh.
2 espécies (1 endêmica)
***Bolbocoleon jolyi* Yam.-Tomita**
Referência: Yamagashi-Tomita, N. 1970. Phycologia 9: 125-132.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Bolbocoleon piliferum* E.G.Pringsh.**
Referência: Barata, D. & Fujii, M.T. 2006. Hoehnea 33: 359-370.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho

Boodlea (Dickie) G.Murray & De Toni
1 espécie (não endêmica)
***Boodlea composita* (Harv.) F.Brand**
Referência: Yoneshigue, Y. et al. 1986. Rickia 13: 17-27.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); marinho

Boodleopsis A.Gepp & E.Gepp
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Boodleopsis pusilla* (F.S.Collins) W.R.Taylor**
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 21(294): 5-393.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Boodleopsis vaucherioidea* Caleron-Saenz & Schnetter**
Referência: Cassano, V. et al. 2004. Bot. Mar. 47:251-254.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Bryopsis J.V.Lamour.
4 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Bryopsis corymbosa* J.Agardh**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Bryopsis hypnoides* J.V.Lamour.**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Bryopsis pennata* J.V.Lamour.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Bryopsis pennata* J.V.Lamour. var. *pennata
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Bryopsis pennata* var. *secunda* (Harv.) F.S.Collins & Hervey**
Referência: Taylor, W.R. 1960. Marine algae of the eastern tropical and subtropical coasts of Americas. University of Michigan Press. p. 870
Distribuição: nativa; não endêmica; marinho

***Bryopsis plumosa* (Huds.) C.Agardh**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009.
Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho

Caulerpa J.V.Lamour.

21 espécies (nenhuma endêmica), 19 variedades (nenhuma endêmica)

***Caulerpa ashmeadii* Harv.**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); marinho

***Caulerpa brachypus* Harv.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Caulerpa brachypus* Harv. var. *brachypus
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (RJ); marinho

***Caulerpa brachypus* var. *brasiliana* A.B.Joly & Semir**
Referência: Joly, A.B. et al. 1974. Rickia 6: 119-125.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB); marinho

***Caulerpa brachypus* var. *nordestina* A.B.Joly & Semir**
Referência: Joly, A.B. & Semir, J. 1973.
Bol. Bot. Univ. São Paulo 1: 103-108.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE); marinho

***Caulerpa cupressoides* (H.West) C.Agardh**
Distribuição: nativa; não endêmica

Caulerpa cupressoides* (H.West) C.Agardh var. *cupressoides
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES); marinho

***Caulerpa cupressoides* var. *flabellata* Børgesen**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

***Caulerpa cupressoides* var. *lycopodium* Weber Bosse**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); marinho

***Caulerpa cupressoides* var. *mamillosa* (Mont.) Weber-van Bosse**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES); marinho

***Caulerpa cupressoides* var. *serrata* (Kütz.) Weber Bosse**
Referência: Ferreira-Correia, M.M. & Pinheiro-Vieira, F. 1969. Arq. Est. Biol. Mar. Univ. Fed. Ceará 9(2): 147-161.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN); marinho

***Caulerpa cupressoides* var. *turneri* Weber Bosse**
Referência: Ferreira-Correia, M.M. & Pinheiro-Vieira, F. 1969. Arq. Est. Biol. Mar. Univ. Fed. Ceará 9(2): 147-161.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); marinho

***Caulerpa fastigiata* Mont.**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho

***Caulerpa floridana* W.R.Taylor**
Referência: Joly, A.B. et al. 1976. Bol. Bot. Univ. São Paulo 4: 121-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA); marinho

***Caulerpa kempfii* A.B.Joly & S.Pereira**
Referência: Joly, A.B. & Pereira, S.M.B. 1975. Ciência e Cultura 27: 417-419.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Domínio desconhecido; ambiente desconhecido

***Caulerpa lanuginosa* J.Agardh**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho

***Caulerpa mexicana* Sond. *ex* Kütz.**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

***Caulerpa microphysa* (Sond. *ex* Kütz.) G.Murray**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

***Caulerpa microphysa* (Weber Bosse) Feldmann**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); marinho

***Caulerpa murrayi* Weber Bosse**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho
***Caulerpa peltata* J.V.Lamour.**
Referência: Barata, D. 2004. Clorofíceas marinhas bentônicas do estado do Espírito Santo. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. 210 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Caulerpa prolifera* (Forssk.) J.V.Lamour.**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Caulerpa pusilla* (Kütz.) J.Agardh**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Caulerpa pusilla* var. *mucronata* A.B.Joly & Sazima**
Referência: Joly, A.B. et al. 1974. Rickia 6: 119-125.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL); marinho
Caulerpa pusilla* (Kütz.) J.Agardh var. *pusilla
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Caulerpa racemosa* (Forssk.) J.Agardh**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Caulerpa racemosa* var. *lamourouxii* (Turner) Weber Bosse**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho
***Caulerpa racemosa* var. *occidentalis* (J.Agardh) Børgesen**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
Caulerpa racemosa* (Forssk.) J.Agardh var. *racemosa
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Caulerpa scalpelliformis* (R.Brown *ex* Turner) C.Agardh**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Caulerpa scalpelliformis* var. *denticulata* (Decne.) Weber Bosse**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, BA, AL); marinho
***Caulerpa scalpelliformis* var. *intermedia* Weber Bosse**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN); marinho
Caulerpa scalpelliformis* (R.Brown *ex* Turner) C.Agardh var. *scalpelliformis
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Caulerpa serrulata* (Forssk.) J.Agardh**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Caulerpa serrulata* var. *pectinata* (Weber Bosse) W.R.Taylor**
Referência: Ferreira-Correia, M.M. & Pinheiro-Vieira, F. 1969. Arq. Est. Biol. Mar. Univ. Fed. Ceará 9(2): 147-161.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); marinho
Caulerpa serrulata* (Forssk.) J.Agardh var. *serrulata
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE, RN, PE, BA); marinho
***Caulerpa sertularioides* (S.G.Gmelin) M.Howe**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Caulerpa taxifolia* (M.Vahl) C.Agardh**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Caulerpa verticillata* J.Agardh**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Caulerpa webbiana* Mont.**
Referência: Barata, D. 2008. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J. V. Lamour (Bryopsidales, Chlorophyta) no Brasil. Tese de Doutorado, Instituto de Botânica da Secretaria do Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 200 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

Chaetomorpha Kütz.

10 espécies (nenhuma endêmica)
***Chaetomorpha aerea* (Dillwyn) Kütz.**
Referência: Alves, A.M. et al. 2009. Rev. bras. bot. 32: 543-570.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

***Chaetomorpha antennina* (Bory) Kütz.**
Referência: Alves, A.M. et al. 2009.
Rev. bras. bot. 32: 543-570.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Chaetomorpha brachygona* Harv.**
Referência: Alves, A.M. et al. 2009.
Rev. bras. bot. 32: 543-570.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Chaetomorpha clavata* Kütz.**
Referência: Alves, A.M. et al. 2009.
Rev. bras. bot. 32: 543-570.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Chaetomorpha crassa* (C.Agardh) Kütz.**
Referência: Alves, A.M. et al. 2009.
Rev. bras. bot. 32: 543-570.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); marinho
***Chaetomorpha gracilis* Kütz.**
Voucher: Coto, A.C.S.P. s.n. (SP 371484)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ); marinho
***Chaetomorpha linum* (O.F.Müll.) Kütz.**
Referência: Reis, R.P & Yoneshigue-Valentin, Y. 1996.
Rev. bras. bot. 19: 77-85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ), Sul (RS); marinho
***Chaetomorpha minima* F.S.Collins & Hervey**
Referência: Alves, A.M. et al. 2009.
Rev. bras. bot. 32: 543-570.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Chaetomorpha nodosa* Kütz.**
Referência: Alves, A.M. et al. 2009.
Rev. bras. bot. 32: 543-570.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Chaetomorpha pachynema* (Mont.) Kütz.**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009.
Rodriguésia 60: 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Chamaedoris Mont.

1 espécie (não endêmica)
***Chamaedoris peniculum* (J.Ellis & Solander) Kuntze**
Referência: Martins, D.V. et al. 1991. Hoehnea 18: 115-133.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); marinho

Cladophora Kütz.

20 espécies (nenhuma endêmica)
***Cladophora albida* (Nees) Kütz.**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009.
Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Cladophora brasiliana* G.Mertens**
Referência: Alves, A.M. 2008. Estudo morfo-taxonômico de Cladophorophyceae (Chlorophyta) do litoral do estado da Bahia, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Feira de Santana. 287 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (SP, RJ); marinho
***Cladophora catenata* (L.) Kütz.**
Referência: Alves, A.M. 2008. Estudo morfo-taxonômico de Cladophorophyceae (Chlorophyta) do litoral do estado da Bahia, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Feira de Santana. 287 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, BA), Sudeste (RJ), Sul (SC); marinho
***Cladophora coelothrix* Kütz.**
Referência: Alves, A.M. 2008. Estudo morfo-taxonômico de Cladophorophyceae (Chlorophyta) do litoral do estado da Bahia, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Feira de Santana. 287 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Cladophora corallicola* Børgesen**
Referência: Gestinari, L.M.S. 2004. Taxonomia e distribuição do gênero Cladophora Kützing (Cladophorales, Chlorophyta) para o litoral brasileiro. Tese de Doutorado, Universidade Federal Rural de Pernambuco. 110 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); marinho
***Cladophora crispula* Vickers**
Referência: Alves, A.M. 2008. Estudo morfo-taxonômico de Cladophorophyceae (Chlorophyta) do litoral do estado da Bahia, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Feira de Santana. 287 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA); marinho
***Cladophora dalmatica* Kütz.**
Referência: Alves, A.M. 2008. Estudo morfo-taxonômico de Cladophorophyceae (Chlorophyta) do litoral do estado da Bahia, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Feira de Santana. 287 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Cladophora echinus* (Biasol.) Kütz.**
Referência: Santos, D.P. 1982. Clorofíceas bentônicas marinhas do estado de Santa Catarina. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo. 172 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); marinho
***Cladophora flexuosa* (O.F.Müll.) Kütz.**
Referência: Coutinho, R. & Seeliger, U. 1986.
Estuar. Coast. Shelf Sci. 23: 889-900.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); marinho
***Cladophora glomerata* (L.) Kütz.**
Referência: Bautista, A.I.N. & Necchi-Júnior, O. 2008.
Braz. J. Biol. 68: 129-136.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido; epicontinental, marinho
***Cladophora laetevirens* (Dillwyn) Kütz.**
Referência: Alves, A.M. 2008. Estudo morfo-taxonômico de Cladophorophyceae (Chlorophyta) do litoral do estado da Bahia, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Feira de Santana 287.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (RJ); marinho
***Cladophora lehmanniana* (Lindenb.) Kütz.**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009.
Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho

***Cladophora longicellulata* C.Hoek**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho
***Cladophora montagneana* Kütz.**
Referência: Alves, A.M. 2008. Estudo morfo-taxonômico de Cladophorophyceae (Chlorophyta) do litoral do estado da Bahia, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Feira de Santana 287.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Cladophora ordina* (Børgesen) C.Hoek**
Referência: Gestinari, L.M.S. 2004. Taxonomia e distribuição do gênero Cladophora Kützing (Cladophorales, Chlorophyta) para o litoral brasileiro. Tese de Doutorado, Universidade Federal Rural de Pernambuco 105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, BA), Sudeste (ES); marinho
***Cladophora pellucidoidea* C.Hoek**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (SP); marinho
***Cladophora prolifera* (Roth) Kütz.**
Referência: Alves, A.M. 2008. Estudo morfo-taxonômico de Cladophorophyceae (Chlorophyta) do litoral do estado da Bahia, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Feira de Santana 287.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Cladophora rupestris* (L.) Kütz.**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); marinho
***Cladophora sericea* (Huds.) Kütz.**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (SC); marinho
***Cladophora vagabunda* (L.) C.Hoek**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Cladophoropsis Børgesen

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cladophoropsis macromeres* W.R.Taylor**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. & Amado-Filho, G.M. 1989. Insula 19: 83-94.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB), Sudeste (RJ), Sul (SC); marinho
***Cladophoropsis membranacea* (Bang *ex* C.Agardh) Børgesen**
Referência: Joly, A.B. 1957. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 14(217): 1-196.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Codium Stackhouse

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Codium decorticatum* (Woodward) M.A.Howe**
Referência: Alves, A.M. & Moura, C.W.N. 2005. Mus. Nac. Série Livros 10:485-516.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Codium intertextum* F.S.Collins & Hervey**
Referência: Alves, A.M. & Moura, C.W.N. 2005. Mus. Nac. Série Livros 10:485-516.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Codium isthmocladum* Vickers**
Voucher: Alves, A.M. s.n. (HUEFS 76917)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Codium repens* P.L.Crouan & H.M.Crouan**
Referência: Alves, A.M. & Moura, C.W.N. 2005. Mus. Nac. Série Livros 10:485-516.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (RJ); marinho
***Codium spongiosum* Harv.**
Referência: Barata, D. 2004. Clorofíceas marinhas bentônicas do estado do Espírito Santo. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. 210 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho
***Codium taylorii* P.C.Silva**
Referência: Alves, A.M. & Moura, C.W.N. 2005. Mus. Nac. Série Livros 10:485-516.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho

Dasycladus C.Agardh

1 espécie (não endêmica)
***Dasycladus vermicularis* (Scopoli) Krasser**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Derbesia Solier

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Derbesia marina* (Lyngb.) Solier**
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 21(294): 5-393.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Derbesia tenuissima* (Moris & De Notaris) P.L.Crouan & H.M.Crouan**
Referência: Paula, E.J. & Ugadim, Y. 1988. Bol. Bot. Univ. São Paulo 10: 119-139.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Derbesia vaucheriaeformis* (Harv.) J.Agardh**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009. Rodriguésia 60: 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

Dictyosphaeria Decne.

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Dictyosphaeria cavernosa* (Forssk.) Børgesen**
Referência: Alves, A.M. 2008. Estudo morfo-taxonômico de Cladophorophyceae (Chlorophyta) do litoral do estado da Bahia, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Feira de Santana. 287 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

***Dictyosphaeria ocellata* (M.A.Howe) J.L.Olsen-Stojkovich**
Referência: Oliveira Filho, E.C. & Ugadim, Y. 1976. Phycologia 15(1): 41-44.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); marinho

***Dictyosphaeria versluysii* Weber Bosse**
Referência: Alves, A.M. 2008. Estudo morfo-taxonômico de Cladophorophyceae (Chlorophyta) do litoral do estado da Bahia, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Feira de Santana. 287 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); marinho

Ernodesmis Børgesen

1 espécie (não endêmica)

***Ernodesmis verticillata* (Kütz.) Børgesen**
Referência: Alves, A.M. 2008. Estudo morfo-taxonômico de Cladophorophyceae (Chlorophyta) do litoral do estado da Bahia, Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Feira de Santana. 287 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); marinho

Gayralia *K.L.Vinogr.*

1 espécie (não endêmica)

***Gayralia oxysperma* (Kütz.) K.L.Vinogradova *ex* Scagel et al.**
Referência: Joly, A.B. 1965. Bol. Fac. Fil. Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 21(294): 5-393.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho

Gomontia Bornet & Flahault

1 espécie (não endêmica)

***Gomontia lignicola* G.Moore**
Referência: Coutinho, R. & Seeliger, U. 1986. Estuar. Coast. Shelf Sci. 23: 889-900.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

Halimeda J.V.Lamour.

7 espécies (nenhuma endêmica)

***Halimeda cuneata* K.Hering**
Referência: Bandeira-Pedrosa, M.E. et al. 2004. Rev. bras. bot. 27: 363-377.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE, RN, PB, BA), Sudeste (ES); marinho

***Halimeda discoidea* Decne.**
Referência: Bandeira-Pedrosa, M.E. et al. 2004. Rev. bras. bot. 27: 363-377.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); marinho

***Halimeda gracilis* Harv. *ex* J.Agardh**
Referência: Bandeira-Pedrosa, M.E. et al. 2004. Rev. bras. bot. 27: 363-377.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); marinho

***Halimeda incrassata* (J.Ellis) J.V.Lamour.**
Referência: Bandeira-Pedrosa, M.E. et al. 2004. Rev. bras. bot. 27: 363-377.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); marinho

***Halimeda opuntia* (L.) J.V.Lamour.**
Referência: Bandeira-Pedrosa, M.E. et al. 2004. Rev. bras. bot. 27: 363-377.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); marinho

***Halimeda simulans* M.Howe**
Referência: Bandeira-Pedrosa, M.E. et al. 2004. Rev. bras. bot. 27: 363-377.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); marinho

***Halimeda tuna* (J.Ellis & Sol.) J.V.Lamour.**
Referência: Bandeira-Pedrosa, M.E. et al. 2004. Rev. bras. bot. 27: 363-377.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); marinho

Microdictyon Decne.

9 espécies (nenhuma endêmica)

***Microdictyon agardhianum* Decne.**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

***Microdictyon boergesenii* Setchell**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

***Microdictyon calodictyon* (Mont.) Kütz.**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); marinho

***Microdictyon japonicum* Setchell**
Referência: Joly, A.B. & Sazima, M. 1971. Ciência e Cultura 23: 329-332.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); marinho

***Microdictyon marinum* (Bory) P.C.Silva**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho

***Microdictyon pseudohapteron* A.Gepp & E.Gepp**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES); marinho

***Microdictyon tenuius* J.E.Gray**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho

***Microdictyon umbilicatum* (Velley) Zanardini**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho
***Microdictyon vanbosseae* Setchell**
Referência: Joly, A.B. & Yoneshigue-Braga, Y. 1974. Rickia 6: 81-87.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Neomeris J.V.Lamour.

1 espécie (não endêmica)
***Neomeris annulata* Dickie**
Referência: Labanca, L. 1967-1969. Trab. Oceanogr. Univ. Fed. Pernambuco 9(11): 325-435.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); marinho

Palmophyllum Kütz.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Palmophyllum crassum* (Naccari) Rabenh.**
Referência: Bravin, C.I. et. al. 1999. Hoehnea 26: 121-133.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Palmophyllum umbracola* Nelson & Ryan**
Referência: Bravin, C.I. et. al. 1999. Hoehnea 26: 121-133.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho

Parvocaulis S.Berger et al.

1 espécie (não endêmica)
***Parvocaulis pusillus* (M.Howe) S.Berger et al.**
Referência: Labanca, L. 1967-1969. Trab. Oceanogr. Univ. Fed. Pernambuco 9(11): 325-435.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES); marinho

Pedobesia MacRaild & Womersley

1 espécie (não endêmica)
***Pedobesia ryukyuensis* (Yamada & T.Tanaka) Kobara & Chihara**
Referência: Paula, E.J. & West, J.A. 1986. Phycologia 25: 482-493.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Penicillus Lam.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Penicillus capitatus* Lam.**
Referência: Amorim, P.R.R. et al. 2008. Mus. Nac. Série Livros 30: 35-54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES); marinho
***Penicillus pyriformis* A.Gepp & E.Gepp**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

Petrosiphon M.Howe

1 espécie (não endêmica)
***Petrosiphon adhaerens* M.A.Howe**
Referência: Oliveira Filho, E.C. & Ugadim, Y. 1974. Bol. Bot. Univ. São Paulo 2: 71-91.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); marinho

Phaeophila Hauck

1 espécie (não endêmica)
***Phaeophila dendroides* (P.L.Crouan & H.M.Crouan) Batters**
Referência: Oliveira Filho, E.C. & Ugadim, Y. 1976. Phycologia 15(1): 41-44.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (RJ); marinho

Phyllodictyon J.E.Gray

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phyllodictyon anastomosans* (Harv.) Kraft & M.J.Wynne**
Referência: Joly, A.B. et al. 1965. Arq. Est. Biol. Mar. Univ. Fed. Ceará 5: 79-92.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES); marinho
***Phyllodictyon pulcherrimum* J.E.Gray**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); marinho

Pringsheimiella Höhn.

1 espécie (não endêmica)
***Pringsheimiella scutata* (Reinke) Marchew.**
Referência: Barata, D. & Fujii, M.T. 2006. Hoehnea 33: 359-370.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho

Pseudendoclonium Wille

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pseudendoclonium marinum* (Reinke) Aleem & E. Schulz**
Referência: Yoneshigue-Braga, Y. 1977. Phycologia 16: 113-118.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); marinho
***Pseudendoclonium submarinum* Wille**
Referência: Barata, D. & Fujii, M.T. 2006. Hoehnea 33: 359-370.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Pseudocodium Weber Bosse

1 espécie (não endêmica)
***Pseudocodium floridanum* C.J.Dawes & A.C.Mathieson**
Referência: Bravin, C.I. et. al. 1999. Hoehnea 26: 121-133.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

Rhipidosiphon Mont.

1 espécie (não endêmica)
***Rhipidosiphon floridensis* D.S.Littler & Littler**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho

Rhipilia Kütz.
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhipilia crassa* A.J.K.Millar & Kraft**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (BA); marinho
***Rhipilia diaphana* W.R.Taylor**
Referência: Joly, A.B. & Sazima, M. 1971.
Ciência e Cultura 23: 333-336.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB),
Sudeste (ES); marinho
***Rhipilia fungiformis* A.B.Joly & Ugadim**
Referência: Joly, A.B. et al. 1965. Arq. Est. Biol.
Mar. Univ. Fed. Ceará 5: 79-92.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(PB, BA); marinho
***Rhipilia orientalis* A.Gepp & E.Gepp**
Referência: Joly, A.B. & Sazima, M. 1971.
Ciência e Cultura 23: 333-336.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL),
Sudeste (ES); marinho
***Rhipilia penicilloides* A.D.R.N'Yeurt & D.W.Keats**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA),
Sudeste (ES); marinho
***Rhipilia tenaculosa* A.Gepp & E.Gepp**
Referência: Gepp, A. & Gepp, E.S. 1911.
Siboga Expedition Monograph 62: 16-45.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); marinho
***Rhipilia tomentosa* Kütz.**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(PE, BA), Sudeste (RJ); marinho

Rhipiliopsis A.Gepp & E.Gepp
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhipiliopsis peltata* (J.Agardh) A.Gepp & E.Gepp**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho
***Rhipiliopsis stri* (Earle & J.R.Young) Farghaly & Denizot**
Referência: Guimarães, S.M.P.B. & Horta, P.A. 2004.
Rev. bras. bot. 27: 507-513.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB),
Sudeste (ES); marinho

Rhizoclonium Kütz.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhizoclonium africanum* Kütz.**
Referência: Alves, A.M. et al. 2009.
Rev. bras. bot. 32: 543-570.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste
(MA, CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); marinho
***Rhizoclonium riparium* (Roth) Kütz. *ex* Harv.**
Referência: Alves, A.M. et al. 2009.
Rev. bras. bot. 32: 543-570.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP),
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ),
Sul (SC, RS); marinho

Siphonocladus F.Schmitz
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Siphonocladus rigidus* M.A.Howe**
Referência: Joly, A.B. et al. 1976.
Bol. Bot. Univ. São Paulo 4: 121-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA);
marinho
***Siphonocladus tropicus* (P.L.Crouan & H.M.Crouan)**
J.Agardh
Referência: Joly, A.B. et al. 1976.
Bol. Bot. Univ. São Paulo 4: 121-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(MA, PB, PE, BA), Sudeste (ES); marinho

Stromatella Kornmann & Sahling
1 espécie (não endêmica)
***Stromatella monostromatica* (P.J.L.Dang.)**
Kornmann & Sahling
Referência: Barata, D. & Fujii, M.T. 2006.
Hoehnea 33: 359-370.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); marinho

Struvea Sonder
1 espécie (não endêmica)
***Struvea elegans* Børgesen**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); marinho

Udotea J.V.Lamour.
6 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades
(nenhuma endêmica)
***Udotea abbottiorum* D.S.Littler & Littler**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); marinho
***Udotea caribaea* D.S.Littler & Littler**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
marinho
***Udotea cyathiformis* Decne.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Udotea cyathiformis* Decne. var. *cyathiformis
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(PB, PE, BA), Sudeste (ES); marinho
***Udotea cyathiformis* var. *flabellifolia* D.S.Littler & Littler**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); marinho
***Udotea dixonii* D.S.Littler & Littler**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); marinho
***Udotea flabellum* (J.Ellis & Sol.) M.A.Howe**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES); marinho

***Udotea occidentalis* A.Gepp & E.Gepp**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006.
Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); marinho

Ulothrix Kütz.

1 espécie (não endêmica)
***Ulothrix flacca* (Dillwyn) Thur.**
Referência: Coutinho, R. & Seeliger, U. 1986.
Estuar. Coast. Shelf Sci. 23: 889-900.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); marinho

Ulva L.

12 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Ulva chaetomorphoides* (Børgesen) Hayden et al.**
Referência: Barata, D. 2004. Clorofíceas marinhas bentônicas do estado do Espírito Santo. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. 210 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Ulva clathrata* (Roth) C.Agardh**
Referência: Barata, D. 2004. Clorofíceas marinhas bentônicas do estado do Espírito Santo. Dissertação de Mestrado, Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. 210 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho
***Ulva compressa* L.**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009.
Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Ulva fasciata* Delile**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Ulva flexuosa* Wulfen**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ulva flexuosa* Wulfen subsp. *flexuosa
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia.
Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Ulva flexuosa* subsp. *paradoxa* (C.Agardh) M.J.Wynne**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PB), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Ulva hookeriana* (Kütz.) Hayden et al.**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia.
Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); marinho
***Ulva intestinalis* L.**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia.
ese de Doutorado, Universidade de São Paulo. 301 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); marinho
***Ulva lactuca* L.**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Ulva linza* L.**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); marinho
***Ulva prolifera* O.F.Müll.**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Ulva ralfsii* (Harv.) Le Jolis**
Referência: Horta, P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia.
Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo 301.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); marinho
***Ulva rigida* C.Agardh**
Referência: Coto, A.C.S.P. & Pupo, D. 2009. Flora Ficológica do estado de São Paulo 3: Ulvophyceae. 96 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); marinho

Ulvella P.L.Crouan & H.M.Crouan

1 espécie (não endêmica)
***Ulvella lens* P.L.Crouan & H.M.Crouan**
Referência: Barata, D. & Fujii, M.T. 2006.
Hoehnea 33: 359-370.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); marinho

Urospora Aresch.

1 espécie (não endêmica)
***Urospora penicilliformis* (Roth) J.E.Aresch.**
Referência: Oliveira Filho, E.C. & Ugadim, Y. 1976.
Phycologia 15(1): 41-44.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN); marinho

Valonia C.Agardh

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Valonia aegagropila* C.Agardh**
Referência: Pereira, S.M.B. & Accioly, M.C. 1998.
Acta Bot. Brasil. 12: 25-52.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); marinho
***Valonia macrophysa* Kütz.**
Referência: Joly, A.B. et al. 1967. Bol. Fac. Fil.
Ciênc. Let. Univ. São Paulo, Sér. Bot. 305(2): 171-194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Valonia utricularis* (Roth) C.Agardh**
Referência: Brasileiro, P.S. et al. 2009.
Rodriguésia 60: 39-66.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE), Sudeste (ES, SP, RJ); marinho
***Valonia ventricosa* J.Agardh**
Referência: Ugadim, Y. & Pereira, S.M.B. 1978.
Ciência e Cultura 30: 839-842.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE), Sudeste (ES); marinho

Verdigellas Kütz.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Verdigellas fimbriata* D.L.Ballant. & J.N.Norris**
Referência: Yoneshigue-Valentin, Y. et al. 2006. Mus. Nac. Série Livros 18:67-105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); marinho
***Verdigellas peltata* D.L.Ballant. & J.N.Norris**
Referência: Bravin, C.I. et. al. 1999. Hoehnea 26: 121-133.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); marinho

XANTHOPHYCEAE
Mariângela Menezes, Carlos Eduardo de Mattos Bicudo
28 gêneros, 71 espécies (2 endêmicas), 4 variedades (nenhuma endêmica)

Acanthochloris Pascher
1 espécie (não endêmica)
***Acanthochloris scherffelii* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Arachnochloris Pascher
1 espécie (não endêmica)
***Arachnochloris minor* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Botryochloris Pascher
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Botryochloris cumulata* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Botryochloris minima* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Bracchiogonium Pascher
1 espécie (não endêmica)
***Bracchiogonium ophiaster* (Pascher) Pascher *ex* Ettl**
Referência: Bovo-Scomparin, V.M. et al. 2005. Acta Sci. Biol. Sci. 27(1): 9-20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Centritractus Lemmerm.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Centritractus africanus* F.E.Fritsch & M.F.Rich**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica; epicontinental
***Centritractus belenophorus* Lemmerm.**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal; epicontinental
***Centritractus ellipsoideus* Starmach**
Referência: Nogueira, I.S. & Leandro-Rodrigues, N.C. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(3): 377-395.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado; epicontinental

Characiopsis Borzi
11 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)
***Characiopsis acuta* (A.Braun) Borzi**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Characiopsis africanus* F.E.Fritsch & M.F.Rich**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Characiopsis anabaenae* Pascher**
Distribuição: nativa; não endêmica
Characiopsis anabaenae* Pascher var. *anabaenae
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Characiopsis aquilonaris* Skuja**
Distribuição: nativa; não endêmica
Characiopsis aquilonaris* Skuja var. *aquilonaris
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Characiopsis elegans* Ettl**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Characiopsis longipes* (Rabenh.) Borzi**
Distribuição: nativa; não endêmica
Characiopsis longipes* (Rabenh.) Borzi var. *longipes
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Characiopsis microcysticola* Skuja**
Distribuição: nativa; não endêmica
Characiopsis microcysticola* Skuja var. *microcysticola
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Characiopsis minima* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Characiopsis minutissima* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Characiopsis pyriformis* (A.Braun) Borzi**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Characiopsis sphagnicola* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Chloridella Pascher
1 espécie (não endêmica)
***Chloridella cystiformis* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental

Chlorocloster Pascher
1 espécie (não endêmica)
***Chlorocloster raphidioides* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental

Chloropedia Pascher
1 espécie (não endêmica)
***Chloropedia plana* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental

Gloeobotrys Pascher
1 espécie (não endêmica)
***Gloeobotrys lunatus* Ettl**
Referência: Bovo-Scomparin, V.M. et al. 2005.
Acta Sci. Biol. Sci. 27(1): 9-20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica; epicontinental

Goniochloris Geitler
8 espécies (nenhuma endêmica)
***Goniochloris cochleata* Pascher**
Referência: Bovo-Scomparin, V.M. et al. 2005.
Acta Sci. Biol. Sci. 27(1): 9-20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica; epicontinental
***Goniochloris contorta* (Bourr.) Ettl**
Referência: Bovo-Scomparin, V.M. et al. 2005.
Acta Sci. Biol. Sci. 27(1): 9-20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica; epicontinental
***Goniochloris fallax* Fott**
Referência: Nogueira, I.S. et al. 2008.
Hoehnea 35(2): 219-233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Goniochloris iyengarii* (Ramanathan) Ettl**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001.
Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica; epicontinental
***Goniochloris laevis* Pascher**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001.
Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica; epicontinental
***Goniochloris mutica* (A.Braun) Fott**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste
(GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado,
Mata Atlântica; epicontinental
***Goniochloris smithii* (Bourr.) Fott**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001.
Mus. Nac. Série Livros 8: 1-200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido; epicontinental
***Goniochloris spinosa* Pascher**
Referência: Bovo-Scomparin, V.M. et al. 2005.
Acta Sci. Biol. Sci. 27(1): 9-20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica; epicontinental

Isthmochloron Skuja
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Isthmochloron gracile* (Reinsch) Skuja**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001.
Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado,
Mata Atlântica; epicontinental
***Isthmochloron lobulatum* (Nägeli) Skuja**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Isthmochloron neustonica* Zalocar & Pizarro**
Referência: Bovo-Scomparin, V.M. et al. 2005.
Acta Sci. Biol. Sci. 27(1): 9-20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica; epicontinental

Lutherella Pascher
1 espécie (não endêmica)
***Lutherella bicudoi* Tell & D.C.Bicudo**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental

Monallantus Pascher
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Monallantus angustus* Ettl**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata
Atlântica; epicontinental
***Monallantus brevicylindrus* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental
***Monallantus pyreniger* Pascher**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001.
Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica; epicontinental
***Monallantus stichococcoides* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental

Monodus Chodat
1 espécie (não endêmica)
***Monodus chodatii* Pascher**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001.
Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica; epicontinental

Nephrodiella Pascher
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Nephrodiella minor* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental
***Nephrodiella semilunaris* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental

Ophiocytium Nägeli
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Ophiocytium capitatum* Wolle**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica;
epicontinental
***Ophiocytium cochleare* A.Braun**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental
***Ophiocytium maximum* Borzi *emend*. Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental
***Ophiocytium parvulum* A.Braun**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental

Pleurochloris Pascher
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pleurochloris imitans* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental
***Pleurochloris pseudopolychloris* Ettl**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental

Polyedriella Pascher
1 espécie (1 endêmica)
***Polyedriella crassispinata* C.E.M.Bicudo**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental

Pseudogoniochloris Krienitz et al.
1 espécie (não endêmica)
***Pseudogoniochloris tripus* (Pascher)**
Krienitz et al.
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001.
Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica; epicontinental

Pseudopolyedriopsis Hollerbach
1 espécie (não endêmica)
***Pseudopolyedriopsis skujae* Hollerbach**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental

Pseudostaurastrum (Hansg.) Chodat
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pseudostaurastrum enorme* (Ralfs) Chodat**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001.
Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Pseudostaurastrum limneticum* (Borge) Chodat**
Referência: Bovo-Scomparin, V.M. et al. 2005.
Acta Sci. Biol. Sci. 27(1): 9-20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica; epicontinental

Rhizochloris Pascher
3 espécies (1 endêmica)
***Rhizochloris pluriplastidiata* C.E.M.Bicudo &**
D.C.Bicudo
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental
***Rhizochloris stigmatica* Pascher**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental
***Rhizochloris virideflavescens* (Skvortzov)**
C.E.M.Bicudo
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica; epicontinental

Tetraedriella Pascher
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Tetraedriella acuta* Pascher**
Referência: Dias, I.C.A. et al. 2001.
Mus. Nac. Série Livros 8:200.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedriella jovetii* (Bourr.) Bourr.**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006.
Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica;
epicontinental

***Tetraedriella polychloris* Skuja**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedriella regularis* (Kütz.) Fott**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraedriella spinigera* Skuja**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica; epicontinental

Tetraplektron Fott

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Tetraplektron acutum* (Pascher) Fott**
Referência: Bovo-Scomparin, V.M. et al. 2005. Acta Sci. Biol. Sci. 27(1): 9-20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraplektron bourrellyi* Ettl**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido; epicontinental
***Tetraplektron laevis* (Bourr.) Ettl**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental
***Tetraplektron torsum* (Turner) Dedus.**
Referência: Nogueira, I.S. & Leandro-Rodrigues, N.C. 1999. Rev. Brasil. Biol. 59(3): 377-395.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Domínio desconhecido; epicontinental
***Tetraplektron tribulus* (Pascher) A.R.Loebl.**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica; epicontinental

Tribonema Derbès & Solier

1 espécie (não endêmica)
***Tribonema minus* Hazen**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

Vaucheria DC.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Vaucheria bursata* (O.F.Müller) C.Agardh**
Referência: Menezes, M. & Dias, I.C.A. (Orgs.) 2001. Mus. Nac. Série Livros 9:1-256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica; epicontinental
***Vaucheria longicaulis* Hoppaugh**
Referência: Joly, A.B. & Sazima, M. 1970. Nova Hedwigia 19: 293-297.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa; epicontinental

Xanthonema P.C.Silva

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Xanthonema hormidioides* (Vischer) P.C.Silva**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental
***Xanthonema stichococcoides* (Pascher) P.C.Silva**
Referência: Bicudo, D.C. et al. 2006. Hoehnea 33(3): 291-316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica; epicontinental

BRIÓFITAS

Coodenadora: Denise Pinheiro da Costa
395 gêneros, 1.521 espécies (275 endêmicas),
20 subespécies (5 endêmicas), 56 variedades (16 endêmicas)

ANTÓCEROS

Denise Pinheiro da Costa
6 gêneros, 11 espécies (3 endêmicas)

ANTHOCEROTACEAE

2 gêneros, 4 espécies (2 endêmicas)

Anthoceros L.

3 espécies (1 endêmica)
***Anthoceros lamellatus* Steph.**
Voucher: Schiffner, V. 294 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthoceros punctatus* L.**
Voucher: Oliveira, S.L. 123 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Anthoceros tuberculatus* Lehm. & Lindenb.**
Voucher: Ule, E.H.G. 506 (PC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Folioceros DC.

1 espécie (1 endêmica)
***Folioceros apiahynus* (Steph.) Hässel**
Voucher: Puiggari, J.J. 100 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

DENDROCEROTACEAE

2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Dendroceros Nees

1 espécie (não endêmica)
***Dendroceros crispus* (Sw.) Nees**
Voucher: Costa, D.P. 3714 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Nothoceros (R.M. Schust.) Hasegawa

1 espécie (não endêmica)
***Nothoceros aenigmaticus* (R.M. Schust.) J.C. Villarreal & McFarland**
Voucher: Santos, N.D. 338 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

NOTOTHYLADACEAE

2 gêneros, 5 espécies (1 endêmica)

Notothylas Sull.

3 espécies (1 endêmica)
***Notothylas breutelii* (Gottsche) Gottsche**
Voucher: Vital, D.M. 8341 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal
***Notothylas orbicularis* (Schwein.) Sull.**
Voucher: Yano, O. 25502 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Notothylas vitalii* Udar & Singh**
Voucher: Germano, S.R. s.n. (UFP 31834)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Phaeoceros Prosk.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phaeoceros bulbiculosus* (Broth.) Prosk.**
Voucher: Yano, O. 29201 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Phaeoceros laevis* (L.) Prosk.**
Voucher: Yano, O. 29121 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal



HEPÁTICAS

Denise Pinheiro da Costa

132 gêneros, 625 espécies (83 endêmicas), 9 subespécies (1 endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)

ACROBOLBACEAE

3 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Lethocolea Mitt.

1 espécie (não endêmica)

***Lethocolea glossophylla* (Spruce) Grolle**
Voucher: Costa, D.P. 4646 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Marsupidium Mitt.

1 espécie (não endêmica)

***Marsupidium gradsteinii* Grolle**
Voucher: Gradstein, S.R. 5111 (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Tylimanthus Mitt.

1 espécie (não endêmica)

***Tylimanthus laxus* (Lehm. & Lindenb.) Spruce**
Voucher: Costa, D.P. 3809 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

ADELANTHACEAE

1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Adelanthus Mitt.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Adelanthus carabayensis* (Mont.) Grolle**
Voucher: Costa, D.P. 3879 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Adelanthus decipiens* (Hook.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 3773 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

ANEURACEAE

2 gêneros, 14 espécies (2 endêmicas)

Aneura Dumort.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Aneura pinguis* (L.) Dumort.**
Voucher: Santos, N.D. 216 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica, Pantanal

***Aneura pseudopinguis* (Herzog) Pócs**
Referência: Herzog, T. 1942. Beih. Bot. Centralbl. 61: 559-590.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

Riccardia S.F.Gray

12 espécies (2 endêmicas)

***Riccardia amazonica* (Spruce) S.W.Arnell**
Voucher: Santos, N.D. 262 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Riccardia cataractarum* (Spruce) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 371 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Riccardia chamedryfolia* (With.) Grolle**
Voucher: Santos, N.D. 164 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Riccardia digitiloba* (Spruce *ex* Steph.) Pagán**
Voucher: Santos, N.D. 346 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Riccardia emarginata* (Steph.) Hell**
Voucher: Santos, N.D. 167 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Riccardia fucoidea* (Sw.) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 362 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Riccardia glaziovii* (Spruce) Meenks**
Voucher: Santos, N.D. 789 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Riccardia metzgeriiformis* (Steph.) R.M.Schust.**
Voucher: Santos, N.D. 350 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Sudeste (SP, RJ); Domínio desconhecido

***Riccardia multifida* (L.) S.F.Gray**
Voucher: Costa, D.P. 9 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Riccardia regnellii* (Aongström.) Hell**
Voucher: Santos, N.D. 106 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Riccardia schwaneckei* (Steph.) Pagán**
Voucher: Schiffner, V. 1009 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Riccardia tenuicula* (Spruce) Meenks**
Voucher: Schiffner, V. 1799 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

ARNELLIACEAE
2 gêneros, 2 espécies (1 endêmica)

Gongylanthus Nees
1 espécie (não endêmica)
***Gongylanthus liebmannianus* (Lindenb. & Gottsche) Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11496 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Southbya Spruce
1 espécie (1 endêmica)
***Southbya organensis* Herzog**
Voucher: Lützelburg, P. 6003 (JE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

AYTONIACEAE
3 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Asterella P.Beauv.
1 espécie (não endêmica)
***Asterella venosa* (Lehm. & Lindenb.) A.Evans**
Voucher: Sehnem, A. 1034 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Plagiochasma Lehm. & Lindenb.
1 espécie (não endêmica)
***Plagiochasma rupestre* (Forster) Steph.**
Voucher: Costa, D.P. 4585 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Reboulia Raddi
1 espécie (não endêmica)
***Reboulia hemisphaerica* (L.) Raddi**
Voucher: Yano, O. 29416 (HUCS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

BALANTIOPSIDACEAE
3 gêneros, 10 espécies (3 endêmicas)

Balantiopsis Mitt.
2 espécies (1 endêmica)
***Balantiopsis brasiliensis* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 686 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Balantiopsis crocea* Herzog**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 158 (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Isotachis Mitt.
4 espécies (1 endêmica)
***Isotachis aubertii* (Schwägr.) Mitt.**
Voucher: Santos, N.D. 426 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Isotachis inflata* Steph.**
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (FH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Isotachis multiceps* (Lindenb. & Gottsche) Gottsche**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8494 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Isotachis serrulata* (Sw.) Gottsche**
Voucher: Costa, D.P. 4545 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Neesioscyphus Grolle
4 espécies (1 endêmica)
***Neesioscyphus argillaceus* (Nees) Grolle**
Voucher: Costa, D.P. 3706 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Neesioscyphus bicuspidatus* (Steph.) Grolle**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 12687 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Neesioscyphus carneus* (Nees) Grolle**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8950 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Neesioscyphus homophyllus* (Nees) Grolle**
Voucher: Costa, D.P. 3892 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

CALYPOGEIACEAE
2 gêneros, 13 espécies (1 endêmica)

Calypogeia Raddi
10 espécies (1 endêmica)
***Calypogeia caespitosa* (Spruce) Steph.**
Voucher: Schiffner, V. 404 p.p. (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Calypogeia cyclostipa* (Spruce) Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14746 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Calypogeia grandistipula* (Steph.) Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 12869 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Calypogeia laxa* Gottsche & Lindenb.**
Voucher: Santos, N.D. 403 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Calypogeia lechleri* (Steph.) Steph.**
Voucher: Visnadi, S.R. 1989 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Calypogeia miquelii* Mont.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 2056 (UERJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Calypogeia nephrostipa* (Spruce) Steph.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Calypogeia peruviana* Nees & Mont.**
Voucher: Santos, N.D. 429 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Calypogeia tenax* (Spruce) Steph.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Calypogeia uncinulatula* Herzog**
Voucher: Costa, D.P. 3800 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Mnioloma Herzog
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Mnioloma cellulosa* (Spreng.) R.M.Schust.**
Voucher: Schiffner, V. 406 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Mnioloma crenulatum* (Bischl.) R.M.Schust.**
Voucher: Schiffner, V. 404 p.p. (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Mnioloma parallelogramma* (Spruce) R.M.Schust.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

CEPHALOZIACEAE
5 gêneros, 9 espécies (nenhuma endêmica)

Alobiella (Spruce) Schiffn.
1 espécie (não endêmica)
***Alobiella husnotii* (Gottsche) Schiffn.**
Voucher: Vital, D.M. 13480 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Anomoclada Spruce
1 espécie (não endêmica)
***Anomoclada portoricensis* (Hampe & Gottsche) Vána**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Cephalozia (Dumort.) Dumort.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cephalozia crassifolia* (Lindenb. & Gottsche) Fulford**
Voucher: Santos, N.D. 634 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Cephalozia crossii* Spruce**
Voucher: Costa, D.P. 3742a (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Nowellia Mitt.
1 espécie (não endêmica)
***Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt.**
Voucher: Stannard, B.L. s.n. (SP 284242)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Odontoschisma (Dumort.) Dumort.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Odontoschisma brasiliense* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 568 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Odontoschisma denudatum* (Nees) Dumort.**
Voucher: Santos, N.D. 538 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Odontoschisma falcifolium* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 521 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Odontoschisma longiflorum* (Taylor) Steph.**
Voucher: Costa, D.P. 3874 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

CEPHALOZIELLACEAE
4 gêneros, 8 espécies (1 endêmica)

Cephaloziella (Spruce) Schiffn.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Cephaloziella divaricata* (Sm.) Schiffn.**
Voucher: Costa, D.P. 3750 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Cephaloziella granatensis* (J.B.Jack) Fulford**
Voucher: Costa, D.P. 4647 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Cephaloziella stellulifera* (Taylor) Schiffn.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10249 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES); Domínio desconhecido

Cephaloziopsis (Spruce) Schiffn.
1 espécie (não endêmica)
***Cephaloziopsis intertexta* (Gottsche) R.M. Schust.**
Voucher: Lützelburg, P. 7312 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Cylindrocolea R.M.Schust.
3 espécies (1 endêmica)
***Cylindrocolea brasiliensis* Costa et al.**
Voucher: Santos, N.D. 310 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cylindrocolea planifolia* (Steph.) R.M.Schust.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8702 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Cylindrocolea rhizantha* (Mont.) R.M.Schust.**
Voucher: Costa, D.P. 2163 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Kymatocalyx Herzog
1 espécie (não endêmica)
***Kymatocalyx dominicensis* (Spruce) Vána**
Voucher: Costa, D.P. 3707 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

CHONECOLEACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Chonecolea Grolle
1 espécie (não endêmica)
***Chonecolea doellingeri* (Nees) Grolle**
Voucher: Costa, D.P. 2300 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

CORSINIACEAE
2 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Corsinia Raddi
1 espécie (não endêmica)
***Corsinia coriandrina* (Spreng.) Lindb.**
Voucher: Vianna, E.C. s.n. (ICN 4189)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Cronisia Berk.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cronisia fimbriata* (Nees) Whittem. & Bischl.**
Voucher: Vital, D.M. 1644 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Cronisia weddellii* (Mont.) Grolle**
Voucher: Vital, D.M. 1121 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

FOSSOMBRONIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Fossombronia Raddi
1 espécie (não endêmica)
***Fossombronia porphyrorhiza* (Nees) Prosk.**
Voucher: Santos, N.D. 469 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

FRULLANIACEAE
1 gênero, 38 espécies (5 endêmicas)

Frullania Raddi
38 espécies (5 endêmicas)
***Frullania apiculata* (Reinw. et al.) Nees**
Voucher: Câmara, P.E.A.S. 516 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Frullania arecae* (Spreng.) Gottsche**
Voucher: Santos, N.D. 194 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Frullania atrata* (Sw.) Nees**
Voucher: Costa, D.P. 4669 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia
***Frullania beyrichiana* (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.**
Voucher: Costa, D.P. 4190 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Frullania brachycarpa* Spruce**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Frullania brasiliensis* Raddi**
Voucher: Santos, N.D. 436 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Frullania breuteliana* Gottsche**
Voucher: Breutel, J.C. s.n. (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Frullania caulisequa* (Nees) Nees**
Voucher: Santos, N.D. 192 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Frullania confertiloba* Steph.**
Voucher: Vital, D.M. 8741 (NICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica, Pantanal

***Frullania cuensensis* Taylor**
Voucher: Costa, D.P. 1967 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Frullania dusenii* Steph.**
Voucher: Costa, D.P. 3823 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Frullania ecklonii* (Spreng.) Gottsche et al.**
Voucher: Santos, N.D. 782 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Frullania ericoides* (Nees) Mont.**
Voucher: Santos, N.D. 552 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Frullania flexicaulis* Spruce**
Voucher: Jameson, W. s.n. (MANCH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Frullania gaudichaudii* (Nees & Mont.) Nees & Mont.**
Voucher: Athayde-Filho, F.P. 803 (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Frullania gibbosa* Nees**
Voucher: Santos, N.D. 585 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Frullania glomerata* (Lehm. & Lindenb.) Mont.**
Voucher: Costa, D.P. 3839 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Frullania griffithsiana* Gottsche**
Voucher: Vianna, E.C. s.n. (ICN 10808)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Frullania guadalupensis* Gottsche *ex* Steph.**
Voucher: Sehnem, A. 5369 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Frullania intumescens* (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.**
Referência: Stotler, R.E. 1969. Nova Hedwigia 18(2-4): 397-555.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Frullania involuta* Hampe *ex* Steph.**
Voucher: Schiffner, V. 2286 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Frullania kunzei* (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.**
Voucher: Santos, N.D. 272 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Frullania lindenbergii* Lehm.**
Voucher: Oliveira, P.L. s.n. (ICN 11051)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica
***Frullania lindmanii* Steph.**
Voucher: Lindmann, C.A.M. 47 (S-PA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Frullania montagnei* Gottsche**
Voucher: Sehnem, A. 2900 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Frullania neurota* Taylor**
Voucher: Vianna, E.C. s.n. (ICN 36167)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Frullania nodulosa* (Reinw. et al.) Nees**
Voucher: Sá, P.S.A. s.n. (UFP 8440)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Frullania platycalyx* Herzog**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 15172 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Frullania riojaneirensis* (Raddi) Spruce**
Voucher: Vital, D.M. 1093 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Frullania schaefer-verwimpii* Yuzawa & Hatt.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7375 (NICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Frullania semivillosa* Lindenb. & Gottsche**
Voucher: Schiffner, V. 2106 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Frullania serrata* Gottsche**
Voucher: Vianna, E.C. s.n. (ICN 36088)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Frullania setigera* Steph.**
Voucher: Ule, E.H.G. 234 (G 13665)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Frullania speciosa* Herzog**
Voucher: Böhner, J. 93 (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Frullania subtilissima* (Mont.) Lindenb.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Frullania supradecomposita* (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.**
Voucher: Yano, O. 25851 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Frullania triquetra* Lindenb. & Gottsche**
Voucher: Liebmann, F.M. s.n. (C)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Frullania vitalii* Yuzawa & Hatt.**
Voucher: Vital, D.M. 5570 (NICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

GEOCALYCACEAE

5 gêneros, 23 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)

Chiloscyphus Corda

12 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)
***Chiloscyphus breutelii* (Gottsche) J.J.Engel & R.M.Schust.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8346 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Chiloscyphus connatus* (Sw.) J.J.Engel & R.M.Schust.**
Voucher: Ule, E.H.G. 4090 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Chiloscyphus glaziovii* (Steph.) J.J.Engel & R.M.Schust.**
Voucher: Reitz, R. 15286 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Chiloscyphus leptanthus* (Hook.f. & Taylor) J.J.Engel & R.M.Schust.**
Voucher: Vital, D.M. 2623 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Domínio desconhecido
***Chiloscyphus liebmannianus* (Gottsche) J.J.Engel & R.M.Schust.**
Voucher: Puiggari, J.J. 826 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Chiloscyphus lindmannii* (Steph.) J.J.Engel &R.M.Schust.**
Voucher: Costa, D.P. 4034 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Chiloscyphus martianus* (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chiloscyphus martianus* subsp. *bidentulus* Nees**
Voucher: Costa, D.P. 4573 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Chiloscyphus muricatus* (Lehm.) J.J.Engel & R.M.Schust.**
Voucher: Costa, D.P. 4637 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Chiloscyphus perissodontus* (Lehm.) J.J.Engel & R.M.Schust.**
Voucher: Santos, N.D. 203 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Chiloscyphus proteus* (Herzog) J.J.Engel & R.M.Schust.**
Voucher: Schiffner, V. 2439 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Chiloscyphus pycnophyllus* (Spruce) J.J.Engel & R.M.Schust.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Chiloscyphus quadridentatus* (Spruce) J.J.Engel & R.M.Schust.**
Voucher: Santos, N.D. 778 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Clasmatocolea Spruce

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Clasmatocolea humilis* (Hook.f. & Taylor) Grolle**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10588 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Clasmatocolea vermicularis* (Lehm.) Grolle**
Voucher: Santos, N.D. 419 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal

Heteroscyphus Schiffn.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Heteroscyphus combinatus* (Nees) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 85 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Heteroscyphus heterophyllus* (Steph.) Engel & Schust.**
Voucher: Bastos, C.J.P. 3476 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Heteroscyphus marginatus* (Steph.) Fulford**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14846 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Leptoscyphus Mitt.

5 espécies (1 endêmica)
***Leptoscyphus amphibolius* (Nees) Grolle**
Voucher: Santos, N.D. 642 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Leptoscyphus cuneifolius* (Hook.) Mitt.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8496b (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Leptoscyphus gibbosus* (Taylor) Mitt.**
Voucher: Richards, P.H. 8 (FULF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leptoscyphus porphyrius* (Nees) Grolle**
Voucher: Costa, D.P. 4646 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Leptoscyphus spectabilis* (Steph.) Grolle**
Voucher: Costa, D.P. 4700 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

Lophocolea (Dumort.) Dumort.
1 espécie (não endêmica)
***Lophocolea platensis* C.Massal.**
Voucher: Yano, O. 29202 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

GYMNOMITRIACEAE
2 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Marsupella Dumort.
1 espécie (não endêmica)
***Marsupella microphylla* R.M.Schust.**
Voucher: Costa, D.P. 3742 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Stephaniella J.B.Jack
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Stephaniella paraphyllina* J.B.Jack**
Voucher: Santos, N.D. 690 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Stephaniella uncifolia* S.Winkl.**
Voucher: Puiggari, J.J. s.n. (G 13297)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste; Cerrado

HERBERTACEAE
2 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica), 4 subespécies (nenhuma endêmica)

Herbertus S.F.Gray
2 espécies (nenhuma endêmica), 4 subespécies (nenhuma endêmica)
***Herbertus juniperoideus* (Sw.) Grolle**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Herbertus juniperoideus* subsp. *acanthelius* (Spruce) Feldberg & J.Heinrichs**
Voucher: Santos, N.D. 793 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Herbertus juniperoideus* subsp. *bivittatus* (Spruce) Feldberg & J.Heinrichs**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10674 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
Herbertus juniperoideus* (Sw.) Grolle subsp. *juniperoideus
Voucher: Costa, D.P. 990 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Herbertus juniperoideus* subsp. *pensilis* (Taylor) Feldberg & J.Heinrichs**
Voucher: Costa, D.P. 4652 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Herbertus sendtneri* (Nees) Lindb.**
Voucher: Vital, D.M. 4896 (GOET)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Triandrophyllum Fulford & Hatch.
1 espécie (não endêmica)
***Triandrophyllum subtrifidum* (Hook.f. & Taylor) Fulford & Hatch.**
Voucher: Santos, N.D. 688 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

JUNGERMANNIACEAE
6 gêneros, 18 espécies (1 endêmica)

Anastrophyllum (Spruce) Steph.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Anastrophyllum auritum* (Lehm.) Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7547 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Anastrophyllum piligerum* (Nees) Steph.**
Voucher: Costa, D.P. 4650 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Anastrophyllum tubulosum* (Nees) Grolle**
Voucher: Costa, D.P. 3743 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Cryptochila R.M.Schust.
1 espécie (não endêmica)
***Cryptochila grandiflora* (Lindenb. & Gottsche) Grolle**
Voucher: Santos, N.D. 790 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Jamesoniella (Spruce) Lees
1 espécie (não endêmica)
***Jamesoniella rubricaulis* (Nees) Grolle**
Voucher: Costa, D.P. 4645 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Jungermannia L.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Jungermannia amoena* Lindenb. & Gottsche**
Voucher: Santos, N.D. 763 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Jungermannia decolor* Schiffn.**
Voucher: Mosén, C.W.H. s.n. (G14482)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Jungermannia hyalina* Lyell**
Voucher: Santos, N.D. 771 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Jungermannia sphaerocarpa* Hook.**
Voucher: Costa, D.P. 3779 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Lophozia (Dumort.) Dumort.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Lophozia bicrenata* (Schmidel) Dumort.**
Voucher: Costa, D.P. 3789 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Lophozia patagonica* Herzog & Grolle**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 13575 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Syzygiella Spruce
7 espécies (1 endêmica)
***Syzygiella anomala* (Lindenb. & Gottsche) Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 787 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Syzygiella concreta* (Gottsche) Spruce**
Voucher: Visnadi, S.R. 2299 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Syzygiella geminifolia* (Mitt.) Steph.**
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (S-PA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica
***Syzygiella integerrima* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 689 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Syzygiella liberata* Inoue**
Voucher: Costa, D.P. 4646 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Syzygiella perfoliata* (Sw.) Spruce**
Voucher: Santos, N.D. 679 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Syzygiella uleana* Steph.**
Voucher: Schiffner, V. 2435 (S-PA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

LEJEUNEACEAE
53 gêneros, 270 espécies (36 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Acanthocoleus R.M.Schust.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Acanthocoleus aberrans* (Lindenb. & Gottsche) Kruijt**
Voucher: Santos, N.D. 422 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Acanthocoleus trigonus* (Nees & Mont.) Gradst.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 13496 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Acrolejeunea (Spruce) Schiffn.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Acrolejeunea emergens* (Mitt.) Steph.**
Voucher: Yano, O. 13787 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Acrolejeunea torulosa* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.**
Voucher: Yano, O. 13775 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Anoplolejeunea (Spruce) Schiffn.
1 espécie (não endêmica)
***Anoplolejeunea conferta* (C.F.W.Meissn.) A.Evans**
Voucher: Santos, N.D. 839 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Aphanolejeunea A.Evans
17 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Aphanolejeunea asperrima* Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7584 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Mata Atlântica
***Aphanolejeunea azorica* (V.Allorge & Jovet-Ast) Bernecker & Pócs**
Voucher: Vital, D.M. 4985 (GOET)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Aphanolejeunea camillii* (Lehm.) R.M.Schust.**
Voucher: Santos, N.D. 516 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, AL), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Aphanolejeunea cingens* Herzog**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14379 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Aphanolejeunea clavatopapillata* (Steph.) E.Reiner**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14670b (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Aphanolejeunea contractiloba* (A.Evans) R.M.Schust.**
Voucher: Ilkiu-Borges, A.L. 1101 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Aphanolejeunea gracilis* Jovet-Ast**
Voucher: Ilkiu-Borges, A.L. 1789 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aphanolejeunea kunertiana* Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14585 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Aphanolejeunea longifolia* Jovet-Ast**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9112 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (SE), Centro-Oeste (GO), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Aphanolejeunea microscopica* (Taylor) A.Evans**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Aphanolejeunea microscopica* var. *africana* (A.Evans) Bernercker & Pócs**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14653 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Aphanolejeunea microscopica* var. *exigua* (A.Evans) Bernercker & Pócs**
Voucher: Schiffner, V. 395 p.p. (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Aphanolejeunea paucifolia* (Spruce) E.Reiner**
Voucher: Santos, N.D. 245 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Aphanolejeunea sicaefolia* (Gottsche *ex* Steph.) A.Evans**
Voucher: Germano, S.R. s.n. (UFP 19135)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Aphanolejeunea sintenisii* (Steph.) Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14581 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Aphanolejeunea subsphaeroidea* R.M.Schust.**
Voucher: Schuster, R.M. 79-16-837 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aphanolejeunea truncatifolia* Horik.**
Voucher: Costa, D.P. 2334 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aphanolejeunea verrucosa* Jovet-Ast**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14379 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Aphanolejeunea winkleri* Morales & A. Lücking**
Voucher: Ilkiu-Borges, A.L. 919 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Archilejeunea (Spruce) Schiffn.

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Archilejeunea auberiana* (Mont.) A.Evans**
Voucher: Santos, N.D. 850 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Archilejeunea badia* (Spruce) Steph.**
Voucher: Griffin III, D. 184a (FLAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Archilejeunea crispistipula* (Spruce) Steph.**
Voucher: Prance, G.T. 11860 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Archilejeunea fuscescens* (Hampe *ex* Lehm.) Fulford**
Voucher: Santos, N.D. 416 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Archilejeunea ludoviciana* (De Not. *ex* Lehm.) Gradst. & Geissler**
Referência: Gradstein, S.R. et Buskes, M.C. 1985. Nova Hedwigia 89:89-112.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Archilejeunea parviflora* (Nees) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 266 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Aureolejeunea R.M.Schust.

1 espécie (não endêmica)
***Aureolejeunea fulva* R.M.Schust.**
Voucher: Costa, D.P. 3755 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Blepharolejeunea S.W. Arnell

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Blepharolejeunea incongrua* (Lindenb. & Gottsche) van Slageren & Kruijt**
Voucher: Costa, D.P. 3754 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Blepharolejeunea securifolia* (Steph.) R.M.Schust.**
Voucher: Vital, D.M. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Brachiolejeunea (Spruce) Schiffn.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Brachiolejeunea laxifolia* (Taylor) Schiffn.**
Voucher: Costa, D.P. 4716 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Brachiolejeunea leiboldiana* (Gottsche & Lindenb.) Schiffn.**
Voucher: Vital, D.M. 6563 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Brachiolejeunea phyllorhiza* (Nees) Kruijt & Gradst.**
Voucher: Santos, N.D. 819 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Bromeliophila R.M.Schust.
1 espécie (1 endêmica)
***Bromeliophila natans* (Steph.) R.M.Schust.**
Voucher: Visnadi, S.R. 1808 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Bryopteris (Nees) Lindenb.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Bryopteris diffusa* (Sw.) Nees**
Voucher: Santos, N.D. 623 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Bryopteris filicina* (Sw.) Nees**
Voucher: Santos, N.D. 327 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Caudalejeunea (Steph.) Schiffn.
1 espécie (não endêmica)
***Caudalejeunea lehmanniana* (Gottsche) A.Evans**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 307 (UERJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Cephalantholejeunea R.M.Schust.
1 espécie (1 endêmica)
***Cephalantholejeunea temnanthoides* (Steph.) R.M.Schust.**
Voucher: Ule, E.H.G. 542 (G 19895)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ceratolejeunea (Spruce) J.B.Jack & Steph.
11 espécies (nenhuma endêmica)
***Ceratolejeunea ceratantha* (Nees & Mont.) Steph.**
Voucher: Costa, D.P. 2089 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Ceratolejeunea coarina* (Gottsche) Steph.**
Voucher: Bastos, C.J.P. 2486 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Ceratolejeunea confusa* R.M.Schust.**
Voucher: Griffin III, D. 810 (GOET)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Ceratolejeunea cornuta* (Lindenb.) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 237 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Ceratolejeunea cubensis* (Mont.) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 191 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Ceratolejeunea desciscens* (Sande-Lac.) Schiffn.**
Voucher: Vital, D.M. 4338c (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Ceratolejeunea fallax* (Lehm. & Lindenb.) Bonner**
Voucher: Vital, D.M. 5354 (GOET)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Ceratolejeunea filaria* (Taylor *ex* Lehm.) Steph.**
Voucher: Pôrto, K.C. 1853 (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Ceratolejeunea laetefusca* (Austin) R.M.Schust.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7869 (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Ceratolejeunea minuta* Dauphin**
Voucher: Ilkiu-Borges, A.L. 946 p.p. (GOET)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Ceratolejeunea rubiginosa* Gottsche *ex* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 544 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Cheilolejeunea (Spruce) Schiffn.
16 espécies (1 endêmica)
***Cheilolejeunea acutangula* (Nees) Grolle**
Voucher: Santos, N.D. 423 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cheilolejeunea adnata* (Kunze) Grolle**
Voucher: Vital, D.M. 8707 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cheilolejeunea beyrichii* (Lindenb.) E. Reiner**
Voucher: Labiak, P.H. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Cheilolejeunea clausa* (Nees & Mont.) R.M.Schust.**
Voucher: Santos, N.D. 400 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Cheilolejeunea comans* (Spruce) R.M.Schust.**
Voucher: Vital, D.M. 6527 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Cheilolejeunea discoidea* (Lehm. & Lindenb.) Kachr. & R.M.Schust.**
Voucher: Costa, D.P. 3843 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Cheilolejeunea fragrantissima* (Spruce) R.M.Schust.**
Voucher: Griffin III, D. 738 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cheilolejeunea holostipa* (Spruce) Grolle & R.-L.Zhu**
Voucher: Santos, N.D. 286 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Cheilolejeunea inflexa* (Hampe *ex* Lehm.) Grolle**
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cheilolejeunea insecta* Grolle & Gradst.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14725 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Cheilolejeunea lacerata* C.Bastos & Gradst.**
Voucher: Bastos, C.J.P. 2077 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cheilolejeunea lineata* (Lehm. & Lindenb.) Steph.**
Voucher: Schiffner, V. 1734 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Cheilolejeunea oncophylla* (Aongström) Grolle & E.Reiner**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 15199 (Herb. SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Cheilolejeunea revoluta* (Herzog) Gradst. & Grolle**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10184a (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Cheilolejeunea rigidula* (Mont.) R.M.Schust.**
Voucher: Santos, N.D. 275 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Cheilolejeunea trifaria* (Reinw. et al.) Mizut.**
Voucher: Santos, N.D. 851 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Cololejeunea (Spruce) Schiffn.

21 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Cololejeunea bischleriana* Tixier**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7270b (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cololejeunea cardiocarpa* (Mont.) A.Evans**
Voucher: Bastos, C.J.P. 2053 p.p. (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cololejeunea dzumacensis* Tixier**
Voucher: Yano, O. 25980 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Cololejeunea falcata* (Horik.) Benedix**
Voucher: Kalb, A. 14 p.p. (EGR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Cololejeunea hildebrandii* (Austin) Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14468 p.p. (EGR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Cololejeunea katiae* Tixier**
Voucher: Pôrto, K.C. 1456 (PC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Cololejeunea manaosensis* (Herzog) Herzog**
Voucher: Lützelburg, P. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Cololejeunea micrandroecia* (Spruce) Schiffn. *ex* Mizut.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cololejeunea minutilobula* Herzog**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9426 (PC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Cololejeunea minutissima* (Sm.) Schiffn.**
Distribuição: nativa; não endêmica;
Cololejeunea minutissima* (Sm.) Schiffn subsp. *minutissima
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8464 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Cololejeunea minutissima* subsp. *myriocarpa* (Nees & Mont.) R.M.Schust.**
Voucher: Vital, D.M. 8130 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Cololejeunea obliqua* (Nees & Mont.) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 245 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Cololejeunea planiuscula* Tixier**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cololejeunea platyneura* (Spruce) S.W.Arnell**
Voucher: Schiffner, V. 1902 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Cololejeunea schusteri* Pócs**
Voucher: Schuster, R.M. 79-20-140 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cololejeunea spruceana* Tixier**
Voucher: Spruce, R. L1692 (MANCH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cololejeunea subcardiocarpa* Tixier**
Voucher: Santos, N.D. 289 p.p (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cololejeunea submarginata* Tixier**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9735 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (AL), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cololejeunea subscariosa* (Spruce) R.M.Schust.**
Voucher: Papp, B. s.n. (EGR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste; Amazônia
***Cololejeunea surinamensis* Tixier**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7242 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cololejeunea verwimpii* Tixier**
Voucher: Yano, O. 26675 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal
***Cololejeunea vitalana* Tixier**
Voucher: Vital, D.M. 13166 (PC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Colura (Dumort.) Dumort.

6 espécies (1 endêmica)
***Colura cylindrica* Herzog**
Voucher: Bastos, C.J.P. 2275 p.p. (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia
***Colura greig-smithii* Jovet-Ast**
Voucher: Germano, S.R. s.n. (UFP 31126c)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Colura itatyana* Steph.**
Voucher: Hell, K.G. 306 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Colura tenuicornis* (A.Evans) Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 244 (RB) Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Colura tortifolia* (Nees & Mont.) Steph.**
Voucher: Schiffner, V. 22 p.p. (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PE), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Colura ulei* Jovet-Ast**
Voucher: Visnadi, S.R. 1809 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Cyclolejeunea A.Evans

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Cyclolejeunea accedens* (Gottsche) A.Evans**
Voucher: Schiffner, V. 1311 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Cyclolejeunea chitonia* (Taylor *ex* Lehm.) A.Evans**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8812 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Cyclolejeunea convexistipa* (Lehm. & Lindenb.) A.Evans**
Voucher: Vilas Bôas-Bastos, S. 742 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Cyclolejeunea foliorum* (Nees) Grolle**
Voucher: Vital, D.M. 3796 (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Cyclolejeunea luteola* (Spruce) Grolle**
Voucher: Bastos, C.J.P. 3664 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyclolejeunea peruviana* (Lehm. & Lindenb.) A.Evans**
Voucher: Schiffner, V. 965 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Diplasiolejeunea (Spruce) Schiffn.

14 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Diplasiolejeunea alata* Jovet-Ast**
Voucher: Santos, N.D. 285 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Diplasiolejeunea brunnea* Steph.**
Voucher: Yano, O. 23667 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Diplasiolejeunea buckii* Grolle**
Voucher: Buck, W.R. 1869 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Diplasiolejeunea caribea* Tixier**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Diplasiolejeunea caribea* subsp. *latetruncata* Tixier**
Referência: Tixier, P. 1985. Bryoph. Biblioth. 27: 1-439.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Diplasiolejeunea cavifolia* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 195 (RB) Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Diplasiolejeunea cobrensis* Gottsche *ex* Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8730b (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica
***Diplasiolejeunea inermis* Tixier**
Voucher: Hampe, E. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Diplasiolejeunea lanciloba* Tixier**
Voucher: Fife, A.J. s.n. (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Diplasiolejeunea latipuensis* Tixier**
Voucher: Bastos, C.J.P. 3500 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Diplasiolejeunea pauckertii* (Nees) Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 13318 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Diplasiolejeunea pellucida* (Meisn.) Schiffn.**
Voucher: Costa, D.P. 4626 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Diplasiolejeunea replicata* (Spruce) Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 13565 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Diplasiolejeunea rudolphiana* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 854 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Diplasiolejeunea unidentata* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.**
Voucher: Bastos, C.J.P. 2061 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Drepanolejeunea (Spruce) Schiffn.

19 espécies (4 endêmicas)
***Drepanolejeunea aculeata* Bischl.**
Voucher: Gehrt, A. 508 p.p (JE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Drepanolejeunea anoplantha* (Spruce) Steph.**
Voucher: Costa, D.P. 4639 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PB, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Drepanolejeunea araucariae* Steph.**
Voucher: Costa, D.P. 3705 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Drepanolejeunea bidens* (Steph.) A.Evans**
Voucher: Costa, D.P. 4026, 4715 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Drepanolejeunea biocellata* A.Evans**
Voucher: Santos, N.D. 187 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Drepanolejeunea campanulata* (Spruce) Steph.**
Voucher: Schiffner, V. 960 (S-PA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Drepanolejeunea crassiretis* A.Evans**
Voucher: Wainio, E.A. 29 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Drepanolejeunea crucianella* (Taylor) A.Evans**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 6905a (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Drepanolejeunea fragilis* Bischl.**
Voucher: Bastos, C.J.P. 2323 p.p. (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Drepanolejeunea granatensis* (J.B.Jack & Steph.) Bischl.**
Voucher: Costa, D.P. 3838 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Drepanolejeunea grollei* E.Reiner & Schäfer-Verw.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 6905 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Drepanolejeunea inchoata* (Meisn.) Schiffn.**
Voucher: Yano, O. 20795 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Drepanolejeunea integribracteata* Bischl.**
Voucher: Spruce, R. 358 (MANCH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Drepanolejeunea lichenicola* (Spruce) Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 829 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Drepanolejeunea mosenii* (Steph.) Bischl.**
Voucher: Santos, N.D. 285 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Drepanolejeunea orthophylla* (Nees & Mont.) Bischl.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 911 (UERJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Drepanolejeunea palmifolia* (Nees) Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 799 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Drepanolejeunea polyrhiza* (Nees) Grolle & R.-L. Zhu**
Voucher: Buck, W.R. 1774 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Drepanolejeunea subdissitifolia* Herzog**
Voucher: Hoehne, F.C. 508 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Frullanoides Raddi

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Frullanoides corticalis* (Lehm. & Lindenb.)**
Voucher: Costa, D.P. 4826 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Frullanoides densifolia* Raddi**
Voucher: Santos, N.D. 439 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Frullanoides liebmanniana* (Lindenb. & Gottsche) van Slageren**
Voucher: Vital, D.M. 6250 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Frullanoides tristis* (Steph.) van Slageren**
Voucher: Bastos, C.J.P. 158 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Haplolejeunea Grolle
1 espécie (não endêmica)
***Haplolejeunea cucullata* (Steph.) Grolle**
Voucher: Bastos, C.J.P. 3270 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

Harpalejeunea (Spruce) Schiffn.
5 espécies (2 endêmicas)
***Harpalejeunea oxyphylla* (Nees & Mont.) Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 320 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Harpalejeunea schiffneri* S.W. Arnell**
Voucher: Costa, D.P. 4688 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Harpalejeunea stricta* (Lindenb. & Gottsche) Steph.**
Voucher: Costa, D.P. 4730 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Harpalejeunea tenuicuspis* (Spruce) Schiffn.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (MANCH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Harpalejeunea tridens* (Besch. & Spruce) Steph.**
Voucher: Vital, D.M. 15570 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Lejeunea Lib.
42 espécies (5 endêmicas)
***Lejeunea adpressa* Nees**
Voucher: Vital, D.M. 763 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Lejeunea anomala* Lindenb. & Gottsche**
Voucher: Schiffner, V. 1972 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Lejeunea asperrima* Spruce**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Lejeunea bermudiana* (A.Evans) R.M.Schust.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 1315 (UERJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Lejeunea boryana* Mont.**
Voucher: Equipe do curso s.n. (INPA, SP 125505)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Lejeunea cancellata* Nees & Mont.**
Voucher: Vital, D.M. 1139 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Lejeunea capensis* Gottsche**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 12677 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Lejeunea caulicalyx* (Steph.) E.Reiner & Goda**
Voucher: Vital, D.M. 12905 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Lejeunea cerina* (Lehm. & Lindenb.) Gottsche**
Voucher: Santos, N.D. 454 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Lejeunea controversa* Gottsche**
Voucher: Santos, N.D. 867 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Lejeunea cristulaeflora* (Gottsche *ex* Steph.) E.Reiner & Goda**
Voucher: Costa, D.P. 4707 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lejeunea cristulata* (Steph.) E.Reiner & Goda**
Voucher: Santos, N.D. 198 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Lejeunea erostrata* E.Reiner & Goda**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lejeunea filipes* Spruce**
Voucher: Natividade, O.R.O. 2 p.p. (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal
***Lejeunea flava* (Sw.) Nees**
Voucher: Santos, N.D. 320 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Lejeunea glaucescens* Gottsche**
Voucher: Yano, O. 2905 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Lejeunea grossiretis* (Steph.) E.Reiner & Goda**
Voucher: Santos, N.D. 524 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lejeunea grossitexta* (Steph.) E.Reiner & Goda**
Voucher: Costa, D.P. 4773 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Lejeunea huctumalcencis* Lindenb. & Gottsche**
Voucher: Ilkiu-Borges, A.L. 803 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Lejeunea immersa* Spruce**
Voucher: Costa, D.P. 4696 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lejeunea inflexiloba* J.B.Jack & Steph.**
Voucher: Costa, D.P. 4696 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lejeunea juruana* Gradst. & E.Reiner**
Referência: Gradstein, S.R. & Reiner-Drehwald, M. E. 2007. Syst. Bot. 32(3): 487.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lejeunea laeta* (Lehm. & Lindenb.) Gottsche**
Voucher: Santos, N.D. 507 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Lejeunea laetevirens* Nees & Mont.**
Voucher: Santos, N.D. 303 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Lejeunea lepida* Lindenb. & Gottsche**
Voucher: Bastos, C.J.P. 2313 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal
***Lejeunea magnoliae* Lindenb. & Gottsche**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 1295 (UERJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Lejeunea monimiae* (Steph.) Steph.**
Voucher: Costa, D.P. 4614 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Lejeunea obtusangula* Spruce**
Voucher: Smith, B. s.n. (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Lejeunea oligoclada* Spruce**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10154 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Lejeunea perapillosa* E.Reiner & Pôrto**
Voucher: Pôrto, K.C. 1812 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Lejeunea phyllobola* Nees & Mont.**
Voucher: Costa, D.P. 4811 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Lejeunea puiggariana* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 4635 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica, Pantanal
***Lejeunea quinque-umbonata* Spruce**
Voucher: Athayde-Filho, F.P. 744 (SJPR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Lejeunea raddiana* Lindenb.**
Voucher: Santos, N.D. 422 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Lejeunea reflexistipula* (Lehm. & Lindenb.) Gottsche**
Voucher: Vital, D.M. 3931 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Lejeunea rionegrensis* Spruce**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7264 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Lejeunea schizotis* Spruce**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lejeunea setiloba* Spruce**
Voucher: Santos, N.D. 494 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Lejeunea subspathulata* Spruce**
Referência: Visnadi, S.R. 1998. Tese de doutorado. Instituto de Biociências do Campus de Rio Claro, UNESP 1-274.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Lejeunea tapajosensis* Spruce**
Voucher: Costa, D.P. 4832 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Lejeunea topoensis* Gradst. & E.Reiner**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10504 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Lejeunea trinitensis* Lindenb.**
Voucher: Vital, D.M. 5939 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Lepidolejeunea R.M.Schust.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Lepidolejeunea eluta* (Nees) R.M.Schust.**
Voucher: Vital, D.M. 7010 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Lepidolejeunea involuta* (Gottsche) Grolle**
Voucher: Santos, N.D. 558 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Lepidolejeunea ornata* (H.Rob.) R.M.Schust.**
Voucher: Griffin III, D. 573 (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Leptolejeunea (Spruce) Schiffn.

9 espécies (nenhuma endêmica)
***Leptolejeunea brasiliensis* Bischl.**
Voucher: Schiffner, V. 1859 (S-PA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Leptolejeunea diversilobulata* Bischl.**
Voucher: Santos, N.D. 4626 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Leptolejeunea elliptica* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 289 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Leptolejeunea exocellata* (Spruce) A.Evans**
Voucher: Santos, N.D. 617 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Leptolejeunea maculata* (Mitt.) Schiffn.**
Voucher: Alvarenga, L.D.P. s.n. (UFP 50889)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Leptolejeunea moniliata* Steph.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 572a (UERJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Leptolejeunea obfuscata* (Spruce) Steph.**
Voucher: Yano, O. 12221 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Leptolejeunea serratifolia* Schiffn.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (G 8066)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Leptolejeunea tridentata* Bischl.**
Voucher: Ilkiu-Borges, A.L. 881 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Leucolejeunea A.Evans

4 espécies (1 endêmica)
***Leucolejeunea caducifolia* Gradst. & Schaf.-Verw.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 12722 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Leucolejeunea conchifolia* (A.Evans) A.Evans**
Voucher: Santos, N.D. 460 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Leucolejeunea unciloba* (Lindenb.) A.Evans**
Voucher: Santos, N.D. 410 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Leucolejeunea xanthocarpa* (Lehm. & Lindenb.) A.Evans**
Voucher: Santos, N.D. 297 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Lopholejeunea (Spruce) Schiffn.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Lopholejeunea eulopha* (Taylor) Schiffn.**
Voucher: Griffin III, D. 552 (FLAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lopholejeunea nigricans* (Lindenb.) Schiffn.**
Voucher: Costa, D.P. 4582 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Lopholejeunea subfusca* (Nees) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 153 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Macrocolura R.M.Schust.

1 espécie (não endêmica)
***Macrocolura sagittistipula* (Spruce) R.M.Schust.**
Referência: Grolle, R. & Zhu, R.L. 2002. J. Hattori Bot. Lab. 76:21-34.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

Marchesinia S.F.Gray

1 espécie (não endêmica)
***Marchesinia brachiata* (Sw.) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 365 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Mastigolejeunea (Spruce) Schiffn.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Mastigolejeunea auriculata* (Wilson) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 877 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Mastigolejeunea innovans* (Spruce) Steph.**
Voucher: Boom, B.M. 8602 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Mastigolejeunea plicatiflora* (Spruce) Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 706 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Metalejeunea Grolle

1 espécie (não endêmica)
***Metalejeunea cucullata* (Reinw. et al.) Grolle**
Voucher: Vilas Bôas-Bastos, S. 450 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Microlejeunea Steph.

9 espécies (1 endêmica)
***Microlejeunea acutifolia* Steph.**
Voucher: Ilkiu-Borges, A.L. 1010 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Microlejeunea aphanella* (Spruce) Steph.**
Voucher: Schiffner, V. 869 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Microlejeunea bullata* (Taylor) Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 347 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Microlejeunea capillaris* (Gottsche) Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9230 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Microlejeunea cystifera* Herzog**
Voucher: Bastos, C.J.P. 3494 p.p. (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Microlejeunea epiphylla* Bischl.**
Voucher: Santos, N.D. 602 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Microlejeunea globosa* (Spruce) Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 13151 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (SE), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Microlejeunea stricta* (Lindenb. & Gottsche) Steph.**
Referência: Gradstein, S.R. & Costa, D.P. 2003. Mem. New York Bot. Gard. 87:1-318.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Microlejeunea subulistipa* Steph.**
Voucher: Ule, E.H.G. 71 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Myriocoleopsis Schiffn.

2 espécies (1 endêmica)
***Myriocoleopsis fluviatilis* (Steph.) E.Reiner & Gradst.**
Voucher: Vital, D.M. 1856 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Myriocoleopsis gymnocolea* (Spruce) E.Reiner & Gradst.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7676 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Neurolejeunea (Spruce) Schiffn.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Neurolejeunea breutelii* (Gottsche) A.Evans**
Voucher: Costa, D.P. 4732 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Neurolejeunea seminervis* (Spruce) Schiffn.**
Voucher: Ilkiu-Borges, A.L. 1079 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Odontolejeunea (Spruce) Schiffn.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Odontolejeunea decemdentata* (Spruce) Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14687 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Odontolejeunea lunulata* (Weber) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 670 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Odontolejeunea rhomalea* (Spruce) Steph.**
Voucher: Vital, D.M. 1146 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Omphalanthus Lindenb. & Nees

1 espécie (não endêmica)
***Omphalanthus filiformis* (Sw.) Nees**
Voucher: Santos, N.D. 442 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

Oryzolejeunea (R.M.Schust.) R.M.Schust.

1 espécie (não endêmica)
***Oryzolejeunea saccatiloba* (Steph.) Gradst.**
Voucher: Schiffner, V. 1117 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Otolejeunea Grolle & Tixier

1 espécie (1 endêmica)
***Otolejeunea schnellii* (Tixier) R.-L.Zhu & M.L.So**
Voucher: Schnell, R. 9312 (PC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pictolejeunea Grolle

2 espécies (1 endêmica)
***Pictolejeunea picta* (Gottsche *ex* Steph.) Grolle**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (RJ); Amazônia
***Pictolejeunea sprucei* Grolle**
Voucher: Santos, N.D. 449 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Pluvianthus R.M.Schust.

1 espécie (1 endêmica)
***Pluvianthus squarrosus* (Steph.) R.M.Schust. & Schaf.-Verw.**
Voucher: Costa, D.P. 3789 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Potamolejeunea Spruce

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Potamolejeunea polystachya* (Spruce) Steph.**
Voucher: Vital, D.M. 4316 (GOET)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Potamolejeunea sprucei* Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9738 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Prionolejeunea (Spruce) Schiffn.
8 espécies (2 endêmicas)
***Prionolejeunea aemula* (Gottsche) A.Evans**
Voucher: Santos, N.D. 668 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Prionolejeunea decora* (Taylor) Steph.**
Voucher: Visnadi, S.R. 2171 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Prionolejeunea denticulata* (Weber) Schiffn.**
Voucher: Vilas Bôas-Bastos, S. 345 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Prionolejeunea grata* (Gottsche) Schiffn.**
Voucher: Visnadi, S.R. 1346 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Prionolejeunea mucronata* (Sande Lac.) Steph.**
Voucher: Gehrt, A. 525 (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Prionolejeunea muricato-serrulata* (Spruce) Steph.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (MANCH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Prionolejeunea recurvula* (Spruce) Steph.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (MANCH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Prionolejeunea scaberula* (Spruce) Steph.**
Voucher: Vilas Bôas-Bastos, S. 345 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, BA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Pycnolejeunea (Spruce) Schiffn.
5 espécies (2 endêmicas)
***Pycnolejeunea contigua* (Nees) Grolle**
Voucher: Bastos, C.J.P. 1234 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Pycnolejeunea densistipula* (Lehm. & Lindenb.) Steph.**
Voucher: Vital, D.M. 3136 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Pycnolejeunea macroloba* (Nees & Mont.) Schiffn.**
Voucher: Yano, O. 3897 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Pycnolejeunea papillosa* X.-L. He**
Voucher: Schuster, R.M. 79-15-807 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pycnolejeunea porrectilobula* Bastos & Yano**
Voucher: Bastos, C.J.P. 1824 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Rectolejeunea A.Evans
4 espécies (1 endêmica)
***Rectolejeunea berteroana* (Gottsche *ex* Steph.) A.Evans**
Voucher: Costa, D.P. 4060 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Rectolejeunea emarginuliflora* (Gottsche) A.Evans**
Voucher: Vilas Bôas-Bastos, S. 1127 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Rectolejeunea flagelliformis* A.Evans**
Voucher: Bastos, C.J.P. 2072 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Rectolejeunea monoica* R.M.Schust.**
Voucher: Vilas Bôas-Bastos, S. 475 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

Schiffneriolejeunea Verd.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Schiffneriolejeunea amazonica* Gradst.**
Voucher: Prance, G.T. 11372 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Schiffneriolejeunea polycarpa* (Nees) Gradst.**
Voucher: Costa, D.P. 4801 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Stictolejeunea (Spruce) Schiffn.
1 espécie (não endêmica)
***Stictolejeunea squamata* (Willd. *ex* Weber) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 866 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Symbiezidium Trevis.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Symbiezidium barbiflorum* (Lindenb. & Gottsche) A. Evans**
Voucher: Santos, N.D. 288 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Symbiezidium transversale* (Sw.) Trevis.**
Voucher: Yano, O. 23551 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

Taxilejeunea (Spruce) Schiffn.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Taxilejeunea asthenica* (Spruce) Steph.**
Voucher: Schiffner, V. 742 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Taxilejeunea isocalycina* (Nees) Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 829 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Taxilejeunea lusoria* (Lindenb. & Gottsche) Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 303 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Taxilejeunea obtusangula* (Spruce) A.Evans**
Voucher: Santos, N.D. 188 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Taxilejeunea pterigonia* (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 803 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Thysananthus Lindenb.
1 espécie (não endêmica)
***Thysananthus amazonicus* (Spruce) Schiffn.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11408 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Trachylejeunea (Spruce) Schiffn.
3 espécies (1 endêmica)
***Trachylejeunea aneogyna* (Spruce) Grolle**
Voucher: Vilas Bôas-Bastos, S. 1632 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Trachylejeunea asperiflora* (Spruce) Schiffn.**
Voucher: Lützelburg, P. 22666a (JE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Trachylejeunea decurviloba* (Steph.) X.-L.He & Grolle**
Voucher: Nelson 37 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Verdoornianthus Gradst.
2 espécies (1 endêmica)
***Verdoornianthus griffinii* Gradst.**
Voucher: Griffin III, D. I-70A (FLAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Verdoornianthus marsupiifolius* (Spruce) Gradst.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (MANCH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Vitalianthus R.M.Schust.
2 espécies (2 endêmicas)
***Vitalianthus bischlerianus* (Porto & Grolle) R.M.Schust. & Giancotti**
Voucher: Bastos, C.J.P. 2562 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vitalianthus urubuensis* Zartmann & Ackerman**
Voucher: Zartmann, C. 2626 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Xylolejeunea X.-L. He & Grolle
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Xylolejeunea aquarius* (Spruce) X.-L.He & Grolle**
Voucher: Spruce, R. s.n. (MANCH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xylolejeunea crenata* (Nees & Mont.) X.-L. He & Grolle**
Voucher: Vilas Bôas-Bastos, S. 1280 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

LEPICOLEACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Lepicolea Dumort.
1 espécie (não endêmica)
***Lepicolea ochroleuca* (Spreng.) Spruce**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10532 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

LEPIDOZIACEAE
12 gêneros, 48 espécies (7 endêmicas)

Amazoopsis Engel & Merr.
1 espécie (1 endêmica)
***Amazoopsis dissotricha* (Spruce) Engel & Merr.**
Referência: Engel, J.J. & Merril, G.L. 2004. Fieldiana, Bot. 44(30):1-265.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Bazzania S.F.Gray
17 espécies (1 endêmica)
***Bazzania aurescens* Spruce**
Voucher: Santos, N.D. 642 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Bazzania cuneistipula* (Gottsche & Lindenb.) Trevis.**
Voucher: Costa, D.P. 3878 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Bazzania denticulata* (Lindenb. & Gottsche) Trevis.**
Voucher: Wainio, E.A. 46 p.p. (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Bazzania diversicuspis* Spruce**
Referência: Fulford, M.H. 1963. Mem. New York Bot. Gard. 11:1-172. Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Bazzania falcata* (Lindenb.) Trevis.**
Voucher: Schiffner, V. 464 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Bazzania gracilis* (Hampe & Gottsche) Steph.**
Voucher: Wainio, E.A. 13 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Bazzania heterostipa* (Steph.) Fulford**
Voucher: Santos, N.D. 620 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Bazzania hookeri* (Lindenb.) Trevis.**
Voucher: Santos, N.D. 465 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Bazzania jamaicensis* (Lehm. & Lindenb.) Trevis.**
Voucher: Wainio, E.A. 35 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Bazzania longistipula* (Lindenb.) Trevis.**
Voucher: Santos, N.D. 83 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Bazzania nitida* (Weber) Grolle**
Voucher: Santos, N.D. 634 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Bazzania pallide-virens* (Steph.) Fulford**
Voucher: Yano, O. 23740 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Bazzania phyllobola* Spruce**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9204 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Bazzania roraimensis* (Steph.) Fulford**
Referência: Fulford, M.H. 1963. Mem. New York Bot. Gard. 11:1-172.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Bazzania schlimiana* (Gottsche) Fulford**
Voucher: Puiggari, J.J. 296 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Bazzania stolonifera* (Sw.) Trevis.**
Voucher: Santos, N.D. 630 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Bazzania taleana* (Gottsche) Fulford**
Voucher: Santos, N.D. 775 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Kurzia G.Martens

3 espécies (1 endêmica)
***Kurzia brasiliensis* (Steph.) Grolle**
Voucher: Santos, N.D. 788 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Kurzia capillaris* (Sw.) Grolle**
Voucher: Santos, N.D. 534 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Kurzia flagellifera* (Steph.) Grolle**
Referência: Gradstein, S.R. & Costa, D.P. 2003. Mem. New York Bot. Gard. 87:1-318.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Lepidozia Dumort.

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Lepidozia brasiliensis* Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 6949 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Lepidozia coilophylla* Taylor**
Voucher: Costa, D.P. 4755 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Lepidozia cupressina* (Sw.) Lindenb.**
Voucher: Santos, N.D. 483 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Lepidozia inaequalis* (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 1916 (UERJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Lepidozia incurvata* Lindenb.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10545 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Lepidozia pseudocupressina* Schiffn.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8941 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Micropterygium Lindenb.

7 espécies (2 endêmicas)
***Micropterygium campanense* Spruce *ex* Reimers**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11462a (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Micropterygium lechleri* Reimers**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9836 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Micropterygium leiophyllum* Spruce**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8607 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Micropterygium parvistipulum* Spruce**
Referência: Gradstein, S.R. & Costa, D.P. 2003. Mem. New York Bot. Gard. 87:1-318.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Micropterygium pterygophyllum* (Nees) Trevis.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Micropterygium reimersianum* Herzog**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8709 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Micropterygium trachyphyllum* Reimers**
Voucher: Hind, D.J.N. s.n. (SP 284244)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Monodactylopsis R.M.Schust.
1 espécie (não endêmica)
***Monodactylopsis monodactyla* (Spruce) R.M.Schust.**
Voucher: Bastos, C.J.P. 899 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Mytilopsis Spruce
1 espécie (não endêmica)
***Mytilopsis albifrons* Spruce**
Voucher: Vital, D.M. 3g (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Paracromastigum Fulford & Taylor
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Paracromastigum dusenii* (Steph.) R.M.Schust.**
Voucher: Costa, D.P. 3836 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Paracromastigum pachyrhizum* (Nees) Fulford**
Voucher: Santos, N.D. 727 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Protocephalozia (Spruce) Schiffn.
1 espécie (não endêmica)
***Protocephalozia ephemeroides* (Spruce) Schiffn.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pteropsiella Spruce
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pteropsiella frondiformis* Spruce**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Pteropsiella serrulata* Spruce *ex* Steph.**
Voucher: Buck, W.R. 1874 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Telaranea (Spruce) Schiffn.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Telaranea diacantha* (Mont.) Engel & Merr.**
Voucher: Santos, N.D. 270 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Telaranea nematodes* (Gottsche *ex* Austin) M.A.Howe**
Voucher: Santos, N.D. 429 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Telaranea pecten* (Spruce) R.M.Schust.**
Referência: Engel, J.J. & Merril, G.L. 2004. Fieldiana, Bot. 44(30):1-265.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Zoopsidella R.M.Schust.
4 espécies (2 endêmicas)
***Zoopsidella antillana* (Steph.) R.M.Schust.**
Voucher: Athayde-Filho, F.P. 689 p.p. (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Zoopsidella integrifolia* (Spruce) R.M.Schust.**
Voucher: Vital, D.M. 1140 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Zoopsidella macella* (Steph.) R.M.Schust.**
Voucher: Yano, O. 12126 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, SE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Zoopsidella serra* (Spruce) R.M.Schust.**
Referência: Fulford, M.H. 1968.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

LUNULARIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Lunularia Adans.
1 espécie (não endêmica)
***Lunularia cruciata* (L.) Dumort.**
Voucher: Santos, N.D. 546 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

MARCHANTIACEAE
2 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica)

Dumortiera Nees
1 espécie (não endêmica)
***Dumortiera hirsuta* (Sw.) Nees**
Voucher: Santos, N.D. 215 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Marchantia L.
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Marchantia berteroana* Lehm. & Lindenb.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 1949 (UERJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Marchantia breviloba* A.Evans**
Voucher: Frahm, J.P. 1621 (PC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Marchantia chenopoda* L.**
Voucher: Santos, N.D. 214 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Marchantia paleacea* Bert.**
Voucher: Raddi, G. s.n. (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marchantia papillata* Raddi**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 3001 (UERJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Marchantia polymorpha* L.**
Voucher: Vianna, E.C. s.n. (ICN 4262)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

METZGERIACEAE

1 gênero, 26 espécies (6 endêmicas), 2 variedades (não endêmicas)

Metzgeria Raddi

26 espécies (6 endêmicas), 2 variedades (não endêmicas)
***Metzgeria acuminata* Steph.**
Voucher: Vital, D.M. 7306 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Metzgeria adscendens* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 772 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Metzgeria agnewiae* Kuwah.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8523 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Metzgeria albinea* Spruce**
Distribuição: nativa; não endêmica
Metzgeria albinea* Spruce var. *albinea
Voucher: Santos, N.D. 334 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Metzgeria albinea* var. *angusta* (Steph.) D.P.Costa & Gradst.**
Voucher: Santos, N.D. 366 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Metzgeria aurantiaca* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 322 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Metzgeria bahiensis* Schiffn.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10968 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Metzgeria brasiliensis* Schiffn.**
Voucher: Costa, D.P. 3113 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Metzgeria ciliata* Raddi**
Voucher: Santos, N.D. 197 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Metzgeria conjugata* Lindb.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10117 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Metzgeria consanguinea* Schiffn.**
Voucher: Yano, O. 6349 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Metzgeria convoluta* Steph.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 2301 (UERJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Metzgeria cratoneura* Schiffn.**
Voucher: Santos, N.D. 691 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Metzgeria dichotoma* (Sw.) Nees**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 156a (UERJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Metzgeria fruticola* Spruce**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8214 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Metzgeria furcata* (L.) Dumort.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 160 (UERJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Metzgeria hegewaldii* Kuwah.**
Voucher: Yano, O. 5828 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Metzgeria herminieri* Schiffn.**
Voucher: Costa, D.P. 3744 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Metzgeria lechleri* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 273 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Metzgeria leptoneura* Spruce**
Voucher: Santos, N.D. 695 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Metzgeria liebmanniana* Lindenb. & Gottsche**
Voucher: Vital, D.M. 11743 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Metzgeria myriopoda* Lindb.**
Voucher: Santos, N.D. 230 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Metzgeria psilocraspeda* Schiffn.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10272 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Metzgeria rufula* Spruce**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9075 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Metzgeria scyphigera* A.Evans**
Voucher: Vital, D.M. 6556 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Metzgeria subaneura* Schiffn.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9242 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Metzgeria uncigera* A.Evans**
Voucher: Yano, O. 13375 (SP) Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

MONOCLEACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

Monoclea Hook.
1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Monoclea gottschei* Lindb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Monoclea gottschei* subsp. *elongata* Gradst. & Mues**
Voucher: Santos, N.D. 385 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

OXYMITRACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Oxymitra Bisch. *ex* Lindenb.
1 espécie (não endêmica)
***Oxymitra incrassata* (Brot.) Sérgio & Sim-Sim**
Voucher: Vianna, E.C. s.n. (ICN 4272)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

PALLAVICINIACEAE
3 gêneros, 8 espécies (nenhuma endêmica)

Jensenia Lindb.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Jensenia difformis* (Nees) Grolle**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8936b (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Jensenia spinosa* (Lindenb. & Gottsche) Grolle**
Voucher: Costa, D.P. 4654 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Pallavicinia S.F.Gray
1 espécie (não endêmica)
***Pallavicinia lyellii* (Hook.) S.F.Gray**
Voucher: Santos, N.D. 348 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Symphyogyna Nees & Mont.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Symphyogyna aspera* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 212 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Symphyogyna brasiliensis* (Nees) Nees & Mont.**
Voucher: Santos, N.D. 176 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Symphyogyna brongniartii* Mont.**
Voucher: Santos, N.D. 590 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Symphyogyna leptothelia* Taylor**
Voucher: Hell, K.G. 669 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Symphyogyna podophylla* (Thunb.) Mont. & Nees**
Voucher: Santos, N.D. 533 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

PELLIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Noteroclada Taylor *ex* Hook.
1 espécie (não endêmica)
***Noteroclada confluens* Taylor *ex* Hook. & Wilson**
Voucher: Santos, N.D. 417 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

PLAGIOCHILACEAE
1 gênero, 36 espécies (5 endêmicas)

Plagiochila (Dumort.) Dumort.
36 espécies (5 endêmicas)
***Plagiochila adiantoides* (Sw.) Lindenb.**
Voucher: Costa, D.P. 3883 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Plagiochila aerea* Taylor**
Voucher: Hampe, E. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Plagiochila amicta* Steph.**
Voucher: Gradstein, S.R. 9826 (GOET)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Plagiochila arenacea* Schiffn.**
Voucher: Mello, E. 2402 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Plagiochila bahiensis* Lindenb.**
Voucher: Guedes, M.L. s.n. (ALCB 37743)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Plagiochila beskeana* Steph.**
Voucher: Schiffner, V. 2298 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Plagiochila bifaria* (Sw.) Lindenb.**
Voucher: Costa, D.P. 4769 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Plagiochila boryana* Gottsche *ex* Steph.**
Voucher: Lützelburg, P. 6708 (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Plagiochila bryopterioides* Spruce**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7695 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Plagiochila bunburii* Taylor**
Voucher: Visnadi, S.R. 1977 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Plagiochila corrugata* (Nees) Nees & Mont.**
Voucher: Santos, N.D. 347 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Plagiochila cristata* (Sw.) Lindenb.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7428 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Plagiochila deflexirama* Taylor**
Voucher: Pôrto, K.C. s.n. (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Plagiochila disticha* (Lehm. & Lindenb.) Lindenb.**
Voucher: Santos, N.D. 865 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Plagiochila distinctifolia* Lindenb.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 1926 (UERJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Plagiochila diversifolia* Lindenb. & Gottsche**
Voucher: Valente, E.B. 314 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Plagiochila exigua* (Taylor) Taylor**
Voucher: Costa, D.P. 4769 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Plagiochila faxinensis* Schiffn.**
Voucher: Schiffner, V. 503 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Plagiochila gymnocalycina* (Lehm. & Lindenb.) Lindenb.**
Voucher: Santos, N.D. 402 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Plagiochila horrida* Gottsche**
Voucher: Schiffner, V. 260 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Plagiochila kroneana* Steph.**
Voucher: Schiffner, V. 989 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Plagiochila lingua* Steph.**
Voucher: Schiffner, V. 2117 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Plagiochila macrostachya* Lindenb.**
Voucher: Costa, D.P. 4734 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Plagiochila martiana* (Nees) Lindenb.**
Voucher: Santos, N.D. 229 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Plagiochila micropterys* Gottsche**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 6781 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Plagiochila montagnei* Nees**
Voucher: Schiffner, V. 2222 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Plagiochila patentissima* Lindenb.**
Voucher: Santos, N.D. 198 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Plagiochila patula* (Sw.) Lindenb.**
Voucher: Santos, N.D. 232 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Plagiochila raddiana* Lindenb.**
Voucher: Santos, N.D. 365 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Plagiochila rutilans* Lindenb.**
Voucher: Santos, N.D. 531 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Plagiochila simplex* (Sw.) Lindenb.**
Voucher: Santos, N.D. 791 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Plagiochila stricta* Lindenb.**
Voucher: Puiggari, J.J. 257 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Plagiochila subbidentata* Taylor**
Voucher: Reitz, R. 16054 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Plagiochila subplana* Lindenb.**
Voucher: Santos, N.D. 370 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Plagiochila vincentina* Lindenb.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (MANCH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Plagiochila wettsteiniana* S.W. Arnell**
Voucher: Schiffner, V. 1346 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PE), Sudeste (SP); Mata Atlântica

PLEUROZIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Pleurozia Dumort.
1 espécie (não endêmica)
***Pleurozia paradoxa* (J.B.Jack) Schiffn.**
Voucher: Sá, C.F.C. et al. 893b (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

PORELLACEAE
1 gênero, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Porella L.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Porella brasiliensis* (Raddi) Schiffn.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 972 (UERJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Porella reflexa* (Lehm. & Lindenb.) Trevis.**
Voucher: Lemos-Michel, E. 3593 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Porella swartziana* (Weber) Trevis.**
Voucher: Lemos-Michel, E. 3525 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

RADULACEAE
1 gênero, 26 espécies (1 endêmica)

Radula Dumort.
26 espécies (1 endêmica)
***Radula angulata* Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8880 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Radula brasilica* K.Yamada**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8484 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Radula cubensis* K.Yamada**
Voucher: Bastos, C.J.P. 2247 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Radula decora* Gottsche *ex* Steph.**
Voucher: Schiffner, V. 1200 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Radula elliottii* Castle**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7634 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Radula fendleri* Gottsche *ex* Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10156b (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Radula flaccida* Lindenb. & Gottsche**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7217 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Radula javanica* Gottsche**
Voucher: Santos, N.D. 254 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Radula kegelii* Gottsche *ex* Steph.**
Voucher: Costa, D.P. 4617 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Radula ligula* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 256 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Radula mammosa* Spruce**
Voucher: Ule, E.H.G. 502 (Y)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Radula mexicana* Lindenb. & Gottsche**
Voucher: Santos, N.D. 553 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Radula nudicaulis* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 177 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Radula obovata* Castle**
Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Radula pocsii* K.Yamada**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8395 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Radula quadrata* Gottsche**
Voucher: Costa, D.P. 3847 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Radula recubans* Taylor**
Voucher: Santos, N.D. 77 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Radula schaefer-verwimpii* K.Yamada**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11534 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Radula sinuata* Gottsche *ex* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 804 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Radula stenocalyx* Mont.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 13026 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Radula tectiloba* Steph.**
Voucher: Costa, D.P. 3729 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Radula tenera* Mitt. *ex* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 749 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Radula varilobula* Castle**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7030 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Radula voluta* Taylor *ex* Gottsche et al.**
Voucher: Lemos-Michel, E. 3580 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Radula wrightii* Castle**
Referência: Castle, H. 1960. Rev. Bryol. Lichénol. 29:1025.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Radula yanoella* R.M.Schust.**
Voucher: Schuster, R.M. 80-1691 (Herb. Schuster)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

RICCIACEAE

2 gêneros, 33 espécies (11 endêmicas)

Riccia L.

32 espécies (11 endêmicas)
***Riccia albopunctata* Jovet-Ast**
Voucher: Vital, D.M. 2181 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Riccia australis* Steph.**
Voucher: Vital, D.M. 8366 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Riccia bahiensis* Steph.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Riccia brasiliensis* Schiffn.**
Voucher: Vital, D.M. 5649 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Riccia breutelii* Hampe *ex* Steph.**
Voucher: Vital, D.M. 201-934 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Riccia campbelliana* Howe**
Voucher: Homrich, R.P. 3148 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Riccia cavernosa* Hoffm.**
Voucher: Vianna, E.C. s.n. (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Riccia crassifrons* Spruce**
Voucher: Spruce, R. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Riccia curtisii* (James *ex* Austin) Austin**
Voucher: Vianna, E.C. s.n. (ICN 4278)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Riccia enyae* Jovet-Ast**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 12979 (PC, SP, SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Sul (RS); Mata Atlântica
***Riccia erythrocarpa* Jovet-Ast**
Voucher: Vital, D.M. 1109 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Riccia fruchartii* Steph.**
Voucher: Vital, D.M. 8366 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Riccia grandis* Nees**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11137 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Riccia horrida* Jovet-Ast**
Voucher: Vital, D.M. 1969 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Riccia jovet-astiae* Vianna**
Voucher: Vianna, E.C. 626 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Riccia lamellosa* Raddi**
Voucher: Vital, D.M. 2026 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Riccia lindmanii* Steph.**
Voucher: Vital, D.M. 1989 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Pampa
***Riccia mauryana* Steph.**
Voucher: Vital, D.M. 8184 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Riccia membranacea* Gottsche & Lindenb.**
Voucher: Bueno, E.A. s.n. (ICN 39388)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Riccia paraguayensis* Spruce**
Voucher: Vital, D.M. 2176 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Riccia paranaensis* Hässel**
Voucher: Vital, D.M. 1874 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Riccia plano-biconvexa* Steph.**
Voucher: Vital, D.M. 1870 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Riccia ridleyi* A.Gepp**
Voucher: Vital, D.M. 8314 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Mata Atlântica
***Riccia sanguineisporis* Jovet-Ast**
Voucher: Vital, D.M. 2335 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Riccia squamata* Nees**
Voucher: Vital, D.M. 8067 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Riccia stenophylla* Spruce**
Voucher: Vianna, E.C. s.n. (ICN 4275)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Riccia subdepilata* Jovet-Ast**
Voucher: Vital, D.M. 8146 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Riccia subplana* Steph.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9783 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Riccia taeniaeformis* Jovet-Ast**
Voucher: Bueno, E.A. 4563 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Riccia viannae* Jovet-Ast**
Voucher: Vianna, E.C. 3999 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Riccia vitalii* Jovet-Ast**
Voucher: Vital, D.M. 1087 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (ES), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Riccia wainionis* Steph.**
Voucher: Vital, D.M. 1643 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ricciocarpos Corda
1 espécie (não endêmica)
***Ricciocarpos natans* (L.) Corda**
Voucher: Vital, D.M. 5916 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

SCAPANIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Scapania (Dumort.) Dumort.
1 espécie (não endêmica)
***Scapania portoricensis* Hampe & Gottsche**
Voucher: Santos, N.D. 789 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia

SPHAEROCARPACEAE
1 gênero, 1 espécie (1 endêmica)

Sphaerocarpos Boehm.
1 espécie (1 endêmica)
***Sphaerocarpos muccilloi* Vianna**
Voucher: Vianna, E.C. s.n. (ICN 5632)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

TARGIONIACEAE
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Cyathodium Kunze
1 espécie (não endêmica)
***Cyathodium cavernarum* Kunze**
Voucher: Vital, D.M. 1207 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Targionia L.
1 espécie (não endêmica)
***Targionia hypophylla* L.**
Voucher: Hatschbach, G. 55146 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

TRICHOCOLEACEAE
1 gênero, 4 espécies (1 endêmica)

Trichocolea Dumort.
4 espécies (1 endêmica)
***Trichocolea argentea* Herzog**
Voucher: Hoehne, F.C. 7769 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Trichocolea brevifissa* Steph.**
Voucher: Santos, N.D. 769 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Trichocolea flaccida* (Spruce) J.B.Jack & Steph.**
Voucher: Yano, O. 23741 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Trichocolea tomentosa* (Sw.) Gottsche**
Voucher: Santos, N.D. 692 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

MUSGOS

Denise Pinheiro da Costa, Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Camara, Kátia Cavalcanti Porto, Andréa Pereira Luizi-Ponzo, Anna Luiza Ilkiu-Borges
257 gêneros, 885 espécies (189 endêmicas), 10 subespécies (4 endêmicas), 53 variedades (16 endêmicas)

ADELOTHECIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Adelothecium Mitt.
1 espécie (não endêmica)
***Adelothecium bogotense* (Hampe) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 476 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

AMBLYSTEGIACEAE
3 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Amblystegium Schimp.
1 espécie (não endêmica)
***Amblystegium varium* (Hedw.) Lindb.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14825 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Leptodictyum (Schimp.) Warnst.
1 espécie (não endêmica)
***Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10481 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Vittia Ochyra
1 espécie (não endêmica)
***Vittia pachyloma* (Mont.) Ochyra**
Voucher: Sehnem, A. 235 (LBLC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

ANDREAEACEAE
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Andreaea Dumort.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Andreaea rupestris* Hedw.**
Voucher: Bandeira, M.C.V. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Andreaea subulata* Harv.**
Voucher: Bandeira, M.C.V. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

ANOMODONTACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Herpertineuron (Müll.Hal.) Cardot
1 espécie (não endêmica)
***Herpertineuron toccoae* (Sull. & Lesq.) Cardot**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 791 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

ARCHIDIACEAE
1 gênero, 8 espécies (nenhuma endêmica)

Archidium Brid.
8 espécies (nenhuma endêmica)
***Archidium amplexicaule* Müll. Hal.**
Voucher: Vital, D.M. 2007 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Archidium clavatum* I.G.Stone**
Voucher: Vital, D.M. 11401 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Archidium donnellii* Austin**
Voucher: Vital, D.M. 2004 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Archidium hallii* Austin**
Voucher: Vital, D.M. 8897 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Archidium julicaule* Müll. Hal.**
Voucher: Vital, D.M. 5912 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal
***Archidium microthecium* Dixon & P. de la Varde**
Voucher: Vital, D.M. 5911 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Archidium ohioense* Schimp. *ex* Müll. Hal.**
Voucher: Vital, D.M. 2923 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Archidium tenerrimum* Mitt.**
Voucher: Vital, D.M. 9146 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

AULACOMNIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Aulacomnium Schwägr.
1 espécie (não endêmica)
***Aulacomnium palustre* (Hedw.) Schwägr.**
Voucher: Sehnem, A. 236 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

BARTRAMIACEAE
4 gêneros, 24 espécies (6 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

Bartramia Hedw.
2 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)
***Bartramia longifolia* Hook.**
Voucher: Griffin III, D. 206 (FLAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Bartramia mathewsii* Mitt.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Bartramia mathewsii* subsp. *brasiliensis* Fransén**
Voucher: Vital, D.M. 5552 (FLAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Breutelia (Bruch & Schimp.) Schimp.
6 espécies (3 endêmicas)
***Breutelia grandis* (Hampe) Paris**
Voucher: Costa, D.P. 1106 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Breutelia microdonta* (Mitt.) Broth.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14461 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Breutelia subdisticha* (Hampe) A.Jaeger**
Voucher: Costa, D.P. 508 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Breutelia subtomentosa* (Hampe) A.Jaeger**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8949 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Breutelia tomentosa* (Brid.) A. Jaeger**
Voucher: Mazzoni, R. 2 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC); Mata Atlântica
***Breutelia wainioi* Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 618 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

Leiomela (Mitt.) Broth.
3 espécies (2 endêmicas)
***Leiomela bartramioides* (Hook.) Paris**
Voucher: Lüth, M. 3652 (Herb. Lüth)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Leiomela capillaris* (Hampe) Paris**
Voucher: Sehnem, A. 5985 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Leiomela piligera* (Hampe) Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 777 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Philonotis Brid.
13 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Philonotis ampliretis* Broth.**
Voucher: Sehnem, A. 2786 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Philonotis cernua* (Wilson) Griffin & W.R.Buck**
Voucher: Peralta, D.F. 1196 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Philonotis curvata* (Hampe) A.Jaeger**
Voucher: Hatschbach, G. 19680 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Philonotis elongata* (Dumort.) H.A.Crum & Steere**
Voucher: Peralta, D.F. 1564 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Philonotis gardneri* (Müll.Hal.) A.Jaeger**
Voucher: Costa, D.P. 500 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Philonotis glaziovii* (Hampe) D.G.Griffin & W.R.Buck**
Referência: Brotherus, V.F. 1924. Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 447-474.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Philonotis gracilenta* (Hampe) A.Jaeger**
Referência: Müller, C.A. 1901. Hedwigia 40:55-99.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Philonotis hastata* (Duby) Wijk & Margad.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 45 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Philonotis longiseta* (Michx.) E.Britton**
Voucher: Bastos, C.J.P. 85 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Philonotis rufiflora* (Hornsch.) Reichardt**
Distribuição: nativa; não endêmica

Philonotis rufiflora* (Hornsch.) Reichardt subsp. *rufiflora
Voucher: Hatschbach, G. 19733 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Philonotis rufiflora* var. *minor* Ångstr.**
Voucher: Widgren, J.F. s.n. (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Philonotis scabrifolia* (Hook.f. & Wilson) Braithw.**
Referência: Camara, P.E.A.S. et al. 2005. Trop. Bryol. 26:133-140.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Philonotis sphaerocarpa* (Hedw.) Brid.**
Voucher: Vital, D.M. 5988 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Philonotis uncinata* (Schwägr.) Brid.**
Voucher: Costa, D.P. 454 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

BRACHYTHECIACEAE
9 gêneros, 20 espécies (1 endêmica)

Aerolindigia M.Menzel
1 espécie (não endêmica)
***Aerolindigia capillacea* (Hornsch.) M. Menzel**
Voucher: Ferreira, G.L. 182 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

Brachythecium Schimp.
4 espécies (1 endêmica)
***Brachythecium occidentale* (Hampe) A.Jaeger**
Referência: Yano, O. & Bordin, J. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 18: 111-122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Brachythecium plumosum* (Hedw.) Schimp.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14651 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica
***Brachythecium poadelphus* Müll. Hal.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Brachythecium ruderale* (Brid.) W.R.Buck**
Voucher: Britto, A.E.R.M. 9 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pantanal

Meteoridium (Müll.Hal.) Manuel
1 espécie (não endêmica)
***Meteoridium remotifolium* (Müll.Hal.) Manuel**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10228 p.p. (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Palamocladium Müll. Hal.
1 espécie (não endêmica)
***Palamocladium leskeoides* (Hook.) E.Britton**
Voucher: Costa, D.P. 746 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Platyhypnidium M.Fleisch.
1 espécie (não endêmica)
***Platyhypnidium aquaticum* (A.Jaeger) M.Fleisch.**
Voucher: Sehnem, A. 227 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Pseudoscleropodium (Limpr.) M. Fleisch.
1 espécie (não endêmica)
***Pseudoscleropodium purum* (Hedw.) M.Fleisch.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10034 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Rhynchostegium Bruch & Schimp.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhynchostegium conchophyllum* A.Jaeger**
Referência: Churchill, S.P. & Linares, C.E.L. 1995. Prod. Bryol. Novo-Granatensis 12: 1-924.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Rhynchostegium serrulatum* (Hedw.) A.Jaeger**
Voucher: Bordin, J. 259 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Squamidium (Müll. Hal.) Broth.
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Squamidium brasiliense* Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 681 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Squamidium diversicoma* (Hampe) Broth.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9281 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Squamidium isocladum* (Renauld & Cardot) Broth.**
Voucher: Vital, D.M. 486a (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Squamidium leucotrichum* (Taylor) Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 733 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Squamidium macrocarpum* (Spruce *ex* Mitt.) Broth.**
Voucher: Visnadi, S.R. 572 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Squamidium nigricans* (Hook.) Broth.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 609 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (CE, PE), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Zelometeorium Manuel
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Zelometeorium ambiguum* (Hornsch.) Manuel**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10098 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Zelometeorium patens* (Hook.) Manuel**
Voucher: Peralta, D.F. 2106 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Zelometeorium patulum* (Hedw.) Manuel**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 56 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

BRUCHIACEAE
4 gêneros, 7 espécies (2 endêmicas)

Bruchia Schwaegr.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Bruchia aurea* Besch.**
Referência: Rushing, A.E. 1986. J. Hattori Bot. Lab. 60: 35-83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Bruchia uruguensis* Müll. Hal.**
Referência: Rushing, A.E. 1986. J. Hattori Bot. Lab. 60: 35-83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Eobruchia W.R. Buck
1 espécie (1 endêmica)
***Eobruchia bruchioides* (Müll.Hal.) W.R.Buck**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11175 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Pringleella Cardot
1 espécie (1 endêmica)
***Pringleella subulata* (Müll.Hal.) Broth.**
Voucher: Ule, E.H.G. 2058 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Trematodon Mich.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Trematodon ambiguous* (Hedw.) Hornsch.**
Referência: Allen, B.H. 1994. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 49: 1-242.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Trematodon longicollis* Michx.**
Voucher: Costa, D.P. 871 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Trematodon vaginatus* Müll. Hal.**
Voucher: Ule, E.H.G. 103 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

BRYACEAE
10 gêneros, 54 espécies (3 endêmicas)

Anomobryum Schimp.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Anomobryum conicum* (Hornsch.) Broth.**
Voucher: Hoehne, F.C. 10 (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Anomobryum julaceum* (Schrad. *ex* P.Gaertn. et al.) Schimp.**
Referência: Hornschuch, C.F. 1840. Fl. bras. 1(2): 1-712.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Brachymenium Schwägr.
10 espécies (2 endêmicas)
***Brachymenium columbicum* (De Not.) Broth.**
Voucher: Puiggari, J.J. 893 (H)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Brachymenium consimile* (Mitt.) A.Jaeger**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7488 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica
***Brachymenium fabronioides* (Müll.Hal.) Paris**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10201 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Brachymenium globosum* A.Jaeger**
Voucher: Vital, D.M. s.n. (SP 373134)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Brachymenium hornschunchianum* Mart.**
Referência: Ochi, H. 1980. J. Fac. Educ. Tottori Univ. 29: 49.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Brachymenium klotzschii* (Schwägr.) Paris**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10306a (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

***Brachymenium morasicum* Besch.**
Voucher: Valdevino, J.A. s.n. (UFP 9624)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Brachymenium peraristatum* (Müll.Hal.) Paris**
Referência: Ochi, H. 1980. J. Fac. Educ. Tottori Univ. 29: 49.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, RO); Amazônia
***Brachymenium regnellii* Hampe**
Voucher: Mosén, C.W.H. s.n. (L)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),
Sul (SC); Mata Atlântica
***Brachymenium speciosum* (Hook.f. & Wilson) Steere**
Voucher: Wasum, R. s.n. (HUCS 8613)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

Bryum Hedw.

13 espécies (nenhuma endêmica)
***Bryum arachnoideum* Müll. Hal.**
Voucher: Herzog 5935 (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica
***Bryum argenteum* Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 223 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),
Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Bryum atenense* Williams**
Voucher: Vital, D.M. 8450 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste
(MT, GO, MS); Cerrado, Pantanal
***Bryum atrovirens* Brid.**
Referência: Bartram, E.B. 1954. Arch. Jard. Bot.
Rio de Janeiro 13:234-242.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Bryum duplicatum* Broth.**
Voucher: Irang, B. s.n. (ICN 60577)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste
(PE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (ES, RJ),
Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Bryum leptocladon* Sull.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1534 (H)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Bryum limbatum* Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 385 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste
(DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica
***Bryum mattogrossense* Broth.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 2571 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste
(MT), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Bryum pabstianum* Müll. Hal.**
Voucher: Germano, S.R. s.n. (UFP 31837)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR,
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Bryum paradoxum* Schwägr.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 235 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO),
Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Bryum renauldii* Röll *ex* Renauld & Cardot**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 4198 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (RS); Mata Atlântica
***Bryum torquatum* Mohamed**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7176 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Bryum turbinatum* (Hedw.) Turner**
Referência: Hornschuch, C.F. 1840. Fl. bras. 1(2): 1-712.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Gemmabryum J.R.Spence & H.P.Ramsay

8 espécies (nenhuma endêmica)
***Gemmabryum acuminatum* (Harv. *ex* Hook.) J.R.Spence & H.P.Ramsay**
Voucher: Ule, E.H.G. 42 (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (SC); Mata Atlântica
***Gemmabryum apiculatum* (Schwägr.) Spence & H.P.Ramsay**
Voucher: Visnadi, S.R. 1504 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica
***Gemmabryum clavatum* (Müll.Hal.) Spence & H.P.Ramsay**
Voucher: Hagendorf, S.O. s.n. (L)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Gemmabryum coronatum* Schwägr.**
Voucher: Peralta, D.F. 2043 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT,
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Gemmabryum exile* (Dozy & Molk.) Spence & H.P.Ramsay**
Voucher: Peralta, D.F. 1404 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste
(PI, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (SP,
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Gemmabryum laevigatum* (Hook. & Wilson) Spence & H.P.Ramsay**
Voucher: Dusén, P.K.H. 4487 (PC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); Mata Atlântica
***Gemmabryum radiculosum* (Brid.) J.R.Spence & H.P.Ramsay**
Voucher: Ule, E.H.G. 599 (H)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste
(MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC);
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Gemmabryum subapiculatum* (Hampe) Spence & H.P.Ramsay**
Voucher: Peralta, D.F. 1481 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Imbribryum Pedersen

1 espécie (não endêmica)
***Imbribryum muehlenbeckii* (Bruch & Schimp.) Pedersen**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9311 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Leptostomopsis (Müll.Hal. *ex* Broth.) J.R.Spence & H.P.Ramsay

1 espécie (não endêmica)
***Leptostomopsis systylium* (Müll.Hal.) J.R.Spence & H.P.Ramsay**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10079 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Plagiobryum Lindb.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Plagiobryum capillare* (Hedw.) Pedersen**
Voucher: Câmara, P.E.A.S. 578 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Plagiobryum cellulare* (Hook.) J.R.Spence & H.P.Ramsay**
Referência: Ochi, H. 1980. J. Fac. Educ. Tottori Univ. 29: 49.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica
***Plagiobryum pseudotriquetrum* (Hedw.) Pedersen**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10277 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Mata Atlântica

Ptychostomum Hornsch.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Ptychostomum caespiticium* (Brid.) J.R.Spence & H.P.Ramsay**
Voucher: Gardner, G. 36 (L)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ptychostomum wrightii* (Sull.) J.R.Spence & H.P.Ramsay**
Voucher: Moura, C.W.N. s.n. (SP 283923)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

Rhodobryum (Schimp.) Limpr.

8 espécies (1 endêmica)
***Rhodobryum aubertii* (Schwägr.) Thér.**
Referência: Hornschuch, C.F. 1840. Fl. bras. 1(2): 1-712. Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Rhodobryum beyrichianum* (Hornsch.) Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 843 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nodeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhodobryum grandifolium* (J.Taylor) Schimp.**
Voucher: Visnadi, S.R. 1158 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhodobryum procerum* (Schimp.) Paris**
Voucher: Yano, O. 10498 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Rhodobryum pseudomarginatum* (Geh. & Hampe) Paris**
Voucher: Puiggari, J.J. 187 (H)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Rhodobryum roseolum* Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 888 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Rhodobryum roseum* (Hedw.) Limpr.**
Voucher: Costa, D.P. 3794 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rhodobryum subverticillatum* Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 1194 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

Rosulabryum J.R.Spence

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Rosulabryum andicola* (Hook.) Ochyra**
Voucher: Prance, G.T. 19414 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Rosulabryum billarderi* (Schwägr.) Spence**
Voucher: Vital, D.M. 8169 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Rosulabryum canariense* (Brid.) Ochyra**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8622 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Rosulabryum densifolium* (Brid.) Ochyra**
Voucher: Costa, D.P. 1166 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Rosulabryum huillense* (Welw. & Duby) Ochyra**
Voucher: Schiffner, V. 1247 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Rosulabryum pseudocapillare* (Besch.) Ochyra**
Voucher: Costa, D.P. & Molinaro, L.C. 138 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica

CALYMPERACEAE

4 gêneros, 48 espécies (2 endêmicas), 9 variedades (nenhuma endêmica)

Calymperes Sw. *ex* Weber

15 espécies (nenhuma endêmica)
***Calymperes afzelii* Sw.**
Voucher: Costa, D.P. 1231 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Calymperes batramii* Reese**
Voucher: Griffin III, D. 765 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Calymperes erosum* Müll. Hal.**
Voucher: Germano, S.R. s.n. (UFP 13420)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Calymperes guildingii* Hook. & Grev.**
Voucher: Buck, W.R. 2504 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Calymperes levyanum* Besch.**
Voucher: Reese, W.D. 16741 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
***Calymperes lonchophyllum* Schwägr.**
Voucher: Buck, W.R. 2771 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Calymperes mitrafugax* Florsch.**
Voucher: Prance, G.T. 209 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Calymperes nicaraguense* Renauld & Cardot**
Voucher: Buck, W.R. 1759 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Calymperes othmeri* Herzog**
Voucher: Peralta, D.F. 1636 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Calymperes palisotii* Schwägr.**
Voucher: Germano, S.R. s.n. (UFP 12149)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Calymperes pallidum* Mitt.**
Voucher: Lisboa, R.C.L. 7183 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Calymperes platyloma* Mitt.**
Voucher: Santiago, R.L. 159 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado
***Calymperes rubiginosum* (Mitt.) Reese**
Voucher: Santiago, R.L. 38c (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Calymperes smithii* E.B.Bartram**
Voucher: Costa, D.P. 1946 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Calymperes tenerum* Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 1342 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Leucophanes Brid.

1 espécie (não endêmica)
***Leucophanes molleri* Müll. Hal.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11248 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (PE), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Octoblepharum Hedw.

7 espécies (1 endêmica)
***Octoblepharum albidum* Hedw.**
Voucher: Germano, S.R. 5 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Octoblepharum cocuiense* Mitt.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 625 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Octoblepharum cylindricum* Mont.**
Voucher: Buck, W.R. 2201 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Octoblepharum erectifolium* Mitt. *ex* Williams**
Voucher: Buck, W.R. 2652 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Octoblepharum leucobryoides* O.Yano**
Voucher: Griffin III, D. 401 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Octoblepharum pulvinatum* (Dozy & Molk.) Mitt.**
Voucher: Peralta, D.F. 1025 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Octoblepharum stramineum* Mitt.**
Voucher: Griffin III, D. 32 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

Syrrhopodon Schwägr.

25 espécies (1 endêmica), 9 variedades (nenhuma endêmica)
***Syrrhopodon annotinus* Reese & Griff.**
Voucher: Buck, W.R. 2826 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Syrrhopodon brasiliensis* W.D.Reese**
Voucher: Vital, D.M. 10328 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste
(MG, ES, SP); Mata Atlântica
***Syrrhopodon circinatus* (Brid.) Mitt.**
Voucher: Reese, W.D. 16758 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia
***Syrrhopodon cryptocarpus* Dozy & Molk.**
Voucher: Buck, W.R. 2160 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA,
AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP);
Amazônia, Mata Atlântica
***Syrrhopodon cymbifolius* Müll. Hal.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8824 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (ES, SP); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica
***Syrrhopodon elatus* Mont.**
Voucher: Reese, W.D. 16820 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Syrrhopodon elongatus* Sull.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Syrrhopodon elongatus* var. *glaziovii* (Hampe) W.D.Reese**
Voucher: Vital, D.M. 8056 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Syrrhopodon fimbriatus* Mitt.**
Voucher: Buck, W.R. 2625 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte
(AM, AC); Domínio desconhecido
***Syrrhopodon flexifolius* Mitt.**
Voucher: Buck, W.R. 2636 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Syrrhopodon gardneri* (Hook.) Schwägr.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 6806 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste
(MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Syrrhopodon gaudichaudii* Mont.**
Voucher: Costa, D.P. 214 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, TO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Syrrhopodon graminicola* Williams**
Voucher: Schiffner, V. s.n. (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste
(PE), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Syrrhopodon helicophyllus* Mitt.**
Voucher: Buck, W.R. 2520 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Syrrhopodon hornschuchii* Mart.**
Voucher: Buck, W.R. 2184 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP,
PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG);
Amazônia, Mata Atlântica
***Syrrhopodon incompletus* Schwägr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Syrrhopodon incompletus* var. *berteroanum* (Brid.) W.D.Reese**
Voucher: Vital, D.M. 3173 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
Syrrhopodon incompletus* Schwägr. var. *incompletus
Voucher: Vital, D.M. 6596 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Syrrhopodon incompletus* var. *lanceolatus* (Hampe) W.D.Reese**
Voucher: Reitz, R. 3148 (FH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul
(PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Syrrhopodon incompletus* var. *luridus* (Paris & Broth.) Florsch.**
Voucher: Buck, W.R. 3140 (MO)
Distribuição: nativa;
não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Syrrhopodon leprieuri* Mont.**
Voucher: Buck, W.R. 2642 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP,
PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT);
Amazônia, Mata Atlântica
***Syrrhopodon ligulatus* Mont.**
Voucher: Lisboa, R.C.L. 7262 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica
***Syrrhopodon lycopodioides* (Brid.) Müll. Hal.**
Voucher: Yano, O. 23680 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Syrrhopodon parasiticus* (Brid.) Besch.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 833 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal
***Syrrhopodon prolifer* Schwägr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Syrrhopodon prolifer* var. *acanthoneuros* (Müll.Hal.) Müll.Hal.**
Voucher: Vital, D.M. 13507 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste
(PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
Syrrhopodon prolifer* Schwägr. var. *prolifer
Voucher: Buck, W.R. 2482 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,
RO), Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT,
GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Syrrhopodon prolifer* var. *scaber* (Mitt.) W.D.Reese**
Voucher: Reese, W.D. 16852 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Syrrhopodon prolifer* var. *tenuifolius* (Sull.) W.D.Reese**
Voucher: Vital, D.M. 10534 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Syrrhopodon rigidus* Hook. & Grev.**
Voucher: Lins, R.C. 238 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Syrrhopodon rupestris* Mitt.**
Voucher: Buck, W.R. 2374 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Syrrhopodon simmondsii* Steere**
Voucher: Lisboa, R.C.L. 7266 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Sul (PR); Amazônia
***Syrrhopodon tortilis* Hampe**
Voucher: Yano, O. 412 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Syrrhopodon xanthophyllus* Mitt.**
Voucher: Buck, W.R. 2412 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

CAMPYLIACEAE
4 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica)

Anacamptodon Brid.
1 espécie (não endêmica)
***Anacamptodon cubensis* (Sull.) Mitt.**
Voucher: Lindberg, S.O. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Campyliadelphus (Kindb.) R.S.Chopra
1 espécie (não endêmica)
***Campyliadelphus chrysophyllus* (Brid.) Kanda**
Referência: Hedenas, L. 2003. Fl. Neotrop. Monogr. 89: 1-108.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Drepanocladus (Müll.Hal.) Roth
1 espécie (não endêmica)
***Drepanocladus perplicatus* (Dusén) G.Roth**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 15010 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Warnstorfia Loeske
1 espécie (não endêmica)
***Warnstorfia exannulata* (Schimp.) Loeske**
Voucher: Vital, D.M. 19828 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

CATAGONIACEAE
1 gênero, 4 espécies (nenhuma endêmica)

Catagonium Müll. Hal. *ex* Broth.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Catagonium brevicaudatum* Müll. Hal. *ex* Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 1098 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Catagonium emarginatum* Lin**
Voucher: Reitz, R. 2527 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Catagonium nitens* (Brid.) Cardot**
Referência: Lin, S.-H. 1982. J. Taiwan Mus. 36: 37-86. Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Catagonium nitidum* (Hook.f. & Wilson) Broth.**
Referência: Lin, S.-H. 1982. J. Taiwan Mus. 36: 37-86.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

CRYPHAEACEAE
2 gêneros, 9 espécies (nenhuma endêmica)

Cryphaea Schimp.
7 espécies (nenhuma endêmica)
***Cryphaea brevipila* Mitt.**
Referência: Rao, P. 2001. Bryobrothera 7: 1-112.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cryphaea filiformis* (Hedw.) Brid.**
Referência: Rao, P. 2001. Bryobrothera 7: 1-112.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Cryphaea jamesonii* Taylor**
Voucher: Vital, D.M. 19481 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Cryphaea orizabae* Schimp. *ex* Besch.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 17078a (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Cryphaea patens* Hornsch. *ex* Müll. Hal.**
Voucher: Vital, D.M. 26970 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cryphaea ramosa* (Mitt.) Wilson**
Voucher: Sehnem, A. 280 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Cryphaea rhacomitrioides* Müll.Hal.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8196 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Schoenobryum Dozy & Molk.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Schoenobryum concavifolium* (Griff.) Gangulee**
Voucher: Bandeira, M.C.V. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Schoenobryum rubricaule* (Mitt.) Manuel**
Voucher: Sehnem, A. 44 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

DALTONIACEAE
3 gêneros, 8 espécies (2 endêmicas)

Calyptrochaeta Desv.
2 espécies (1 endêmica)
***Calyptrochaeta albescens* (Hampe) W.R.Buck**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9096 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Calyptrochaeta setigera* (Mitt.) W.R.Buck**
Voucher: Visnadi, S.R. 2096 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Daltonia Hook. & Taylor
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Daltonia brasiliensis* Mitt.**
Voucher: Hatschbach, G. 19538 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Daltonia gracilis* Mitt.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11502 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Daltonia longifolia* Taylor**
Voucher: Pôrto, K.C. s.n. (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Daltonia stenophylla* Mitt.**
Voucher: Yano, O. 10475 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Leskeodon Broth.
2 espécies (1 endêmica)
***Leskeodon aristatus* (Geh. & Hampe) Broth.**
Voucher: Peralta, D.F. 1201 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Leskeodon auratus* (Müll.Hal.) Broth.**
Referência: Buck, W.R. 1998. Mem. New York Bot. Gard. 82:1-400.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

DICRANACEAE
13 gêneros, 52 espécies (11 endêmicas), 3 subespécies (2 endêmicas), 8 variedades (1 endêmica)

Aongstroemia Bruch & Schimp.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Aongstroemia julacea* (Hook.) Mitt.**
Voucher: Vital, D.M. 11735 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Aongstroemia longipes* (Sommerf.) Bruch & Schimp.**
Voucher: Vital, D.M. 8863 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Aongstroemia orientalis* Mitt.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8970 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Atractylocarpus Mitt.
2 espécies (1 endêmica)
***Atractylocarpus brasiliensis* (Müll.Hal.) R.S.Williams**
Voucher: Vital, D.M. 6010 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Atractylocarpus longisetus* (Hook.) E.B.Bartram**
Voucher: Frahm, J.P. 1892 (Herb. Frahm)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Bryohumbertia P. de la Varde
1 espécie (não endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Bryohumbertia filifolia* (Hornsch.) J.-P. Frahm**
Distribuição: nativa; não endêmica
Bryohumbertia filifolia* (Hornsch.) J.-P. Frahm var. *filifolia
Voucher: Vital, D.M. 7703 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Bryohumbertia filifolia* var. *humilis* (Mont.) J.-P.Frahm**
Voucher: Vitt, D.H. 20638 (FLAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia

Campylopus Brid.
30 espécies (7 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 6 variedades (1 endêmica)
***Campylopus aemulans* (Hampe) A.Jaeger**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8969 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Campylopus angustiretis* (Austin) Lesq. & James**
Voucher: Vital, D.M. 240 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Campylopus arctocarpus* (Hornsch.) Mitt.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Campylopus arctocarpus* (Hornsch.) Mitt. var. *arctocarpus
Voucher: Vital, D.M. 5897 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Campylopus arctocarpus* var. *caldensis* (Ångstr.) J.-P.Frahm**
Voucher: Frahm, J.P. 1577 (Herb. Frahm)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Campylopus carolinae* Grout**
Voucher: Vital, D.M. 2200 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Campylopus cryptopodioides* Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 1928 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Campylopus cuspidatus* (Hornsch.) Mitt.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Campylopus cuspidatus* (Hornsch.) Mitt. var. *cuspidatus
Voucher: Ule, E.H.G. 1364 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Campylopus cuspidatus* var. *dicnemoides* (Müll.Hal.) J.-P.Frahm**
Voucher: Buck, W.R. 15555 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Campylopus densicoma* (Müll.Hal.) Paris**
Voucher: Griffin III, D. 26 (FLAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Campylopus dichrostis* (Müll.Hal.) Paris**
Voucher: Costa, D.P. 625 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Campylopus fragilis* (Brid.) Bruch & Schimp.**
Distribuição: nativa; endêmica

***Campylopus fragilis* subsp. *fragiliformis* (J.-P.Frahm) J.-P.Frahm**
Referência: Frahm, J.-P. 1991.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Campylopus gardneri* (Müll.Hal.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 989 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Campylopus gastro-alaris* (Müll.Hal.) Paris**
Voucher: Vital, D.M. 7617 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Campylopus gemmatus* (Müll.Hal.) Paris**
Voucher: Costa, D.P. 225 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Campylopus griseus* (Hornsch.) A.Jaeger**
Voucher: Costa, D.P. 488 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Campylopus heterostachys* (Hampe) A.Jaeger**
Voucher: Costa, D.P. 977 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Campylopus jamesonii* (Hook.) A.Jaeger**
Voucher: Griffin III, D. 167 (FLAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Campylopus julaceus* A.Jaeger**
Voucher: Costa, D.P. 217 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Campylopus julicaulis* Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 1100 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Campylopus lamellinervis* (Müll.Hal.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 639 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

***Campylopus occultus* Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 65 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Campylopus pilifer* Brid.**
Voucher: Landrum, L.R. 2190 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Campylopus reflexisetus* (Müll.Hal.) Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 660 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Campylopus richardii* Brid.**
Voucher: Costa, D.P. 86 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Campylopus savannarum* (Müll.Hal.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 208 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Campylopus sehnemii* Brid.**
Voucher: Vital, D.M. 2069 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Campylopus subcuspidatus* (Hampe) A.Jaeger**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Campylopus subcuspidatus* var. *damazii* (Broth.) J.-P.Frahm**
Voucher: Damazio, L.B. 2147 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Campylopus subcuspidatus* (Hampe) A. Jaeger var. *subcuspidatus
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7096 (PC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Campylopus surinamensis* Müll. Hal.**
Voucher: Hind, D.J.N. s.n. (SP 284210)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Campylopus trachyblepharon* (Müll.Hal.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 1334 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Campylopus twaitesii* (Mitt.) A.Jaeger**
Voucher: Giordano, L.C. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Campylopus uleanus* (Müll.Hal.) Broth.**
Voucher: Lützelburg, P. 7040 p.p. (JE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Campylopus widgrenii* (Müll.Hal.) Mitt.**
Voucher: Sehnem, A. 7133b (LBLC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Dicranella (Müll.Hal.) Schimp.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Dicranella guilleminiana* (Mont.) Mitt.**
Voucher: Bandeira, M.C.V. 224 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Dicranella hilariana* (Mont.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 899 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Dicranella vaginata* (Hook.) Cardot**
Referência: Yano, O. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17:1-142.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Dicranodontium Bruch & Schimp.

1 espécie (1 endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)
***Dicranodontium pulchroalare* Broth.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Dicranodontium pulchroalare* subsp. *brasiliense* (Herzog) J.-P.Frahm**
Referência: Frahm, J.-P. 1997. Ann. Bot. Fenn. 34:179-204.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Dicranum Hedw.

1 espécie (não endêmica)
***Dicranum frigidum* Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 354 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Holomitrium Brid.

3 espécies (1 endêmica)
***Holomitrium arboreum* Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 370 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Holomitrium crispulum* Mart.**
Voucher: Costa, D.P. 63a (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Holomitrium nitidum* Herzog**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9998 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Leucoloma Brid.

4 espécies (1 endêmica)
***Leucoloma cruegerianum* (Müll.Hal.) A.Jaeger**
Voucher: Costa, D.P. 571 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Leucoloma serrulatum* Brid.**
Voucher: Costa, D.P. 743 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Leucoloma tortellum* (Mitt.) A.Jaeger**
Referência: Yano, O. 2006. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 17:1-142.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Leucoloma triforme* (Mitt.) A.Jaeger**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10110 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Microcampylopus (Müll.Hal.) M.Fleisch.

1 espécie (não endêmica)
***Microcampylopus curvisetus* (Hampe) Giese & J.-P.Frahm**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8518 (Herb. Frahm) Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Microdus Schimp. *ex* Besch.

1 espécie (não endêmica)
***Microdus brasiliensis* (Duby) Thér.**
Referência: Theriot, J. 1907. Bull. Herb. Boissier 2, 7: 278.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Paraleucobryum (Lindenb. *ex* Limpr.) Loeske

1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Paraleucobryum longifolium* (Hedw.) Loeske**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Paraleucobryum longifolium* subsp. *brasiliense* (Broth.) P.Müller & J.-P.Frahm**
Voucher: Yano, O. 4844 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Pilopogon Brid.
1 espécie (não endêmica)
***Pilopogon guadalupensis* (Brid.) J.-P.Frahm**
Voucher: Baumgratz, J.F.A. 310 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

DIPHYSCIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Diphyscium D.Mohr
1 espécie (não endêmica)
***Diphyscium longifolium* Griff.**
Voucher: Vital, D.M. 19978 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

DITRICHACEAE
7 gêneros, 13 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

Ceratodon Brid.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid.**
Voucher: Costa, D.P. 232 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
Ceratodon stenocarpus
Bruch & Schimp. *ex* Müll. Hal.
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8977 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Chrysoblastella Williams
1 espécie (não endêmica)
***Chrysoblastella chilensis* (Mont.) Reimers**
Voucher: Vital, D.M. 11773 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Cladastomum Müll. Hal.
2 espécies (2 endêmicas)
***Cladastomum robustum* Broth.**
Voucher: Brotherus, V.F. 1923 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cladastomum ulei* Müll. Hal.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11487 p.p. (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Crumuscus W.R.Buck & Snider
1 espécie (1 endêmica)
***Crumuscus vitalis* W.R.Buck & Snider**
Voucher: Vital, D.M. 7435 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Ditrichum Hampe
5 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Ditrichum crinale* (Taylor) Kuntze**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11539 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Ditrichum itatiaiae* (Müll.Hal.) Paris**
Distribuição: nativa; endêmica
***Ditrichum itatiaiae* var. *brevipes* (Müll.Hal.) Paris**
Voucher: Ule, E.H.G. 1786 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Ditrichum itatiaiae* (Müll.Hal.) Paris var. *itatiaiae
Voucher: Ule, E.H.G. 1809 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ditrichum liliputanum* (Müll.Hal.) Paris**
Voucher: Hatschbach, G. 27075 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Ditrichum paulense* Geh. *ex* Hampe**
Voucher: Puiggari, J.J. 900 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ditrichum ulei* (Müll.Hal.) Paris**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11493 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Eccremidium Wilson
1 espécie (não endêmica)
***Eccremidium floridanum* H.A.Crum**
Voucher: Vital, D.M. 8171 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Garkea Müll. Hal.
1 espécie (não endêmica)
***Garkea flexuosa* (Griff.) Margad. & Nork.**
Voucher: Vital, D.M. 3022 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO); Cerrado

ENTODONTACEAE
3 gêneros, 15 espécies (6 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 1 variedade (1 endêmica)

Entodon Müll. Hal.
12 espécies (5 endêmicas)
***Entodon argyreus* (Besch.) Besch.**
Referência: Yano, O. & Peralta, D.F. 2004. Hoehnea 31(3):251-292.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Entodon beyrichii* (Schwägr.) Müll.Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 263 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Entodon campipatum* Sehnem**
Voucher: Sehnem, A. 7008 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Entodon gracilis* (Ångstr.) A.Jaeger**
Voucher: Sehnem, A. 6837 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica
***Entodon hampeanus* Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 255 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Entodon jamesonii* (Taylor) Mitt.**
Voucher: Bandeira, M.C.V. s.n. (RB 156653)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Entodon lindbergii* Hampe**
Voucher: Sehnem, A. 6086 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Entodon macropodus* (Hedw.) Müll.Hal.**
Voucher: Vital, D.M. 6064 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Entodon mosenii* Broth.**
Voucher: Sehnem, A. 7717b (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Entodon splendidulus* Hampe**
Voucher: Costa, D.P. 255 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Entodon suberythropus* Müll. Hal.**
Referência: Sehnem, A. 1970. Pesquisas, Bot. 28:1-117.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Entodon virens* (Hook.f. & Wilson) Mitt.**
Referência: Yano, O. 1981. J. Hattori Bot. Lab. 50: 270.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Erythrodontium Hampe
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Erythrodontium longisetum* (Hook.) Paris**
Voucher: Costa, D.P. 254 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Erythrodontium squarrosum* (Hampe) Paris**
Voucher: Valdevino, J.A. s.n. (UFP 9614)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Mesonodon Hampe
1 espécie (1 endêmica), 1 subespécie (1 endêmica), 1 variedade (1 endêmica)
***Mesonodon regnellianus* (Müll.Hal.) W.R.Buck**
Distribuição: nativa; endêmica
Mesonodon regnellianus* (Müll.Hal.) W.R.Buck subsp. *regnellianus
Voucher: Mexia, Y. 4929a (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Mesonodon regnellianus* var. *lepyrodontoides* (Müll.Hal.) W.R.Buck**
Referência: Buck, W.R. 1980. J. Hattori Bot. Lab. 48: 71.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

EPHEMERACEAE
2 gêneros, 8 espécies (2 endêmicas)

Ephemerum Hampe
4 espécies (1 endêmica)
***Ephemerum aequinoctale* Spruce**
Referência: Yano, O. 1981. J. Hattori Bot. Lab. 50:279-456.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ephemerum pachyneuron* Müll. Hal.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14605 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Ephemerum spinulosum* Bruch & Schimp.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8460 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Ephemerum uleanum* Müll. Hal.**
Voucher: Ule, E.H.G. 601 (H)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Micromitrium Austin
4 espécies (1 endêmica)
***Micromitrium subaequinoctale* (Broth.) Crosby**
Referência: Yano, O. 1981. J. Hattori Bot. Lab. 50:279-456.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micromitrium tenerum* (Bruch & Schimp.) Crosby**
Referência: Crosby, M.R. 1968. Bryologist 71:116.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Micromitrium thelephorothecum* (Florsch.) Crosby**
Voucher: Pôrto, K.C. s.n. (UFP 9149b)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Micromitrium wrightii* (Müll.Hal.) Crosby**
Voucher: Yano, O. 10605 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

ERPODIACEAE
2 gêneros, 5 espécies (1 endêmica)

Aulacopilum Wilson
2 espécies (1 endêmica)
***Aulacopilum glaucum* Wilson**
Voucher: Vital, D.M. 5747 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica, Pantanal
***Aulacopilum schaeferi* H.A.Crum**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 6967a (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Erpodium (Brid.) Brid.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Erpodium beccari* Müll. Hal.**
Voucher: Vital, D.M. 6068 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pantanal

***Erpodium coronatum* (Hook. & Wilson) Mitt.**
Voucher: Vital, D.M. 1112 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Erpodium glaziovii* Hampe**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 831 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

EUSTICHIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Eustichia (Brid.) Brid.
1 espécie (não endêmica)
***Eustichia longirostris* (Brid.) Brid.**
Referência: Allen, B.H. 2002. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 90:1-699.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

FABRONIACEAE
2 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Dimerodontium Mitt.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Dimerodontium balansae* Müll. Hal.**
Voucher: Câmara, P.E.A.S. 760 (SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Dimerodontium mendozense* Mitt.**
Voucher: Câmara, P.E.A.S. 757 (SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pantanal

Fabronia Raddi
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Fabronia ciliaris* (Brid.) Brid.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Fabronia ciliaris* (Brid.) Brid. subsp. *ciliaris
Voucher: Vital, D.M. 8131 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Fabronia ciliaris* var. *polycarpa* (Hook.) W.R. Buck**
Voucher: Valdevino, J.A. s.n. (UFP 9113)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
Fabronia ciliaris* var. *wrightii* (Sull. *ex* Sull. & Lesq.) *W.R.Buck
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 1046 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Fabronia macroblepharis* Schwägr.**
Voucher: Vital, D.M. 8096 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

FISSIDENTACEAE
1 gênero, 61 espécies (3 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 8 variedades (1 endêmica)

Fissidens Hedw.
61 espécies (3 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 8 variedades (1 endêmica)
***Fissidens acacioides* Schrad.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Fissidens acacioides* Schrad. var. *acacioides
Voucher: Sehnem, A. 228 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Fissidens acacioides* var. *brevicostatus* (Pursell et al.) Pursell**
Voucher: Herter, W.G. s.n. (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Fissidens acacioides* var. *immersus* (Mitt.) Pursell**
Voucher: Vital, D.M. 13460 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens adiantoides* Hedw.**
Voucher: Reitz, R. 1494 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Fissidens allionii* Broth.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7240 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Fissidens amazonicus* Pursell**
Voucher: Buck, W.R. 1927 p.p. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Fissidens amoenus* Müll. Hal.**
Voucher: Visnadi, S.R. 1104 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Fissidens anguste-limbatus* Mitt.**
Voucher: Yano, O. 25913 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fissidens asplenioides* Hedw.**
Voucher: Costa, D.P. 456 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Fissidens berteroi* (Mont.) Müll.Hal.**
Voucher: Sehnem, A. 3650 (FH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Fissidens brachypus* Mitt.**
Voucher: Spruce, R. 476 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Fissidens brevipes* Besch.**
Voucher: Vital, D.M. 5499 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fissidens bryoides* Hedw.**
Voucher: Costa, D.P. 1093 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Fissidens crispus* Mont.**
Voucher: Vital, D.M. 8125 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Fissidens cryptoneuron* P. de la Varde**
Voucher: Vital, D.M. 7518 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Fissidens curvatus* Hornsch.**
Voucher: Puiggari, J.J. 2323 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Fissidens dendrophilus* Brugg.-Nann. & Pursell**
Voucher: Sehnem, A. 300 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Fissidens dissitifolius* Sull.**
Voucher: Thomas, W. 9521 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Fissidens elegans* Brid.**
Voucher: Lisboa, R.C.L. 7206 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fissidens flabellatus* Hornsch.**
Voucher: Vital, D.M. 2326 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Fissidens flaccidus* Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 2001 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Fissidens fontanus* (Bach. Pyl.) Steud.**
Voucher: Sehnem, A. 8322 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Fissidens gardneri* Mitt.**
Voucher: Visnadi, S.R. 1969 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Fissidens goyazensis* Broth.**
Voucher: Vital, D.M. 6069 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens guianensis* Mont.**
Voucher: Germano, S.R. 30 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Fissidens gymnostomus* Brugg.-Nann.**
Voucher: Vital, D.M. 6168 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Fissidens hornschuchii* Mont.**
Voucher: Costa, D.P. 1370 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fissidens inaequalis* Mitt.**
Voucher: Silva, E.C. s.n. (UFP 8522)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Fissidens intromarginatus* (Hampe) A.Jaeger**
Voucher: Vital, D.M. 5920 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fissidens juruensis* Broth.**
Voucher: Ule, E.H.G. 250 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Fissidens lagenarius* Mitt.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Fissidens lagenarius* Mitt. var. *lagenarius
Voucher: Vital, D.M. 6946 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Fissidens lagenarius* var. *muricatulus* (Spruce *ex* Mitt.) Pursell**
Voucher: Yano, O. 29077 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens leptophyllus* Mont.**
Voucher: Vital, D.M. 14993 (PAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Fissidens lindbergii* Mitt.**
Voucher: Vital, D.M. 12661 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens neglectus* Crum**
Voucher: Vital, D.M. 7572a (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens oblongifolius* Hook. f. & Wilson**
Voucher: Burchell, W.J. 9333-3 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Fissidens oediloma* Müll. Hal. *ex* Broth.**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Fissidens ornatus* Herzog**
Voucher: Pôrto, K.C. 410 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens pallidinervis* Mitt.**
Voucher: Vital, D.M. 8821 (FLAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fissidens palmatus* Hedw.**
Voucher: Vital, D.M. 5931 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens pauperculus* Howe**
Voucher: Pôrto, K.C. s.n. (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Fissidens pellucidus* Hornsch.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Fissidens pellucidus* var. *papilliferus* (Broth.) Pursell**
Voucher: Buck, W.R. 1738 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia
Fissidens pellucidus* Hornsch. var. *pellucidus
Voucher: Reese, W.D. 12680 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens perfalcatus* Broth.**
Voucher: Vital, D.M. 6091 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens prionodes* Mont.**
Voucher: Costa, D.P. 1123 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens radicans* Mont.**
Voucher: Costa, D.P. 1421 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Fissidens ramicola* Broth.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8831 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Fissidens rigidulus* Hook. f. & Wilson**
Voucher: Griffin III, D. 262 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Fissidens saprophilus* Broth.**
Voucher: Yano, O. 4026 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens scalaris* Mitt.**
Voucher: Sehnem, A. 2041 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Fissidens scariosus* Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 428 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Fissidens semicompletus* Hedw.**
Voucher: Sehnem, A. 231 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Fissidens serratus* Müll. Hal.**
Voucher: Peralta, D.F. 1489 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens spuriolimbatus* Broth.**
Voucher: Messias, A.C. 121 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (ES, SP), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Fissidens stenophyllus* Ångström**
Voucher: Widgren, J.F. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Fissidens submarginatus* Bruch**
Voucher: Yano, O. 26757 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Fissidens subradicans* Broth.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1506 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens subramicola* Broth.**
Voucher: Yano, O. 1992 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Fissidens subulatus* Mitt.**
Voucher: Vital, D.M. s.n. (SP 373119)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Fissidens taxifolius* Hedw.**
Voucher: Eiten, G. 3744b (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PB), Sul (RS); Caatinga, Pampa
***Fissidens termitarum* (Herzog) Pursell**
Voucher: Vital, D.M. 6557 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens wallisii* Müll. Hal.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11492 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Fissidens weirii* Mitt.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Fissidens weirii* Mitt. subsp. *weirii
Voucher: Peralta, D.F. 1187 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens weirii* var. *hemicraspedophyllus* (Cardot) Pursell**
Voucher: Vital, D.M. 10862 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Fissidens yanoae* Pursell**
Voucher: Yano, O. 3456 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Fissidens zollingeri* Mont.**
Voucher: Costa, D.P. 1965 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

FONTINALACEAE
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Brachelyma Schimp. *ex* Cardot
1 espécie (não endêmica)
***Brachelyma subulatum* (P.Beauv.) Cardot**
Voucher: Yano, O. 25891 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Fontinalis Hedw.
1 espécie (não endêmica)
***Fontinalis duriaei* Schimp.**
Voucher: Reineck, H.E. s.n. (PC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

FUNARIACEAE
3 gêneros, 13 espécies (7 endêmicas)

Entosthodon Schwägr.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Entosthodon bonplandii* (Hook.) Mitt.**
Voucher: Peralta, D.F. 1479 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Entosthodon obtusatus* (Schimp.) Fife**
Voucher: Vital, D.M. 8600 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Entosthodon obtusifolius* Hook.f.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1310 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Funaria Hedw.
4 espécies (2 endêmicas)
***Funaria beyrichii* Hampe**
Voucher: Hatschbach, G. 14138 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Funaria calvescens* Schwägr.**
Referência: Sehnem, A. 1970. Pesquisas, Bot. 28:1-117.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Funaria hygrometrica* Hedw.**
Voucher: Costa, D.P. 228 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Funaria luteolimbata* Broth.**
Voucher: Sehnem, A. 4512 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Physcomitrium (Brid.) Brid.
6 espécies (5 endêmicas)
***Physcomitrium acutifolium* Broth.**
Voucher: Sehnem, A. 6172 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Physcomitrium badium* Broth.**
Voucher: Sehnem, A. 49 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Physcomitrium brevisrostre* Broth.**
Voucher: Hatschbach, G. 19818 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Physcomitrium subsphaericum* Schimp.**
Voucher: Patrus, P. 81 (HPUC-MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Physcomitrium sylvestre* Müll. Hal.**
Voucher: Sehnem, A. 8466c (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Physcomitrium umbonatum* Mitt.**
Referência: Sehnem, A. 1970. Pesquisas, Bot. 28:1-117.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

GRIMMIACEAE
2 gêneros, 10 espécies (1 endêmica)

Grimmia Hedw.
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Grimmia atrata* Miel. *ex* Hornsch.**
Voucher: Wasum, R. s.n. (SP 368648)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Grimmia elongata* Kaulf.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 611 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Grimmia laevigata* (Brid.) Brid.**
Voucher: Vital, D.M. 9196 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Grimmia longirostris* Hook.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1913 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Grimmia ovalis* (Hedw.) Lindb.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11506 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Grimmia trichophylla* Grev.**
Voucher: Lüth, M. 3597 (MEXU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Racomitrium Brid.
4 espécies (1 endêmica)
***Racomitrium crispipilum* (Taylor) A.Jaeger**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11498 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Racomitrium didymum* (Mont.) Lorentz**
Voucher: Reitz, R. 2463 (FH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Racomitrium subsecundum* (Hook. & Grev. *ex* Harv.) Mitt.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11523 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Racomitrium visnadiae* W.R.Buck**
Voucher: Buck, W.R. 27020 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

HEDWIGIACEAE
3 gêneros, 5 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)

Braunia Bruch & Schimp.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Braunia plicata* (Mitt.) A.Jaeger**
Voucher: Sehnem, A. 7752 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Braunia subincana* Broth.**
Voucher: Sehnem, A. 100 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Hedwigia P.Beauv.
1 espécie (não endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Hedwigia ciliata* (Hedw.) Ehrh.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Hedwigia ciliata* (Hedw.) Ehrh. var. *ciliata
Voucher: Sehnem, A. 245 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Hedwigia ciliata* var. *leucophaea* Bruch & Schimp.**
Referência: Angely, J. 1961. Inst. Paran. Bot. 20: 1-8.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hedwigia ciliata* var. *nivalis* Hampe**
Referência: Sehnem, A. 1976. Pesquisas, Bot. 30:1-79.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Hedwigidium Bruch & Schimp.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hedwigidium glyphocarpum* (Hampe) A.Jaeger**
Voucher: Sehnem, A. 14518 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Hedwigidium integrifolium* (P.Beauv.) Dixon**
Voucher: Costa, D.P. 70 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

HELICOPHYLLACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Helicophyllum Brid.
1 espécie (não endêmica)
***Helicophyllum torquatum* (Hook.) Brid.**
Voucher: Vital, D.M. 8553 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

HOOKERIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Hookeria Sm.
1 espécie (não endêmica)
***Hookeria acutifolia* Hook. & Grev.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 13025 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

HYDROPOGONACEAE
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Hydropogon Brid.
1 espécie (não endêmica)
***Hydropogon fontinaloides* (Hook.) Brid.**
Voucher: Lisboa 682 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Hydropogonella Cardot
1 espécie (não endêmica)
***Hydropogonella gymnostoma* (Schimp.) Cardot**
Voucher: Reese, W.D. 13295 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

HYPNACEAE

11 gêneros, 27 espécies (3 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)

Chryso-hypnum Hampe

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Chryso-hypnum diminutivum* (Hampe) W.R.Buck**
Voucher: Costa, D.P. 394 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Chryso-hypnum elegantulum* (Hook.) Hampe**
Voucher: Santos, N.D. 269 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Ctenidium (Schimp.) Mitt.

1 espécie (não endêmica)

***Ctenidium malacodes* Mitt.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7549 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Ectropothecium Mitt.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Ectropothecium aeruginosum* (Müll.Hal.) Mitt.**
Voucher: Ramos, J.S. 348 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Ectropothecium leptochaeton* (Schwägr.) W.R.Buck**
Voucher: Costa, D.P. 1288 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nor-deste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Hypnum Hedw.

1 espécie (não endêmica)

***Hypnum amabile* (Mitt.) Hampe**
Voucher: Brotherus, V.F. 476 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Isopterygium Mitt.

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Isopterygium affusum* Mitt.**
Voucher: Buck, W.R. 2549 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Isopterygium byssobolax* (Müll.Hal.) Paris**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10078 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Isopterygium subbrevisetum* (Hampe) Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 1132 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Isopterygium tenerifolium* Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 1251 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Isopterygium tenerum* (Sw.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 1189 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Mittenothamnium Henn.

10 espécies (3 endêmicas)

***Mittenothamnium andicola* (Hook.) Cardot**
Referência: Yano, O. 1996. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 10: 47-232.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Mittenothamnium expallescens* (Hampe) Cardot**
Voucher: Hatschbach, G. 17225 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica

***Mittenothamnium heterostachys* (Hampe) Cardot**
Voucher: Ferreira, G.L. 175 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Mittenothamnium hylophilum* (Müll.Hal.) Cardot**
Voucher: Hatschbach, G. 29675 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Mittenothamnium macrodontium* (Hornsch.) Cardot**
Voucher: Sehnem, A. 4627 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Mittenothamnium reduncum* (Mitt.) Ochyra**
Voucher: Vital, D.M. 11595 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mittenothamnium reptans* (Hedw.) Cardot**
Voucher: Costa, D.P. 913 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Mittenothamnium simorrhynchum* (Hampe) Cardot**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 84 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Mittenothamnium subcampaniforme* (Geh. & Hampe) Cardot**
Voucher: Sehnem, A. 5947 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Mittenothamnium subdiminutivum* (Geh. & Hampe) Cardot**
Voucher: Costa, D.P. 1395 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Phyllodon Bruch & Schimp.
1 espécie (não endêmica)
***Phyllodon truncatulus* (Müll.Hal.) W.R.Buck**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8626 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Platygyriella Cardot
1 espécie (não endêmica)
***Platygyriella densa* (Hook.) W.R. Buck**
Voucher: Vital, D.M. 8535 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Rhacopilopsis Renauld & Cardot
1 espécie (não endêmica)
***Rhacopilopsis trinitensis* (Müll.Hal.) E.Britton & Dixon**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8619 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PE, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Taxiphyllum M.Fleisch.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Taxiphyllum ligulaefolium* (E.B.Bartram) W.R.Buck**
Voucher: Vital, D.M. 12686 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Taxiphyllum taxirameum* (Mitt.) M.Fleisch.**
Voucher: Peralta, D.F. 1182 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Vesicularia (Müll.Hal.) Müll.Hal.
1 espécie (não endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Vesicularia vesicularis* (Schwägr.) Broth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Vesicularia vesicularis* var. *portoricensis* (Brid.) W.R.Buck**
Voucher: Santos, N.D. 361 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Vesicularia vesicularis* var. *rutilans* (Brid.) W.R.Buck**
Referência: Buck, W.R. 1998. Mem. New York Bot. Gard. 82:1-400.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
Vesicularia vesicularis* (Schwägr.) Broth. var. *vesicularis
Voucher: Santos, N.D. 178 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

HYPOPTERYGIACEAE
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Hypopterygium Brid.
1 espécie (não endêmica)
***Hypopterygium tamarisci* (Sw.) Brid. *ex* Müll.Hal.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 118 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Lopidium Hook. f. & Wilson
1 espécie (não endêmica)
***Lopidium concinnum* (Hook.) Wilson**
Voucher: Costa, D.P. 466 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

LEMBOPHYLLACEAE
2 gêneros, 5 espécies (nenhuma endêmica)

Orthostichella Müll. Hal.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Orthostichella pachygastrella* (Müll.Hal.) B.H.Allen & Magill**
Voucher: Sehnem, A. 7485 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Orthostichella rigida* (Müll.Hal.) B.H.Allen & Magill**
Voucher: Yano, O. 2780 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Orthostichella versicolor* (Müll.Hal.) B.H.Allen & W.R.Buck**
Voucher: Costa, D.P. 388 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Orthostichella welwistchii* (Duby) B.H.Allen & Magill**
Referência: Allen, B.H. & Magill, R.E. 2007. Bryologist 110: 1-45.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Pilotrichella (Müll.Hal.) Besch.
1 espécie (não endêmica)
***Pilotrichella flexilis* (Hedw.) Ångström**
Voucher: Costa, D.P. 953 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

LESKEACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Haplocladium Müll. Hal.
1 espécie (não endêmica)
***Haplocladium microphyllum* (Hedw.) Broth.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 534 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

LEUCOBRYACEAE
2 gêneros, 8 espécies (1 endêmica)

Leucobryum Hampe
6 espécies (1 endêmica)
***Leucobryum albicans* (Schwägr.) Lindb.**
Voucher: Costa, D.P. 482 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Leucobryum albidum* (Brid. *ex* P. Beauv.) Lindb.**
Voucher: Costa, D.P. 1357 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Leucobryum clavatum* Hampe**
Voucher: Costa, D.P. 383 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Leucobryum crispum* Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 595 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Leucobryum giganteum* Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 362 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Leucobryum martianum* (Hornsch.) Hampe *ex* Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 1541 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Ochrobryum Mitt.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Ochrobryum gardneri* (Müll.Hal.) Lindb.**
Voucher: Valdevino, J.A. s.n. (UFP 9056)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Ochrobryum subulatum* Hampe**
Voucher: Câmara, P.E.A.S. 600 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

LEUCODONTACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Pterogoniadelphus M.Fleisch.
1 espécie (não endêmica)
***Pterogoniadelphus assimilis* (Müll.Hal.) Ochyra & Zijlstra**
Voucher: Vital, D.M. 9356 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

LEUCOMIACEAE
3 gêneros, 5 espécies (1 endêmica)

Leucomium Mitt.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Leucomium steerei* B.H.Allen & Veling**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 7423 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leucomium strumosum* (Hornsch.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 1506 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

Philophyllum Müll. Hal.
1 espécie (não endêmica)
***Philophyllum tenuifolium* (Mitt.) Broth.**
Voucher: Visnadi, S.R. 1665 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Rhynchostegiopsis Bruch & Schimp.
2 espécies (1 endêmica)
***Rhynchostegiopsis brasiliensis* Broth.**
Voucher: Schiffner, V. 679 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Rhynchostegiopsis flexuosa* (Sull.) Müll.Hal.**
Voucher: Steward, A. 381 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

METEORIACEAE
7 gêneros, 13 espécies (5 endêmicas)

Aerobryopsis M.Fleisch.
1 espécie (não endêmica)
***Aerobryopsis capensis* (Müll.Hal.) M.Fleisch.**
Voucher: Visnadi, S.R. 504 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Cryptopapilaria Menzel
1 espécie (não endêmica)
***Cryptopapilaria penicillata* (Hedw.) Dozy & Molk.**
Voucher: Costa, D.P. 422 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Floribundaria M.Fleisch.
1 espécie (não endêmica)
***Floribundaria flaccida* (Mitt.) Broth.**
Voucher: Santos, N.D. 227 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Meteoriopsis M.Fleisch. *ex* Broth.
1 espécie (1 endêmica)
***Meteoriopsis auronitens* (Hornsch.) Broth.**
Voucher: Bandeira, M.C.V. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Meteorium (Brid.) Dozy & Molk.
7 espécies (4 endêmicas)
***Meteorium araucariophila* M.Fleisch.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10124 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Meteorium deppei* (Hornsch.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 244 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Meteorium flexicaule* Wilson**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10247 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Meteorium gerale* (Müll.Hal.) Broth.**
Voucher: Sehnem, A. 2581 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Meteorium medium* (Ångstr.) Broth.**
Voucher: Ule, E.H.G. 168 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Meteorium nigrescens* (Hedw.) Dozy & Molk.**
Voucher: Costa, D.P. 1157 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Meteorium squamidioides* Sehnem**
Voucher: Sehnem, A. 3244 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Toloxis W.R.Buck
1 espécie (não endêmica)
***Toloxis imponderosa* (Taylor) W.R. Buck**
Voucher: Costa, D.P. 999 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

Trachypus Reinw. & Hornsch.
1 espécie (não endêmica)
***Trachypus bicolor* Reinw. & Hornsch.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8923 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

MNIACEAE
4 gêneros, 11 espécies (nenhuma endêmica)

Mielichhoferia Nees & Hornsch.
1 espécie (não endêmica)
***Mielichhoferia megalocarpum* (Arn.) Mitt.**
Referência: Mitten, W. 1869. J. Linn. Soc., Bot. 12. 659.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Plagiomnium T.J.Kop.
1 espécie (não endêmica)
***Plagiomnium rhynchophorum* (Hook.) T.J.Kop.**
Voucher: Costa, D.P. 372 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Pohlia Hedw.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Pohlia camptotrachela* (Renauld & Cardot) Broth.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8327 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Pohlia elongata* Hedw.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11494 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Pohlia papillosa* (Müll.Hal. *ex* A.Jaeger) Broth.**
Voucher: Vital, D.M. 8087 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pohlia tenuifolia* (A.Jaeger) Broth.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8309 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Schizymenium Harv.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Schizymenium brevicaule* (Hornsch.) A.J. Shaw & S.P.Churchill**
Referência: Hornschuch, C.F. 1840. Fl. bras. 1(2): 1-712.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Schizymenium campylocarpum* (Arn. & Hook.) Shaw**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11495 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Schizymenium lindigii* (Hampe) A.J.Shaw**
Referência: Allen, B.H. 2002. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 90:1-699.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Schizymenium linearicaule* (Müll.Hal.) A.J.Shaw**
Referência: Müller, C.A. 1898. Bull. Herb. Boissier 6(1):18-48.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Schizymenium pusillum* (Hook.f. & Wilson) A.J.Shaw**
Referência: Churchill, S.P. & Linares, C.E.L. 1995. Prod. Bryol. Novo-Granatensis 12: 1-924.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

MYRINIACEAE
3 gêneros, 5 espécies (1 endêmica)

Austinia Müll. Hal.
1 espécie (não endêmica)
***Austinia tenuinervis* (Mitt.) Müll. Hal.**
Voucher: Yano, O. 4059 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal

Helicodontium (Mitt.) Jaeger
3 espécies (1 endêmica)
***Helicodontium capillare* (Hedw.) A.Jaeger**
Voucher: Costa, D.P. 1956 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Helicodontium clarazii* (Duby) Paris**
Voucher: Sehnem, A. 4535 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Helicodontium pervirens* (Müll.Hal.) Paris**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9318 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Myrinia Schimp.
1 espécie (não endêmica)
***Myrinia brasiliensis* (Hampe) Schimp.**
Voucher: Sehnem, A. 3206 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

NECKERACEAE
8 gêneros, 20 espécies (2 endêmicas)

Homalia Brid.
1 espécie (não endêmica)
***Homalia glabella* (Hedw.) Schimp.**
Voucher: Vilas Bôas-Bastos, S. 1872 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Homaliodendron M.Fleisch.
1 espécie (não endêmica)
***Homaliodendron piniforme* (Brid.) Enroth**
Voucher: Peralta, D.F. 2213 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Isodrepanium (Mitt.) Britton
1 espécie (não endêmica)
***Isodrepanium lentulum* (Wilson) E.Britton**
Voucher: Costa, D.P. 1175 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Neckera Hedw.
4 espécies (1 endêmica)
***Neckera caldensis* Lindb.**
Voucher: Costa, D.P. 998 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Neckera scabridens* Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 1082 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Neckera urnigera* Müll. Hal.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11826 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Neckera villae-ricae* Besch.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 627 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Neckeropsis Reichardt
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Neckeropsis disticha* (Hedw.) Kindb.**
Voucher: Costa, D.P. 1222 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Neckeropsis foveolata* (Mitt.) Broth.**
Voucher: Arnott, W.M. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neckeropsis undulata* (Hedw.) Reichardt**
Voucher: Costa, D.P. 893 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Pinnatella M.Fleisch.
1 espécie (não endêmica)
***Pinnatella minuta* (Mitt.) Broth.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10516 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

Porotrichum (Brid.) Hampe
8 espécies (1 endêmica)
***Porotrichum filiferum* Mitt.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10067 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Porotrichum korthalsianum* (Dozy & Molk.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 378 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Porotrichum lancifrons* (Hampe) Mitt.**
Voucher: Vital, D.M. 1938b (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Porotrichum leucocaulon* Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 80 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Porotrichum longirostre* (Hook.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 400 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Porotrichum mutabile* Hampe**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 659 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Porotrichum substriatum* (Hampe) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 645 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Porotrichum thieleanarum* (Müll.Hal.) Mitt.**
Voucher: Sehnem, A. 2772 (FH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Thamnobryum Nieuwl.
1 espécie (não endêmica)
***Thamnobryum fasciculatum* (Hedw.) I.Sastre**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10233 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

ORTHODONTIACEAE
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Orthodontium Schwägr.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Orthodontium gracile* (Wilson) Schwägr. *ex* B.S.G.**
Referência: Allen, B.H. 2002. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 90:1-699.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Orthodontium pellucens* (Hook.) B.S.G.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1008 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

ORTHOTRICHACEAE
8 gêneros, 52 espécies (12 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 4 variedades (1 endêmica)

Cardotiella Vitt
1 espécie (não endêmica)
***Cardotiella quinquefaria* (Hornsch.) Vitt**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10306b (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Groutiella Steere
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Groutiella apiculata* (Hook.) H.A.Crum & Steere**
Voucher: Costa, D.P. 1279 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Groutiella chimborazensis* (Spruce *ex* Mitt.) Florsch.**
Referência: Allen, B.H. 2002. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 90:1-699.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Groutiella obtusa* (Mitt.) Florsch.**
Referência: Allen, B.H. 2002. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 90:1-699.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Groutiella tomentosa* (Hornsch.) Wijk & Margad.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 2431 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Groutiella tumidula* (Mitt.) Vitt**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 2911 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Groutiella wagneriana* (Müll.Hal.) H.A.Crum & Steere**
Referência: Lisboa, R.C.L. 1993. Musgos Acrocárpicos do estado de Rondônia 272p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Macrocoma (Hornsch. *ex* Müll. Hal.) Grout
4 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Macrocoma brasiliensis* (Mitt.) Vitt**
Voucher: Sehnem, A. 279 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Macrocoma frigida* (Müll.Hal.) Vitt**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 1600 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Macrocoma orthotrichoides* (Raddi) Wijk & Margad.**
Voucher: Sehnem, A. 552 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Macrocoma tenuis* (Hook. & Grev.) Vitt**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Macrocoma tenuis* subsp. *sullivantii* (Müll.Hal.) Vitt**
Voucher: Sehnem, A. 7822 (PACA) Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Macromitrium Brid.
18 espécies (4 endêmicas)
***Macromitrium adnatum* Müll. Hal.**
Voucher: Sehnem, A. 12775 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL), Centro-Oeste (GO); Cerrado, Mata Atlântica
***Macromitrium argutum* Hampe**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 837 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Macromitrium carionis* Müll. Hal.**
Referência: Allen, B.H. 2002. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 90:1-699.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Macromitrium catharinense* Paris**
Voucher: Visnadi, S.R. 1550 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Macromitrium cirrosum* (Hedw.) Brid.**
Voucher: Vital, D.M. 6060 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Macromitrium contextum* Hampe**
Voucher: Sonoda, F. 47 (UFM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Macromitrium divortiarum* Sehnem**
Referência: Sehnem, A. 1978. Pesquisas, Bot. 32:1-170.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Macromitrium guatemalense* Müll. Hal.**
Voucher: Vitt, D.H. 21437 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Macromitrium longifolium* (Hook.) Brid.**
Voucher: Góes-Neto, A. s.n. (ALCB 18862)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Macromitrium microstomum* (Hook. & Grev.) Schwägr.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 3127 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Macromitrium nitidum* Hook. & Wilson**
Voucher: Sehnem, A. 5337 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Macromitrium pellucidum* Mitt.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 695 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Macromitrium podocarpi* Müll. Hal.**
Voucher: Pôrto, K.C. s.n. (UFP 9034)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Macromitrium proliferum* Mitt.**
Voucher: Burchell, W.J. 3959 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Macromitrium punctatum* (Hook. & Grev.) Brid.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 1581 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Macromitrium richardii* Schwägr.**
Voucher: Costa, D.P. 1268 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Macromitrium stellulatum* (Hornsch.) Brid.**
Voucher: Pôrto, K.C. s.n. (UFP 9037)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Macromitrium undatum* Müll. Hal.**
Voucher: Sehnem, A. 251 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

Orthotrichum Hedw.

3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Orthotrichum araucarieti* Müll. Hal.**
Voucher: Ule, E.H.G. 20 (FH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Orthotrichum diaphanum* Schrad. *ex* Brid.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Orthotrichum diaphanum* var. *podocarpi* (Müll.Hal.) Lewinsky**
Voucher: Vital, D.M. 9157 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Orthotrichum rupestre* Schleich. *ex* Schwägr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Orthotrichum rupestre* var. *papilosum* Lewinsky**
Referência: Lewinsky, J. 1993. Bryobrothera 2:1.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Schlotheimia Brid.

13 espécies (6 endêmicas)
***Schlotheimia appressifolia* Mitt.**
Voucher: Weir, J.C. 72 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Schlotheimia breviseta* Ångström**
Voucher: Sehnem, A. 7026 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Schlotheimia chamissonis* Hornsch.**
Voucher: Sehnem, A. 144 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Schlotheimia clavata* Geh. & Hampe**
Voucher: Sehnem, A. 5414 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Schlotheimia compacta* Müll. Hal.**
Voucher: Hatschbach, G. 17516 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Schlotheimia fuscoviridis* Hornsch.**
Voucher: Sehnem, A. 17 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Schlotheimia gracilescens* Broth.**
Voucher: Sehnem, A. 7111 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Schlotheimia jamesonii* (Arn.) Brid.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 2888 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Schlotheimia pseudoaffinis* Müll. Hal.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 563 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Schlotheimia rugifolia* (Hook.) Schwägr.**
Voucher: Costa, D.P. 514 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Schlotheimia tecta* Hook. f. & Wilson**
Voucher: Landrum, L.R. 2177 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Schlotheimia torquata* (Hedw.) Brid.**
Voucher: Costa, D.P. 526 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Schlotheimia trichomitria* Schwägr.**
Voucher: Vital, D.M. 8029 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Sehnemobryum Lewinsky-Haapasaari & Hedenas
1 espécie (não endêmica)
***Sehnemobryum paraguense* (Besch.) Lewinsky-Haapasaari & Hedenas**
Voucher: Sehnem, A. 2793 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Zygodon Hook. & Taylor
6 espécies (1 endêmica), 2 variedades (1 endêmica)
***Zygodon campylophyllus* Müll. Hal.**
Voucher: Sucre, D. 7297 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Zygodon obtusifolius* Hook.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9664a (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Zygodon patrum* Sehnem**
Voucher: Sehnem, A. 6994b (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Zygodon pungens* Müll. Hal.**
Referência: Allen, B.H. 2002. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 90:1-699.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES), Sul (SC); Mata Atlântica
***Zygodon reinwardtii* (Hornsch.) A.Braun**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Zygodon reinwardtii* var. *capillicaulis* (Müll.Hal.) Malta**
Voucher: Bandeira, M.C.V. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Zygodon reinwardtii* (Hornsch.) A.Braun var. *reinwardtii
Voucher: Bandeira, M.C.V. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Zygodon viridissimus* (Dicks.) Brid.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10145 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

PHYLLODREPANIACEAE
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Mniomalia Müll. Hal.
1 espécie (não endêmica)
***Mniomalia viridis* (Mitt.) Müll. Hal.**
Voucher: Lisboa, R.C.L. 3503 (MG) Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Phyllodrepanium Crosby
1 espécie (não endêmica)
***Phyllodrepanium falcifolium* (Schwägr.) Crosby**
Voucher: Mori, S.A. 17142 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

PHYLLOGONIACEAE
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Phyllogonium Brid.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Phyllogonium fulgens* (Hedw.) Brid.**
Voucher: Klotzsch, C. 2161 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Phyllogonium viride* Brid.**
Voucher: Costa, D.P. 472 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

PILOTRICHACEAE
11 gêneros, 51 espécies (2 endêmicas)

Brymela Crosby & B.H.Allen
2 espécies (1 endêmica)
***Brymela fluminensis* (Hampe) W.R.Buck**
Voucher: Occhioni, P. s.n. (RB 156664)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Brymela parkeriana* (Hook. & Grev.) W.R.Buck**
Voucher: Vital, D.M. 4286 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Callicostella (Müll.Hal.) Mitt.
8 espécies (1 endêmica)
***Callicostella apophysata* (Hampe) A.Jaeger**
Voucher: Santos, N.D. 333 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Callicostella ciliata* (Schimp.) A.Jaeger**
Voucher: Yano, O. 5164 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Callicostella depressa* (Hedw.) A.Jaeger**
Voucher: Costa, D.P. 2708 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Callicostella martiana* (Hornsch.) A.Jaeger**
Voucher: Costa, D.P. 1244 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Callicostella merkelii* (Hornsch.) A.Jaeger**
Voucher: Vital, D.M. 12669 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Callicostella microcarpa* Ångström**
Voucher: Vaz-Imbassahy, T.F. 87 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Callicostella pallida* (Hornsch.) Ångström**
Voucher: Costa, D.P. 1218 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Callicostella rufescens* (Mitt.) A.Jaeger**
Voucher: Costa, D.P. 1407 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Crossomitrium Müll. Hal.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Crossomitrium epiphyllum* (Mitt.) Müll. Hal.**
Voucher: Vital, D.M. 6550 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Crossomitrium patrisiae* (Brid.) Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 1417 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Crossomitrium saprophilum* Broth.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Cyclodictyon Mitt.

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Cyclodictyon albicans* (Hedw.) Kuntze**
Voucher: Costa, D.P. 447 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Cyclodictyon limbatum* (Hampe) Kuntze**
Voucher: Bandeira, M.C.V. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cyclodictyon marginatum* (Hook. & Wilson) Kuntze**
Voucher: Vaz-Imbassahy, T.F. 156 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Cyclodictyon olfersianum* (Hornsch.) Kuntze**
Voucher: Costa, D.P. 506 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cyclodictyon varians* (Sull.) Kuntze**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 234 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Helicoblepharum (Spruce *ex* Mitt.) Broth.

1 espécie (não endêmica)
***Helicoblepharum brasiliense* Herzog**
Voucher: Zikán, J.F. 232 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Hypnella (Müll.Hal.) Jaeger

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Hypnella pallescens* (Hook.) A.Jaeger**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5561)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Hypnella pilifera* (Hook. & Wilson) A.Jaeger**
Voucher: Sehnem, A. 4035 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hypnella punctata* Broth.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Lepidopilidium (Müll.Hal.) Broth.

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Lepidopilidium aureo-purpureum* (Geh. & Hampe) Broth.**
Voucher: Ule, E.H.G. 94 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Lepidopilidium brevisetum* (Hampe) Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 2002 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Lepidopilidium laevisetum* (Hampe) Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 586 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Lepidopilidium plebejum* (Müll.Hal.) Sehnem**
Voucher: Costa, D.P. 1115 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Lepidopilidium portoricense* (Müll.Hal.) H.A.Crum & Steere**
Voucher: Vaz-Imbassahy, T.F. 83 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Lepidopilum (Brid.) Brid.

12 espécies (nenhuma endêmica)
***Lepidopilum affine* Müll. Hal.**
Voucher: Vital, D.M. 15069 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Lepidopilum brevipes* Mitt.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8870 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Lepidopilum caudicaule* (Müll.Hal.) Broth.**
Voucher: Sehnem, A. 6993 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Lepidopilum cuspidans* Mitt.**
Referência: Yano, O. 1981. J. Hattori Bot. Lab. 50:279-456.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lepidopilum longifolium* Hampe**
Voucher: Fidalgo, O. 19 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lepidopilum muelleri* (Hampe) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 740 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Lepidopilum ovalifolium* (Duby) Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 455 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Lepidopilum polytrichoides* (Hedw.) Brid.**
Voucher: Windisch, P.G. 7803 p.p. (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Lepidopilum scabrisetum* (Schwägr.) Steere**
Voucher: Costa, D.P. 590 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Lepidopilum subsubulatum* Geh. & Hampe**
Voucher: Costa, D.P. 599 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Lepidopilum surinamense* Müll. Hal.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 2855 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA, AL), Sudeste (SP, RJ);
Amazônia, Mata Atlântica
***Lepidopilum tortifolium* Mitt.**
Voucher: Buck, W.R. 2506 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

Pilotrichum P.Beauv.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pilotrichum bipinnatum* (Schwägr.) Brid.**
Voucher: Vital, D.M. 2952 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, RJ);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Pilotrichum evanescens* (Müll.Hal.) Müll.Hal.**
Voucher: Germano, S.R. s.n. (UFP 3151a)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Amazônia, Mata Atlântica

Thamniopsis (Mitt.) M.Fleisch.
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Thamniopsis cruegeriana* (Müll.Hal.) W.R.Buck**
Voucher: s.col. s.n. (SP 284134)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Thamniopsis incurva* (Hornsch.) W.R. Buck**
Voucher: Costa, D.P. 784 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Mata Atlântica
***Thamniopsis langsdorffi* (Hook.) W.R. Buck**
Voucher: Costa, D.P. 860 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Thamniopsis pendula* (Hook.) M.Fleisch.**
Voucher: Raddi, G. s.n. (PI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Thamniopsis purpureophylla* (Müll.Hal.) W.R.Buck**
Voucher: Lützelburg, P. 6269 (JE)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Thamniopsis undata* (Hedw.) W.R.Buck**
Voucher: Costa, D.P. 790 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Cerrado, Mata Atlântica

Trachyxiphium W.R.Buck
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Trachyxiphium aduncum* (Mitt.) W.R.Buck**
Voucher: Costa, D.P. 318 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Trachyxiphium guadalupense* (Brid.) W.R.Buck**
Voucher: Costa, D.P. 309 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Trachyxiphium heteroicum* (Cardot) W.R.Buck**
Voucher: Costa, D.P. 859 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Trachyxiphium variable* (Mitt.) W.R.Buck**
Voucher: Costa, D.P. 739 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

PLAGIOTHECIACEAE
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Plagiothecium Bruch & Schimp.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Plagiothecium lucidum* (Hook.f. & Wilson) Paris**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11514 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Plagiothecium novogranatense* (Hampe) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 850 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

POLYTRICHACEAE
7 gêneros, 13 espécies (3 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

Atrichum P.Beauv.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Atrichum oerstedianum* (Müll.Hal.) Nyholm**
Voucher: Farias, H.C. s.n. (ICN 45164)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Atrichum polycarpum* (Müll.Hal.) Mitt.**
Voucher: Wasum, R. 4745 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

Itatiella G.L.Sm.
1 espécie (1 endêmica)
***Itatiella ulei* (Broth. *ex* Müll. Hal.) G.L.Sm.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 4168 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Notoligotrichum G.L.Sm.
1 espécie (não endêmica)
***Notoligotrichum minimum* (Cardot) G.L.Sm.**
Referência: Smith, G.L. 1971. Mem. New York Bot. Gard. 21(3):1-83.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Oligotrichum DC.
1 espécie (1 endêmica)
***Oligotrichum denudatum* G.L.Merr.**
Voucher: Vital, D.M. 11941 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

Pogonatum P.Beauv.
4 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Pogonatum campylocarpon* (Müll.Hal.) Mitt.**
Voucher: Martinelli, G. 2460 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Pogonatum pensilvanicum* (E.B.Bartram *ex* Hedw.) P.Beauv.**
Voucher: Costa, D.P. 189 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Pogonatum perichaetiale* (Mont.) A.Jaeger**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pogonatum perichaetiale* subsp. *oligodus* (Kunze *ex* Müll. Hal.) Hyvönen**
Voucher: Costa, D.P. 3788 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Pogonatum tortile* (Sw.) Brid.**
Voucher: Soares-Filho, H. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Polytrichadelphus (Müll.Hal.) Mitt.
1 espécie (não endêmica)
***Polytrichadelphus pseudopolytrichum* (Raddi) G.L.Sm.**
Voucher: Yano, O. 23875 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Polytrichum Hedw.
3 espécies (1 endêmica)
***Polytrichum angustifolium* Mitt.**
Voucher: Yano, O. 9220 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Polytrichum commune* L. *ex* Hedw.**
Voucher: Costa, D.P. 651 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Polytrichum juniperinum* Willd. *ex* Hedw.**
Voucher: Costa, D.P. 241 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

POTTIACEAE
32 gêneros, 61 espécies (11 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

Acaulon Müll. Hal.
1 espécie (1 endêmica)
***Acaulon uleanum* Müll. Hal.**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Anoectangium Schwägr.
1 espécie (não endêmica)
***Anoectangium aestivum* (Hedw.) Mitt.**
Voucher: Vital, D.M. & Buck, W.R. 12427 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Barbula Hedw.
4 espécies (1 endêmica)
***Barbula afrofontana* (Müll.Hal.) Broth.**
Voucher: Vital, D.M. 10841 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Barbula arcuata* Griff.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9867 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Barbula indica* (Hook.) Spreng.**
Voucher: Pôrto, K.C. s.n. (UFP 9080)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Barbula riograndensis* E.B.Bartram**
Voucher: Sehnem, A. 3980 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Chenia R.H.Zander
1 espécie (não endêmica)
***Chenia leptophylla* (Müll.Hal.) R.H.Zander**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 2818 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Didymodon Hedw.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Didymodon australasiae* (Hook. & Grev.) R.H.Zander**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 15183 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Didymodon rigidulus* Hedw.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10039 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

Dolotortula R.H.Zander
1 espécie (não endêmica)
***Dolotortula mnifolia* (Sull.) R.H.Zander**
Voucher: Vital, D.M. 11087 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica

Erythrophyllastrum R.H.Zander
1 espécie (não endêmica)
***Erythrophyllastrum andinum* (Sull.) R.H.Zander**
Voucher: Yano, O. 3983 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Eucladium Bruch & Schimp.
1 espécie (não endêmica)
***Eucladium verticillatum* (Hedw.) Bruch & Schimp.**
Voucher: Vital, D.M. 9071/Z (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Ganguleea R.H.Zander
1 espécie (não endêmica)
***Ganguleea angulosa* (Broth. & Dixon) R.H.Zander**
Voucher: Costa, D.P. 1250 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Gymnostomiella M.Fleisch.
1 espécie (não endêmica)
***Gymnostomiella vernicosa* (Harv.) M. Fleisch.**
Voucher: Vital, D.M. 5022 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Gymnostomum Nees & Hornsch.
1 espécie (não endêmica)
***Gymnostomum aeruginosum* Sm.**
Referência: Brotherus, V.F. 1924. Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 10(1):143-478.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Hymenostyliella E.B.Bartram
1 espécie (1 endêmica)
***Hymenostyliella alata* (Herzog) H.Rob.**
Voucher: Lützelburg, P. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica

Hymenostylilium Brid.
1 espécie (não endêmica)
***Hymenostylilium recurvirostrum* (Hedw.) Dixon**
Voucher: Costa, D.P. 4953 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

Hyophiladelphus (Müll.Hal.) R.H.Zander
1 espécie (não endêmica)
***Hyophiladelphus agrarius* (Hedw.) R.H.Zander**
Voucher: Vital, D.M. 6553 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Hyophilla Brid.
4 espécies (3 endêmicas)
***Hyophilla blanda* (Hook.f. & Wilson) A.Jaeger**
Voucher: Gardner, G. 6 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Hyophilla incurva* A.Jaeger**
Referência: Aongstroem, J. 1876. Öfvers. K. Vetensk. Akad. Förh. 33(4): 3-55.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Hyophilla involuta* (Hook.) A.Jaeger**
Voucher: Vital, D.M. 8143 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Hyophilla mattogrossensis* Broth.**
Voucher: Lindmann, C.A.M. 542 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Leptodontium (Müll.Hal.) Hampe *ex* Lindb.
9 espécies (1 endêmica), 2 variedades (1 endêmica)
***Leptodontium araucarieti* (Müll.Hal.) Paris**
Voucher: Costa, D.P. 855 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Leptodontium capituligerum* Müll. Hal.**
Voucher: Wasum, R. 4158 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Leptodontium filicola* Herzog**
Voucher: Wasum, R. s.n. (HUCS 4387)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Leptodontium flexifolium* (Dicks.) Hampe**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14659 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leptodontium luteum* (Taylor) Mitt.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11188 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Leptodontium pungens* (Mitt.) Kindb.**
Voucher: Sehnem, A. 286 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Leptodontium stellatifolium* (Hampe) Broth.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11497 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Leptodontium viticulosoides* (P.Beauv.) Wijk & Margad.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Leptodontium viticulosoides* var. *sulphureum* (Müll. Hal.) R.H.Zander**
Voucher: Sehnem, A. 5334 (FH)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
Leptodontium viticulosoides* (P.Beauv.) Wijk & Margad. var. *viticulosoides
Voucher: Vital, D.M. 19873 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Leptodontium wallisii* (Müll.Hal.) Kindb.**
Voucher: Costa, D.P. et al. 4972 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Luisierella Thér. & P. de la Varde
1 espécie (não endêmica)
***Luisierella barbula* (Schwägr.) Steere**
Voucher: Vital, D.M. 2307 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Microbryum Schimp.
1 espécie (não endêmica)
***Microbryum davallianum* (Sm.) R.H.Zander**
Voucher: Widgren, J.F. s.n. (S B10082)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Molendoa Lindb.
1 espécie (não endêmica)
***Molendoa sendtneriana* (Bruch & Schimp.) Limpr.**
Voucher: Vital, D.M. 9071b (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Plaubelia Brid.
1 espécie (não endêmica)
***Plaubelia sprengelii* (Schwägr.) R.H.Zander**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 1984 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pleurochaete Lindb.
1 espécie (não endêmica)
***Pleurochaete luteola* (Besch.) Thér.**
Voucher: Vital, D.M. 9201 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Pseudocrossidium R.S.Williams
1 espécie (não endêmica)
***Pseudocrossidium replicatum* (Taylor) R.H.Zander**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14928 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Pseudosymblepharis Broth.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pseudosymblepharis cavernarum* (Broth.) R.H.Zander**
Voucher: Puiggari, J.J. 2028 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Pseudosymblepharis schimperiana* (Paris) H.A.Crum**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 14939 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Streptocalypta Müll. Hal.
1 espécie (não endêmica)
***Streptocalypta lorentziana* Müll. Hal.**
Voucher: Sehnem, A. 3195 (HBR) Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Streptopogon Wilson *ex* Mitt.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Streptopogon calymperes* Müll. Hal.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11946 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Streptopogon cavifolius* Mitt.**
Voucher: Buck, W.R. 26937 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Syntrichia Brid.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Syntrichia amphidiacea* (Müll.Hal.) R.H.Zander**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10314a (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica, Pampa
***Syntrichia fragilis* (J.Taylor) Ochyra**
Voucher: Vital, D.M. 6455 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Syntrichia pagorum* (Milde) Amann**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10448 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Timmiella (De Not.) Limpr.
1 espécie (não endêmica)
***Timmiella barbuloides* (Brid.) Mönk.**
Referência: Hornschuch, C.F. 1840. Fl. bras. 1(2): 1-712.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Tortella (Lindb.) Limpr.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Tortella humilis* (Hedw.) Jenn.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 1626 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Tortella lilliputana* (Müll.Hal.) R.H.Zander**
Voucher: Ule, E.H.G. 8 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Tortella linearis* (Sw. *ex* F.Weber & D.Mohr) R.H.Zander**
Voucher: Vital, D.M. 6560 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Tortula Hedw.
1 espécie (não endêmica)
***Tortula muralis* Hedw.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10566 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Trichostomum Hedw.
5 espécies (3 endêmicas)
***Trichostomum arboreum* (Mitt.) R.H.Zander**
Voucher: Buck, W.R. 2519 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Trichostomum brachydontium* Bruch**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10097 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Trichostomum tenuirostre* (Hook. & Taylor) Lindb.**
Voucher: Vital, D.M. 8712 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Trichostomum termitarum* (Müll.Hal.) R.H.Zander**
Voucher: Vital, D.M. 2873 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (SE), Centro-Oeste (GO); Cerrado, Mata Atlântica
***Trichostomum weisioides* Müll. Hal.**
Voucher: Vital, D.M. 3013 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Weisiopsis Broth.
2 espécies (1 endêmica)
***Weisiopsis bahiensis* (Müll.Hal.) Broth.**
Voucher: Vital, D.M. 8217 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Weisiopsis nigeriana* (Egunyomi & Olar.) R.H.Zander**
Voucher: Vital, D.M. 3003 (SP) Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

Weissia Hedw.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Weissia breutelli* Müll. Hal.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10260 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (ES), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Weissia controversa* Hedw.**
Voucher: Vital, D.M. 8723 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Weissia glazioui* R.H.Zander**
Voucher: Bastos, C.J.P. 761 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Weissia jamaicensis* (Mitt.) Grout**
Voucher: Vital, D.M. 11487 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES), Sul (PR); Mata Atlântica

PRIONODONTACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Prionodon Müll. Hal.
1 espécie (não endêmica)
***Prionodon densus* (Hedw.) Müll.Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 758 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

PTERIGYNANDRACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Trachyphyllum A.Gepp
1 espécie (não endêmica)
***Trachyphyllum dusenii* (Müll.Hal. *ex* Broth.) Broth.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11328 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

PTEROBRYACEAE
8 gêneros, 15 espécies (1 endêmica)

Calyptothecium Mitt.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Calyptothecium acutifolium* (Brid.) Broth.**
Referência: Argent, G.C.G. 1973. J. Bryol. 7:563.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Calyptothecium duplicatum* (Schwägr.) Broth.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 1308 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Calyptothecium planifrons* (Renauld & Paris) Argent**
Voucher: Reese, W.D. 16751 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (AL), Sudeste, Sul; Amazônia

Henicodium (Müll.Hal.) Kindb.
1 espécie (não endêmica)
***Henicodium geniculatum* (Mitt.) W.R.Buck**
Voucher: Germano, S.R. s.n. (UFP 31549a)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Hildebrantiella Müll. Hal.
1 espécie (não endêmica)
***Hildebrantiella guyanensis* (Mont.) W.R.Buck**
Voucher: Oliveira, S.M. 302 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Jaegerina Müll. Hal.
1 espécie (não endêmica)
***Jaegerina scariosa* (Lorentz) Arzeni**
Voucher: Santiago, R.L. 57a (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Orthostichopsis Broth.
5 espécies (1 endêmica)
***Orthostichopsis praetemissa* W.R.Buck**
Voucher: Vital, D.M. 2945 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Orthostichopsis tenuis* (A.Jaeger) Broth.**
Voucher: Visnadi, S.R. 2031 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Orthostichopsis tetragona* (Hedw.) Broth.**
Voucher: Vital, D.M. 6018 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Orthostichopsis tijucae* (Müll.Hal.) Broth.**
Referência: Klein, R.M. 1979.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Orthostichopsis tortipilis* (Müll.Hal.) Broth.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10335 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Pireella Cardot
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pireella cymbifolia* (Sull.) Cardot**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 1431 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Pireella pohli* (Schwägr.) Cardot**
Voucher: Sehnem, A. 6693 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Pterobryon Hornsch.
1 espécie (não endêmica)
***Pterobryon densum* (Schwägr.) Hornsch.**
Voucher: Costa, D.P. 387 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Spiridentopsis Broth.
1 espécie (não endêmica)
***Spiridentopsis longissima* (Raddi) Broth.**
Voucher: Reitz, R. 1936 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

PTYCHOMITRIACEAE
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Ptychomitrium Fürnr.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Ptychomitrium sellowianum* (Müll.Hal.) A.Jaeger**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10214 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Ptychomitrium vaginatum* Besch.**
Voucher: Yano, O. 4047 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

PTYCHOMNIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Ptychomnion (Hook. & Wilson) Mitt.
1 espécie (não endêmica)
***Ptychomnion fruticetorum* Müll. Hal.**
Voucher: Reitz, R. 3492 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

RACOPILACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Racopilum P.Beauv.
1 espécie (não endêmica)
***Racopilum tomentosum* (Hedw.) Brid.**
Voucher: Costa, D.P. 787 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

RHABDOWEISIACEAE
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Oreoweisia (Bruch & Schimp.) De Not.
1 espécie (não endêmica)
***Oreoweisia brasiliensis* Hampe**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11190 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Rhabdoweisia Bruch & Schimp.
1 espécie (não endêmica)
***Rhabdoweisia fugax* (Hedw.) Bruch & Schimp.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 15043 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

RHACHITHECIACEAE
5 gêneros, 6 espécies (3 endêmicas)

Jonesiobryum Bizot & Pócs *ex* B.H.Allen & Pursell
2 espécies (2 endêmicas)
***Jonesiobryum cerradense* Vital *ex* B.H.Allen & Pursell**
Voucher: Vital, D.M. 8242 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Jonesiobryum termitarum* Vital *ex* B.H.Allen & Pursell**
Voucher: Vital, D.M. 8244 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Rhachithecium Broth.
1 espécie (não endêmica)
***Rhachithecium perpusillum* (Thwaites & Mitt.) Broth.**
Voucher: Yano, O. 6043 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tisserantiella P. de la Varde
1 espécie (não endêmica)
***Tisserantiella minutissima* (Mitt.) R.H.Zander**
Voucher: Câmara, P.E.A.S. 452 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Uleastrum W.R.Buck
1 espécie (não endêmica)
***Uleastrum palmicola* (Müll.Hal.) R.H.Zander**
Voucher: Yano, O. 6629 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Zanderia Goffinet
1 espécie (1 endêmica)
***Zanderia octoblepharis* (A.Jaeger) Goffinet**
Voucher: Vital, D.M. 2995 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

RHACOCARPACEAE
1 gênero, 2 espécies (1 endêmica), 3 variedades (3 endêmicas)

Rhacocarpus Lindb.
2 espécies (1 endêmica), 3 variedades (3 endêmicas)
***Rhacocarpus inermis* (Müll.Hal.) Lindb.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Rhacocarpus inermis* var. *cuspidatulus* (Müll.Hal.) J.-P.Frahm**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4537 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Rhacocarpus inermis* (Müll. Hal.) Lindb. var. *inermis
Voucher: Vital, D.M. 11613 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Rhacocarpus inermis* var. *piliformis* (Broth.) J.-P.Frahm**
Voucher: Wainio, E.A. s.n. (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Mata Atlântica
***Rhacocarpus purpurascens* (Brid.) Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 1012 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

RHIZOGONIACEAE
3 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Hymenodon Hook. & Wilson
1 espécie (não endêmica)
***Hymenodon aeruginosus* (Hook.f. & Wilson) Müll.Hal.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 636 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Pyrrhobryum Mitt.
1 espécie (não endêmica)
***Pyrrhobryum spiniforme* (Hedw.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 828 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Rhizogonium Brid.
1 espécie (não endêmica)
***Rhizogonium novae-hollandiae* (Brid.) Brid.**
Referência: Frahm, J.-P. et al. 2003. Trop. Bryol. 24: 129-137.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

RIGODIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Rigodium Kunze *ex* Schwägr.
1 espécie (não endêmica)
***Rigodium toxarion* (Schwägr.) Schimp.**
Voucher: Costa, D.P. 1068 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

RUTENBERGIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Pseudocryphaea E. Britton *ex* Broth.
1 espécie (não endêmica)
***Pseudocryphaea domingensis* (Spreng.) W.R.Buck**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 1967 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

SELIGERIACEAE
2 gêneros, 2 espécies (1 endêmica)

Blindia Bruch & Schimp.
1 espécie (não endêmica)
***Blindia magellanica* Schimp. *ex* Müll. Hal.**
Voucher: Vital, D.M. 19761 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Brachydontium Fürnr.
1 espécie (1 endêmica)
***Brachydontium notorogenes* W.R.Buck & Schaf.-Verw.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 12760 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

SEMATOPHYLLACEAE
14 gêneros, 51 espécies (15 endêmicas)

Acroporium Mitt.
6 espécies (2 endêmicas)
***Acroporium caespitosum* (Hedw.) W.R.Buck**
Referência: Yano, O. 1981. J. Hattori Bot. Lab. 50:279-456.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (MT, DF), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Acroporium catharinense* Sehnem**
Voucher: Costa, D.P. 1083 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Acroporium estrellae* (Müll.Hal.) W.R.Buck & Schäf.-Verw.**
Voucher: Costa, D.P. 1156 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Acroporium exiguum* (Broth.) W.R.Buck & Schäf.-Verw.**
Voucher: Visnadi, S.R. 1626 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Acroporium longirostre* (Brid.) W.R.Buck**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 105 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Acroporium pungens* (Hedw.) Broth.**
Voucher: Costa, D.P. 295 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Aptychella (Broth.) Herzog
1 espécie (não endêmica)
***Aptychella proligera* (Broth.) Herzog**
Voucher: Costa, D.P. 652 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Aptychopsis (Broth.) M.Fleisch.
3 espécies (2 endêmicas)
***Aptychopsis pungifolia* (Hampe) Broth.**
Voucher: Visnadi, S.R. 1365 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Aptychopsis pyrrophylla* (Müll.Hal.) Wijk & Margad.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11156 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Aptychopsis subpungifolia* (Broth.) Broth.**
Voucher: Valdevino, J.A. s.n. (UFP 8736)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG), Sul (SC); Mata Atlântica

Colobodontium Herzog
1 espécie (não endêmica)
***Colobodontium vulpinum* (Mont.) S.P.Churchill**
Voucher: Wasum, R. 2265 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Donnellia Austin
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Donnellia commutata* (Müll.Hal.) W.R.Buck**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 12874 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Donnellia lagenifera* (Müll.Hal.) W.R.Buck**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 13252 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Donnellia lageniformis* (Müll.Hal.) W.R.Buck**
Voucher: Visnadi, S.R. 1552 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Meiothecium Mitt.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Meiothecium boryanum* (Müll.Hal.) Mitt.**
Voucher: Lisboa, R.C.L. 7179 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Meiothecium revolubile* Mitt.**
Voucher: Belo, M.A.M. s.n. (UFP 8524)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Paranapiacabeae W.R.Buck & Vital
1 espécie (1 endêmica)
***Paranapiacabeae paulista* W.R.Buck & Vital**
Voucher: Vital, D.M. 20488 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Potamium Mitt.
1 espécie (não endêmica)
***Potamium lonchophyllum* (Mont.) Mitt.**
Voucher: Bastos, C.J.P. 1671 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Pterogonidium Müll. Hal.
1 espécie (não endêmica)
***Pterogonidium pulchellum* (Hook.) Müll.Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 1990 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Pylaisiadelpha Cardot
2 espécies (1 endêmica)
***Pylaisiadelpha brasiliensis* H.A.Crum**
Voucher: Vital, D.M. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Pylaisiadelpha tenuirostris* (Bruch & Schimp.) W.R.Buck**
Voucher: Yano, O. 9281 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS); Pantanal

Sematophyllum Mitt.
18 espécies (6 endêmicas)
***Sematophyllum adnatum* (Michx.) Brid.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 689 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Sematophyllum beyrichii* (Hornsch.) Broth.**
Voucher: Pôrto, K.C. s.n. (UFP 9165)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Sematophyllum cataractae* W.R.Buck**
Voucher: Ule, E.H.G. 92 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Sematophyllum cuspidiferum* Mitt.**
Voucher: Patrus, P. 10 (HPUC-MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Sematophyllum decumbens* Mitt.**
Voucher: Sehnem, A. 4910b (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Sematophyllum galipense* (Müll.Hal.) Mitt.**
Voucher: Valdevino, J.A. s.n. (UFP9173)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sematophyllum leucostomum* (Hampe) W.R.Buck**
Voucher: Schiffner, V. 623 (W)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sematophyllum lithophilum* (Hornsch.) Ångström**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8914 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sematophyllum macrorhynchum* (Hornsch.) Mitt.**
Referência: Sehnem, A. 1978. Pesquisas, Bot. 32:1-170.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Sematophyllum oedophysidium* W.R.Buck**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12316 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Sematophyllum pacimoniense* (Mitt.) J.Florsch.**
Voucher: Buck, W.R. 1881 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, AM); Amazônia
***Sematophyllum subfulvum* (Broth.) Broth.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8844 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sematophyllum subpinnatum* (Brid.) E.Britton**
Voucher: Costa, D.P. 1255 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Sematophyllum subsimplex* (Hedw.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 938 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Sematophyllum succedaneum* (Hook.f. & Wilson) Mitt.**
Voucher: Hatschbach, G. 24908 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Sematophyllum swartzii* (Schwägr.) W.H.Welch & H.A.Crum**
Voucher: Sousa, H.C. s.n. (SP 389532)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Sematophyllum tequendamense* (Hampe) Mitt.**
Voucher: Bastos, C.J.P. 1727 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Sematophyllum warmingii* (Hampe) W.R.Buck**
Voucher: Schiffner, V. 1839 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Taxithelium Spruce *ex* Mitt.
3 espécies (1 endêmica)
***Taxithelium juruense* (Broth.) Broth.**
Voucher: Mello, E. 2413 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Taxithelium planum* (Brid.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 1213 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Taxithelium pluripunctatum* (Renauld & Cardot) Broth.**
Voucher: Lisboa, R.C.L. 7165 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Trichosteleum Mitt.
8 espécies (2 endêmicas)
***Trichosteleum brachydictyon* (Besch.) A.Jaeger**
Voucher: Bastos, C.J.P. 325 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Trichosteleum cyparissoides* (Hornsch.) H. Rob.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9562 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Trichosteleum glaziovii* W.R.Buck**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7145 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Trichosteleum papillosum* (Hornsch.) A.Jaeger**
Voucher: Costa, D.P. 1130 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Trichosteleum sentosum* (Sull.) A.Jaeger**
Voucher: Costa, D.P. 1532 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Trichosteleum subdemissum* (Besch.) A.Jaeger**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 234 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Trichosteleum sublaevigatum* Herzog**
Voucher: Visnadi, S.R. 2266 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Trichosteleum vicentinum* (Mitt.) A.Jaeger**
Referência: Buck, W.R. 1998. Mem. New York Bot. Gard. 82:1-400.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Wijkia H.A.Crum

1 espécie (não endêmica)
***Wijkia flagellifera* (Broth.) H.A.Crum**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10085 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

SPHAGNACEAE

1 gênero, 93 espécies (65 endêmicas), 7 variedades (6 endêmicas)

Sphagnum L.

93 espécies (65 endêmicas), 7 variedades (6 endêmicas)
***Sphagnum aciphyllum* Müll. Hal.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica, Pampa
***Sphagnum acutirameum* H.A.Crum**
Voucher: Vital, D.M. 19692 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sphagnum aequalipunctatum* H.A.Crum**
Voucher: Griffin III, D. 118 (FLAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Sphagnum alegrense* Warnst.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 3920 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sphagnum amazonicum* H.A.Crum & W.R.Buck**
Voucher: Buck, W.R. 2501 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sphagnum amoenoides* H.A.Crum**
Voucher: Buck, W.R. 26422 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Sphagnum amoenum* Warnst.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1892 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sphagnum atroligneum* H.A.Crum**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 15214 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Sphagnum billbuckii* H.A.Crum**
Voucher: Buck, W.R. 26642 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sphagnum bocainense* H.A.Crum**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9588 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Sphagnum brachybolax* Müll. Hal. *ex* Warnst.**
Voucher: Puiggari, J.J. 1140a (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Sphagnum brasiliense* Warnst.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1299 (CHR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sphagnum brevirameum* Hampe**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4548 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
***Sphagnum buckianum* H.A.Crum**
Voucher: Vital, D.M. 20513 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Sphagnum capillifolium* (Ehrh.) Hedw.**
Voucher: Vital, D.M. 1237 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
***Sphagnum carneum* Müll. Hal. & Warnst.**
Voucher: Costa, D.P. 3797 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sphagnum chi-chiense* H.A.Crum**
Voucher: Harley, R.M. 26644 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Sphagnum columniforme* H.A.Crum**
Voucher: Boom, B.M. 715 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Sphagnum contortulum* H.A.Crum**
Voucher: Vital, D.M. 8080 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Sphagnum costae* H.A.Crum & D.P.Costa**
Distribuição: nativa; endêmica
***Sphagnum costae* var. *confertorameum* H.A.Crum & D.P.Costa**
Voucher: Costa, D.P. 301 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Sphagnum costae* H.A.Crum & D.P.Costa var. *costae
Voucher: Costa, D.P. 290 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sphagnum costae* var. *seriatum* H.A.Crum & D.P.Costa**
Voucher: Costa, D.P. 601 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sphagnum cribriforme* H.A.Crum**
Voucher: Ule, E.H.G. 1528 (CHR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Sphagnum crumii* Schäf.-Verw.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 15129 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Sphagnum curicuriariense* H.A.Crum & W.R.Buck**
Voucher: Prance, G.T. 21579 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Sphagnum cuspidatum* Ehrh. *ex* Hoffm.**
Voucher: Yano, O. 7632 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Sphagnum cyclophyllum* Sull. & Lesq.**
Voucher: Yano, O. 3831 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Sphagnum delamboyense* Schäf.-Verw.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11319 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Sphagnum dimorphophyllum* H.A.Crum & W.R.Buck**
Voucher: Buck, W.R. 2561 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sphagnum divisum* H.A.Crum**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 11441 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Sphagnum exile* H.A.Crum**
Voucher: Frahm, J.P. 1865 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sphagnum exquisitum* H.A.Crum**
Voucher: Kubitzki, K. 84-8 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG,
SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
***Sphagnum frahmii* H.A.Crum**
Voucher: Frahm, J.P. 1866 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Sphagnum garysmithii* H.A.Crum**
Voucher: Irwin, H.S. 33181 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Sphagnum geraisense* H.A.Crum**
Voucher: Vital, D.M. 11971 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sphagnum globicephalum* Müll. Hal. *ex* Warnst.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 10460 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Sphagnum gracilescens* Müll. Hal.**
Distribuição: nativa; endêmica
Sphagnum gracilescens* Müll. Hal. var. *gracilescens
Voucher: Buck, W.R. 26417 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Sphagnum gracilescens* var. *submolluscum* (Hampe) Warnst.**
Referência: Crum, H.A. 1990.
Contr. Univ. Michigan Herb. 17: 93.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica
***Sphagnum guanabarae* H.A.Crum**
Voucher: Sucre, D. 3249 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Sphagnum harleyi* H.A.Crum**
Voucher: Irwin, H.S. 30752 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Sphagnum homophyllum* H.A.Crum**
Voucher: Vitt, D.H. 21020 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC);
Mata Atlântica
***Sphagnum imbricatum* Hornsch.**
Voucher: Yano, O. 5201a (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sphagnum irwinii* H.A.Crum**
Voucher: Irwin, H.S. 32684 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Sphagnum itatiaiae* Müll. Hal. & Warnst.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1742 (CHR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sphagnum laxiramosum* H.A.Crum**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8591 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Sphagnum laxulum* H.A.Crum**
Voucher: Frahm, J.P. 1865 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sphagnum leoni* H.A.Crum**
Voucher: Leoni, L.S. 2170 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sphagnum lindbergii* Schimp.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1736 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Sphagnum longicomosum* Müll. Hal. *ex* Warnst.**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sphagnum longistolo* Müll. Hal.**
Voucher: Vital, D.M. 7547 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Sphagnum luetzelburgii* H.K.G.Paul *ex* H.A.Crum**
Voucher: Costa, D.P. 355 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sphagnum magellanicum* Brid.**
Voucher: Yano, O. 523 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sphagnum matogrossense* H.A.Crum**
Voucher: Hoehne, F.C. 2147 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Sphagnum meridense* (Hampe) Müll.Hal.**
Voucher: Ule, E.H.G. 327 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Sphagnum microcuspidatum* H.A.Crum**
Voucher: Sehnem, A. 6816 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Sphagnum mirabile* Müll. Hal. & Warnst.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1287 (CHR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sphagnum molle* Sull.**
Voucher: Hoehne, F.C. 133a (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Sphagnum mosenii* Warnst.**
Voucher: Mosén, C.W.H. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Sphagnum multiporosum* H.A.Crum**
Voucher: Sehnem, A. 6818 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Sphagnum negrense* Mitt.**
Voucher: Spruce, R. 1507 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sphagnum obliquefibrosum* H.A.Crum**
Voucher: Vitt, D.H. 21148 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Sphagnum ornatum* H.A.Crum**
Voucher: Boom, B.M. 1167 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia
***Sphagnum oxyphyllum* Warnst.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 13031 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Sphagnum palustre* L.**
Voucher: Landrum, L.R. 2144 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Sphagnum papillosum* Lindb.**
Voucher: Vital, D.M. 10802 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Sphagnum paranense* H.A.Crum**
Voucher: Griffin III, D. 114 (FLAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica
***Sphagnum parcoramosum* H.A.Crum**
Voucher: Sehnem, A. 15690 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Sphagnum pendulirameum* H.A.Crum**
Voucher: Sucre, D. 4639 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica
***Sphagnum perforatum* Warnst.**
Voucher: Costa, D.P. et al. 5017 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Sphagnum perichaetiale* Hampe**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sphagnum perichaetiale* Hampe var. *perichaetiale
Voucher: Buck, W.R. 26444 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Sphagnum perichaetiale* var. *ramulosum* Hampe**
Referência: Yano, O. 1984. J. Hattori Bot. Lab. 50:279-456.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Sphagnum platyphylloides* Warnst.**
Voucher: Costa, D.P. 238 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Sphagnum pluriporosum* H.A.Crum**
Voucher: Vital, D.M. 7578 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG), Sul (SC); Mata Atlântica
***Sphagnum pseudoramulinum* H.A.Crum**
Voucher: Sucre, D. 4673 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Sphagnum pulvinatum* H.A.Crum**
Voucher: Steyermark, J.A. 103911 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Sphagnum ramulinum* Warnst.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1304 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica
***Sphagnum recurvum* P.Beauv.**
Voucher: Vital, D.M. 3610 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Sphagnum ripense* H.A.Crum & W.R.Buck**
Voucher: Buck, W.R. 2544 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sphagnum rotundatum* Müll. Hal. & Warnst.**
Voucher: Yano, O. 7659 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Sphagnum sanguinale* Warnst.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 9589 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Sphagnum scorpioides* (Hampe) H.A.Crum**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7042 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sphagnum sehnemii* H.A.Crum**
Voucher: Sehnem, A. 15965 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Sphagnum septatoporosum* H.A.Crum**
Voucher: Vital, D.M. 7641 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica
***Sphagnum sparsum* Hampe**
Voucher: Vital, D.M. 1058 p.p. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Sphagnum strictum* Sull.**
Voucher: Landrum, L.R. 2174 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica
***Sphagnum subhomophyllum* H.A.Crum**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8323 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sphagnum submedium* Warnst.**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 8519 (SV)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica
***Sphagnum subsecundoides* H.A.Crum & W.R.Buck**
Voucher: Buck, W.R. 2413 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Sphagnum subsecundum* Nees**
Voucher: Vital, D.M. 7531 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sphagnum sucrei* H.A.Crum**
Voucher: Costa, D.P. 643 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sphagnum tabuleirense* O.Yano & H.A.Crum**
Voucher: Xavier-Filho, L. s.n. (SP 231902)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA);
Mata Atlântica

***Sphagnum tenellum* Ehrh. *ex* Hoffm.**
Voucher: Maguire, B. 60468 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sphagnum tenerum* Sull. & Lesq.**
Voucher: Schiffner, V. 297 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Sphagnum triporosum* H.A.Crum**
Voucher: Frahm, J.P. 1834 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Sphagnum turgens* Warnst.**
Voucher: Mosén s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Sphagnum umbrosum* Warnst.**
Voucher: Mosén s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Sphagnum vitalii* H.A.Crum**
Voucher: Vital, D.M. 8081 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

SPLACHNACEAE
3 gêneros, 5 espécies (3 endêmicas)

Moseniella
2 espécies (2 endêmicas)
***Moseniella brasiliensis* Broth.**
Referência: Koponen, A. 1982. Ann. Bot. Fenn. 14:1-93.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Moseniella ulei* (Müll.Hal. *ex* Broth.) A.K.Kop.**
Referência: Koponen, A. 1977. Ann. Bot. Fenn. 14: 193.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Tayloria Hook.
1 espécie (não endêmica)
***Tayloria arenaria* (Müll.Hal.) Broth.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1398 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Tetraplodon Bruch & Schimp.
2 espécies (1 endêmica)
***Tetraplodon itatiaiae* Müll. Hal.**
Voucher: Sehnem, A. 4749 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Tetraplodon tomentosus* Sehnem**
Voucher: Sehnem, A. 5292 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

SPLACHNOBRYACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Splachnobryum Müll. Hal.
1 espécie (não endêmica)
***Splachnobryum obtusum* (Brid.) Müll. Hal.**
Voucher: Vital, D.M. 15020 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (CE, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

STEREOPHYLLACEAE
4 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica)

Entodontopsis Broth.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Entodontopsis angustiretis* (Broth.) W.R.Buck & Ireland**
Referência: Ireland, R.R. & Buck, W.R. 1994. Fl. Neotrop. Monogr. 65: 1-49.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Entodontopsis leucostega* (Brid.) W.R.Buck & Ireland**
Voucher: Valdevino, J.A. s.n. (UFP 9111)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Entodontopsis nitens* (Mitt.) W.R.Buck & Ireland**
Voucher: Vital, D.M. 6228 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Entodontopsis panamensis* (E.B.Bartram) W.R.Buck & Ireland**
Voucher: Lützelburg, P. 4202 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Eulacophyllum W.R.Buck & Ireland
1 espécie (não endêmica)
***Eulacophyllum cultelliforme* (Sull.) W.R.Buck & Ireland**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 357 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Pilosium (Müll.Hal.) M.Fleisch.
1 espécie (não endêmica)
***Pilosium chlorophyllum* (Hornsch.) Müll. Hal.**
Voucher: Costa, D.P. 814 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Stereophyllum Mitt.
1 espécie (não endêmica)
***Stereophyllum radiculosum* (Hook.) Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 2196 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

SYMPHYODONTACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Symphyodon Dozy & Molk.
1 espécie (não endêmica)
***Symphyodon imbricatifolius* (Mitt.) S.P.Churchill**
Voucher: Schäfer-Verwimp, A. 12790 (SV)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

THUIDIACEAE

3 gêneros, 18 espécies (5 endêmicas)

Pelekium Mitt.

6 espécies (1 endêmica)

***Pelekium involvens* (Hedw.) Touw**
Voucher: Costa, D.P. 453 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Pelekium minutulum* (Hedw.) Touw**
Voucher: Costa, D.P. 85 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Pelekium muricatulum* (Hampe) Touw**
Voucher: Burchell, W.J. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Pelekium scabrosulum* (Mitt.) Touw**
Voucher: Lisboa, R.C.L. 7203 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Pelekium schistocalyx* (Müll.Hal.) Touw**
Voucher: Landrum, L.R. 2185 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Pelekium subpinnatum* (Broth.) Touw**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11743 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Thuidiopsis (Broth.) M.Fleisch.

1 espécie (não endêmica)

***Thuidiopsis furfurosa* (Hook.f. & Wilson) M.Fleisch.**
Voucher: Sehnem, A. 3717 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Thuidium Bruch & Schimp.

11 espécies (4 endêmicas)

***Thuidium brasiliense* Mitt.**
Voucher: Costa, D.P. 1454 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Thuidium delicatulum* (Hedw.) Bruch & Schimp.**
Voucher: Costa, D.P. 735 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Thuidium granulatum* (Hampe) A.Jaeger**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9078 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Thuidium mattogrossense* Broth.**
Referência: Gier, L.J. 1980. J. Bryol. 11: 253-309.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Thuidium patrum* Sehnem**
Voucher: Sehnem, A. 6999 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Thuidium peruvianum* Mitt.**
Referência: Gier, L.J. 1980. J. Bryol. 11: 253-309.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Thuidium pseudoprotensum* (Müll.Hal.) Mitt.**
Voucher: Sehnem, A. 2990 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thuidium serricola* (Müll.Hal.) Paris**
Referência: Gier, L.J. 1980. J. Bryol. 11: 253-309.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Thuidium tamariscinum* (Hedw.) Schimp.**
Voucher: Sehnem, A. 6422 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Thuidium tomentosum* Schimp. *ex* Besch.**
Voucher: Oliveira-e-Silva, M.I.M.N. 11 (HRJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Thuidium urceolatum* Lorentz**
Voucher: Costa, D.P. et al. 143 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
Referência: Gier, L.J. 1980. J. Bryol. 11: 253-309.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

SAMAMBAIAS E LICÓFITAS

Coodenadores: Jefferson Prado & Lana da Silva Sylvestre
121 gêneros, 1.176 espécies (450 endêmicas),
11 subespécies (4 endêmicas), 43 variedades (8 endêmicas)

ANEMIACEAE

Iva Carneiro Leão Barros, Augusto César Pessôa Santiago, Ana Flora de Novaes Pereira
1 gênero, 69 espécies (40 endêmicas),
6 variedades (1 endêmica)

Anemia Sw.

69 espécies (40 endêmicas),
6 variedades (1 endêmica)

***Anemia alfredi-rohrii* Brade**
Voucher: Brade, A.C. s.n. (MBM 18452)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sul (SC); Mata Atlântica

***Anemia antrorsa* Mickel**
Referência: Mickel, J.T. 1985. Amer. Fern J. 75(2):33-37.
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Norte (AM); Amazônia

***Anemia aspera* (Fée) Baker**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 8205 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Anemia barbatula* Christ**
Voucher: Hatschbach, G. 36154 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste
(MT, GO); Cerrado

***Anemia blackii* Brade**
Referência: Brade, A.C. 1965. Arch.
Jard. Bot. Rio de Janeiro 18:25.
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (AC); Amazônia

***Anemia blechnoides* J.Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 19833 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Anemia buniifolia* (Gardner) T.Moore**
Voucher: Heringer, E.P. 10953 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Anemia candidoi* Brade**
Referência: Brade, A.C. 1951. Arch.
Jard. Bot. Rio de Janeiro 11:34.
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Anemia cipoensis* Sehnem**
Voucher: Hatschbach, G. 29887 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado

***Anemia clinata* Mickel**
Referência: Tryon, R.M. & Stolze, R.G. 1989. Fieldiana, Bot. 20: 1-145.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Anemia collina* Raddi**
Voucher: Brade, A.C. 12828 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Anemia costata* Sehnem**
Voucher: Irwin, H.S. 24871 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Anemia damazii* Christ**
Referência: Christ, H. 1907. Bull. Herb. Boissier 7: 792.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
***Anemia dardanoi* Brade**
Voucher: Noblick, L.R. 4289 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Anemia dentata* Gardner *ex* Field & Gardner**
Voucher: Queiroz, L.P. 5796 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Anemia diversifolia* Schrad.**
Referência: Schrader, H.A. 1824. Gött. Gel. Anz. 864.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Anemia duartei* Brade**
Voucher: Duarte, A.P. 9166 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anemia elaphoglossoides* Mickel**
Voucher: Irwin, H.S. 34664 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Anemia elegans* (Gardner) C.Presl**
Voucher: Krieger, L. 20355 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Anemia espiritosantensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 18480 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anemia ferruginea* Humb. & Bonpl. *ex* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Anemia ferruginea* var. *ahenobarba* (Christ) Mickel**
Voucher: Duarte, L. 614 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
Anemia ferruginea* Humb. & Bonpl. *ex* Kunth var. *ferruginea
Voucher: Andrade-Lima, D. 4094 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Anemia flexuosa* Sw.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 590 (IPA 1792)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Anemia gardneri* Hook.**
Voucher: Gardner, G. 4 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Anemia glareosa* Gardner**
Voucher: Irwin, H.S. 9914 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Anemia gomesii* Christ**
Voucher: Salino, A. 3188 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Anemia hatschbachii* Sehnem**
Voucher: Hatschbach, G. 23767 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Anemia heterodoxa* Christ**
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (MOBOT 3274405)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Anemia hirsuta* (L.) Sw.**
Voucher: Pontual, I.B. 1269 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Anemia hirta* (L.) Sw.**
Voucher: Pickel, B.J. 35 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Anemia imbricata* J.W.Sturm**
Voucher: Brade, A.C. 13943 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Anemia incisa* Schrad.**
Referência: Sturm, J.G. 1859. Fl. bras. 1(2): 142-304.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Anemia lanuginosa* Bong. *ex* J.W.Sturm**
Voucher: Brade, A.C. 13953 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Anemia laxa* Lindm.**
Voucher: Irwin, H.S. 25412a (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Anemia luetzelburgii* Rosenst.**
Voucher: Salino, A. 5140 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Anemia mandioccana* Raddi**
Voucher: Prado, J. 1980 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Anemia marginata* Mickel**
Voucher: Gates, B. 206 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Anemia millefolia* (Gardner) C.Presl**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4589 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Anemia mirabilis* Brade**
Voucher: Sarmento, A.C. 364 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Anemia nana* Baker**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20160 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anemia nervosa* Pohl**
Voucher: Paula, E.J. 140 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Anemia oblongifolia* (Cav.) Sw.**
Voucher: Damazio, L.B. 53 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Anemia organensis* Rosenst.**
Voucher: Labiak, P.H. 4176 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Anemia pallida* Gardner**
Voucher: Mota, R. 195 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
A***nemia palmarum* Lindm.**
Voucher: Irwin, H.S. 24260 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Anemia pastinacaria* Moritz *ex* Prantl**
Voucher: Pickel, B.J. 3050 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PB, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Anemia phyllitidis* (L.) Sw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Anemia phyllitidis* (L.) Sw. var. *phyllitidis
Voucher: Arbo, M.M. 9261 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Anemia phyllitidis* var. *tweedieana* (Hook.) Hassl.**
Voucher: Irwin, H.S. 10181 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Anemia pinnata* Sehnem**
Voucher: Irwin, H.S. 24034 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Anemia pohliana* J.W.Sturm**
Voucher: Hatschbach, G. 36181 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Anemia pyrenaea* Taub.**
Voucher: Ule, E.H.G. 3226 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Anemia raddiana* Link**
Voucher: Martinelli, G. 183 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Anemia repens* Raddi**
Voucher: Jardim, J.G. 3348 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado
***Anemia retroflexa* Brade**
Voucher: Labiak, P.H. 4139 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Anemia rigida* Sehnem**
Voucher: Hatschbach, G. 36275 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado
***Anemia rotundifolia* Schrad.**
Voucher: Wacket, M. 142 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anemia rutifolia* Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 19518 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul; Cerrado
***Anemia schaeferi* Sehnem**
Voucher: Hatschbach, G. 35992 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Anemia simplicior* (Christ) Mickel**
Voucher: Jürgens, C. 28 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Anemia smithii* Brade**
Voucher: Anderson, W.R. 12442 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Anemia spicantoides* Mabb.**
Voucher: Labiak, P.H. 4976 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anemia tenella* (Cav.) Sw.**
Voucher: Heringer, E.P. 10904 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Anemia tenera* Pohl**
Voucher: Edwall, G. 4749 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Anemia tomentosa* (Sav.) Sw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Anemia tomentosa* var. *anthriscifolia* (Schrad.) Mickel**
Voucher: Pickel, B.J. 2964 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
Anemia tomentosa* (Sav.) Sw. var. *tomentosa
Voucher: Silva, M.A. s.n. (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Anemia trichorhiza* Gardner**
Voucher: Irwin, H.S. 14097 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Anemia tripinnata* Copel.**
Voucher: Mexia, Y. 5627 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
***Anemia ulbrichtii* Rosenst.**
Voucher: Ulbricht, H.A. 30 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anemia ulei* Christ**
Voucher: King, R.M. 8855 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Anemia villosa* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Pontual, I.B. 329 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Anemia warmingii* Prantl**
Voucher: Reitz, R. 297 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Anemia wettsteinii* Christ**
Voucher: Irwin, H.S. 18927 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado

ASPLENIACEAE

Lana da Silva Sylvestre
1 gênero, 77 espécies (22 endêmicas)

Asplenium L.

77 espécies (22 endêmicas)
***Asplenium abscissum* Willd.**
Voucher: Brade, A.C. 19900 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium alatum* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Brade, A.C. 15962 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium angustum* Sw.**
Voucher: Prance, G.T. 8552 (INPA, K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte
(AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Asplenium auriculatum* Sw.**
Voucher: Sylvestre, L.S. 394 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),
Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES,
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Asplenium auritum* Sw.**
Voucher: Campos-Porto, P. 1584 (HB, HPNI, PACA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP,
PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium austrobrasiliense* (Christ) Maxon**
Voucher: Brade, A.C. 8569 (HB, NY, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Asplenium badinii* Sylvestre & P.G.Windisch**
Voucher: Lisbôa, M.A. s.n. (OUPR 4138)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Asplenium balansae* (Baker) Sylvestre**
Voucher: Windisch, P.G. 4255 (RBR, SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium beckeri* Brade**
Voucher: Becker, J. 26 (HB, R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Asplenium bradeanum* Handro**
Voucher: Toledo Jr., F.T. 171b (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Asplenium bradei* Rosenst.**
Voucher: Brade, A.C. 7684 (B, MBM, NY, PACA, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Asplenium brasiliense* Sw.**
Voucher: Hatschbach, G. 33747 (HB, MBM, MO,
PACA, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium campos-portoi* Brade**
Voucher: Hatschbach, G. 2527 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Asplenium cariocanum* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 18759 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Asplenium castaneum* Schltdl. & Cham.**
Voucher: Brade, A.C. 15500 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Asplenium cirrhatum* Rich. *ex* Willd.**
Voucher: Brade, A.C. 16598 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte
(RR, AM, AC, RO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Asplenium claussenii* Hieron.**
Voucher: Sylvestre, L.S. 265 (RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste
(CE, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium cristatum* Lam.**
Voucher: Salino, A. 2817 (BHCB, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES,
SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium cruegeri* Hieron.**
Voucher: Strudwick, J.J. 3130 (MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Asplenium cuneatum* Lam.**
Voucher: Prance, G.T. 16079 (MG, NY, P, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte
(RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Asplenium delitescens* (Maxon) L.D.Gómez**
Voucher: Daly, D.C. 7337 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Asplenium depauperatum* Fée**
Voucher: Chase, A. 11137 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium dimidiatum* Sw.**
Voucher: Macedo, A. 1853 (MBM, RB, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium dissectum* Sw.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8524 (B, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Asplenium douglasii* Hook. & Grev.**
Voucher: Barroso, G.M. 26 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Asplenium escaleroense* Christ**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 215 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Asplenium feei* Kunze *ex* Fée**
Voucher: Sylvestre, L.S. 525 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Asplenium flabellulatum* Kunze**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 1629 (MBM, RBR, SJRP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium formosum* Willd.**
Voucher: Salino, A. 3034 (BHCB, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium gastonis* Fée**
Voucher: Hatschbach, G. 22702 (MBM, NY, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium geraense* (C.Chr.) Sylvestre**
Voucher: Souza, V.C. 731 (RBR, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Asplenium hallii* Hook.**
Voucher: Prance, G.T. 2850 (NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Asplenium harpeodes* Kunze**
Voucher: Windisch, P.G. 5906 (RBR, SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium hostmannii* Hieron.**
Voucher: Irwin, H.S. 48714 (B, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Asplenium inaequilaterale* Willd.**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 4400 (RBR, UFPE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium incurvatum* Fée**
Voucher: Sylvestre, L.S. 1289 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium juglandifolium* Lam.**
Voucher: Prance, G.T. 2786 (NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Asplenium kunzeanum* Klotzsch *ex* Rosenst.**
Voucher: Brade, A.C. 6457 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium lacinulatum* Schrad.**
Voucher: Santos, T.S. 1150 (CEPEC, RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Asplenium laetum* Sw.**
Voucher: Brade, A.C. 19905 (HB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium martianum* C.Chr.**
Voucher: Hatschbach, G. 22233 (MBM, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium monanthes* L.**
Voucher: Sylvestre, L.S. 229 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium mourai* Hieron.**
Voucher: Pita, P.B. 280 (CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Asplenium mucronatum* C.Presl**
Voucher: Sylvestre, L.S. 1381 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium muellerianum* Rosenst.**
Voucher: Hatschbach, G. 16376 (MBM, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Asplenium oligophyllum* Kaulf.**
Voucher: Campos-Porto, P. 2585 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium ortegae* N.Murak. & R.C.Moran**
Voucher: Lima, H.C. 2078 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Asplenium otites* Link**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 4512 (RBR, UFPE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium pearcei* Baker**
Voucher: Maas, P.J.M. 13295 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Asplenium pedicularifolium* A.St.-Hil.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 10577 (P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Asplenium poloense* Rosenst.**
Voucher: Anderson, W.R. 12232 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Asplenium praemorsum* Sw.**
Voucher: Salino, A. 3110 (BHCB, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium pseudonitidum* Raddi**
Voucher: Brade, A.C. 9261 (HB, NY, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium pteropus* Kaulf.**
Voucher: Brade, A.C. 18846 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Asplenium pulchellum* Raddi**
Voucher: Hoehne, F.C. 2614 (CESJ, IPA, MBM, NY, RB, RBR, SJRP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Asplenium pumilum* Sw.**
Voucher: Noblick, L.R. 4287 (CEPEC, HUEFS, K, SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium raddianum* Gaudich.**
Voucher: Brade, A.C. 14520 (RB, VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Asplenium radicans* L.**
Voucher: Badini, J. 248 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium regulare* Sw.**
Voucher: Salino, A. 1829 (BHCB, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Asplenium resiliens* Kunze**
Voucher: Anderson, W.R. 12440 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium rutaceum* (Willd.) Mett.**
Voucher: Granville, J.J. 12463 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Asplenium salicifolium* L.**
Voucher: Brade, A.C. 15352 (HB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium scandicinum* Kaulf.**
Voucher: Sylvestre, L.S. 1057 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium schwackei* Christ**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 14231 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Asplenium sellowianum* (Hieron.) Hieron.**
Voucher: Jürgens, C. 306 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium serra* Langsd. & Fisch.**
Voucher: Brade, A.C. 15284 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Asplenium serratum* L.**
Voucher: Prance, G.T. 9371 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Asplenium squamosum* L.**
Voucher: Reitz, R. 4540 (B, BM, HB, HBR, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);
Mata Atlântica
***Asplenium stuebelianum* Hieron.**
Voucher: Salino, A. 330 (BHCB, MBM, UEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Asplenium theciferum* (Kunth) Mett.**
Voucher: Andrade-Lima, A. 98-68 (IPA, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Asplenium trindadense* (Brade) Sylvestre**
Voucher: Becker, J. 806 (HB, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica
***Asplenium triquetrum* N.Murak. & R.C.Moran**
Voucher: Reitz, R. 236 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium truncorum* F.B.Matos et al.**
Voucher: Matos, F.B. 1408 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Asplenium ulbrichtii* Rosenst.**
Voucher: Ferreiro, R.C.C. 27 (BOTU, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium uniseriale* Raddi**
Voucher: Brade, A.C. 5239 (HB, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Asplenium wacketii* Rosenst.**
Voucher: Brade, A.C. 12630 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Asplenium zamiifolium* Willd.**
Voucher: s.col. s.n. (data: 1862) (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

BLECHNACEAE

Vinícius Antonio de Oliveira Dittrich, Alexandre Salino
2 gêneros, 29 espécies (8 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

Blechnum L.

27 espécies (8 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Blechnum andinum* (Baker) C.Chr.**
Voucher: Brade, A.C. 6484 (B, HB, K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
Blechnum asplenioides Sw.
Voucher: Salino, A. 5095 (BHCB, HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Blechnum australe* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Blechnum australe subsp. *auriculatum* (Cav.) de la Sota
Voucher: Hatschbach, G. 72495 (HRCB, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Blechnum austrobrasilianum* de la Sota**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 1264 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Blechnum binervatum* (Poir.) C.V.Morton & Lellinger**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Blechnum binervatum* subsp. *acutum* (Desv.) R.M.Tryon & Stolze**
Voucher: Kozera, C. 1258 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Blechnum brasiliense* Desv.**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 1255 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Blechnum cordatum* (Desv.) Hieron.**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 360 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Blechnum divergens* Mett.**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 957 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Blechnum glaziovii* Christ**
Voucher: Hatschbach, G. 30042 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Blechnum gracile* Kaulf.**
Voucher: Salino, A. 992 (BHCB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Blechnum heringeri* Brade**
Voucher: Salino, A. 10743 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Blechnum laevigatum* Cav.**
Voucher: Hatschbach, G. 10231 (B, MBM, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Blechnum lanceola* Sw.**
Voucher: Salino, A. 1814 (BHCB, HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Blechnum lehmannii* Hieron.**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 595 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Blechnum mochaenum* G.Kunkel**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Blechnum mochaenum* var. *squamipes* (Hieron.) de la Sota**
Voucher: Sehnem, A. 6798 (MBM, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Blechnum occidentale* L.**
Voucher: Salino, A. 3491 (BHCB, HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Blechnum organense* Brade**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 1067 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn**
Voucher: Smith, L.B. 10367 (HBR, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Blechnum polypodioides* Raddi**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 1259 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Blechnum proliferum* Rosenst.**
Voucher: Salino, A. 3382 (BHCB, HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Blechnum pteropus* (Kunze) Mett.**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 981 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Blechnum sampaioanum* Brade**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 711 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Blechnum schomburgkii* (Klotzsch) C.Chr.**
Voucher: Salino, A. 7935 (BHCB, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Blechnum serrulatum* Rich.**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 878 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Blechnum spannagelii* Rosenst.**
Voucher: Salino, A. 5634 (BHCB, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Blechnum sprucei* C.Chr.**
Voucher: Brade, A.C. 19047 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Blechnum usterianum* (Christ) C.Chr.**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 1114 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Salpichlaena J.Sm.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Salpichlaena hookeriana* (Kuntze) Alston**
Voucher: Prado, J. 1229 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Salpichlaena volubilis* (Kaulf.) J.Sm.**
Voucher: Prado, J. 1200 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, BA); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

CULCITACEAE

João Paulo Santos Condack
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Culcita C.Presl

1 espécie (não endêmica)
***Culcita coniifolia* (Hook.) Maxon**
Voucher: Brade, A.C. 17510 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

CYATHEACEAE

Paulo G. Windisch
4 gêneros, 36 espécies (21 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Alsophila R.Br.

4 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)
***Alsophila capensis* (L.f.) J.Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Alsophila capensis* subsp. *polypodioides* (Sw.) D.S.Conant**
Voucher: Sehnem, A. 5507a (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Alsophila cuspidata* (Kunze) D.S.Conant**
Voucher: Duarte, A.P. 6904 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Alsophila setosa* Kaulf.**
Voucher: Reitz, R. 12727 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Alsophila sternbergii* (Sternb.) D.S.Conant**
Voucher: Brade, A.C. 17923 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Cnemidaria C.Presl

1 espécie (1 endêmica)
***Cnemidaria uleana* (Samp.) Tryon**
Voucher: Smith, L.B. 2077 (GH, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Cyathea J.Sm.

30 espécies (19 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Cyathea abreviata* I.Fern.**
Voucher: Fernandes, I. 1404 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Cyathea acantha* (Sehnem) Lehnert**
Voucher: Sehnem, A. 3042 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Cyathea andina* (H.Karst.) Domin**
Referência: Lehnert, M. 2006. Brittonia 58(3):229-244.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Cyathea atrovirens* (Langsd. & Fisch.) Domin**
Voucher: Brade, A.C. 7725 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cyathea axillaris* (Fée) Lellinger**
Referência: Lellinger 1987. Amer. Fern J. 77(3):90-94.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cyathea bipinnatifida* (Baker) Domin**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12375 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Cyathea corcovadensis* (Raddi) Domin**
Voucher: Brade, A.C. 16886 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cyathea cyatheoides* (Desv.) K.U.Kramer**
Voucher: Black, G.A. 48-2784 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Cyathea delgadii* Sternb.**
Voucher: Brade, A.C. 13934 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Cyathea dichromatolepis* (Fée) Domin**
Voucher: Tryon, R.M. 6662 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Cyathea gardneri* Hook.**
Voucher: Reitz, R. 232 (HBR, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Cyathea glaziovii* (Fée) Domin**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2155 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Cyathea hirsuta* C.Presl**
Voucher: Fernandes, I. 1310 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cyathea leucofolis* Domin**
Voucher: Fernandes, I. 1232 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Cyathea macrocarpa* (C.Presl) Domin**
Voucher: Fernandes, I. 1499 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Cyathea macrosora* (Baker) Domin**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cyathea macrosora* var. *reginae* (P.G.Windisch) A.R.Sm.**
Voucher: Traill, J.W.H. 1384 (GH, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cyathea macrosora* var. *vaupensis* (P.G.Windisch) A.R.Sm.**
Referência: Windisch, P.G. 1973. Bradea 1:374.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Cyathea microdonta* (Desv.) Domin**
Voucher: Brade, A.C. 11970 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyathea multiflora* Sm.**
Voucher: Traill, J.W.H. 1382 (GH, US, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cyathea myriotricha* (Baker) R.C.Moran & J.Prado**
Voucher: Prado, J. 1772 (MBM, NY, SP, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Cyathea nigra* Linden *ex* Fournet**
Voucher: Nee, M. 42799 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cyathea phalerata* Mart.**
Voucher: Brade, A.C. 13936 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Cyathea pilosissima* (Baker) Domin**
Voucher: Daly, D.C. 11603 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cyathea platylepis* (Hook.) Domin**
Voucher: Prance, G.T. 29231 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cyathea poeppigii* (Hook.) Domin**
Voucher: Macedo, A. 1111 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Cyathea praecincta* (Kunze) Domin**
Voucher: Smith, L.B. 7580 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cyathea pungens* (Willd.) Domin**
Voucher: Windisch, P.G. 2570b (HB, SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cyathea rufa* (Fée) Lellinger**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2291 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Cyathea surinamensis* (Miq.) Domin**
Voucher: Windisch, P.G. 408 (GH, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Cyathea thysanolepis* (Barrington) A.R.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 29177 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cyathea villosa* Willd.**
Voucher: Humboldt, F.H.A. 436 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Hymenophyllopsis Pic.Serm.
1 espécie (não endêmica)
***Hymenophyllopsis hymenophylloides* L.D.Gómez**
Referência: Lellinger, D.B. 1995. Fl. Venez. Guayana 2: 1-706.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

DENNSTAEDTIACEAE
Pedro Bond Schwartsburd
7 gêneros, 17 espécies (3 endêmicas)

Blotiella R.M.Tryon
1 espécie (não endêmica)
***Blotiella lindeniana* (Hook.) R.M.Tryon**
Voucher: Reitz, R. 3456 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Dennstaedtia Bernh.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Dennstaedtia bipinnata* (Cav.) Maxon**
Voucher: Daly, D.C. 11418 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Dennstaedtia cicutaria* (Sw.) T.Moore**
Voucher: Schwartsburd, P.B. 1629 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica, Pantanal
***Dennstaedtia dissecta* T.Moore**
Voucher: Schwartsburd, P.B. 1627 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Dennstaedtia globulifera* (Poir.) Hieron.**
Voucher: Schwartsburd, P.B. 1113 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal
***Dennstaedtia obtusifolia* (Willd.) T.Moore**
Voucher: Labiak, P.H. 4480 (SP, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Histiopteris J.Agardh
1 espécie (não endêmica)
***Histiopteris incisa* (Thunb.) J.Sm.**
Voucher: Schwartsburd, P.B. 780 (MBM, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Hypolepis Bernh.
6 espécies (3 endêmicas)
***Hypolepis hostilis* (Kunze) C.Presl**
Voucher: Spruce, R. 2119 (B, GH, K, NY, P, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hypolepis mitis* Kunze *ex* Kuhn**
Voucher: Prado, J. 2057 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Mata Atlântica
***Hypolepis repens* (L.) C.Presl**
Voucher: Lopes, M.S. 216 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Hypolepis rigescens* (Kunze) T.Moore**
Voucher: Tosta Silva, A. 530 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Hypolepis rugosula* (Labill.) J.Sm.**
Voucher: Schwartsburd, P.B. 2000 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Hypolepis stolonifera* Fée**
Voucher: Schwartsburd, P.B. 1928 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Microlepia C.Presl
1 espécie (não endêmica)
***Microlepia speluncae* (L.) T.Moore**
Voucher: Labiak, P.H. 4522 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Paesia A.St.-Hil.
1 espécie (não endêmica)
***Paesia glandulosa* (Sw.) Kuhn**
Voucher: Badini, J. 2455 (OUPR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Pteridium Gled. *ex* Scop.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pteridium arachnoideum* (Kaulf.) Maxon**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 4680 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Pteridium caudatum* (L.) Maxon**
Voucher: Costa, M.S. 69 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste; Amazônia

DICKSONIACEAE
João Paulo Santos Condack
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Dicksonia L'Hér.
1 espécie (não endêmica)
***Dicksonia sellowiana* Hook.**
Voucher: Condack, J.P.S. 526 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Lophosoria C.Presl
1 espécie (não endêmica)
***Lophosoria quadripinnata* (J.F.Gmel.) C.Chr.**
Voucher: Condack, J.P.S. 344 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

DRYOPTERIDACEAE
Jefferson Prado, Lana da Silva Sylvestre, Alexandre Salino, João Paulo Santos Condack, Paulo G. Windisch, Regina Y. Hirai, Thais Elias Almeida, Maria Angélica Kieling-Rúbio
15 gêneros, 162 espécies (78 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (2 endêmicas)

Arachniodes Blume
João Paulo Santos Condack
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Arachniodes denticulata* (Sw.) Ching**
Voucher: Brade, A.C. 21111 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Arachniodes macrostegia* (Hook.) R.M.Tryon & D.S.Conant**
Voucher: Fiaschi, P. 1148 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Bolbitis Schott
Jefferson Prado
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Bolbitis lindigii* (Mett.) Ching**
Voucher: Prance, G.T. 12069a (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Bolbitis nicotianifolia* (Sw.) Alston**
Voucher: Daly, D.C. 9128 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Bolbitis oligarchica* (Baker) Hennipman**
Voucher: Siveira, M. 1361 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Bolbitis semipinnatifida* (Fée) Alston**
Voucher: Zuquim, G.P.S. 240 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bolbitis serratifolia* Schott**
Voucher: Gardner, G. 217 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Ctenitis (C.Chr.) C.Chr.
Alexandre Salino, Thais Elias Almeida
17 espécies (10 endêmicas)
***Ctenitis abyssi* (Sehnem) Salino & Morais**
Voucher: Sehnem, A. 6315 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Ctenitis ampla* (Willd.) Ching**
Voucher: Salino, A. 3257 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Ctenitis anniesii* (Rosenst.) Copel.**
Voucher: Brade, A.C. 20105 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ctenitis aspidioides* (C.Presl) Copel.**
Voucher: Krieger, L. 11513 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Ctenitis bigarellae* Schwartsb. et al.**
Voucher: Schwartsburd, P.B. 565 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Ctenitis deflexa* (Kaulf.) Copel.**
Voucher: Salino, A. 1993 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ctenitis distans* (Brack.) Ching**
Voucher: Brade, A.C. 18072 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Ctenitis eriocaulis* (Fée) Alston**
Voucher: Salino, A. 5130 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Ctenitis falciculata* (Raddi) Ching**
Voucher: Brade, A.C. 18471 (GH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ctenitis fenestralis* (C.Chr.) Copel.**
Voucher: Spannagel, C. 144 (NY, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Ctenitis flexuosa* (Fée) Copel.**
Voucher: Luederwaldt, H. s.n. (HB 39022)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ctenitis laetevirens* (Rosenst.) Salino & Morais**
Voucher: Goeden 49 (NY,UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (SC); Mata Atlântica
***Ctenitis nigrovenia* (Christ) Copel.**
Voucher: Windisch, P.G. 1529 (UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Ctenitis pedicellata* (Christ) Copel.**
Voucher: Kummrow, R. 2701 (MBM, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ctenitis refulgens* (Mett.) Vareschi**
Voucher: Krieger, L. 12127 (CESJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Ctenitis sloanei* (Poepp. *ex* Spreng.) C.V.Morton**
Voucher: Almeida-Neto, M. 270 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica
***Ctenitis submarginalis* (Langsd. & Fisch.) Ching**
Voucher: Windisch, P.G. 6910 (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Cyclodium C.Presl

Alexandre Salino, Thais Elias Almeida
5 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (2 endêmicas)
***Cyclodium calophyllum* (C.V.Morton) A.R.Sm.**
Voucher: Prado, J. 50 (UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cyclodium guianense* (Klotzsch) van der Werff *ex* L.D.Gómez**
Voucher: Prado, J. 1342 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Cyclodium heterodon* (Schrad.) T.Moore**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Cyclodium heterodon* var. *abreviatum* (C.Presl) A.R.Sm.**
Voucher: Harley, R.M. 17173 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL); Mata Atlântica
Cyclodium heterodon* (Schrad.) T.Moore var. *heterodon
Voucher: Salino, A. 9372 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Cyclodium inerme* (Fée) A.R.Sm.**
Voucher: Carvalho, F.A. 204 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Cyclodium meniscioides* (Willd.) C.Presl**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cyclodium meniscioides* (Willd.) C.Presl var. *meniscioides
Voucher: Salino, A. 8304 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Didymochlaena Desv.

Jefferson Prado
1 espécie (não endêmica)
***Didymochlaena truncatula* (Sw.) J.Sm.**
Voucher: Prado, J. 341 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Dryopteris Adans.

Alexandre Salino, Thais Elias Almeida
2 espécies (nenhuma endêmica),
1 subespécie (não endêmica)
***Dryopteris patula* (Sw.) Underw.**
Voucher: Salino, A. 4542 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Dryopteris wallichiana* (Spreng.) Hyl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Dryopteris wallichiana* (Spreng.) Hyl. subsp. *wallichiana
Voucher: Salino, A. 10456 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Elaphoglossum Schott *ex* J.Sm.

Paulo G. Windisch, Maria Angélica Kieling-Rúbio
78 espécies (35 endêmicas)
***Elaphoglossum acrocarpum* (Mart.) T.Moore**
Voucher: Badini, J. 271 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Elaphoglossum actinotrichum* (Mart.) T.Moore**
Voucher: Macedo, A. 1515 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Elaphoglossum acutum* (Fée) Brade**
Referência: Brade, A.C. 1956. Bol. Parque Nacion. Itatiaia ser. tecn.-sc. 5/56.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Elaphoglossum amplissimum* (Fée) Christ**
Voucher: Brade, A.C. 14933 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Elaphoglossum angustius* Mickel**
Voucher: Anderson, W. 12274 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Elaphoglossum apodum* (Kaulf.) Schott**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 193 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Elaphoglossum apparicioi* Brade**
Voucher: Duarte, A.P. 3067 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Elaphoglossum bahiense* Rosenst.**
Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Elaphoglossum balansae* C.Chr.**
Referência: Brade, A.C. 1960/1961. Rodriguésia 35-36:22-23.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum beckeri* Brade**
Voucher: Becker, J. 810 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Elaphoglossum blanchetii* (Mett.) C.Chr.**
Voucher: Occhioni, P. s.n. (RB 44165)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Elaphoglossum brachyneuron* (Fée) J.Sm.**
Voucher: Spannagel s.n. (SP 21200)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum brevipes* (Kunze) T.Moore**
Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Elaphoglossum burchellii* (Baker) C.Chr.**
Voucher: Fernandes, I. 115 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum consobrinum* (Kunze) T.Moore**
Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Elaphoglossum craspedariiforme* (Fée) Brade**
Voucher: Brade, A.C. 5290 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Elaphoglossum crassinerve* (Kunze) T.Moore**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 576 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum decoratum* (Kunze) T.Moore**
Voucher: Labiak, P.H. 4074 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Elaphoglossum didymoglossoides* C.Chr.**
Referência: Christensen, C 1904. Bot. Tidsskr. 26(2):299.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Elaphoglossum discolor* (Kuhn) C.Chr.**
Voucher: Costa, M.A.S. 92 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Elaphoglossum dutraei* Brade**
Voucher: Dutra, J. 222 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum edwallii* Rosenst.**
Voucher: Brade, A.C. 6441 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum erinaceum* (Fée) T.Moore**
Voucher: Brade, A.C. 15515 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum ernestii* Brade**
Voucher: Ule, E.H.G. 265 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Elaphoglossum flaccidum* (Fée) T.Moore**
Voucher: Prado, J. 1266 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Elaphoglossum gayanum* (Fée) T.Moore**
Voucher: Bueno, R. s.n. (ICN 85223)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum gehrtii* Sehnem**
Voucher: Hatschbach, G. 10794 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum glabellum* J.Sm.**
Voucher: Prado, J. 1297 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Elaphoglossum heringeri* Brade**
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 14523)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Elaphoglossum herminieri* (Bory & Fée) T.Moore**
Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32:12.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Elaphoglossum hirtipes* (Fée) Brade**
Referência: Brade, A.C. 1935. Arq. Inst. Biol. Veg. 2:5.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Elaphoglossum horridulum* (Kaulf.) J.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 2254 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Elaphoglossum iguapense* Brade**
Voucher: Reitz, R. 109 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum insigne* (Fée) Brade**
Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Elaphoglossum itatiayense* Rosenst.**
Voucher: Brade, A.C. 6449 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Elaphoglossum jamesonii* (Hook. & Grev.) T.Moore**
Voucher: Bueno, R.M. 4468 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum juruense* A.Samp.**
Voucher: Hoehne, F.C. 5367 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Elaphoglossum lagesianum* Rosenst.**
Voucher: Dutra, J. 210 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum laminarioides* (Fée) T.Moore**
Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Elaphoglossum langsdorffii* (Hook. & Grev.) T.Moore**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12499 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Elaphoglossum latifolium* (Sw.) J.Sm.**
Voucher: Leite, J.E. 412 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum lingua* (C.Presl) Brack.**
Voucher: Hatschbach, G. 54110 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Elaphoglossum lisboae* Rosenst.**
Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Elaphoglossum luridum* (Fée) Christ**
Voucher: Waechter, J.L. 1529 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Elaphoglossum macahense* (Fée) Rosenst.**
Voucher: Rizzini, C.T. 612 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum macrophyllum* (Mett. *ex* Kuhn) Christ**
Voucher: Labiak, P.H. 140 (SP, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum macrorhizum* (Baker) C.Chr.**
Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum miersii* (Baker) C.Chr.**
Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum minutum* (Pohl *ex* Fée) T.Moore**
Voucher: Santos Lima, J. 13175 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum mourae* Brade**
Voucher: Moura, T. s.n. (R 86251)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum nigrescens* (Hook.) T.Moore *ex* Diels**
Voucher: Verveloet, R.R. 1884 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Elaphoglossum ornatum* (Mett. *ex* Kuhn) Christ**
Voucher: Brade, A.C. 21117 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum pachydermum* (Fée) T.Moore**
Voucher: Sehnem, A. 921 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum paleaceum* (Hook. & Grev.) Sledge**
Referência: Moran, R.C. & Riba, R. 1995. Fl. Mesoamer. 275.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Elaphoglossum paulistanum* Rosenst.**
Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Elaphoglossum peltatum* (Sw.) Urb.**
Voucher: Campos-Porto, P. 2645 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Nordeste, Amazônia e Mata Atlântica

***Elaphoglossum petiolatum* (Sw.) Urb.**
Referência: Moran, R.C. & Riba, R. 1995. Flora Mesoamericana 277.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Elaphoglossum pteropus* C.Chr.**
Voucher: Brade, A.C. 18068 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Elaphoglossum raywaense* (Jenman) Alston**
Voucher: Prado, J. 1314 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, AM); Amazônia

***Elaphoglossum rigidum* Urb.**
Voucher: Sick, H. 546 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Elaphoglossum riparium* Brade**
Voucher: Macedo, A. 1511 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Elaphoglossum rubicundum* (Pohl *ex* Ettingsh.) Alston**
Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Elaphoglossum schwackeanum* Brade**
Voucher: Damazio, L.B. s.n. (RB 39239)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Elaphoglossum scolopendrifolium* (Raddi) J.Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 14934 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Elaphoglossum sehnemii* Brade**
Voucher: Sehnem, A. 6732 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum sporadolepis* (Kunze *ex* Kuhn) T.Moore *ex* C.Chr.**
Referência: Rojas-Alvarado, A. F. 2002. Rev. Biol. Trop. 3-4:969-1006.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Elaphoglossum squamipes* (Hook.) T.Moore**
Voucher: Barbosa, E. 430 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Elaphoglossum strictum* (Raddi) T.Moore**
Voucher: Labiak, P.H. 990 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum styriacum* Mickel**
Voucher: Prado, J. 1381 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Elaphoglossum subarborescens* Rosenst.**
Voucher: Mamede, M.C.H. 274 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Elaphoglossum tamandarei* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 18957 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Elaphoglossum tantalinum* Mickel**
Voucher: Prado, J. 1179 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Elaphoglossum tectum* (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) T.Moore**
Voucher: Hatschbach, G. 68285 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Elaphoglossum tenax* Rosenst.**
Voucher: Campos-Porto, P. 3018 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Elaphoglossum tenuiculum* (Fée) Baker**
Referência: Moran, R.C. & Riba, R. 1995. Fl. Mesoamer. 283.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Elaphoglossum ulei* Christ**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (RB 36811)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum vagans* (Mett.) Hieron.**
Voucher: Hornung, H.H. 51827 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Elaphoglossum wettsteinii* Christ**
Voucher: Hatschbach, G. 22781 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Lastreopsis Ching

Jefferson Prado
3 espécies (1 endêmica)
***Lastreopsis acuta* (Hook.) Tindale**
Voucher: Graçano, D. 70 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Lastreopsis amplissima* (C.Presl) Tindale**
Voucher: Prado, J. 1459 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lastreopsis effusa* (Sw.) Tindale**
Voucher: Graçano, D. 45 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Lomagramma J.Sm.

Regina Y. Hirai
1 espécie (não endêmica)
***Lomagramma guianensis* (Aubl.) Ching**
Voucher: Prado, J. 1278 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Megalastrum Holttum

Alexandre Salino, Thais Elias Almeida
18 espécies (13 endêmicas)
***Megalastrum abundans* (Rosenst.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Brade, A.C. 18071 (GH, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Megalastrum adenopteris* (C.Chr.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Jürgens, C. 206 (UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Megalastrum albidulum* R.C.Moran et al.**
Voucher: Salino, A. 1475 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Megalastrum brevipubens* R.C.Moran et al.**
Voucher: Salino, A. 1987 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Megalastrum canescens* (Kunze *ex* Mett.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Salino, A. 10330 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Megalastrum connexum* (Kaulf.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Salino, A. 10267 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Megalastrum crenulans* (Fée) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Salino, A. 4925 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Megalastrum eugenii* (Brade) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Salino, A. 9383 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Megalastrum grande* (C.Presl) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Salino, A. 11061 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Megalastrum inaequale* (Kaulf. *ex* Link) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Salino, A. 4908 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Megalastrum indusiatum* R.C.Moran et al.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 4435 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Megalastrum littorale* R.C.Moran et al.**
Voucher: Válio, I.M. 112 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Megalastrum oreocharis* (Sehnem) Salino & Ponce**
Voucher: Salino, A. 12039 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Megalastrum organense* R.C.Moran et al.**
Voucher: Almeida, T.E. 1632 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Megalastrum retrorsum* R.C.Moran et al.**
Voucher: Salino, A. 7421 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Megalastrum substrigosum* R.C.Moran et al.**
Voucher: Salino, A. 13753 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Megalastrum umbrinum* (C.Chr.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Brade, A.C. 10056 (C)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Megalastrum wacketii* (Rosenst. *ex* C.Chr.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Hatschbach, G. 10745 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

Olfersia Raddi

Regina Y. Hirai
1 espécie (não endêmica)
***Olfersia cervina* (L.) Kunze**
Voucher: Prado, J. 539 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Polybotrya Willd.

Jefferson Prado
13 espécies (6 endêmicas)
***Polybotrya caudata* Kunze**
Voucher: Prance, G.T. 12069 (F, LP, NY, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Polybotrya crassirhizoma* Lellinger**
Voucher: Prance, G.T. 12180 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Polybotrya cylindrica* Kaulf.**
Voucher: Hatschbach, G. 8141 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Polybotrya espiritosantensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 18224 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Polybotrya glandulosa* Mett. *ex* Kuhn**
Voucher: Spruce, R. s.n. (B 2000 84967)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Polybotrya goyazensis* Brade**
Voucher: Macedo, A. 2682 (HB, MO, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Polybotrya osmundacea* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Sperling 5915 (GH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Polybotrya pilosa* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 20733 (NY, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Polybotrya pubens* Mart.**
Voucher: Prado, J. 1394 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Polybotrya semipinnata* Fée**
Voucher: Luederwaldt, H. 21547 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Polybotrya sessilisora* R.C.Moran**
Voucher: Conant, D. 1016 (GH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Polybotrya sorbifolia* Mett. *ex* Kuhn**
Voucher: Prance, G.T. 10466 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Mata Atlântica
***Polybotrya speciosa* Schott**
Voucher: Brade, A.C. 14943 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Polystichum Röth

João Paulo Santos Condack
8 espécies (6 endêmicas)
***Polystichum auritum* (Fée) Yatsk.**
Voucher: Brade, A.C. 16513 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Polystichum bradei* Rosenst.**
Voucher: Brade, A.C. 6482 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Polystichum caudescens* Dutra**
Voucher: Dutra 216 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Polystichum laniceps* Rosenst.**
Voucher: Jürgens, C. 276 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Polystichum montevidense* (Spreng.) Rosenst.**
Voucher: Brade, A.C. 16555 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Polystichum opacum* Rosenst.**
Voucher: Jürgens, C. 140 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Polystichum platyphyllum* (Willd.) C.Presl**
Voucher: Brade, A.C. 17979 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Mata Atlântica
***Polystichum rochaleanum* (Glaz.) Fée**
Voucher: Brade, A.C. 15543 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Rumohra Raddi
João Paulo Santos Condack
2 espécies (1 endêmica)
***Rumohra adiantiformis* (G.Forst.) Ching**
Voucher: Brade, A.C. 14044 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Rumohra turficola* R.M.Senna**
Voucher: Senna, R.M. 918 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Stigmatopteris C.Chr.
Alexandre Salino, Thais Elias Almeida
6 espécies (6 endêmicas)
***Stigmatopteris brevinervis* (Fée) R.C.Moran**
Voucher: Stehmann, J.R. 3552 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Stigmatopteris caudata* (Raddi) C.Chr.**
Voucher: Salino, A. 5325 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Stigmatopteris heterocarpa* (Fée) Rosenst.**
Voucher: Salino, A. 5307 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Stigmatopteris prionites* (Kunze) C.Chr.**
Voucher: Salino, A. 9078 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Stigmatopteris tyucana* (Raddi) C.Chr.**
Voucher: Salino, A. 7964 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Stigmatopteris ulei* (Christ) Sehnem**
Voucher: Salino, A. 10326 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

EQUISETACEAE
Alexandre Salino, Thais Elias Almeida
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Equisetum L.
1 espécie (não endêmica)
***Equisetum giganteum* L.**
Voucher: Figueiredo, J.B. 514 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

GLEICHENIACEAE
Fernando Bittencourt de Matos
3 gêneros, 11 espécies (1 endêmica)

Dicranopteris Bernh.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Dicranopteris flexuosa* (Schrad.) Underw.**
Voucher: Windisch, P.G. 6272 (HB, MO, SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Dicranopteris linearis* (Burm.f.) Underw.**
Voucher: Mello-Silva, R. 8324 (SJRP, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Dicranopteris nervosa* (Kaulf.) Maxon**
Voucher: Reitz, R. 17992 (HBR, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Gleichenella Ching
1 espécie (não endêmica)
***Gleichenella pectinata* (Willd.) Ching**
Voucher: Windisch, P.G. 6269 (NY, SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Sticherus C.Presl
7 espécies (1 endêmica)
***Sticherus bifidus* (Willd.) Ching**
Voucher: Schwartsburd, P.B. 818 (HUPG, MBM, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Sticherus longipinnatus* (Hook.) Nakai**
Referência: Andersen, E.O. & Øllgaard., B. 2001. Flora of Ecuador 66: 105-170.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Sticherus nigropaleaceus* (J.W.Sturm) J.Prado & Lellinger**
Voucher: Labiak, P.H. 203 (SP, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Sticherus penniger* (Mart.) Ching**
Voucher: Barbosa, M.A. 74 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Sticherus remotus* (Kaulf.) Chrysler**
Voucher: Prado, J. 1300 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Sticherus revolutus* (Kunth) Ching**
Voucher: Brade, A.C. 12625 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Sticherus tomentosus* (Cav. *ex* Sw.) A.R.Sm.**
Referência: Smith, A.R. 1995. Fl. Venez. Guayana 2:706.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

HYMENOPHYLLACEAE

Paulo G. Windisch

6 gêneros, 84 espécies (12 endêmicas),
3 variedades (1 endêmica)

Abrodictyum C.Presl

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Abrodictyum cellulosum* (Klotzsch) Ebihara & Dubuisson**
Voucher: Vicentini, A. 1256 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Abrodictyum rigidum* (Sw.) Ebihara & Dubuisson**
Voucher: Windisch, P.G. 1330 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Abrodictyum sprucei* (Baker) Ebihara & Dubuisson**
Voucher: Prado, J. 41 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Didymoglossum Desv.

12 espécies (1 endêmica)

***Didymoglossum angustifrons* Fée**
Voucher: Windisch, P.G. 1369 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Didymoglossum ekmanii* (Wess.Boer) Ebihara & Dubuisson**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 808 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Didymoglossum hymenoides* (Hedw.) Desv.**
Voucher: Windisch, P.G. 5338 (HB, SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Didymoglossum kapplerianum* (Sturm) Ebihara & Dubuisson**
Voucher: Santos Lima, J. 12 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Didymoglossum krausii* (Hook. & Grev.) C.Presl**
Voucher: Windisch, P.G. 5813 (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Didymoglossum lineolatum* Bosch**
Referência: Wessels Boer, J.G. 1962. Acta Bot. Neerl. 11(4):277-330.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Didymoglossum membranaceum* (L.) Vareschi**
Referência: Sturm, J. 1859. Fl. bras. Vol. I, Part II, Fasc. 23 - 276.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Didymoglossum numularium* Bosch**
Voucher: Pivetta, S.J.P. 177 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Didymoglossum ovale* E.Fourn.**
Voucher: Prance, G.T. 1288 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Didymoglossum punctatum* (Poir.) Desv.**
Voucher: Windisch, P.G. 4787 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Didymoglossum pusillum* (Sw.) Desv.**
Voucher: Brade, A.C. 11598 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Didymoglossum reptans* (Sw.) C.Presl**
Voucher: Regnell, A.F. 1490 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Mata Atlântica

Hymenophyllum J.Sm.

29 espécies (8 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)

***Hymenophyllum abruptum* Hook.**
Voucher: Prance, G.T. 16472 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hymenophyllum angustum* Bosch**
Voucher: Prado, J. 1153 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Hymenophyllum asplenioides* (Sw.) Sw.**
Voucher: Hatschbach, G. 17219 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum axillare* Sw.**
Referência: Smith, A.R. 1995. Fl. Venez. Guayana 2: 1-706.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hymenophyllum caudiculatum* Mart.**
Voucher: Reitz, R. 7899 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum ciliatum* (Sw.) Sw.**
Voucher: Prance, G.T. 20059 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Hymenophyllum crispum* Kunth**
Voucher: Spannagel, C. 123 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum delicatulum* Sehnem**
Voucher: Sehnem, A. 6513 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum elegans* Spreng.**
Voucher: Hatschbach, G. 19245 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Hymenophyllum fragile* (Hedw.) C.V.Morton**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Hymenophyllum fragile* var. *venustum* (Desv.) C.V.Morton**
Voucher: Brade, A.C. 9549 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum fucoides* Sw.**
Voucher: Warrington, J.F. K.E.R. 23 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum glaziovii* Baker**
Voucher: Ribas, O.S. 859 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Hymenophyllum hirsutum* (L.) Sw.**
Voucher: Labiak, P.H. 67 (SP, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Hymenophyllum lineare* (Sw.) Sw.**
Voucher: Hatschbach, G. 11725 (MBM, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido
***Hymenophyllum magellanicum* Willd. *ex* Kunze**
Voucher: Sehnem, A. 6971 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hymenophyllum microcarpum* Desv.**
Voucher: Reitz, R. 3021 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Hymenophyllum myriocarpum* Hook.**
Voucher: Oliveira, P.I. 798 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica
***Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Lam.**
Voucher: Windisch, P.G. 8735 (HB, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Hymenophyllum plumosum* Kaulf.**
Voucher: Berry, P.E. 4479 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Hymenophyllum polyanthos* (Sw.) Sw.**
Voucher: Sehnem, A. 5633 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Hymenophyllum prionema* Kunze**
Referência: Morton, C.V. 1947. Contr. U.S. Natl. Herb. 29(3):158.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hymenophyllum pulchellum* Schltdl. & Cham.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 6524 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Hymenophyllum rufum* Fée**
Voucher: Windisch, P.G. 8737 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hymenophyllum sampaioanum* Brade & Rosenst.**
Voucher: Brade, A.C. 9881 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Hymenophyllum silveirae* Christ**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12528 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Hymenophyllum trichophyllum* Kunth**
Voucher: Ule, E.H.G. 8497 (R, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Hymenophyllum ulei* Christ & Giesenh.**
Voucher: Reitz, R. 240 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Hymenophyllum undulatum* (Sw.) Sw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Hymenophyllum undulatum* var. *fedlerianum* (J.W.Sturm) Stolze**
Voucher: Prance, G.T. 21453 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
Hymenophyllum undulatum* (Sw.) Sw. var. *undulatum
Referência: Funk, V. et al. 2007. Contr. U.S. Natl. Herb. 55:1-384.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Hymenophyllum valvatum* Hook. & Grev.**
Voucher: Warrington, J.F. K.E.R. 23 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Polyphlebium Copel.

4 espécies (1 endêmica)
***Polyphlebium angustatum* (Carmich.) Ebihara & Dubuisson**
Voucher: Sehnem, A. 5892 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Polyphlebium diaphanum* (Kunth) Ebihara & Dubuisson**
Voucher: Labiak, P.H. 3084 (MBM, RB, SP, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Polyphlebium hymenophylloides* (Bosch) Ebihara & Dubuisson**
Voucher: Callejas, R. 1829 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Polyphlebium pyxidiferum* (L.) Ebihara & Dubuisson**
Voucher: Sehnem, A. 6225 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Trichomanes L.

33 espécies (2 endêmicas)
***Trichomanes accedens* C.Presl**
Voucher: Windisch, P.G. 6364 (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Trichomanes anadromum* Rosenst.**
Voucher: Hatschbach, G. 24688 (MBM, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Trichomanes ankersii* C.Parker *ex* Hook. & Grev.**
Voucher: Hoehne, F.C. 5256 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Trichomanes arbuscula* Desv.**
Voucher: Freitas, C. 655 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Trichomanes bicorne* Hook.**
Voucher: Prado, J. 1313 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Trichomanes crinitum* Sw.**
Voucher: Warrington, J.F. K.E.R. 23 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Trichomanes crispum* L.**
Voucher: Smith, L. 2932 (K, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (CE); Amazônia

***Trichomanes cristatum* Kaulf.**
Voucher: Windisch, P.G. 4726 (HB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Trichomanes diversifrons* (Bory) Mett. *ex* Sadeb.**
Voucher: Alves, M. 2415 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Trichomanes egleri* P.G.Windisch**
Voucher: Berg, C.C. P18194 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Trichomanes elegans* Rich.**
Voucher: Nelson, B.W. 365 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Trichomanes emarginatum* C.Presl**
Voucher: Hatschbach, G. 15872 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Trichomanes guidoi* P.G.Windisch**
Voucher: Holt, K.G. 503 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Trichomanes hostmannianum* (Klotzsch) Kunze**
Voucher: Windisch, P.G. 6461 (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado
***Trichomanes humboldtii* (Bosch) Lellinger**
Voucher: Prance, G.T. 15681 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Trichomanes lucens* Sw.**
Voucher: Brade, A.C. 6619 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Trichomanes macilentum* Bosch**
Voucher: Prado, J. 1385 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Trichomanes martiusii* C.Presl**
Voucher: Hoehne, F.C. 5368 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Trichomanes pedicellatum* Desv.**
Voucher: Hoehne, F.C. 5263 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Trichomanes pellucens* Kunze**
Voucher: Luetzelburg, P. 6935 (R, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Trichomanes pilosum* Raddi**
Voucher: Brade, A.C. 8587 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Trichomanes pinnatum* Hedw.**
Voucher: Nonato, F.R. 1006 (HUFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Trichomanes plumosum* Kunze**
Voucher: Prance, G.T. 12139 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Trichomanes polypodioides* Raddi**
Voucher: Harley, R.M. 18224 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, PI, PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Trichomanes robustum* E.Fourn.**
Voucher: Martins, A.B. s.n. (EAC 20503, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica
***Trichomanes roraimense* Jenman**
Voucher: Ule, E.H.G. 8500 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Trichomanes spruceanum* Hook.**
Voucher: Pires, J.M. 16391 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Trichomanes steyermakii* P.G.Windisch & A.R.Sm.**
Voucher: Steyermark, J.A. 107541 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Trichomanes tanaicum* Hook.**
Voucher: Prado, J. 1209 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Trichomanes trollii* Bergdolt**
Voucher: Pivetta, S.J.P. 27 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Trichomanes tuerckheimii* Christ**
Voucher: Freitas, C. 702 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Trichomanes vandenboschii* P.G.Windisch**
Voucher: Prance, G.T. 9994 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Trichomanes vittaria* DC. *ex* Poir.**
Voucher: Jangoux, J. 521 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Vandenboschia Copel.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Vandenboschia collariata* (Bosch) Ebihara & Dubuisson**
Voucher: Callejas, R. 1818 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Vandenboschia radicans* (Sw.) Copel.**
Voucher: Pivetta, S.J.P. 27 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Vandenboschia rupestris* (Raddi) Ebihara & K.Iwats.**
Voucher: Sehnem, A. 723 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

ISOETACEAE

Jefferson Prado, Lana da Silva Sylvestre

1 gênero, 14 espécies (12 endêmicas)

Isoetes L.

14 espécies (12 endêmicas)

***Isoetes amazonica* A.Br.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Isoetes bradei* Herter**
Voucher: Brade, A.C. (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Isoetes fusco-marginata* H.P.Fuchs**
Voucher: Sehnem, A. 4122 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Isoetes gardneriana* Kunze *ex* Mett.**
Voucher: Gardner, G. 3563 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado, Mata Atlântica

***Isoetes gigantea* U.Weber**
Voucher: Lacerda, N. (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Isoetes martii* A.Braun**
Voucher: Brade, A.C. 16868 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Isoetes maxima* Hickey et al.**
Voucher: Sehnem, A. 10960 (FHS, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Isoetes organensis* F.A.C.Weber**
Voucher: Brade, A.C. 20292 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Isoetes panamensis* Maxon & C.V.Morton**
Voucher: Irwin, H.S. 31615 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado, Mata Atlântica

***Isoetes ramboi* Herter**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 34681)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Isoetes sehnemii* H.P.Fuchs**
Voucher: Sehnem, A. 14987 (FHS, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Isoetes smithii* H.P.Fuchs**
Voucher: Reitz, R. 3305 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Isoetes spannagelii* H.P.Fuchs**
Voucher: Spannagel, C. 301 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Isoetes triangula* U.Weber**
Referência: Hickey, R.J. & Smith, A.R. 1995. Fl. Venez. Guayana 2: 1-706.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

LINDSAEACEAE

Jefferson Prado

2 gêneros, 28 espécies (5 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica), 8 variedades (2 endêmicas)

Lindsaea Dryand *ex* Sen.

27 espécies (5 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica), 8 variedades (2 endêmicas)

***Lindsaea arcuata* Kunze**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 50611)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Lindsaea bifida* (Kaulf.) Mett. *ex* Kuhn**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 53 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Lindsaea botrychioides* A.St.-Hil.**
Voucher: Handro, O. s.n. (SP 46133)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Lindsaea coarctata* K.U.Kramer**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Lindsaea cyclophylla* K.U.Kramer**
Voucher: Spruce, R. 2916 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindsaea divaricata* Klotzsch**
Voucher: Prado, J. 1151 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lindsaea dubia* Spreng.**
Voucher: Spruce, R. 2599 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindsaea filipendula* (Rosenst.) K.U.Kramer**
Voucher: Luetzelburg, P. 141 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lindsaea guianensis* (Aubl.) Dryand.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Lindsaea guianensis* (Aubl.) Dryand. subsp. *guianensis
Voucher: Zuquim, G.P.S. 128 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Lindsaea guianensis* subsp. *lanceastrum* K.U.Kramer**
Voucher: Dusén, P.K.H. 14117 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Lindsaea hemiglossa* K.U.Kramer**
Voucher: Prance, G.T. 12142 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Lindsaea hemiptera* K.U.Kramer**
Voucher: Luetzelburg, P. 23658 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindsaea javitensis* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Luetzelburg, P. 22605 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindsaea lancea* (L.) Bedd.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Lindsaea lancea* var. *elatior* (Kunze) K.U.Kramer**
Voucher: Sick, H. 535 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Lindsaea lancea* var. *falcata* (Dryand.) Rosenst.**
Voucher: Zuquim, G.P.S. 70 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
Lindsaea lancea* (L.) Bedd. var. *lancea
Voucher: Prado, J. 1458 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Lindsaea lancea* var. *remota* (Kunze) K.U.Kramer**
Voucher: Mexia, Y. 5948a (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Lindsaea macrophylla* Kaulf.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Lindsaea meifolia* (Kunth) Mett. *ex* Kunh**
Voucher: Luetzelburg, P. 23606 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lindsaea ovoidea* Fée**
Voucher: Spannagel, C. 214 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Lindsaea pallida* Klotzsch**
Voucher: Ranal, M.A. 1307b (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Lindsaea portoricensis* Desv.**
Voucher: Smith, L.B. 2202 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Lindsaea quadrangularis* Raddi**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Lindsaea quadrangularis* subsp. *antillensis* K.U.Kramer**
Voucher: Zuquim, G.P.S. 233 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Lindsaea quadrangularis* Raddi subsp. *quadrangularis
Voucher: Prado, J. 1649 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Lindsaea quadrangularis* subsp. *terminalis* K.U.Kramer**
Voucher: Brade, A.C. 7727 (UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lindsaea rigidiuscula* Lindm.**
Voucher: Luetzelburg, P. 23601 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Lindsaea schomburgkii* Klotzsch**
Voucher: Prado, J. 1309 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Lindsaea semilunata* (C.Chr.) C.Chr.**
Voucher: Spruce, R. 2338 (B, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lindsaea stricta* (Sw.) Dryand.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Lindsaea stricta* var. *parvula* (Fée) K.U. Kramer**
Voucher: Luetzelburg, P. 22692 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
Lindsaea stricta* (Sw.) Dryand. var. *stricta
Voucher: Prado, J. 1335 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Lindsaea taeniata* K.U.Kramer**
Referência: Smith, A.R. 1995. Fl. Venez. Guayana 2:1 706.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Lindsaea tetraptera* K.U.Kramer**
Voucher: Spruce, R. 2277 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lindsaea ulei* Hieron. *ex* Christ**
Voucher: Prado, J. 1369 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Lindsaea virescens* Sw.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Lindsaea virescens* var. *catharinae* (Hook.) Baker**
Voucher: Brade, A.C. 8258a (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
Lindsaea virescens* Sw. var. *virescens
Voucher: Eiten, G. 2108a (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Lonchitis L.

1 espécie (não endêmica)
***Lonchitis hirsuta* L.**
Referência: Tryon, R.M. & Tryon, A. F. 1982. Ferns and allied plants, with special reference to Tropical America 1-857.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

LOMARIOPSIDACEAE

Iva Carneiro Leão Barros, Augusto César Pessôa Santiago, Ana Flora de Novaes Pereira
3 gêneros, 14 espécies (2 endêmicas)

Cyclopeltis J.Sm.

1 espécie (não endêmica)
***Cyclopeltis semicordata* (Sw.) J.Sm.**
Voucher: Daly, D.C. 11721 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Lomariopsis Fée

4 espécies (1 endêmica)
***Lomariopsis japurensis* (Mart.) J.Sm.**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 5090 (HB, MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Lomariopsis marginata* (Schrad.) Kuhn**
Referência: Moran, R.C. 2000. Brittonia 52(1)/55-111.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Lomariopsis nigropaleata* Holttum**
Voucher: Prado, J. 1211 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Lomariopsis prieuriana* Fée**
Voucher: Prado, J. 1137 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Nephrolepis Schott
9 espécies (1 endêmica)
***Nephrolepis biserrata* (Sw.) Schott**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 4396 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Nephrolepis brownii* (Desv.) Hovenkamp & Miyam.**
Voucher: Daly, D.C. 11595 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Nephrolepis cordifolia* (L.) C.Presl**
Voucher: Wacket, M. 206 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Nephrolepis exaltata* (L.) Schott**
Voucher: Santana, E.S. 84 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, PB, PE, BA, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Nephrolepis occidentalis* Kunze**
Voucher: Prance, G.T. 28784 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Mata Atlântica
***Nephrolepis pectinata* (Willd.) Schott**
Voucher: Costa, M.A.S. 237 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Nephrolepis pendula* (Raddi) J.Sm.**
Voucher: Stork, H.E. 4763 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Nephrolepis rivularis* (Vahl) Mett. *ex* Krug**
Voucher: Lopes, M.S. 645 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Nephrolepis undulata* (Afzel.) J.Sm.**
Voucher: Santos, H.G.P. 282 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

LYCOPODIACEAE
Paulo G. Windisch, Carla Gabriela Vargas Ramos
3 gêneros, 54 espécies (27 endêmicas), 6 variedades (1 endêmica)

Huperzia Bernh.
38 espécies (25 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Huperzia acerosa* (Sw.) Holub**
Voucher: Ramos, C.G.V. 43 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Huperzia badiniana* B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Condack, J.P.S. 524 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Huperzia biformis* (Hook.) Holub**
Voucher: Ramos, C.G.V. 72 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Huperzia capillaris* (Sodiro) Holub**
Voucher: Prance, G.T. 20006 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Huperzia catharinae* (Christ) Holub**
Referência: Øllgaard, B. & Windisch, P.G. 1987. Bradea 5(1): 1-43.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Huperzia christii* (Silveira) Holub**
Voucher: Ramos, C.G.V. 68 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Huperzia comans* (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Sylvestre, L.S. 1766 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Huperzia deminuens* (Herter) B.Øllg.**
Referência: Øllgaard, B. & Windisch, P.G. 1987. Bradea 5(1): 1-43.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Huperzia dichotoma* (Jacq.) Trevis.**
Voucher: Toledo Jr., F.T. 1912 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Huperzia erythrocaulon* (Fée) Holub**
Voucher: Condack, J.P.S. 431 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Huperzia flexibilis* (Fée) B.Øllg.**
Voucher: Sylvestre, L.S. 567 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Huperzia fontinaloides* (Spring) Trevis.**
Voucher: Brade, A.C. 19722 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Huperzia friburgensis* (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Sylvestre, L.S. 2053 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Huperzia hemleri* (Nessel) B.Øllg.**
Voucher: Leitman, M. 324 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Huperzia heterocarpon* (Fée) Holub**
Voucher: Ramos, C.G.V. 20 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Huperzia hexasticha* B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Ramos, C.G.V. 51 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Huperzia hippuridea* (Christ) Holub**
Referência: Øllgaard, B. & Windisch, P.G. 1987. Bradea 5(1): 1-43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Huperzia intermedia* Trevis.**
Voucher: Labiak, P.H. 4239 (RB, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Huperzia itambensis* B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Almeida, T.E. 575 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Huperzia linifolia* (L.) Trevis.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Huperzia linifolia* var. *jenmanii* (Underw. & Lloyd) B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Jardim, J.G. 2655 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Huperzia loefgreniana* (Silveira) B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Sylvestre, L.S. 1854 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Huperzia mandiocana* (Raddi) Trevis.**
Voucher: Duarte, A.P. 5380 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Huperzia martii* (Wawra) Holub**
Voucher: Sano, P.T. H50865 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Huperzia mollicoma* (Spring) Holub**
Voucher: Brade, A.C. 14528 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Huperzia mooreana* (Baker) Holub**
Voucher: Matos, F.B. 1044 (CEPEC, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Huperzia nuda* (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Ramos, C.G.V. 40 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Huperzia pungentifolia* (Silveira) B.Øllg.**
Voucher: Condack, J.P.S. 424 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Huperzia quadrifariata* (Bory) Rothm.**
Voucher: Ramos, C.G.V. 19 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Huperzia recurvifolia* Rolleri**
Voucher: Labiak, P.H. 4123 (RB, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Huperzia reflexa* (Lam.) Trevis.**
Voucher: Ramos, C.G.V. 13 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Huperzia regnellii* (Maxon) B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Regnell, A.F. 1500 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Huperzia rostrifolia* (Silveira) Holub**
Referência: Øllgaard, B. & Windisch, P.G. 1987. Bradea 5(1): 1-43.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Huperzia rubra* (Cham. & Schltdl.) Rothm.**
Voucher: Martinelli, G. 2755 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Huperzia sellowiana* (Herter) B.Øllg.**
Voucher: Santos Lima, J. 13184 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Huperzia silveirae* (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Ramos, C.G.V. 24 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Huperzia taxifolia* (Sw.) Trevis.**
Voucher: Labiak, P.H. 242 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (CE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Huperzia treitubensis* (Silveira) B.Øllg.**
Voucher: Sucre, D. 6766 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Huperzia wilsonii* (Underw. & Lloyd) B.Øllg.**
Voucher: Cordeiro, M.R. 1215 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Lycopodiella Holub

12 espécies (2 endêmicas), 5 variedades (1 endêmica)
***Lycopodiella alopecuroides* (L.) Cranfill**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Lycopodiella alopecuroides* var. *duseniana* B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Condack, J.P.S. 410 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lycopodiella alopecuroides* var. *integerrima* (Spring) B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Sucre, D. 3711 (RB, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Lycopodiella alopecuroides* var. *tupiana* B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Siegel, B. 6 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Lycopodiella benjaminiana* P.G.Windisch**
Referência: Windisch, P.G. 1991. Bradea 6(3): 21-24.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Lycopodiella bradei* (Herter) B.Øllg.**
Voucher: Reitz, R. 5319 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Lycopodiella camporum* B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Irwin, H.S. 24586 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lycopodiella carnosa* (Silveira) B.Øllg.**
Voucher: Anderson, W.R. 36813 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS,); Cerrado, Mata Atlântica
***Lycopodiella caroliniana* (L.) Pic.Serm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Lycopodiella caroliniana* var. *meridionalis* (Underw. & Lloyd) B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Boom, B.M. 718 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Lycopodiella caroliniana* var. *paradoxa* (Mart.) B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Claussen, P. s.n. (NY 921380)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado
***Lycopodiella cernua* (L.) Pic.Serm.**
Voucher: Matos, F.B. 857 (RB, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Lycopodiella contexta* (Mart.) Holub**
Voucher: Brade, A.C. 13966 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Lycopodiella geometra* B.Øllg. & P.G.Windisch**
Voucher: Condack, J.P.S. 458 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Lycopodiella iuliformis* (Underw. & Lloyd) B.Øllg.**
Referência: Øllgaard, B. & Windisch, P.G. 1987. Bradea 5(1): 1-43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Lycopodiella pendulina* (Hook.) B.Øllg.**
Voucher: Farney, C. 1422 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Lycopodiella riofrioi* (Sodiro) B.Øllg.**
Referência: Øllgaard, B. & Windisch, P.G. 1987. Bradea 5(1): 1-43.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Lycopodium L.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Lycopodium assurgens* Fée**
Voucher: Brade, A.C. 15566 (HC, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Lycopodium clavatum* L.**
Voucher: Salino, A. 6191 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lycopodium jussiaei* Poir.**
Voucher: Toledo Jr., F.T. 826 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Lycopodium thyoides* Willd.**
Voucher: Ramos, C.G.V. 42 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

LYGODIACEAE

Iva Carneiro Leão Barros, Augusto César Pessôa Santiago, Ana Flora de Novaes Pereira
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Lygodium Sw.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Lygodium venustum* Sw.**
Voucher: Santiago, A.C.P. 02 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Lygodium volubile* Sw.**
Voucher: Santiago, A.C.P. 19 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

MARATTIACEAE

Paulo H. Labiak
3 gêneros, 14 espécies (7 endêmicas)

Danaea Sm.

12 espécies (5 endêmicas)
***Danaea arbuscula* Christenh. & Tuomisto**
Referência: Christenhuzs, M. 2007. Ann. Univ. Turku., A. 216: 1-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Danaea bipinnata* Tuomisto**
Referência: Christenhuzs, M. 2007. Ann. Univ. Turku., A. 216: 1-134.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Danaea cartilaginea* Christenh. & Tuomisto**
Voucher: Liesner, R. 16352 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Danaea excurrens* Rosenst.**
Referência: Christenhuzs, M. 2007. Ann. Univ. Turku., A. 216: 1-134.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Danaea geniculata* Raddi**
Voucher: Matos, F.B. 293 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Danaea leprieurii* Kunze**
Voucher: Prado, J. 1204 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Danaea media* Liebm.**
Referência: Christenhuzs, M. 2007. Ann. Univ. Turku., A, Tom. 216: 39.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Danaea moritziana* C.Presl**
Voucher: Schmalz, A. 122 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Danaea nodosa* (L.) Sm.**
Voucher: Daly, D.C. 6787 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Danaea simplicifolia* Rudge**
Referência: Christenhuzs, M. 2007. Ann. Univ. Turku., A, Tom. 216: 39.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Danaea trifoliata* Rchb. *ex* Kunze**
Voucher: Prado, J. 1365 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Danaea ulei* Christ**
Voucher: Ule, E.H.G. 5758 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Eupodium J.Sm.
1 espécie (1 endêmica)
***Eupodium kaulfussii* (J.Sm.) J.Sm.**
Voucher: Simonis, J. E. 30 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Marattia Kaulf.
1 espécie (1 endêmica)
***Marattia cicutifolia* Kaulf.**
Voucher: Labiak, P.H. 3508 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

MARSILEACEAE
Paulo G. Windisch
3 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica)

Marsilea L.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Marsilea ancylopoda* A.Braun**
Referência: Johson, D.M. 1986. Systematics of the New World Species of Marsilea – Marsileaceae 11:1-87.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); Mata Atlântica
***Marsilea crotophora* D.M.Johnson**
Voucher: Prance, G.T. 26143 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal
***Marsilea deflexa* A.Braun**
Referência: Johson, D.M. 1986. Sistematics of the New World Species of Marsilea – Marsileaceae 11:1-87.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PI); Cerrado
***Marsilea minuta* L.**
Voucher: Pickel, D.B. 3116 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Marsilea polycarpa* Hook. & Grev.**
Voucher: Cervi, A.C. 3250 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Pilularia L.
1 espécie (não endêmica)
***Pilularia americana* A.Braun**
Voucher: Dutra, J. s.n. (ICN 1224)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Regnellidium Lindm.
1 espécie (não endêmica)
***Regnellidium diphyllum* Lindm.**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 2574)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

METAXYACEAE
Lana da Silva Sylvestre
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Metaxya C.Presl
1 espécie (não endêmica)
***Metaxya rostrata* (Kunth) C.Presl**
Voucher: Austin, D.F. 7183 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Mata Atlântica

OLEANDRACEAE
Lana da Silva Sylvestre
1 gênero, 3 espécies (1 endêmica)

Oleandra Cav.
3 espécies (1 endêmica)
***Oleandra articulata* (Sw.) C.Presl**
Voucher: Mello-Silva, R. 1658 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Oleandra baetae* Damazio**
Voucher: Travassos, O. 336 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Oleandra pilosa* Hook.**
Voucher: Rosa, N.A. 1979 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

OPHIOGLOSSACEAE
João Paulo Santos Condack, Lana da Silva Sylvestre
2 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica)

Botrychium Sw.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Botrychium australe* R.Br.**
Voucher: Brade, A.C. 14533 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Botrychium virginianum* (L.) Sw.**
Voucher: Reitz, R. 68 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Ophioglossum L.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Ophioglossum crotalophoroides* Walter**
Voucher: Reitz, R. 147 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Ophioglossum ellipticum* Hook. & Grev.**
Voucher: Dutra, J. 476 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Ophioglossum nudicaule* L.f.**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (RB 36821)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Ophioglossum palmatum* L.**
Voucher: Brade, A.C. 19176 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Ophioglossum reticulatum* L.**
Voucher: Badini, J. 317 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

OSMUNDACEAE

Lana da Silva Sylvestre
2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Osmunda L.

1 espécie (não endêmica)
***Osmunda regalis* L.**
Voucher: Reitz, R. 1527 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Osmundastrum C.Presl

1 espécie (não endêmica)
***Osmundastrum cinnamomeum* (L.) C.Presl**
Voucher: Mynssen, C.M. 1117 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

PLAGIOGYRIACEAE

João Paulo Santos Condack
1 gênero, 1 espécie (1 endêmica)

Plagiogyria (Kunze) Mett.

1 espécie (1 endêmica)
***Plagiogyria fialhoi* (Fée & Glaz.) Copel.**
Voucher: Sylvestre, L.S. 1777 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

POLYPODIACEAE

Paulo H. Labiak, Regina Y. Hirai
17 gêneros, 152 espécies (68 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Campyloneurum C.Presl

21 espécies (5 endêmicas)
***Campyloneurum abruptum* (Lindm.) B.León**
Voucher: Prance, G.T. 10923 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Campyloneurum acrocarpon* Fée**
Voucher: Hatschbach, G. 16314 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Campyloneurum aglaolepis* (Alston) de la Sota**
Voucher: Kummrow, R. 1423 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Campyloneurum angustifolium* (Sw.) Fée**
Voucher: Daly, D.C. 8628 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Campyloneurum aphanophlebium* (Kunze) T.Moore**
Voucher: Prance, G.T. 7267 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Campyloneurum austrobrasilianum* (Alston) de la Sota**
Voucher: Kummrow, R. 1959 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Campyloneurum brevifolium* (Lodd. *ex* Link) Link**
Voucher: Vieira, MG 897 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Campyloneurum centrobrasilianum* Lellinger**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1898 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Campyloneurum chlorolepis* Alston**
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Campyloneurum coarctatum* (Kunze) Fée**
Voucher: Ule, E.H.G. 5607 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Campyloneurum decurrens* (Raddi) C.Presl**
Voucher: Dusén, P.K.H. 743 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Campyloneurum fallax* Fée**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2819 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Campyloneurum fuscosquamatum* Lellinger**
Voucher: Daly, D.C. 6802 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Campyloneurum lapathifolium* (Poir.) Ching**
Voucher: Brade, A.C. 20989 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Campyloneurum nitidum* (Kaulf.) C.Presl**
Voucher: Hatschbach, G. 24526 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Campyloneurum ophiocaulon* (Klotzsch) Fée**
Voucher: Pardo, M. 94 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Campyloneurum phyllitidis* (L.) C.Presl**
Voucher: Prado, J. 1315 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Campyloneurum repens* (Aubl.) C.Presl**
Voucher: Prado, J. 1273 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), Nordeste (PE, AL), Centro-Oeste (DF); Amazônia
***Campyloneurum rigidum* Sm.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 4458 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Campyloneurum vulpinum* (Lindm.) Ching**
Voucher: Mosén, C.W.M. 2220 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Campyloneurum wacketii* Lellinger**
Voucher: Wacket, M. 213 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Ceradenia L.E.Bishop

8 espécies (6 endêmicas)
***Ceradenia albidula* (Baker) L.E.Bishop**
Voucher: Labiak, P.H. 3567 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ceradenia capillaris* (Desv.) L.E.Bishop**
Voucher: Mexia, Y. 4059 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Ceradenia glaziovii* (Baker) Labiak**
Voucher: Campos-Porto, P. 311 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Ceradenia itatiaiensis* Labiak & Condack**
Voucher: Condack, J.P.S. 308 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ceradenia jungermannioides* (Klotzsch) L.E.Bishop**
Voucher: Moritz, J.W.K. 312 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ceradenia pruinosa* (Maxon) L.E.Bishop**
Voucher: Prance, G.T. 20063 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia
***Ceradenia spixiana* (Mart. *ex* Mett.) L.E.Bishop**
Voucher: Handro, O. 1186 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ceradenia warmingii* (C.Chr.) Labiak**
Voucher: Damazio, L.B. 1360 (OURP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Cochlidium Kaulf.

6 espécies (2 endêmicas)
***Cochlidium furcatum* (Hook. & Grev.) C.Chr.**
Voucher: Prance, G.T. 17802 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Cochlidium linearifolium* (Desv.) Maxon *ex* C.Chr.**
Voucher: Austin, D.F. 7320 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Cochlidium pumilum* Massee *ex* C.Chr.**
Voucher: Boom, B.M. 5765 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cochlidium punctatum* (Raddi) L.E.Bishop**
Voucher: Brade, A.C. 19168 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Cochlidium serrulatum* (Sw.) L.E.Bishop**
Voucher: Madison, M.T. 621 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cochlidium tepuiense* (A.C.Sm.) L.E.Bishop**
Voucher: Ule, E.H.G. 8515 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Dicranoglossum J.Sm.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Dicranoglossum desvauxii* (Klotzsch) Proctor**
Voucher: Prado, J. 1239 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, AM, AP, PA); Nordeste (BA, CE)Amazônia
***Dicranoglossum furcatum* (L.) J.Sm.**
Voucher: Labiak, P.H. 4619 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Grammitis Sw.

2 espécies (2 endêmicas)
***Grammitis fluminensis* Fée**
Voucher: Brade, A.C. 13157 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Grammitis leptopoda* (C.H.Wright) Copel.**
Voucher: Badini, J. 290 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Lellingeria A.R.Sm. & R.C.Moran

14 espécies (11 endêmicas)
***Lellingeria apiculata* (Kunze *ex* Klotzsch) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Brade, A.C. 20718 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Lellingeria brasiliensis* (Rosenst.) Labiak**
Voucher: Brade, A.C. 9633 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Lellingeria brevistipes* (Mett. *ex* Kuhn) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Brade, A.C. 19871 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lellingeria depressa* (C.Chr.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Labiak, P.H. 886 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Lellingeria hirsuta* A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Prance, G.T. 16110 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lellingeria itatimensis* (C.Chr.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Sehnem, A. 7300 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Lellingeria limula* (Christ) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Labiak, P.H. 965 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica
***Lellingeria myosuroides* (Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Farney, C. 857 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste; Amazônia
***Lellingeria organensis* (Gardner) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Brade, A.C. 19853 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lellingeria pumila* Labiak**
Voucher: Labiak, P.H. 4015 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Lellingeria schenckii* (Hieron.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Hatschbach, G. 30769 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lellingeria suspensa* (L.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Brade, A.C. 6591 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Lellingeria tamandarei* (Rosenst.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Brade, A.C. 17006 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Lellingeria wittigiana* (Fée & Glaz. *ex* Fée) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Brade, A.C. 20300 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Melpomene A.R.Sm. & R.C.Moran

8 espécies (4 endêmicas)
***Melpomene albicans* Lehnert**
Voucher: Ribas, O.S. 3080 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Melpomene firma* (J.Sm.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Boom, B.M. 6005 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Melpomene flabelliformis* (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Brade, A.C. 19025 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Melpomene melanosticta* (Kunze) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Damazio, L.B. 1870 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Melpomene moniliformis* (Lag. *ex* Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Brade, A.C. 16559 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Melpomene peruviana* (Desv.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Brade, A.C. 10098 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Melpomene pilosissima* (M.Martens & Galeotti) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Brade, A.C. 20661 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Melpomene xiphopteroides* (Liebm.) A.R.Sm. & R.C.Moran**
Voucher: Ule, E.H.G. 8517 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA); Amazônia

Microgramma C.Presl

18 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Microgramma acatallela* Alston**
Voucher: Matos, F.B. 577 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Microgramma baldwinii* Brade**
Voucher: Prado, J. 1282 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Microgramma bifrons* (Hook.) Lellinger**
Voucher: Daly, D.C. 8998 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Microgramma crispata* (Fée) R.M.Tryon & A.F.Tryon**
Voucher: Boldrin, A.H.L. 103 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Microgramma dictyophylla* (Kunze *ex* Mett.) de la Sota**
Voucher: Daly, D.C. 8955 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Microgramma geminata* (Schrad.) R.M.Tryon & A.F.Tryon**
Voucher: Salino, A. 6679 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Microgramma lindbergii* (Mett. *ex* Kuhn) de la Sota**
Voucher: Salino, A. 4449 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Microgramma lycopodioides* (L.) Copel.**
Voucher: Matos, F.B. 1374 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Microgramma megalophylla* (Desv.) de la Sota**
Voucher: Prance, G.T. 12595 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Microgramma microsoroides* Salino et al.**
Voucher: Almeida, T.E. 681 (BHCB, CVRD, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Micrograma mortoniana* de la Sota**
Voucher: Assis, E.L.M. 548 (COR)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Micrograma percussa* (Cav.) de la Sota**
Voucher: Labiak, P.H. 245 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Micrograma persicariifolia* (Schrad.) C.Presl**
Voucher: Lohmann, L.G. 600 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Micrograma reptans* (Cav.) A.R.Sm.**
Voucher: Daly, D.C. 8081 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Micrograma squamulosa* (Kaulf.) de la Sota**
Voucher: Schwartsburd, P.B. 43 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Micrograma tecta* (Kaulf.) Alston**
Distribuição: nativa; não endêmica
Micrograma tecta (*Kaulf.) Alston var. *tecta
Voucher: Labiak, P.H. 127 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Micrograma thurnii* (Baker) R.M.Tryon & Stolze**
Voucher: Prado, J. 1250 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Micrograma vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Copel.**
Voucher: Labiak, P.H. 160 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, CE, PB), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Micropolypodium Hayata

9 espécies (5 endêmicas)
***Micropolypodium achilleifolium* (Kaulf.) Labiak & F.B.Matos**
Voucher: Labiak, P.H. 3920 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Micropolypodium caucanum* (Hieron.) A.R.Sm.**
Voucher: Maguire, B. 60536 p.p. (UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micropolypodium gradatum* (Baker) Labiak & F.B.Matos**
Voucher: Labiak, P.H. 4099 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Micropolypodium nanum* (Fée) A.R.Sm.**
Voucher: Prado, J. 640 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Micropolypodium perpusillum* (Maxon) A.R.Sm.**
Voucher: Hirai, R.Y. 574 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Micropolypodium setosum* (Kaulf.) A.R.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 14146 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Micropolypodium taenifolium* (Jenman) A.R.Sm.**
Voucher: Amaral, I.L. 1649 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micropolypodium truncicola* (Klotzsch) A.R.Sm.**
Voucher: Maguire, B. 60536 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Micropolypodium* x *bradei* Labiak & F.B.Matos**
Voucher: Brade, A.C. 16676 p.p. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Niphidium J.Sm.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Niphidium crassifolium* (L.) Lellinger**
Voucher: Schwartsburd, P.B. 2992 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Niphidium rufosquamatum* Lellinger**
Voucher: Reitz, R. 4692 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Pecluma M.G.Price

18 espécies (8 endêmicas)
***Pecluma camptophyllaria* (Fée) M.G.Price**
Voucher: Macedo, A. 2383 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pecluma dispersa* (A.M.Evans) M.G.Price**
Voucher: Cutler, H.C. 8318 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Pecluma filicula* (Kaulf.) M.G.Price**
Voucher: Beetle, A.A. 1753 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pecluma hoehnii* (A.Samp.) Salino**
Voucher: Hoehne, F.C. 3808 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Pecluma hygrometrica* (Splitg.) M.G.Price**
Voucher: Daly, D.C. 7488 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia
***Pecluma imbeana* (Brade) Salino**
Voucher: Brade, A.C. 11633 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Pecluma insularis* (Brade) Salino**
Voucher: Becker, J. 808 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica
***Pecluma macedoi* (Brade) M.Kessler & A.R.Sm.**
Voucher: Macedo, A. 1098 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Pecluma paradiseae* (Langsd. & Fisch.) M.G.Price**
Voucher: Dusén, P.K.H. 17128 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pecluma pectinata* (L.) M.G.Price**
Voucher: Prance, G.T. 2784 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Pecluma pectinatiformis* (Lindm.) M.G.Price**
Voucher: Lindman, C.A.M. 493 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pecluma pilosa* (A.M.Evans) M.Kessler & A.R.Sm.**
Voucher: Matos, F.B. 626 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Pecluma plumula* (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) M.G.Price**
Voucher: Matos, F.B. 1339 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pecluma recurvata* (Kaulf.) M.G.Price**
Voucher: Matos, F.B. 1377 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pecluma robusta* (Fée) M.Kessler & A.R.Sm.**
Voucher: Bresolin, A. 583 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pecluma sicca* (Lindm.) M.G.Price**
Voucher: Dusén, P.K.H. 14141 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pecluma singeri* (de la Sota) M.G.Price**
Voucher: Dusén, P.K.H. 14880 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pecluma truncorum* (Lindm.) M.G.Price**
Voucher: Matos, F.B. 1536 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Phlebodium (R.Br.) J.Sm.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Phlebodium areolatum* (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) J.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 32567 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Phlebodium aureum* (L.) J.Sm.**
Voucher: Irwin, H.S. 15588 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Phlebodium decumanum* (Willd.) J.Sm.**
Voucher: Assis, E.L.M. 246 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Phlebodium pseudoaureum* (Cav.) Lellinger**
Voucher: Assis, E.L.M. 460 (COR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Pleopeltis Humb. & Bonpl. *ex* Willd.

13 espécies (5 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Pleopeltis alborufula* (Brade) Salino**
Voucher: Labiak, P.H. 4144 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pleopeltis astrolepis* (Liebm.) E.Fourn.**
Voucher: Labiak, P.H. 3975 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, BA), Centro-Oeste (MS) Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pleopeltis bombycina* (Maxon) A.R.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 11927 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Pleopeltis hirsutissima* (Raddi) de la Sota**
Voucher: Labiak, P.H. 4205 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Pleopeltis lepidopteris* (Langsd. & Fisch.) de la Sota**
Voucher: Sehnem, A. 3883 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pleopeltis macrocarpa* (Bory *ex* Willd.) Kaulf.**
Voucher: Labiak, P.H. 4537 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pleopeltis minarum* (Weath.) Salino**
Voucher: Claussen, P. 78 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Pleopeltis monoides* (Weath.) Salino**
Voucher: Matos, F.B. 281 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Pleopeltis pleopeltidis* (Fée) de la Sota**
Voucher: Sehnem, A. 972 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pleopeltis pleopeltifolia* (Raddi) Alston**
Voucher: Labiak, P.H. 3144 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pleopeltis polypodioides* (L.) L.E.G. Andrews & Windham**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pleopeltis polypodioides* var. *burchellii* (Baker) A.R.Sm.**
Voucher: Irwin, H.S. 13976 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado
***Pleopeltis squalida* (Vell.) de la Sota**
Voucher: Hatschbach, G. 26388 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pleopeltis trindadensis* (Brade) Salino**
Voucher: Pôrto, C. 585 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Polypodium L.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Polypodium chnoophorum* Kunze**
Voucher: Matos, F.B. 3722 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Polypodium dulce* Poir.**
Voucher: Mattos, F.B. 1093 (CEPEC, SP, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Mata Atlântica

Serpocaulon A.R.Sm.
13 espécies (8 endêmicas)
***Serpocaulon adnatum* (Kunze *ex* Klotzsch) A.R.Sm.**
Voucher: Zuquim, G.P.S. 212 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Serpocaulon caceresii* (Sodiro) A.R.Sm.**
Voucher: Daly, D.C. 10169 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Serpocaulon catharinae* (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 1222 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Serpocaulon fraxinifolium* (Jacq.) A.R.Sm.**
Voucher: Amorim, A.M. 4367 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Serpocaulon glandulosissimum* (Brade) Labiak & J.Prado**
Voucher: Labiak, P.H. 4457 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Serpocaulon latipes* (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 5288 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Serpocaulon levigatum* (Cav.) A.R.Sm.**
Voucher: Matos, F.B. 741 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Serpocaulon meniscifolium* (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.**
Voucher: Barcia, J. 593 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Serpocaulon mexiae* (Copel.) A.R.Sm.**
Voucher: Irwin, H.S. 34045 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Serpocaulon panorense* (C.Chr.) A.R.Sm.**
Voucher: Costa, M.A.S. 546 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Serpocaulon sehnemii* (Pic.Serm.) Labiak & J.Prado**
Voucher: Labiak, P.H. 3898 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Serpocaulon triseriale* (Sw.) A.R.Sm.**
Voucher: Labiak, P.H. 4013 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Serpocaulon vacillans* (Link) A.R.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 733 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Terpsichore A.R.Sm.
11 espécies (10 endêmicas)
***Terpsichore alfarii* (Donn.Sm.) A.R.Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 16675 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Terpsichore aspleniifolia* (L.) A.R.Sm.**
Voucher: Matos, F.B. 308 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Terpsichore bradeana* Labiak**
Voucher: Prance, G.T. 10075 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Terpsichore chrysleri* (Copel.) A.R.Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 8398 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Terpsichore cultrata* (Bory *ex* Willd.) A.R.Sm.**
Voucher: Tate, G.H. 465 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Terpsichore lanigera* (Desv.) A.R.Sm.**
Voucher: Tate, G.H. 501 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Terpsichore reclinata* (Brack.) Labiak**
Voucher: Brade, A.C. 5237 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Terpsichore semihirsuta* (Klotzsch) A.R.Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 9509 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Terpsichore senilis* (Fée) A.R.Sm.**
Voucher: Spruce, R. 1720 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Terpsichore steyermarkii* Labiak**
Voucher: Luetzelburg, P. 18202 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Terpsichore taxifolia* (L.) A.R.Sm.**
Voucher: Labiak, P.H. 963 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

Zygophlebia L.E.Bishop
1 espécie (1 endêmica)
***Zygophlebia longipilosa* (C.Chr.) L.E.Bishop**
Voucher: Brade, A.C. 16673 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

PSILOTACEAE
Lana da Silva Sylvestre
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Psilotum Sw.
1 espécie (não endêmica)
***Psilotum nudum* (L.) P.Beauv.**
Voucher: Winter, S.L.S. 99 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

PTERIDACEAE
Jefferson Prado
22 gêneros, 182 espécies (65 endêmicas), 6 variedades (1 endêmica)

Acrostichum L.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Acrostichum* aureum L.**
Voucher: Rose, J.N. 19637 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Acrostichum danaeifolium* Langsd. & Fisch.**
Voucher: Hatschbach, G. 10199 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Adiantopsis Fée

8 espécies (5 endêmicas)
***Adiantopsis cheilanthoides* R.M.Senna**
Voucher: Senna, R.M. 208 (HAS, HBR, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Adiantopsis chlorophylla* (Sw.) Fée**
Voucher: Heringer, E.P. 16576 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Adiantopsis minutula* Sehnem**
Voucher: Shaefer, O.F.M. 69 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Adiantopsis monticola* (Hook.) T.Moore**
Voucher: Gardner, G. 3557 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste; Cerrado
***Adiantopsis occulta* Sehnem**
Voucher: Sehnem, A. 3568 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Adiantopsis perfasciculata* Sehnem**
Voucher: Smith, L.B. 17 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Adiantopsis radiata* (L.) Fée**
Voucher: Gomes, S.M. 76 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Adiantopsis* x *australopedata* Hickey et al.**
Voucher: Jürgens, C. 173a (UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Adiantum L.

62 espécies (18 endêmicas)
***Adiantum abscissum* Schrad.**
Voucher: Prado, J. 1578 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Adiantum adiantoides* (J.Sm.) C.Chr.**
Voucher: Egler, W.A. 46707 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Adiantum argutum* Splitg.**
Voucher: Prado, J. 1344 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Adiantum cajennense* Willd. *ex* Klotzsch**
Voucher: Prado, J. 1233 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Adiantum calcareum* Gardner**
Voucher: Heringer, E.P. 8269/463 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Adiantum cinnamomeum* Lellinger & J.Prado**
Voucher: Prance, G.T. 22691 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (DF); Amazônia
***Adiantum concinnum* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Pires, J.M. 9698a (F, HB, K, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Adiantum curvatum* Kaulf.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 15012 (GH, MBM, MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Adiantum dawsonii* Lellinger & J.Prado**
Voucher: Gomes, S.M. 113 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Adiantum decoratum* Maxon & Weath.**
Voucher: Daly, D.C. 10164 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Adiantum deflectens* Mart.**
Voucher: Santos, G.B. 36 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado
***Adiantum delicatulum* Mart.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 1191 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
***Adiantum digitatum* Hook.**
Voucher: Sacco, J.C. 1241 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Adiantum diogoanum* Glaz. *ex* Baker**
Voucher: Daly, D.C. 9385 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum diphyllum* (Fée) Maxon**
Voucher: Thomas, W. W. 10570 (CEPEC, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Adiantum discolor* J.Prado**
Voucher: Kameyama, C. 82 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Adiantum dolosum* Kunze**
Voucher: Prado, J. 1249 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum giganteum* J.Prado**
Voucher: Mexia, Y. 6013 (MO, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE); Amazônia
***Adiantum glaucescens* Klotzsch**
Voucher: Prado, J. 1954 (NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum gracile* Fée**
Voucher: Heringer, E.P. 3767 (IBGE, MBM, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Adiantum humile* Kunze**
Voucher: Prado, J. 1246 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum incertum* Lindm.**
Voucher: Hatschbach, G. 23171 (HB, MBM, MO, PACA, UC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Adiantum intermedium* Sw.**
Voucher: Heringer, E.P. 6901 (IBGE, MG, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Adiantum latifolium* Lam.**
Voucher: Prado, J. 1294 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum leprieurii* Hook.**
Voucher: Figueiredo, F.O. 460 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Adiantum lorentzii* Hieron.**
Voucher: Irwin, H.S. 11338 (GH, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Adiantum lucidum* (Cav.) Sw.**
Voucher: Prance, G.T. 14632 (NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum macrophyllum* Sw.**
Voucher: Toler, R. 19 (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum mathewsianum* Hook.**
Voucher: Forzza, R.C. 828 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Adiantum multisorum* A. Samp.**
Voucher: Prado, J. 1358 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum mynsseniae* J.Prado**
Voucher: Mynssen, C.M. 356 (MBM, NY, RB, RUSU, SP, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Adiantum nudum* A.R.Sm.**
Voucher: Daly, D.C. 8854 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Adiantum obliquum* Willd.**
Voucher: Prado, J. 1259 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum ornithopodum* C.Presl *ex* Kuhn**
Voucher: Valente, G. 880 (SP, VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Adiantum papillosum* Handro**
Voucher: Graçano, D. 159 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Adiantum paraense* Hieron.**
Voucher: Prance, G.T. 6445 (INPA, NY, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Adiantum patens* Willd.**
Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Amazônia
***Adiantum pectinatum* Kunze *ex* Baker**
Voucher: Walter, B.M.T. 3761 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Adiantum pentadactylon* Langsd. & Fisch.**
Voucher: Eiten, G. 2081 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Adiantum petiolatum* Desv.**
Voucher: Prado, J. 1275 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum philippense* L.**
Voucher: Plowman, T. 8513 (GH, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum phyllitidis* J.Sm.**
Voucher: Sampaio, A. 5217 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum platyphyllum* Sw.**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 2114 (MBM, SJRP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Adiantum poeppigianum* (Kuhn) Hieron.**
Voucher: Daly, D.C. 9810 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Adiantum poiretii* Wikstr.**
Voucher: Lindman, A. 983 (BM, GH, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Adiantum pseudotinctum* Hieron.**
Voucher: Reitz, R. 6700 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Adiantum pulverulentum* L.**
Voucher: Daly, D.C. 7365 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum raddianum* C.Presl**
Voucher: Irwin, H.S. 14011 (GH, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Adiantum rhizophytum* Schrad.**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 1779 (MBM, MO, SJRP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Adiantum ruizianum* Klotzsch**
Voucher: Salino, A. 182 (GH, HB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Adiantum scalare* R.M.Tryon**
Voucher: Prance, G.T. 7335 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Adiantum senae* Baker**
Voucher: Rodrigues, C.E. 645 (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Adiantum serratodentatum* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Pirani, J.R. 3194 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Adiantum sinuosum* Gardner**
Voucher: Heringer, E.P. 16727 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Adiantum subcordatum* Sw.**
Voucher: Hoehne, W. 3260 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Adiantum terminatum* Kunze *ex* Miq.**
Voucher: Prado, J. 1354 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum tetragonum* Schrad.**
Voucher: Jardim, J.G. 3153 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Adiantum tetraphyllum* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Daly, D.C. 11878 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Adiantum tomentosum* Klotzsch**
Voucher: Prance, G.T. 11390 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Adiantum villosum* L.**
Voucher: Sehnem, A. 9884 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum windischii* J.Prado**
Voucher: Prado, J. 1276 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Adiantum* x *moranii* J.Prado**
Voucher: Prance, G.T. 13949 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica

Ananthacorus Underw. & Maxon

1 espécie (não endêmica)
***Ananthacorus angustifolius* (Sw.) Underw. & Maxon**
Voucher: Daly, D.C. 7495 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

Anetium (Kunze) Splitg.

1 espécie (não endêmica)
***Anetium citrifolium* (L.) Splitg.**
Voucher: Prance, G.T. 7426 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

Anogramma Link

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Anogramma chaerophylla* (Desv.) L.Link**
Voucher: Brade, A.C. 12569 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Anogramma leptophylla* Link**
Voucher: Sehnem, A. 1352 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Anogramma lorentzii* (Hieron.) Diels**
Voucher: Eugênio-Leite, J. 1850 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Anogramma osteniana* Dutra**
Voucher: Eugênio-Leite, J. 1851 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Argyrochosma (J.Sm.) Windham

1 espécie (não endêmica),
2 variedades (nenhuma endêmica)
***Argyrochosma nivea* (Poir.) Windham**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Argyrochosma nivea* var. *flava* (Hook.) Ponce**
Voucher: Reitz, R. 3335 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Argyrochosma nivea* var. *tenera* (Gillies *ex* Hook.) Ponce**
Referência: Ponce, M.M. 1996. Hickenia 2: 177-178.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Ceratopteris Brongn.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Ceratopteris pteridoides* (Hook.) Hieron.**
Voucher: Eugênio-Leite, J. 60 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal
***Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn.**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 1730 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal

Cheilanthes Sw.

16 espécies (7 endêmicas)
***Cheilanthes bradei* J.Prado & A.R.Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 13494 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cheilanthes dichotoma* Sw.**
Voucher: Sehnem, A. 7967 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Cheilanthes eriophora* (Fée) Mett.**
Referência: Smith, A.R. 2005. Fl. Venez. Guayana 2: 1-334.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cheilanthes flexuosa* Kunze**
Voucher: Stannard, B.L. H51634 (K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Cheilanthes geraniifolia* (Weath.) R.M.Tryon & A.F.Tryon**
Voucher: Assis, E.L.M. 492 (COR, SI, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Cheilanthes goyazensis* (Taub.) Domin**
Voucher: Prado, J. 1403 (NY, SP, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, MG), Sul (PR); Cerrado
***Cheilanthes hassleri* (Weath.) Ponce**
Voucher: Damasceno Jr., G.A. 4196 (COR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Cheilanthes hieronymi* Herter**
Voucher: Herter, W.G. 3153 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Cheilanthes incisa* Kunze *ex* Mett.**
Voucher: Braga, J.M.A. 4427 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cheilanthes juergensii* Rosenst.**
Voucher: Sehnem, A. 12278 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Cheilanthes micropteris* Sw.**
Voucher: Prado, J. 2132 (DUKE, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Cheilanthes obducta* Mett. *ex* Kuhn**
Voucher: Assis, E.L.M. 574 (COR, SI, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Cheilanthes pantanalensis* E.Assis et al.**
Voucher: Assis, E.L.M. 364 (UPCB, SI, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Cheilanthes pohliana* Mett.**
Voucher: Godoy, F.D. 5 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Cheilanthes regnelliana* Mett.**
Voucher: Prado, J. 1062 (MU, NY, P, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Cheilanthes regularis* Mett.**
Voucher: Prado, J. 830 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Doryopteris J.Sm.

27 espécies (16 endêmicas)
***Doryopteris acutiloba* (Prantl) Diels**
Voucher: Sylvestre, L.S. 361 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Doryopteris collina* (Raddi) J.Sm.**
Voucher: Prado, J. 1402 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Doryopteris concolor* (Langsd. & Fisch.) J.Sm.**
Voucher: Prado, J. 2133 (MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Doryopteris conformis* K.U.Kramer & R.M.Tryon**
Referência: Smith, A.R. 2005. Fl. Venez. Guayana 2: 1-334.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Doryopteris crenulans* (Fée) Christ**
Voucher: Dusén, P.K.H. 15099 (G, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Doryopteris hybrida* Brade & Rosenst.**
Voucher: Brade, A.C. 7697 (G, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Doryopteris itatiaiensis* (Fée) Christ**
Voucher: Condack, J.P.S. 528 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Doryopteris jequitinhonhensis* Salino**
Voucher: Salino, A. 9425 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Doryopteris juergensii* Rosenst.**
Voucher: Jürgens, C. 126 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Doryopteris lomariacea* Klotzsch**
Voucher: Hatschbach, G. 6431 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Doryopteris lorentzii* (Hieron.) Diels**
Voucher: Luederwaldt 1838 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Doryopteris nobilis* (T.Moore) C.Chr.**
Voucher: Croat, T.B. 53766 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Doryopteris ornithopus* (Hook. & Baker *ex* Mett.) J.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 31623 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado
***Doryopteris paradoxa* (Fée) Christ**
Voucher: Brade, A.C. 110093 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Doryopteris patula* Fée**
Voucher: Yesilyurt, J.C. 564 (BM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Doryopteris pentagona* Pic.Serm.**
Voucher: Boldrin, A.H.L. 206 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Doryopteris quinquelobata* (Fée) Diels**
Voucher: Brade, A.C. 8634 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Doryopteris rediviva* Fée**
Voucher: Sylvestre, L.S. 1870 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Doryopteris rosenstockii* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 9257 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Doryopteris rufa* Brade**
Referência: Tryon, R.M. 1942. Contr. Gray Herb. 143: 1-80.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Doryopteris sagittifolia* (Raddi) J.Sm.**
Voucher: Prado, J. 1108 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Doryopteris subsimplex* (Fée) Diels**
Voucher: Lima 13130 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Doryopteris tijucana* Brade & Rosenst.**
Voucher: Brade, A.C. 8598 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Doryopteris trilobata* J.Prado**
Voucher: Harley, R.M. 25574 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Doryopteris triphylla* (Lam.) Christ**
Voucher: Spannagel, C. 56 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Doryopteris varians* (Raddi) J.Sm.**
Voucher: Damazio, L.B. 1816 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Doryopteris* x *scalaris* Sehnem**
Voucher: Sehnem, A. 2813 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Eriosorus Fée

8 espécies (6 endêmicas)
***Eriosorus areniticola* Schwartsb. & Labiak**
Voucher: Labiak, P.H. 182 (SP, UC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR); Mata Atlântica
***Eriosorus biardii* (Fée) A.F.Tryon**
Voucher: Prado, J. 775 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Eriosorus cheilanthoides* (Sw.) A.F.Tryon**
Voucher: Tryon, R.M. 6724a (GH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriosorus insignis* (Kuhn) A.F.Tryon**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12310 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eriosorus myriophyllus* (Sw.) Copel.**
Voucher: Prado, J. 999 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Eriosorus rufescens* (Fée) A.F.Tryon**
Voucher: Capell, P. s.n. (FCAB 0273)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eriosorus schwackeanus* (Christ) Copel.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (SP 21572)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eriosorus sellowianus* (Mett. *ex* Kuhn) Copel.**
Voucher: Prado, J. CFSC 10983 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hecistopteris J.Sm.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hecistopteris kaieteurensis* Kelloff & G.S.McKee**
Voucher: Araújo, I. 100 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hecistopteris pumila* (Spreng.) J.Sm.**
Voucher: Prado, J. 618 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

Hemionitis L.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Hemionitis palmata* L.**
Voucher: Pontual, I.B. s.n. (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Hemionitis rufa* L.Sw.**
Voucher: Zuquim, G.P.S. 206 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Hemionitis tomentosa* (Lam.) Raddi**
Voucher: Heringer, E.P. 8175/369 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Jamesonia Hook. & Grev.

1 espécie (não endêmica)
***Jamesonia brasiliensis* Christ**
Voucher: Prado, J. 1122 (SP, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Pellaea Link

6 espécies (6 endêmicas)
***Pellaea crenata* R.M.Tryon**
Voucher: Prado, J. 1409 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pellaea cymbiformis* J.Prado**
Voucher: Furlan, A. CFCR 3271 (HB, K, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pellaea flavescens* Fée**
Voucher: Prado, J. 2036 (DUKE, MO, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Pellaea gleichenioides* (Gardner) Christ**
Voucher: Barreto, H.L.M. 9711 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pellaea pinnata* (Kaulf.) Prantl**
Voucher: Brade, A.C. 14396 (HB, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Pellaea riedelii* Baker**
Voucher: Prado, J. CFSC 10227 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Pityrogramma Link

3 espécies (nenhuma endêmica),
2 variedades (nenhuma endêmica)

***Pityrogramma calomelanos* (L.) Link**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Pityrogramma calomelanos* var. *aureoflava* (Hook.) Weath. *ex* L.H.Bailey**
Referência: Tryon, R.M. 1962. Contr. Gray Herb. 189: 52-76.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Pityrogramma calomelanos* (L.) Link var. *calomelanos
Voucher: Heringer, E.P. 5608 (IBGE, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Pityrogramma ebenea* (L.) Proctor**
Voucher: Pereira, B.A.S. 535 (IBGE, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Pityrogramma trifoliata* (L.) R.M.Tryon**
Voucher: Pires, J.M. 9912 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Polytaenium Desv.

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Polytaenium cajenense* (Desv.) Benedict**
Voucher: Daly, D.C. 11688 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Polytaenium feei* (W.Schaffn. *ex* Fée) Maxon**
Voucher: Válio, I.M. 102 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Polytaenium guayanense* (Hieron.) Alston**
Voucher: Prado, J. 1248 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Polytaenium lineatum* (Sw.) J.Sm.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 4716 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Pteris L.

22 espécies (6 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Pteris altissima* Poir.**
Voucher: Brade, A.C. 21366 (HB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Pteris angustata* (Fée) C.V.Morton**
Voucher: Brade, A.C. 8244 (HB, HRCB, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pteris biaurita* L.**
Voucher: Eugênio, J. 22 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Pteris brasiliensis* Raddi**
Voucher: Prado, J. 2112 (NY, SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pteris congesta* J.Prado**
Voucher: Smith, L.B. 1353 (BM, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pteris decurrens* C.Presl**
Voucher: Tryon, R.M. 6590 (GH, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pteris deflexa* Link**
Voucher: Brade, A.C. 21364 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pteris denticulata* Sw.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Pteris denticulata* Sw. var. *denticulata
Voucher: Windisch, P.G. 271 (HB, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Pteris denticulata* var. *tristicula* (Raddi) J.Prado**
Voucher: Heringer, E.P. 5645 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Pteris grandifolia* L.**
Voucher: Maas, P.J.M. 13239 (INPA, K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pteris haenkeana* C.Presl**
Voucher: Daly, D.C. 11426 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pteris lechleri* Mett.**
Voucher: Brade, A.C. 9318 (BM, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pteris leptophylla* Sw.**
Voucher: Heringer, E.P. 1508 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Pteris limae* Brade**
Voucher: Lima, J. 36 (BM, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Domínio desconhecido

***Pteris pearcei* Baker**
Voucher: Prance, G.T. 10169 (INPA, K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Pteris plumula* Desv.**
Voucher: Prado, J. 384 (SPF, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Pteris podophylla* Sw.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 68-5413 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Pteris propinqua* J.Agardh**
Voucher: Smith, J.P.G. 129 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Pteris pungens* Willd.**
Voucher: Maas, P.J.M. 13011 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Pteris schwackeana* Christ**
Voucher: Brade, A.C. 19953 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Pteris splendens* Kaulf.**
Voucher: Eugênio, J. 1354 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pteris tripartita* Sw.**
Voucher: Zuquim, G.P.S. 171 (INPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (AL); Amazônia, Mata Atlântica
***Pteris vittata* L.**
Voucher: Heringer, E.P. 10274 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Pterozonium Fée
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pterozonium maguirei* Lellinger**
Voucher: Farney, C. 842 (INPA, MO, RB, SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pterozonium scopulinum* Lellinger**
Voucher: Prance, G.T. 29147 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Radiovittaria (Benedict) E.H.Crane
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Radiovittaria gardneriana* (Fée) E.H.Crane**
Voucher: Brade, A.C. 12240 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Radiovittaria stipitata* (Kunze) E.H.Crane**
Voucher: Labiak, P.H. 63 (SP, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Trachypteris André *ex* Christ
1 espécie (1 endêmica)
***Trachypteris gilliana* (Baker) Svenson**
Voucher: Sehnem, A. 16831 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

Vittaria Sm.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Vittaria costata* Kunze**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 5151 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Vittaria graminifolia* Kaulf.**
Voucher: Nonato, F.R. 608 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Vittaria lineata* (L.) Sm.**
Voucher: Windisch, P.G. 2501 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Vittaria scabrida* Klotzsch *ex* Fée**
Voucher: Labiak, P.H. 268 (SP, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

SACCOLOMATACEAE
Pedro Bond Schwartsburd
1 gênero, 4 espécies (1 endêmica)

Saccoloma Kaulf.
4 espécies (1 endêmica)
***Saccoloma brasiliense* (C.Presl) Mett.**
Voucher: Mynssen, C.M. 1091 (RB, SP, TUR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Saccoloma elegans* Kaulf.**
Voucher: Matos, F.B. 1131 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Saccoloma inaequale* (Kunze) Mett.**
Voucher: Prado, J. 1203 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Saccoloma membranaceum* Mickel**
Referência: Prado, J. & Moran, R.C. 2009. Fern Gaz. 18(5): 257.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

SALVINIACEAE
Alexandre Salino, Thais Elias Almeida
2 gêneros, 11 espécies (4 endêmicas)

Azolla Lam.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Azolla caroliniana* Willd.**
Voucher: Salino, A. 9103 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Azolla filiculoides* Lam.**
Voucher: Reitz, R. 3876 (HBR, PACA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal
***Azolla microphylla* Kaulf.**
Voucher: Silva, J.M. 2067 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, SE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Salvinia Ség.
8 espécies (4 endêmicas)
***Salvinia adnata* Desv.**
Voucher: Forno, I.W. 28c (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Salvinia auriculata* Aubl.**
Voucher: Mitchell, D.S. 1235 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Salvinia biloba* Raddi**
Voucher: Forno, I.W. 33c (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Salvinia martynii* Kopp**
Referência: de la Sota, E. & Pazos, L.A.C 1992. Darwiniana 31: 316.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Salvinia minima* Baker**
Voucher: Almeida, T.E. 693 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Salvinia nuriana* de la Sota**
Referência: de la Sota, E. & Pazos, L.A.C 1997. Notes on the Neotropical species of Salvinia Séguier: In Johns, R.J. Ed.), Holttum Memorial Volume, pp. 193-201. Royal Botanic Gardens 1: 194.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Salvinia oblongifolia* Mart.**
Voucher: Salino, A. 8012 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Salvinia sprucei* Kuhn**
Voucher: Spruce, R. 1636 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

SCHIZAEACEAE

Iva Carneiro Leão Barros, Augusto César Pessôa Santiago, Ana Flora de Novaes Pereira
2 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica)

Actinostachys Wall.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Actinostachys pennula* (Sw.) Hook.**
Voucher: Rodrigues, W.R. 2645 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Actinostachys subtrijuga* (Mart.) C.Presl**
Voucher: Santiago, A.C.P. 48 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste, Sul; Amazônia

Schizaea Sm.

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Schizaea elegans* (Vahl) Sw.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 5535 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Schizaea fluminensis* Miers *ex* J.W.Sturm**
Voucher: Costa, M.A.S. 415 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Schizaea incurvata* Schkuhr**
Voucher: Prance, G.T. 11340 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia, Cerrado
***Schizaea poeppigiana* J.W.Sturm**
Referência: Sturm, J.W. 1859. Fl. bras. 2(2):1-711
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Schizaea stricta* Lellinger**
Voucher: Costa, M.A.S. 760 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

SELAGINELLACEAE

Regina Y. Hirai
1 gênero, 55 espécies (15 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)

Selaginella P.Beauv.

55 espécies (15 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)
***Selaginella amazonica* Spring**
Voucher: Spruce, R. 2358 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella anceps* (C.Presl) C.Presl**
Voucher: Daly, D.C. 7891 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Selaginella applanata* A.Braun**
Referência: Smith, A.R. 1995. Fl. Venez. Guayana 2:296-314.
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia
***Selaginella arenaria* Baker**
Voucher: Spruce, R. 2861 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella articulata* (Kunze) Spring**
Referência: Tryon, R.M. & Stolze, R.G. 1994. Fieldiana, Bot. 34: 66-88.
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia
***Selaginella asperula* Spring**
Voucher: Costa, M.A.S. 713 (INPA, K, MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Selaginella bahiensis* Spring**
Distribuição: nativa; endêmica
Selaginella bahiensis* Spring subsp. *bahiensis
Voucher: Blanchet, J.S. 549 (G, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Selaginella bahiensis* subsp. *manausensis* (Bautista) Jermy & J.M.Rankin**
Voucher: Rodrigues, W. 8588 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella brevifolia* Baker**
Voucher: Spruce, R. 2328 (BM, CGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella breynii* Spring**
Voucher: Costa, M.A.S. 702 (INPA, K, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Selaginella calceolata* Jermy & J.M.Rankin**
Voucher: Spruce, R. 2861 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella cladorrhizans* A.Braun**
Voucher: Traill, J.W.H. 1436 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Selaginella coarctata* Spring**
Voucher: Schomburgk, R. 979 (BM, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella conduplicata* Spring**
Voucher: Prado, J. 568 (INPA, K, MG, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella contigua* Baker**
Voucher: Hoehne, F.C. 4112a (CESJ, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Selaginella convoluta* (Arn.) Spring**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 1780 (HB, MBM, SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Selaginella decomposita* Spring**
Voucher: Kameyama, C. 127 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Selaginella dendricola* Jenman**
Voucher: Spruce, R. 2535 (BM, CGE, K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella epirrhizos* Spring**
Voucher: Ule, E.H.G. 9141 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella erectifolia* Spring**
Voucher: Badini, J. 316 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Selaginella erythropus* (Mart.) Spring**
Voucher: Hoehne, F.C. 921 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Selaginella exaltata* (Kunze) Spring**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1722 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Selaginella flagellata* Spring**
Voucher: Ule, E.H.G. 5524 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Selaginella flexuosa* Spring**
Voucher: Kameyama, C. 128 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Selaginella fragilis* A.Braun**
Voucher: Schultes, R.E. 9838 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella fragillima* Silveira**
Voucher: Sasaki, D. 434 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Selaginella haematodes* (Kunze) Spring**
Voucher: Daly, D.C. 11141 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Selaginella homaliae* A.Braun**
Voucher: Spruce, R. 2534 (BM, CGE, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella jungermannioides* (Gaudich.) Spring**
Voucher: Alston, A.H.G. 9004 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Selaginella kochii* Hieron.**
Voucher: Schultes, R.E. 9176 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella kraussiana* (Kunze) A.Braun**
Voucher: Hoehne, F.C. 222 (CESJ, SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Selaginella macrostachya* (Spring) Spring**
Voucher: Prado, J. 317 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Selaginella marginata* (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) Spring**
Voucher: Labiak, P.H. 671 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Selaginella mendoncae* Hieron.**
Voucher: Pirani, J.R. 3103 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Selaginella microphylla* (Kunth) Spring**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 466 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Selaginella minima* Spring**
Voucher: Anderson, W.R. 7863 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Selaginella muscosa* Spring**
Voucher: Hirai, R.Y. 83 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Selaginella palmiformis* Alston *ex* Crabbe & Jermy**
Voucher: Costa, M.A.S. 673 (INPA, K, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella parkeri* (Hook. & Grev.) Spring**
Voucher: Prado, J. 644 (INPA, K, MBM, MG, MO, NY, RB, SP, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Selaginella pedata* Klotzsch**
Voucher: Costa, M.A.S. 446 (IAN, INPA, KNY, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella plana* (Desv. *ex* Poir.) Hieron.**
Voucher: Wells-Windisch, R. 583 (HB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Selaginella porelloides* (Lam.) Spring**
Voucher: Anderson, W.R. 9901 (NY, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Selaginella producta* Baker**
Voucher: Thohmas, W.W. 11506 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA) Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Selaginella radiata* (Aubl.) Spring**
Voucher: Black, G.A. 16330 (BM, IAN, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Selaginella revoluta* Baker**
Voucher: Spruce, R. 2195 (BM, CGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella sellowii* Hieron.**
Voucher: Yano, O. 825 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Selaginella simplex* Baker**
Voucher: Loefgren, A. 1160 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE); Amazônia, Caatinga
***Selaginella suavis* (Spring) Spring**
Voucher: Yano, O. 799 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Selaginella sulcata* (Desv. *ex* Poir.) Spring *ex* Mont.**
Voucher: Luederwaldt, H. 1659 (BM, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Selaginella tenuissima* Fée**
Voucher: Windisch, P.G. 6824a (SJRP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Selaginella terezoana* Bautista**
Voucher: Terezo, E.F. 32 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Selaginella trisulcata* Aspl.**
Voucher: Prance, G.T. 1866 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Selaginella tuberculata* Spruce *ex* Baker**
Voucher: Spruce, R. 2940 (BM, CGE, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Selaginella valida* Alston**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 3904 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Selaginella vestiens* Baker**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11723 (BM, C, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Selaginella vogelii* Spring**
Voucher: Salino, A. 1045 (UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

TECTARIACEAE

Jefferson Prado
2 gêneros, 14 espécies (3 endêmicas)

Tectaria Cav.

7 espécies (3 endêmicas)
***Tectaria buchtienii* (Rosenst.) Maxon**
Voucher: Reitz, R. 2818 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Tectaria draconoptera* (D.C.Eaton) Copel.**
Voucher: Daly, D.C. 9882 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Tectaria incisa* Cav.**
Voucher: Daly, D.C. 7493 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Tectaria pilosa* (Fée) R.C.Moran**
Voucher: Labiak, P.H. 22 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Tectaria plantaginea* (Jacq.) Maxon**
Referência: Smith, A.R. 1995. Fl. Venez. Guayana 2: 1-706.
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia
***Tectaria trifoliata* (L.) Cav.**
Voucher: Daly, D.C. 1229 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Tectaria trinitensis* Maxon**
Referência: Smith, A.R. 1995. Fl. Venez. Guayana 2: 1-706.
Distribuição: nativa; endêmica; Amazônia

Triplophyllum Holttum

7 espécies (nenhuma endêmica)
***Triplophyllum angustifolium* Holttum**
Voucher: Conant, D. 1005 (GH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Triplophyllum boliviense* J.Prado & R.C.Moran**
Voucher: Daly, D.C. 8463 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (PE, AL); Amazônia, Mata Atlântica
***Triplophyllum crassifolium* Holttum**
Voucher: Zuquim, G.P.S. 158 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); Amazônia
***Triplophyllum dicksonioides* (Fée) Holttum**
Voucher: Prance, G.T. 2174 (GH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Triplophyllum funestum* (Kunze) Holttum**
Voucher: Prance, G.T. 10754 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Triplophyllum glabrum* J.Prado & R.C.Moran**
Voucher: Secco, R.S. 292 (GH, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Triplophyllum hirsutum* (Holttum) J.Prado & R.C.Moran**
Voucher: Thomas, W.W. 9255 (NY, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

THELYPTERIDACEAE

Alexandre Salino, Thais Elias Almeida
2 gêneros, 87 espécies (46 endêmicas),
6 variedades (nenhuma endêmica)

Macrothelypteris (H.Ito) Ching

1 espécie (não endêmica)
***Macrothelypteris torresiana* (Gaudich.) Ching**
Voucher: Salino, A. 11401 (BHCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Thelypteris Schmidel

86 espécies (46 endêmicas),
6 variedades (nenhuma endêmica)

***Thelypteris abbiattii* C.F.Reed**
Voucher: Hatschbach, G. 40287 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris abrupta* (Desv.) Proctor**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 5261 (BHCB, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica

***Thelypteris amambayensis* (Christ) Ponce**
Voucher: Hatschbach, G. 25469 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris angustifolia (*Willd.) Proctor**
Voucher: Windisch, P.G. 1905 (HB, HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris anoptera* (Kunze *ex* Kuhn) C.F.Reed**
Voucher: Salino, A. 9052 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Thelypteris araucariensis* Ponce**
Voucher: Salino, A. 8452 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Thelypteris arborescens* (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) C.V.Morton**
Voucher: Conant, D. 894 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Thelypteris aspidioides* (Willd.) R.M.Tryon**
Voucher: Irwin, H.S. 29545 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Thelypteris berroi* (C.Chr.) C.F.Reed**
Voucher: Salino, A. 453 (BHCB, UC, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris biformata* (Rosenst.) R.M.Tryon**
Voucher: Ranal, M. 478 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Thelypteris biolleyi* (Christ) Proctor**
Voucher: Prance, G.T. 26488 (NY, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Thelypteris burkartii* Abbiatti**
Voucher: Salino, A. 1675 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Thelypteris cheilanthoides* (Kunze) Proctor**
Voucher: Salino, A. 4577 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris chrysodioides* (Fée) C.V.Morton**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 2020 (BHCB, HB, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris concinna* (Willd.) Ching**
Voucher: Salino, A. 7187 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris conspersa* (Schrad.) A.R.Sm.**
Voucher: Salino, A. 486 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris cuneata* (C.Chr.) C.F.Reed**
Voucher: Brade, A.C. 8234 (GH, HB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Thelypteris cutiataensis* (Brade) Salino**
Voucher: Brade, A.C. 16275 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Thelypteris decurtata* (Link) de la Sota**
Voucher: Salino, A. 6131 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris decussata* (L.) Proctor**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Thelypteris decussata* var. *brasiliensis* (C.Chr.) A.R.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 8057 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Thelypteris decussata (*L.) Proctor var. *decussata
Voucher: Prado, J. 1370 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA); Amazônia

***Thelypteris dentata* (Forssk.) E.P.St.John**
Voucher: Salino, A. 3254 (BHCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Thelypteris devolvens* (Baker) C.F.Reed**
Voucher: Salino, A. 10278 (BHCB, ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Thelypteris eriosora* (Fée) Ponce**
Voucher: Toledo Jr., F.T. 6462 (HB, RB, SP, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Thelypteris gardneriana* (Baker) C.F.Reed**
Voucher: Brade, A.C. 16581 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris glaziovii* (Christ) C.F.Reed**
Voucher: Salino, A. 2828 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris grandis* A.R.Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Thelypteris grandis* var. *kunzeana* (Hook.) A.R.Sm.**
Voucher: Macedo, A. 2112 (SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris gymnosora* Ponce**
Voucher: Salino, A. 385 (SJRP, UC,UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris hatschbachii* A.R.Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 17224 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Thelypteris heineri* (C.Chr.) C.F.Reed**
Voucher: Salino, A. 1024 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Thelypteris hispidula* (Decne.) C.F.Reed**
Voucher: Salino, A. 1007 (UC, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Thelypteris iguapensis* (C.Chr.) Salino**
Voucher: Brade, A.C. 8232 (BM, C, NY, R, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Thelypteris interrupta* (Willd.) K.Iwats.**
Voucher: Salino, A. 163 (BHCB, SJRP, UC, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Thelypteris ireneae* (Brade) Lellinger**
Voucher: Salino, A. 9577 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Thelypteris jamesonii* (Hook.) R.M.Tryon**
Voucher: Windisch, P.G. 5994 (SJRP, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Thelypteris juergensii* (Rosenst.) C.F.Reed**
Voucher: Sehnem, A. 3097 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Thelypteris juruensis* (C.Chr.) R.M.Tryon**
Voucher: Prance, G.T. 2912 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Thelypteris leprieurii* (Hook.) R.M.Tryon**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Thelypteris leprieurii* var. *glandifera* A.R.Sm.**
Voucher: Salino, A. 1762 (BHCB, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
Thelypteris leprieurii* var. *incana
Voucher: Ule, E.H.G. 5763 (B, K, BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Thelypteris leprieurii* var. *leprieurii
Voucher: Salino, A. 3203 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Thelypteris littoralis* Salino**
Voucher: Prado, J. 977 (SP, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Thelypteris longifolia* (Desv.) R.M.Tryon**
Voucher: Salino, A. 593 (BHCB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Thelypteris lugubris* (Mett.) R.M.Tryon & A.F.Tryon**
Voucher: Salino, A. 2213 (BHCB, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Thelypteris macrophylla* (Kunze) C.V.Morton**
Voucher: Salino, A. 8307 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Thelypteris maxoniana* A.R.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 54108 (C, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Thelypteris membranacea* (Mett.) R.M.Tryon**
Voucher: Silveira, M. 1249 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Thelypteris metteniana* Ching**
Voucher: Salino, A. 2935 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Thelypteris mexiae* (C.Chr. *ex* Copel.) Ching**
Voucher: Brade, A.C. 14504 (BM, GH, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Thelypteris monosora* (C.Presl) Salino**
Voucher: Salino, A. 2098 (BHCB, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Thelypteris montana* Salino**
Voucher: Brade, A.C. 15910 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Thelypteris mosenii* (C.Chr.) C.F.Reed**
Voucher: Krieger, L. 10896 (BHCB, CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Thelypteris multigemmifera* Salino**
Voucher: Salino, A. 1800 (BHCB, UC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Thelypteris neglecta* (Brade & Rosenst.) Ching**
Voucher: Brade, A.C. 9492 (R, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Thelypteris novaeana* (Brade) Ponce**
Voucher: Campos-Porto, P. 575 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Thelypteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. *ex* Willd.) Ching**
Voucher: Salino, A. 2637 (BHCB, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica
***Thelypteris opposita* (Vahl) Ching**
Voucher: Salino, A. 533 (BHCB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Thelypteris opulenta* (Kaulf.) Fosberg**
Voucher: Prance, G.T. 12428 (MG, NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Thelypteris pachyrhachis* (Mett.) Ching**
Voucher: Salino, A. 85 (BHCB, SJRP, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Thelypteris paranaensis* Salino**
Voucher: Salino, A. 1459 (BHCB, MBM, UC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); Mata Atlântica
***Thelypteris patens* (Sw.) Small**
Voucher: Brade, A.C. 7720 (GH, HB, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),
Nordeste (CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Thelypteris pennata* (Poir.) C.V.Morton**
Voucher: Strudwick, J.J. 3711 (MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Thelypteris platypes* (Fée) Ponce**
Voucher: Salino, A. 2133 (BHCB, SI, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido
***Thelypteris pleiophylla* (Sehnem) Ponce**
Voucher: Spannagel, C. 89c (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Thelypteris podotricha* (Sehnem) Ponce**
Voucher: Sehnem, A. 7648 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Thelypteris poiteana* (Bory) Proctor**
Voucher: Salino, A. 9411 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),
Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG); Amazônia,
Mata Atlântica
***Thelypteris polypodioides* (Raddi) C.F.Reed**
Voucher: Salino, A. 8294 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Thelypteris ptarmica* (Mett.) C.F.Reed**
Voucher: Salino, A. 2879 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Thelypteris raddii* (Rosenst.) Ponce**
Voucher: Salino, A. 2097 (BHCB, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Thelypteris recumbens* (Rosenst.) C.F.Reed**
Voucher: Reitz, R. 16375 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica
***Thelypteris refracta* (Fisch. & C.Meyer *ex* Kunze) C.F.Reed**
Voucher: Sylvestre, L.S. 990 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Thelypteris regnelliana* (C.Chr.) Ponce**
Voucher: Hatschbach, G. 31616 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR,
SC, RS); Mata Atlântica
***Thelypteris retusa* (Sw.) C.F.Reed**
Voucher: Salino, A. 2108 (BHCB, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Thelypteris riograndensis* (Lindm.) C.F.Reed**
Voucher: Salino, A. 868 (BHCB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Thelypteris rioverdensis* (C.Chr.) Ponce**
Voucher: Salino, A. 2598 (BHCB, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul
(PR); Domínio desconhecido
***Thelypteris rivularioides* (Fée) Abbiatti**
Voucher: Salino, A. 573 (BHCB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica
***Thelypteris salzmannii* (Fée) C.V.Morton**
Voucher: Salino, A. 1556 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica
***Thelypteris sanctae-catharinae* (Rosenst.) Ponce**
Voucher: Spannagel, C. 181a (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica
***Thelypteris scabra* (C.Presl) Lellinger**
Voucher: Salino, A. 1958 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Thelypteris schwackeana* (Christ) Salino**
Voucher: Salino, A. 1004 (UC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica
***Thelypteris semirii* Salino & Melo**
Voucher: Mexia, Y. 4487b (GH,UC,US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica
***Thelypteris serrata* (Cav.) Alston**
Voucher: Salino, A. 3245 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte
(RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA,
AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica
***Thelypteris soridepressa* Salino & V.A.O.Dittrich**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 1484 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica
***Thelypteris stierii* (Rosenst.) C.F.Reed**
Voucher: Salino, A. 1965 (BHCB, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Thelypteris tamandarei* (Rosenst.) Ponce**
Voucher: Salino, A. 551 (BHCB, UC, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica
***Thelypteris tenerrima* (Fée) C.F.Reed**
Voucher: Hatschbach, G. 8146 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),
Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Thelypteris tetragona* (Sw.) Small**
Voucher: Windisch, P.G. 4241 (UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Thelypteris tristis* (Kunze) R.M.Tryon**
Voucher: Prado, J. 1376 (HPZ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Thelypteris villosa* (Link) C.F.Reed**
Voucher: Spannagel, C. 577 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Thelypteris vivipara* (Raddi) C.F.Reed**
Voucher: Salino, A. 2031 (BHCB, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

WOODSIACEAE

Claudine M. Mynssen
5 gêneros, 27 espécies (8 endêmicas)

Athyrium Röth

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Athyrium decurtatum* (Kunze) C. Presl**
Voucher: Dutra, J. 1569 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Athyrium filix-femina* (L.) Roth**
Voucher: Mynssen, C.M. 713 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Deparia Hook. & Grev.

1 espécie (não endêmica)
***Deparia petersenii* (Kunze) M.Kato**
Voucher: Salino, A. 6104 (BHCB, RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Diplazium Sw.

22 espécies (8 endêmicas)
***Diplazium aberrans* Maxon & C.V.Morton**
Voucher: Silva, N.T. 60853 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Diplazium ambiguum* Raddi**
Voucher: Brade, A.C. 8552 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Diplazium asplenioides* (Kunze) C.Presl**
Voucher: Labiak, P.H. 4907 (MBML, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Diplazium celtidifolium* Kunze**
Voucher: Braga, J.M.A. 2487 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Diplazium cristatum* (Desr.) Alston**
Voucher: Hatschbach, G. 24754 (MBM, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Diplazium gracilescens* (Mett.) C.Chr.**
Voucher: Carvalho, F.A. 241 (BHCB, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Diplazium herbaceum* Fée**
Voucher: Mynssen, C.M. 304 (RB, RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Diplazium lechleri* (Mett.) T.Moore**
Voucher: Matos, F.B. 622 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (RN, BA), Sudeste (MG); Amazônia,Mata Atlântica
***Diplazium leptocarpon* Fée**
Voucher: Mynssen, C.M. 968 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Diplazium lindbergii* (Mett.) Christ**
Voucher: Labiak, P.H. 4866 (MBML, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Diplazium longipes* Fée**
Voucher: Mynssen, C.M. 1144 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Diplazium mattogrossense* A.Samp.**
Voucher: Neiva, S.Z. 397 (RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Diplazium mickelii* Mynssen & Sylvestre**
Voucher: Brade, A.C. 19821 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Diplazium mutilum* Kunze**
Voucher: Mynssen, C.M. 949 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Diplazium petiolulatum* (Stolze) A.R.Sm.**
Voucher: Neiva, S.Z. 425 (NX, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO);Amazônia
***Diplazium plantaginifolium* (L.) Urb.**
Voucher: Salino, A. 8586 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Diplazium praestans* (Copel.) C.V.Morton**
Voucher: Prance, G.T. 7400 (INPA, K, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Diplazium riedelianum* (Bong. *ex* Kuhn) C.Chr.**
Voucher: Reitz, R. 5710 (BM, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Diplazium roemerianum* (Kunze) C.Presl**
Voucher: Amorim, A.M. 2359 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Diplazium rostratum* Fée**
Voucher: Brade, A.C. 20172 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Diplazium tamandarei* Rosenst.**
Voucher: Brade, A.C. 6529 (B, HB, MVM, RB, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Diplazium turgidum* Rosenst.**
Voucher: Sehnem, A. 9408 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Hemidictyum C.Presl

1 espécie (não endêmica)
***Hemidictyum marginatum* (L.) C.Presl**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1872 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ),
Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Woodsia Spreng.

1 espécie (não endêmica)
***Woodsia montevidensis* (Spreng.) Hieron.**
Voucher: Brade, A.C. 15539 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

GIMNOSPERMAS

Coodenador: Vinícius Castro Souza
7 gêneros, 26 espécies (2 endêmicas)

ARAUCARIACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Araucaria Juss.
1 espécie (não endêmica)
***Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze**
Voucher: Souza, V.C. 10840 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

EPHEDRACEAE
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Ephedra Tourn. *ex* L.
1 espécie (não endêmica)
***Ephedra tweediana* C.A.Mey.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 1697 (ESA, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

GNETACEAE
1 gênero, 6 espécies (nenhuma endêmica)

Gnetum L.
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Gnetum leyboldii* Tul.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2678 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Gnetum nodiflorum* Brongn.**
Voucher: Daly, D.C. 8966 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Gnetum paniculatum* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Daly, D.C. 8824 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Gnetum schwackeanum* Taub. *ex* Schenck**
Voucher: Schwacke, C.A.W. III-576 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Gnetum urens* (Aubl.) Blume**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 527 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Gnetum venosum* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Henderson, A. 375 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

PINACEAE
1 gênero, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Pinus
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Pinus caribaea* Morelet**
Voucher: Wasum 9335 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Pinus elliottii* L.**
Voucher: Reitz, R. 7407 (HBR)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Pinus taeda* L.**
Voucher: Imaguire, N. 2471 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica



PODOCARPACEAE
2 gêneros, 10 espécies (2 endêmicas)

Podocarpus L'Hér. *ex* Pers.
8 espécies (2 endêmicas)
***Podocarpus acuminatus* Laubenf.**
Voucher: Farney, C. 870 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Podocarpus aracensis* Laubenf. & Silba**
Voucher: Prance, G.T. 29121 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Podocarpus barretoi* Laubenf. & Silba**
Voucher: Barreto, H.L.M. 8878 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Podocarpus brasiliensis* Laubenf.**
Voucher: Heringer, E.P. 8034 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Podocarpus celatus* Laubenf.**
Voucher: Maguire, B. 56811 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Podocarpus lambertii* Klotzsch *ex* Endl.**
Voucher: Barreto, K.D. 1019 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Podocarpus roraimae* Pilg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 40 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Podocarpus sellowii* Klotzsch *ex* Endl.**
Voucher: Souza, V.C. 6213 (ESA, HRCB, PMSP, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Retrophyllum C.N.Page
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Retrophyllum piresii* (Silba) C.N.Page**
Voucher: Rosa, N.A. 586 (MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Retrophyllum rospigliosii* (Pilg.) C.N.Page**
Voucher: Rosa, N.A. 856 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

ZAMIACEAE
1 gênero, 5 espécies (nenhuma endêmica)

Zamia L.
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Zamia amazonum* D.W.Stev.**
Voucher: Daly, D.C. 10219 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Zamia boliviana* (Brongn.) A.DC.**
Voucher: Cunha, C.M. 992 (UFMT)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Zamia cupatiensis* Ducke**
Voucher: Stevenson, D.W. 1052 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Zamia poeppigiana* Mart. & Eichler**
Voucher: Daly, D.C. 8342 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Zamia ulei* Dammer**
Voucher: Prance, G.T. 12100 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

ANGIOSPERMAS

Coodenadores: Rafaela Campostrini Forzza & Paula Leitman
2.826 gêneros, 31.160 espécies (17.628 endêmicas), 673 subespécies (304 endêmicas), 2.022 variedades (1.163 endêmicas)

ACANTHACEAE

Sheila R. Profice, Cíntia Kameyama, Ana Luiza Andrade Côrtes, Denise Monte Braz, Alexandre Indriunas, Thaisa Vilar, Clenia Pessoa, Cecilia Ezcurra, Dieter Wasshausen
41 gêneros, 432 espécies (265 endêmicas), variedades (2 endêmicas)

Anisacanthus Nees

5 espécies (3 endêmicas)
***Anisacanthus boliviensis* (Nees) Wassh.**
Voucher: Takahashi, A. 1396 (COR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal
***Anisacanthus pohlii* Lindau**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1905 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Anisacanthus ramosissimus* (Moric.) V.M.Baum**
Voucher: Forzza, R.C. 1398 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Anisacanthus secundus* Leonard**
Voucher: Cowan, R.S. 38083 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Anisacanthus trilobus* Lindau**
Voucher: Harley, R.M. 21361 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

Aphelandra R.Br.

43 espécies (33 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Aphelandra acrensis* Lindau**
Voucher: Ule, E.H.G. 9834 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aphelandra aurantiaca* (Scheidw.) Lindl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aphelandra aurantiaca* (Scheidw.) Lindl. var. *aurantiaca
Voucher: Ferreira, C.A.C. 208 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Aphelandra bahiensis* (Nees) Wassh.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2106 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aphelandra blanchetiana* (Nees) Hook.**
Voucher: Lima, J.C.A. 174 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aphelandra bradeana* Rizzini**
Voucher: Brade, A.C. 18841 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aphelandra caput-medusae* Lindau**
Voucher: Ule, E.H.G. 5499 (HBG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aphelandra chamissoniana* Nees**
Voucher: Reitz, R. 2044 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Aphelandra claussenii* Wassh.**
Voucher: Giordano, L.C. 1083 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Aphelandra colorata* (Vell.) Wassh.**
Voucher: Viegas, A.P. s.n. (IAC, SP 41898, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Aphelandra decorata* (Nees) Wassh.**
Referência: Wasshausen, D.C. 1975.
Smithsonian Contr. Bot. 18:72.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Aphelandra espirito-santensis* Profice & Wassh.**
Voucher: Carvalho, A.M. 80 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aphelandra gigantea* (Rizzini) Profice**
Voucher: Oliveira, J.E. 1105 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Aphelandra goodspeedii* Standl. & F.A.Barkley**
Voucher: Ule, E.H.G. 5498 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aphelandra grazielae* Profice**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2930 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aphelandra harleyi* Wassh.**
Voucher: Profice, S.R. 125 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aphelandra hirta* (Klotzsch) Wassh.**
Voucher: Sampaio, A. 3302 (R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Aphelandra hylaea* Leonard**
Voucher: Fróes, R.L. 26345 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Aphelandra hymenobracteata* Profice**
Voucher: Pizziolo, W. 129 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aphelandra ignea* Nees *ex* Steud.**
Referência: Wasshausen, D.C. 1975.
Smithsonian Contr. Bot. 18:53.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Mata Atlântica
***Aphelandra liboniana* Linden *ex* Hook.**
Voucher: Reitz, R. 11181 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aphelandra longiflora* (Lindl.) Profice**
Voucher: Sucre, D. 1474 (RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aphelandra macrostachya* Nees**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3723 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aphelandra margaritae* E.Morren**
Voucher: Kolmann, K. 2896 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica
***Aphelandra marginata* Nees & Mart.**
Voucher: Santos, T.S. 1269 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Aphelandra martiusii* Wassh.**
Referência: Wasshausen, D.C. 1975.
Smithsonian Contr. Bot. 18: 108.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Aphelandra maximiliana* (Nees) Benth.**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2716 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aphelandra neesiana* Wassh.**
Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aphelandra nemoralis* Nees**
Voucher: Rizzini, C.T. 313 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aphelandra nitida* Nees & Mart.**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 478 (CEPEC, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE),
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aphelandra nuda* Nees**
Voucher: Falcão 1205 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Aphelandra obtusa* (Nees) Wassh.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 6031 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Aphelandra ornata* (Nees) T.Anderson**
Voucher: Giordano, L.C. 1867 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aphelandra paulensis* Wassh.**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Aphelandra phrynioides* Lindau**
Voucher: Luschnath s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aphelandra prismatica* (Vell.) Hiern**
Voucher: Braga, J.M.A. 3144. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Aphelandra pulcherrima* (Jacq.) Kunth**
Voucher: Ule, E.H.G. 9809 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Aphelandra rigida* Glaz. *ex* Mildbr.**
Voucher: Brade, A.C. 15829 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aphelandra schottiana* (Nees) Profice**
Voucher: Profice, S.R. 130 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Aphelandra squarrosa* Nees**
Voucher: Martinelli, G. 221 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE),
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Aphelandra stephanophysa* Nees**
Voucher: Martinelli, G. 12032 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aphelandra straminea* Leonard**
Voucher: Saraiva, R.S. 1505 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aphelandra variegata* Morel**
Voucher: Fenzel s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aphelandra wasshausenii* Profice**
Voucher: Kameyama, C. 13 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Asystasia Blume
1 espécie (não endêmica)
***Asystasia gangetica* (L.) T.Anderson**
Voucher: Carvalho, L.d'A.F. s.n. (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Avicennia L.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Avicennia germinans* (L.) L.**
Voucher: Jardim, J.G. 1801 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Avicennia schaueriana* Stapf & Leechm. *ex* Moldenke**
Voucher: Reitz, R. 683 (MBM,NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Chamaeranthemum Nees
2 espécies (2 endêmicas)
***Chamaeranthemum beyrichii* Nees**
Voucher: Andreata, R.H.P. 602 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Chamaeranthemum gaudichaudii* Nees**
Voucher: Ribeiro, R. 307 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Clistax Mart.
2 espécies (2 endêmicas)
***Clistax brasiliensis* Mart.**
Voucher: Shepherd, C.S. 4462 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Clistax speciosus* Nees**
Voucher: Alves, R.J.V. 4180 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

Dicliptera Juss.
5 espécies (3 endêmicas)
***Dicliptera ciliaris* Juss.**
Voucher: Irwin, H.S. 48681 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Dicliptera falciflora* Lindau**
Voucher: Ratter, J.A. 141 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Dicliptera mucronifolia* Nees**
Voucher: Côrtes A. 30 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dicliptera sparsiflora* (Nees) Nees**
Voucher: Malme, G.O.A. 1838 (S)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Dicliptera squarrosa* Nees**
Voucher: Proença, S.L. 14 (SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Drejera Nees
1 espécie (1 endêmica)
***Drejera ramosa* Nees**
Voucher: Pohl, J.B.E. 1905 (BR,K,W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Dyschoriste Nees
11 espécies (6 endêmicas)
***Dyschoriste crinita* (Nees) Kuntze**
Voucher: Gardner, G. 3951 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyschoriste erythrorhiza* (Nees) Lindau**
Voucher: Pohl, J.B.E. 5005 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Dyschoriste humilis* Lindau**
Voucher: Hatschbach, G. 25113 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Dyschoriste hygrophiloides* (Nees) Kuntze**
Voucher: Loefgren, A. 117 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Dyschoriste lavandulacea* (Nees) Kuntze**
Voucher: Oliveira, P.I. 45 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Dyschoriste maranhonis* (Nees) Kuntze**
Voucher: Mattos, J.R. 8530 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Dyschoriste schottiana* (Nees) Kobuski**
Voucher: Schott, H.W. 5972 (W)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dyschoriste serphyllum* (Nees) Kuntze**
Voucher: Hatschbach, G. 25133 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Dyschoriste smithii* Leonard**
Voucher: Smith, L.B. 9912 (HBR, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Dyschoriste trichanthera* Kobuski**
Voucher: Hatschbach, G. 49193 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Dyschoriste tweediana* (Nees) Kuntze**
Voucher: Tweedie, J. 771 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Elytraria Michx.

1 espécie (não endêmica)
***Elytraria imbricata* (Vahl) Pers.**
Voucher: Eiten, G. 4453 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO),
Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste
(MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Encephalosphaera Lindau

1 espécie (não endêmica)
***Encephalosphaera lasiandra* Mildbr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9810 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Eranthemum L.

1 espécie (1 endêmica)
***Eranthemum duckeii* Rizzini**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18434)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Fittonia Coem.

1 espécie (não endêmica)
***Fittonia albivenis* (Lindl. *ex* Veitch) Brummitt**
Voucher: Goldenberg, R. 1339 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

Gynocraterium Bremek.

1 espécie (não endêmica)
***Gynocraterium guianense* Bremek.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2342 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

Harpochilus Nees

2 espécies (2 endêmicas)
***Harpochilus neesianus* Mart. *ex* Nees**
Voucher: Queiroz, L.P. 4637 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PB, PE, BA); Caatinga
***Harpochilus phaeocarpus* Nees**
Voucher: Thomas, W.W. 10676 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

Herpetacanthus Nees

8 espécies (6 endêmicas)
***Herpetacanthus acuminatus* (Lindau) Bremek.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5848 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AC, RO); Amazônia
***Herpetacanthus longiflorus* Moric.**
Voucher: Jardim, J.G. 236 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Herpetacanthus macahensis* Nees**
Voucher: Pereira, E. 628 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Herpetacanthus macrophyllus* Nees**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1605 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Herpetacanthus melancholicus* Mart. *ex* Nees**
Voucher: Harley, R.M. 18279 (K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Herpetacanthus rotundatus* (Lindau) Bremek.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5573 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Herpetacanthus rubiginosus* Nees**
Voucher: Furlan, A. 1301 (ESA, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Herpetacanthus tetrandrus* (Nees & Mart.) Herter**
Voucher: Harley, R.M. 18134 (K, MBM, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

Hygrophila R.Br.

8 espécies (6 endêmicas)
***Hygrophila costata* Nees**
Voucher: Klein, R.M. 1116 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hygrophila glandulifera* Nees**
Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 22.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Hygrophila guianensis* Nees *ex* Benth.**
Voucher: Klein, R.M. 5235 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ),
Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hygrophila hirsuta* Nees**
Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 24.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Hygrophila humistrata* Rizzini**
Voucher: Macedo, A. 3615 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hygrophila oblongifolia* Nees**
Voucher: Riedel, L. 1263 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Hygrophila paraibana* Rizzini**
Voucher: Vasconcellos, J.M. 305 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PB); Mata Atlântica
***Hygrophila sessilifolia* Rizzini**
Voucher: Duarte, A.P. 1463 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (CE); Mata Atlântica

Justicia L.

126 espécies (75 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Justicia aequilabris* (Nees) Lindau**
Voucher: Queiroz, L.P. 3033 (HRB, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Justicia amazonica* (Nees) Lindau**
Voucher: Poeppig, E.F. 2156 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Justicia andersonii* Wassh.**
Voucher: Anderson, W.R. 9225 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Justicia angustifolia* (Nees) Lindau**
Voucher: Filgueiras, T.S. 3075 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Justicia antirrhina* Nees & Mart.**
Voucher: Raimundo, S.P. 1042 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Justicia appendiculata* (Ruiz & Pav.) Vahl**
Voucher: Daly, D.C. 13256 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Justicia araucariensis* Profice**
Voucher: Duarte, A.P. 1927 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Justicia asclepiadea* (Nees) Wassh. & C.Ezcurra**
Voucher: Côrtes, A. 89 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Justicia axillaris* (Nees) Lindau**
Voucher: Smith, L.B. 13865 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Justicia beyrichii* (Nees) Lindau**
Voucher: Profice, S.R. 115 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Justicia boliviana* Rusby**
Voucher: Daly, D.C. 7155 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Justicia bradeana* Profice**
Voucher: Brade, A.C. 19889 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Justicia brasiliana* Roth**
Voucher: Lima, H.C. 6341 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Justicia bullata* (Nees) Profice**
Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9:141.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Justicia burchellii* Hiern**
Voucher: Hatschbach, G. 34675 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Justicia calycina* (Nees) V.A.W.Graham**
Voucher: Daly, D.C. 8825 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Justicia carnea* Lindl.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34538 (ESA, SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Justicia catharinensis* Lindau**
Voucher: Kuhlmann, M. 3772 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (SC); Mata Atlântica

***Justicia chacoënsis* Wassh. & C.Ezcurra**
Voucher: Moore, S. 1047 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Justicia chapadensis* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 199 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Justicia chrysotrichoma* Pohl *ex* Nees**
Voucher: Forzza, R.C. 4604 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Justicia clausseniana* (Nees) Profice**
Voucher: Martinelli, G. 12070 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Justicia clivalis* Wassh.**
Voucher: Santos, J.B. 150 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Justicia comata* (L.) Lam.**
Voucher: Jardim, J.G. 3625 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Justicia concavibracteata* Lindau**
Voucher: Ule, E.H.G. 5456 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Justicia congrua* (Nees *ex* Mart.) Lindau**
Voucher: Harley, R.M. 54047 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Justicia corumbensis* (Lindau) Wassh. & C.Ezcurra**
Voucher: Malme, G.O.A. 3029 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Justicia cowanii* Leonard**
Voucher: Pires, J.M. 50422 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Justicia cuneifolia* Nees & Mart.**
Voucher: Côrtes, A. 117 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Justicia cydoniifolia* (Nees) Lindau**
Voucher: Farney, C. 2427 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Justicia cyrtantheriformis* (Rizzini) Profice**
Voucher: Marques, M.C.M. 119 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Justicia dasyclados* (Nees) Lindau**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 757 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Justicia dubiosa* Lindau**
Voucher: Prance, G.T. 4144 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Justicia eranthemantha* (Rizzini) Profice**
Voucher: Macedo, A. 3274 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Justicia fittonioides* Lindau**
Voucher: Ule, E.H.G. 5457 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Justicia floribunda* (C.Koch) Wassh.**
Voucher: Smith, L.B. 7839 (HBR, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Justicia flosculosa* Profice**
Voucher: Brade, A.C. 19903 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Sudeste (ES) Mata Atlântica
***Justicia glaziovii* Lindau**
Voucher: Queiroz, L.P. 970 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Justicia glischrantha* Lindau**
Referência: Lindau, G. 1898. Bot. Jahrb. Syst. 25, 60: 49.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Justicia glutinosa* (Bremek.)V.A.W.Graham**
Voucher: Hatschbach, G. 66820 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Justicia goianiensis* Profice**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W 5007)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Justicia goudotii* V.A.W.Graham**
Voucher: Tweedie, J. 1262 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal
***Justicia harleyi* Wassh.**
Voucher: Conceição, A.A. 2380 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Justicia hassleri* (Lindau) V.A.W.Graham**
Voucher: Hatschbach, G. 24578 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Justicia hatschbachii* (Rizzini) Wassh. & L.B.Sm.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Justicia hatschbachii* var. *catharinensis* (Rizzini) Wassh. & L.B.Sm.**
Voucher: Klein, R.M. 1078 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Justicia hatschbachii* (Rizzini) Wassh. & L.B.Sm. var. *hatschbachii
Voucher: Hatschbach, G. 2105 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Justicia heterophylla* (Nees *ex* Mart.) Lindau**
Voucher: Brade, A.C. 18646 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Justicia hylophila* Lindau**
Voucher: Ule, E.H.G. 5700 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Justicia involucrata* (Nees) Leonard**
Voucher: Catharino, E.L.M. 1970 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Justicia irwinii* Wassh.**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4759 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Justicia itatiaiensis* Profice**
Voucher: Lanstyack, L. 203 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Justicia ixodes* Leonard**
Voucher: Yale Dawson, E. 14915 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Justicia japurensis* Profice**
Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 108.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Justicia kleinii* Wassh. & L.B.Sm.**
Voucher: Souza, V.C. 11072 (ESA, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Justicia laevilinguis* (Nees) Lindau**
Voucher: Hatschbach, G. 46376 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Justicia lanstyakii* Rizzini**
Voucher: Hunt, D.R. 5452 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Justicia lavandulifolia* (Pohl *ex* Nees) Wassh.**
Voucher: Irwin, H.S. 15999 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Justicia lepida* (Moric.) Wassh.**
Voucher: Carvalho, A.M. 993 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Justicia lindmani* (Lindau) Wassh.**
Voucher: Lindman, A. 3509 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Justicia lineolata* Ruiz & Pav.**
Referência: Wasshausen, D.C. & Wood, J.R.I. 2003. Kew Bull. 58(4): 813.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Justicia luschnathii* Lindau**
Voucher: Carvalho, A.M. 1417 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Justicia lythroides* (Nees) V.A.W.Graham**
Voucher: Reitz, R. 1522 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Justicia matogrossensis* Wassh.**
Voucher: Ratter, J.A. 1911 (NY, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Justicia mesetarum* Wassh. & J.R.I.Wood**
Voucher: Hatschbach, G. 66972 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Justicia metallicorum* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 44 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Justicia meyeniana* (Nees) Lindau**
Voucher: Marquete, R. 1500 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Justicia minensis* Profice**
Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 141.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Justicia monticola* (Nees) Profice**
Voucher: Marquete, R. 95 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica
***Justicia nervata* (Lindau) Profice**
Voucher: Leitman, M. 243 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Justicia nodicaulis* (Nees) Leonard**
Voucher: Irwin, H.S. 13995 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Justicia oblonga* (Nees) Lindau**
Referência: Lindau, G. 1895. Nat. Pflanzenfam.
43: 350.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Justicia obovata* Wassh. & J.R.I.Wood**
Voucher: Daly, D.C. 6835 (NY,US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Justicia oncodes* (Lindau) Wassh. & C.Ezcurra**
Voucher: Macedo, A. 1604 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Justicia oreadum* S.Moore**
Voucher: Hatschbach, G. 24586 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Justicia parabolica* (Nees) Profice**
Voucher: Brade, A.C. 19171 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Justicia paranaensis* (Rizzini) Wassh. & L.B.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 359 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Justicia pectoralis* Jacq.**
Voucher: Pires, J.M. 9978 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Justicia phyllocalyx* (Lindau) Wassh. & C.Ezcurra**
Voucher: Macedo, A. 1617 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG); Cerrado
***Justicia physogaster* Lindau**
Voucher: Santos, T.S. 2826 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Justicia pilosa* (Nees) Lindau**
Voucher: Daly, D.C. 11524 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Justicia plumbaginifolia* Jacq.**
Voucher: Martinelli, G. 1581 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Justicia poeppigiana* (Nees) Lindau**
Voucher: Silveira, M. 938 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Justicia pohliana* Profice**
Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 143.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Justicia polita* (Nees) Profice**
Voucher: Profice, S.R. 42 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Justicia polygaloides* (S.Moore) Lindau**
Voucher: Moore, S. 667 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Justicia polygonoides* Kunth**
Voucher: Daly, D.C. 7155 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Justicia polystachya* Lam.**
Voucher: Harley, R.M. 24733 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Justicia potamogeton* Lindau**
Voucher: Sperling, C.R. 5894 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Justicia pseudoamazonica* Lindau**
Voucher: Ule, E.H.G. 5929 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Justicia pycnophylla* Lindau**
Voucher: Heringer, E.P. 6751 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Justicia pygmaea* Lindau**
Voucher: Kuhlmann, M. 3772 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Justicia pyrrhostachya* (Lindau) Wassh.**
Voucher: Daly, D.C. 11761 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Justicia ramulosa* (Morong) C.Ezcurra**
Voucher: Hatschbach, G. 19151 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica
***Justicia rectiflora* (Lindau) V.A.W.Graham**
Referência: Graham, V.A.W. 1988. Kew Bull. 43(4):614.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Justicia regnellii* Lindau**
Referência: Lindau, G. 1897. Bull. Herb. Boissier 5(1): 672.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Justicia rhomboidea* Wassh. & J.R.I.Wood**
Voucher: Prance, G.T. 14629 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, RO); Amazônia
***Justicia riparia* Kameyama**
Voucher: Duarte, A.P. 2272 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Justicia robertii* V.A.W.Graham**
Voucher: Robert, A. 408b (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Justicia ruiziana* (Nees) Lindau**
Voucher: Daly, D.C. 13344 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Justicia rusbyi* (Lindau) V.A.W.Graham**
Voucher: Hatschbach, G. 49068 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Justicia sarmentosa* (Nees) Lindau**
Referência: Lindau, G. 1895. Nat. Pflanzenfam. 4: 351.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Justicia sarothroides* Lindau**
Voucher: Irwin, H.S. 18115 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Justicia scansilis* (Rizzini) V.A.W.Graham**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 53237)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Justicia scheidweileri* V.A.W.Graham**
Voucher: Braz, D.M. 14 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Justicia schenckiana* Lindau**
Voucher: Reitz, R. 5907 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Justicia sebastianopolitana* Profice**
Voucher: Braga, J.M.A. 2749 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Justicia secunda* Vahl**
Voucher: Amaral, I.L. 900 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Justicia sellowiana* Profice**
Voucher: Duarte, A.P. 4293 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Justicia sericographis* V.A.W.Graham**
Voucher: Delprete, P.G. 10178 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Justicia serrana* Kameyama**
Voucher: Braga, P.I.S. s.n. (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Justicia simonisia* V.A.W.Graham**
Voucher: Côrtes, A. 91 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Justicia sprucei* V.A.W.Graham**
Voucher: Silva, M.G. 2933 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia
***Justicia symphyantha* (Nees *ex* Mart.) Lindau**
Voucher: Jardim, J.G. 634 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Justicia thunbergioides* (Lindau) Leonard**
Voucher: Harley, R.M. 16885 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Justicia tijucensis* V.A.W.Graham**
Voucher: Braga, J.M.A. 3427 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Justicia tocantina* (Nees) V.A.W.Graham**
Voucher: Souza Silva, S. 233 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Justicia trifoliata* Roem. & Schult.**
Referência: Nees, C.G.D. 1847. Fl. bras. 9: 72.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Justicia ulei* Lindau**
Referência: Lindau, G. 1914. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6: 199.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Justicia viridiflavescens* Lindau**
Voucher: Ule, E.H.G. 5698 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Justicia warmingii* Hiern**
Referência: Hiern, J. 1979. Vidensk. Meddel. Dansk Natuhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78: 80.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Justicia wasshauseniana* Profice**
Voucher: Paula, C.H.R. de 206 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Justicia xipotensis* (Roem. & Schult.) A.Côrtes & Rapini**
Voucher: Hatschbach, G. 44147 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Justicia yhuensis* Lindau**
Voucher: Smith, L.B. 13217 (HBR, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Justicia yurimaguensis* Lindau**
Voucher: Calderón, C.E. 2800 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Justicia zarucchii* Wassh.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2971 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Kalbreyeriella Lindau

1 espécie (não endêmica)
***Kalbreyeriella rostellata* Lindau**
Voucher: Campbell, D.G. 8909 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Lepidagathis Willd.

16 espécies (11 endêmicas)
***Lepidagathis alopecuroidea* (Vahl) R.Br. *ex* Griseb.**
Voucher: Costa, M.A.S. 254 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lepidagathis callistachys* Kameyama**
Voucher: Krapovickas, A. 40186 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Lepidagathis cataractae* (Nees) Lindau *ex* Pulle**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (GZU 250443)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Lepidagathis cuneiformis* Kameyama**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 221 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica
***Lepidagathis cyanea* (Leonard) Kameyama**
Voucher: Heringer, E.P. 1094 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Lepidagathis diffusa* (Nees) Lindau**
Voucher: Archermann s.n. (GZU)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Lepidagathis floribunda* (Pohl) Kameyama**
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1122 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lepidagathis lanceolata* (Nees) Wassh.**
Voucher: Riedel, L. 1327 (GZU)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Lepidagathis laxifolia* (Nees) Kameyama**
Voucher: Heringer, E.P. 2242 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Lepidagathis meridionalis* Kameyama**
Voucher: Koczicki, C. 182 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); Mata Atlântica
***Lepidagathis montana* (Nees) Kameyama**
Voucher: Kameyama, C. 34 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Lepidagathis nemoralis* (Mart. *ex* Nees) Kameyama**
Voucher: Rodrigues, I.A. 53 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Lepidagathis paraensis* Kameyama**
Voucher: Strudwick, J.J. 3803 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA); Amazônia
***Lepidagathis riedeliana* Nees**
Voucher: Riedel, L. 1122 (LE, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Lepidagathis sessilifolia* (Pohl) Kameyama *ex* Wassh. & J.R.I.Wood**
Voucher: Lima, J.P.S. 204 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA),
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Lepidagathis wasshausenii* Kameyama**
Voucher: Hatschbach, G. 36031 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT); Cerrado

Lychniothyrsus Lindau

1 espécie (1 endêmica)
***Lychniothyrsus mollis* Lindau**
Voucher: Ule, E.H.G. 9114 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Mendoncia Vell. *ex* Vand.

17 espécies (5 endêmicas)
***Mendoncia bahiensis* Profice**
Voucher: Amorim, A.M. 1216 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mendoncia blanchetiana* Profice**
Voucher: Pinheiro, R.S. 1212 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mendoncia cordata* Leonard**
Voucher: Lleras, E. 17069 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mendoncia glabra* Poepp. & Endl.**
Voucher: Santos, T.S. 555 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Mendoncia hoffmannseggiana* Nees**
Voucher: Cowan, R.S. 38470 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Mendoncia hymenophyllacea* Rizzini**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1624 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Mendoncia lasiophyta* Schult. *ex* Leonard**
Voucher: Ducke, A. 1851 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mendoncia mollis* Lindau**
Voucher: Magalhães, G.M. 76 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mendoncia multiflora* Poepp. & Endl.**
Voucher: Ducke, A. 1127 (MG, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mendoncia pedunculata* Leonard**
Voucher: Prance, G.T. 2741 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Mendoncia pilosa* Mart.**
Voucher: Lowrie, S.R. 473 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Mendoncia puberula* Mart.**
Voucher: Brade, A.C. 20939 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Mendoncia rizziniana* Profice**
Voucher: Maas, P.J.M. 12578 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Mendoncia rotundifolia* Poepp. & Endl.**
Voucher: Silva, M. 974 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Mendoncia sprucei* Lindau**
Voucher: Spruce, R. 2332 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Mendoncia tomentosa* Poepp. *ex* Nees**
Voucher: Silva, M.F. 968 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mendoncia velloziana* Mart.**
Voucher: Peixoto, A.L. 948 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Nelsonia R.Br.

1 espécie (não endêmica)
***Nelsonia canescens* (Lam.) Spreng.**
Voucher: Delprete, P.G. 9890 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Odontonema Nees

4 espécies (3 endêmicas)
***Odontonema amplexicaule* (Nees) Kuntze**
Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 98.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Odontonema barlerioides* (Nees) Kuntze**
Voucher: Canela, M.B.F. 5 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Odontonema dissitiflorum* (Nees) Kuntze**
Voucher: Schott, A.C.V. 6120 (GZU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Odontonema speciosum* V.M.Baum**
Voucher: Fróes, R.L. 29106 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pachystachys Nees

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Pachystachys coccinea* (Aubl.) Nees**
Voucher: Pires, J.M. 14871 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Pachystachys lutea* Nees**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 728 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Pachystachys spicata* (Ruiz & Pav.) Wassh.**
Voucher: Bovini, M.G. 503 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Poikilacanthus Lindau

2 espécies (1 endêmica)
***Poikilacanthus bahiensis* (Nees) Wassh.**
Voucher: Giulietti, A.M. 2274 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Poikilacanthus glandulosus* (Nees) Ariza**
Voucher: Reitz, R. 5468 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Pranceacanthus Wassh.

1 espécie (não endêmica)
***Pranceacanthus coccineus* Wassh.**
Voucher: Prance, G.T. 14305 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Pseuderanthemum Radlk.

10 espécies (7 endêmicas)
***Pseuderanthemum bolivianum* Britton *ex* Rusby**
Voucher: Prance, G.T. 5595 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Pseuderanthemum congestum* (S.Moore) Wassh.**
Voucher: Hatschbach, G. 22028 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Pseuderanthemum detruncatum* (Nees *ex* Mart.) Radlk.**
Referência: Radlkofer, L.A.T. 1884. Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 13: 286.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Pseuderanthemum exaequatum* (Nees) Radlk.**
Voucher: Magenta, M.A.G. 24 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Pseuderanthemum heterophyllum* (Nees) Radlk.**
Voucher: Joaquim, G.O. 39 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Pseuderanthemum leptostachyum* (Nees) Radlk.**
Referência: Radlkofer, L.A.T. 1884. Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 13:286.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pseuderanthemum macrophylum* (Nees) Radlk.**
Referência: Radlkofer, L.A.T. 1884. Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 13: 286.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Pseuderanthemum modestum* (Nees) Radlk.**
Voucher: Côrtes, A. 36 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Pseuderanthemum riedelianum* (Nees) Radlk.**
Voucher: Melo, M.M.R.F. 546 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pseuderanthemum verbenaceum* (Nees & Mart.) Radlk.**
Voucher: Kallunki, J.A. 411 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Pulchranthus V.M.Baum

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Pulchranthus adenostachyus* (Lindau) V.M.Baum**
Voucher: Ule, E.H.G. 9821 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pulchranthus congestus* (Lindau) V.M.Baum**
Voucher: Costa, M.A.S. 158 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pulchranthus variegatus* (Aubl.) V.M.Baum**
Voucher: Costa-Neto, S.V. 2175 (HAMAB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Ruellia L.

82 espécies (49 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Ruellia acutangula* (Mart. *ex* Ness) Lindau**
Voucher: Heringer, E.P. 16011 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia adenocalyx* Lindau**
Voucher: Irwin, H.S. 32184 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Ruellia adenostachya* Lindau**
Referência: Lindau, G. 1898. Bot. Jahrb. Syst. 25, 60: 45.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia affinis* (Schrad.) Lindau**
Voucher: Carvalho, A.M. 4613 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ruellia amapensis* Wassh.**
Voucher: Pires, J.M. 50309 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ruellia amplexicaule* (Nees) Lindau**
Voucher: Irwin, H.S. 5372 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Ruellia angustiflora* (Nees) Lindau *ex* Rambo**
Voucher: Duarte, A.P. 1753 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia angustior* Lindau**
Voucher: Fonseca, M.L. 1041 (IBGE, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia asperula* (Mart. *ex* Ness) Lindau**
Voucher: Duarte, A.P. 10558 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia bahiensis* (Nees) Morong**
Voucher: Pirani, J.R. 3436 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Cerrado

***Ruellia beyrichiana* (Nees) S.Moore**
Referência: Moore, S. 1904. J. Bot. 42: 34.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE); Amazônia, Caatinga

***Ruellia blanchetiana* (Moric.) Lindau**
Referência: Lindau, G. 1895. Nat. Pflanzenfam. 4: 311.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ruellia blechum* L.**
Voucher: Lôbo, C.C.G. s.n. (UFPE 58162)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Ruellia brachysiphon* (Nees) Lindau**
Voucher: Harley, R.M. 10126 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Ruellia brevicaulis* (Nees) Lindau**
Voucher: Hatschbach, G. 6419 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia brevifolia* (Pohl) C.Ezcurra**
Voucher: Smith, L.B. 12310 (HBR, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia bulbifera* Lindau**
Voucher: Rambo, B. 9596 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Ruellia capitata* Rizzini**
Voucher: Macedo, A. 3677 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia cearensis* Lindau**
Voucher: Mori, S.A. 11580 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); Caatinga

***Ruellia chamaedrys* (Nees) Angely**
Voucher: Pohl, J.B.E. 3632 (GZU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia ciliatiflora* Hook.**
Voucher: Takahashi, A. 1032 (COR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Ruellia consocialis* Lindau**
Referência: Lindau, G. 1904. Bull. Herb. Boissier 2(4): 319.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ruellia costata* (Nees) Hiern**
Voucher: Heringer, E.P. 3761 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Ruellia curviflora* Nees & Mart.**
Voucher: Amorim, A.M. 2383 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ruellia densa* Hiern**
Voucher: Heringer, E.P. 5175 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Ruellia diffusa* Nees**
Voucher: Hatschbach, G. 42329 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Ruellia dissitifolia* (Nees) Hiern**
Voucher: Sucre, D. 864 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado

***Ruellia elegans* Poir.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 645 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Ruellia epallocaulos* Leonard *ex* C.Ezcurra & Wassh.**
Voucher: Hatschbach, G. 5025 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Ruellia erythropus* (Nees) Lindau**
Voucher: Hatschbach, G. 43966 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Ruellia eurycodon* Lindau**
Voucher: Delprete, P.G. 9888 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia exserta* Wassh. & J.R.I.Wood**
Voucher: Santos, R.R. 1798 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Ruellia geminiflora* Kunth**
Voucher: Mimura, I. 104 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ruellia glischrocalyx* Lindau**
Voucher: Figueiredo, C. 470 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Ruellia hapalotricha* Lindau**
Voucher: Mendonça, R.C. 2118 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Ruellia helianthema* (Nees) Profice**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (GZU 249505)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Ruellia herbstii* (Hook.) Hiern**
Voucher: Herbst, R. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ruellia hygrophila* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 29597 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Ruellia hypericoides* (Nees) Lindau**
Voucher: Pereira, E. 8675 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Ruellia incomta* (Nees) Lindau**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4309 (INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Ruellia inflata* Rich.**
Voucher: Figueiredo, C. 855 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Ruellia japurensis* Mart. *ex* Nees**
Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 29.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Ruellia kleinii C.Ezcurra & Wassh.
Voucher: Klein, R.M. 7333 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Ruellia laxa* (Nees) Lindau**
Referência: Lindau, G. 1895. Nat. Pflanzenfam. 4: 311.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ruellia macrantha* (Mart. *ex* Ness) Lindau**
Voucher: Silva, M.G. 4221 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Ruellia magniflora* C.Ezcurra**
Voucher: Hatschbach, G. 25186 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Ruellia makoyana* Jacob-Makoy *ex* Closon**
Referência: Closon 1895. Rev. Hort. Belge Étrangère 21: 109.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Ruellia menthoides* (Nees) Hiern**
Voucher: Prance, G.T. 5380 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Ruellia morongii* Britton**
Voucher: Rambo, B. 8466 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Ruellia multifolia* (Nees) Lindau**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ruellia multifolia* (Nees) Lindau var. *multifolia
Voucher: Aragaki, S. 254 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Ruellia multifolia* var. *viscossisima* (Nees) C.Ezcurra**
Voucher: Sellow, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Ruellia neesiana* (Mart. *ex* Ness) Lindau**
Voucher: Delprete, P.G. 9918 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Ruellia neowedia* (Nees) Lindau**
Voucher: Martius, C.F.P. 1042 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Ruellia nitens* (Nees) Wassh.**
Voucher: Fonseca, M.L. 270 (IBGE, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Caatinga, Cerrado
***Ruellia nitida* (Nees) Wassh. & J.R.I.Wood**
Voucher: Prance, G.T. 5876 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Ruellia nobilis* (S.Moore) Lindau**
Voucher: Almeida 1713 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Ruellia ochroleuca* Mart. *ex* Nees**
Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 56.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Caatinga
***Ruellia paniculata* L.**
Voucher: Sucre, D. 10275 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA); Caatinga
***Ruellia portellae* Hook.**
Referência: Hooker, J.D. 1880. Bot. Mag. 36: t.6498.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Ruellia proxima* Lindau**
Voucher: Daly, D.C. 9034 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Ruellia puri* (Mart. *ex* Ness) Lindau**
Voucher: Cordeiro, I. 1746 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Ruellia rasa* Hiern**
Voucher: Barreto, H.L.M. 137 (BHCB,US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ruellia reitzii* Wassh. & L.B.Sm.**
Voucher: Reitz, R. 2009 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Ruellia riedeliana* Profice**
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Ruellia rubiginosa* (Nees) Lindau**
Referência: Lindau, G. 1895.
Nat. Pflanzenfam. 4:311.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Ruellia rubra* Aubl.**
Voucher: Amaral, I.L. 1288 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Ruellia rufipila* Rizzini**
Voucher: Macedo, A. 3635 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Ruellia salviifolius* (Nees) Profice**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Ruellia serrana* Profice**
Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ruellia sessilifolia* (Nees) Lindau**
Voucher: Santos, T.S. 1369 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ruellia silvaccola* (Mart. *ex* Ness) Lindau**
Referência: Lindau, G. 1895.
Nat. Pflanzenfam. 4: 311.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ruellia simplex* Wright**
Voucher: Hatschbach, G. 25175 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),
Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Ruellia solitaria* Vell.**
Voucher: Souza, V.C. 57 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Ruellia splendidula* (Nees) Lindau**
Referência: Lindau, G. 1895.
Nat. Pflanzenfam. 4: 311.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Ruellia sprucei* Lindau**
Voucher: Sothers, C.A. 552 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ruellia subringens* (Nees) Lindau**
Voucher: Belém, R.P. 2995 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ruellia subssessilis* (Nees) Lindau**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 9176 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Ruellia tarapotana* Lindau**
Voucher: Maas, P.J.M. 13280 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Ruellia trachyphylla* Lindau**
Voucher: Marquete, R. 2767 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Ruellia verbasciformis* (Nees *ex* Mart.) C.Ezcurra & Zappi**
Voucher: Forzza, R.C. 4606 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Ruellia villosa* (Nees) Lindau**
Voucher: Pirani, J.R. 10283 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Ruellia viscidula* (Mart. *ex* Ness) Lindau**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (GZU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Ruellia yurimaguensis* Lindau**
Voucher: Prance, G.T. 6009 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AC, RO); Amazônia

Sanchezia Ruiz & Pav.

6 espécies (1 endêmica)
***Sanchezia decora* Leonard & L.B.Sm.**
Voucher: Daly, D.C. 8273 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Sanchezia loranthifolia* Lindau**
Voucher: Daly, D.C. 9918 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Sanchezia macrocnemis* (Nees) Wassh.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (GZU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Sanchezia munita* (Nees) G.Planch.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5121 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Sanchezia oblonga* Ruiz & Pav.**
Voucher: Daly, D.C. 13159 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Sanchezia scandens* Leonard & L.B.Sm.**
Voucher: Daly, D.C. 8273 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Schaueria Nees

12 espécies (12 endêmicas)
***Schaueria calycotricha* (Link & Otto) Nees**
Voucher: Santos, M.G. 391 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Schaueria gonyostachya* (Nees & Mart.) Nees**
Voucher: Hage, J.L. 2212 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Schaueria hirsuta* Nees**
Voucher: Blanchet, J.S. 3131 (GZU)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Schaueria humuliflora* (Nees & Mart.) Nees**
Voucher: Côrtes, A. 31 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Schaueria lachnostachya* Nees**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 10783 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Schaueria lophura* Nees & Mart.**
Voucher: Sucre, D. 7058 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Schaueria macrophylla* Nees**
Voucher: Pohl, J.B.E. 4738 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Schaueria marginata* Nees**
Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 102.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Schaueria maximiliani* Nees**
Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 106.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Schaueria schottii* Nees**
Voucher: Schott, A.C.V. 4723 (GZU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Schaueria sulfurea* Nees**
Voucher: Pohl, J.B.E. 4741 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Schaueria virginea* Nees**
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (GZU 251416)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Sebastianoschaueria Nees

1 espécie (1 endêmica)
***Sebastianoschaueria oblongata* Nees**
Voucher: Riedel, L. 362 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Stachyacanthus Nees

1 espécie (1 endêmica)
***Stachyacanthus riedelianus* Nees**
Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 65-6.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Staurogyne Wall.

28 espécies (21 endêmicas)
***Staurogyne alba* Braz & R.Monteiro**
Voucher: Cordeiro, J. 108 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Staurogyne anigozanthus* (Nees) Kuntze**
Voucher: Hatschbach, G. 46703 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Staurogyne brachiata* (Hiern) Leonard**
Voucher: Duarte, A.P. 4290 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Staurogyne carvalhoi* Profice**
Voucher: Santos, T.S. 1085 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Staurogyne diantheroides* Lindau**
Voucher: Schessl, M. 201/1-1 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Staurogyne elegans* (Nees) Kuntze**
Voucher: Foster, M.B. 10834 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Staurogyne ericoides* Lindau**
Voucher: Lima, H.C. 1282 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Staurogyne euryphylla* E.Hossain**
Voucher: Rizzini, C.T. 248 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Staurogyne eustachya* Lindau**
Voucher: Reitz, R. 1913 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Staurogyne fastigiata* (Nees) Kuntze**
Voucher: Burchell, W.J. 2664 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Staurogyne flava* Braz & R.Monteiro**
Voucher: Pereira, E. 9045 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Staurogyne hirsuta* (Nees) Kuntze**
Voucher: Roth, L. 1778 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Staurogyne itatiaiae* (Wawra) Leonard**
Voucher: Martinelli, G. 10741 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Staurogyne lepidagathoides* Leonard**
Voucher: Ratter, J.A. 1878 (RB, UB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Staurogyne linearifolia* Bremek.**
Voucher: Silva, M.N. 362 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Staurogyne mandioccana* (Nees) Kuntze**
Voucher: Duarte, A.P. 1128 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Staurogyne minarum* (Nees) Kuntze**
Voucher: Kameyama, C. 25 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Staurogyne miqueliana* Kuntze**
Voucher: Hoehne, F.C. 4225 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Staurogyne parva* Braz & R.Monteiro**
Voucher: Boone, W. 927 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Staurogyne repens* (Nees) Kuntze**
Voucher: Spruce, R. 2212 (BM, BR, E, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Staurogyne riedeliana* (Nees) Kuntze**
Voucher: Lima, J.S. 321 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Staurogyne rubescens* Braz & R.Monteiro**
Voucher: Bovini, M.G. 724 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Staurogyne stolonifera* (Nees) Kuntze**
Voucher: Prance, G.T. 14439 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
***Staurogyne sylvatica* Lindau *ex* Braz & R.Monteiro**
Voucher: Bovini, M.G. 828 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Staurogyne trinitensis* Leonard**
Voucher: Hoehne, F.C. 4225 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Staurogyne vauthieriana* (Nees) Kuntze**
Voucher: Lombardi, J.A. 2280 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica
***Staurogyne veronicifolia* (Nees) Kuntze**
Voucher: Bade, A.C. 19428 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Staurogyne warmingiana* (Hiern) Leonard**
Voucher: Paula, J.A. 8971 (BHCH, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

Stenandrium Nees

15 espécies (11 endêmicas)
***Stenandrium affine* S.Moore**
Referência: Moore, S.L. 1895. Trans. Linn.
Soc. London, Bot. 4(3): 426.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Stenandrium diphyllum* Nees**
Voucher: Roth, L. 340 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),
Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Stenandrium dulce* (Cav.) Nees**
Referência: Esenbeck, C.G.N. 1847. Prodr. 11: 282.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Stenandrium goiasense* Wassh.**
Voucher: Hatschbach, G. 39009 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stenandrium hatschbachii* Wassh.**
Voucher: Hatschbach, G. 41518 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stenandrium hirsutum* Nees**
Voucher: Pohl, J.B.E. 2183 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Stenandrium irwinii* Wassh.**
Voucher: Irwin, H.S. 9272 (NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Stenandrium mandioccanum* Nees**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SPF 15439, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Stenandrium pohlii* Nees**
Voucher: Takahashi, A. 818 (COR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Stenandrium praecox* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 293 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA),
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Stenandrium riedelianum* Nees**
Voucher: Riedel, L. 58 (GZU, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT),
Sudeste (MG); Cerrado
***Stenandrium serpens* Nees**
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (GOET)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP),
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Stenandrium stenophyllum* Kameyama**
Voucher: Oliveira, A.A. CFCR 12982 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stenandrium tenellum* Nees**
Voucher: Reitz, R. 1212 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Stenandrium villosum* Nees**
Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 77-8.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Stenostephanus Nees

2 espécies (1 endêmica)
***Stenostephanus lobeliiformis* Nees**
Voucher: Pastore, J.A. 606 (SP, SPF, SPSF, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Stenostephanus longistaminus* (Ruiz & Pav.) V.M.Baum**
Voucher: Daly, D.C. 8759 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Streblacanthus Kuntze

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Streblacanthus amoenus* (Bremek.) T.F.Daniel**
Voucher: Daly, D.C. 12679 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Streblacanthus dubiosus* (Lindau) V.M.Baum**
Voucher: Daly, D.C. 13229 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sul (PR);
Amazônia, Mata Atlântica

Suessenguthia Merxm.

1 espécie (não endêmica)
***Suessenguthia trochilophila* Merxm.**
Voucher: Pires, J.M. 10077 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

Thunbergia L.

1 espécie (não endêmica)
***Thunbergia alata* Bojer *ex* Sims**
Voucher: Reitz, R. 540 (HBR)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA,
AM, AC), Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Trichanthera Kunth

1 espécie (não endêmica)
***Trichanthera gigantea* Humb. & Bonpl. *ex* Steud.**
Voucher: Prance, G.T. 9336 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA); Amazônia

ACHARIACEAE

Ronaldo Marquete, Erika Medeiros
4 gêneros, 17 espécies (7 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

Carpotroche Endl.

8 espécies (2 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)
***Carpotroche amazonica* Mart. *ex* Eichler**
Voucher: Pires, J.M. 902 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Carpotroche brasiliensis* (Raddi) Endl.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Carpotroche brasiliensis* var. *bahiensis* Rizzini**
Voucher: Monteiro, M.T. 23582 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Carpotroche crispidentata* Ducke**
Voucher: Fróes, R.L. 25884 (IAN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Carpotroche froesiana* Sleumer**
Voucher: Fróes, R.L. 21324 (IAN, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Carpotroche grandiflora* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34675)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Carpotroche integrifolia* Kuhlm.**
Voucher: Fróes, R.L. 23943 (IAN, LIL)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, RO); Amazônia
***Carpotroche longifolia* (Poepp.) Benth.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 890 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Carpotroche surinamensis* Uittien**
Voucher: Thomas, W.W. 13395 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (BA); Amazônia

Kuhlmanniodendron Fiaschi & Groppo

1 espécie (1 endêmica)
***Kuhlmanniodendron apterocarpum* (Kuhlm.) Fiaschi & Groppo**
Referência: Fiaschi & Groppo 2008.
Bot. J. Linn. Soc. 157(1): 104-105.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

Lindackeria C.Presl

5 espécies (4 endêmicas)
***Lindackeria latifolia* Benth.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Lindackeria ovata* (Benth.) Gilg**
Voucher: Gardner, G. 2396 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Lindackeria paludosa* (Benth.) Gilg**
Voucher: Fróes, R.L. 22072 (COL, IAN, U, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Lindackeria paraensis* Kuhlm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1802 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA); Amazônia
***Lindackeria pauciflora* Benth.**
Voucher: Fróes, R.L. 24263 (IAN, L, LIL)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Mayna Aubl.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Mayna grandifolia* (H.Karst.) Warb.**
Voucher: Silveira, M. 1428 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Mayna odorata* Aubl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4629 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Mayna parvifolia* (J.F.Macbr.) Sleumer**
Voucher: Pena 530 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

ACHATOCARPACEAE

Marcos Sobral
1 gênero, 1 espécie (1 endêmica)

Achatocarpus

1 espécie (1 endêmica)
***Achatocarpus praecox* Griseb.**
Voucher: Farney, C. 3617 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

ADOXACEAE

Marcos Sobral
1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

Sambucus L.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sambucus australis* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Reitz, R. 16832 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Mata Atlântica
***Sambucus canadensis* L.**
Voucher: Urquia, M. 185 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

AGAVACEAE

Rosana Conrado Lopes, José Rubens Pirani
4 gêneros, 14 espécies (7 endêmicas)

Clara Kunth

3 espécies (1 endêmica)
***Clara gracilis* R.C.Lopes & Andreata**
Voucher: Paula, C.H.R. de 151 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Clara ophiopogonoides* Kunth**
Voucher: Abruzzi, M.L. 2017 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Clara stricta* (L.B.Sm.) R.C.Lopes & Andreata**
Voucher: Matzenbacher, N.I. s.n. (ICN 88490)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Furcraea Vent.

1 espécie (não endêmica)
***Furcraea foetida* (L.) Haw.**
Voucher: Pirani, J.R. 4502 (MEXU, SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Hagenbachia Nees & Mart.

2 espécies (1 endêmica)
***Hagenbachia brasiliensis* Nees & Mart.**
Voucher: Amorim, A.M. 857 (CEPEC 56575)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO); Mata Atlântica
***Hagenbachia matogrossensis* (Poelln.) Ravenna**
Referência: Ravenna, P.F. 1985. Phytologia 57: 328.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

Herreria Ruiz & Pav.

8 espécies (5 endêmicas)
***Herreria bonplandii* Lecomte**
Voucher: Ritter, M.R. 685 (SMDB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Herreria cipoana* Ravenna**
Referência: Ravenna, P. 2004. Onira 9: 44.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Herreria glaziovii* Lecomte**
Voucher: Araújo, D.S.D. 9297 (GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Herreria grandiflora* Griseb.**
Voucher: Irwin, H.S. 30729 (RB, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Herreria interrupta* Griseb.**
Voucher: Anderson, W.R. 8714 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado
***Herreria latifolia* Woodson**
Voucher: Macedo, A. 1317 (HB, MO, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Herreria montevidensis* Klotzsch *ex* Griseb.**
Voucher: Kinupp, V.F. 2527 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Herreria salsaparilha* Mart.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 730 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal

AIZOACEAE

Daniela Zappi
3 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Sesuvium L.

1 espécie (não endêmica)
***Sesuvium portulacastrum* (L.) L.**
Voucher: Eiten, G. 7855 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (CE, BA), Sudeste (RJ), Sul (SC);
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Tetragonia

1 espécie (não endêmica)
***Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze**
Voucher: Fernandes, D. 68 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Trianthema L.

1 espécie (não endêmica)
***Trianthema portulacastrum* L.**
Voucher: Heringer, E.P. 62 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (RN, PE, BA); Caatinga

ALISMATACEAE

Ligia Queiroz Matias
2 gêneros, 30 espécies (7 endêmicas), 3 subespécies
(1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Echinodorus Rich. *ex* Engelm.

24 espécies (7 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica),
2 variedades (nenhuma endêmica)
***Echinodorus aschersonianus* Graebn.**
Voucher: Pickel, B.J. 5110 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Echinodorus australis* Rataj**
Voucher: Smith, A.C. 13449 (US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Echinodorus bolivianus* (Rusby) Holm-Niels.**
Voucher: Barros, F. 876 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Echinodorus floribundus* (Seub.) Seub.**
Voucher: Claussen, P. 351 (BR, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Echinodorus gabrielii* Rataj**
Referência: Rataj, K. 1990. Akvár. Terár., 33: 15.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);
Amazônia

***Echinodorus glandulosus* Rataj**
Voucher: Félix, L.P. 8996 (HST)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (CE, PB, PE, BA); Caatinga
***Echinodorus glaucus* Rataj**
Voucher: Silva, J.B.F. 411 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal
***Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltr.) Micheli**
Referência: Candolle, A.L.P.P. & Candolle, A.C.P. 1881. Monogr. Phan. 3: 57.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica
***Echinodorus grisebachii* Small**
Voucher: Pires, J.M. 9972 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado
***Echinodorus horizontalis* Rataj**
Voucher: Cid, C.A. 4147 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Echinodorus inpai* Rataj**
Voucher: Rataj, K. s.n. (INPA 62471; 62470)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS);
Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Echinodorus lanceolatus* Rataj**
Voucher: Andrade-Lima, D. 1211 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado
***Echinodorus longipetalus* Micheli**
Voucher: Duarte, A.P. 10392 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal
***Echinodorus longiscapus* Arechav.**
Voucher: Hatschbach, G. 41908 (MEXU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa
***Echinodorus macrophyllus* (Kunth) Micheli**
Distribuição: nativa; não endêmica
Echinodorus macrophyllus* (Kunth) Micheli subsp. *macrophyllus
Voucher: Hatschbach, G. 22741 (C)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Echinodorus major* (Micheli) Rataj**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 824 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,
Centro-Oeste (GO), Sudeste; Cerrado
***Echinodorus paniculatus* Micheli**
Voucher: Matias, L.Q. 411 (EAC, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Echinodorus pubescens* (Mart.) Seub. *ex* Warm.**
Voucher: Matias, L.Q. 321 (EAC, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga
***Echinodorus reticulatus* R.R.Haynes & Holm-Niels.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 7889 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Echinodorus scaber* Rataj**
Voucher: Gardner, G. 2330 (UNA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Amazônia, Pantanal
***Echinodorus subalatus* (Mart.) Griseb.**
Voucher: França, F. 3884 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Echinodorus tenellus* (Mart.) Buchenau**
Distribuição: nativa; não endêmica
Echinodorus tenellus* var. *latifoli
Voucher: Hoehne, F.C. 305 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado
Echinodorus tenellus* (Mart.) Buchenau var. *tenellus
Referência: Fasset, N.C. 1955. Rhodora 57: 185.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Centro-Oeste (GO, MS); Domínio desconhecido
***Echinodorus trialatus* Fassett**
Voucher: Eiten, G. 4105 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT); Caatinga
***Echinodorus uruguayensis* Arechav.**
Voucher: Hatschbach, G. 35188 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

Sagittaria L.

6 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)
***Sagittaria guayanensis* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sagittaria guayanensis* Kunth subsp. *guayanensis
Voucher: Matias, L.Q. 455 (EAC, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado
***Sagittaria lancifolia* L.**
Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 1321 (MAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP),
Nordeste (PB, BA, AL, SE); Cerrado, Mata Atlântica
***Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltdl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltdl. subsp. *montevidensis
Voucher: Vianna, E. 7567 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste
(RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado
***Sagittaria planitiana* G.Agostini**
Voucher: Teixeira 823 (UNA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (CE,
BA), Centro-Oeste; Cerrado
***Sagittaria rhombifolia* Cham.**
Voucher: Martinelli, G. 5485 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),
Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Sagittaria sprucei* Micheli**
Voucher: Prance, G.T. 20931 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia

ALLIACEAE

Julie H. A. Dutilh

2 gêneros, 29 espécies (3 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

Ipheion Raf.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Ipheion sellowianum* (Kunth) Traub**
Voucher: Sellow, F. 3664 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Ipheion vittatum* (Griseb.) Traub**
Voucher: Rosengurtt, B. 9465 (MVFA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Nothoscordum Kunth

27 espécies (3 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Nothoscordum aparadense* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 3870 (R, BA, BM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica

***Nothoscordum bahiense* Ravenna**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 246 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Nothoscordum cambarense* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 12280 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Nothoscordum capivarinum* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 36634 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum castilloi* T.M.Howard**
Voucher: Howard, T.M. 86-6 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Nothoscordum catharinense* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P.F. 3205 (BM, MBM, G, HBR, K, SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica

***Nothoscordum clevelandicum* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 3347 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum collinum* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 3162 (BM, MBM, NY, SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Nothoscordum curvipes* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 3388 (BM, MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum exile* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 1016 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum goianum* Ravenna**
Voucher: Heringer, E.P. 10747, (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Nothoscordum gracile* (Aiton) Stearn**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Nothoscordum gracile* var. *macrostemon* (Kunth) Guagl.**
Referência: Guaglianone 1995. Hickenia 2(31): 137.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Nothoscordum gracilipes* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 24139 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum ibiramense* Ravenna**
Voucher: Klein, R.M. 609 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica

***Nothoscordum jaibanum* Ravenna**
Voucher: Teixeira, L.O.A. s.n. (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Nothoscordum leptogynum* Ravenna**
Voucher: Rosengurtt, B. 9134 (MVA, SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Nothoscordum luteomajus* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 19880 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum montevidense* Beauverd**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Nothoscordum montevidense* subsp. *minarum* (Beauverd) Ravenna**
Voucher: Rambo, B. 43706 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Nothoscordum nudicaule* (Lehm.) Guagl.**
Voucher: Rambo, B. s.n. (MO 33892)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Nothoscordum nutans* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 3200 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum pernambucanum* Ravenna**
Voucher: Guerra, M. 1413 (PE, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Nothoscordum portoalegrense* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 3354 (BM, MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

Nothoscordum pulchellum
Referência: Kunth, C. 1843. Enum. Pl. [Kunth] 4: 458.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Nothoscordum sengesianum* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 53624 (BM, MBM, NY, SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum stenandrum* Ravenna**
Referência: Ravenna, P.F. 1989. Onira 2: 45.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum tibaginum* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 3887 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum uruguaianum* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 3330 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

ALSTROEMERIACEAE

Marta Camargo de Assis

2 gêneros, 45 espécies (40 endêmicas)

Alstroemeria L.

44 espécies (40 endêmicas)

***Alstroemeria albescens* M.C.Assis**
Voucher: Setubal, R.B. 246 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Alstroemeria amabilis* M.C.Assis**
Voucher: Kummrow, R. 3387 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Alstroemeria amazonica* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 14938)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Alstroemeria apertiflora* Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 25088 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Alstroemeria aquidauanica* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 24311 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Alstroemeria brasiliensis* Spreng.**
Voucher: Tombolato, A.F.C. s.n. (IAC 18467, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Alstroemeria burchellii* Baker**
Voucher: Rizzo, J.A. 4655 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Alstroemeria caiaponica* Ravenna**
Voucher: Fiaschi, P. 118 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Alstroemeria calliantha* M.C.Assis**
Voucher: Stehmann, J.R. 4007 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Alstroemeria capixaba* M.C.Assis**
Voucher: Assis, M.C. 569 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Alstroemeria caryophyllaea* Jacq.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 102 (USU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Alstroemeria chapadensis* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. 2964 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Alstroemeria cunha* Vell.**
Voucher: Kirizawa, M. 3266 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste, Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Alstroemeria foliosa* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Occhioni, P. 8058 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Alstroemeria fuscovinosa* Ravenna**
Voucher: Leoni, L.S. 2015 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Alstroemeria gardneri* Baker**
Voucher: Assis, M.C. 361 (CEN, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Alstroemeria inodora* Herb.**
Voucher: Hatschbach, G. 53681 (C, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Alstroemeria isabelleana* Herb.**
Voucher: Pirani, J.R. 273 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Alstroemeria julieae* M.C.Assis**
Voucher: Farinaccio, A. 316 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Alstroemeria longistaminea* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Tombolato, A.F.C. 926 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga
***Alstroemeria longistyla* Schenk**
Voucher: Hatschbach, G. 64337 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Alstroemeria malmeana* Kraenzl.**
Voucher: Poliquesi, C.B. 489 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Alstroemeria monticola* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Forzza, R.C. 1207 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Alstroemeria ochracea* M.C.Assis**
Voucher: Tombolato, A.F.C. (BHCB 52418)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Alstroemeria orchidioides* Meerow**
Voucher: Tombolato, A.F.C. 479 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Alstroemeria paraensis* M.C.Assis**
Voucher: Fróes, R.L. 30089 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Alstroemeria penduliflora* M.C.Assis**
Voucher: Rapini, A. 445 (BHCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Alstroemeria piauhyensis* Gardner**
Voucher: Franca, A.R. s.n. (TEPB 10594)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE); Caatinga
***Alstroemeria plantaginea* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Assis, M.C. 339 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Alstroemeria psittacina* Lehm.**
Voucher: Nave, A.G. 1199 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Alstroemeria punctata* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 36736 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Alstroemeria radula* Dusén**
Voucher: Mello-Silva, R. 9 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Alstroemeria ribeirensis* Ravenna**
Referência: Ravenna, P. 2003. Onira 9: 27.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Alstroemeria riedeliana* Audot.**
Referência: Audot, N. 1846. Rev. Hort. 4: 207.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Alstroemeria rupestris* M.C.Assis**
Voucher: Rapini, A. 790 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Alstroemeria sellowiana* Seub. *ex* Schenk**
Voucher: Kummrow, R. 3369 (BHCB, MBM, UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Alstroemeria speciosa* M.C.Assis**
Voucher: Custódio-Filho, A. 1561 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Alstroemeria stenopetala* Schenk**
Voucher: Heringer, E.P. 3949b (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Alstroemeria stenophylla* M.C.Assis**
Voucher: Assis, M.C. 560 (CEN, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Alstroemeria tombolatoana* M.C.Assis**
Voucher: Marquete, R. 2520 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Alstroemeria variegata* M.C.Assis**
Voucher: Krapovickas, A. 355493 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Alstroemeria viridiflora* Warm.**
Voucher: Brina, A.E. (BHCB 36359)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Alstroemeria xavantinensis* Ravenna**
Referência: Ravenna, P. 2000. Onira 4: 39.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Bomarea Mirb.

1 espécie (não endêmica)
***Bomarea edulis* (Tussac) Herb.**
Voucher: Daly, D.C. 7387 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO),
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

AMARANTHACEAE

Maria Salete Marchioretto, Luisa Senna , Josafá Carlos de Siqueira
19 gêneros, 145 espécies (71 endêmicas), 11 variedades
(1 endêmica)

Achyranthes L.

Maria Salete Marchioretto
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Achyranthes aspera* L.**
Voucher: Krieger, L. s.n. (PACA 85326)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES);
Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Achyranthes indica* (L.) Mill.**
Voucher: Krapovickas, A. 29947 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT),
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Alternanthera Forssk.

Luisa Senna
34 espécies (11 endêmicas), 6 variedades (1 endêmica)
***Alternanthera adscendens* Suess.**
Voucher: Ribas, O.S. 1417 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Alternanthera albida* (Moq.) Griseb.**
Voucher: Dombrowski, L.T. 14638 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica
***Alternanthera aquatica* (D.Parodi) Chodat**
Voucher: Cervi, A.C. 3299 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal
***Alternanthera bahiensis* Pedersen**
Referência: Pedersen, T.M. 1995. Flora do Pico das Almas,
Chapada Diamantina, Bahia, Brasil 115-119.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado
***Alternanthera bettzichiana* (Regel) G.Nicholson**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (MBM 121290)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (PA), Nordeste (MA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR);
Amazônia, Mata Atlântica
***Alternanthera brasiliana* (L.) Kuntze**
Distribuição: nativa; não endêmica
Alternanthera brasiliana* (L.) Kuntze var. *brasiliana
Voucher: Siqueira, J.C. 1007 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (PB), Centro-Oeste, Sudeste (RJ), Sul;
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Alternanthera brasiliana* var. *moquini* Uline & W.L.Bray**
Voucher: Castro, J.F. 79 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),
Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica
***Alternanthera decurrens* J.C.Siqueira**
Voucher: Hatschbach, G. 77985 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG); Cerrado
***Alternanthera dendrotricha* C.C.Towns.**
Voucher: Senna, L.R. 54 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Alternanthera dentata* (Moench) Stuchlík *ex* R.E.Fr.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1371 (GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA, PB), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Alternanthera flavida* Suess.**
Voucher: Mori, S.A. 12245 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Alternanthera hirtula* (Mart.) R.E.Fr.**
Voucher: Krapovickas, A. 34156 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Alternanthera januarensis* J.C.Siqueira**
Referência: Siqueira, J.C. 2004. Eugeniana 27: 11-17.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Alternanthera kurtzii* Schinz**
Voucher: Carvalho, A. s.n. (IAC 4311)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica

***Alternanthera littoralis* P.Beauv.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Alternanthera littoralis* var. *maritima* (Mart.) Pedersen**
Voucher: Lima, J.C.A. 115 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Alternanthera malmeana* R.E.Fr.**
Voucher: Pedersen, T.M. 11403 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Alternanthera markgrafii* Suess.**
Voucher: Hatschbach, G. 41263 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Alternanthera martii* R.E.Fr.**
Voucher: Anderson, W.R. 10259 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Alternanthera micrantha* R.E.Fr.**
Voucher: Plaumann, F. 394 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Alternanthera minutiflora* Suess.**
Voucher: Pereira, E. 127 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Alternanthera multicaulis* Kuntze**
Voucher: Noblick, L.R. 3251 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Alternanthera paronychioides* A.St.-Hil.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Alternanthera paronychioides* var. *amazonica* Huber**
Voucher: Silva, M. 1155 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Alternanthera paronychioides* var. *boliviana* (Rusby) Pedersen**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 149988)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (RN), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal
***Alternanthera paronychioides* var. *robusta* Chodat**
Voucher: Hatschbach, G. 30435 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb.**
Voucher: Kummrow, R. 1200 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Alternanthera pilosa* Moq.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 629 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Amazônia
***Alternanthera praelonga* A.St.-Hil.**
Voucher: Pedersen, T.M. 12667 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Alternanthera puberula* D.Dietr.**
Voucher: Hatschbach, G. 44001 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Alternanthera pulchella* Kunth**
Voucher: Humboldt, F.H.A. s.n. (MO 2074498)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Sul (RS); Amazônia, Pampa
***Alternanthera pungens* Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 21865 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Alternanthera ramosissima* (Mart.) Chodat**
Voucher: Arbo, M.M. 5200 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Alternanthera regelii* (Seub.) Schinz**
Voucher: Morretes, B.L. s.n. (SPF 19706)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado
***Alternanthera reineckii* Briq.**
Voucher: Krapovickas, A. 18057 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT), Sul (PR, SC); Cerrado, Pantanal
***Alternanthera rufa* (Mart.) D.Dietr.**
Voucher: Hatschbach, G. 22934 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Alternanthera sessilis* (L.) R.Br.**
Voucher: Davis, P.H. 60703 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Alternanthera tenella* Colla**
Voucher: Hatschbach, G. 21085 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Alternanthera tetramera* R.E.Fr.**
Voucher: Hatschbach, G. 65813 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga

Amaranthus L.

Maria Salete Marchioretto
10 espécies (nenhuma endêmica)
***Amaranthus blitum* L.**
Voucher: Ferreira, A.G. 641 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Amaranthus caudatus* L.**
Voucher: Barreto, K.D. 2496 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Amaranthus cruentus* L.**
Voucher: Aloisi, J. s.n. (SP 268488)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Amaranthus deflexus* L.**
Voucher: Rambo, B. 40277 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Amaranthus hybridus* L.**
Voucher: Rambo, B. 04 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Pampa
***Amaranthus muricatus* (Moq.) Hieron.**
Voucher: Rambo, B. 60559 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Amaranthus retroflexus* L.**
Voucher: Klein, A. 16024 (UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Amaranthus rosengurtii* Hunz.**
Voucher: Valls, J.F.M. s.n. (ICN 30752)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Amaranthus spinosus* L.**
Voucher: Friderichs, E. s.n. (PACA 10918)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
***Amaranthus viridis* L.**
Voucher: Rambo, B. 4095 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Blutaparon Raf.

Maria Salete Marchioretto, Luisa Senna
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Blutaparon portulacoides* (A.St.-Hil.) Mears**
Voucher: Magenta, M.A.G. s.n. (SPF 96261)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Blutaparon vermiculare* (L.) Mears**
Voucher: Mattos, L.A. 837 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PB, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Celosia L.

Luisa Senna
3 espécies (1 endêmica)
***Celosia argentea* L.**
Voucher: Oliveira, T.S. 2179 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Celosia corymbifera* Didr.**
Voucher: Kirizawa, M. 2272 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Celosia grandifolia* Moq.**
Voucher: Thomas, W. 13359 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

Chamissoa Kunth

Luisa Senna
2 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)
***Chamissoa acuminata* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamissoa acuminata* Mart. var. *acuminata
Voucher: Blanchet, J.S. 3576 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Chamissoa acuminata* var. *maximilianii* (Mart. *ex* Moq.) Sohmer**
Voucher: Blanchet, J.S. 2364 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica
***Chamissoa altissima* (Jacq.) Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chamissoa altissima* (Jacq.) Kunth var. *altissima
Referência: Sohmer, S.H. 1977. Mem. Torrey Bot. Club 104(2): 111-126.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chamissoa altissima* var. *rubella* Suess.**
Referência: Sohmer, S.H. 1977. Mem. Torrey Bot. Club 104(2): 111-126.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Chenopodium L.

Luisa Senna
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Chenopodium album* L.**
Voucher: Cordeiro, I. 509 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Chenopodium ambrosioides* L.**
Voucher: Rezende, G.S.Z. 268 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chenopodium murale* L.**
Voucher: Noblick, L.R. 3724 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Cyathula Blume

Luisa Senna
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cyathula achyranthoides* (Kunth) Moq.**
Voucher: Harley, R.M. 19482 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Cyathula prostrata* Blume**
Voucher: Maas, P.J.M. 12831 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Froelichia Moench

Maria Salete Marchioretto

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Froelichia humboldtiana* (Roem. & Schult.) Seub.**
Voucher: Noblick, L.R. 2733 (HUEFS, PACA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Froelichia interrupta* (L.) Moq.**
Voucher: Freire-Fierro, A. 1954 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Froelichia procera* (Seub.) Pedersen**
Voucher: Hatschbach, G. 15921 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Froelichia sericea* (Roem. & Schult.) Moq.**
Voucher: Mileski, E. 134 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Froelichia tomentosa* (Mart.) Moq.**
Voucher: Freitas, E. s.n. (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); Cerrado, Pampa

Froelichiella R.E.Fr.

Maria Salete Marchioretto

1 espécie (1 endêmica)

***Froelichiella grisea* R.E.Fr.**
Voucher: Hatschbach, G. 37210 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Gomphrena L.

Luisa Senna , Josafá Carlos de Siqueira

44 espécies (36 endêmicas)

***Gomphrena agrestis* Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 21940 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Gomphrena arborescens* L.f.**
Voucher: Irwin, H.S. 11097 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Gomphrena basilanata* Suess.**
Voucher: Harley, R.M. 19091 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Gomphrena celosioides* Mart.**
Voucher: Eiten, G. 3581 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Gomphrena centrota* E.Holzh.**
Voucher: Hatschbach, G. 29522 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Gomphrena chrestoides* C.C.Towns.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1493 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Gomphrena claussenii* Moq.**
Voucher: Kawasaki, M.L. 7575 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Gomphrena debilis* Mart.**
Voucher: Miranda, A.M. 3992 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Gomphrena demissa* Mart.**
Voucher: Duarte, A.P. 14108 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Gomphrena desertorum* Mart.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 11416 (BHMH)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Gomphrena duriuscula* Moq.**
Voucher: Costa, M.R. 886 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Gomphrena elegans* Mart.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 8855 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Gomphrena gardnerii* Moq.**
Voucher: Hatschbach, G. 42100 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga, Cerrado

***Gomphrena globosa* L.**
Voucher: Siqueira, J.C. 3504 (UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Gomphrena graminea* Moq.**
Voucher: Macedo, A. 533 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

***Gomphrena hatschbachiana* Pedersen**
Voucher: Hatschbach, G. 65947 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Gomphrena hermogenesii* J.C.Siqueira**
Voucher: Hatschbach, G. 37260 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Gomphrena hillii* Suess.**
Voucher: Eiten, G. 10061 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Gomphrena incana* Mart.**
Voucher: Giulietti, A.M. 956 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gomphrena lanigera* Pohl *ex* Moq.**
Voucher: Rizzo, J.A. 5854 (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Gomphrena leucocephala* Mart.**
Voucher: Barroso, G.M. 255 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga

***Gomphrena macrocephala* A.St.-Hil.**
Voucher: Hatschbach, G. 16058 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Gomphrena marginata* Seub.**
Voucher: Riedel, L. 1192 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gomphrena matogrossensis* Suess.**
Voucher: Lutz, A. s.n. (RB 110923)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Gomphrena microcephala* Moq.**
Voucher: Harley, R.M. 21496 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Gomphrena mollis* Mart.**
Voucher: Furlan, A. 7647 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Gomphrena moquinii* Seub.**
Voucher: Duarte, A.P. 11753 (BHMH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gomphrena nigricans* Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 27595 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Gomphrena paranensis* R.E.Fr.**
Voucher: Hatschbach, G. 23044 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Gomphrena perennis* L.**
Voucher: Rambo, B. 31737 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Gomphrena pohlii* Moq.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 2957 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Gomphrena prostrata* Mart.**
Voucher: Irwin, H.S. 9872 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Gomphrena pulchella* Mart.**
Voucher: Porto, M.L. 2438 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Gomphrena pulvinata* Suess.**
Voucher: Luetzelburg, P. 292 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Gomphrena regeliana* Seub.**
Voucher: Hatschbach, G. 30503 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado
***Gomphrena rudis* Moq.**
Voucher: Luetzelburg, P. 191a (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Gomphrena rupestris* Nees**
Voucher: Giulietti, A.M. 6746 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Gomphrena scandens* (R.E.Fr.) J.C.Siqueira**
Voucher: Góes, O.C. 531 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Gomphrena scapigera* Mart.**
Voucher: Pirani, J.R. 11108 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Gomphrena schlechtendaliana* Mart.**
Voucher: Pereira, A.C. 8454 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Gomphrena sellowiana* Mart.**
Voucher: Swallen, J.R. 7224b (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Gomphrena serturneroides* Suess.**
Voucher: Harley, R.M. 21230 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Gomphrena vaga* Mart.**
Voucher: França, F. 4196 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Gomphrena virgata* Mart.**
Voucher: Giulietti, A.M. 7114 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Hebanthe Mart.

Maria Salete Marchioretto
6 espécies (nenhuma endêmica)
***Hebanthe eriantha* (Poir.) Pedersen**
Voucher: Hatschbach, G. 18291 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Hebanthe grandiflora* (Hook.) Borsch & Pedersen**
Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 3486 (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Hebanthe occidentallis* (R.E.Fr.) Borsch & Pedersen**
Voucher: Krukoff, B.A. 5346 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Hebanthe pulverulenta* Mart.**
Voucher: Reitz, R. 4283 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Hebanthe reticulata* (Seub.) Borsch & Pedersen**
Voucher: Queiroz, L.P. 3279 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Hebanthe spicata* Mart.**
Voucher: Carvalho, A. 654 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica

Herbstia Sohmer

Maria Salete Marchioretto
1 espécie (não endêmica)
***Herbstia brasiliana* (Moq.) Sohmer**
Voucher: Hoehne, W. 5145 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Iresine P.Browne
Maria Salete Marchioretto
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Iresine diffusa* Humb. & Bonpl. *ex* Willd.**
Voucher: Taroda, N. 17048 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Iresine poeppigiana* Klotzsch**
Voucher: Poeppig, E.F. s.n. (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Lecosia Pedersen
Luisa Senna
2 espécies (2 endêmicas)
***Lecosia formicarum* Pedersen**
Voucher: Kallunki, J.A. 539 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Lecosia oppositifolia* Pedersen**
Voucher: Hatschbach, G. 51339 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Pedersenia Holub
Luisa Senna
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Pedersenia argentata* (Mart.) Holub**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pedersenia argentata* var. *amazonica* Seub.**
Referência: Seubert, M.A. 1875. Fl. bras. 5(1): 161-264.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Pfaffia Mart.
Maria Salete Marchioretto
20 espécies (15 endêmicas)
***Pfaffia acutifolia* (Moq.) O.Stützer**
Voucher: Hatschbach, G. 56612 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pfaffia aphylla* Suess.**
Voucher: Hatschbach, G. 27024 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pfaffia argyrea* Pedersen**
Voucher: Silva, T.R.S. 13482 (PACA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pfaffia cipoana* Marchior. et al.**
Voucher: Hensold, N. 820 (PACA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pfaffia denudata* (Moq.) Kuntze**
Voucher: Fonseca, M.L. 457 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Pfaffia elata* R.E.Fr.**
Voucher: Hatschbach, G. 32028 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Pfaffia glabrata* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 35347 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Pfaffia glomerata* (Spreng.) Pedersen**
Voucher: Hatschbach, G. 35139 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Pfaffia gnaphaloides* (L.f.) Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 13005 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Pfaffia hirtula* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 28760 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pfaffia jubata* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 37242 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Pfaffia minarum* Pedersen**
Voucher: Souza, V.C. 11768 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Pfaffia rupestris* Marchior. et al.**
Voucher: Pirani, J.R. 4300 (PACA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pfaffia sarcophylla* Pedersen**
Voucher: Macedo, A. 4458 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Pfaffia sericantha* (Mart.) Pedersen**
Voucher: Hatschbach, G. 42081 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pfaffia siqueiriana* Marchior. & Miotto**
Voucher: Santos, A 3326 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pfaffia townsendii* Pedersen**
Voucher: Lughadha, E. 51115 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pfaffia tuberculosa* Pedersen**
Voucher: Harley, R.M. 27180 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Pfaffia tuberosa* (Spreng.) Hicken**
Voucher: Hatschbach, G. 18778 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Pfaffia velutina* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 41674 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Quaternella Pedersen
Maria Salete Marchioretto
3 espécies (3 endêmicas)
***Quaternella confusa* Pedersen**
Voucher: Pabst, G.F.J. 8861 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Quaternella ephedroides* Pedersen**
Voucher: Queiroz, L.P. 7814 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Quaternella glabratoides* (Suess.) Pedersen**
Voucher: Dusén, P.K.H. 7819 (K, S)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Xerosiphon Turcz.
2 espécies (2 endêmicas)
***Xerosiphon angustiflorus* (Mart.) Pedersen**
Voucher: Queiroz, L.P. 7076 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Xerosiphon aphyllus* (Pohl *ex* Moq.) Pedersen**
Voucher: Melo, E. 1737 (ALCB, HUEFS, HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (AL),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

AMARYLLIDACEAE
Julie H. A. Dutilh
12 gêneros, 103 espécies (68 endêmicas), 1 variedade
(1 endêmica)

Cearanthes Ravenna
1 espécie (1 endêmica)
***Cearanthes fuscoviolacea* Ravenna**
Voucher: Sucre, D. 10347 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Crinum L.
1 espécie (não endêmica)
***Crinum americanum* L.**
Voucher: Hatschbach, G. 50733 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Eithea Ravenna
1 espécie (1 endêmica)
***Eithea blumenavia* (Koch & Bouché) Ravenna**
Voucher: Kirizawa, M. 2755 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Eucharis Planch. & Linden
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Eucharis castelnaeana* (Baill.) J.F.Macbr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5737 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Eucharis cyaneosperma* Meerow**
Voucher: Krukoff, B.A. 5573 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Eucharis ulei* Kraenzl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4637 (G, GH, K, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

Griffinia Ker Gawl.
20 espécies (20 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)
***Griffinia alba* Preuss & Meerow**
Voucher: Pickel, B.J. 2907 (US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Griffinia aracensis* Ravenna**
Voucher: Heringer, E.P. 72-40 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado
***Griffinia arifolia* Ravenna**
Voucher: Santos, T.S. 927 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Griffinia colatinensis* Ravenna**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 06588 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Griffinia concinna* (Mart.) Ravenna**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Griffinia cordata* K.D.Preuss & Meerow**
Voucher: Sanders, F. 280 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Griffinia espiritensis* Ravenna**
Distribuição: nativa; endêmica
Griffinia espiritensis* Ravenna var. *espiritensis
Voucher: Hatschbach, G. 46913 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Griffinia gardneriana* (Herb.) Ravenna**
Voucher: Gardner, G. 1854 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE,
BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga
***Griffinia hyacinthina* Ker Gawl.**
Voucher: Lombardi, J.A. 4343 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica
***Griffinia ilheusiana* Ravenna**
Voucher: Pinheiro,R.S. 334 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Griffinia intermedia* Lindl.**
Referência: Lindley, J. 1826. Bot. Reg. 12: t. 990.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Griffinia itambensis* Ravenna**
Voucher: Anderson, W.R. 35681 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Griffinia leucantha* K.D.Preuss**
Voucher: Sanders, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica
***Griffinia liboniana* Morren**
Voucher: Lombardi, J.A. 1450 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Griffinia mucurina* Ravenna**
Voucher: Mori, S. 10441 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Griffinia nocturna* Ravenna**
Voucher: Cavalcanti, T.B. s.n. (IAC 40270)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Griffinia parviflora* Ker Gawl.**
Voucher: Hage, J.L. 1476 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Griffinia paubrasilica* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 53647 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Griffinia rochae* Morel**
Voucher: Morel ,G.M. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Griffinia rostrata* Ravenna**
Voucher: Harley, R.M. 10975 (K, MT, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Habranthus Herb.

13 espécies (11 endêmicas)
***Habranthus araguaiensis* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 35087 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; Cerrado
***Habranthus bahiensis* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 39682 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Habranthus concinnus* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 54460 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Mata Atlântica
***Habranthus datensis* Ravenna**
Voucher: Archer, A. 4091 (BHCB, RB, BHMH, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado
***Habranthus duarteanus* Ravenna**
Voucher: Duarte, A.P. 10595 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Habranthus gameleirensis* Ravenna**
Voucher: Pires, J.M. 16169 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; Domínio desconhecido
***Habranthus goianus* Ravenna**
Voucher: Prance, G.T. 58505 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Habranthus irwinianus* Ravenna**
Voucher: Mello Barreto 8809 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Habranthus itaobinus* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 48134 (GFJP, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga
***Habranthus minor* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 56089 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Habranthus pantanalensis* Ravenna**
Voucher: Pott, A. 3633 (CPAP, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Habranthus pedunculosus* Herb.**
Voucher: Rambo, B. 63639 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Habranthus ruber* Ravenna**
Voucher: Emrich, K. s.n. (PACA 52819)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

Hippeastrum Herb.

34 espécies (22 endêmicas)
***Hippeastrum angustifolium* Pax**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 36534)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Hippeastrum araripinum* (Ravenna) Meerow**
Voucher: Ravenna, P. 165 (Herb. Ravenna)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Hippeastrum aulicum* Herb.**
Voucher: Baitello, J.B. 409 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hippeastrum blossfeldiae* (Traub & J.L.Doran) Van Scheepen**
Voucher: Ziller, S.R. 888 (HFCS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Hippeastrum brasilianum* (Traub & J.L.Doran) Dutilh**
Voucher: Traub, H.P. 1132 (MO, TRA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Hippeastrum breviflorum* Herb.**
Voucher: Sellow, F. 7676 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Mata Atlântica
***Hippeastrum caiaponicum* (Ravenna) Dutilh**
Voucher: Hatschbach, G. 37711 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hippeastrum calyptratum* Herb.**
Voucher: Gardner, G. 687 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Hippeastrum correiense* (Bury) Worsley**
Referência: Bury, E. 1831-1834. Select. Hexandr. Pl. 9.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido
***Hippeastrum curitibanum* (Ravenna) Dutilh**
Voucher: Kummrow, R. 642 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Hippeastrum damazianum* Beauverd**
Voucher: Damazio, L.B. 1481 (G, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Hippeastrum elegans* (Spreng.) H.E.Moore**
Voucher: Gardner, G. 3477 (BM, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Hippeastrum gertianum* (Ravenna) Dutilh**
Voucher: Hatschbach, G. 27082 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido
***Hippeastrum glaucescens* (Mart.) Herb.**
Voucher: Souza, V.C. 12184 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hippeastrum goianum* (Ravenna) Meerow**
Voucher: Haas, A. 170 (U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Hippeastrum guarapuavicum* (Ravenna) Van Scheepen**
Voucher: Hatschbach, G. 23129 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;
Cerrado, Mata Atlântica
***Hippeastrum hemographes* (Ravenna) Dutilh**
Voucher: Reitz, R. 7367 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Hippeastrum iguazuanum* (Ravenna) T.R.Dudley & M.Williams**
Voucher: Hatschbach, G. 19784 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica
***Hippeastrum kromeri* (Worsley) Meerow**
Referência: Meerow, A.W. et al. 1997. Taxon 46: 17.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hippeastrum leucobasis* (Ravenna) Dutilh**
Voucher: Hatschbach, G. 35016 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Hippeastrum maracasum* (Traub) H.E.Moore**
Voucher: Traub, H.P. 198-201 (MO, TRA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Hippeastrum marumbiense* (Ravenna) Van Scheepen**
Voucher: Hatschbach, G. 24191 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hippeastrum morelianum* Lem.**
Voucher: Coffani, J.V. 047 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Hippeastrum papilio* (Ravenna) Van Scheepen**
Voucher: Ravenna, P. 1000 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hippeastrum psittacinum* Herb.**
Voucher: Dutilh, J.H.A. 701 (UEC 19774)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Hippeastrum puniceum* (Lam.) Kuntze**
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 10454 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Hippeastrum reginae* (L.) Herb.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 10454 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste
(MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Hippeastrum reticulatum* Herb.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 2175 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Hippeastrum rubropictum* (Ravenna) Meerow**
Voucher: Hatschbach, G. 19683 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR);
Domínio desconhecido
***Hippeastrum santacatarina* (Traub) Dutilh**
Voucher: Hatschbach, G. 15011 (MBM 3774)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hippeastrum solandriflorum* (Lindl.) Herb.**
Voucher: Sano, P.T. H52316 (BHCB, CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG);
Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Hippeastrum striatum* (Lam.) Moore**
Voucher: Santos, T.S. 1822 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hippeastrum stylosum* Herb.**
Voucher: Gardner, G. 1167 (BM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN,
PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Hippeastrum vittatum* (L'Hér.) Herb.**
Voucher: Hatschbach, G. 15184 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Domínio desconhecido

Hymenocallis Salisb.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Hymenocallis littoralis* (Jacq.) Salisb.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 162-163.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste, Sudeste;
Domínio desconhecido
***Hymenocallis schizostephana* Worsley**
Referência: Hooker, J.D. 1901. Curtis Bot. Mag. 127: 7762.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Hymenocallis tubiflora* Salisb.**
Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 162.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA); Domínio desconhecido

Rhodophiala C.Presl

2 espécies (1 endêmica)
***Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub**
Referência: Herbert, W.M. 1825.
Curtis Bot. Mag. 52(10), t. 2597.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Rhodophiala cipoana* Ravenna**
Voucher: Mota, R.C. 1923 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

Tocantinia Ravenna

1 espécie (1 endêmica)
***Tocantinia mira* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 56087 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO);
Domínio desconhecido

Worsleya Traub

1 espécie (1 endêmica)
***Worsleya rayneri* (Hook.f.) Traub & Moldenke**
Voucher: Martinelli, G. 6748 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Zephyranthes Herb.

23 espécies (10 endêmicas)
***Zephyranthes americana* (Hoffmanns.) Ravenna**
Voucher: Jürgens, C. 38 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Zephyranthes amoena* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 28355 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Zephyranthes brachyandra* (Baker) Backer**
Referência: Backer, C.A. & Bakhuizen van der Brink, R.C. 1951. Fl. Java 11(228): 11.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Zephyranthes brasiliensis* (Traub) Traub**
Voucher: Traub, H.P. s.n. (US 01898317)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica
***Zephyranthes caerulea* (Griseb.) Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 19722 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Zephyranthes candida* (Lindl.) Herb.**
Voucher: Souza, V.C. 2249 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Zephyranthes capivarina* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 1010 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Mata Atlântica
***Zephyranthes cearensis* (Herb.) Baker**
Voucher: Gardner, G. 1858 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado
***Zephyranthes flavissima* Ravenna**
Voucher: Stehmann, J.R. 3377 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Zephyranthes franciscana* Herb.**
Voucher: Gardner, G. 1422 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Zephyranthes gratissima* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 2722 (BA, BM, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Zephyranthes lactea* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 283 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Zephyranthes lagesiana* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 2700 (BA, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Zephyranthes mesochloa* Herb. *ex* Lindl.**
Voucher: Rambo, B. 64306 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Zephyranthes microstigma* Ravenna**
Referência: Ravenna, P. 2005. Onira 10: 8.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa
***Zephyranthes minima* Herb.**
Voucher: Pedersen, T.M. 15698 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Zephyranthes paranaensis* Ravenna**
Voucher: Hatschbach, G. 19865 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Zephyranthes purpurella* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 5017 (R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO); Cerrado
***Zephyranthes robusta* Baker**
Voucher: Lemos-Filho, J.P. s.n. (BHCB 31270)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Zephyranthes seubertii* (Seub.) H.H.Hume**
Voucher: Nicora, E.G. 1 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Zephyranthes sylvatica* (Mart.) Baker**
Voucher: Araújo-Alves, A. 31 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste; Caatinga, Cerrado
***Zephyranthes tubispatha* Herb.**
Referência: Arroyo, S.C. 1990. Parodiana (6): 11-30.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Zephyranthes uruguaianica* Ravenna**
Voucher: Ravenna, P. 4351 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

ANACARDIACEAE

Cíntia Luiza da Silva Luz, José Rubens Pirani
14 gêneros, 57 espécies (14 endêmicas), 10 variedades (1 endêmica)

Anacardium L.

9 espécies (4 endêmicas)
***Anacardium amapaense* J.D.Mitch.**
Voucher: Pires, J.M. 51650 (MG, RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia, Mata Atlântica
***Anacardium corymbosum* Barb.Rodr.**
Voucher: Hatschbach, G. 63581 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Anacardium giganteum* W.Hancock *ex* Engl.**
Voucher: Pires, J.M. 113446 (MG, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Anacardium humile* A.St.-Hil.**
Voucher: Harley, R.M. 76038 (HUEFS, K, NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Anacardium microsepalum* Loes.**
Voucher: Loureiro, A. 48461 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Anacardium nanum* A.St.-Hil.**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 7450 (MBM, NY, R, SP, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Anacardium occidentale* L.**
Voucher: Pirani, J.R. 2670 (HUEFS, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Anacardium parvifolium* Ducke**
Voucher: Oliveira, A.A. 1142 (INPA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Mata Atlântica
***Anacardium spruceanum* Benth. *ex* Engl.**
Voucher: Oliveira, A.A. 1330 (INPA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Mata Atlântica

Antrocaryon Pierre
1 espécie (não endêmica)
***Antrocaryon amazonicum* (Ducke) B.L.Burtt & A.W.Hill**
Voucher: Figueiredo, C. 460 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste; Amazônia

Apterokarpos Rizzini
1 espécie (1 endêmica)
***Apterokarpos gardneri* (Engl.) Rizzini**
Voucher: Pirani, J.R. 2586 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

Astronium Jacq.
9 espécies (3 endêmicas)
***Astronium concinnum* Schott**
Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 129 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Astronium fraxinifolium* Schott**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 12961 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Astronium gardneri* Mattick**
Voucher: Gardner, G. 2520 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI); Caatinga
***Astronium glaziovii* Mattick**
Voucher: Andreata, R.H.P. 719 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Astronium gracile* Engl.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 969 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, RO); Amazônia, Cerrado
***Astronium graveolens* Jacq.**
Voucher: Harley, R.M. 24804 (F, HUEFS, K, NY, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Astronium lecointei* Ducke**
Voucher: Rodrigues, W.A. 7948 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Astronium nelson-rosae* Santin**
Voucher: Barros-Barreto, M.B. 10230 (BHMH, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Astronium ulei* Mattick**
Voucher: Rodrigues, W.A. 10237 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Campnosperma Thwaites
1 espécie (não endêmica)
***Campnosperma gummifera* Marchand**
Referência: Marchand, N.L. 1869. Rev. Anacardiac. 173.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

Cyrtocarpa Kunth
2 espécies (1 endêmica)
***Cyrtocarpa caatingae* J.D.Mitch. & Daly**
Voucher: Mori, S.A. 11248 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Cyrtocarpa velutinifolia* (Cowan) J.D.Mitch. & Daly**
Voucher: Pires, J.M. 16709 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Lithrea Miers *ex* Hook. & Arn.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Lithrea brasiliensis* Marchand**
Voucher: Forzza, R.C. 3371 (MBM, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Lithrea molleoides* (Vell.) Engl.**
Voucher: Harley, R.M. 27079 (F, HUEFS, K, MBM, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Mangifera L.
1 espécie (não endêmica)
***Mangifera indica* L.**
Voucher: Rossi, L. 253 (PMSP, SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA),
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Myracrodruon Allemão
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Myracrodruon balansae* (Engl.) Santin**
Voucher: Fleig, M. 101 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Myracrodruon urundeuva* Allemão**
Voucher: Pirani, J.R. 4277 (MBM, NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

Schinopsis Engl.
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (1 endêmica)
***Schinopsis balansae* Engl.**
Voucher: Moreira, F.F. s.n. (RB 422362)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Schinopsis brasiliensis* Engl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Schinopsis brasiliensis* var. *glabra* Engl.**
Referência: Engler, H.G.A. 1876. Fl. bras. 12(2): 404.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Schinus L.
11 espécies (2 endêmicas), 7 variedades (nenhuma endêmica)
***Schinus engleri* F.A.Barkley**
Distribuição: nativa; não endêmica
Schinus engleri* F.A.Barkley var. *engleri
Voucher: Duarte, A.P. 5287 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Schinus engleri* var. *uruguayensis* F.A.Barkley**
Referência: Barkley, F.A. 1957. Lilloa 28: 49-51.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Schinus ferox* Hassl.**
Voucher: Rambo, B. 30888 (LIL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (SC, RS); Cerrado, Pampa
***Schinus lentiscifolius* Marchand**
Voucher: Hatschbach, G. 79024 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Schinus longifolius* (Lindl.) Speg.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Schinus longifolius* (Lindl.) Speg. var. *longifolius
Voucher: Reitz, R. 532 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Schinus molle* L.**
Voucher: Pirani, J.R. 514 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Schinus pearcei* Engl.**
Voucher: Fleig, M. 958 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera**
Voucher: Guimarães, J.G. 1114 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Schinus ramboi* F.A.Barkley**
Voucher: Pirani, J.R. 2515 (F, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Schinus spinosus* Engl.**
Voucher: Hatschbach, G. 14992 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Schinus terebinthifolius* Raddi**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Schinus terebinthifolius* var. *acutifolius* Engl.**
Voucher: Rossi, L. 224 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Schinus terebinthifolius* var. *pohlianus* Engl.**
Voucher: Venturelli, M. s.n. (SPF 78304, SPSF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Schinus terebinthifolius* var. *raddianus* Engl.**
Voucher: Gomes, J.C. 2622 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Schinus terebinthifolius* var. *rhoifolius* (Mart.) Engl.**
Voucher: Robim, M.J. 599 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Schinus weinmannifolius* Engl.**
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 66843)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Spondias L.

6 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Spondias dulcis* Parkinson**
Voucher: Hage, J.L. 352 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Spondias macrocarpa* Engl.**
Voucher: Farney, C. 4172 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Spondias mombin* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Spondias mombin* var. *globosa* J.D.Mitch. & Daly**
Voucher: Daly, D.C. 9548 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Spondias mombin* L. var. *mombin
Voucher: Daly, D.C. 10039 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Spondias testudinis* J.D.Mitch. & Daly**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10116a (AAU, HPZ, INPA, L, MG, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Spondias tuberosa* Arruda**
Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 1115 (ALCB, BAH, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Spondias venulosa* (Engl.) Engl.**
Voucher: Correia, C. 161 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Tapirira Aubl.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Tapirira guianensis* Aubl.**
Voucher: Mello-Silva, R. 759 (CTES, HUEFS, K, LPB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Tapirira obtusa* (Benth.) J.D.Mitch.**
Voucher: Vicentini, A. 1033 (COL, F, INPA, K, MG, NY, SPF, UEC, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Tapirira pilosa* Sprague**
Voucher: Daly, D.C. 4320 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tapirira retusa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23582)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Thyrsodium Salzm. *ex* Benth.

6 espécies (nenhuma endêmica)
***Thyrsodium bolivianum* J.D.Mitch. & Daly**
Voucher: Prance, G.T. 3258 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Thyrsodium guianense* Sagot *ex* Marchand**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9702 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA); Amazônia
***Thyrsodium herrerense* Encarn.**
Voucher: Daly, D.C. 4500 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Thyrsodium puberulum* J.D.Mitch. & Daly**
Voucher: Irwin, H.S. 48121 (K, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA); Amazônia
***Thyrsodium rondonianum* J.D.Mitch. & Daly**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6330 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Thyrsodium spruceanum* Benth.**
Voucher: Pirani, J.R. 2656 (NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

ANISOPHYLLEACEAE

Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros
2 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Anisophyllea R.Br. *ex* Sabine

1 espécie (não endêmica)
***Anisophyllea manausensis* Pires & W.A.Rodrigues**
Voucher: Vicentini, A. 1042 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Polygonanthus Ducke

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Polygonanthus amazonicus* Ducke**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4262 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Polygonanthus punctulatus* Kuhlm.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 37727)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

ANNONACEAE

Paul Maas, Heimo Rainer, Adriana Lobão
29 gêneros, 385 espécies (158 endêmicas)

Anaxagorea A.St.-Hil.

14 espécies (1 endêmica)
***Anaxagorea acuminata* (Dunal) A.DC.**
Voucher: Pires, J.M. 50477 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Anaxagorea angustifolia* Timmerman**
Voucher: Fróes, R.L. 22217 (IAN, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Anaxagorea brachycarpa* R.E.Fr.**
Voucher: Prance, G.T. 15635 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Anaxagorea brevipedicellata* Timmerman**
Voucher: Campbell, D.G. P22258 (INPA, K, MEXU,
MO, NY, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Anaxagorea brevipes* Benth.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6820 (A, BM, BR, F, K, LE, MICH,
MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Anaxagorea dolichocarpa* Sprague & Sandwith**
Voucher: Harley, R.M. 17549 (K, MO, NY, P, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Anaxagorea gigantophylla* R.E.Fr.**
Voucher: Maguire, B. 60311 (F, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Anaxagorea macrantha* R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 6749 (F, INPA, K, MO, NY, U, WU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Anaxagorea manausensis* Timmerman**
Voucher: Prance, G.T. 14745 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Anaxagorea petiolata* R.E.Fr.**
Voucher: Prance, G.T. 9733 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Anaxagorea phaeocarpa* Mart.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB 19631, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Anaxagorea prinoides* (Dunal) A.DC.**
Voucher: Cowan, R.S. 38515 (NY, RB, S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Anaxagorea rufa* Timmerman**
Voucher: Cavalcante, P.B. 641 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Anaxagorea silvatica* R.E.Fr**.
Voucher: Maas, P.J.M. 8836 (H, MBML, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Annona L.

80 espécies (25 endêmicas)
***Annona acutiflora* Mart.**
Voucher: Vinha, P.C. 812 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Annona amazonica* R.E.Fr.**
Voucher: Prance, G.T. 2377 (GH, K, MG, NY, S, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Annona ambotay* Aubl.**
Voucher: Irwin, H.S. 48244 (F, FHO, G, GH, M,
MG, MO, NY, S, U, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Annona angustifolia* Huber**
Voucher: Ducke, A. 107 (A, F, K, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Annona annonoides* (R.E.Fr.) Maas & Westra**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1911 (RB, S)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Annona asplundiana* R.E.Fr.**
Voucher: Prance, G.T. 23781 (NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Annona atabapensis* Kunth**
Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 8094 (MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Annona aurantiaca* Barb.Rodr.**
Voucher: Fróes, R.L. 2054 (A, G, K, NY, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado, Pantanal
***Annona bahiensis* (Maas & Westra) H.Rainer**
Voucher: Harley, R.M. 18451 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Annona burchellii* R.E.Fr.**
Voucher: Irwin, H.S. 34800 (F, MO, NY, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Annona cacans* Warm.**
Voucher: Peixoto, A.L. 3181 (MO, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Annona calcarata* (R.E.Fr.) H.Rainer**
Voucher: Krukoff, B.A. 5315 (A, B, BM, F, G,
M, MICH, MO, NY, U, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Annona centrantha* (R.E.Fr.) H.Rainer**
Voucher: Daly, D.C. 8557 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Annona cordifolia* (Szyszył.) R.E.Fr.**
Voucher: Figueiredo, C. 186 (MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Annona coriacea* Mart.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 9485 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Pantanal
***Annona cornifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Irwin, H.S. 25241 (F, MO, NY, RB, U, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Pantanal
***Annona crassiflora* Mart.**
Voucher: Irwin, H.S. 14674 (MO, NY, S, SP, TEX)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Pantanal
***Annona crotonifolia* Mart.**
Voucher: Irwin, H.S. 9236 (MO, NY, S, SP, TEX, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);
Cerrado, Pantanal
***Annona cuspidata* (Mart.) H.Rainer**
Voucher: Amaral, I.L. 242 (INPA, MG, NY, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC,
RO); Amazônia
***Annona deminuta* R.E.Fr.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9843 (NY, WU)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia
***Annona densicoma* Mart.**
Voucher: Silva, J.A. 292 (INPA, K, NY, SP, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Annona dioica* A.St.-Hil.**
Voucher: Mello-Silva, R. 2355 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Pantanal
***Annona dolabripetala* Raddi**
Voucher: Duarte, A.P. 4960 (AAU, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Annona dolichophylla* R.E.Fr.**
Voucher: Plowman, T.C. 12266 (MG, RB, U, WU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Annona echinata* Dunal**
Voucher: Lobo, M.G. 308 (MG, U, WU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA); Amazônia
***Annona edulis* (Triana & Planch.) H.Rainer**
Voucher: Maas, P.J.M. 6753 (INPA, NY, U, WU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Annona emarginata* (Schltdl.) H.Rainer**
Voucher: Záchia, R.A. 847 (ICN, PACA, PEL, SPF, SPSF, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Annona excellens* R.E.Fr.**
Voucher: Prance, G.T. 3395 (K, MG, NY, R, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Annona exsucca* DC.**
Voucher: Westra, L.Y.T. 47317 (FHO, MG, MO, NY, S, U,
VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
RO), Nordeste (MA, CE), Sudeste (MG); Amazônia
***Annona ferruginea* (R.E.Fr.) H.Rainer**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6111 (AAU, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica
***Annona foetida* Mart.**
Voucher: Forero, E. 7091 (K, MO, NY, S, U, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Annona gardneri* R.E.Fr.**
Voucher: Gardner, G. 2996 (BM, FI, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Annona gigantophylla* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 6754 (NY, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Annona glabra* L.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 3632 (GUA, HRB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste, Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Annona glaucophylla* R.E.Fr.**
Voucher: Prance, G.T. 18967 (K, NY, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (SP); Cerrado, Pantanal
***Annona glomerulifera* (Maas & Westra) H.Rainer**
Voucher: Silveira, M. 424 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Annona haematantha* Miq.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 132 (NY, SP, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Annona hispida* (Maas & Westra) H.Rainer**
Voucher: Daly, D.C. 11480 (HPZ, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Annona hypoglauca* Mart.**
Voucher: Silva, M.G. 3912 (MG, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Annona insignis* R.E.Fr.**
Voucher: Prance, G.T. 7974 (MEXU, MG, MO, NY, R, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Annona jahnii* Saff.**
Voucher: Silva, M.G. 192 (HB, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR);
Amazônia, Cerrado
***Annona jucunda* Diels**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2651 (MG, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Annona leptopetala* (R.E.Fr.) H.Rainer**
Voucher: Harley, R.M. 18943 (CEPEC, K, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Annona malmeana* R.E.Fr.**
Voucher: Irwin, H.S. 18955 (MO, NY, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal
***Annona mammifera* (Maas & Westra) H.Rainer**
Voucher: Campbell, D.G. 9002 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Annona maritima* (Záchia) H.Rainer**
Voucher: Rambo, B. s.n. (B, HBR, PACA 54826)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Annona montana* Macfad.**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 608 (F, MG, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Annona monticola* Mart.**
Voucher: Heringer, E.P. 2573 (K, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal
***Annona mucosa* Jacq.**
Voucher: Irwin, H.S. 2207 (F, MICH, NY, R, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Annona neoinsignis* H.Rainer**
Voucher: Ducke, A. 141 (A, F, K, MO, NY, RB, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Annona neolaurifolia* H.Rainer**
Voucher: Maas, P.J.M. 7074 (CEPEC, NY, P, S, U, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Annona neosalicifolia* H.Rainer**
Voucher: Záchia, R.A. 657 (B, BHCB, G, ICN, K, PACA, S, SP, SPF, U, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Annona neosericea* H.Rainer**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (S, SP 7768)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Annona nitida* Mart.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5287 (MG, MO, NY, RB, U, WU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Annona nutans* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**
Voucher: Pires, J.M. 17327 (HRB, MG, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Annona paludosa* Aubl.**
Voucher: Fróes, R.L. 11791 (A, F, MO, NY, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO);
Amazônia, Cerrado
***Annona papilionella* (Diels) H.Rainer**
Voucher: Silva, M.G. 6088 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Annona paraensis* R.E.Fr.**
Voucher: Cavalcante, P. 180 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Annona parviflora* (A.St.-Hil.) H.Rainer**
Voucher: Maas, P.J.M. 7089 (GUA, K, MO, NY, U, WIS, WU, Z)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Annona pickelii* (Diels) H.Rainer**
Voucher: Leal, C.G. s.n. (MO, RB 70848)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PB, PE, SE); Mata Atlântica
***Annona poeppigii* (Mart.) Maas & Westra**
Voucher: Poeppig, E.F. 2685 (BR, LE, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Annona prevostiae* H.Rainer**
Voucher: Pires, J.M. 1637 (IAN, S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA); Amazônia
***Annona rigida* R.E.Fr.**
Voucher: Pires, J.M. 1097 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Annona rugulosa* (Schltdl.) H.Rainer**
Voucher: Hatschbach, G. 1664 (HBR, MBM, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Annona saffordiana* R.E.Fr.**
Voucher: Coêlho-de-Moraes, J. 717 (ALCB, COL, GH, IPA, K, P, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Annona salzmannii* A.DC.**
Voucher: Duarte, A.P. 8032 (HB, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Annona sanctae-crucis* S.Moore**
Voucher: Malme, G.O.A. I-1206 (G, F, R, S, UPS, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Annona scandens* Diels**
Voucher: Rosa, N.A. 1169 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AC); Amazônia

***Annona schunkei* (Maas & Westra) H.Rainer**
Voucher: Campbell, D.G. 8665 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Annona sericea* Dunal**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3433 (MG, MO, NY, R, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Annona spinescens* Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 19081 (IPA, K, M, MO, NY, P, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga
***Annona sylvatica* A.St.-Hil.**
Voucher: Harley, R.M. 16512 (CEPEC, K, M, MO, NY, P, RB, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Annona symphyocarpa* Sandwith**
Voucher: Pires, J.M. 14526 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Annona tenuiflora* Mart.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, P, RB 19640, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Annona tomentosa* R.E.Fr.**
Voucher: Irwin, H.S. 23127 (F, MG, MO, NY, R, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal
***Annona ubatubensis* (Maas & Westra) H.Rainer**
Voucher: Gibbs, P.E. 3501 (E, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Annona vepretorum* Mart.**
Voucher: Arbo, M.M. 5671 (GH, RB, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Annona warmingiana* Mello-Silva & Pirani**
Voucher: Irwin, H.S. 9829 (F, LE, MO, NY, S, SP, TEX, US, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Annona williamsii* (Rusby *ex* R.E.Fr.) H.Rainer**
Voucher: Prance, G.T. 7938 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Annona xylopiifolia* A.St.-Hil. & Tul.**
Voucher: Brade, A.C. 19766 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Bocagea A.St.-Hil.

2 espécies (2 endêmicas)
***Bocagea longepedunculata* Mart.**
Voucher: Magalhães, G.M. 18868 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Bocagea viridis* A.St.-Hil.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 119 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Bocageopsis R.E.Fr.

4 espécies (1 endêmica)
***Bocageopsis canescens* (Benth.) R.E.Fr.**
Voucher: Pipoly, J.J. 6779 (F, INPA, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia, Cerrado
***Bocageopsis mattogrossensis* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**
Voucher: Malme, G.O.A. II-2390 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Bocageopsis multiflora* (Mart.) R.E.Fr.**
Voucher: Poeppig, E.F. 2668 (BM, BR, F, G, GOET, HAL, K, M, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Bocageopsis pleiosperma* Maas**
Voucher: Silva, M.G. 3927 (INPA, MG, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Cardiopetalum Schltdl.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Cardiopetalum calophyllum* Schltdl.**
Voucher: Maas, P.J.M. 8895 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PI, RN), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Cardiopetalum plicatum* N.A.Murray**
Voucher: Silva, M.F. 645 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Cardiopetalum surinamense* R.E.Fr.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1925 (GH, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

Cremastosperma R.E.Fr.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Cremastosperma cauliflorum* R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 9251 (HPZ, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Cremastosperma microcarpum* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6151 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cremastosperma monospermum* (Rusby) R.E.Fr.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10286 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia
***Cremastosperma oblongum* R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 9148 (HPZ, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Cymbopetalum Benth.

5 espécies (2 endêmicas)
***Cymbopetalum alkekengi* N.A.Murray**
Voucher: Mori, S.A. 9170 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cymbopetalum brasiliense* (Vell.) Benth. *ex* Baill.**
Voucher: Sucre, D. 10157 (COL, F, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Cymbopetalum euneurum* N.A.Murray**
Voucher: Sothers, C.A. 960 (INPA, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cymbopetalum longipes* Benth. *ex* Diels**
Voucher: Prance, G.T. 12007 (INPA, NY, U, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Cymbopetalum physaloides* N.A.Murray**
Voucher: Silva, M.F. 427 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Diclinanona R.E.Fr.

3 espécies (1 endêmica)
***Diclinanona calycina* (Diels) R.E.Fr.**
Voucher: Martins, L.H.P. 28 (BM, INPA, K, MG, R, U, UB, ULM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Diclinanona matogrossensis* Maas**
Voucher: Santos, R.R. 1247 (E, MO, NY, RB, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Diclinanona tessmannii* Diels**
Voucher: Daly, D.C. 9908 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC); Amazônia

Duckeanthus R.E.Fr.

1 espécie (1 endêmica)
***Duckeanthus grandiflorus* R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 6778 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Duguetia A.St.-Hil.

66 espécies (28 endêmicas)
***Duguetia arenicola* Maas**
Voucher: Duarte, A.P. 9838 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duguetia argentea* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 6764 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Duguetia aripuanae* Maas**
Voucher: Lisboa, P. 78 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Duguetia asterotricha* (Diels) R.E.Fr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5389 (B, F, G, K, MG, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duguetia bahiensis* Maas**
Voucher: Maas, P.J.M. 6987 (CEPEC, LPZ, MO, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Duguetia cadaverica* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, F, G, GH, MG 7995, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Duguetia calycina* Benoist**
Voucher: Fróes, R.L. 28375 (IAN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Duguetia cauliflora* R.E.Fr.**
Voucher: Amaral, I.L. 223 (MG, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Duguetia chrysea* Maas**
Voucher: Mori, S.A. 20697 (INPA, K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Duguetia chrysocarpa* Maas**
Voucher: Mello-Silva, R. 98 (BHCB, K, MBM, MO, NY, RB, SP, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Duguetia dicholepidota* Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 18917 (CEPEC, IAN, K, M, MO, NY, P, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Duguetia duckei* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, RB 19643, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Cerrado
***Duguetia echinophora* R.E.Fr.**
Voucher: Fróes, R.L. 1905 (A, B, BM, F, G, K, MICH, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Duguetia elliptica* R.E.Fr.**
Voucher: Spruce, R. 2946 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duguetia eximia* Diels**
Voucher: Rosa, N.A. 1035 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Duguetia flagellaris* Huber**
Voucher: Maas, P.J.M. 8049 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Duguetia fufuracea* (A.St.-Hil.) Saff.**
Voucher: Heringer, E.P. 5971 (K, MG, MO, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Duguetia gardneriana* Mart.**
Voucher: Gardner, G. 914 (B, E, F, G, K, NY, OXF, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, SE); Cerrado, Mata Atlântica
***Duguetia glabriuscula* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**
Voucher: Malme, G.O.A. II-2440 (LE, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Duguetia granvilleana* Maas**
Voucher: Cowan, R.S. 38193 (NY, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Duguetia hadrantha* (Diels) R.E.Fr.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6174 (SPF, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Duguetia inconspicua* Sagot**
Voucher: Rosa, N.A. 1804 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Duguetia lanceolata* A.St.-Hil.**
Voucher: Duarte, A.P. 3208 (BM, F, M, NY, RB, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Duguetia latifolia* R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12855 (INPA, NY, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Duguetia lepidota* (Miq.) Pulle**
Voucher: Amaral, I.L. 1702 (INPA, K, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Duguetia longicuspis* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 739 (INPA, MG, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Duguetia lucida* Urb.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5390 (BM, F, G, GH, K, LE, M, MO, S, SP, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO); Amazônia
***Duguetia macrocalyx* R.E.Fr.**
Voucher: Milliken, W. 445 (K, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Duguetia macrophylla* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29013, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duguetia magnolioidea* Maas**
Voucher: Silva, L.A.M. 1456 (CEPEC, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Duguetia manausensis* Maas & Boon**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8418 (INPA, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Duguetia marcgraviana* Mart.**
Voucher: Pirani, J.R. 1278 (INPA, MG, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Duguetia megalocarpa* Maas**
Voucher: Loureiro, A. s.n. (INPA 38089, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Duguetia microphylla* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16689 (B, C, K, P, F, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Duguetia moricandiana* Mart.**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 1744 (CEPEC, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
***Duguetia oblongifolia* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. 12 (B, RB 23901, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duguetia odorata* (Diels) J.F.Macbr.**
Voucher: Prance, G.T. 12085 (INPA, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Duguetia paraensis* R.E.Fr.**
Voucher: Rabelo, B.V. 3131 (K, MG, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Duguetia phaeoclados* (Mart.) Maas & H.Rainer**
Voucher: Hoehne, F.C. 4539 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Duguetia pohliana* Mart.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 6363 (GUA, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Duguetia pycnastera* Sandwith**
Voucher: Lisboa, P. 1387 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Duguetia quitarensis* Benth.**
Voucher: Amaral, I.L. 195 (INPA, MG, RB, U, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Duguetia restingae* Maas**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 169 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Duguetia reticulata* Maas**
Voucher: Mori, S.A. 10554 (CEPEC, K, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Duguetia riedeliana* R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 8819 (H, NY, RB, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Duguetia rigida* R.E.Fr.**
Voucher: Prance, G.T. 9737 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Duguetia rionegrensis* Zuilen & Maas**
Voucher: Cordeiro, M.R. 331 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duguetia riparia* Huber**
Voucher: Huber, J. 1867 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Duguetia rotundifolia* R.E.Fr.**
Voucher: Gardner, G. 2998 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Duguetia ruboides* Maas & He**
Voucher: Jangoux, J. 513 (NY, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI); Amazônia
***Duguetia salicifolia* R.E.Fr.**
Voucher: Cordeiro, I. 914 (SP, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Duguetia sancticaroli* Maas**
Voucher: Nascimento, O.C. 145 (IAN, TEX)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duguetia scottmorii* Maas**
Voucher: Mori, S.A. 9920 (CEPEC, K, MO, NY, TEX, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Duguetia sessilis* (Vell.) Maas**
Voucher: Maas, P.J.M. 8838 (RB, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Duguetia sooretamae* Maas**
Voucher: Maas, P.J.M. 8827 (CVRD, H, K, MBML, MO, NY, SP, U, ULM, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Duguetia spixiana* Mart.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2721 (MG, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Duguetia stelechantha* (Diels) R.E.Fr.**
Voucher: Almeida, J.C. s.n. (IAN 806, INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Duguetia stenantha* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. 1796 (F, GH, IAN, K, NY, RB, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duguetia subcordata* Maas & J.A.C.Dam**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 867 (INPA, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Duguetia surinamensis* R.E.Fr.**
Voucher: Prance, G.T. 3771 (F, GH, INPA, K, MG, NY, R, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Duguetia tenuis* R.E.Fr.**
Voucher: Ackerley, D.D. s.n. (INPA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duguetia trunciflora* Maas & A.H.Gentry**
Voucher: Nee, M. 42478 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Duguetia ulei* (Diels) R.E.Fr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5003 (B, F, G, K, L, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duguetia uniflora* (DC.) Mart.**
Voucher: Pires, J.M. 1395 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia
***Duguetia venezuelana* R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 6673 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Duguetia yeshidan* Sandwith**
Voucher: Irwin, H.S. 47694 (F, GH, IAN, MG, MO, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Ephedranthus S.Moore

4 espécies (2 endêmicas)
***Ephedranthus amazonicus* R.E.Fr.**
Voucher: Vicentini, A. 991 (COL, F, INPA, K, MG, R, U, UB,
ULM, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia
***Ephedranthus boliviensis* Chatrou & Pirie**
Voucher: Maas, P.J.M. 9254 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Ephedranthus parviflorus* S.Moore**
Voucher: Fróes, R.L. 29889 (IAN, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Ephedranthus pisocarpus* R.E.Fr.**
Voucher: Schatz, G.E. 732 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (MA, PI, CE); Amazônia

Froesiodendron R.E.Fr.

1 espécie (não endêmica)
***Froesiodendron amazonicum* R.E.Fr.**
Voucher: Fróes, R.L. 20861 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

Fusaea (Baill.) Saff.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Fusaea longifolia* (Aubl.) Saff.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 19622, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Fusaea peruviana* R.E.Fr.**
Voucher: Amaral, I.L. 594 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Guatteria Ruiz & Pav.

88 espécies (47 endêmicas)
***Guatteria alutacea* Diels**
Voucher: Ule, E.H.G. 5010 (B, F, G, K, L, MG, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Guatteria anthracina* Scharf & Maas**
Voucher: Daly, D.C. 3780 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, AM); Amazônia
***Guatteria arenicola* Maas & Erkens**
Voucher: Maas, P.J.M. 8980 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Guatteria australis* A.St.-Hil.**
Voucher: Lobão, A. 1400 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Guatteria blepharophylla* Mart.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1030 (INPA, K, MG, NY, U, ULM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia
***Guatteria boliviana* H.Winkl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4970 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Guatteria campestris* R.E.Fr.**
Voucher: Lopes, W.P. 431 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Guatteria campinensis* (Morawetz & Maas) Erkens &
Maas**
Voucher: Morawetz, W. 31-24883 (INPA, U, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria candolleana* Schltdl.**
Voucher: Lobão, A. 1316 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Guatteria caniflora* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria citriodora* Ducke**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 964 (BM, G, INPA, K, MBM, MG,
R, U, UB, ULM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Guatteria cryandra* Erkens & Maas**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 24361, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Guatteria curvipetala* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6600 (BM, F, G, K, MO, NY,
RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria decurrens* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4664 (F, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria discolor* R.E.Fr.**
Voucher: Miralha, J.M.S. 304 (INPA, K, MG,
NY, RB, SP, U, ULM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Guatteria dolichophylla* R.E.Fr.**
Voucher: Poeppig, E.F. 2693 (BM, BR, F, G, HAL, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Guatteria duckeana* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29019, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria duodecima* Maas & Westra**
Voucher: Campbell, D.G. 8817 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Guatteria dura* R.E.Fr.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 460 (RB 24256, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Guatteria elata* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8356 (BM, F, K, MO, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria elliptica* R.E.Fr.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9605 (C, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica
***Guatteria elongata* Benth.**
Voucher: Schomburgk, R.H. I-962 (B, BM, E, F, G, K, L, P, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria ferruginea* A.St.-Hil.**
Voucher: Silva Neto, S.J. 1697 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Guatteria foliosa* Benth.**
Voucher: Pruski, J.F. 3279 (IAN, INPA, RB, SP, U, ULM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Guatteria friesiana* (W.A.Rodrigues) Erkens & Maas**
Voucher: Rodrigues, W.A. 5908 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria gamosepala* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6047 (BM, F, K, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria glauca* Ruiz & Pav.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5707 (BM, K, MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Guatteria guianensis* (Aubl.) R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 1534 (F, NY, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Guatteria heteropetala* Benth.**
Voucher: Schomburgk, R.H. I-950 (B, BM, F, K, L, P, U, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria hispida* (R.E.Fr.) Erkens & Maas**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 845 (G, IAN, INPA, MBM, U, UB, ULM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria hyposericea* Diels**
Voucher: Maas, P.J.M. 9001 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Guatteria insculpta* R.E.Fr.**
Voucher: Spruce, R. 2896 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria insignis* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8723 (BM, F, G, K, NY, P, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria intermedia* Scharf**
Voucher: Irwin, H.S. 48667 (G, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Guatteria inundata* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Guatteria jamundensis* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11780, RB 35322, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Guatteria japurensis* Maas & Westra**
Voucher: Amaral, I.L. 518 (NY, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria krukoffii* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 1487 (BM, F, K, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Guatteria lanceolata* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5950 (BM, F, K, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria latifolia* R.E.Fr.**
Voucher: Mello-Silva, R. 1 (NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Guatteria leiocarpa* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8995 (BM, F, G, K, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria liesneri* D.M.Johnson & N.A.Muray**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8403 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria longestipitata* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19613, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Guatteria longicuspis* R.E.Fr.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 24260, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Guatteria macropus* Mart.**
Voucher: Pirani, J.R. 2725 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Guatteria maguirei* R.E.Fr.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 279 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria maypurensis* Kunth**
Voucher: Nelson, B.W. 1393 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
***Guatteria megalophylla* Diels**
Voucher: Ule, E.H.G. 5630 (B, F, L, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Guatteria meliodora* R.E.Fr.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1710 (INPA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Guatteria modesta* Diels**
Voucher: Krukoff, B.A. 8225 (BM, F, K, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Guatteria myriocarpa* R.E.Fr.**
Voucher: Dahlgren, B.E. 119 (B, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Guatteria notabilis* Mello-Silva & Pirani**
Voucher: Lobão, A. 623 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Guatteria obliqua* R.E.Fr.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (F, RB 24280, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria obovata* R.E.Fr.**
Voucher: Schomburgk, R.H. I-922 (B, BM, E, F, FI, G, K, L, P, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria odorata* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15722, RB 35316, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Guatteria oligocarpa* Mart.**
Voucher: Fiaschi, P. 2552 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Mata Atlântica
***Guatteria olivacea* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6853 (BM, F, K, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Guatteria ouregou* (Aubl.) Dunal**
Voucher: Mori, S.A. 17369 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Guatteria pannosa* Scharf & Maas**
Voucher: Pires, J.M. 51575 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Guatteria paraensis* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17866, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Guatteria parviflora* R.E.Fr.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 24263, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Guatteria poeppigiana* Mart.**
Voucher: Poeppig, E.F. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Guatteria pogonopus* Mart.**
Voucher: Lobão, A. 680 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Guatteria pohliana* Schltdl.**
Voucher: Forzza, R.C. 3234 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Guatteria polyantha* R.E.Fr.**
Voucher: Monteiro da Costa, R.C. 284 (F, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Guatteria procera* R.E.Fr.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1024 (INPA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria pteropus* R.E.Fr.**
Voucher: Spruce, R. 1680 (B, G, K, M, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Guatteria punctata* (Aubl.) R.A.Howard**
Voucher: Pires, J.M. 52186 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Guatteria richardii* R.E.Fr.**
Voucher: Cowan, R.S. 38187 (NY, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Guatteria rigida* R.E.Fr.**
Voucher: Irwin, H.S. 6670 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Guatteria riparia* R.E.Fr.**
Voucher: Spruce, R. 3105 (B, BM, BR, C, G, K, NY, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria robusta* R.E.Fr.**
Voucher: Fróes, R.L. 20788 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria rupestris* Mello-Silva & Pirani**
Voucher: Hatschbach, G. 41573 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Guatteria sabuletorum* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19617, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Guatteria scandens* Diels**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17874, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Guatteria schomburgkiana* Mart.**
Voucher: Martinelli, G. 14503 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PB, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Guatteria scytophylla* Diels**
Voucher: Miralha, J.M.S. 277 (BM, INPA, K, MG, R, U, UB, ULM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria sellowiana* Schltdl.**
Voucher: Forzza, R.C. 2862 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Guatteria speciosa* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, MO, NY, RB 29049, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria stipitata* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6907 (BM, F, K, MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria subsessilis* Mart.**
Voucher: Gottsberger, G. 13-4286 (U, ULM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria sylvicola* S.Moore**
Voucher: Moore, S.L.M. 142 (B, BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Guatteria tomentosa* Rusby**
Voucher: Waltier, F.C.S. 11 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Guatteria trichocarpa* Erkens & Maas**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9987 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria trichostemon* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8862 (BM, F, K, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guatteria umbonata* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19614, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Guatteria villosissima* A.St.-Hil.**
Voucher: Forzza, R.C. 2830 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Guatteria wachenheimii* Benoist**
Voucher: Cowan, R.S. 38259 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Hornschuchia Nees
10 espécies (10 endêmicas)
***Hornschuchia alba* (A.St.-Hil.) R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 8818 (RB, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Hornschuchia bryotrophe* Nees**
Voucher: Maas, P.J.M. 8829 (H, MBML, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Hornschuchia cauliflora* Maas & Setten**
Voucher: Santos, T.S. 2193 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hornschuchia citriodora* D.M.Johnson**
Voucher: Pirani, J.R. 2435 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Hornschuchia leptandra* D.M.Johnson**
Voucher: Hage, J.L. 1447 (CEPEC, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hornschuchia lianarum* D.M.Johnson**
Voucher: Mori, S.A. 11254 (CEPEC, K, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hornschuchia myrtillus* Nees**
Voucher: Kallunki, J.A. 465 (CEPEC, NY, OWU, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Hornschuchia obliqua* Maas & Setten**
Voucher: Amorim, A.M. 794 (CEPEC, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hornschuchia polyantha* Maas**
Voucher: Thomas, W.W. 9086 (U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hornschuchia santosii* D.M.Johnson**
Voucher: Santos, T.S. 2091 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

Klarobelia Chatrou
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Klarobelia cauliflora* Chatrou**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9893 (INPA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Klarobelia inundata* Chatrou**
Voucher: Goulding, M. 1402 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, RO); Amazônia
***Klarobelia pandoensis* Chatrou**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2589 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Klarobelia pumila* Chatrou**
Voucher: Prance, G.T. 7876 (F, GH, MICH, MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Malmea R.E.Fr.
3 espécies (2 endêmicas)
***Malmea dielsiana* R.E.Fr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9373 (B, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Malmea manausensis* Maas & Miralha**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1826 (INPA, K, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Malmea obovata* R.E.Fr.**
Voucher: Riedel, L. 525 (BR, GH, LE, NY, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

Mosannona Chatrou
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Mosannona pachiteae* (D.R.Simpson) Chatrou**
Voucher: Daly, D.C. 9194 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Mosannona raimondii* (Diels) Chatrou**
Voucher: Pena, B.S. 604 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

Onychopetalum R.E.Fr.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Onychopetalum amazonicum* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (B, K, RB 11374, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Onychopetalum periquino* (Rusby) D.M.Johnson & N.A.Murray**
Voucher: Krukoff, B.A. 5326 (A, AAU, F, G, K, M, MICH, MO,
NY, RB, S, U, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

Oxandra A.Rich.
14 espécies (4 endêmicas)
***Oxandra espintana* (Spruce *ex* Benth.) Baill.**
Voucher: Lima, J. 229 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Oxandra euneura* Diels**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23698, S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Oxandra krukoffii* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 1124 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Oxandra macrophylla* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4628 (G, K, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Oxandra major* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8497 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Oxandra martiana* (Schltdl.) R.E.Fr.**
Voucher: Guedes, R. 2256 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Oxandra mediocris* Diels**
Voucher: Ule, E.H.G. 5796 (B, G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Oxandra nitida* R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 8840 (RB, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Oxandra polyantha* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5628 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO); Amazônia
***Oxandra reticulata* Maas**
Voucher: Schatz, G.E. 855 (INPA, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Oxandra riedeliana* R.E.Fr.**
Voucher: Riedel, L. 1389 (K, M, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Oxandra sessiliflora* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18347, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE); Amazônia, Cerrado
***Oxandra sphaerocarpa* R.E.Fr.**
Voucher: Traill, J.W.H. s.n. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Oxandra xylopioides* Diels**
Voucher: Maas, P.J.M. 9095 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Porcelia Ruiz & Pav.

2 espécies (1 endêmica)
***Porcelia macrocarpa* (Warm.) R.E.Fr.**
Voucher: Fiaschi, P. 1196 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Porcelia ponderosa* (Rusby) Rusby**
Voucher: Krukoff, B.A. 5299 (A, BM, F, MICH, MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Pseudephedranthus Aristeg.

1 espécie (não endêmica)
***Pseudephedranthus fragrans* (R.E.Fr.) Aristeg.**
Voucher: Maguire, B. 60189 (F, GH, MO, NY, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Pseudomalmea Chatrou

1 espécie (não endêmica)
***Pseudomalmea diclina* (R.E.Fr.) Chatrou**
Voucher: Krukoff, B.A. 5632 (A, F, G, GB, K, M, MICH, MO, NY, RB, S, U, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Pseudoxandra R.E.Fr.

14 espécies (7 endêmicas)
***Pseudoxandra acreana* Maas**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10570 (MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pseudoxandra bahiensis* Maas**
Voucher: Mori, S.A. 10240 (CEPEC, G, K, MG, MO, NY, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Pseudoxandra borbensis* Maas**
Voucher: Henderson, A. 355 (F, GH, INPA, K, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pseudoxandra cauliflora* Maas**
Voucher: Daly, D.C. 4424 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pseudoxandra cuspidata* Maas**
Voucher: Berg, C.C. 757 (COL, F, K, MO, NY, RB, S, U, US, WU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Pseudoxandra duckei* Maas**
Voucher: Albuquerque, B.W. 67-16 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pseudoxandra leiophylla* (Diels) R.E.Fr.**
Voucher: Spruce, R. 2473 (B, BM, C, E, G, GH, K, LE, NY, P, S, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pseudoxandra lucida* R.E.Fr.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 463 (MO, RB 24264, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Pseudoxandra obscurinervis* Maas**
Voucher: Prance, G.T. 11468 (INPA, K, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pseudoxandra papillosa* Maas**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3699 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pseudoxandra pilosa* Maas**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9925 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pseudoxandra polyphleba* (Diels) R.E.Fr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5628 (B, F, G, K, MG, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Pseudoxandra rionegrensis* Maas**
Voucher: Maas, P.J.M. 6910 (INPA, NY, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pseudoxandra spiritus-sancti* Maas**
Voucher: Maas, P.J.M. 8833 (AAU, B, F, GB, K, LZ, MBML, MO, NY, P, U, US, WIS, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Ruizodendron Ruiz & Pav.

1 espécie (não endêmica)
***Ruizodendron ovale* (Ruiz & Pav.) R.E.Fr.**
Voucher: Nelson, B.W. 818 (MICH, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Tetrameranthus R.E.Fr.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Tetrameranthus duckei* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. 30 (RB 23919, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tetrameranthus laomae* D.R.Simpson**
Voucher: Prance, G.T. 12236 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Tetrameranthus umbellatus* Westra**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7269 (INPA, K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Trigynaea Schltdl.

3 espécies (2 endêmicas)
***Trigynaea axilliflora* D.M.Johnson & N.A.Muray**
Voucher: Maas, P.J.M. 8817 (H, RB, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Trigynaea duckei* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**
Voucher: Schatz, G.E. 723 (F, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA, PI); Amazônia
***Trigynaea oblongifolia* Schltdl.**
Voucher: Hoehne, F.C. 7974 (NY, S)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Unonopsis R.E.Fr.

16 espécies (8 endêmicas)
***Unonopsis aurantiaca* Maas & Westra**
Voucher: Maas, P.J.M. 8825 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Unonopsis bahiensis* Maas & Orava**
Voucher: Lewis, G.P. 1173 (CEPEC, K, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Unonopsis bauxitae* Maas et al.**
Voucher: Castro, R.M. 745 (BHCB, CESJ, K, NY, RB, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Unonopsis duckei* R.E.Fr.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 639 (INPA, K, MG, MO,
NY, RB, SP, U, ULM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Unonopsis elegantissima* R.E.Fr.**
Voucher: Prance, G.T. 23759 (MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Unonopsis floribunda* Diels**
Voucher: Amaral, I.L. 451 (K, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Unonopsis guatterioides* (A.DC.) R.E.Fr.**
Voucher: Miralha, J.M.S. 309 (INPA, K, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste
(MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Unonopsis heterotricha* Maas & Westra**
Voucher: Campbell, D.G. P22532 (INPA, K, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Unonopsis perrottetii* (A.DC.) R.E.Fr.**
Voucher: Mori, S.A. 17555 (F, GH, MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Unonopsis renati* Maas & Westra**
Voucher: Sucre, D. 8355 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Unonopsis riedeliana* R.E.Fr.**
Voucher: Kurtz, B.C. s.n. (RB 328311)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Unonopsis rufescens* (Baill.) R.E.Fr.**
Voucher: Bamps, P. 5306 (BR, NY, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Unonopsis sanctae-teresae* Maas & Westra**
Voucher: Maas, P.J.M. 8831 (MBML, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Unonopsis spectabilis* Diels**
Voucher: Ule, E.H.G. 5795 (B, G, K, L, MG, S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Unonopsis stipitata* Diels**
Voucher: Sothers, C.A. 464 (INPA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Unonopsis veneficiorum* (Mart.) R.E.Fr.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

Xylopia L.

32 espécies (14 endêmicas)
***Xylopia amazonica* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29050, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xylopia aromatica* (Lam.) Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 21849 (K, SPF, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Xylopia barbata* Hoffmanns. *ex* Mart.**
Voucher: Ferreira, L.V. 54 (U)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Xylopia benthamii* R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 9133 (HPZ, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Xylopia brasiliensis* Spreng.**
Voucher: Hatschbach, G. 18161 (HB, L, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Xylopia calophylla* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29016, S)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Xylopia cayennensis* Maas**
Voucher: Rosa, N.A. 985 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AC); Amazônia
***Xylopia crinita* R.E.Fr.**
Voucher: Pires, J.M. 683 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Xylopia cuspidata* Diels**
Voucher: Maas, P.J.M. 9218 (HPZ, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Xylopia decorticans* D.M.Johnson & Lobão**
Voucher: Maas, P.J.M. 8834 (MBML, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Xylopia discreta* (L.f.) Sprague & Hutch.**
Voucher: Jangoux, J. 223 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Xylopia egleriana* Aristeg. *ex* Maas**
Voucher: Egler, W.A. 46462 (BR, IAN, NY, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Xylopia emarginata* Mart.**
Voucher: Kuhlmann, M. 5003 (SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Xylopia excellens* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MO, RB 23902, S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, AM); Amazônia
***Xylopia frutescens* Aubl.**
Voucher: Pires, J.M. 52154 (A, G, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Xylopia involucrata* M.C.Dias & Kinoshita**
Voucher: Mori, S.A. 13248 (CEPEC, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Xylopia laevigata* (Mart.) R.E.Fr.**
Voucher: Duarte, A.P. 4975 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Xylopia langsdorfiana* A.St.-Hil. & Tul.**
Voucher: Kirizawa, M. 3226 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Xylopia ligustrifolia* Humb. & Bonpl. *ex* Dunal**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3594 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Xylopia longicuspis* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23910, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xylopia multiflora* R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 9200 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Xylopia neglecta* (Kuntze) R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8930 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Xylopia nervosa* (R.E.Fr.) Maas**
Voucher: Krukoff, B.A. 8792 (BM, F, GH, K, MO, P, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Xylopia nitida* Dunal**
Voucher: Krukoff, B.A. 8715 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Xylopia ochrantha* Mart.**
Voucher: Folli, D.A. 63 (CVRD, FUEL, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Xylopia polyantha* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 1204 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Xylopia rigidiflora* Bagstad & D.M.Johnson**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9064 (U)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Norte (RR, AM); Amazônia
***Xylopia sericea* A.St.-Hil.**
Voucher: Ratter, J.A. 1413 (E, MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Xylopia spruceana* Benth. *ex* Spruce**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 282 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xylopia trichostemon* R.E.Fr.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5690 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Xylopia uniflora* R.E.Fr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29017, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Xylopia xylantha* R.E.Fr.**
Voucher: Maas, P.J.M. 6948 (INPA, K, MO, NY, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

APIACEAE

Pedro Fiaschi
14 gêneros, 80 espécies (32 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)

Anethum L.

1 espécie (não endêmica)
***Anethum graveolens* L.**
Voucher: Reitz, R. 11257 (HBR)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Mata Atlântica

Apium L.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Apium prostratum* Labill.**
Voucher: Klein, R.M. 7256 (HBR)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Apium sellowianum* H.Wolff**
Voucher: Hatschbach, G. 17935 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Bowlesia Ruiz & Pav.

1 espécie (não endêmica)
***Bowlesia incana* Ruiz & Pav.**
Voucher: Smith, L.B. 12555 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Centella L.
1 espécie (não endêmica)
***Centella asiatica* (L.) Urb.**
Voucher: Souza, J.P. 753 (ESA, SPF, UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ciclospermum Lag.
1 espécie (não endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Ciclospermum leptophyllum* (Pers.) Sprague**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ciclospermum leptophyllum* var. *latisectum* (Urb.) Constance**
Voucher: Hatschbach, G. 15631 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica
Ciclospermum leptophyllum* (Pers.) Sprague var. *leptophyllum
Referência: Constance, L. 1990. Brittonia 42: 276-278.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa
***Ciclospermum leptophyllum* var. *multisectum* (Mathias & Constance) Constance**
Voucher: Lindeman, J.C. 2810 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Conium L.
1 espécie (não endêmica)
***Conium maculatum* L.**
Voucher: Hatschbach, G. 2015 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Coriandrum L.
1 espécie (não endêmica)
***Coriandrum sativum* L.**
Voucher: Reitz, R. 6219 (HBR)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

Daucus L.
1 espécie (não endêmica)
***Daucus pusillus* Michx.**
Voucher: Hatschbach, G. 22918 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Eryngium L.
60 espécies (28 endêmicas)
***Eryngium aloifolium* Mart. *ex* Urb.**
Voucher: Baitello, J.B. 446 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Eryngium balansae* H.Wolff**
Voucher: Rambo, B. 61751 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Eryngium brasiliense* Constance**
Voucher: Irwin, H.S. 18131 (NY, UB, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Eryngium canaliculatum* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Souza, V.C. 3941 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eryngium chamissonis* Urb.**
Referência: Martínez, S. 2005. Fl. Fanerog. Argentina 94(2): 1-24.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Eryngium ciliatum* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Rambo, B. 53333 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Eryngium corallinum* Mathias & Constance**
Voucher: Smith, L.B. 11537 (UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Eryngium delarocheanum* H.Wolff**
Voucher: Hatschbach, G. 26136 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica
***Eryngium divaricatum* Hook. & Arn.**
Voucher: s.col. (ICN 7492)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Eryngium dorae* Norman**
Voucher: s.col. (ICN 21004)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Eryngium dusenii* H.Wolff**
Voucher: Reitz, R. 282 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Eryngium ebracteatum* Lam.**
Voucher: Souza, V.C. 10725 (ESA, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Eryngium eburneum* Decne.**
Voucher: Sobral, M. 5025 (ICN, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Eryngium echinatum* Urb.**
Voucher: Rambo, B. 25803 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Eryngium ekmanii* H.Wolff**
Voucher: Rambo, B. 36087 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Eryngium elegans* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Souza, V.C. 4417 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Eryngium eriophorum* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Souza, V.C. 3995 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Eryngium eurycephalum* Malme**
Voucher: Hatschbach, G. 29070 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Eryngium falcifolium* Irgang**
Voucher: Rambo, B. 53856 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Eryngium floribundum* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Mimura, I. 29 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Eryngium fluminense* Urb.**
Voucher: Brade, A.C. 9665 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Eryngium foetidum* L.**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (BHCB, MBM, R, SP, SPF 15026, UB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Eryngium foliosum* Scheele**
Voucher: Hartleben, A. s.n.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Eryngium glaziovianum* Urb.**
Voucher: Nook, F. s.n. (SPF 15991)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Eryngium goulartii* Glaz. & Urb. *ex* Urb.**
Voucher: Duarte, A.P. 6318 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eryngium goyazense* Urb.**
Voucher: Irwin, H.S. 12880 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eryngium hemisphaericum* Urb.**
Voucher: Mattos, J.R. 8497 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Eryngium horridum* Malme**
Voucher: Freitas, L. 140 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eryngium irwinii* Constance**
Voucher: Anderson, W.R. 7163 (NY, RB, UB, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eryngium junceum* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Cordeiro, I. 1719 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Eryngium juncifolium* (Urb.) Mathias & Constance**
Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12571 (BHCB, SPF, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Eryngium koehneanum* Urb.**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (BHCB, F, R, SP, SPF 12336)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eryngium lacustre* Pohl *ex* Urb.**
Voucher: Gardner, G. 4165 (G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Eryngium leptophyllum* H.Wolff**
Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Eryngium luzulifolium* Cham. & Schltdl.**
Referência: Irgang, B.E. 1974. Fl. Il. Rio Grande do Sul 9(2).
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Eryngium malmeanum* H.Wolff**
Voucher: Hatschbach, G. 36042 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Eryngium marginatum* Pohl *ex* Urb.**
Voucher: Hatschbach, G. 34936 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Eryngium megapotamicum* Malme**
Referência: Irgang, B.E. 1974. Fl. Il. Rio Grande do Sul 9(2).
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sul (RS); Cerrado, Pampa
***Eryngium mesopotamicum* Pedersen**
Referência: Martínez, S. 2008. Catalogo de las plantas vasculares del Cono Sur 2: 1056-1090.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Eryngium nudicaule* Lam.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 1462 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa
***Eryngium ombrophilum* Dusén & H.Wolff**
Voucher: Hatschbach, G. 20700 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Eryngium pandanifolium* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Barreto, K.D. 1795 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Eryngium paniculatum* Cav. & Dombey *ex* F.Delaroche**
Voucher: Shepherd, G.J. 97-87 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Eryngium paraguariense* Urb.**
Voucher: Harley, R.M. 26344 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eryngium pohlianum* Urb.**
Voucher: Barreto, K.D. 2967 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Eryngium pristis* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 12291 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Eryngium proliferum* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 17170 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Eryngium ramboanum* Mathias & Constance**
Voucher: Rambo, B. 35209 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Eryngium raulinii* Mathias & Constance**
Voucher: Reitz, R. 3419 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Eryngium regnellii* Malme**
Voucher: Reitz, R. 7964 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Eryngium reitzii* Mathias & Constance**
Voucher: Smith, L.B. 10336 (UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Eryngium rochei* Constance**
Voucher: Hatschbach, G. 26136 (MBM, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Mata Atlântica
***Eryngium sanguisorba* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Hatschbach, G. 43508 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Eryngium scirpinum* Cham.**
Voucher: Reitz, R. 17456 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Eryngium sellowii* H.Wolff**
Voucher: Hatschbach, G. 36917 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Eryngium smithii* Mathias & Constance**
Voucher: Smith, L.B. 10459 (HBR, K, P, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Eryngium stenophyllum* Urb.**
Voucher: Hatschbach, G. 16172 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Eryngium subinerme* (H.Wolff) Mathias & Constance**
Voucher: Souza, V.C. 2559 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Eryngium urbanianum* H.Wolff**
Voucher: Hatschbach, G. 61668 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Eryngium zosterifolium* H.Wolff**
Voucher: Hatschbach, G. 59153 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Foeniculum Mill.
1 espécie (não endêmica)
***Foeniculum vulgare* Mill.**
Voucher: Smith, L.B. 11025 (HBR, UC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Klotzschia Cham.
3 espécies (3 endêmicas)
***Klotzschia brasiliensis* Cham.**
Voucher: Queiroz, L.P. 38863 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Klotzschia glaziovii* Urb.**
Voucher: Anderson, W.R. 7371 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Klotzschia rhizophylla* Urb.**
Voucher: Arbo, M.M. 4726 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lilaeopsis Greene
4 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)
***Lilaeopsis attenuata* (Hook. & Arn.) Fernald**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Lilaeopsis attenuata* subsp. *ulei* (Pérez-Mor.) Affolter**
Voucher: Brade, A.C. 15665 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lilaeopsis brasiliensis* (Glaz.) Affolter**
Voucher: Hatschbach, G. 1606 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lilaeopsis carolinensis* J.M.Coult. & Rose**
Voucher: Leite, J.E. 610 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Lilaeopsis tenuis* A.W.Hill**
Voucher: Smith, L.B. 9031 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Spananthe Jacq.
1 espécie (não endêmica)
***Spananthe paniculata* Jacq.**
Voucher: Pires, J.M. 9321 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Torilis Adans.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Torilis arvensis* (Huds.) Link**
Voucher: Reitz, R. 14355 (HBR, US)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Torilis nodosa* (L.) Gaertn.**
Voucher: Klein, R.M. 6207 (HBR, UC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

APOCYNACEAE
Alessandro Rapini, Ingrid Koch, Luiza Sumiko Kinoshita, André O. Simões, Andréa Pozetti Spina
75 gêneros, 759 espécies (421 endêmicas), 15 variedades (9 endêmicas)

Allamanda L.
13 espécies (11 endêmicas)
***Allamanda angustifolia* Pohl**
Voucher: Irwin, H.S. 34608 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Allamanda blanchetii* A.DC.**
Voucher: Heringer, E.P. 433 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga
***Allamanda calcicola* Souza-Silva & Rapini**
Voucher: Souza-Silva 302 (BHCB, CEPEC, HUEFS, K, MBM, MO, P, RB, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Allamanda cathartica* L.**
Voucher: Kotchekoff, O. 22340 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Allamanda doniana* Müll.Arg.**
Voucher: Hatschbach, G. 46327 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, PB); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Allamanda laevis* Markgr.**
Voucher: Duarte, A.P. 8587 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Allamanda martii* Müll.Arg.**
Voucher: Santos, T.S. 2060 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Allamanda nobilis* T.Moore**
Voucher: Prance, G.T. 4378 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); Amazônia
***Allamanda oenotherifolia* Pohl**
Voucher: Cardoso-da-Silva, F. 277 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado
***Allamanda polyantha* Müll.Arg.**
Voucher: Santos, T.S. 2060 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Allamanda puberula* A.DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 31453 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Allamanda schottii* Pohl**
Voucher: Toledo 421 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Allamanda thevetiifolia* Müll.Arg.**
Voucher: Pereira, E. 10411 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Ambelania Aubl.

3 espécies (1 endêmica)
***Ambelania acida* Aubl.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2903 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Ambelania duckei* Markgr.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2531 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Ambelania occidentalis* Zarucchi**
Voucher: Fróes, R.L. 23949 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Araujia Brot.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Araujia angustifolia* (Hook. & Arn.) Steud.**
Voucher: Kinupp, V.C. 2720 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Araujia megapotamica* (Spreng.) Don**
Voucher: Magenta, M.A.G. 518 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Araujia plumosa* Schltr.**
Voucher: Hatschbach, G. 74413 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Araujia sericifera* Brot.**
Voucher: Farinaccio, M.A. 612 (HUEFS, MBM, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Asclepias L.

6 espécies (4 endêmicas)
***Asclepias aequicornu* E.Fourn.**
Voucher: Vidal, J. 249 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Asclepias bracteolata* E.Fourn.**
Voucher: Reitz, R. 801 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Asclepias candida* Vell.**
Voucher: Berg, C.C. 1283 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Asclepias curassavica* L.**
Voucher: Lowrie, S.R. 268 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Asclepias langsdorffii* E.Fourn.**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SPF 13918)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Asclepias mellodora* A.St.-Hil.**
Voucher: Hatschbach, G. 35292 (INPA, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Aspidosperma Mart. & Zucc.

51 espécies (21 endêmicas)
***Aspidosperma album* (Vahl) Benoist *ex* Pichon**
Voucher: Pires, J.M. 51149 (MG, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Aspidosperma araracanga* Marc.-Ferr.**
Voucher: Huber, J. 3848 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Aspidosperma auriculatum* Markgr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22450)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Aspidosperma australe* Müll.Arg.**
Voucher: Sellow, F. 1648 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aspidosperma capitatum* L.O.Williams**
Voucher: Gentry, A.H. 48924 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Aspidosperma carapanauba* Pichon**
Voucher: Ducke, A. 136 (F, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Aspidosperma compactinervium* Kuhlm.**
Voucher: Machado-Nunes 39 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Aspidosperma cuspa* (Kunth) S.F.Blake *ex* Pittier**
Voucher: Bernacci, L.C. 35012 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Aspidosperma cylindrocarpon* Müll.Arg.**
Voucher: Sellow, F. 1650 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (RN), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aspidosperma darienense* Woodson *ex* Dwyer**
Voucher: Pires, J.M. 50756 (COL, F, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Aspidosperma desmanthum* Benth. *ex* Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. 2618 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Aspidosperma discolor* A.DC.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3388 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Aspidosperma dispermum* Müll.Arg.**
Voucher: Duarte, A.P. 13710 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Aspidosperma eteanum* Markgr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22445)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Aspidosperma excelsum* Benth.**
Referência: Bentham, G. 1841. J. Bot. (Hooker) 3: 245.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia
***Aspidosperma gomezianum* A.DC.**
Referência: Candolle, A.P. de 1844. Prodr. 8: 397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Domínio desconhecido
***Aspidosperma illustre* (Vell.) Kuhlm. & Pirajá**
Voucher: Spada 19 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Aspidosperma ingratum* K.Schum.**
Voucher: Martinelli, G. 11913 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aspidosperma inundatum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 17195 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Aspidosperma leucocymosum* Kuhlm.**
Voucher: Ducke, A. 24472 (K, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aspidosperma limae* Woodson**
Voucher: Andrade-Lima, D. 49-333 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Aspidosperma macrocarpon* Mart.**
Voucher: Maguire, B. 56296 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Aspidosperma megalocarpon* Müll.Arg.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10537 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aspidosperma megaphyllum* Woodson**
Voucher: Krukoff, B.A. 5639 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aspidosperma multiflorum* A.DC.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2806 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Aspidosperma myristicifolium* (Markgr.) Woodson**
Voucher: Daly, D.C. 8348 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aspidosperma nemorale* Handro**
Voucher: Kuhlmann, M. 2607 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Aspidosperma nobile* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (RB 451984)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Aspidosperma oblongum* A.DC.**
Voucher: Freitas, M.A. s.n. (MO 2796070)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Aspidosperma obscurinervium* Azambuja**
Voucher: Ducke, A. 931 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aspidosperma olivaceum* Müll.Arg.**
Voucher: Sellow, F. 466 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aspidosperma pachypterum* Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. 3345 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Aspidosperma parvifolium* A.DC.**
Voucher: Saraiva, R. 1500 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Aspidosperma polyneuron* Müll.Arg.**
Voucher: Koch, I. 118 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Aspidosperma pyricollum* Müll.Arg.**
Voucher: Weddell, H.A. 445 (P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado

***Aspidosperma pyrifolium* Mart.**
Voucher: Sucre, D. 9215 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga, Cerrado
***Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl.**
Voucher: Árbocz, G.F. 867 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Aspidosperma ramiflorum* Müll.Arg.**
Voucher: Sello, F. 1651 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica
***Aspidosperma riedelii* Müll.Arg.**
Voucher: Riedel, L. 2771 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Aspidosperma rigidum* Rusby**
Voucher: Krukoff, B.A. 6224 (BR, F, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Aspidosperma salgadense* Markgr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22456)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA); Domínio desconhecido
***Aspidosperma sandwithianum* Markgr.**
Voucher: Mori, S.A. CFCR 21487 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Aspidosperma schultesii* Woodson**
Voucher: Schultes, R.E. 10178 (F, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Aspidosperma spruceanum* Benth. *ex* Müll.Arg.**
Voucher: Spruce, R. 2265 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aspidosperma subincanum* Mart.**
Voucher: Maestro 64 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aspidosperma thomasii* Marc.-Ferr.**
Voucher: Thomas, W.W. 10814 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aspidosperma tomentosum* Mart.**
Referência: Martius, C.F.P. von 1824. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 58.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Aspidosperma triternatum* Rojas Acosta**
Voucher: Pott, A. 5293 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Aspidosperma ulei* Markgr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8453 (B, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (CE, RN, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Aspidosperma warmingii* Müll.Arg.**
Voucher: Ivanauskas, N.M. 550 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Aspidosperma williamii* Duarte**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8978 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Bahiella J.F.Morales

2 espécies (2 endêmicas)
***Bahiella blanchetii* (A.DC.) J.F.Morales**
Voucher: Blanchet, J.S. 3223a (G)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Bahiella infundibuliflora* J.F.Morales**
Voucher: Thomas, W.W. 10765 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

Barjonia Decne.

7 espécies (5 endêmicas)
***Barjonia chloraeifolia* Decne.**
Voucher: Harley, R.M. 26672 (CEPEC, HUEFS, K, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Barjonia cymosa* E.Fourn.**
Voucher: Souza, V.C. 17681 (ESA, HB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Barjonia erecta* (Vell.) K.Schum.**
Voucher: Teixeira, W.A. s.n. (BHCB 23922, HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Barjonia glazioui* Marquete**
Voucher: Philcox, D. 4860 (K)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Barjonia grazielae* Fontella & Marquete**
Voucher: Heringer, E.P. 15337 (F, UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Barjonia harleyi* Fontella & Marquete**
Voucher: Harley, R.M. 27101 (CEPEC, K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Barjonia laxa* Malme**
Voucher: Souza, V.C. 20532 (ESA, HB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

Blepharodon Decne.

13 espécies (7 endêmicas)
***Blepharodon amazonicum* (Benth.) Fontella**
Voucher: Philcox, D. 3113 (IAN, K, NY, P, RB, S, W)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Blepharodon ampliflorum* E.Fourn.**
Voucher: Hatschbach, G. 50213 (BR, C, HRB, MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica
***Blepharodon angustifolium* Malme**
Voucher: Philcox, D. 4725 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Blepharodon bicolor* Decne.**
Voucher: Alencar, M.E. 902 (SP, TEPB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Blepharodon bicuspidatum* E.Fourn.**
Voucher: Souza, V.C. 10983 (BHCB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Blepharodon costae* Fontella & Morillo**
Voucher: Carneiro, C.E. 382 (ASE, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
***Blepharodon glaucescens* (Decne.) Fontella**
Voucher: Lima, H.C. 3172 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia
***Blepharodon hatschbachii* Fontella & Marquete**
Voucher: Hatschbach, G. 34049 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Blepharodon lineare* (Decne.) Decne.**
Voucher: Mello-Silva, R. 717 (CTES, G, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Blepharodon manicatum* (Decne.) Fontella**
Voucher: Hatschbach, G. 50146 (CEPEC, HUEFS, MBM, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Blepharodon pictum* (Vahl) W.D.Stevens**
Voucher: Queiroz, L.P. 9196 (ESA, HUEFS, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Blepharodon reflexum* Malme**
Voucher: Pastore, J.A. 570 (HB, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Blepharodon salicinum* Decne.**
Voucher: Daly, D.C. 11539 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Calotropis R.Br.

1 espécie (não endêmica)
***Calotropis procera* (Aiton) W.T.Aiton**
Voucher: Shepherd, G.J. 3835 (MBM, UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Condylocarpon Desf.

7 espécies (1 endêmica)
***Condylocarpon amazonicum* (Markgr.) Ducke**
Voucher: Rodrigues 7632 (F, INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Condylocarpon glabrum* Müll.Arg.**
Voucher: Folli, D.A. 4994 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Condylocarpon guyanense* Desf.**
Voucher: Fonseca, M.L. 3596 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Condylocarpon intermedium* Müll.Arg.**
Voucher: Brade, A.C. 11055 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Condylocarpon isthmicum* (Vell.) A.DC.**
Voucher: Souza, V.C. 10387 (ESA, UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Condylocarpon myrtifolium* (Miq.) Müll.Arg.**
Voucher: Vogel, S. 346 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, RO); Amazônia
***Condylocarpon pubiflorum* Müll.Arg.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22434)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Couma Aubl.

6 espécies (2 endêmicas)
***Couma arenicola* Zarucchi**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2843 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Couma catingae* Ducke**
Voucher: Prance, G.T. 15641 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Couma guianensis* Aubl.**
Voucher: Prance, G.T. 5652 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Couma macrocarpa* Barb.Rodr.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 3158 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Couma rigida* Müll.Arg.**
Voucher: Lemos 19927 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Couma utilis* (Mart.) Müll.Arg.**
Voucher: Nascimento, J.R. 510 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, AM, AC); Amazônia

Cryptostegia R.Br.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Cryptostegia grandiflora* R.Br.**
Voucher: Nunes, T.S. 1172 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (PA), Nordeste (PI, RN, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga
***Cryptostegia madagascariensis* Bojer**
Voucher: Lucena, M.F.A. 1608 (RB, UFP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (MA, CE, PE); Amazônia, Caatinga

Cynanchum L.

9 espécies (3 endêmicas)
***Cynanchum brasiliense* (Morillo) Liede**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7763 (C, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cynanchum carautanum* (Fontella & E.A.Schwarz) Morillo**
Voucher: Philcox, D. 3908 (IAN, K, RB, S, UB, W)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Cynanchum caudiculatum* Rapini**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 49926)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Cynanchum guanchezii* Morillo**
Voucher: Amaral, I.L. 1549 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Cynanchum montevidense* Spreng.**
Voucher: Hatschbach, G. 15734 (B, C, MBM, NY, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cynanchum morrenioides* Goyder**
Voucher: Harley, R.M. 27541 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Cynanchum rioparanense* Sundell**
Voucher: Macedo, A. 1167 (IAN, MO, RB, S, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Pantanal
***Cynanchum roulinioides* (E.Fourn.) Rapini**
Voucher: Barreto, H.L.M. 1831 (BHCB, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cynanchum strictum* (Gleason & Moldenke) R.W.Holm**
Voucher: Rosa, N.A. 2344 (IAN, INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ditassa R.Br.

57 espécies (46 endêmicas)
***Ditassa aequicymosa* E.Fourn.**
Voucher: Rapini, A. 615 (SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa arianeae* Fontella & E.A.Schwarz**
Voucher: Araújo, D.S.D. 352 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Ditassa auriflora* Rapini**
Voucher: Rapini, A. 785 (K, MBM, RB, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ditassa banksii* R.Br. *ex* Schult.**
Voucher: Gonçalves, D. 32 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Ditassa bicolor* Decne.**
Voucher: Pereira, E. 3991a (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Ditassa blanchetii* Decne.**
Voucher: Duarte, A.P. 6848 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Ditassa buntingii* (Morillo) Liede**
Voucher: Pires, J.M. 16697 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste; Amazônia
***Ditassa burchellii* Hook. & Arn.**
Voucher: Forzza, R.C. 2725 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ditassa capillaris* E.Fourn.**
Voucher: França, F. 1608 (ESA, HB, HRB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Ditassa cipoensis* (Fontella) Rapini**
Voucher: Anderson, W.R. 36111 (HB, INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ditassa conceptionis* Fontella**
Voucher: Rapini, A. 1016 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa congesta* E.Fourn.**
Voucher: Harley, R.M. 20162 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Ditassa cordeiroana* Fontella**
Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 11457 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Ditassa crassifolia* Decne.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 7359 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa dardanoi* T.U.P.Konno & Wand.**
Voucher: Duarte, A.P. 7403 (HB, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Ditassa dolichoglossa* Schltr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 7154 (G, HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Ditassa duartei* Fontella & T.U.P.Konno**
Voucher: Duarte, A.P. 9769 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Ditassa edmundoi* Fontella & Valente**
Voucher: Pereira, E. 5433 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Ditassa emmerichii* Fontella**
Voucher: Gardner, G. 3328 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Ditassa eximia* Decne.**
Voucher: Hatschbach, G. 31554 (HBG, MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ditassa fasciculata* E.Fourn.**
Voucher: Hatschbach, G. 27756 (C, HB, HBG, M, MBM, P, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ditassa fontellae* Marquete & C.Valente**
Voucher: Góes, O.C. 535 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ditassa franciscoi* (Morillo) Liede**
Voucher: Tavares, A.S. 100 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ditassa glazioui* E.Fourn.**
Voucher: Harley, R.M. 27139 (BHCB, CEPEC, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Ditassa gracilipes* Schltr.**
Voucher: Henderson, A. 1001 (INPA, K, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Ditassa gracilis* Hand.-Mazz.**
Voucher: Silva-Neto, S.J. 1651 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Ditassa guilleminiana* Decne.**
Voucher: Guillemin, J.B.A. 656 (P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ditassa hastata* Decne.**
Voucher: Harley, R.M. PCD 5003 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Ditassa hispida* (Vell.) Fontella**
Voucher: Forzza, R.C. 2744 (HUEFS, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa imbricata* E.Fourn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3728 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ditassa insignis* Farinaccio**
Voucher: Farinaccio, M.A. 510 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ditassa itambensis* Rapini**
Voucher: Anderson, W.R. 35888 (HB, MBM, MO, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ditassa laevis* Mart.**
Voucher: Grandi, T.S.M. 2409 (BHCB, BR)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa lenheirensis* Silveira**
Voucher: Andrade, P.M. 1373 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa leonii* Fontella & T.U.P.Konno**
Voucher: Leoni, L.S. 4089 (GFJP, HB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Ditassa linearis* Mart.**
Voucher: Rapini, A. 600 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa longicaulis* (E.Fourn.) Rapini**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 27562 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa longisepala* (Hua) Fontella & E.A.Schwarz**
Voucher: Rapini, A. 614 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa maricaensis* Fontella & E.A.Schwarz**
Voucher: Krieger, L. 15698 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ditassa mucronata* Mart.**
Voucher: Rapini, A. 605 (K, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa nitida* Decne.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11193 (G, LE, NY, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Ditassa obcordata* Mart.**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (SPF 13360, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa oberdanii* Fontella & M.C.Alvarez**
Voucher: Konno, T.U.P. 811 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Ditassa obscura* (E.Fourn.) Farinaccio & T.U.P.Konno**
Voucher: Farinaccio, M.A. 281 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ditassa oxyphylla* Turcz.**
Voucher: Hatschbach, G. 63185 (BHCB, HB, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Ditassa pauciflora* Decne.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 609 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Ditassa pedunculata* Malme**
Voucher: Rapini, A. 652 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa poeppigii* E.Fourn.**
Voucher: Black, G.A. 50-8714 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ditassa pohliana* E.Fourn.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 1282 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa retusa* Mart.**
Voucher: Rapini, A. 677 (CEPEC, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ditassa rotundifolia* (Decne.) Baill. *ex* K.Schum.**
Voucher: Harley, R.M. 20878 (CEPEC, K, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado
***Ditassa sobradoi* (Morillo) Liede**
Voucher: Prance, G.T. 29078 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Ditassa subumbellata* Malme**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 25110)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ditassa succedanea* Rapini**
Voucher: Mello-Silva, R. 1599 (HUEFS, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa tatei* Gleason & Moldenke**
Voucher: Prance, G.T. 29652 (INPA, K, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia
***Ditassa taxifolia* Decne.**
Voucher: Luetzelburg, P. 21419 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia
***Ditassa tomentosa* (Decne.) Fontella**
Voucher: Hatschbach, G. 42203 (B, C, HBG, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Fischeria DC.

2 espécies (1 endêmica)
***Fischeria polytricha* Decne.**
Voucher: Silva Manso, A.L.P. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Fischeria stellata* (Vell.) E.Fourn.**
Voucher: Silva, J.M. 4028 (ALCB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

Forsteronia G.Mey.

25 espécies (10 endêmicas)
***Forsteronia acouci* (Aubl.) A.DC.**
Voucher: Prance, G.T. 11986 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Forsteronia affinis* Müll.Arg.**
Voucher: Prance, G.T. 7731 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM,
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Forsteronia amazonica* Monach.**
Voucher: Ducke, A. 1891 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Forsteronia australis* Müll.Arg.**
Voucher: Sartori, A.L.B. 28948 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Forsteronia brevifolia* Markgr.**
Voucher: Fróes, R.L. 21471 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Forsteronia cordata* (Müll.Arg.) Woodson**
Voucher: Martins, M.L.L. 154 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Forsteronia duckei* Markgr.**
Voucher: Carreira 88 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Forsteronia glabrescens* Müll.Arg.**
Voucher: Koch, I. 171 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Forsteronia gracilis* (Benth.) Müll.Arg.**
Voucher: Ducke, A. 1425 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Forsteronia guyanensis* Müll.Arg.**
Voucher: Ducke, A. 1761 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA); Domínio desconhecido
***Forsteronia laurifolia* (Benth.) A.DC.**
Referência: Candolle, A.P. de 1844. Prodr. 8: 438.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Forsteronia leptocarpa* (Hook. & Arn.) A.DC.**
Voucher: Simões, A.O. 1037 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Forsteronia linearis* (Vell.) Müll.Arg.**
Referência: Müller Argoviensis, J. 1860. Fl. bras. 6: 107.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Forsteronia lucida* Markgr.**
Referência: Markgraf, F. 1982. Ernstia 19: 2.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Forsteronia mollis* Rusby**
Referência: Rusby, H.H. 1896. Mem. Torrey Bot. Club 4: 218.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Forsteronia montana* Müll.Arg.**
Voucher: Santos 3323 (NY, USF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Forsteronia paludosa* Woodson**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 21627, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Forsteronia pilosa* (Vell.) Müll.Arg.**
Voucher: Furlan, A. 165 (HRCB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Forsteronia pubescens* A.DC.**
Voucher: Koch, I. 66 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Forsteronia refracta* Müll.Arg.**
Voucher: Bernacci, L.C. 285 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Forsteronia rufa* Müll.Arg.**
Voucher: Bernacci, L.C. 785 (IAC, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Forsteronia tarapotensis* K.Schum. *ex* Woodson**
Voucher: Lleras, E. P19448 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Forsteronia thyrsoidea* (Vell.) Müll.Arg.**
Voucher: Koch, I. 77 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,
RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Forsteronia umbellata* (Aubl.) Woodson**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21598, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Forsteronia velloziana* (A.DC.) Woodson**
Voucher: Koch, I. 131 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Funastrum E.Fourn.
3 espécies (1 endêmica)
***Funastrum clausum* (Jacq.) Schltr.**
Voucher: Teixeira, G. 2695 (HST, PEUFR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Funastrum flavum* (Decne.) Schltr.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2662 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Funastrum trichopetalum* (Silveira) Schltr.**
Voucher: Silveira, A. 297 (R?)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Galactophora Woodson
4 espécies (1 endêmica)
***Galactophora colellana* Morillo**
Voucher: Farney, C. 1723 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Galactophora crassifolia* (Müll.Arg.) Woodson**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 475 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Galactophora pulchella* Woodson**
Voucher: Fróes, R.L. 12558 (F, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Galactophora schomburgkiana* Woodson**
Referência: Woodson, R.E. 1932. Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Geissospermum Allemão
5 espécies (1 endêmica)
***Geissospermum argenteum* Woodson**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1493 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Geissospermum laeve* (Vell.) Miers**
Voucher: Portella, G. 225 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Geissospermum reticulatum* A.H.Gentry**
Voucher: Nee, M. 34470 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Geissospermum sericeum* Miers**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 61264)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Geissospermum urceolatum* A.H.Gentry**
Referência: Gentry, A.H. 1985. Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 1078.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Gomphocarpus R.Br.
1 espécie (não endêmica)
***Gomphocarpus physocarpus* E.Mey.**
Voucher: Noblick, L.R. 2593 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido

Gonolobus Michx.
3 espécies (1 endêmica)
***Gonolobus dorothyanus* Fontella**
Voucher: Araújo, D.S.D. 128 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Gonolobus parviflorus* Decne.**
Voucher: Rapini, A. 609 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Gonolobus rostratus* (Vahl) R.Br. *ex* Schltr.**
Voucher: Silva, J.M. 2720 (ALCB, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Gyrostelma E.Fourn.
2 espécies (1 endêmica)
***Gyrostelma bornmulleri* Schltr. *ex* Malme**
Voucher: Hagelund, K. 2896 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Gyrostelma oxypetaloides* E.Fourn.**
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 31669)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Hancornia Gomes
1 espécie (não endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)
***Hancornia speciosa* Gomes**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Hancornia speciosa* var. *pubescens* (Nees & Mart.) Müll. Arg.**
Referência: Müller Argoviensis, J. 1860. Fl. bras. 6: 25.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
Hancornia speciosa* Gomes var. *speciosa
Voucher: Kinoshita, L.S. 94-211 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Hemipogon Decne.
12 espécies (11 endêmicas)
***Hemipogon abietoides* E.Fourn.**
Voucher: Ribeiro, P.L. 283 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hemipogon acerosus* Decne.**
Voucher: Hoehne, F.C. 5947 (R, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Hemipogon carassensis* (Malme) Rapini**
Voucher: Souza, V.C. 7886 (HUEFS, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hemipogon furlanii* (Fontella) Rapini**
Voucher: Furlan, A. CFCR 686 (BHCB, G, K, MBM, MO, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hemipogon harleyi* (Fontella) Goyder**
Voucher: Rapini, A. 1410 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Hemipogon hatschbachii* (Fontella & Marquete) Rapini**
Voucher: Irwin, H.S. 20127 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hemipogon hemipogonoides* (Malme) Rapini**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 8108 (MBM, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Hemipogon irwinii* Fontella & Paixão**
Voucher: Irwin, H.S. 12541 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Hemipogon luteus* E.Fourn.**
Voucher: Arbo, M.M. 4129 (HB, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hemipogon piranii* (Fontella) Rapini**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 7969 (HB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hemipogon setaceus* Decne.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (S, SP 1427)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte,
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Hemipogon sprucei* E.Fourn.**
Voucher: Irwin, H.S. 7256 (B, K, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

Himatanthus Willd. *ex* Schult.

13 espécies (13 endêmicas), 5 variedades (5 endêmicas)
***Himatanthus articulatus* (Vahl) Woodson**
Voucher: Plumel, M.M. 8363 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Himatanthus attenuatus* (Benth.) Woodson**
Voucher: Prance, G.T. 3755 (F, G, K, MG, NY, R, S, U, Z)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA, AM, RO), Sudeste (ES); Amazônia
***Himatanthus bracteatus* (A.DC.) Woodson**
Distribuição: nativa; endêmica
Himatanthus bracteatus* (A.DC.) Woodson var. *bracteatus
Voucher: Harley, R.M. 17950 (NY, UEC, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA,
AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Himatanthus bracteatus* var. *revolutus* (Huber) Plumel**
Voucher: Ducke, A. 13304 (MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (RR, PA, AC); Amazônia
***Himatanthus drasticus* (Mart.) Plumel**
Voucher: Alencar, M.E. 424 (UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Himatanthus fallax* (Müll.Arg.) Plumel**
Voucher: Duarte, A.P. 9273 (RB, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO),
Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Himatanthus lancifolius* (Müll.Arg.) Woodson**
Voucher: Plumel, M.M. 8611 (P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Himatanthus obovatus* (Müll.Arg.) Woodson**
Distribuição: nativa; endêmica
Himatanthus obovatus* (Müll.Arg.) Woodson var. *obovatus
Voucher: Benson, W.W. 4659 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Himatanthus obovatus* var. *puberulus* (Müll.Arg.) Woodson**
Voucher: Falcão, C.T. 5139 (HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Himatanthus obovatus* var. *velutinus* (Müll.Arg.) Woodson**
Voucher: Araújo, A.P. 186 (CEPEC, HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, PI, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG); Cerrado
***Himatanthus phagedaenicus* (Mart.) Woodson**
Voucher: Luetzelburg, P. 22903 (R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Himatanthus semilunatus* Markgr.**
Voucher: Absy, M.L. 87 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Himatanthus speciosus* (Müll.Arg.) Plumel**
Voucher: Plumel, M.M. 8108 (INPA, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Himatanthus stenophyllus* Plumel**
Voucher: Ducke, A. 11358 (BM, MG)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Himatanthus sucuuba* (Spruce *ex* Müll.Arg.) Woodson**
Voucher: Nelson, B.W. 393 (IAN, INPA, MG, NY, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS);
Amazônia, Cerrado
***Himatanthus tarapotensis* (K.Schum. *ex* Markgr.) Plumel**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 601 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia, Cerrado

Hypolobus E.Fourn.

1 espécie (1 endêmica)
***Hypolobus infractus* E.Fourn.**
Voucher: Luschnath, B. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

Jobinia E.Fourn.

6 espécies (5 endêmicas)
***Jobinia connivens* (Hook. & Arn.) Malme**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (BM, M, S, SP 1483)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Jobinia grandis* (Hand.-Mazz.) Fontella & Goes**
Voucher: Lutz, B. 1541 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica
***Jobinia hatschbachii* Fontella & E.A.Schwarz**
Voucher: Hatschbach, G. 24387 (C, MBM, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Jobinia lindbergii* E.Fourn.**
Voucher: Hatschbach, G. 6445 (B, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Jobinia longicoronata* Goes & Fontella**
Voucher: Pizziolo, R. 86 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata
Atlântica
***Jobinia paranaensis* Fontella & Valente**
Voucher: Hatschbach, G. 26008 (BM, MBM, S, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Kerbera E.Fourn.

1 espécie (1 endêmica)
***Kerbera eichleri* E.Fourn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11211 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Lacmellea H.Karst.

12 espécies (6 endêmicas), 6 variedades (nenhuma
endêmica)
***Lacmellea aculeata* (Ducke) Monach.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Lacmellea aculeata* (Ducke) Monach. var. *aculeata
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 13316)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Lacmellea aculeata* var. *inermis* Monach.**
Voucher: Ducke, A. 23875 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM); Amazônia
***Lacmellea arborescens* (Müll.Arg.) Markgr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Lacmellea arborescens* (Müll.Arg.) Markgr. var.
arborescens**
Voucher: Spruce, R. 1001 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Lacmellea arborescens* var. *monosperma* (Müll.Arg.)
Markgr.**
Referência: Markgraf, F. 1941.
Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 15: 627.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, RO); Amazônia
***Lacmellea bahiensis* J.F.Morales**
Voucher: Carvalho, A.M. 6180 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Lacmellea densifoliata* (Ducke) Markgr.**
Voucher: Ducke, A. 17455 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Lacmellea floribunda* (Poepp.) Benth. & Hook.f.**
Voucher: Nascimento, O.C. 1004 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Lacmellea gracilis* (Müll.Arg.) Markgr.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1524 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Lacmellea guyanensis* (Müll.Arg.) Monach.**
Voucher: Jangoux, J. 270 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (MA); Amazônia
***Lacmellea lactescens* (Kuhlm.) Markgr.**
Voucher: Silva, N.T. 4598 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Lacmellea microcarpa* (Müll.Arg.) Markgr.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 3233 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Lacmellea oblongata* Markgr.**
Voucher: Gentry, A.H. 12832 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lacmellea pauciflora* (Kuhlm.) Markgr.**
Voucher: Amorim, A.M. 5865 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Lacmellea ramosissima* (Müll.Arg.) Markgr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Lacmellea ramosissima* var. *hirtella* Monach.**
Voucher: Ducke, A. 306 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Amazônia
***Lacmellea ramosissima* (Müll.Arg.) Markgr. var.
ramosissima**
Voucher: Spruce, R. 2628 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Laxoplumeria Markgr.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Laxoplumeria baehniana* Monach.**
Voucher: Fróes, R.L. 21694 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Laxoplumeria macrophylla* (Kuhlm.) Monach.**
Voucher: Monteiro, O.P. s.n. (INPA 212519)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Laxoplumeria tessmannii* Markgr.**
Voucher: Krukoff, B.A. s.n. (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Macoubea Aubl.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Macoubea guianensis* Aubl.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10668 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT),
Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Macoubea sprucei* (Müll.Arg.) Markgr.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 3238 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, RO), Nordeste (MA, BA),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

Macroditassa Malme
9 espécies (9 endêmicas)
***Macroditassa adnata* (E.Fourn.) Malme**
Voucher: Amorim, A.M. 4931 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Macroditassa grandiflora* (E.Fourn.) Malme**
Voucher: Jardim, J.G. 4227 (CEPEC, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Macroditassa lagoensis* (E.Fourn.) Malme**
Voucher: Fontella, J.P. 1059 (HB, RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Macroditassa laurifolia* (Decne.) Fontella**
Voucher: Mori, S.A. 12026 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Macroditassa laxa* (Malme) Fontella & de Lamare**
Voucher: Lima, S. 14170 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Macroditassa macrophylla* Malme**
Voucher: Mexia, Y. 5366 (BM, G, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Macroditassa marianae* Fontella & M.V.Ferreira**
Voucher: Kim, A.C. 30096 (HB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Macroditassa melantha* (Malme) Rapini**
Voucher: Guedes, M.L.S. PCD 716 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Macroditassa morilloana* Fontella & M.V.Ferreira**
Voucher: Andrade, P.M. 763 (BHCB, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Macropharynx Rusby
1 espécie (não endêmica)
***Macropharynx spectabilis* (Stadelm.) Woodson**
Voucher: Vieira, M.G.G. 1027 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Macroscepis Kunth
5 espécies (1 endêmica)
***Macroscepis aurea* E.Fourn.**
Voucher: Rambo, B. 53570 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Macroscepis dutrae* (Malme) Morillo**
Voucher: Dutra, J. 410 (S)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Macroscepis elliptica* N.E.Br.**
Voucher: Sander, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Macroscepis magnifica* Malme**
Voucher: Handro, O. s.n. (HB 84783)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Macroscepis selloana* E.Fourn.**
Voucher: Claussen, P. 342 (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Malouetia A.DC.
15 espécies (9 endêmicas)
***Malouetia amazonica* M.E.Endress**
Voucher: Prance, G.T. 17710 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Malouetia amplexicaulis* Spruce *ex* Müll.Arg.**
Voucher: Fróes, R.L. 22170 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Malouetia aquatica* Markgr.**
Voucher: Prance, G.T. 20595 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Malouetia calva* Markgr.**
Voucher: Fróes, R.L. 23334 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Malouetia cestroides* (Nees *ex* Mart.) Müll.Arg.**
Voucher: Cordeiro, I. 747 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Malouetia duckei* Markgr.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17464)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Malouetia flavescens* (Willd. *ex* Roem. & Schult.) Müll. Arg.**
Voucher: Prance, G.T. 7477 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia
***Malouetia glandulifera* Miers**
Voucher: Maguire, B. 34810 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Malouetia gracillima* Woodson**
Voucher: Traill, J.W.H. 517 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Malouetia lata* Markgr.**
Voucher: Ducke, A. 11014 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Malouetia nitida* Spruce *ex* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1860. Fl. bras. 6(1): 94.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Malouetia pubescens* Markgr.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 3778 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Malouetia pumila* M.E.Endress**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9061 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Malouetia tamaquarina* (Aubl.) A.DC.**
Voucher: Albuquerque, B.W. 206 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Malouetia virescens* Spruce *ex* Müll.Arg.**
Voucher: Kubitzki, K. 167 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Mandevilla Lindl.

69 espécies (41 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Mandevilla abortiva* J.F.Morales**
Voucher: Mendonça 3266 (IBGE, WAG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mandevilla alexicaca* (Mart. *ex* Stadelm.) M.F.Sales**
Voucher: Queiroz, L.P. 2092 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Mandevilla anceps* Woodson**
Voucher: Spruce, R. 3395 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mandevilla antennacea* (A.DC.) K.Schum.**
Voucher: Hatschbach, G. 62580 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia

***Mandevilla atroviolacea* (Stadelm.) Woodson**
Voucher: Romero, R. 448 (HRCB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Mandevilla bahiensis* (Woodson) M.F.Sales & Kin.-Gouv.**
Voucher: Ule, E.H.G. 7121 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Mandevilla catimbauensis* Souza-Silva et al.**
Voucher: Miranda, E.B. 576 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Mandevilla clandestina* J.F.Morales**
Voucher: Kinoshita, L.S. 94-22 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Mandevilla coccinea* (Hook. & Arn.) Woodson**
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 17905 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Mandevilla crassinoda* (Gardner) Woodson**
Voucher: Sucre, D. 1640 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mandevilla dardanoi* M.F.Sales et al.**
Voucher: Miranda, A.M. 1590 (PEUFR, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Mandevilla duartei* Markgr.**
Voucher: Simões, A.O. 1293 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Mandevilla emarginata* (Vell.) C.Ezcurra**
Voucher: Quast, M.P. 1 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mandevilla eximia* (Hemsl.) Woodson**
Voucher: Pirani, J.R. 4544 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Mandevilla fistulosa* M.F.Sales et al.**
Voucher: Carvalho, A.M. 897 (CEPEC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Mandevilla fragrans* (Stadelm.) Woodson**
Voucher: Pansarin, E.R. 1022 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Mandevilla funiformis* (Vell.) K.Schum.**
Voucher: Sales, M.F. s.n. (UEC 22855)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mandevilla grazielae* M.F.Sales et al.**
Voucher: Shepherd, G.J. 5869 (U, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Mandevilla guanabarica* Casar. *ex* M.F.Sales et al.**
Voucher: Souza, A.B. 69 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Mandevilla harleyi* M.F.Sales et al.**
Voucher: Harley, R.M. 25194 (K, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Mandevilla hatschbachii* M.F.Sales et al.**
Voucher: Pinto, G.C.P. 422-83 (HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Mandevilla hirsuta* (A.Rich.) K.Schum.**
Voucher: Morokawa, S. 176 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mandevilla illustris* (Vell.) Woodson**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Mandevilla illustris* var. *glabra* (Müll.Arg.) Woodson**
Voucher: Blanchet, J.S. 3382 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Mandevilla illustris* (Vell.) Woodson var. *illustris
Voucher: Kinoshita, L.S. 94-127 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado

***Mandevilla immaculata* Woodson**
Voucher: Hatschbach, G. 41753 (B, MU, UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mandevilla javitensis* (Kunth) K.Schum.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2546 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mandevilla krukovii* Woodson**
Voucher: Krukoff, B.A. 6335 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mandevilla lancifolia* Woodson**
Voucher: Spruce, R. 3610 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mandevilla leptophylla* (A.DC.) K.Schum.**
Voucher: Souza, V.C. 5279 (ESA, INB, K, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga

***Mandevilla longiflora* (Desf.) Pichon**
Voucher: Morokawa, R. 108 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

***Mandevilla lucida* Woodson**
Voucher: Barreto, H.L.M. s.n. (RB 54860)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Mandevilla luetzelburgii* (H.Ross & Markgr.) Woodson**
Voucher: Hatschbach, G. 44287 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Mandevilla martiana* (Stadelm.) Woodson**
Voucher: Souza, V.C. 21131 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mandevilla martii* (Müll.Arg.) Pichon**
Voucher: Silva, A.C.B. 864 (SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mandevilla matogrossana* J.F.Morales**
Voucher: Souza, V.C. 15097 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mandevilla microphylla* (Stadelm.) M.F.Sales & Kin.-Gouv.**
Voucher: Conceição 731 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mandevilla moricandiana* (A.DC.) Woodson**
Voucher: Simões, A.O. 1145 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mandevilla muelleri* Woodson**
Voucher: Sellow, F. 34 (B, MBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Mandevilla myriophylla* (Taub. *ex* Ule) Woodson**
Voucher: Ratter, J.A. 3981 (UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mandevilla novocapitalis* Markgr.**
Voucher: Morokawa, R. 188 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mandevilla pavonii* (A.DC.) Woodson**
Voucher: Croat, T.B. 62368 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Mandevilla pendula* (Ule) Woodson**
Voucher: Castellanos, A. 21946 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Mandevilla pentlandiana* (A.DC.) Woodson**
Voucher: Bernacci, L.C. 1442 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Mandevilla permixta* Woodson**
Voucher: Blanchet, J.S. 3960 (C, K, M, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mandevilla petraea* (A.St.-Hil.) Pichon**
Referência: Pichon, M. 1825. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia ser. 12: 322.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa
***Mandevilla pinifolia* (A.St.-Hil.) Miers**
Voucher: Joly, A.B. s.n. (SPF 16548)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado
***Mandevilla pohliana* (Stadelm.) A.H.Gentry**
Voucher: Koch, I. 30835 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mandevilla pycnantha* (Steud. *ex* A.DC.) Woodson**
Voucher: Shepherd, G.J. 3900 (MG, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Mandevilla rubra* Markgr. *ex* M.F.Sales et al.**
Voucher: Anderson, W.R. 35397 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mandevilla rugellosa* (A.Rich.) L.Allorge**
Voucher: Daly, D.C. 4197 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mandevilla rugosa* (Benth.) Woodson**
Voucher: Schomburgk, R.H. s.n. (UEC 49116)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Mandevilla sancta* (Stadelm.) Woodson**
Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 7524 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mandevilla scaberula* N.E.Br.**
Voucher: Forero, E. 6402 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Mandevilla scabra* (Hoffmanns. *ex* Roem. & Schult.) K.Schum.**
Voucher: Simões, A.O. 1127 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mandevilla schlimii* (Müll.Arg.) Woodson**
Voucher: Rodrigues, W.A. s.n. (INPA 598)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Mandevilla sellowii* (Müll.Arg.) Woodson**
Voucher: Monguilhott, L. 118 (RB, SPF, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mandevilla semirii* M.F.Sales et al.**
Voucher: Semir, J. CFCR 9689 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Mandevilla speciosa* (Kunth) J.F.Morales**
Voucher: Ule, E.H.G. 8450 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mandevilla spigeliiflora* (Stadelm.) Woodson**
Voucher: Kuhlmann, M. 3690 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal
***Mandevilla splendens* (Hook.f.) Woodson**
Voucher: Vidal, J. II-6568 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Mandevilla steyermarkii* Woodson**
Voucher: Poole, J.M. 1815 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mandevilla subcarnosa* (Benth.) Woodson**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 980 (INPA, MG, NY, WAG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Mandevilla symphytocarpa* (G.Mey.) Woodson**
Voucher: Prance, G.T. 2697 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Mandevilla tenuifolia* (J.C.Mikan) Woodson**
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1256 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mandevilla urceolata* Markgr.**
Voucher: Santos Lima, J. 198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Mandevilla urophylla* (Hook.f.) Woodson**
Voucher: Gibbs, P.E. 3266 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mandevilla velame* (A.St.-Hil.) Pichon**
Voucher: Oliveira, C.M. 76 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Pampa
***Mandevilla venulosa* (Müll.Arg.) Woodson**
Voucher: Mosén, C.W.H. 947 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Mandevilla virescens* (A.St.-Hil.) Pichon**
Voucher: Koch, I. 148 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado
***Mandevilla widgrenii* C.Ezcurra**
Voucher: Brade, A.C. 6698 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Marsdenia R.Br.

35 espécies (26 endêmicas)
***Marsdenia altissima* (Jacq.) Dugand**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12959 (C, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Marsdenia amorimii* Morillo**
Voucher: Hind, D.J.N. 64 (ALCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Marsdenia amylacea* (Barb.Rodr.) Malme**
Referência: Malme, G.O.A. 1936. Ark. Bot. 28A(5): 25.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Marsdenia bergii* Morillo**
Voucher: Berg, C.C. 455 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Marsdenia brasiliensis* Decne.**
Voucher: Irwin, H.S. 10349 (HB, K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Marsdenia breviramosa* Rapini & Fontella**
Voucher: Rapini, A. 1477 (BHCB, CTES, HUEFS, IAN, K, MBM, MO, NY, P, R, RB, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Marsdenia caatingae* Morillo**
Voucher: Carvalho, A.M. 1972 (CEPEC, G, HRB, HUEFS, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Marsdenia carvalhoi* Morillo & Carnevali**
Voucher: Lewis, G.P. 771 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Marsdenia dorothyae* Fontella & Morillo**
Voucher: Araújo, D.S.D. 4623 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Marsdenia fontellana* Morillo & Carnevali**
Voucher: Sucre, D. 8310 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Marsdenia glaziovii* (E.Fourn.) Spellman & Morillo**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8804 (C, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Marsdenia hassleriana* Malme**
Voucher: Warming, E. 1025 (C)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Marsdenia hatschbachii* Morillo**
Voucher: Hatschbach, G. 15251 (B, C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Marsdenia heringeri* Fontella**
Voucher: Brito, Z. 51 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Marsdenia hilariana* E.Fourn.**
Voucher: Imaguire, N. 5267 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Marsdenia loniceroides* (Hook.) E.Fourn.**
Voucher: Miers, J. 377 (K)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Marsdenia macrophylla* (Humb. & Bonpl.) E.Fourn.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (S, SP 28663)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Marsdenia malmeana* Rothe**
Voucher: Malme, G.O.A. 1116 (S)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado
***Marsdenia megalantha* Goyder & Morillo**
Voucher: Taylor, N.P. 1557 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (CE, RN, PB, BA, SE); Caatinga
***Marsdenia montana* Malme**
Voucher: Reitz, R. 8104 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Marsdenia nana* Rapini & Fontella**
Voucher: Hatschbach, G. 78449 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Marsdenia neomanarae* Morillo**
Voucher: Irwin, H.S. 13940 (NY, U, UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Marsdenia otoniense* Fontella & Morillo**
Voucher: Belém, R.P. 1625 (CEPEC, IAN)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Marsdenia pickelii* Fontella & Morillo**
Voucher: Pickel, B.J. 3715 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Marsdenia queirozii* Fontella**
Voucher: Hatschbach, G. 55182 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Marsdenia riparia* Morillo & Spellman**
Voucher: Egler, W.A. 46527 (HB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Marsdenia rubrofusca* E.Fourn.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6813 (INPA, K, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Marsdenia sessilifolia* (E.Fourn.) Fontella**
Voucher: Harley, R.M. CFCR 6694 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Marsdenia sprucei* Rothe**
Voucher: Spruce, R. 3404 (C, P, S, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Marsdenia suberosa* (E.Fourn.) Malme**
Voucher: Lombardi, J.A. 5940 (BHCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Marsdenia thomasii* Morillo**
Voucher: Thomas, W.W. 4169 (INPA, MER, NY, USF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Marsdenia ulei* Schltr. & Rothe**
Referência: Rothe, W. 1915. Bot. Jahrb. Syst. 52: 354-434.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Marsdenia virgultorum* (E.Fourn.) Malme**
Voucher: Warming, E. 1818 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Marsdenia weddellii* (E.Fourn.) Malme**
Voucher: Queiroz, L.P. 11015 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Marsdenia zehntneri* Fontella**
Voucher: Zehntner, D. 572 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Matelea Aubl.

43 espécies (28 endêmicas)
***Matelea amazonica* Morillo**
Voucher: Prance, G.T. 15760 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Matelea badilloi* Morillo**
Voucher: Thomas, W.W. 4381 (INPA, K, MG, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Matelea bahiensis* Morillo & Fontella**
Voucher: Almeida, J. 121 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Matelea barrosiana* Fontella**
Voucher: Barros, F. 927 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Matelea capillacea* (E.Fourn.) Fontella & E.A.Schwarz**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2909 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Matelea demuneri* Goes & Fontella**
Voucher: Demuner, V. 1015 (MBML, R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Matelea denticulata* (Vahl) Fontella & E.A.Schwarz**
Voucher: Hatschbach, G. 45425 (ALCB, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Matelea diversifolia* (E.Fourn.) Morillo & Fontella**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21757 (BR, C, G, K, LE, P)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Matelea dusenii* Morillo**
Voucher: Dusén, P.K.H. 9431 (BM, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Matelea endressiae* Fontella & Goes**
Voucher: Rapini, A. 1233 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Matelea fontellana* Morillo**
Voucher: Madison, M.T. 6475 (F, SEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Matelea fournieri* Morillo**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8798 (C, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Matelea ganglinosa* (Vell.) Rapini**
Voucher: Miranda, E.B. 2838 (HST, HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Matelea geminiflora* (Decne.) Fontella**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Matelea glaziovii* (E.Fourn.) Morillo**
Voucher: Usteri, A. s.n. (S, SP 15827)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Matelea harleyi* Fontella & Morillo**
Voucher: Harley, R.M. 19166 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (CE, RN, PE, BA); Caatinga
***Matelea hatschbachii* (Fontella & Valente) Morillo**
Voucher: Hatschbach, G. 6399 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Matelea lanosa* (E.Fourn.) Morillo & Fontella**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21757 (BR, C, G, K, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Matelea lhotzkyana* (E.Fourn.) Fontella**
Voucher: Lhotsky, J. 14 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Matelea ligustrina* (Decne.) Morillo**
Voucher: Claussen, P. 356 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Matelea lourteigiae* Morillo**
Voucher: Spruce, R. 888 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Matelea macrocarpa* (Poepp. & Endl.) Morillo**
Voucher: Ule, E.H.G. 9530 (G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Matelea marcoassisii* Fontella**
Voucher: Assis, M.C. 1322 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Matelea maritima* (Vell.) Fontella**
Voucher: Queiroz, L.P. 2335 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Matelea matogrossensis* Fontella**
Voucher: Hatschbach, G. 24617 (HUEFS, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Matelea microphylla* Morillo**
Voucher: Daly, D.C. 1713 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Matelea morilloana* Fontella**
Voucher: Harley, R.M. 21287 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Matelea nigra* (Decne.) Morillo & Fontella**
Voucher: Cardoso, D. 639 (BHCB, ESA, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Matelea orthosioides* (E.Fourn.) Fontella**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 1254 (CEPEC, HRB, K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM), Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Matelea palustris* Aubl.**
Voucher: Pires, J.M. 864 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Matelea pedalis* (E.Fourn.) Fontella & E.A.Schwarz**
Voucher: Rapini, A. 907 (BHCB, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, RJ);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Matelea purpurea* (Decne.) Goyder**
Voucher: Malme, G.O.A. 2562a-c (S)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Matelea pyrrhotricha* (Decne.) Fontella**
Voucher: Hatschbach, G. 1491 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Matelea quindecimlobata* Farinaccio & W.D.Stevens**
Voucher: Farinaccio, M.A. 750 (B, ESA, F, HRCB, HUEFS, INPA, K, MBM, MO, NY, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Matelea quinquedentata* (E.Fourn.) Morillo**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11205 (P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Matelea reflexa* (Hemsl.) Morillo**
Voucher: Ule, E.H.G. 9529 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Matelea refracta* (E.Fourn.) Morillo**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3727 (C, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Matelea reitzii* Fontella**
Voucher: Reitz, R. 11987 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Matelea riparia* Morillo**
Voucher: Belém, R.P. 2735 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Matelea roulinioides* Agra & W.D.Stevens**
Voucher: Agra, M.F. 1251 (JPB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB); Caatinga
***Matelea santosii* Morillo & Fontella**
Voucher: Santos, T.S. 2254 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Matelea stenopetala* Sandwith**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2638 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Matelea viridis* (Moldenke) Spellman**
Voucher: Cowan, R.S. 38232 (NY, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Mesechites Müll.Arg.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Mesechites mansoanus* (A.DC.) Woodson**
Voucher: Koch, I. 135 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);
Cerrado, Mata Atlântica
***Mesechites trifidus* (Jacq.) Müll.Arg.**
Voucher: Hatschbach, G. 63956 (MBM, WAG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal

Metalepis Griseb.

1 espécie (não endêmica)
***Metalepis albiflora* Urb.**
Voucher: Daly, D.C. 6948 (CAS, INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Metastelma R.Br.

5 espécies (3 endêmicas)
***Metastelma ditassoides* Schltr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8455 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Metastelma giuliettianum* Fontella**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 1669 (HB, K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Metastelma harleyi* Fontella**
Voucher: Harley, R.M. 53649 (CEPEC, HUEFS, MBM, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Metastelma myrtifolium* Decne.**
Voucher: Ferreira, M.C. PCD 1807 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Metastelma parviflorum* (Sw.) R.Br. *ex* Schult.**
Voucher: Coradin, L. 787 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Microplumeria Baill.

1 espécie (não endêmica)
***Microplumeria anomala* (Müll.Arg.) Markgr.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2900 (INPA, NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

Minaria T.U.P.Konno & Rapini
19 espécies (17 endêmicas)
***Minaria abortiva* (Silveira) Rapini**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16259 (BR, C, G, IAN, K, LE, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica
***Minaria acerosa* (Mart.) T.U.P.Konno & Rapini**
Voucher: Williams, L.O. 6350 (A, K, MO, NY, R, RB, S, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, RS);
Cerrado, Mata Atlântica
***Minaria bifurcata* (Rapini) T.U.P.Konno & Rapini**
Voucher: Irwin, H.S. 27896a (R, MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minaria campanuliflora* Rapini**
Voucher: Viana, P.L. 1263 (BHCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minaria cordata* (Turcz.) T.U.P.Konno & Rapini**
Voucher: Harley, R.M. 20151 (CEPEC, K, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Minaria decussata* (Mart.) T.U.P.Konno & Rapini**
Voucher: Irwin, H.S. 29359 (MBM, MO, NY, UPS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Minaria diamantinensis* (Fontella) T.U.P.Konno &
Rapini**
Voucher: Kameyama, C. CFCR 11282 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minaria ditassoides* (Silveira) T.U.P.Konno & Rapini**
Voucher: Irwin, H.S. 19997 (BR, MBM, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minaria grazielae* (Fontella & Marquete) T.U.P.Konno &
Rapini**
Voucher: Hatschbach, G. 36496 (C, HB, INPA,
MBM, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minaria hemipogonoides* (E.Fourn.) T.U.P.Konno &
Rapini**
Voucher: Rapini, A. 1770 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minaria inconspicua* (Rapini) Rapini**
Voucher: Pirani, J.R. 5686 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minaria lourteigiae* (Fontella) T.U.P.Konno & Rapini**
Voucher: Irwin, H.S. 25458 (K, MO, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minaria magisteriana* (Rapini) T.U.P.Konno & Rapini**
Voucher: Rapini, A. 597 (BHCB, K, MBM, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minaria micromeria* (Decne.) T.U.P.Konno & Rapini**
Voucher: Irwin, H.S. 19556 (BR, MBM, MO, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);
Cerrado, Mata Atlântica
***Minaria monocoronata* (Rapini) T.U.P.Konno & Rapini**
Voucher: Teixeira, W.A. s.n. (BHCB 25014, HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Minaria parva* (Silveira) T.U.P.Konno & Rapini**
Voucher: Irwin, H.S. 22361 (K, MO, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minaria polygaloides* (Silveira) T.U.P.Konno & Rapini**
Voucher: Sajo, M.G. CFSC 7610 (RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minaria refractifolia* (K.Schum.) T.U.P.Konno & Rapini**
Voucher: Mello-Silva, R. 1760 (BHCB, CTES, F, G, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minaria semirii* (Fontella) T.U.P.Konno & Rapini**
Voucher: Ribeiro, P.L. 366 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Molongum Pichon
3 espécies (1 endêmica)
***Molongum laxum* (Benth.) Pichon**
Voucher: Kubitzki, K. 75-84 (HBG, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Molongum lucidum* (Kunth) Zarucchi**
Voucher: Silva, N.T. 3858 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Molongum zschokkeiforme* (Markgr.) Pichon**
Voucher: Rodrigues, W.A. 6779 (GH, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Morrenia Lindl.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Morrenia odorata* (Hook. & Arn.) Lindl.**
Voucher: Barbosa, E. 1894 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Pampa
***Morrenia stormiana* (Morong) Malme**
Voucher: Hatschbach, G. 49242 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Morrenia variegata* (Griseb.) T.Mey.**
Voucher: Barbosa, E. 1895 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS); Cerrado

Mucoa Zarucchi
1 espécie (1 endêmica)
***Mucoa duckei* (Markgr.) Zarucchi**
Voucher: Albuquerque, B. 917 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Nautonia Decne.
1 espécie (1 endêmica)
***Nautonia nummularia* Decne.**
Voucher: Irwin, H.S. 7455 (HB, K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Neocouma Pierre
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Neocouma parviflora* (Markgr.) Zarucchi**
Voucher: Rosa, N.A. 2350 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Neocouma ternstroemiacea* (Müll.Arg.) Pierre**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35156)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Norte (PA, AM); Amazônia

Nephradenia Decne.

4 espécies (3 endêmicas)

***Nephradenia acerosa* Decne.**
Voucher: Hatschbach, G. 33248 (BHCB, C, HB, INPA, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Nephradenia asparagoides* (Decne.) E.Fourn.**
Voucher: Hatschbach, G. 67629 (BHCB, CEPEC, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Caatinga, Cerrado

***Nephradenia filipes* Malme**
Voucher: Silva, U.C.S. 114 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Nephradenia linearis* Benth. *ex* E.Fourn.**
Voucher: Prance, G.T. 30061 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

Odontadenia Benth.

16 espécies (2 endêmicas)

***Odontadenia funigera* Woodson**
Voucher: Lowrie, S.R. 41 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Odontadenia geminata* (Hoffmanns. *ex* Roem. & Schult.) Müll.Arg.**
Voucher: Austin, D.F. 7444 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Odontadenia gracilipes* (Stadelm.) Woodson**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (INB, RB 92710)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Odontadenia hypoglauca* Müll.Arg.**
Voucher: Hatschbach, G. 42041 (MBM, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Odontadenia killipii* Woodson**
Voucher: Elias, S.I. 318 (HB, IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Odontadenia kochii* Pilg.**
Voucher: Amaral 1601 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Odontadenia laxiflora* (Rusby) Woodson**
Voucher: Ducke, A. 23954 (INB, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Odontadenia lutea* (Vell.) Markgr.**
Voucher: Hatschbach, G. 38180 (M, MBM, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Odontadenia macrantha* (Roem. & Schult.) Markgr.**
Voucher: Daly, D.C. 9023 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC); Amazônia

***Odontadenia markgrafiana* J.F.Morales**
Voucher: Oliveira 3911 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Odontadenia matogrossana* J.F.Morales**
Voucher: Hatschbach, G. 37204 (HB, INB, M, MBM, UC, US, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Odontadenia nitida* (Vahl) Müll.Arg.**
Voucher: Secco, R.S. 167 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Odontadenia perrottetii* (A.DC.) Woodson**
Voucher: Prance, G.T. 3129 (F, INPA, NY, S, US, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Odontadenia puncticulosa* (Rich.) Pulle**
Voucher: Marinho, L.R. 31 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Odontadenia stemmadeniifolia* Woodson**
Voucher: Prance, G.T. 12016 (F, INPA, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Odontadenia verrucosa* (Willd. *ex* Roem. & Schult.) K.Schum. *ex* Markgr.**
Voucher: Prance, G.T. 30285 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Orthosia Decne.

15 espécies (12 endêmicas)

***Orthosia arenosa* Decne.**
Voucher: Vauthier, M. 97 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Orthosia congesta* Decne.**
Voucher: Folli, D.A. 337 (CVRD, HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Orthosia dusenii* (Malme) Fontella**
Voucher: Hatschbach, G. 17832 (C, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Orthosia eichleri* E.Fourn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8174 (C, G, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Orthosia guilleminiana* (Decne.) Liede & Meve**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (S, SP 2613)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Orthosia hatschbachii* Fontella & Goes**
Voucher: Hatschbach, G. 19295 (C, G, MBM, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Orthosia itatiaiensis* Malme**
Voucher: Smith, L.B. 2300 (A, BM, F, K, NY, P, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Orthosia latipes* (Decne.) Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 704 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Orthosia loandensis* Fontella & Valente**
Voucher: Hatschbach, G. 5653 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Orthosia multiflora* E.Fourn.**
Voucher: Cordeiro, I. 544 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Orthosia parviflora* (E.Fourn.) Liede & Meve**
Voucher: Mori, S.A. 11771 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Orthosia scoparia* (Nutt.) Liede & Meve**
Voucher: Hatschbach, G. 21346 (BM, C, F, HRB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Orthosia umbrosa* Decne.**
Voucher: Lhotsky, J. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Orthosia urceolata* E.Fourn.**
Voucher: Silva, J.M. 4349 (ALCB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Orthosia virgata* (Poir.) E.Fourn.**
Voucher: Rambo, B. 29017 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Oxypetalum R.Br.

89 espécies (52 endêmicas)
***Oxypetalum aequaliflorum* E.Fourn.**
Voucher: Farinaccio, M.A. 482 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Oxypetalum albicans* Schltr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8270 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Oxypetalum alpinum* (Vell.) Fontella**
Voucher: Hatschbach, G. 62090 (HRB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum appendiculatum* Mart.**
Voucher: Mexia, Y. 4312 (BM, G, IAN, P, VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum arachnoideum* E.Fourn.**
Voucher: Harley, R.M. 21204 (CEPEC, K, P, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum argentinum* Malme**
Voucher: Rambo, B. s.n. (B, PACA 25844)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Oxypetalum arnnotianum* H.Buek**
Voucher: Rambo, B. 34611 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Oxypetalum aurantiacum* Malme *ex* Chodat & Hassl.**
Voucher: Hatschbach, G. 37088 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Oxypetalum balansae* Malme**
Voucher: Hatschbach, G. 19080 (C, MBM, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum banksii* R.Br. *ex* Schult.**
Voucher: Rapini, A. 988 (HRB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum boudettii* Fontella & Goes**
Voucher: Pereira, O.J. 2171 (VIES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Oxypetalum burchellii* (E.Fourn.) Malme**
Voucher: Reitz, R. 6023 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Oxypetalum capitatum* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 18019 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum charrua* T.Mey.**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 9513)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum chodatianum* Malme**
Voucher: Dusén, P.K.H. 10908 (BM, G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum coalitum* E.Fourn.**
Voucher: Rambo, B. 34607 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum coccineum* (Griseb.) Malme**
Voucher: Bueno, O. 3920 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Oxypetalum commersonianum* (Decne.) Fontella & E.A.Schwarz**
Voucher: Malme, G.O.A. 658 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum confusum* Malme**
Voucher: Rambo, B. 34609 (B, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum costae* Occhioni**
Voucher: Brade, A.C. 3644 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Oxypetalum crispum* Wight *ex* Hook. & Arn.**
Voucher: Malme, G.O.A. 990 (R, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum dusenii* Malme**
Voucher: Dusén, P.K.H. 11301 (B, G, K, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Oxypetalum ekblomii* Malme**
Voucher: Macedo, A. 420 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Oxypetalum erectum* Mart.**
Voucher: Rapini, A. 316 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum erianthum* Decne.**
Voucher: Harley, R.M. 28523 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum erostre* E.Fourn.**
Voucher: Hoehne, F.C. 5910 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum foliosum* Mart.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15236 (C, K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum glabrum* (Decne.) Malme**
Voucher: Rapini, A. 317 (K, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum glaziovianum* Loes.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17143 (C, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Oxypetalum glaziovii* (E.Fourn.) Fontella & Marquete**
Voucher: Mello-Silva, R. 2851 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Oxypetalum gyrophyllum* Farinaccio & Mello-Silva**
Voucher: Dittrich, V.A.O. 17143 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Oxypetalum habrogynum* Farinaccio**
Voucher: Farinaccio, M.A. 143 (F, MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Oxypetalum harleyi* (Fontella & Goyder) Farinaccio**
Voucher: Harley, R.M. 16882 (CEPEC, K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Oxypetalum helios* Farinaccio**
Voucher: Farinaccio, M.A. 351 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Oxypetalum hilarianum* E.Fourn.**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 25850)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Oxypetalum hoehnei* Malme**
Voucher: Silva, J.M. 3932 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Oxypetalum humile* (Morong) Hassl.**
Voucher: Jörgensen, P. 2068 (BA, LIL, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Oxypetalum incanum* E.Fourn.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1437 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum insigne* (Decne.) Malme**
Voucher: Lima, L.R. 146 (BHCB, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum jacobinae* Decne.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15227 (C, K, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum joergensenii* T.Mey.**
Voucher: Rambo, R. 56584 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum kleinii* Fontella & Marquete**
Voucher: Reitz, R. 8216 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Oxypetalum kuhlmannianum* Occhioni**
Voucher: Macedo, A. s.n. (RB 55442)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Oxypetalum* laciniatum** Rapini & Farinaccio
Voucher: Mattos-Silva, L.A. 4493 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Oxypetalum lanatum* Decne. *ex* E.Fourn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16253 (BR, C, K, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Oxypetalum leonii* Fontella**
Voucher: Rapini, A. 885 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Oxypetalum lineare* Decne.**
Voucher: Hoehne, F.C. 36558 (IAN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum lutescens* E.Fourn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6903 (C, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Oxypetalum macrolepis* (Hook. & Arn.) Decne.**
Voucher: Rambo, B. 2289 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum malmei* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (S, SP 23381)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Oxypetalum marginatum* Malme**
Voucher: Farinaccio, M.A. 505 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Oxypetalum martii* E.Fourn.**
Voucher: Loefgren, A. 324 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum megapotamicum* Spreng.**
Voucher: Krapovickas, A. 37030 (C, G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum melinioides* Goyder**
Voucher: Pereira, E. 4760 (HB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Oxypetalum mexiae* Malme**
Voucher: Mexia, Y. 5147 (BM, G, K, P, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Oxypetalum microphyllum* Hook. & Arn.**
Voucher: Tweedie, J. 225 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum minarum* E.Fourn.**
Voucher: Rapini, A. 836 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum molle* Hook. & Arn.**
Voucher: Silva, J.M. 757 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum montanum* Mart.**
Voucher: Silveira, V.M. 18 (BHCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum morilloanum* Fontella**
Voucher: Reitz, R. 16541 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Oxypetalum mosenii* (Malme) Malme**
Voucher: Silva, J.M. 483 (HUEFS, MBM, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum muticum* E.Fourn.**
Voucher: Hatschbach, G. 25447 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum oblanceolatum* Farinaccio & Mello-Silva**
Voucher: Hatschbach, G. 24431 (HUEFS, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Oxypetalum obtusifolium* Malme**
Voucher: Ribas, O.S. 7569 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Oxypetalum ostenii* Malme**
Voucher: Hatschbach, G. 23162 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Oxypetalum pachyglossum* Decne.**
Voucher: Fontella, J.P. 1065 (OUPR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum pachygynum* Decne.**
Voucher: Souza, V.C. 8084 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum pannosum* Decne.**
Voucher: Silva, J.M. 4619 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum pardense* E.Fourn.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Oxypetalum parviflorum* (Decne.) Decne.**
Voucher: Hatschbach, G. 22580 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum patulum* E.Fourn.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 265 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Oxypetalum pedicellatum* Decne.**
Voucher: Hatschbach, G. 35752 (C, MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum pilosum* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 226 (G, K, NY, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Oxypetalum polyanthum* (Hoehne) Rapini**
Voucher: Roth, L. 16339 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum rariflorum* Malme**
Voucher: Rapini, A. 1015 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum reflexum* Malme**
Voucher: Salles, A.E.H. 335 (HEPH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Oxypetalum regnellii* (Malme) Malme**
Voucher: Regnell, A.F. 73 (BR, M, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum reitzii* Fontella & Marquete**
Voucher: Reitz, R. 6108 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Oxypetalum rusticum* Rapini**
Voucher: Souza, V.C. 20973 (BHCB, ESA, HUEFS, MBM, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Oxypetalum schottii* E.Fourn.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7760 (C, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Oxypetalum solanoides* Hook. & Arn.**
Voucher: Molon, R. s.n. (B, G, HUCS 9012)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum stipatum* Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 500 (BM, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum strictum* Mart.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 177 (G, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum sublanatum* Malme**
Voucher: Silva, J.M. 3931 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum subopposítum* Malme**
Voucher: Hatschbach, G. 12833 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum tomentosum* Wight *ex* Hook. & Arn.**
Voucher: Hatschbach, G. 72695 (HUEFS, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Oxypetalum tubatum* Malme**
Voucher: Amaral, M.C.E. 60 (HB, HUEFS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Oxypetalum warmingii* (E.Fourn.) Fontella & Marquete**
Voucher: Rapini, A. 906 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Oxypetalum wightianum* Hook. & Arn.**
Voucher: Rapini, A. 705 (G, K, SP, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Pacouria Aubl.
3 espécies (1 endêmica)
***Pacouria boliviensis* (Markgr.) A.Chev.**
Voucher: Maciel, U.N. 1853 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia
***Pacouria guianensis* Aubl.**
Voucher: Fróes, R.L. 26176 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Pacouria paraensis* (Huber) Pichon**
Voucher: Huber, O. 9341 (F, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Parahancornia Ducke
7 espécies (2 endêmicas)
***Parahancornia amara* (Markgr.) Monach.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9407 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Parahancornia fasciculata* (Poir.) Benoist**
Voucher: Prance, G.T. 10315
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Parahancornia krukovii* Monach.**
Voucher: Prance, G.T. 156449 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Parahancornia negroensis* Monach.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1121 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Parahancornia oblonga* (Benth. *ex* Müll.Arg.) Monach.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 3738 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Parahancornia peruviana* Monach.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1326 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Parahancornia surrogata* Zarucchi**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1121 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Peltastes Woodson
4 espécies (2 endêmicas)
***Peltastes bahiensis* Markgr.**
Voucher: Harley, R.M. 300 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Peltastes macrocalyx* (Müll.Arg.) Woodson**
Voucher: Prance, G.T. 59613 (INB, K, NY, S, US, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica
***Peltastes peltatus* (Vell.) Woodson**
Voucher: Souza, V.C. 11165 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN,
PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES,
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Peltastes pulcher* (Miers) J.F.Morales**
Voucher: Hatschbach, G. 48724 (HBG, MBM, NY, UC, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, RJ); Domínio desconhecido

Peplonia Decne.
6 espécies (6 endêmicas)
***Peplonia asteria* (Vell.) Fontella & E.A.Schwarz**
Voucher: Harley, R.M. 18154 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Peplonia axillaris* (Vell.) Fontella & Rapini**
Voucher: Ribas, O.S. 972 (C, G, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Peplonia bradeana* (Fontella & E.A.Schwarz) Fontella & Rapini**
Voucher: Amorim, A.M. 432 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Peplonia hatschbachii* (Fontella & de Lamare) Fontella & Rapini**
Voucher: Hatschbach, G. 15688 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); Mata Atlântica
***Peplonia organensis* (E.Fourn.) Fontella & Rapini**
Voucher: Atkins, S. CFCR 13805 (K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Peplonia riedelii* (E.Fourn.) Fontella & Rapini**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11192 (P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Petalostelma E.Fourn.
6 espécies (3 endêmicas)
***Petalostelma bracteolatum* (E.Fourn.) Fontella**
Voucher: Burchell, W.J. 6658 (BR, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (ES);
Amazônia, Cerrado
***Petalostelma calcaratum* (Decne.) Fontella**
Voucher: Martius, C.F.P. 1225 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Petalostelma cearense* Malme**
Voucher: Loefgren, A. 699 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (MA, CE); Caatinga
***Petalostelma dardanoi* Fontella**
Voucher: Heringer, E.P. 655 (IPA, PEUFR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Caatinga
***Petalostelma martianum* E.Fourn.**
Voucher: Martius, C.F.P. 2474 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE,
RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Petalostelma robertii* (S.Moore) Liede & Meve**
Voucher: Hatschbach, G. 23787 (ESA, SPF, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS); Cerrado

Prestonia R.Br.
23 espécies (10 endêmicas)
***Prestonia acrensis* J.F.Morales**
Voucher: Ramos 249 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Prestonia amazonica* (Benth. *ex* Müll.Arg.) J.F.Macbr.**
Voucher: Spruce, R. 239 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Prestonia annularis* (L.f.) G.Don**
Voucher: Krukoff, B.A. 6190 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Prestonia bahiensis* Müll.Arg.**
Voucher: Kameyama, C. s.n. (SPF 41118)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Prestonia calycina* Müll.Arg.**
Voucher: Bernacci, L.C. 139 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Prestonia cayennensis* (A.DC.) Pichon**
Voucher: Mota, C.D.A. 2951 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Prestonia coalita* (Vell.) Woodson**
Voucher: Koch, I. 179 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Prestonia cyaniphylla* (Rusby) Woodson**
Referência: Woodson, R.E. 1936. Ann. Missouri Bot. Gard. 23: 234.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Prestonia denticulata* (Vell.) Woodson**
Voucher: Marquete, R. 3450 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Prestonia didyma* (Vell.) Woodson**
Voucher: Gentry, A.H. 49479 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Prestonia dusenii* (Malme) Woodson**
Voucher: Moreira 13 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Prestonia erecta* (Malme) J.F.Morales**
Referência: Morales, J.F. 1999. Novon 9: 90.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Prestonia lagoensis* (Müll.Arg.) Woodson**
Referência: Woodson, R.E. 1936. Ann. Missouri Bot. Gard. 23: 296.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Prestonia lindleyana* Woodson**
Referência: Woodson, R.E. 1933. Mem. Torrey Bot. Club 60: 392.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Prestonia macroneura* (Müll.Arg.) Woodson**
Voucher: Martius, C.F.P. 3029 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Prestonia megagros* (Vell.) Woodson**
Voucher: Ducke, A. 21602 (B, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Prestonia plumierifolia* Markgr.**
Voucher: Daly, D.C. 9531 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Prestonia quinquangularis* (Jacq.) Spreng.**
Voucher: Daly, D.C. 8444 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Prestonia riedelii* (Müll.Arg.) Markgr.**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 1196 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Prestonia solanifolia* (Müll.Arg.) Woodson**
Voucher: Novaes s.n. (SP 2982)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Prestonia surinamensis* Müll.Arg.**
Voucher: Ducke, A. 21628 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Prestonia tomentosa* R.Br.**
Voucher: Figueiredo, C. 202 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Prestonia trifida* (Poepp.) Woodson**
Voucher: Góes, O.C. s.n. (RB 49408)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Pseudibatia Malme
2 espécies (2 endêmicas)
***Pseudibatia ciliata* (E.Fourn.) Malme**
Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pseudibatia suberosa* Malme**
Voucher: Mosén, C.W.H. 4283 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Rauvolfia L.
19 espécies (11 endêmicas)
***Rauvolfia atlantica* Emygdio**
Voucher: Amorim, A.M. 1602 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Rauvolfia bahiensis* A.DC.**
Voucher: Sobral, M. 3592 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Rauvolfia capixabae* I.Koch & Kin.-Gouv.**
Voucher: Mansano, V.F. 79 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Rauvolfia gracilis* I.Koch & Kin.-Gouv.**
Voucher: Vieira, M.G. 955 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Rauvolfia grandiflora* Mart.**
Voucher: Belém, R.P. 2235 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Rauvolfia ligustrina* Willd.**
Voucher: Félix, L.P. 5629 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado
***Rauvolfia macrantha* K.Schum. *ex* Markgr.**
Voucher: Loureiro, A. 5313 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Rauvolfia mattfeldiana* Markgr.**
Voucher: Harley, R.M. 15560 (CEPEC, MO, NY, US, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rauvolfia moricandii* A.DC.**
Voucher: Pirani, J.R. 2733 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Rauvolfia pachyphylla* Markgr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8736 (B (destruído), F (foto))
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Cerrado
***Rauvolfia paraensis* Ducke**
Voucher: Prance, G.T. 22723 (F, NY, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Rauvolfia paucifolia* A.DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 44127 (C, NY, US, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Rauvolfia pentaphylla* (Huber) Ducke**
Voucher: Pires, J.M. 730 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Rauvolfia polyphylla* Benth.**
Voucher: Schomburgk, R.H. 891 (K, UEC (foto))
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Rauvolfia praecox* K.Schum. *ex* Markgr.**
Voucher: Prance, G.T. 7928 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Rauvolfia pruinosifolia* I.Koch & Kin.-Gouv.**
Voucher: Magalhães, G.M. 18840 (MG, PEL)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Rauvolfia sellowii* Müll.Arg.**
Voucher: Garcia, F.C.P. 513 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Rauvolfia sprucei* Müll.Arg.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10576 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Rauvolfia weddelliana* Müll.Arg.**
Voucher: Hatschbach, G. 37527 (C, M, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

Rhabdadenia Müll.Arg.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Rhabdadenia biflora* (Jacq.) Müll.Arg.**
Voucher: Fróes, R.L. 1886 (P, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Rhabdadenia madida* (Vell.) Miers**
Voucher: Hatschbach, G. 18229 (MBM, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Rhabdadenia ragonesei* Woodson**
Voucher: Hatschbach, G. 45842 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Rhigospira Miers

1 espécie (não endêmica)
***Rhigospira quadrangularis* (Müll.Arg.) Miers**
Voucher: Prance, G.T. 3013 (F, INPA, K, MG, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM, AC); Amazônia

Schistogyne Hook. & Arn.

2 espécies (1 endêmica)
***Schistogyne decaisneana* H.Karst.**
Voucher: Pedersen, T.M. 11428 (C, K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica
***Schistogyne sylvestris* Hook. & Arn.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2645 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Schubertia Mart.

3 espécies (2 endêmicas)
***Schubertia grandiflora* Mart.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3057 (P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Schubertia morilloana* Fontella**
Voucher: Harley, R.M. 21597 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Schubertia multiflora* Mart.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 12257 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Secondatia A.DC.

3 espécies (2 endêmicas)
***Secondatia densiflora* A.DC.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5165 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Secondatia duckei* Markgr.**
Voucher: Vicentini, A. 692 (IAN, INB, INPA, K, MO, NY, SP, SPF, UB, WAG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Secondatia floribunda* A.DC.**
Voucher: Alencar, M.E. 445 (TEPB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Skytanthus Meyen

2 espécies (1 endêmica)
***Skytanthus hancorniifolius* (A.DC.) Miers**
Voucher: Sucre, D. 11356 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Skytanthus martianus* (Müll.Arg.) Miers**
Referência: Miers, J. 1878. Apocyn. S. Amer. 110 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

Spongiosperma Zarucchi

3 espécies (1 endêmica)
***Spongiosperma grandiflorum* (Huber) Zarucchi**
Voucher: Bastos 112 (F, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Spongiosperma longilobum* (Markgr.) Zarucchi**
Voucher: Duarte, A.P. 9845 (HB, INPA, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Spongiosperma macrophyllum* (Müll.Arg.) Zarucchi**
Voucher: Zarucchi, J.L. 1903 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Stemmadenia Benth.

2 espécies (2 endêmicas)
***Stemmadenia brasiliensis* Leeuwenb.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7935 (INPA, NY, WAG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Stemmadenia grandiflora* (Jacq.) Miers**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 528 (GH, K, US, WAG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Stenomeria Turcz.

1 espécie (não endêmica)
***Stenomeria decalepis* Turcz.**
Voucher: Prance, G.T. 7414 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Stipecoma Müll.Arg.

1 espécie (não endêmica)
***Stipecoma peltigera* (Stadelm.) Müll.Arg.**
Voucher: Silva 1607 (CEPEC, WAG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Tabernaemontana L.

28 espécies (6 endêmicas)
***Tabernaemontana albiflora* (Miq.) Pulle**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2003 (GH, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Tabernaemontana amygdalifolia* Jacq.**
Voucher: Figueiredo, C. 1137 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Tabernaemontana angulata* Mart. *ex* Müll.Arg.**
Voucher: Prance, G.T. 10045 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Tabernaemontana catharinensis* A.DC.**
Voucher: Koch, I. 57 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Tabernaemontana coriacea* Link *ex* Roem. & Schult.**
Voucher: Balée, W.L. 1555 (WAG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Tabernaemontana cumata* Leeuwenb.**
Voucher: Ducke, A. 1290 (MO, NY, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tabernaemontana cuspidata* Rusby**
Voucher: Rusby, H.H. 2376 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Tabernaemontana cymosa* Jacq.**
Voucher: Prance, G.T. 4596 (F, K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AC); Amazônia
***Tabernaemontana disticha* A.DC.**
Voucher: Granville 1452 (CAY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Tabernaemontana flavicans* Willd. *ex* Roem. & Schult.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21616)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Tabernaemontana heterophylla* Vahl**
Voucher: Krukoff, B.A. 7848 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia, Cerrado
***Tabernaemontana hystrix* Steud.**
Voucher: Gardner, G. 74 (BM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Tabernaemontana laeta* Mart.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34848 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Tabernaemontana lagenaria* Leeuwenb.**
Voucher: Daly, D.C. 7008 (WAG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Tabernaemontana linkii* A.DC.**
Voucher: Daly, D.C. 6947 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Tabernaemontana lorifera* (Miers) Leeuwenb.**
Voucher: Cavalcanti 799 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Tabernaemontana macrocalyx* Müll. Arg.**
Voucher: Daly, D.C. 7329 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, AM, AC); Amazônia
***Tabernaemontana markgrafiana* J.F.Macbr.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5179 (G, K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Tabernaemontana maxima* Markgr.**
Voucher: Ducke, A. 1302 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tabernaemontana muricata* Link *ex* Roem. & Schult.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 934 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Tabernaemontana palustris* Markgr.**
Voucher: Alencar 469 (NY, US, WAG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tabernaemontana rupicola* Benth.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3150 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia
***Tabernaemontana salzmannii* A.DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 68374 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES); Cerrado
***Tabernaemontana sananho* Ruiz & Pav.**
Voucher: Daly, D.C. 8328 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Tabernaemontana siphilitica* (L.f.) Leeuwenb.**
Voucher: Prance, G.T. 3986 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Tabernaemontana solanifolia* A.DC.**
Voucher: Mori, S.A. 11322 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tabernaemontana undulata* Vahl**
Voucher: Fróes, R.L. 25726 (MO, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Tabernaemontana vanheurckii* Müll. Arg.**
Voucher: Daly, D.C. 7182 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Tassadia Decne.

15 espécies (3 endêmicas)
***Tassadia aristata* (Benth. *ex* E.Fourn.) Fontella**
Voucher: Spruce, R. 2118 (A, BM, BR, F, G, K, NY, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Tassadia berteroana* (Spreng.) W.D.Stevens**
Voucher: Hatschbach, G. 19070 (BR, C, INPA, MG, SPF, UEC, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Tassadia burchellii* E.Fourn.**
Voucher: Prance, G.T. 19062 (G, INPA, MG, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Caatinga, Cerrado
***Tassadia capitata* W.D.Stevens**
Voucher: Silva, M.G. 3976 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Tassadia geniculata* Fontella**
Voucher: Phillcox, A. 3251 (K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Tassadia guianensis* Decne.**
Voucher: Krieger, L. 12794 (ESA, INPA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Tassadia leptobotrys* Decne.**
Voucher: Prance, G.T. 6642 (BM, K, LE, NY, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tassadia martiana* Decne.**
Voucher: Poeppig, E.F. 2846 (G, LE, W)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Tassadia medinae* (Morillo) Morillo**
Voucher: Baldwin, J.T. 3292 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tassadia milanezii* Fontella**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 713 (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Tassadia obovata* Decne.**
Voucher: Hatschbach, G. 58507 (C, G, HRB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Tassadia ovalifolia* (E.Fourn.) Fontella**
Voucher: Campbell, D.G. P22352 (INPA, K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Tassadia propinqua* Decne.**
Voucher: Hatschbach, G. 31714 (C, K, MBM, MO, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Tassadia rizzoana* Fontella**
Voucher: Rizzo, J.A. 9413 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Tassadia trailiana* (Benth.) Fontella**
Voucher: Harley, R.M. 11147 (K, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Temnadenia Miers

3 espécies (2 endêmicas)
***Temnadenia odorifera* (Vell.) J.F.Morales**
Voucher: Kirizawa, M. 2220 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Temnadenia ornata* (Hoehne) Woodson**
Voucher: Secco, R.S. 247 (MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Temnadenia violacea* (Vell.) Miers**
Voucher: Simões, A.O. 1322 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Thevetia L.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Thevetia amazonica* Ducke**
Voucher: Markgraf, F. 3849 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Thevetia bicornuta* Müll.Arg.**
Voucher: Hatschbach, G. 29551 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Domínio desconhecido

***Thevetia peruviana* (Pers.) K.Schum.**
Voucher: Thomas, W.W. 4559 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado

Widgrenia Malme
1 espécie (não endêmica)
***Widgrenia corymbosa* Malme**
Voucher: Widgren, J.F. 6814 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal

APODANTHACEAE
Milton Groppo
2 gêneros, 9 espécies (6 endêmicas)

Apodanthes Poit.
2 espécies (1 endêmica)
***Apodanthes caseariae* Poit.**
Referência: Vattimo, I. 1971. Rodriguésia 26(38): 37-62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Apodanthes minarum* Vattimo**
Voucher: Leoni, L.S. 6872 (SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Pilostyles Guill.
7 espécies (5 endêmicas)
***Pilostyles blanchetii* (Gardner) R.Br.**
Voucher: Magalhães, G.M. 2771 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pilostyles calliandrae* (Gardner) R.Br.**
Referência: Vattimo, I. 1971. Rodriguésia 26(38): 37-62.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Pilostyles caulotreti* (H.Karst.) Hook.f.**
Referência: Vattimo, I. 1971. Rodriguésia 26(38): 37-62.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pilostyles galactiae* Ule**
Referência: Vattimo, I. 1971. Rodriguésia 26(38): 37-62.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pilostyles goyazensis* Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 149 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Pilostyles stawiarskii* Vattimo**
Voucher: Borgo, M. s.n. (UPCB 40717)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Pilostyles ulei* Solms**
Voucher: Groppo, M. 632 (F, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (RS); Caatinga, Cerrado

AQUIFOLIACEAE
Milton Groppo
1 gênero, 63 espécies (47 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)

Ilex L.
63 espécies (47 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)
***Ilex affinis* Gardner**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12011 (CTES, K, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ilex angustissima* Reissek**
Voucher: Riedel, L. s.n. (RB 53581)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ilex asperula* Reissek**
Distribuição: nativa; endêmica
Ilex asperula* Reissek var. *asperula
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Ilex asperula* var. *pyrenea* Loes.**
Voucher: Riedel, L. 2838 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Ilex auricula* S.Andrews**
Voucher: Harley, R.M. 15536 (K, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Ilex biserrulata* Loes.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7576 (B (destruído))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ilex blanchetii* Loes.**
Voucher: Mori, S.A. 14073 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ilex brasiliensis* (Spreng.) Loes.**
Voucher: Campos s.n. (SPF 124941)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Ilex brevicuspis* Reissek**
Voucher: Matthes, L.A.F. 7978 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ilex buxifolia* Gardner**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15900 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ilex casiquiarensis* Loes.**
Voucher: Spruce, R. 3471 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ilex cerasifolia* Reissek**
Voucher: Campos, C.J. s.n. (SPF 124946)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Ilex chamaedryfolia* Reissek**
Voucher: Barbosa, E. 804 (MBM, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ilex cognata* Reissek**
Voucher: Luschnath, B. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ilex congesta* Reissek**
Voucher: Irwin, H.S. 32971 (MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Ilex congonhinha* Loes.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7575 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Ilex conocarpa* Reissek**
Voucher: Groppo, M. 1482 (ESA, G, SPF, SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ilex costata* Blume *ex* Miq.**
Voucher: Prance, G.T. 29026 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Ilex diospyroides* Reissek**
Voucher: Spruce, R. 3339 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ilex diuretica* Mart. *ex* Reissek**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Ilex divaricata* Mart. *ex* Reissek**
Voucher: Prance, G.T. 22753 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Ilex dumosa* Reissek**
Voucher: Duarte, A.P. 9205 (K, NY, SPFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ilex euryaeformis* Reissek**
Voucher: Sellow, F. 1081 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ilex floribunda* Reissek *ex* Maxim.**
Voucher: Eupulino 313 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Ilex friburgensis* Loes.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18191 (B (destruído), K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ilex glazioviana* Loes.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15091 (K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ilex grandis* Reissek**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9502 (B (destruído))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ilex integerrima* (Vell.) Reissek**
Voucher: Occhioni, P. 118 (RB, SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ilex inundata* Poepp. *ex* Reissek**
Voucher: Farney, C. 1993 (INPA, NY, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Ilex laureola* Triana**
Voucher: Schomburgk 555 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Ilex longipetiolata* Loes.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16748 (B (destruído))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ilex loranthoides* Mart. *ex* Reissek**
Voucher: Paula 545 (SP, SPFR, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Ilex lundii* Warm.**
Voucher: Groppo, M. 1478 (G, K, MBM, SPF, SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Ilex microdonta* Reissek**
Voucher: Barreto, R.A.A. 54 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ilex mucugensis* Groppo**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1454 (SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Ilex neblinensis* Edwin**
Voucher: Maguire, B. 60458 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ilex nigropunctata* Miers**
Referência: Miers 1861. Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 3, 8: 397.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Domínio desconhecido
***Ilex nummularia* Reissek**
Voucher: Groppo, M. 1080 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Ilex oligoneura* Loes.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 7489a (B (destruído))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Ilex organensis* Loes.**
Voucher: Gardner, G. 5697 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ilex paltorioides* Reissek**
Voucher: Sellow, F. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ilex paraguariensis* A.St.-Hil.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ilex paraguariensis* A.St.-Hil. var. *paraguariensis
Voucher: Groppo, M. 1335 (SPFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado
***Ilex paraguariensis* var. *sincorensis* Loes.**
Voucher: Ganev, W. 2284 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Ilex petiolaris* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 1141 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia
***Ilex phillyreaefolia* Reissek**
Voucher: Sello, F. s.n. (B (destruído), W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Ilex prostrata* Groppo**
Voucher: Groppo, M. 624 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ilex psammophila* Mart. *ex* Reissek**
Voucher: Harley, R.M. 22141 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Ilex pseudobuxus* Reissek**
Voucher: Machado, C.G. 22393 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ilex pseudotheezans* Loes.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20829 (B (destruído))
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado, Pantanal
***Ilex pseudovaccinium* Reissek *ex* Maxim.**
Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 7199 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Ilex rugulosa* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8545)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Ilex sapiiformis* Reissek**
Voucher: Gardner, G. 1145 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Ilex sapotifolia* Reissek**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16749 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Ilex schwackeana* Loes.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18192 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ilex scutiiformis* Reissek**
Voucher: Sello, F. 2038 (B (destruído))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Ilex spruceana* Reissek**
Voucher: Spruce, R. 3447 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ilex subcordata* Reissek**
Voucher: Hatschbach, G. 51030 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ilex suber* Loes.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20262a (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Ilex taubertiana* Loes.**
Voucher: Fiaschi, P. 522 (BHCB, CTES, F, G, HRCB, HUEFS, K, MBM, MO, NY, R, RB, SP, SPF, UB, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Ilex theezans* Mart. *ex* Reissek**
Voucher: Viani, R.A.G. 25 (FUEL, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Ilex trichothyrsa* Loes.**
Voucher: Irwin, H.S. 23484 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Ilex uleana* Loes.**
Voucher: Ule, E.H.G. 6082 (B (destruído))
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ilex velutina* Reissek**
Voucher: Harley, R.M. 15644 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Ilex virgata* Loes.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 883 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Ilex vismiifolia* Reissek**
Voucher: Daly, D.C. 10615 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia, Cerrado

ARACEAE

Marcus Alberto Nadruz Coelho, Maria de Lourdes Soares, Cássia Mônica Sakuragui, Simon Mayo, Ivanilza Moreira de Andrade, Lívia Godinho Temponi
35 gêneros, 458 espécies (286 endêmicas), 9 subespécies (3 endêmicas), 15 variedades (2 endêmicas)

Alloschemone Schott

Marcus Alberto Nadruz Coelho
2 espécies (1 endêmica)
***Alloschemone inopinata* Bogner & P.C.Boyce**
Voucher: Madison, M.T. 310 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Caatinga
***Alloschemone occidentalis* (Poepp.) Engl. & K.Krause**
Voucher: Sakuragui, C.M. 1050 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia, Caatinga

Anaphyllopsis A.Hay

Marcus Alberto Nadruz Coelho
2 espécies (1 endêmica)
***Anaphyllopsis americana* (Engl.) A.Hay**
Referência: Engler, H.G.A. 1878. Fl. bras. 3(2): 117-118.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Anaphyllopsis cururuana* A.Hay**
Voucher: Gonçalves, E.G. 1070 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Anthurium Schott

Marcus Alberto Nadruz Coelho
120 espécies (91 endêmicas), 5 subespécies (2 endêmicas), 6 variedades (1 endêmica)
***Anthurium acutum* N.E.Br.**
Voucher: Nadruz, M. 1556 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Anthurium aduncum* (Vell.) Schott**
Referência: Schott, H.G. 1860. Prodr. Syst. Aroid. 478.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium affine* Schott**
Voucher: Fraga, C.N. 2619 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Anthurium alcatrazense* Nadruz & Cath.**
Voucher: Catharino, E.L.M. 2009 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anthurium ameliae* Nadruz & Cath.**
Voucher: Nadruz, M. 1679 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anthurium asplundii* Croat**
Voucher: Croat, T.B. 62642 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Anthurium atropurpureum* R.E.Schult. & Maguire**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Anthurium atropurpureum* var. *arenicola* Croat**
Voucher: Croat, T.B. 62694 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AC); Amazônia
Anthurium atropurpureum* R.E.Schult. & Maguire var. *atropurpureum
Voucher: Soares, M.L. 567 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia
***Anthurium augustinum* K.Koch & Lauche**
Voucher: Duarte, A.P. 4147 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium bellum* Schott**
Voucher: Amorim, A.M. 2597 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE),
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Anthurium binotii* Linden**
Voucher: Nadruz, M. 1699 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium bocainense* Cath. & Nadruz**
Voucher: Nadruz, M. 1691 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anthurium bonplandii* Bunting**
Distribuição: nativa; não endêmica
Anthurium bonplandii* Bunting subsp. *bonplandii
Voucher: Anjos, O.S. 96 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Anthurium bonplandii* subsp. *guayanum* (G.S.Bunting) Croat**
Voucher: Prance, G.T. 10010 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Anthurium boudetii* Nadruz**
Voucher: Fernandes, H.B. 2962 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anthurium brachypodum* G.M.Barroso**
Voucher: Duarte, A.P. s.n. (RB 97752)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC);
Amazônia, Mata Atlântica
***Anthurium bragae* Nadruz**
Voucher: Nadruz, M. 1455 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium brevipedunculatum* Madison**
Voucher: Nadruz, M. 847 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Anthurium breviscapum* Kunth**
Voucher: Croat, T.B. 62557 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Anthurium bromelicola* Mayo & L.P.Felix**
Distribuição: nativa; endêmica
***Anthurium bromelicola* subsp. *bahiense* Mayo et al.**
Voucher: Jardim, J.G. 2234 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
Anthurium bromelicola* Mayo & L.P.Felix subsp. *bromelicola
Voucher: Félix, L.P. 10746 (UFPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Anthurium cataniapoense* Croat**
Voucher: Sampaio, A.J. 5158 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Anthurium clavigerum* Poepp.**
Voucher: Quinet, A. 966 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Anthurium cleistanthum* G.M.Barroso**
Voucher: Valadares, R. 148 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica
***Anthurium comtum* Schott**
Voucher: Nadruz, M. 1716 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Anthurium coriaceum* G.Don**
Voucher: Vianna-Filho, M.D.M. 470 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Anthurium croatii* Madison**
Voucher: Delprete, P.G. 8304 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (TO, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Anthurium cultrifolium* Schott**
Voucher: Valadares, R. 126 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anthurium curicuriariense* Croat**
Voucher: Madison, M.T. 1978 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Anthurium decurrens* Poepp.**
Voucher: Campbell, D.G. 8939 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Anthurium eichleri* Engl.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16506 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium eminens* Schott**
Voucher: Croat, T.B. 85352 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (PB, PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Anthurium ensifolium* Bogner & E.G.Gonç.**
Voucher: Bogner, J. 2450 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Anthurium ernestii* Engl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Anthurium ernestii* Engl. var. *ernestii
Voucher: Croat, T.B. 85333 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Anthurium erskinei* Mayo**
Voucher: Paula-Souza, J. 6299 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Anthurium expansum* Gleason**
Voucher: Prance, G.T. 21350 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Anthurium fontellanus* Nadruz & Leoni**
Voucher: Nadruz, M. 1574 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Anthurium fragae* Nadruz**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 7981 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anthurium galactospadix* Croat**
Voucher: Croat, T.B. 85481 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Anthurium galeottii* K.Koch**
Voucher: Vieira, C.M. 1153 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Anthurium gaudichaudianum* Kunth**
Voucher: Forzza, R.C. 4771 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Anthurium geitnerianum* Regel**
Voucher: Salimena-Pires, F.R. s.n. (RB 352941)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Anthurium gladiifolium* Schott**
Voucher: Jardim, J.G. 3135 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Anthurium gomesianum* Nadruz**
Voucher: Fontana, A.P. 646 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Anthurium gracile* (Rudge) Lindl.**
Voucher: Queiroz, L.P. 2567 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Anthurium harrisii* (Graham) G.Don**
Voucher: Nadruz, M. 1563 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium hoehnei* K.Krause**
Voucher: Nadruz, M. 1560 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anthurium ianthinopodum* (Schott *ex* Engl.) Nadruz & Mayo**
Voucher: Nadruz, M. 1535 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anthurium illepidum* Schott**
Voucher: Mello-Filho, L.E. s.n. (MO 361303)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Anthurium inconspicuum* N.E.Br.**
Voucher: Martinelli, G. 2498 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium intermedium* Kunth**
Voucher: Nadruz, M. 2057 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Anthurium itanhaense* Engl.**
Voucher: Nadruz, M. 1494 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anthurium jenmanii* Engl.**
Voucher: Martinelli, G. 14609 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, AM); Amazônia
***Anthurium jilekii* Schott**
Voucher: Borges, R.A.X. 480 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Anthurium jureianum* Cath. & Olaio**
Voucher: Nunes, J.V.C. 1503 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anthurium krukovii* Croat**
Voucher: Sousa, G.M. 427 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Anthurium kunthii* Poepp.**
Voucher: Croat, T.B. 85501 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado
***Anthurium lacerdae* Reitz**
Voucher: Reitz, R. s.n. (MO 2456073)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Anthurium* langsdorffii Schott**
Voucher: Nadruz, M. 1688 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Anthurium laucheanum* K.Koch**
Voucher: Vieira, C.M. 1032 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium leonii* E.G.Gonç.**
Voucher: Forzza, R.C. 4370 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Anthurium lhotzkyanum* Schott**
Voucher: Nadruz, M. 1717 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium lindmanianum* Engl.**
Voucher: Sobral, M. 10561 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Anthurium loefgrenii* Engl.**
Voucher: Nadruz, M. 1491 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Anthurium longicuspidatum* Engl.**
Voucher: Nadruz, M. 1558 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Anthurium longifolium* (Hoffmanns.) G.Don**
Voucher: Nadruz, M. 1502 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Mata Atlântica

***Anthurium longipes* N.E.Br.**
Voucher: Pereira, L.A. 1662 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Anthurium loretense* Croat**
Voucher: Bogner, J. s.n. (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Anthurium lucidum* Kunth**
Voucher: Imbassahy, C.A.A. s.n. (RB 427456)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium lucioi* Nadruz**
Voucher: Nadruz, M. 1496 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Anthurium luschnathianum* Kunth**
Voucher: Nadruz, M. 1642 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium marense* K.Krause**
Voucher: Mynssen, C.M. 1050 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Anthurium maricense* Nadruz & Mayo**
Voucher: Marquete, R. 4219 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium maximilianii* Schott**
Voucher: Paula-Souza, J. 5926 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Anthurium megapetiolatum* E.G.Gonç.**
Voucher: Nadruz, M. 1578 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Anthurium microphyllum* (Raf.) G.Don**
Voucher: Carauta, J.P.P. 3264 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium minarum* Sakur. & Mayo**
Voucher: Giacomin, L.L. 188 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Anthurium miquelianum* C.Koch & Augustin**
Voucher: Moraes, M.A. 121 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium montezumense* Sakur.**
Voucher: Sakuragui, C.M. 15111 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Anthurium morii* Mayo & Haigh**
Voucher: Mori, S.A. 12680 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Anthurium mourae* Engl.**
Voucher: Nadruz, M. 1478 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Anthurium navicularis* Cath. & Nadruz**
Voucher: Cordeiro, I. 660 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anthurium nitidulum* Engl.**
Voucher: Braga, J.M.A. 2263 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium obtusum* (Engl.) Grayum**
Voucher: Cunha, N.M.L. 936 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Anthurium organense* Engl.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4176 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Anthurium oxycarpum* Poepp.**
Voucher: Croat, T.B. s.n. (MO 1713012)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Anthurium paraguayense* Engl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Anthurium paraguayense* Engl. var. *paraguayense
Voucher: Zardini, E. 24384 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Anthurium parasiticum* (Vell.) Stellfeld**
Voucher: Nadruz, M. 1466 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Anthurium parvum* N.E.Br.**
Voucher: Nadruz, M. 1904 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Anthurium pentaphyllum* (Aubl.) G.Don**
Distribuição: nativa; não endêmica
Anthurium pentaphyllum* (Aubl.) G.Don var. *pentaphyllum
Voucher: Kollmann, L.J.C. 10647 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Anthurium petrophilum* K.Krause**
Voucher: Cardoso, D. 1494 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Anthurium pilonense* Reitz**
Voucher: Reitz, R. 2955 (HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Anthurium plowmanii* Croat**
Voucher: Nogueira, F.L. 10 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Anthurium polyschistum* R.E.Schult. & Idrobo**
Voucher: Croat, T.B. 62581 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Anthurium pranceanum* Croat**
Voucher: Rodrigues, W.A. 10718 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Anthurium ptarianum* Steyerm.**
Voucher: Boom, B.M. 1985 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Anthurium purpureum* N.E.Br.**
Voucher: Nadruz, M. 1310 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium radicans* K.Koch & Haage**
Voucher: Nadruz, M. 1528 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anthurium raimundii* Mayo et al.**
Voucher: Braga, J.M.A. 7306 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anthurium regnellianum* Engl.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 211 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Anthurium roraimense* N.E.Br. *ex* Oliv.**
Voucher: Tavares, A.S. (MO 2801280)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Anthurium sagittatum* Kunth**
Voucher: Croat, T.B. 62345 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Anthurium santaritensis* Nadruz & Croat**
Voucher: Leoni, L.S. 5245 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Anthurium scandens* (Aubl.) Engl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Anthurium scandens* (Aubl.) Engl. subsp. *scandens
Voucher: Pereira, L.A. 1883 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Anthurium sellowianum* Kunth**
Voucher: Arzola, F. 1183 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Anthurium simonii* Nadruz**
Voucher: Nadruz, M. 808 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium sinuatum* Benth. *ex* Schott**
Voucher: Delprete, P.G. 9051 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Anthurium solitarium* Schott**
Voucher: Nadruz, M. 1708 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Anthurium sucrii* G.M.Barroso**
Voucher: Nadruz, M. 599 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium talmonii* Mayo & Haigh**
Voucher: Harley, R.M. 54063 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Anthurium thrinax* Madison**
Voucher: Pereira, L.A. 608 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Anthurium tomasiae* Cath. & Nadruz**
Voucher: Catharino, E.L.M. 2790 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anthurium trinervium* Kunth**
Voucher: Pereira, L.A. 895 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado
***Anthurium uleanum* Engl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Anthurium uleanum* Engl. var. *uleanum
Voucher: Croat, T.B. s.n. (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Anthurium undatum* Schott**
Voucher: Matos, F.B. 1205 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Anthurium unense* Cath. & Nadruz**
Voucher: Burle Marx, R. s.n. (RB 157145)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anthurium urvilleanum* Schott**
Voucher: Bovini, M.G. 2753 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Anthurium validinervium* Engl.**
Voucher: Braga, J.M.A. 1815 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Anthurium victorii* Nadruz & Cath.**
Voucher: Nadruz, M. 1557 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Anthurium viridispathum* E.G.Gonç.**
Voucher: Gonçalves, E.G. 587 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anthurium vittariifolium* Engl.**
Voucher: Daly, D.C. 9335 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Anthurium xanthophylloides* G.M.Barroso**
Voucher: Nadruz, M. 2292 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Anthurium zappiae* Haigh et al.**
Voucher: Inácio, M. 10 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Asterostigma Fisch. & C.A.Mey.

Marcus Alberto Nadruz Coelho
10 espécies (10 endêmicas)
***Asterostigma columbrinum* Schott**
Voucher: Gonçalves, E.G. 598 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Asterostigma concinnum* Schott**
Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (MO 2815759)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Asterostigma cryptostylum* Bogner**
Voucher: Mello-Silva, R. 1810 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Asterostigma cubense* (A.Rich.) K.Krause *ex* Bogner**
Voucher: Gonçalves, E.G. 474 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Asterostigma lividum* (Lodd.) Engl.**
Voucher: Nadruz, M. 1114 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Asterostigma lombardii* E.G.Gonç.**
Voucher: Lombardi, J.A. 658 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Asterostigma luschnathianum* Schott**
Voucher: Gonçalves, E.G. 696 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Asterostigma reticulatum* E.G.Gonç.**
Voucher: Gonçalves, E.G. 630 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Asterostigma riedelianum* (Schott) Kuntze**
Voucher: Gonçalves, E.G. 438 (CEPEC, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Asterostigma tweedianum* Schott**
Voucher: Gonçalves, E.G. 316 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Bognera Mayo & Nicolson

Marcus Alberto Nadruz Coelho
1 espécie (1 endêmica)
***Bognera recondita* (Madison) Mayo & Nicolson**
Voucher: Gonçalves, E.G. 849 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Caladium Vent.

Marcus Alberto Nadruz Coelho
7 espécies (1 endêmica)
***Caladium bicolor* (Aiton) Vent.**
Voucher: Pereira, L.A. 1775 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Caladium humboldtii* (Raf.) Schott**
Referência: Schott, H.W. 1854. Oesterr. Bot. Wochenbl. 4: 417.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Caladium macrotites* Schott**
Voucher: Prance, G.T. 15987 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Caladium picturatum* K.Koch & C.D.Bouché**
Voucher: Balée, W.L. 909 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Caladium schomburgkii* Schott**
Referência: Schott, H.W. 1858. Oesterr. Bot. Wochenbl. 8: 122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Caladium ternatum* Madison**
Voucher: Stevenson, D.W. 1053 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Caladium tuberosum* (S.Moore) Bogner & Mayo**
Voucher: Harley, R.M. 10477 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Dieffenbachia Schott

Marcus Alberto Nadruz Coelho
23 espécies (9 endêmicas)
***Dieffenbachia acreana* Croat**
Voucher: Croat, T.B. 62675 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Dieffenbachia aglaonematifolia* Engl.**
Voucher: Lombardi, J.A. 6516 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Dieffenbachia alexiadesii* Croat**
Voucher: Krukoff, B.A. 7672 (GH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dieffenbachia amapaensis* Croat**
Voucher: Westra, L.Y.Th. s.n. (MO 354870)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Dieffenbachia bowmannii* Carrière**
Voucher: Hatschbach, G. 59257 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (PR); Domínio desconhecido
***Dieffenbachia cannifolia* Engl.**
Voucher: Croat, T.B. 85533 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Dieffenbachia costata* Klotzsch**
Voucher: Milliken, W. 1716a (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Dieffenbachia duidae* (Steyerm.) G.S.Bunting**
Voucher: Madison, M.T. s.n. (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dieffenbachia elegans* A.M.E.Jonker & Jonker**
Voucher: Drucker, D.P. 24 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (RS); Amazônia
***Dieffenbachia goncalvesii* Croat**
Voucher: Gonçalves, E.G. 164 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Dieffenbachia gracilis* Huber**
Referência: Huber, J. 1906. Bol. Mus. Goeldi Hist. Nat. Ethnogr. 4: 540.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Dieffenbachia humilis* Poepp.**
Voucher: Daly, D.C. 11107 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (MA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Dieffenbachia juruaensis* Croat**
Voucher: Daly, D.C. 8707 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Dieffenbachia krukoffii* Croat**
Voucher: Krukoff, B.A. s.n. (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dieffenbachia maranhaoana* Croat**
Voucher: Daly, D.C. 307 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Dieffenbachia millikenii* Croat**
Voucher: Milliken, W. 1716a (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dieffenbachia paludicola* N.E.Br. *ex* Gleason**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1928 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dieffenbachia parviflora* Schott**
Voucher: Souza, M.A.D. 693 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dieffenbachia parvifolia* Engl.**
Voucher: Croat, T.B. 85895 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Dieffenbachia seguine* (Jacq.) Schott**
Voucher: Bove, C.P. 615 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dieffenbachia smithii* Croat**
Voucher: Croat, T.B. s.n. (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Dieffenbachia tefensis* Croat**
Voucher: Soares, M.L. s.n. (INPA 218216)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Dieffenbachia westrae
Voucher: Rodrigues, W.A. 5137 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

Dracontioides Engl.

Marcus Alberto Nadruz Coelho
2 espécies (2 endêmicas)
***Dracontioides desciscens* (Schott) Engl.**
Voucher: Nadruz, M. 1608 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Dracontioides salvianii* E.G.Gonç.**
Referência: Gonçalves, E.G. 2005. Aroideana 28: 28.
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

Dracontium L.

Marcus Alberto Nadruz Coelho
11 espécies (4 endêmicas)
***Dracontium amazonense* G.H.Zhu & Croat**
Voucher: Plowman, T. 12510 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Dracontium asperum* K.Koch**
Voucher: Milliken, W. 1717 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM), Nordeste; Amazônia
***Dracontium bogneri* G.H.Zhu**
Voucher: Bogner, J. 2097 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dracontium longipes* Engl.**
Voucher: Quinet, A. 953 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dracontium margaretae* Bogner**
Voucher: Lolis, S.L. 249 (HUEM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Dracontium nivosum* (Lem.) G.H.Zhu**
Voucher: Balée, W.L. 3476 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia
***Dracontium peruvianum* G.H.Zhu & Croat**
Voucher: Krukoff, B.A. 4987 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dracontium polyphyllum* L.**
Voucher: Andrade, I.M. 635 (UFC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Dracontium prancei* G.H.Zhu & Croat**
Voucher: Prance, G.T. 28732 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Dracontium spruceanum* (Schott) G.H.Zhu**
Voucher: Kinupp, V.F. 1756 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Dracontium ulei* K.Krause**
Voucher: Croat, T.B. 85992 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado

Gearum N.E.Br.

Marcus Alberto Nadruz Coelho
1 espécie (1 endêmica)
***Gearum brasiliense* N.E.Br.**
Voucher: Gonçalves, E.G. 672 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Heteropsis Kunth

Maria de Lourdes Soares, Simon Mayo
14 espécies (4 endêmicas)
***Heteropsis croatii* M.L.Soares**
Voucher: Croat, T.B. 62424 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Heteropsis duckeana* M.L.Soares**
Voucher: Soares, M.L. 503 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Heteropsis flexuosa* (Kunth) G.S.Bunting**
Voucher: Humboldt, F.H.A. 978 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Heteropsis linearis* A.C.Sm.**
Voucher: Mota, C.D.A. s.n. (INPA 61600)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Heteropsis longispathacea* Engl.**
Voucher: Huber, J.E. s.n. (INPA 11206)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Heteropsis macrophylla* A.C.Sm.**
Voucher: Soares, M.L.A. 674 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Heteropsis oblongifolia* Kunth**
Voucher: Farney, C. 521 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Heteropsis peruviana* K.Krause**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4986 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AC, RO); Amazônia
***Heteropsis rigidifolia* Engl.**
Voucher: Nadruz, M. 1583 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Heteropsis robusta* (Bunting) M.L.Soares**
Voucher: Francisco-Guanchez 61 (MYF)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste; Amazônia
***Heteropsis salicifolia* Kunth**
Voucher: Nadruz, M. 1704 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Heteropsis spruceana* Schott**
Voucher: Soares, M.L.A. 506 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Heteropsis steyermarkii* G.S.Bunting**
Voucher: Steyermark, J.A. 102607 (VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Heteropsis tenuispadix* G.S.Bunting**
Voucher: Berry, P.E. 2189 (VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

Homalomena Schott

Marcus Alberto Nadruz Coelho
4 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Homalomena crinipes* Engl.**
Voucher: Daly, D.C. s.n. (MO 1319988)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Homalomena erythropus* (Mart. *ex* Schott) Engl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Homalomena erythropus* (Mart. *ex* Schott) Engl. subsp. *erythropus
Voucher: Mojica, J. 1103 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Homalomena picturata* (Linden & André) Regel**
Voucher: Croat, T.B. 85463 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Homalomena wendlandii* Schott**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Homalomena wendlandii* subsp. *crinipes* (Engl.) Croat**
Voucher: Croat, T.B. 85114 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Landoltia Les & D.J.Crawford

Marcus Alberto Nadruz Coelho
1 espécie (não endêmica)
***Landoltia punctata* (G.Mey.) Les & D.J.Crawford**
Voucher: Pott, V.J. 59466 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica

Lemna L.

Marcus Alberto Nadruz Coelho
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Lemna aequinoctialis* Welw.**
Voucher: Nadruz, M. 1655 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Lemna minor* L.**
Voucher: Cavalcante, N.B. 14 (HVASF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Lemna minuta* Kunth**
Voucher: Cervi, A.C. 8692 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Lemna valdiviana* Phil.**
Voucher: Nadruz, M. 1655 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Mangonia Schott

Marcus Alberto Nadruz Coelho
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Mangonia tweediana* Schott**
Voucher: Gonçalves, E.G. 611 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mangonia uruguaya* (Hicken) Bogner**
Referência: Bogner, J. 1973. Darwiniana 18: 70.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica

Monstera Adans.

Ivanilza Moreira de Andrade, Simon Mayo
9 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Monstera adansonii* Schott**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Monstera adansonii* var. *klotzschiana* (Schott) Madison**
Voucher: Hatschbach, G. 48740 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Monstera adansonii* var. *laniata* (Schott) Madison**
Voucher: Pires, J.M. 52495 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Monstera aureopinnata* Croat**
Voucher: Krukoff, B.A. 4752 (A)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Amazônia
***Monstera dissecta* (Schott) Croat & Grayum**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2855 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); N
orte (AM, TO, AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Monstera dubia* (Kunth) Engl. & K.Krause**
Voucher: Prance, G.T. 12502 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AC, RO); Amazônia
***Monstera lechleriana* Schott**
Voucher: Croat, T.B. 85315 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC);
Amazônia
***Monstera obliqua* Miq.**
Voucher: Quinet, A. 985 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT);
Amazônia, Mata Atlântica
***Monstera praetermissa* E.G.Gonç. & Temponi**
Voucher: Thomas, W.W. 10179 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Monstera spruceana* (Schott) Engl.**
Voucher: Spruce, R. 2293 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Monstera subpinnata* (Schott) Engl.**
Voucher: Sperling, C.R. 6196 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AC); Amazônia

Montrichardia Crueg.

Marcus Alberto Nadruz Coelho
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Montrichardia arborescens* (L.) Schott**
Voucher: Soares, M.L. 673 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (RN, PB), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Montrichardia linifera* (Arruda) Schott**
Voucher: Junior, J.E.N. 247 (ASE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Philodendron Schott

Cássia Mônica Sakuragui, Maria de Lourdes Soares
156 espécies (127 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)
***Philodendron acreanum* K.Krause**
Voucher: Ule, E.H.G. 9213 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Philodendron acutatum* Schott**
Voucher: Nadruz, M. 889 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Philodendron adamantinum* Mart. *ex* Schott**
Voucher: Hatschbach, G. 50912 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica
***Philodendron aemulum* Schott**
Voucher: Carvalho, A.M. 3369 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica
***Philodendron alternans* Schott**
Voucher: Nadruz, M. 184 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Philodendron altomacaense* Nadruz & Mayo**
Voucher: Nadruz, M. 779 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Philodendron angustialatum* Engl.**
Voucher: Croat, T.B. 62596 (CUVC, HUA, MO, UB, USZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Philodendron angustisectum* Engl.**
Voucher: Krieger, L. 18973 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AC),
Centro-Oeste; Amazônia
***Philodendron appendiculatum* Nadruz & Mayo**
Voucher: Sakuragui, C.M. 1640 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Philodendron applanatum* G.M.Barroso**
Voucher: Duarte, A.P. s.n. (RB 100249)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Philodendron asplundii* Croat & M.L.Soares**
Voucher: Soares, M.L. 251 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Philodendron bahiense* Engl.**
Voucher: Maly, J.K. 743 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Philodendron barrosoanum* G.S.Bunting**
Voucher: Nadruz, M. 974 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Philodendron bertae* K.Krause**
Voucher: Ule, E.H.G. 9218 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Philodendron billietiae* Croat**
Voucher: Nadruz, M. 1249 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Philodendron bipennifolium* Schott**
Voucher: Lima, H.C. 4638 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE),
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Philodendron bipinnatifidum* Schott**
Voucher: Souza s.n. (RB 430740)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Philodendron biribiriense* Sakur. & Mayo**
Voucher: Sakuragui, C.M. 288 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Philodendron blanchetianum* Schott**
Voucher: Martinelli, G. 14826 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Philodendron brandtianum* K.Krause**
Voucher: Soares, M.L. 226 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado
***Philodendron brasiliense* Engl.**
Voucher: Hatschbach, G. 51658 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica
***Philodendron brevispathum* Schott**
Voucher: Pereira, E. 169 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado
***Philodendron burle-marxii* G.M.Barroso**
Voucher: Barroso, G.M. s.n. (RB 116807)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Philodendron callosum* K.Krause**
Distribuição: nativa; não endêmica
Philodendron callosum* K.Krause subsp. *callosum
Voucher: Nadruz, M. 920 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM);
Amazônia
***Philodendron callosum* subsp. *ptarianum* (Steyerm.) G.S.Bunting**
Voucher: Prance, G.T. 10004 (INPA, M, MG, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Philodendron campii* Croat**
Voucher: Heras, E. 16997 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Philodendron camposportoanum* G.M.Barroso**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2817 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Philodendron cardosoi* E.G.Gonç.**
Referência: Gonçalves, E.G. 2004. Willdenowia 34: 525.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Philodendron carinatum* E.G.Gonç.**
Voucher: Gonçalves, E.G. 508 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Philodendron cataniapoense* G.S.Bunting**
Voucher: Nadruz, M. 919 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Philodendron cipoense* Sakur. & Mayo**
Voucher: Martinelli, G. 6309 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Philodendron colombianum* R.E.Schult.**
Voucher: Plowman, T. 12205 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Philodendron corcovadense* Kunth**
Voucher: Nadruz, M. 873 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica
***Philodendron cordatum* Kunth *ex* Schott**
Voucher: Sakuragui, C.M. 536 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Philodendron crassinervium* Lindl.**
Voucher: Nadruz, M. 462 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Philodendron crassum* Rendle**
Referência: Rendle, A.B. 1901. J. Bot. 39: 277.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Philodendron cuneatum* Engl.**
Voucher: César, E.A. 130 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Philodendron curvilobum* Schott**
Voucher: Nadruz, M. 1177 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Philodendron dardanianum* Mayo**
Voucher: Filgueiras, T.S. 1278 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Philodendron deflexum* Poepp. *ex* Schott**
Voucher: Daly, D.C. 8946 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Philodendron deltoideum* Poepp.**
Voucher: Plowman, T. 11640 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Philodendron distantilobum* K.Krause**
Voucher: Boom, B.M. 8762 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia
***Philodendron divaricatum* K.Krause**
Voucher: Milliken, W. 2071 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Philodendron duckei* Croat & Grayum**
Voucher: Ducke, A. 11471 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Philodendron dunstervilleorum* G.S.Bunting**
Voucher: Prance, G.T. 10897 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Philodendron dyscarpium* R.E.Schult.**
Voucher: Milliken, W. 246 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Philodendron ecordatum* Schott**
Voucher: Prance, G.T. 1703 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Philodendron edmundoi* G.M.Barroso**
Voucher: Pereira, E. s.n. (RB 97070)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Philodendron elaphoglossoides* Schott**
Voucher: Plowman, T. 12682 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Philodendron ernestii* Engl.**
Voucher: Croat, T.B. 85052 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Philodendron eximium* Schott**
Voucher: Sakuragui, C.M. 584 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Philodendron fibrillosum* Poepp.**
Voucher: Croat, T.B. 85321 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Philodendron flumineum* E.G.Gonç.**
Voucher: Forzza, R.C. 2474 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Philodendron fragile* Nadruz & Mayo**
Voucher: Nadruz, M. 1076 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Philodendron fragrantissimum* (Hook.) G.Don**
Voucher: Hutchison, P.C. 8703 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Philodendron glaziovii* Hook.f.**
Voucher: Sucre, D. 10722 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Philodendron goeldii* G.M.Barroso**
Voucher: Soares, M.L. 224 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Philodendron grazielae* G.S.Bunting**
Voucher: Daly, D.C. 10480 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Philodendron guianense* Croat & Grayum**
Voucher: Irwin, H.S. 48137 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Philodendron guttiferum* Kunth**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1592 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Philodendron hastatum* K.Koch & Sello**
Voucher: Sakuragui, C. 1639 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Philodendron hatschbachii* Nadruz & Mayo**
Voucher: Nadruz, M. 773 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Philodendron hederaceum* (Jacq.) Schott**
Distribuição: nativa; não endêmica
Philodendron hederaceum* (Jacq.) Schott var. *hederaceum
Voucher: Nadruz, M. 1648 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Philodendron herthae* K.Krause**
Voucher: Prance, G.T. 10312 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Philodendron heterophyllum* Poepp.**
Voucher: Croat, T.B. 85840 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Philodendron hopkinsianum* M.L.Soares & Mayo**
Voucher: Soares, M.L. 260 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (RR, AP, AM); Amazônia
***Philodendron humile* E.G.Gonç.**
Voucher: Gonçalves, E.G. 1007 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste; Amazônia
***Philodendron hylaeae* G.S.Bunting**
Voucher: Soares, M.L. 274 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Philodendron imbe* Schott *ex* Endl.**
Referência: Sakuragui et al. 2005. Taxonomic Revision of Brazilian species of Philodendron sect. Macrobelium 60: 465-513.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Philodendron inaequilaterum* Liebm.**
Voucher: Mayo, S.J. 808 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Philodendron inops* Schott**
Voucher: Martinelli, G. 15836 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica
***Philodendron insigne* Schott**
Voucher: Nadruz, M. 1244 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado
***Philodendron karstenianum* Schott**
Voucher: Pereira, L.A. 604 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Philodendron kautskyi* G.S.Bunting**
Voucher: Burle Marx, R. s.n. (RB 184535)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica
***Philodendron leal-costae* Mayo & G.M.Barroso**
Voucher: Harley, R.M. 19428 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Philodendron lechlerianum* Schott**
Voucher: Prance, G.T. 7946 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Philodendron leucanthum* K.Krause**
Voucher: Prance, G.T. 7902 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Philodendron linguifolium* Schott**
Voucher: Belém, R.P. 196 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Philodendron linnaei* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
Philodendron linnaei* Kunth var. *linnaei
Voucher: Pereira, L.A. 414 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT);
Amazônia, Cerrado
***Philodendron loefgrenii* Engl.**
Voucher: Hatschbach, G. 30871 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Philodendron longilaminatum* Schott**
Voucher: Martinelli, G. 8968 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Philodendron longistilum* K.Krause**
Voucher: Croat, T.B. 62297 (INPA, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Philodendron lundii* Warm.**
Voucher: Queiroz, L.P. 5980 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Philodendron macropodum* K.Krause**
Voucher: Rosa, N.A. 1716 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Philodendron maculatum* K.Krause**
Voucher: Ule, E.H.G. 9004 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Philodendron martianum* Engl.**
Voucher: Nadruz, M. 807 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,
Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Philodendron maximum* K.Krause**
Voucher: Croat, T.B. 86093 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Philodendron* mayoi E.G.Gonç.**
Voucher: Nadruz, M. 1271 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Philodendron megalophyllum* Schott**
Voucher: Martinelli, G. 7260 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Philodendron melinonii* Brongn. *ex* Regel**
Voucher: Soares, M.L. 208 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Philodendron micranthum* Poepp. *ex* Schott**
Voucher: Schott 2597 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron millerianum* Nadruz & Sakur.**
Voucher: Nadruz, M. 1077 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Philodendron minarum* Engl.**
Voucher: Forzza, R.C. 3690 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG); Cerrado
***Philodendron missionum* (Hauman) Hauman**
Voucher: Cervi, A.C. 2540 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Philodendron muricatum* Willd. *ex* Schott**
Voucher: Plowman, T. 12428 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Philodendron myrmecophilum* Engl.**
Voucher: Nadruz, M. 1020 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Philodendron nullinervium* E.G.Gonç.**
Voucher: Gonçalves, E.G. 850 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Philodendron obliquifolium* Engl.**
Voucher: Reitz, R. 5736 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Philodendron oblongum* (Vell.) Kunth**
Referência: Kunth, C. 1841. Enum. Pl. [Kunth] 3: 41.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Philodendron ochrostemon* Schott**
Voucher: Nadruz, M. 740 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA,
BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC,
RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Philodendron ornatum* Schott**
Voucher: Soares, M.L. 200 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO),
Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia,
Caatinga, Mata Atlântica
***Philodendron pachyphyllum* K.Krause**
Voucher: Bautista, H.P. 1349 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Philodendron paludicola* E.G.Gonç. & Salviani**
Voucher: Sucre, D. 5613 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Philodendron panduriforme* (Kunth) Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Philodendron panduriforme* (Kunth) Kunth var.
*panduriforme***
Voucher: Croat, T.B. 85349 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Philodendron paucinervium* Croat**
Voucher: Croat, T.B. 19426 (F, IBE, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Philodendron paxianum* K.Krause**
Voucher: Prance, G.T. 23921 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Philodendron pedatum* (Hook.) Kunth**
Voucher: Soares, M.L. 288 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste
(ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Philodendron phlebodes* G.S.Bunting**
Distribuição: nativa; não endêmica
Philodendron phlebodes* G.S.Bunting var. *phlebodes
Voucher: Plowman, T. 12118 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Philodendron pinnatifidum* (Willd.) Schott**
Voucher: Hutchison, P.C. 8678 (MO, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (AM, RO); Amazônia, Cerrado
***Philodendron pinnatilobum* Engl.**
Voucher: Nee, M. 34416 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Philodendron placidum* Schott**
Voucher: Pereira, L.A. 152 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Philodendron platypodum* Gleason**
Voucher: Plowman, T. 12253 (INPA, MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Philodendron propinquum* Schott**
Voucher: Nadruz, M. 1075 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES,
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Philodendron pteropus* Mart. *ex* Engl.**
Voucher: Poeppig, E.F. 1948 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Philodendron pulchellum* Engl.**
Voucher: Pereira, L.A. 907 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC);
Amazônia
***Philodendron pulchrum* G.M.Barroso**
Voucher: Nadruz, M. 1234 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia
***Philodendron quinquelobum* K.Krause**
Voucher: Soares, M.L. 230 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia
***Philodendron recurvifolium* Schott**
Voucher: Mayo, S.J. 877 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica
***Philodendron renauxii* Reitz**
Voucher: Mayo, S.J. 579 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Philodendron revillanum* Croat**
Voucher: Croat, T.B. 62328 (MO, R, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Philodendron rhizomatosum* Sakur. & Mayo**
Voucher: Sakuragui, C.M. 588 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica
***Philodendron roraimae* K.Krause**
Distribuição: nativa; não endêmica
Philodendron roraimae* K.Krause var. *roraimae
Voucher: Ule, E.H.G. 8487 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Philodendron roseocataphyllum* Croat & M.M.Mora**
Voucher: Croat, T.B. 62325 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Philodendron roseopetiolatum* Nadruz & Mayo**
Voucher: Nadruz, M. 1019 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Philodendron rotundatum* Engl.**
Voucher: Nadruz, M. 1350 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Philodendron rudgeanum* Schott**
Voucher: Folli, D.A. 2939 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Philodendron saxicola* K.Krause**
Voucher: Mayo, S.J. 853 (CM, F, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado
***Philodendron simonianum* Sakur.**
Voucher: Sakuragui, C.M. 629 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Philodendron solimoesense* A.C.Sm.**
Voucher: Nadruz, M. 923 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Philodendron sonderianum* Schott**
Voucher: Sakuragui, C.M. 881 (HUEM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Philodendron speciosum* Schott *ex* Endl.**
Voucher: Duarte, A.P. 4129 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Philodendron sphalerum* Schott**
Voucher: Soares, M.L. 229 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Philodendron spiritus-sancti* G.S.Bunting**
Voucher: Sucre, D. 10749 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Philodendron splitgerberi* Schott**
Voucher: Pereira, L.A. 139 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, AM); Amazônia
***Philodendron squamiferum* Poepp.**
Voucher: Croat, T.B. 71914 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Philodendron stenolobum* E.G.Gonç.**
Voucher: Nadruz, M. 1606 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Philodendron steyermarkii* G.S.Bunting**
Voucher: Croat, T.B. 10628 (INPA, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Philodendron surinamense* (Miq.) Engl.**
Voucher: Mayo 836 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Philodendron tenuispadix* E.G.Gonç.**
Voucher: Martinelli, G. 11610 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica
***Philodendron tortum* M.L.Soares & Mayo**
Voucher: Cavalcante, P. 632 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Philodendron toshibai* M.L.Soares & Mayo**
Voucher: Soares, M.L. 226 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Philodendron traunii* Engl.**
Referência: Engler, H.G.A. 1905. Bot. Jahrb. Syst. 37: 127.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Philodendron tripartitum* (Jacq.) Schott**
Voucher: Hutchison, P.C. 8677 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Philodendron tweedieanum* Schott**
Voucher: Hatschbach, G. 51658 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Centro-Oeste (MS); Cerrado, Mata Atlântica
***Philodendron uleanum* Engl.**
Voucher: Pereira, E. 1809 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO);
Amazônia, Cerrado
***Philodendron uliginosum* Mayo**
Voucher: Hatschbach, G. 35350 (K, MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Philodendron undulatum* Engl.**
Voucher: Mayo, S.J. 703 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Philodendron vargealtense* Sakur.**
Voucher: Breier, T.B. 1093 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP);
Mata Atlântica
***Philodendron venezuelense* G.S.Bunting**
Voucher: Soares, M.L. 513 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Philodendron venustifoliatum* E.G.Gonç. & Mayo**
Voucher: Carniello, M.A., 44 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Philodendron venustum* G.S.Bunting**
Referência: Govaerts, R. & Frodin, D.G. 2002.
World Checkl. & Bibliogr. Araceae 405.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Philodendron wadedavisii* Croat**
Referência: Croat, T.B. 2006. Willdenowia 36: 893.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Philodendron williamsii* Hook.f.**
Voucher: Mayo, S.J. 771 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA);
Amazônia, Mata Atlântica
***Philodendron wittianum* Engl.**
Voucher: Barroso, G.M. 1959 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Philodendron wullschlaegelii* Schott**
Voucher: Andrade, I.M. 1582 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado
***Philodendron wurdackii* G.S.Bunting**
Voucher: Croat, T.B. 85167 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron xanadu* Croat et al.**
Voucher: Croat, T.B. 81537 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste; Domínio desconhecido

Pistia L.

Marcus Alberto Nadruz Coelho
1 espécie (não endêmica)
***Pistia stratiotes* L.**
Voucher: Neto, P.C.G. 1729 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Rhodospatha Poepp.

Lívia Godinho Temponi
5 espécies (4 endêmicas)
***Rhodospatha latifolia* Poepp.**
Voucher: Croat, T.B. 62619 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhodospatha moritziana* Schott**
Voucher: Croat, T.B. 85174 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Rhodospatha oblongata* Poepp.**
Voucher: Prance, G.T. 7601 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Rhodospatha rubropunctata* Croat**
Voucher: Daly, D.C. 8765 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Rhodospatha venosa* Gleason**
Voucher: Kinupp, V.F. 1538 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Scaphispatha Brongn. ex Schott

Marcus Alberto Nadruz Coelho
2 espécies (1 endêmica)
***Scaphispatha gracilis* Brongn. *ex* Schott**
Voucher: Andrade, I.M. 622 (EAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Scaphispatha robusta* E.G.Gonç.**
Voucher: Gonçalves, E.G. 685 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Schismatoglottis Zoll. & Moritzi

Marcus Alberto Nadruz Coelho
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Schismatoglottis americana* Jonker & Jonker**
Voucher: Nee, M. 43006 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schismatoglottis spruceana* (Schott) G.S.Bunting**
Voucher: Soares, M.L. 202 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Spathicarpa Hook.

Marcus Alberto Nadruz Coelho
4 espécies (2 endêmicas)
***Spathicarpa gardneri* Schott**
Voucher: Souza, V.C. 28798 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Spathicarpa hastifolia* Hook.**
Voucher: Janunzzi, A.M. 49 (UEM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Spathicarpa lanceolata* Engl.**
Voucher: Gonçalves, E.G. 633 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Spathicarpa sagittifolia* Schott**
Voucher: Melo, E. 6225 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PI, CE, BA), Sul (PR); Mata Atlântica

Spathiphyllum Schott

Marcus Alberto Nadruz Coelho
10 espécies (2 endêmicas)
***Spathiphyllum cannifolium* (Dryand. *ex* Sims) Schott**
Voucher: Prance, G.T. s.n. (MO 348376)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia
***Spathiphyllum cuspidatum* Schott**
Voucher: Prance, G.T. 9395 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR), Centro-Oeste (GO); Amazônia
***Spathiphyllum gardneri* Schott**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 2874 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Spathiphyllum grazielae* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1968. Fl. Brazil. Forests : t. 31.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Spathiphyllum humboldtii* Schott**
Voucher: Cesarino, F. 149 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Spathiphyllum juninense* K.Krause**
Voucher: Daly, D.C. 8956 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal
***Spathiphyllum maguirei* G.S.Bunting**
Voucher: Feitosa, M.C.B. 2 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Spathiphyllum neblinae* G.S.Bunting**
Voucher: Carvalho, F.A. 198 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Spathiphyllum schomburgkii* Schott**
Voucher: Prance, G.T. 10467 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Spathiphyllum tenerum* Engl.**
Voucher: Almeida, S. 579 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Spirodela Schleid.
Marcus Alberto Nadruz Coelho
1 espécie (não endêmica)
***Spirodela intermedia* W.Koch**
Voucher: Neto, J.R.L. s.n. (UFC 31352)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

Stenospermation Schott
Marcus Alberto Nadruz Coelho
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Stenospermation amomifolium* (Poepp.) Schott**
Voucher: Amorim, A.M. s.n. (MO 3288334)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Stenospermation multiovulatum* (Engl.) N.E.Br.**
Voucher: Verveloet, R.R. 2251 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Stenospermation spruceanum* Schott**
Voucher: Giulietti, A.M. 3506 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Stenospermation ulei* K.Krause**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 1938 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Syngonium Schott
Marcus Alberto Nadruz Coelho
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Syngonium angustatum* Schott**
Voucher: Rodrigues, W.A. 1177 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Syngonium atrovirens* G.S.Bunting**
Voucher: Pardo, M. 154 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Syngonium hastifolium* Engl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 6010 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Syngonium vellozianum* Schott**
Voucher: Nadruz, M. 1584 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Syngonium yurimaguense* Engl.**
Voucher: Croat, T.B. 85074 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia

Taccarum Brongn. *ex* Schott
Marcus Alberto Nadruz Coelho
6 espécies (3 endêmicas)
***Taccarum caudatum* Rusby**
Voucher: Nelson, B.W. 751 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Taccarum crassispathum* E.G.Gonç.**
Voucher: Forzza, R.C. 2544 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Taccarum peregrinum* (Schott) Engl.**
Voucher: Costa, R.C. 358 (EAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, PE), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Taccarum ulei* Engl. & K.Krause**
Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 1865 (HVASF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Taccarum warmingii* Engl.**
Voucher: Nadruz, M. 1275 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Taccarum weddellianum* Brongn. *ex* Schott**
Voucher: Hatschbach, G. 65517 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

Ulearum Engl.
Marcus Alberto Nadruz Coelho
1 espécie (não endêmica), 2 variedades (1 endêmica)
***Ulearum sagittatum* Engl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Ulearum sagittatum* Engl. var. *sagittatum
Voucher: Jangoux, J. 85058 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Ulearum sagittatum* var. *viridispadix* Bogner**
Voucher: Bogner, J. 1947 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Urospatha Schott
Marcus Alberto Nadruz Coelho
7 espécies (5 endêmicas)
***Urospatha angustiloba* Engl.**
Voucher: Cytyn, R. 18 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Urospatha caudata* (Poepp.) Schott**
Voucher: Pires, J.M. 16152 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Urospatha edwallii* Engl.**
Voucher: Proença, C.E. 1739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado
***Urospatha loefgreniana* Engl.**
Voucher: Hoehne, W. 3799 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Urospatha riedeliana* Schott**
Voucher: Prance, G.T. 58485 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Urospatha sagittifolia* (Rudge) Schott**
Voucher: Pereira, L.A. 2005 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Urospatha wurdackii* Bunting**
Voucher: Stevenson, D.W. 888 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Wolffia Horkel *ex* Schleid

Marcus Alberto Nadruz Coelho

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Wolffia arrhiza* (L.) Horkel *ex* Wimm.**
Voucher: Landolt, E. 1983 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Wolffia brasiliensis* Wedd.**
Voucher: Neto, P.C.G. 1740 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA, AL), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

***Wolffia columbiana* Karsten**
Voucher: França, F. 5267 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Caatinga, Pampa, Pantanal

Wolffiella Hegelm.

Marcus Alberto Nadruz Coelho

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Wolffiella caudata* Landolt**
Voucher: Guillaumet, J.L.B. 5744 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Wolffiella lingulata* (Hegelm.) Hegelm.**
Voucher: Schinini, A. 34987 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Pantanal

***Wolffiella neotropica* Landolt**
Voucher: Landolt, E. 199 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Wolffiella oblonga* (Phil.) Hegelm.**
Voucher: Cervi, A.C. 8691 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC); Mata Atlântica, Pantanal

***Wolffiella welwitschii* (Hegelm.) Monod**
Voucher: Leite, M.S. 904 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Pantanal

Xanthosoma Schott

Marcus Alberto Nadruz Coelho

27 espécies (11 endêmicas)

***Xanthosoma acutum* E.G.Gonç.**
Referência: Gonçalves, E.G. 2003. Aroideana 25: 22.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Xanthosoma aristeguietae* (G.S.Bunting) Madison**
Voucher: Janssen, A. 24 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia, Cerrado

***Xanthosoma auriculatum* Regel**
Voucher: Janssen, A. 24 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xanthosoma brasiliense* (Desf.) Engl.**
Referência: Engler, H.G.A. 1920.
Pflanzenr. (Engler) IV, 23E: 58.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Xanthosoma caulotuberculatum* G.S.Bunting**
Voucher: Croat, T.B. 85477 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Xanthosoma helleborifolium* (Jacq.) Schott**
Voucher: Gonçalves, E.G. 669 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado

***Xanthosoma lucens* E.G.Gonç.**
Voucher: Gonçalves, E.G. 237 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Xanthosoma mafaffoides* G.S.Bunting**
Referência: Bunting, G.S. 1988. Phytologia 64: 485.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Xanthosoma maximiliani* Schott**
Voucher: Forzza, R.C. 2947 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Xanthosoma mexicanum* Liebm.**
Voucher: Ehringhaus, C. 352 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Xanthosoma pentaphyllum* Engl.**
Voucher: Forzza, R.C. 2552 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Xanthosoma platylobum* (Schott) Engl.**
Voucher: Deubrwsii, L.Th. 1828 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PB), Centro-Oeste, Sudeste, Sul (PR); Cerrado

***Xanthosoma plowmanii* Bogner**
Voucher: Gonçalves, E.G. 690 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Xanthosoma poeppigii* Schott**
Voucher: Daly, D.C. 11532 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Xanthosoma pottii* E.G.Gonç.**
Voucher: Hatschbach, G. 36097 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal

***Xanthosoma pubescens* Poepp. & Endl.**
Voucher: Lima, H.C. 2137 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Xanthosoma pulchrum* E.G.Gonç.**
Voucher: Hatschbach, G. 65550 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Xanthosoma purpuratum* K.Krause**
Voucher: Croat, T.B. 84993 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Xanthosoma riedelianum* (Schott) Schott**
Voucher: Pickel, B.J. 4645 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Xanthosoma riparium* E.G.Gonç.**
Voucher: Gonçalves, E.G. s.n. (MO 1445192)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Xanthosoma sagittifolium* Schott**
Voucher: Nadruz, M. 1723 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Xanthosoma striatipes* (Kunth & Bouché) Madison**
Voucher: Sobral, M. 10408 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Xanthosoma striolatum* Mart. *ex* Schott**
Voucher: Silva, N.T. 2238 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Xanthosoma syngoniifolium* Rusby**
Voucher: Gonçalves, E.G. 684 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Xanthosoma ulei* Engl.**
Voucher: Hatschbach, G. 65550 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Xanthosoma undipes* (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch**
Voucher: Nogueira, F.L. 5 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Xanthosoma viviparum* Madison**
Voucher: Daly, D.C. 10471 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Zomicarpa Schott
Marcus Alberto Nadruz Coelho
3 espécies (3 endêmicas)
***Zomicarpa pythonium* (Mart.) Schott**
Voucher: Gonçalves, E.G. 416 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE); Caatinga
***Zomicarpa riedelianum* Schott**
Voucher: Miranda, A.M. 1599 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga
***Zomicarpa steigeriana* Maxim. *ex* Schott**
Voucher: Carvalho, A.M. 6727 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

Zomicarpella N.E.Br.
Marcus Alberto Nadruz Coelho
1 espécie (1 endêmica)
***Zomicarpella amazonica* Bogner**
Voucher: Bogner, J. 1985 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

ARALIACEAE
Pedro Fiaschi
5 gêneros, 90 espécies (53 endêmicas), 9 variedades (3 endêmicas)

Aralia L.
1 espécie (não endêmica)
***Aralia warmingiana* (Marchal) J.Wen**
Voucher: Hatschbach, G. 50381 (K, MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica

Dendropanax Decne. & Planch.
19 espécies (13 endêmicas)
***Dendropanax amorimii* Fiaschi**
Voucher: Amorim, A.M. 3589 (CEPEC, K, MBM, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Dendropanax arboreus* (L.) Decne. & Planch.**
Referência: Frodin, D.G. & R. Govaerts 2003. World Checkl. & Bibliogr. Araliaceae 1-444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dendropanax australis* Fiaschi & Jung-Mend.**
Voucher: Mello-Silva, R. 962 (IAC, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Dendropanax bahiensis* Fiaschi**
Voucher: Fiaschi, P. 1259 (CEPEC, HUEFS, K, MBM, MO, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Dendropanax brasiliensis* (Seem.) Frodin**
Voucher: Santos, T.S. 2889 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dendropanax caudatus* Fiaschi**
Voucher: Fiaschi, P. 1473 (CEPEC, HUEFS, K, MBML, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dendropanax cuneatus* (DC.) Decne. & Planch.**
Voucher: Pirani, J.R. 3196 (ESA, HRCB, IAC, SP, SPF, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Dendropanax denticulatus* Fiaschi**
Voucher: Fiaschi, P. 1252 (CEPEC, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Dendropanax exilis* (Toledo) S.L.Jung**
Voucher: Jung, S.L. 223 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Dendropanax geniculatus* Fiaschi**
Voucher: Fiaschi, P. 1338 (CEPEC, HUEFS, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Dendropanax heterophyllus* (Marchal) Frodin**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3021 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dendropanax langsdorfii* (Marchal) Frodin**
Voucher: Wesenberg, J.G. 364 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dendropanax macropodus* (Harms) Marchal**
Voucher: Daly, D.C. 10513 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Dendropanax monogynus* (Vell.) Seem.**
Voucher: Fiaschi, P. 566 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Dendropanax neblinae* Maguire et al.**
Referência: Frodin, D. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 1-31.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dendropanax nebulosus* Fiaschi & Jung-Mend.**
Voucher: Rossi, L. 1477 (IAC, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Dendropanax palustris* (Ducke) Harms**
Voucher: Ducke, A. 14802 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dendropanax resinosus* (Marchal) Frodin**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6648 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Dendropanax trilobus* (Gardner) Seem.**
Voucher: Costa, C.B. 467 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Hydrocotyle L.

17 espécies (6 endêmicas), 7 variedades (2 endêmicas)
***Hydrocotyle acuminata* Urb.**
Referência: Mathias, M.E. & Constance, L. 1962. Fieldiana, Bot. 13: 3-97.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Hydrocotyle alpestris* Gardner**
Referência: Eichler, H. 1987. Feddes Repert. 98: 1-51.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Hydrocotyle barbarossa* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Souza, J.P. 765 (ESA, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Hydrocotyle bonariensis* Lam.**
Voucher: Romera, E.C. 144 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Hydrocotyle bowlesioides* Mathias & Constance**
Voucher: Hatschbach, G. 23165 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica
***Hydrocotyle bradei* Rossberg**
Voucher: Brade, A.C. 14668 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Hydrocotyle callicephala* (Cham.) Urb.**
Voucher: Barreto, K.D. 1982 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Hydrocotyle exigua* (Urb.) Malme**
Voucher: Souza, V.C. 10495 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hydrocotyle hirta* R.Br. *ex* A.Rich.**
Voucher: Ceroni, Z.S. 5077 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica
***Hydrocotyle itatiaiensis* Brade**
Voucher: Rossi, L. 1415 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (SC); Mata Atlântica
***Hydrocotyle langsdorffii* DC.**
Voucher: Reitz, R. 7193 (HBR, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Salino, A. 29935 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Hydrocotyle pusilla* A.Rich.**
Voucher: Kuhlmann, M. 2007 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Hydrocotyle quinqueloba* Ruiz & Pav.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Hydrocotyle quinqueloba* var. *angulata* Urb.**
Voucher: Sucre, D. 6680 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Hydrocotyle quinqueloba* var. *asterias* (Cham. & Schltdl.) Urb.**
Voucher: Martinelli, G. 2765 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Hydrocotyle quinqueloba* var. *glabra* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Saavedra, M.M. 281 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica
***Hydrocotyle quinqueloba* var. *macrophylla* (Pohl *ex* DC.) Urb.**
Voucher: Cordeiro, I. 1336 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Hydrocotyle quinqueloba* var. *quadriloba* Urb.**
Referência: Eichler, H. 1987. Feddes Repert. 98: 145-196.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP);
Mata Atlântica
Hydrocotyle quinqueloba* Ruiz & Pav. var. *quinqueloba
Voucher: Souza, J.P. 826 (ESA, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Hydrocotyle quinqueloba* var. *quinqueradiata* Urb.**
Voucher: Tamashiro, J.Y. 828 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica
***Hydrocotyle ranunculoides* L.f.**
Voucher: Pirani, J.R. 4250 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hydrocotyle ulei* H.Wolff**
Voucher: Brade, A.C. 21001 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Hydrocotyle verticillata* Thunb.**
Voucher: Souza, J.P. 791 (ESA, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Oreopanax Decne. & Planch.

2 espécies (1 endêmica)
***Oreopanax capitatus* (Jacq.) Decne. & Planch.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1463 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AC), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Oreopanax fulvus* Marchal**
Voucher: Fiaschi, P. 812 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Schefflera J.R.Forst. & G.Forst.

51 espécies (33 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms**
Voucher: Dislich, R. 165 (SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Schefflera angustissima* (Marchal) Frodin**
Voucher: Fiaschi, P. 540 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Schefflera asymmetrica* Frodin**
Voucher: Stein, B. 1585 (K, MO, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera aurata* Fiaschi**
Voucher: Fiaschi, P. 988 (CEPEC, HUEFS, K, MBM, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Schefflera botumirimensis* Fiaschi & Pirani**
Voucher: Fiaschi, P. 3086 (CEPEC, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schefflera burchellii* (Seem.) Frodin & Fiaschi**
Voucher: Fiaschi, P. 2990 (CEPEC, K, MO, NY, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado

***Schefflera calva* (Cham.) Frodin & Fiaschi**
Voucher: Fiaschi, P. 144 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Schefflera capixaba* Fiaschi**
Voucher: Fiaschi, P. 690 (K, MBML, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Schefflera cephalantha* (Harms) Frodin**
Voucher: Malme, G.O.A. 2073 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Schefflera chimantensis* (Steyerm. & Maguire) Maguire et al.**
Referência: Frodin, D.G. 1997. Fl. Venez. Guayana 2: 1-31.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Schefflera ciliatifolia* Fiaschi & Frodin**
Voucher: Nee, M. 43002 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera concolor* Frodin**
Voucher: Gentry, A.H. 46613 (K, MO, US, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera confusa* (Marchal) Harms**
Voucher: Prance, G.T. 3010 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Schefflera cordata* (Taub.) Frodin & Fiaschi**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19413 (BR, C, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schefflera decaphylla* (Seem.) Harms**
Voucher: Ducke, A. 1929 (K, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Schefflera dichotoma* Fiaschi & Frodin**
Voucher: Black, G.A. 2714 (GH, IAN, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera distractiflora* (Harms) Frodin**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5652 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Schefflera duidae* Steyerm.**
Referência: Frodin, D.G. 1997. Fl. Venez. Guayana 2: 1-31.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera eximia* Frodin**
Voucher: Boom, B.M. 5969 (K, NY, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera fruticosa* Fiaschi & Pirani**
Voucher: Fiaschi, P. 286 (BHCB, K, MBM, MO, NY, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schefflera gardneri* (Seem.) Frodin & Fiaschi**
Voucher: Fiaschi, P. 3090 (CEPEC, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schefflera glaziovii* (Taub.) Frodin & Fiaschi**
Voucher: Pirani, J.R. 4247 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schefflera grandigemma* Fiaschi**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4723 (MBML, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Schefflera japurensis* (Mart. & Zucc. *ex* Marchal) Harms**
Voucher: Silva, N.T. 60814 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera kollmannii* Fiaschi**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 3825 (MBML, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Schefflera longipetiolata* (Pohl *ex* DC.) Frodin & Fiaschi**
Voucher: Fiaschi, P. 617 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Schefflera lucumoides* (Decne. & Planch. *ex* Marchal) Frodin & Fiaschi**
Voucher: Fiaschi, P. 908 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schefflera macrocarpa* (Cham. & Schltdl.) Frodin**
Voucher: Fiaschi, P. 3040 (CEPEC, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Schefflera malmei* (Harms) Frodin**
Voucher: Fiaschi, P. 2972 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Schefflera monosperma* Maguire et al. *ex* Frodin**
Voucher: Ule, E.H.G. 8706 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Schefflera morototoni* (Aubl.) Maguire et al.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Schefflera morototoni* (Aubl.) Maguire et al. var. *morototoni
Voucher: Fiaschi, P. 241 (F, K, MBML, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Schefflera morototoni* var. *sessiliflora* (Marchal) Frodin**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6557 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Schefflera neblinae* (Maguire et al.) Frodin**
Voucher: Silva, N.T. 60903 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schefflera pallens* Maguire et al.**
Voucher: Maguire, B. 60503 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schefflera plurifolia* Fiaschi & Frodin**
Voucher: Fiaschi, P. 3027 (CEPEC, INPA, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Schefflera plurispicata* Maguire et al.**
Voucher: Silva, N.T. 60941 (IAN, K, MG, NY, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schefflera psilophylla* (Harms) Maguire et al.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8702 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Schefflera quinquecarinata* Steyerm.**
Voucher: Prance, G.T. 10159 (MG, NY, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Schefflera racemifera* Fiaschi & Frodin**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 6057 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Schefflera ruschiana* Fiaschi & Pirani**
Voucher: Fiaschi, P. 960 (K, MBML, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Schefflera selloi* (Marchal) Frodin & Fiaschi**
Voucher: Fiaschi, P. 239 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Schefflera simplex* Steyerm. & Holst**
Voucher: Gentry, A.H. 46694 (MO, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schefflera spruceana* (Seem.) Maguire et al.**
Voucher: Farney, C. 1781 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Schefflera sprucei* (Seem.) Harms**
Voucher: Daly, D.C. 8995 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Schefflera suaveolens* Frodin**
Voucher: Silva, N.T. 60866 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Schefflera succinea* Frodin & Fiaschi**
Voucher: Martinelli, G. 13395 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Schefflera tremuloidea* Maguire et al.**
Voucher: Farney, C. 863 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Schefflera umbellata* (N.E.Br.) R.Vig.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8704 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Schefflera umbrosa* Frodin & Fiaschi**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1150 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Schefflera varisiana* Frodin**
Voucher: Prance, G.T. 9796 (INPA, K, MG, NY, US, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Schefflera villosissima* Fiaschi & Pirani**
Voucher: Irwin, H.S. 20809 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Schefflera vinosa* (Cham. & Schltdl.) Frodin & Fiaschi**
Voucher: Pirani, J.R. 3287 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

ARECACEAE

Paula Leitman, Andrew Henderson, Larry Noblick
39 gêneros, 266 espécies (111 endêmicas), 41 variedades (1 endêmica)

Acrocomia Mart.

6 espécies (3 endêmicas)
***Acrocomia aculeata* (Jacq.) Lodd. *ex* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 22191 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Acrocomia emensis* (Toledo) Lorenzi**
Voucher: Medeiros-Costa, J.T. 151 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Acrocomia glaucescens* Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6785 (ESA, HPL, NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Acrocomia hassleri* (Barb.Rodr.) W.J.Hahn**
Voucher: Batalha, M.A. 3828 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Acrocomia intumescens* Drude**
Referência: Drude, O. 1882. Fl. bras. 3(2): 251-464.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Acrocomia totai* Mart.**
Voucher: Lorenzi, H. 6770 (HPL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Pantanal

Aiphanes Willd.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Aiphanes aculeata* Willd.**
Voucher: Daly, D.C. 9191 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aiphanes deltoidea* Burret**
Voucher: Traill, J.W.H. 1070 (BH, GH, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aiphanes ulei* (Dammer) Burret**
Voucher: Henderson, A. 1133 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Allagoptera Nees

4 espécies (2 endêmicas)
***Allagoptera arenaria* (Gomes) Kuntze**
Voucher: Figueiredo, M.A.O. 2 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Allagoptera brevicalyx* Moraes**
Voucher: Krukoff, B.A. 12631 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Allagoptera campestris* (Mart.) Kuntze**
Voucher: Krapovickas, A. 33184 (CTES, F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Allagoptera leucocalyx* (Drude) Kuntze**
Voucher: Martinelli, G. 365 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

Aphandra Barfod

1 espécie (não endêmica)
***Aphandra natalia* (Balslev & A.J.Hend.) Barfod**
Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Astrocaryum G.Mey.

21 espécies (5 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Astrocaryum acaule* Mart.**
Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Astrocaryum aculeatissimum* (Schott) Burret**
Voucher: Braga, J.M.A. 1863 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Astrocaryum aculeatum* G.Mey.**
Voucher: Ferreira, E. 286 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Astrocaryum campestre* Mart.**
Voucher: Noblick, L.R. 4664 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Astrocaryum chambira* Burret**
Voucher: Henderson, A. 1681 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Astrocaryum echinatum* Barb.Rodr.**
Voucher: Lorenzi, H. 4762 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Astrocaryum faranae* F.Kahn & E.Ferreira**
Voucher: Kahn, F. 3560 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Astrocaryum farinosum* Barb.Rodr.**
Voucher: Rabelo, A. 50 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Astrocaryum giganteum* Barb.Rodr.**
Referência: Kahn, F. 2010. Flora brasileira Lorenzi: Arecaceae (palmeiras) 368 p.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Astrocaryum gynacanthum* Mart.**
Voucher: Balée, W.L. 3484 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Astrocaryum huaimi* Mart.**
Voucher: Irwin, H.S. 17364 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Astrocaryum jauari* Mart.**
Voucher: Balick, M.J. 1475 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Astrocaryum javarense* Trail *ex* Drude**
Voucher: Henderson, A. 852 (CEN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Astrocaryum minus* Trail**
Voucher: Trail, J.W.H. 213 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Astrocaryum murumuru* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Astrocaryum murumuru* var. *ciliatum* (F.Kahn & B. Millán) A.J.Hend.**
Referência: Kahn, F. 2010. Flora brasileira Lorenzi: Arecaceae (palmeiras) 368 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Astrocaryum murumuru* var. *ferrugineum* (F.Kahn & B.Millán) A.J.Hend.**
Voucher: Henderson, A. 674 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
Astrocaryum murumuru* Mart. var. *murumuru
Voucher: Beck, H.T. 273 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Astrocaryum paramaca* Mart.**
Voucher: Rosa, N.A. 1789 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Astrocaryum rodriguesii* Trail**
Voucher: Henderson, A. 506 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Astrocaryum sciophilum* (Miq.) Pulle**
Voucher: Henderson, A. 1158 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Astrocaryum sociale* Barb.Rodr.**
Voucher: Kahn, F. 569 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Astrocaryum ulei* Burret**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 959 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Astrocaryum vulgare* Mart.**
Voucher: Daly, D.C. 388 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia

Attalea Kunth

30 espécies (16 endêmicas)
***Attalea anisitsiana* (Barb.Rodr.) Zona**
Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1898. Palm. Mattogross. Nov. 63, t. 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Attalea apoda* Burret**
Voucher: Glassmann, S.F. 13004 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Attalea attaleoides* (Barb.Rodr.) Wess.Boer**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 29 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Attalea barreirensis* Glassman**
Voucher: Noblick, L.R. 4528 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Attalea brasiliensis* Glassman**
Voucher: Glassmann, S.F. 13057 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Attalea brejinhoensis* (Glassman) Zona**
Voucher: Noblick, L.R. 4515 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Attalea burretiana* Bondar**
Voucher: Noblick, L.R. 3810 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
***Attalea butyracea* (Mutis *ex* L.f.) Wess.Boer**
Voucher: Jangoux, J. 85-42 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Attalea compta* Mart.**
Voucher: Noblick, L.R. 4855 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Attalea dahlgreniana* (Bondar) Wess.Boer**
Voucher: Balick, M.J. 1300 (FTG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Attalea dubia* (Mart.) Burret**
Voucher: Krapovickas, A. 21354 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Attalea eichleri* (Drude) A.J.Hend.**
Voucher: Noblick, L.R. 4674 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA); Cerrado
***Attalea exigua* Drude**
Voucher: Bernacci, L.C. s.n. (IAC 44109)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Attalea funifera* Mart.**
Voucher: Noblick, L.R. 4578 (BAH)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Attalea geraensis* Barb.Rodr.**
Voucher: Glassmann, S.F. 8017 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Attalea huebneri* (Burret) Zona**
Voucher: Krukoff, B.A. 5572 (A, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Attalea humilis* Mart.**
Voucher: Noblick, L.R. 4505 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Attalea insignis* (Mart.) Drude**
Voucher: Pardini, R. 20 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Attalea luetzelburgii* (Burret) Wess.Boer**
Voucher: Luetzelburg, P. 21969 (B, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Attalea maripa* (Aubl.) Mart.**
Voucher: Noblick, L.R. 4973 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Attalea microcarpa* Mart.**
Voucher: Emilio, T. 184 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Attalea oleifera* Barb.Rodr.**
Voucher: Noblick, L.R. 5133 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL); Cerrado
***Attalea phalerata* Mart. *ex* Spreng.**
Voucher: Noblick, L.R. 4889 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Attalea pindobassu* Bondar**
Voucher: Noblick, L.R. 3828 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Attalea racemosa* Spruce**
Referência: Henderson, A. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Attalea seabrensis* Glassman**
Voucher: Noblick, L.R. 4518 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Attalea speciosa* Mart. *ex* Spreng.**
Voucher: Noblick, L.R. 4950 (EAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Attalea spectabilis* Mart.**
Voucher: Henderson, A. 668 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Attalea tessmannii* Burret**
Voucher: Henderson, A. 1656 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Attalea vitrivir* Zona**
Voucher: Noblick, L.R. 4622 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Bactris Jacq. *ex* Scop.

45 espécies (13 endêmicas), 14 variedades (1 endêmica)
***Bactris acanthocarpa* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Bactris acanthocarpa* Mart. var. *acanthocarpa
Voucher: Noblick, L.R. 4781 (CEPEC, F, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Bactris acanthocarpa* var. *exscapa* Barb.Rodr.**
Voucher: Henderson, A. 657 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Bactris acanthocarpa* var. *intermedia* A.J.Hend.**
Voucher: Henderson, A. 1611 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Bactris acanthocarpa* var. *trailiana* (Barb.Rodr.) A.J.Hend.**
Voucher: Mori, S.A. 20586 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Bactris acanthocarpoides* Barb.Rodr.**
Voucher: Henderson, A. 1160 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Bactris bahiensis* Noblick *ex* A.J.Hend.**
Voucher: Noblick, L.R. 4733 (CEPEC, F, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Bactris balanophora* Spruce**
Voucher: Henderson, A. 1078 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bactris bidentula* Spruce**
Voucher: Henderson, A. 1555 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Bactris bifida* Mart.**
Voucher: Henderson, A. 1103 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Bactris brongniartii* Mart.**
Voucher: Balée, W.L. 1955 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Bactris campestris* Poepp.**
Voucher: Prance, G.T. 29705 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Bactris caryotifolia* Mart.**
Voucher: Leitman, P. 29 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Bactris chaveziae* A.J.Hend.**
Voucher: Henderson, A. 1658 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Bactris concinna* Mart.**
Voucher: Pardini, R. 43 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Bactris constanciae* Barb.Rodr.**
Voucher: Mori, S.A. 19603 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Bactris corossilla* H.Karst.**
Voucher: Henderson, A. 1109 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Bactris cuspidata* Mart.**
Voucher: Pardini, R. 73 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Bactris elegans* Barb.Rodr.**
Voucher: Henderson, A. 654 (BH, COL, INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Bactris ferruginea* Burret**
Voucher: Stehmann, J.R. 27252 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Bactris fissifrons* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bactris gasipaes* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Bactris gasipaes* var. *chichagui* (H.Karst.) A.J.Hend.**
Voucher: Pinard, M. 845 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Bactris gasipaes* Kunth var. *gasipaes
Voucher: Dahlgren, B.E. 701 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste; Amazônia
***Bactris gastoniana* Barb.Rodr.**
Voucher: Henderson, A. 658 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Bactris glassmanii* Med.-Costa & Noblick *ex* A.J.Hend.**
Voucher: Noblick, L.R. 4681 (ALCB, CEPEC, F, FTG, K, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica
***Bactris glaucescens* Drude**
Voucher: Henderson, A. 812 (COL, INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Bactris halmoorei* A.J.Hend.**
Voucher: Henderson, A. 1689 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Bactris hatschbachii* Noblick *ex* A.J.Hend.**
Voucher: Hatschbach, G. 47145 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Bactris hirta* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Bactris hirta* Mart. var. *hirta
Voucher: Henderson, A. 859 (COL, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bactris hirta* var. *lakoi* (Burret) A.J.Hend.**
Referência: Henderson, A. 2000. Fl. Neotrop. Monogr. 79: 181 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bactris horridispatha* Noblick *ex* A.J.Hend.**
Voucher: Noblick, L.R. 4608 (ALCB, CEPEC, F, FTG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Bactris killipii* Burret**
Voucher: Henderson, A. 1514 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bactris macroacantha* Mart.**
Voucher: Pardini, R. 71 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Bactris major* Jacq.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Bactris major* var. *infesta* (Mart.) Drude**
Voucher: Nee, M. 34953 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
Bactris major* Jacq. var. *major
Voucher: Balick, M.J. 1352 (COL, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PI); Amazônia
***Bactris maraja* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Bactris maraja* var. *chaetospatha* (Mart.) A.J.Hend.**
Voucher: Pardini, R. 59 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bactris maraja* var. *juruensis* (Trail) A.J.Hend.**
Voucher: Henderson, A. 1522 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Bactris maraja* Mart. var. *maraja
Voucher: Pardini, R. 38 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Bactris maraja* var. *trichospatha* (Trail) A.J.Hend.**
Voucher: Pardini, R. 42 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Bactris martiana* A.J.Hend.**
Voucher: Henderson, A. 1654 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Bactris oligocarpa* Barb.Rodr. & Trail**
Voucher: Henderson, A. 1608 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Bactris pickelii* Burret**
Voucher: Noblick, L.R. 4745 (CEPEC, F, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Bactris pliniana* Granv. & A.J.Hend.**
Voucher: Mori, S. 17196 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Bactris rhaphidacantha* Wess.Boer**
Referência: Henderson, A. 2000. Fl. Neotrop. Monogr. 79: 1-181.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Bactris riparia* Mart.**
Voucher: Henderson, A. 1676 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Bactris setosa* Mart.**
Voucher: Leitman, P. 37 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Bactris simplicifrons* Mart.**
Voucher: Prance, G.T. 10873 (BH, F, INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Bactris soeiroana* Noblick *ex* A.J.Hend.**
Voucher: Noblick, L.R. 4682 (ALCB, BH, CEPEC, FTG, K, MO, NY, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Bactris sphaerocarpa* Trail**
Voucher: Prance, G.T. 11932 (BH, F, INPA, K, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Bactris syagroides* Barb.Rodr. & Trail**
Voucher: Vicentini, A. 1170 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Bactris tefensis* A.J.Hend.**
Voucher: Henderson, A. 1583 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bactris timbuiensis* H.Q.B.Fern.**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2622 (MBML, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Bactris tomentosa* Mart.**
Voucher: Henderson, A. 642 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Bactris turbinocarpa* Barb.Rodr.**
Voucher: Trail, J.W.H. 856-XII (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Bactris vulgaris* Barb.Rodr.**
Voucher: Leitman, P. 36 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Barcella (Trail) Drude

1 espécie (1 endêmica)
***Barcella odora* (Trail) Drude**
Voucher: Trail, J.W.H. 1124 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Butia Becc.

16 espécies (11 endêmicas)
***Butia archeri* (Glassman) Glassman**
Voucher: Marcato, A.C. 131 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Butia capitata* (Mart.) Becc.**
Voucher: Marcato, A.C. 184 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Butia catarinensis* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6760 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Butia eriospatha* (Mart. *ex* Drude) Becc.**
Voucher: Marcato, A.C. 250 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Butia exospadix* Noblick**
Voucher: Lorenzi, H. 6688 (HPL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica
***Butia lallemantii* Deble & Marchiori**
Voucher: Deble, L. 1514 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica (?); Sul (RS); Pampa
***Butia leiospatha* (Barb.Rodr.) Becc.**
Voucher: Marcato, A.C. 246 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Butia lepidotispatha* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6767 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Butia leptospatha* (Burret) Noblick**
Voucher: Archer, W.A. 3915 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Butia matogrossensis* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Tsuji, R. 2674 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Butia microspadix* Burret**
Voucher: Krieger, L. 7722 (CESJ, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Butia odorata* (Barb.Rodr.) Noblick & Lorenzi**
Voucher: Noblick, L. 5129 (CEN, FTG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Butia paraguayensis* (Barb.Rodr.) Bailey**
Voucher: Marcato, A.C. 259 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Butia pubispatha* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6766 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Butia purpurascens* Glassman**
Voucher: Glassman, S.F. 13075 (CHI, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Butia yatay* (Mart.) Becc.**
Voucher: Noblick, L.R. 4885 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Chamaedorea Willd.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Chamaedorea angustisecta* Burret**
Voucher: Daly, D.C. 9193 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Chamaedorea pauciflora* Mart.**
Voucher: Daly, D.C. 10364 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Chamaedorea pinnatifrons* (Jacq.) Oerst.**
Voucher: Daly, D.C. 9816 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Chelyocarpus Dammer

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Chelyocarpus chuco* (Mart.) H.E.Moore**
Voucher: Pinard, M. 836 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Chelyocarpus ulei* Dammer**
Voucher: Henderson, A. 1144 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Cocos

1 espécie (não endêmica)
***Cocos nucifera* L.**
Voucher: s.col. 658 (RB 264750)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Copernicia Mart. *ex* Endl.

2 espécies (1 endêmica)
***Copernicia alba* Morong *ex* Morong & Britton**
Voucher: Noblick, L.R. 4890 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Copernicia prunifera* (Mill.) H.E.Moore**
Voucher: Thomas, W.W. 4432 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Cerrado

Desmoncus Mart.

6 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)
***Desmoncus giganteus* A.J.Hend.**
Voucher: Henderson, A. 1688 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Desmoncus leptospadix* Mart.**
Voucher: Forero, E. 6384 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Desmoncus mitis* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Desmoncus mitis* var. *leptoclonos* (Drude) A.J.Hend.**
Voucher: Daly, D.C. 11467 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
Desmoncus mitis* Mart. var. *mitis
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Desmoncus mitis* var. *tenerrimus* (Mart. *ex* Drude) A.J.Hend.**
Referência: Henderson, A. 1995. Palms Amazon 362 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Desmoncus orthacanthos* Mart.**
Voucher: Henderson, A. 1696 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Desmoncus phoenicocarpus* Barb.Rodr.**
Voucher: Hatschbach, G. 62618 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Desmoncus polyacanthos* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Desmoncus polyacanthos* Mart. var. *polyacanthos
Voucher: Cardoso, L.J.T. 176 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Dictyocaryum H.Wendl.

1 espécie (não endêmica)
***Dictyocaryum ptarianum* (Steyerm.) H.E.Moore & Steyerm.**
Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Elaeis Jacq.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Elaeis guineensis* Jacq.**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 831 (HPZ, NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Elaeis oleifera* (Kunth) Cortés**
Voucher: Henderson, A. 1508 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Euterpe Mart.
5 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)
***Euterpe catinga* Wallace**
Distribuição: nativa; não endêmica
Euterpe catinga* Wallace var. *catinga
Voucher: Prance, G.T. 16116 (BH, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Euterpe catinga* var. *roraimae* (Dammer) A.J.Hend. & Galeano**
Voucher: Prance, G.T. 29061 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Euterpe edulis* Mart.**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2891 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Euterpe longibracteata* Barb.Rodr.**
Voucher: Henderson, A. 247 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Euterpe oleracea* Mart.**
Voucher: Balick, M.J. 904 (BH, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia
***Euterpe precatoria* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Euterpe precatoria* var. *longevaginata* (Mart.) A.J.Hend.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12651 (INPA, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
Euterpe precatoria* Mart. var. *precatoria
Voucher: Moore, H.E. 9539 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Geonoma Willd.
32 espécies (13 endêmicas), 11 variedades (nenhuma endêmica)
***Geonoma appuniana* Spruce**
Referência: Henderson, A. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Geonoma arundinacea* Mart.**
Referência: Henderson, A. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Geonoma aspidiifolia* Spruce**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1010 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Geonoma baculifera* (Poit.) Kunth**
Voucher: Prance, G.T. 9362 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Geonoma bifurca* Drude & H.Wendl.**
Voucher: Martinelli, G. 13314 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Geonoma brevispatha* Barb.Rodr.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Geonoma brevispatha* Barb.Rodr. var. *brevispatha
Voucher: Barros, F. 1789 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Geonoma brevispatha* var. *occidentalis* A.J.Hend.**
Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Geonoma brongniartii* Mart.**
Voucher: Prance, G.T. 12038 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Geonoma camana* Trail**
Voucher: Henderson, A. 1106 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Geonoma deversa* (Poit.) Kunth**
Voucher: Daly, D.C. 9854 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Geonoma elegans* Mart.**
Voucher: Martinelli, G. 2838 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Geonoma fiscellaria* Mart. *ex* Drude**
Voucher: Leitman, P. 39 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Geonoma gamiova* Barb.Rodr.**
Voucher: Hatschbach, G. 61004 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Geonoma gastoniana* Glaz. *ex* Drude**
Voucher: Sylvestre, L.S. 1490 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Geonoma interrupta* (Ruiz & Pav.) Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Geonoma interrupta* var. *euspatha* (Burret) A.J.Hend.**
Voucher: Prance, G.T. 10036 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
Geonoma interrupta* (Ruiz & Pav.) Mart. var. *interrupta
Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO); Amazônia
***Geonoma kuhlmannii* Burret**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 141 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Geonoma laxiflora* Mart.**
Voucher: Figueiredo, C. 761 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Geonoma leptospadix* Trail**
Voucher: Miralha, J.M.S. 205 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Geonoma macrostachys* Mart.**
Voucher: Prance, G.T. 16493 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Geonoma maxima* (Poit.) Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Geonoma maxima* var. *ambigua* (Spruce) A.J.Hend.**
Voucher: Milliken, W. 706 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Geonoma maxima* var. *chelidonura* (Spruce) A.J.Hend.**
Voucher: Scariot, A.O. 562 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
Geonoma maxima* (Poit.) Kunth var. *maxima
Voucher: Henderson, A. 664 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Geonoma maxima* var. *spixiana* (Mart.) A.J.Hend.**
Voucher: Henderson, A. 189 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Geonoma oldemanii* Granv.**
Referência: Henderson, A. 1995.
Field Guide Palms Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA); Amazônia
***Geonoma oligoclona* Trail**
Voucher: Krukoff, B.A. 1934 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Geonoma pauciflora* Mart.**
Voucher: Mori, S.A. 12822 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Geonoma poeppigiana* Mart.**
Voucher: Henderson, A. 845 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Geonoma pohliana* Mart.**
Voucher: Duarte, A.P. 1147 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Geonoma poiteauana* Kunth**
Voucher: Emilio, T. 6 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Geonoma rodeiensis* Barb.Rodr.**
Voucher: Leitman, P. 90 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Geonoma rubescens* H.Wendl.**
Voucher: Sucre, D. 5494 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Geonoma schottiana* Mart.**
Voucher: Brade, A.C. 20608 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Geonoma stricta* (Poit.) Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Geonoma stricta* var. *piscicauda* (Dammer) A.J.Hend.**
Voucher: Henderson, A. 1682 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
Geonoma stricta* (Poit.) Kunth var. *stricta
Voucher: Daly, D.C. 8272 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Geonoma stricta* var. trailii (Burret) A.J.Hend.**
Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms
Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Geonoma trinervis* Drude & H.Wendl.**
Voucher: Brade, A.C. 15878 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Geonoma umbraculiformis* Wess.Boer**
Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms
Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA); Amazônia
***Geonoma wittigiana* Glaz. *ex* Drude**
Voucher: Leitman, P. 78 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Hyospathe Mart.

1 espécie (não endêmica)
***Hyospathe elegans* Mart.**
Voucher: Henderson, A. 1124 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

Iriartea Ruiz & Pav.

1 espécie (não endêmica)
***Iriartea deltoidea* Ruiz & Pav.**
Voucher: Henderson, A. 199 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

Iriartella H.Wendl.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Iriartella setigera* (Mart.) H.Wendl.**
Voucher: Prance, G.T. 24569 (INPA, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM,
AC, RO); Amazônia
***Iriartella stenocarpa* Burret**
Voucher: Prance, G.T. 12322 (BH, INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Itaya H.E.Moore

1 espécie (não endêmica)
***Itaya amicorum* H.E.Moore**
Voucher: Henderson, A. 884 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Leopoldinia Mart.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Leopoldinia major* Wallace**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 7144)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Leopoldinia piassaba* Wallace**
Voucher: Luetzelburg, P. 22350 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Leopoldinia pulchra* Mart.**
Voucher: Henderson, A. 650 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Lepidocaryum Mart.
1 espécie (não endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Lepidocaryum tenue* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Lepidocaryum tenue* var. *casiquiarense* (Spruce) A.J.Hend.**
Voucher: Luetzelburg, P. 22395 (M, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lepidocaryum tenue* var. *gracile* (Mart.) A.J.Hend.**
Voucher: Silveira, M. 1289 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Lepidocaryum tenue* Mart. var. *tenue
Voucher: Emilio, T. 19 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Lytocaryum Toledo
4 espécies (4 endêmicas)
***Lytocaryum hoehnei* (Burret) Toledo**
Voucher: Silva, J.M. 3080 (FTG, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lytocaryum insigne* (Drude) Toledo**
Voucher: Martinelli, G. 13172 (FTG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Lytocaryum itapebiensis* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6496 (CEPEC, FTG, HPL, K, NY, R, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Lytocaryum weddellianum* (H.Wendl.) Toledo**
Voucher: Lima, H.C. 2200 (GUA, K, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Manicaria Gaertn.
1 espécie (não endêmica)
***Manicaria saccifera* Gaertn.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1192 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Mauritia L.f.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Mauritia carana* Wallace**
Voucher: Moore, H.E. 9546 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Mauritia flexuosa* L.f.**
Voucher: Nee, M.H. 34853 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Mauritiella Burret
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Mauritiella aculeata* (Kunth) Burret**
Voucher: Mori, S.A. 21821 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Mauritiella armata* (Mart.) Burret**
Voucher: Irwin, H.S. 6645 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Mauritiella martiana* (Spruce) Bureau**
Referência: Henderson, A. 2008. Primeiro Catálogo da Flora do Acre 555 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Oenocarpus Mart.
6 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Oenocarpus bacaba* Mart.**
Voucher: Prance, G.T. 2187 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Oenocarpus balickii* F.Kahn**
Voucher: Campos, M.T.V.A. 951 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Oenocarpus bataua* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Oenocarpus bataua* Mart. var. *bataua
Voucher: Rabelo, A. 28 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Oenocarpus distichus* Mart.**
Voucher: Miralha, J.M.S. s.n. (INPA 186903)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Oenocarpus mapora* H.Karst.**
Voucher: Rabelo, A. 58 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Oenocarpus minor* Mart.**
Voucher: Henderson, A. 640 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Pholidostachys H.Wendl. *ex* Hook.f.
1 espécie (não endêmica)
***Pholidostachys synanthera* (Mart.) H.E.Moore**
Voucher: Lleras, E. 16971 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Phytelephas Ruiz & Pav.
1 espécie (não endêmica)
***Phytelephas macrocarpa* Ruiz & Pav.**
Voucher: Ferreira, E. 70 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Polyandrococos Barb.Rodr.
1 espécie (1 endêmica)
***Polyandrococos caudescens* (Mart.) Barb.Rodr.**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2207 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Prestoea Hook.f.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Prestoea schultzeana* (Burret) H.E.Moore**
Voucher: Daly, D.C. 8347 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Prestoea tenuiramosa* (Dammer) H.E.Moore**
Referência: Henderson, A. & Galeano, G. 1996. Fl. Neotrop. Monogr. 72: 1-92.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Raphia P.Beauv.
1 espécie (não endêmica)
***Raphia taedigera* (Mart.) Mart.**
Voucher: Noblick, L.R. 5015 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Socratea H.Karst.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Socratea exorrhiza* (Mart.) H.Wendl.**
Voucher: Moore, H.E. 9538 (BH, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Socratea salazarii* H.E.Moore**
Voucher: Ferreira, E. 349 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Syagrus Mart.
46 espécies (40 endêmicas)
***Syagrus allagopteroides* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6792 (AAU, BHCB, CEPEC, FTG, HPL, K, NY, R, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Syagrus angustifolia* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6636 (BHCB, HPL, K, NY, R, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syagrus botryophora* Mart.**
Voucher: Noblick, L.R. 4690 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Syagrus caerulescens* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6649 (HPL, K, NY, R, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syagrus campestris* (Mart.) Bomhard**
Voucher: Lorenzi, H. 6536 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syagrus campylospatha* (Barb.Rodr.) Becc.**
Voucher: Lorenzi, H. 6694 (HPL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Syagrus cearensis* Noblick**
Voucher: Noblick, L.R. 4951 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, AL); Mata Atlântica
***Syagrus cerqueirana* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6514 (CGMS, HPL, K, NY, R, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado
***Syagrus cocoides* Mart.**
Voucher: Noblick, L.R. 4954 (TEPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Syagrus comosa* (Mart.) Mart.**
Voucher: Noblick, L.R. 4648 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Syagrus coronata* (Mart.) Becc.**
Voucher: Noblick, L.R. 4694 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Syagrus deflexa* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Tsuji, R. 2691 (AAU, CTES, FTG, HPL, K, NY, R, SP, UB, UFG,)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syagrus duartei* Glassman**
Voucher: Noblick, L.R. 4854 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syagrus evansiana* Noblick**
Voucher: Tsuji, R. 2703 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syagrus flexuosa* (Mart.) Becc.**
Voucher: Noblick, L.R. 5108 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Syagrus glaucescens* Glaz. *ex* Becc.**
Voucher: Noblick, L.R. 4843 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syagrus glaziouviana* (Dammer) Becc.**
Voucher: Tsuji, R. 2681 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Syagrus gouveiana* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6537 (BHCB, HPL, K, NY, R, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syagrus graminifolia* (Drude) Becc.**
Voucher: Lorenzi, H. 4771 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Syagrus harleyi* Glassman**
Voucher: Harley, R.M. 15963 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Syagrus inajai* (Spruce) Becc.**
Voucher: Noblick, L.R. 4970 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Syagrus itacambirana* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Tsuji, R. 2706 (BHCB, HPL, K, NY, R, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syagrus kellyana* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Noblick, L.R. 5156 (FTG, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Syagrus lilliputiana* (Barb.Rodr.) Becc.**
Voucher: Lorenzi, H. 2805 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Syagrus loefgrenii* Glassman**
Voucher: Noblick, L.R. 4888 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Syagrus longipedunculata* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6790 (BHCB, HPL, K, NY, R, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syagrus lorenzoniorum* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Tsuji, R. 2713 (AAU, FTG, HPL, K, MBML, NY, R, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Syagrus macrocarpa* Barb.Rodr.**
Voucher: Noblick, L.R. 4841 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Syagrus mendanhensis* Glassman**
Voucher: Noblick, L.R. 4844 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syagrus microphylla* Burret**
Voucher: Noblick, L.R. 3508 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Syagrus minor* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6639 (BHCB, HPL, K, NY, R, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syagrus oleracea* (Mart.) Becc.**
Voucher: Noblick, L.R. 4627 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Syagrus picrophylla* Barb.Rodr.**
Voucher: Lorenzi, H. 6631 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Syagrus pleioclada* Burret**
Voucher: Noblick, L.R. 4853 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Syagrus pleiocladoides* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6583 (AAU, CTES, FTG, HPL, K, NY, R, SP, UB, UFMT)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Syagrus procumbens* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Tsuji, R. 2677 (AAU, CGMS, CTES, FTG, HPL, K, NY, R, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado
***Syagrus pseudococos* (Raddi) Glassman**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 3080 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman**
Voucher: Mori, S.A. 11324 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Syagrus rupicola* Noblick & Lorenzi**
Voucher: Lorenzi, H. 6647 (HPL, R, SP, UB, NY, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Syagrus ruschiana* (Bondar) Glassman**
Voucher: Noblick, L.R. 4838 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Syagrus sancona* H.Karst.**
Voucher: Ferreira, E. 210 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Syagrus schizophylla* (Mart.) Glassman**
Voucher: Noblick, L.R. 4514 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE); Mata Atlântica
***Syagrus smithii* (H.E.Moore) Glassman**
Voucher: Henderson, A. 1117 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Syagrus vagans* (Bondar) A.D.Hawkes**
Voucher: Noblick, L.R. 3846 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Syagrus vermicularis* Noblick**
Voucher: Noblick, L.R. 4971 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Syagrus werdermannii* Burret**
Voucher: Noblick, L.R. 4519 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Trithrinax Mart.
2 espécies (1 endêmica)
***Trithrinax brasiliensis* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 58545 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Trithrinax schizophylla* Drude**
Referência: Henderson, A. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Wendlandiella Dammer
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Wendlandiella gracilis* Dammer**
Distribuição: nativa; não endêmica
Wendlandiella gracilis* Dammer var. *gracilis
Voucher: Figueiredo, C. 880 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Wettinia Poepp. *ex* Endl.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Wettinia augusta* Poepp. & Endl.**
Voucher: Ferreira, E. 93 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Wettinia drudei* (O.F.Cook & Doyle) A.J.Hend.**
Voucher: Henderson, A. 830 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Wettinia maynensis* Spruce**
Voucher: Jangoux, J. 85-110 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

ARISTOLOCHIACEAE
Fábio de Barros
1 gênero, 89 espécies (33 endêmicas)

Aristolochia L.
89 espécies (33 endêmicas)
***Aristolochia acutifolia* Duch.**
Voucher: Black, G.A. 9775 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia
***Aristolochia albertiana* Ahumada**
Referência: Ahumada, Z. 1975. Fl. Ilustr. Catarin. ARIS: 47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Aristolochia amazonica* Ule**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 15(2): 94.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Aristolochia angustifolia* Cham.**
Referência: Ahumada, Z. 1967. Opera Lilloana 16: 112.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aristolochia arcuata* Mast.**
Voucher: Barros, F. 3067 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Aristolochia asperifolia* Ule**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 15(2): 89.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Aristolochia bahiensis* F.González**
Referência: González, F. 1998. Brittonia 50(1): 8.
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aristolochia birostris* Duch.**
Voucher: Noblick, L.R. s.n. (HUEFS 2046, SP 201306)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado
***Aristolochia brevifolia* (Cham.) Hauman**
Referência: Ahumada, Z. 1967. Opera Lilloana 16: 123.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Aristolochia burchellii* Mast.**
Voucher: Pires, J.M. 10574 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Aristolochia burelae* Herzog**
Voucher: Ule, E.H.G. 9342 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Aristolochia ceresensis* Kuntze**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 15(2): 134.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Aristolochia chamissonis* (Klotzsch) Duch.**
Voucher: Ule, E.H.G. 213 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Aristolochia chiquitensis* Duch.**
Voucher: Souza, V.C. 5141 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
Sudeste (MG, RJ); Cerrado
***Aristolochia chrysochlora* Barb.Rodr.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 15(2): 99.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Aristolochia claussenii* Duch.**
Voucher: Cordeiro, I. 395 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Aristolochia cordigera* Willd.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 2024)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Aristolochia cornuta* Mast.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (SP 47064)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aristolochia curviflora* Malme**
Referência: Bazzolo, T.M. & Pfeifer, H.M. 1977. Caldasia 12(56): 23.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Aristolochia cymbifera* Mart. & Zucc.**
Voucher: Kuhlmann, M. 2646 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Aristolochia cynanchifolia* Mart. & Zucc.**
Voucher: Hoehne, F.C. 96 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aristolochia dalyi* F.González**
Referência: González, F. 1998. Brittonia 50(1): 6.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aristolochia deltoidea* Kunth**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 15(2): 57.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Aristolochia didyma* S.Moore**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2775 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Aristolochia disticha* Mast.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1708 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Aristolochia elegans* Mast.**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 51652)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aristolochia eriantha* Mart. & Zucc.**
Voucher: Foster, M.B. s.n. (SP 41441, SPF 71775)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado
***Aristolochia esperanzae* Kuntze**
Voucher: Sugiyama, M. 81 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Aristolochia filipendulina* Duch.**
Voucher: Mendonça, R.C. 287 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Aristolochia fimbriata* Cham.**
Voucher: Kozera, C. 36 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aristolochia floribunda* Lem.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5856 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Aristolochia fragrantissima* Ruiz**
Voucher: Daly, D.C. 8380 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aristolochia galeata* Mart. & Zucc.**
Voucher: Mantovani, W. 1080 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Caatinga, Cerrado
***Aristolochia gardneri* Duch.**
Referência: Ahumada, Z. 1977. Darwiniana 21(1): 67.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA),
Nordeste (PI, BA); Amazônia
***Aristolochia gehrtii* Hoehne**
Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 39275)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado
***Aristolochia gibertii* Hook.**
Voucher: Macedo, A. 1084 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Aristolochia gigantea* Mart. & Zucc.**
Voucher: Barros, F. 3069 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Aristolochia ginzbergeri* Ahumada**
Referência: Ahumada, Z. 1977. Darwiniana 21(1): 78.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Aristolochia guentheri* O.C.Schmidt**
Voucher: Irwin, H.S. 48705 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Aristolochia hilaireana* Duch.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 15(2): 96.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Aristolochia hispida* Pohl *ex* Duch.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 15(2): 108.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Aristolochia hoehneana* O.C.Schmidt**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 15(2): 117.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Domínio desconhecido
***Aristolochia holostylis* F.González**
Voucher: Eiten, G. 10196 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado, Mata Atlântica
***Aristolochia hypoglauca* Kuhlm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 238 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aristolochia iquitensis* O.C.Schmidt**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19526, SP 47063)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aristolochia labiata* Willd.**
Voucher: Tozzi, A.M.G.A. 94-72 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Aristolochia lagesiana* Ule**
Voucher: Daly, D.C. 9904 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aristolochia lanceolatolorata* S.Moore**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 15(2): 139.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM); Amazônia
***Aristolochia limai* Hoehne**
Voucher: Heringer, E.P. 2248 (SP 268106, SP 48245)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Aristolochia longispathulata* F.González**
Voucher: Thomas, W.W. 11741 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aristolochia lutescens* Duch.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 15(2): 55.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
***Aristolochia macrota* Duch.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 15(2): 99.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aristolochia manaosensis* Ahumada**
Referência: Ahumada, Z. 1977. Darwiniana 21(1): 77.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Aristolochia marianensis* Ahumada**
Referência: Ahumada, Z. 1979. Hickenia 1(32): 171.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Aristolochia melastoma* Silva Manso *ex* Duch.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1365 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aristolochia mishuyacensis* O.C.Schmidt**
Voucher: Black, G.A. 48-2992 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Aristolochia mossii* S.Moore**
Voucher: Macedo, A. 1733 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Aristolochia nevesarmondiana* Hoehne**
Voucher: Pereira, L.T. 4 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Aristolochia odora* Steud.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17313)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Aristolochia odoratissima* L.**
Voucher: Macedo, A. 613 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aristolochia papillaris* Mast.**
Voucher: Jofili, J.M. 454a (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, BA, AL); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Aristolochia paulistana* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5819)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aristolochia peltatodeltoidea* Hoehne**
Voucher: Pires, J.M. 942 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aristolochia pilosa* Kunth**
Voucher: Eiten, G. 9319 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Aristolochia pohliana* Duch.**
Voucher: Barros, F. 2720 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Aristolochia pubescens* Willd.**
Voucher: Capanema, G.S. 1368 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Aristolochia raja* Mart. & Zucc.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (SP 9526)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aristolochia ridicula* N.E.Brown**
Voucher: Hoehne, F.C. 5789 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Aristolochia robertii* Ahumada**
Voucher: Klein, R.M. 8696 (FLOR, HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Aristolochia rojasiana* (Chodat & Hassl.) F.González**
Voucher: Hatschbach, G. 49258 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Aristolochia rugosa* Lam.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1811 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Aristolochia ruiziana* (Klotzsch) Duch.**
Voucher: Daly, D.C. 6679 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aristolochia sepicola* Mast.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 15(2): 111.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Aristolochia sessilifolia* (Klotzsch) Duch.**
Voucher: Leite, J.E. 245 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Aristolochia setosa* Duch.**
Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasilica 15(2): 138.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Aristolochia silvatica* Barb.Rodr.**
Voucher: Sothers, C.A. 1037 (INPA, MG, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aristolochia smilacina* (Klotzsch) Duch.**
Voucher: Barros, F. 585 (SP 18683, SP 267109)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Aristolochia sprucei* Mast.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9340 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Aristolochia stomachoides* Hoehne**
Voucher: Macedo, A. 1470 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Aristolochia tamnifolia* (Klotzsch) Duch.**
Voucher: Thomas, W.W. 12343 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Aristolochia theriaca* Mart. *ex* Duch.**
Referência: Ahumada, Z. 1977. Darwiniana 21(1): 75.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Aristolochia triangularis* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32748 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Aristolochia trilobata* L.**
Voucher: Barros, F. 1873 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Aristolochia trulliformis* Mast.**
Voucher: Ducke, A. 2024 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI); Amazônia
***Aristolochia urbaniana* Taub.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14229 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Aristolochia urupaensis* Hoehne**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1963 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Aristolochia warmingii* Mast.**
Voucher: Macedo, A. 98 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado
***Aristolochia weddellii* Duch.**
Voucher: Hoehne, F.C. 717 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Aristolochia wendeliana* Hoehne**
Voucher: Hatschbach, G. 40214 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

ASTERACEAE

Jimi Nakajima, Benoit Loeuille, Gustavo Heiden, Massimiliano Dematteis, Eric Koiti Okiyama Hattori, Mara Angelina Galvão Magenta, Mara Rejane Ritter, Cláudio Augusto Mondin, Nadia Roque, Silvana C. Ferreira, Aristônio Magalhães Teles, Rafael Augusto Xavier Borges, Marcelo Monge, João Bernardo de Azevedo Bringel Jr., Caetano Troncoso Oliveira, Polyana Noronha Soares, Gracineide Almeida, Angelo Schneider, Gisela Sancho, Mariana Machado Saavedra, Renata Moura de Liro, Fátima Otavina de Souza-Buturi, Anna Carolina Mendonça Pereira, Marta Dias Moraes
271 gêneros, 1965 espécies (1289 endêmicas), 18 subespécies (12 endêmicas), 39 variedades (17 endêmicas)

Acanthospermum Schrank

Cláudio Augusto Mondin
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Acanthospermum australe* (Loefl.) Kuntze**
Voucher: Mondin, C.A. 2931 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa
***Acanthospermum hispidum* DC.**
Voucher: Rambo, B. 3541 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

Acanthostyles R.M.King & H.Rob.

Eric Koiti Okiyama Hattori
1 espécie (não endêmica)
***Acanthostyles buniifolius* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Matzenbacher, N.I. s.n. (RB 174264)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Achyrocline (Less.) DC.

Benoit Loeuille
17 espécies (6 endêmicas)
***Achyrocline alata* (Kunth) DC.**
Voucher: Reitz, R. 9183 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Achyrocline albicans* Griseb.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. s.n. (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Achyrocline anabelae* Deble**
Voucher: Ritter, M.R. 484 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Achyrocline candicans* (Kunth) DC.**
Voucher: Gottsberger, I. 138 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Achyrocline crassiuscula* (Malme) Deble & Marchiori**
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Achyrocline disjuncta* Hemsl.**
Voucher: Alves, R.J.V. 4447 (HUEFS, MBM, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Achyrocline flaccida* (Weinm.) DC.**
Voucher: Jesus, N.G. 1336 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Achyrocline gertiana* Deble & Marchiori**
Voucher: Chagas, F. 767 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Achyrocline glandulosa* Blake**
Voucher: Hatschbach, G. 2151 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Achyrocline luisiana* Deble**
Voucher: Fernandes, I. 637 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Achyrocline marchiorii* Deble**
Voucher: Falkenberg, D.B. s.n. (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Achyrocline mathiolaefolia* DC.**
Voucher: Deble, L.P. 3811 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Achyrocline ribasiana* Deble & Marchiori**
Voucher: Ferreira, V.F. 1847 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Achyrocline satureioides* (Lam.) DC.**
Voucher: Belém, R.P. 2845 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Achyrocline tombadorensis* Deble & Marchiori**
Voucher: Pinto, G.C.P. 512 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Achyrocline vargasiana* DC.**
Voucher: Ganev, W. 524 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Achyrocline vauthieriana* DC.**
Voucher: Bautista, H.P. 2110 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Acilepidopsis H.Rob.

Massimiliano Dematteis
1 espécie (não endêmica)
***Acilepidopsis echitifolia* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 34203 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Acmella Rich. *ex* Pers.

Cláudio Augusto Mondin, Mara Angelina Galvão Magenta, Jimi Nakajima
13 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Acmella alba* (L'Hér.) R.K.Jansen**
Voucher: Mori, S.A. 9865 (NYBG)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Acmella bellidioides* (Sm.) R.K.Jansen**
Voucher: Mondin, C.A. 254 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa
***Acmella brachyglossa* Cass.**
Voucher: Gardner, G. 3866 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Acmella ciliata* (Kunth) Cass.**
Voucher: Mendonça, R.C. 4017 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Acmella decumbens* (Sm.) R.K.Jansen**
Distribuição: nativa; não endêmica
Acmella decumbens* (Sm.) R.K.Jansen var. *decumbens
Voucher: Hatschbach, G. 76331 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Acmella leptophylla* (DC.) R.K.Jansen**
Voucher: Mondin, C.A. 2385 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado, Pampa
***Acmella oleracea* (L.) R.K.Jansen**
Voucher: Ferreira, L. 92 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (CE, RN, PB, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Acmella oppositifolia* (Lam.) R.K.Jansen**
Voucher: Scarda, F.M. 21 (INPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Acmella paniculata* (Wall. *ex* DC.) R.K.Jansen**
Voucher: Harley, R.M. 21979 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Acmella psilocarpa* R.K.Jansen**
Voucher: Mondin, C.A. 2500 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Acmella pusilla* (Hook. & Arn.) R.K.Jansen**
Voucher: Lindeman, J.C. s.n. (ICN 8426)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Pampa
***Acmella serratifolia* R.K.Jansen**
Voucher: Mondin, C.A. 2688 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acmella uliginosa* (Sw.) Cass.**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 2252 (HVASF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado

Acritopappus R.M.King & H.Rob.

Jimi Nakajima
16 espécies (16 endêmicas)
***Acritopappus buiquensis* Bautista & D.J.N.Hind**
Voucher: Andrade, A.P. 277 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Acritopappus catolesensis* D.J.N.Hind & Bautista**
Voucher: Hind, D.J.N. H51333 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Acritopappus confertus* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Gardner, G. 1974 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE); Caatinga
***Acritopappus connatifolius* (Soar.Nunes) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Mori, S.A. 13221 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Acritopappus diamantinicus* Bautista et al.**
Voucher: Bautista, H.P. 2922 (HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Acritopappus harleyi* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 15554 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Acritopappus heterolepis* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3123 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Acritopappus irwinii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 23621 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Acritopappus longifolius* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Gardner, G. 4863 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Acritopappus micropappus* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3700 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Acritopappus morii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8172 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Acritopappus pintoi* Bautista & D.J.N.Hind**
Voucher: Bautista, H.P. 2200 (HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Acritopappus prunifolius* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 32394 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Acritopappus santosii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 19350 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Acritopappus subtomentosus* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 28506 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Acritopappus teixeirae* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 20075 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Adenostemma J.R.Forst. & G.Forst.

Eric Koiti Okiyama Hattori, Gracineide Almeida
6 espécies (4 endêmicas)
***Adenostemma brasilianum* (Pers.) Cass.**
Voucher: Moraes, M.D. 16 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Adenostemma fosbergii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Daly, D.C. 8572 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Adenostemma goyazense* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Silva, F.C. 160 (IBGE, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Adenostemma involucratum* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 2700 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Adenostemma platyphyllum* Cass.**
Voucher: Daly, D.C. 10272 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Adenostemma suffruticosum* Gardner**
Voucher: Barbosa, A.A.A. 3380 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

Ageratum L.

Jimi Nakajima
4 espécies (2 endêmicas)
***Ageratum candidum* G.M.Barroso**
Voucher: Pabst, G.F.J. 8328 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Ageratum conyzoides* L.**
Voucher: Boog s.n. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Ageratum fastigiatum* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Gardner, G. 4837 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Ageratum myriadenium* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Warming, E. 402 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

Agrianthus Mart. *ex* DC.

Silvana C. Ferreira
8 espécies (8 endêmicas)
***Agrianthus almasensis* D.J.N.Hind**
Voucher: Harley, R.M. 19699 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Agrianthus carvalhoi* D.J.N.Hind**
Voucher: Souza, V.C. 26280 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Agrianthus empetrifolius* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Ferreira, S.C. 335 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Agrianthus giuliettiae* D.J.N.Hind**
Voucher: Ferreira, S.C. 321 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Agrianthus luetzelburgii* Mattf.**
Voucher: Pirani, J.R. 2174 (HUEFS, K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Agrianthus microlicioides* Mattf.**
Voucher: Queiroz, L.P. 4345 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Agrianthus myrtoides* Mattf.**
Voucher: Ganev, W. 1881 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Agrianthus pungens* Mattf.**
Voucher: Hind, D.J.N. 4214 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Albertinia Spreng.

Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Albertinia brasiliensis* Spreng.**
Voucher: Harley, R.M. 26493 (F, MBM, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Alomiella R.M.King & H.Rob.

Eric Koiti Okiyama Hattori
2 espécies (2 endêmicas)
***Alomiella hatschbachii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 36137 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Alomiella regnellii* (Malme) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Prance, G.T. 19364 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Ambrosia L.

Cláudio Augusto Mondin, Jimi Nakajima
8 espécies (1 endêmica)
***Ambrosia artemisiaefolia* L.**
Voucher: Prance, G.T. 8306 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Ambrosia cumanensis* Kunth**
Voucher: Hill, S.R. 13178 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Ambrosia elatior* L.**
Voucher: Mondin, C.A. 2944 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Ambrosia microcephala* DC.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 7523 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, PE); Amazônia, Caatinga
***Ambrosia peruviana* Willd.**
Voucher: Daly, D.C. 7992 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Ambrosia polystachya* DC.**
Voucher: Camargo, O. 3036 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado
***Ambrosia scabra* Hook. & Arn.**
Voucher: Mattos, J.R. 5764 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Ambrosia tenuifolia* Spreng.**
Voucher: Mondin, C.A. 2899 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

Anteremanthus H.Rob.

Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Anteremanthus hatschbachii* H.Rob.**
Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 9700 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Apopyros G.L.Nesom

Rafael Augusto Xavier Borges, Gustavo Heiden, Aristônio Magalhães Teles
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Apopyros corymbosus* (Hook. & Arn.) G.L.Nesom**
Voucher: Irwin, H.S. 29591 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Apopyros warmingii* (Baker) G.L.Nesom**
Voucher: Barroso, G.M. 529 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Arrojadocharis Mattf.

Silvana C. Ferreira
2 espécies (2 endêmicas)
***Arrojadocharis praxeloides* (Mattf.) Mattf.**
Voucher: Campos, G.L. 146 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Arrojadocharis santosii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8143 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Artemisia L.

Angelo Schneider
1 espécie (não endêmica)
***Artemisia vulgaris* L.**
Voucher: Brito, Y. s.n. (RB 195762)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Aspilia Thouars

Jimi Nakajima, Cláudio Augusto Mondin

65 espécies (57 endêmicas)

***Aspilia albuquerquei* J.U.Santos**
Voucher: Miranda, C.A. 83 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aspilia almasensis* D.J.N.Hind**
Voucher: Harley, R.M. 27287 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Aspilia andrade-limae* J.U.Santos**
Voucher: Fernandes, A. s.n. (HPB 3457)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga

***Aspilia attenuata* (Gardner) Baker**
Voucher: Macedo, A. 4418 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Aspilia belo-horizontinae* J.U.Santos**
Voucher: Heringer, E.P. 6509 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia bishoplecta* H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8584 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia bonplandiana* (Gardner) S.F.Blake**
Voucher: Gardner, G. 2218 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA); Caatinga

***Aspilia camporum* Chodat**
Voucher: Macedo, A. 4085 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia caudata* J.U.Santos**
Voucher: Badini, J. s.n. (RB 163203)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia cavalcantei* J.U.Santos**
Voucher: Prance, G.T. 5898 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Cerrado

***Aspilia cearensis* J.U.Santos**
Voucher: Loefgren, A. 183 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Aspilia clausseniana* Baker**
Voucher: Sampaio, A.J. 6549 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Aspilia cordifolia* J.U.Santos**
Voucher: Hatschbach, G. 27798 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia cylindrocephala* H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 27007 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia diamantinae* J.U.Santos**
Voucher: Brade, A.C. 13542 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia diffusiflora* H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 35649 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia diniz-cruzeanae* J.U.Santos**
Voucher: Cruz, N.D. 6426 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia discolor* J.U.Santos**
Voucher: Philcox, D. 4100 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Aspilia duarteana* J.U.Santos**
Voucher: Duarte, A.P. 8160 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia eglerii* J.U.Santos**
Voucher: Egler, W.A. s.n. (RB 59679)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia elata* Pilg.**
Voucher: Eiten, G. 4039 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia erosa* J.U.Santos**
Voucher: Shepherd, G.J. 3820 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia espinhacensis* J.U.Santos**
Voucher: Irwin, H.S. 23136 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia floribunda* (Gardner) Baker**
Voucher: Mendonça, R.C. 4188 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Aspilia foliacea* (Spreng.) Baker**
Voucher: Barroso, G.M. 521 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa

***Aspilia foliosa* (Gardner) Baker**
Voucher: Barreto, H.L.M. 4094 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Aspilia fruticosa* (Gardner) Baker**
Voucher: Romero, R. 5237 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Aspilia glaziovii* Baker**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18318 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia goiazensis* J.U.Santos**
Voucher: Guimarães, J.G. 48 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aspilia grazielae* J.U.Santos**
Voucher: Barroso, G.M. s.n. (RB 117472)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Aspilia hatschbachii* J.U.Santos**
Voucher: Hatschbach, G. 35983 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Aspilia heringeriana* H.Rob.**
Voucher: Heringer, E.P. 11466 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aspilia hispidantha* H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8761 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Aspilia ioletae* J.U.Santos**
Voucher: Irwin, H.S. 21339 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Aspilia itabaianensis* J.U.Santos**
Voucher: Andrade-Lima, D. 62-4104 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (SE); Caatinga

***Aspilia jolyana* G.M.Barroso**
Voucher: Joly, A.B. 1098 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia jugata* H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 8930 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Aspilia kunthiana* (Gardner) S.F.Blake**
Voucher: Gardner, G. 3846 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Aspilia laevissima* (Less. *ex* Baker) Baker**
Voucher: Nakajima, J.N. 522 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Aspilia latissima* Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 2705 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Pantanal
***Aspilia leucoglossa* Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 1160 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Aspilia martii* Baker**
Voucher: Azevedo, M.L.M. 1165 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado
***Aspilia matogrossensis* J.U.Santos**
Voucher: Moraes, E.C.C. 134 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Aspilia montevidensis* (Spreng.) Kuntze**
Voucher: Mondin, C.A. 799 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Aspilia ovalifolia* (DC.) Baker**
Voucher: Rizzo, J.A. s.n. (UFG 703)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Aspilia ovatifolia* (DC.) Baker**
Voucher: Vauthier, M. 521 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Aspilia paraensis* (Huber) J.U.Santos**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8052)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Aspilia pascalioides* Griseb.**
Voucher: Mondin, C.A. 2903 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Aspilia pereirae* J.U.Santos**
Voucher: Pereira, E. 8963 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Aspilia phyllostachya* Baker**
Voucher: Irwin, H.S. 24625 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Aspilia platyphylla* (Baker) S.F.Blake**
Voucher: Ratter, J.A. 3973 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Aspilia podophylla* Baker**
Voucher: Burchell, W.J. 9070 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Aspilia pohlii* (Sch.Bip. *ex* Baker) Baker**
Voucher: Pohl, J.B.E. 499 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Aspilia procumbens* Baker**
Voucher: Pohl, J.B.E. 327 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN); Caatinga
***Aspilia prostrata* J.U.Santos**
Voucher: King, R.M. 8442 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Aspilia pseudoyedaea* H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 15792 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Aspilia reflexa* (Sch.Bip. *ex* Baker) Baker**
Voucher: Romero, R. 3115 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado
***Aspilia reticulata* Baker**
Voucher: Daniel, T.F. 2324 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Aspilia riedelii* Baker**
Voucher: Nakajima, J.N. 1514 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
***Aspilia rubra* Aristeg.**
Voucher: Pires, J.M. 820 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Aspilia silphioides* (Hook. & Arn.) Benth. & Hook.**
Voucher: Silva, J.S. 127 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Aspilia squarrosa* Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 42847 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Aspilia subpetiolata* Baker**
Voucher: Magalhães, G.M. 19144 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Aspilia subscandens* J.U.Santos**
Voucher: Pabst, G.F.J. 8422 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Aspilia warmingii* Baker**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21549 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

Asteropsis Less.

Gustavo Heiden, Aristônio Magalhães Teles
1 espécie (não endêmica)
***Asteropsis megapotamica* (Spreng.) Marchesi et al.**
Voucher: Pereira, E. 8494 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Austrobrickellia R.M.King & H.Rob.

Jimi Nakajima
2 espécies (1 endêmica)
***Austrobrickellia bakerianum* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Giulietti, A.M. s.n. (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Austrobrickellia patens* (D.Don *ex* Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Referência: Hooker,J.D. & Arnott 1835. Companion Bot. Mag. 1:242.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Austrocritonia R.M.King & H.Rob.

Eric Koiti Okiyama Hattori

4 espécies (4 endêmicas)

***Austrocritonia angulicaulis* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pifano, D.S. 218 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Austrocritonia rosea* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Martinelli, G. 13200 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Austrocritonia taunayana* (Glaz. *ex* B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Quinet, A. 817 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Austrocritonia velutina* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Sendulsky, T. 901 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Austroeupatorium R.M.King & H.Rob.

Gracineide Almeida

11 espécies (5 endêmicas)

***Austroeupatorium albescens* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Heringer, E.P. 8330 (GO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Austroeupatorium apense* (Chodat) King & H.Rob.**
Voucher: Proença, C.E. s.n. (GO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Austroeupatorium inulaefolium* (Kunth) King & H.Rob.**
Voucher: Almeida, G.S.S. 656 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Austroeupatorium laetevirens* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Reitz, R. 2964 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Austroeupatorium morii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Mori, S.A. 13646 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Austroeupatorium neglectum* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Silva, J.M. 532 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Austroeupatorium paulinum* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Gaudichaud, C. 498 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Austroeupatorium petrophilum* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Brade, A.C. 20279 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Austroeupatorium picturatum* (Malme) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Mattos, J.R. 23414 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Austroeupatorium rosmarinaceum* (Cabrera & Vittet) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Rau, G. s.n. (RB 42304)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Pampa

***Austroeupatorium silphiifolium* (Mart.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Vidal, M.R.R. 224 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

Ayapana Spach

Eric Koiti Okiyama Hattori

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Ayapana amygdalina* (Lam.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Barbosa, A.A.A. 2084 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Ayapana lanceolata* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Strudwick, J.J. 3907 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ayapana triplinervis* (M.Vahl) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35650)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Ayapanopsis R.M.King & H.Rob.

Eric Koiti Okiyama Hattori

1 espécie (1 endêmica)

***Ayapanopsis oblongifolia* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ferreira, S.C. 354 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Baccharis L.

Gustavo Heiden, Angelo Schneider

149 espécies (95 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Baccharis albilanosa* A.S.Oliveira & Deble**
Voucher: Deble, L.P. 5109 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Baccharis aliena* (Spreng.) Joch.Müll.**
Voucher: Heiden, G. 935 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis alleluia* A.S.Oliveira & Deble**
Voucher: Giulietti, A.M. s.n. (SPF 18425)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Baccharis alpestris* Gardner**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16206 (R, ramo à direita)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Baccharis altimontana* G.Heiden et al.**
Voucher: Brade, A.C. 12510 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Baccharis angusticeps* Dusén *ex* Malme**
Voucher: Dusén, P.K.H. 8: 303 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Baccharis anomala* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 44614 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis aphylla* (Vell.) DC.**
Voucher: Brade, A.C. 12959 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis apicifoliosa* A.A.Schneid. & Boldrini**
Voucher: Schneider, A.A. 1542 (ICN, K, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis arassatubaensis* Malag.**
Voucher: Hatschbach, G. 7078 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Baccharis arenaria* Baker**
Voucher: Maria, I.E. 10688 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Baccharis articulata* (Lam.) Pers.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 8249 (HB, PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis axillaris* DC.**
Voucher: Dombrowski, L.T. 472 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis bifrons* Baker**
Voucher: Heiden, G. 917 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Baccharis brevifolia* DC.**
Voucher: Lund, P. 849 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis breviseta* DC.**
Voucher: Nunes, S. 211 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis burchellii* Baker**
Voucher: Heiden, G. 926 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Baccharis calvescens* DC.**
Voucher: Reitz, R. 2984 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis caprariifolia* DC.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12857 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis ciliata* Gardner**
Voucher: Heiden, G. 797 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Baccharis cinerea* DC.**
Voucher: Heiden, G. 952 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Baccharis cognata* DC.**
Voucher: Hoehne, W. 2053 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis concinna* G.M.Barroso**
Voucher: Pereira, E. 2924 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Baccharis conyzoides* (Less.) DC.**
Voucher: Rambo, B. 48917 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis coridifolia* DC.**
Voucher: Pott, A. 40 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis coronata* Giuliano**
Voucher: Reitz, R. 2422 (HBR, LP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Baccharis crassipappa* Deble & A.S.Oliveira**
Voucher: Hatschbach, G. 77696 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Baccharis crispa* Spreng.**
Voucher: Silva, L.A.M. 931 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis cultrata* Baker**
Voucher: Hagelund, K. 13487 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis curitybensis* Heering *ex* Malme**
Voucher: Reitz, R. 10034 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Baccharis deblei* A.S.Oliveira & Marchiori**
Voucher: Smith, L.B. 10455 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis dentata* (Vell.) G.M.Barroso**
Voucher: Brade, A.C. 12657 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis dracunculifolia* DC.**
Voucher: Reitz, R. 563 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis dubia* Deble & A.S.Oliveira**
Voucher: Brade, A.C. 16970 (JE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Baccharis dunensis* A.A.Schneid. & G.Heiden**
Voucher: Heiden, G. 1053 (HECT, ICN, JE, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Baccharis elliptica* Gardner**
Voucher: Brade, A.C. 560 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Baccharis erigeroides* DC.**
Voucher: Fonseca, M.L. 2115 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis erioclada* DC.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 4112 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis flexuosiramosa* A.A.Schneid. & Boldrini**
Voucher: Schneider, A.A. 1419 (ICN, K, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis friburgensis* G.Heiden et al.**
Voucher: Vieira, C.M. 48 (FCAB, GUA, NY, R, RB, RBR, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Baccharis genistifolia* DC.**
Voucher: Sellow, F. 117 (P, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Baccharis gibertii* Baker**
Voucher: Maria, E. s.n. (SP 76652)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Baccharis glaziovii* Baker**
Voucher: Hemmendorff, E. 662 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis glutinosa* Pers.**
Voucher: Schessl, M. 3404 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Baccharis gnaphalioides* Spreng.**
Voucher: Teodoro Luis 3133 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Baccharis gracilis* DC.**
Voucher: Pilger, R.K.F. 50 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis grandimucronata* Malag.**
Voucher: Brade, A.C. 14589 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Baccharis helichrysoides* DC.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 14 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis hirta* DC.**
Voucher: Sellow, F. 384 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis humilis* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Roth, L. 1495 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Baccharis hyemalis* Deble**
Voucher: Deble, L.P. 499 (CNPO, ICN, MBM, PACA, SI, SMDB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Baccharis hypericifolia* Baker**
Voucher: Rambo, B. 35088 (MBM, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis incisa* Hook. & Arn.**
Voucher: Kummrow, R. 374 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis inexpectata* Deble & A.S.Oliveira**
Voucher: Deble, L.P. 9344 (CTES, MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Baccharis intermixta* Gardner**
Voucher: Heiden, G. 731 (JE, K, PEL, RB, RBR, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis itatiaiae* Wawra**
Voucher: Brade, A.C. 14090 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis jocheniana* G.Heiden & Macias**
Voucher: Sacco, J.C. 567 (PEL, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis junciformis* DC.**
Voucher: Heiden, G. 728 (JE, K, R, RB, RBR, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis lateralis* Baker**
Voucher: Heiden, G. 714 (JE, K, PEL, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis leucocephala* Dusén**
Voucher: Dombrowski, L.T. 4741 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis leucopappa* DC.**
Voucher: Meireles, L.D. 2402 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis ligustrina* DC.**
Voucher: Brade, A.C. 21176 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis linearifolia* (Lam.) Pers.**
Voucher: Porto, L. 316 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Baccharis longiattenuata* A.S.Oliveira**
Voucher: Klein, R.M. 5909 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis lychnophora* Gardner**
Voucher: Forzza, R.C. 3341 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis lymanii* G.M.Barroso *ex* G.Heiden**
Voucher: Reitz, R. 10184 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Baccharis macrophylla* Dusén**
Voucher: Heiden, G. 828 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Baccharis malmei* Joch.Müll.**
Voucher: Hatschbach, G. 1992 (IPA, MBM, PEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis maritima* Baker**
Voucher: Heiden, G. 1199 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis maxima* Baker**
Voucher: Heiden, G. 980 (JE, K, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Baccharis megapotamica* Spreng.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Baccharis megapotamica* Spreng. var. *megapotamica
Voucher: Heiden, G. 787 (PEL, R, RB, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis megapotamica* var. *weirii* (Baker) G.M.Barroso**
Voucher: Reitz, R. 13512 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis mesoneura* DC.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (R 151905)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis microcephala* (Less.) DC.**
Voucher: Reitz, R. 10984 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis microdonta* DC.**
Voucher: Heiden, G. 703 (JE, K, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis milleflora* (Less.) DC.**
Voucher: Rambo, B. 8608 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis minutiflora* Mart. *ex* Baker**
Voucher: Harley, R.M. 22545 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Baccharis montana* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 3303 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis multifolia* A.S.Oliveira et al.**
Voucher: Oliveira, A.S. 5589 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Baccharis myricifolia* DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 18685 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis notosergila* Griseb.**
Voucher: Döbereiner, J. 838 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Pampa, Pantanal
***Baccharis nummularia* Heering *ex* Malme**
Voucher: Smith, L.B. 10137 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis oblongifolia* (Ruiz & Pav.) Pers.**
Voucher: Hatschbach, G. 2283 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis ochracea* Spreng.**
Voucher: Bueno, O. 1383 (HAS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis opuntioides* Mart. *ex* Baker**
Voucher: Moreira, A.X. 44 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Baccharis orbiculata* Deble & A.S.Oliveira**
Voucher: Ganev, W. 997 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Baccharis orbygniana* Klatt**
Voucher: Hatschbach, G. 30018 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado
***Baccharis oreophila* Malme**
Voucher: Hatschbach, G. 34555 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Baccharis organensis* Baker**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6034 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis oxyodonta* DC.**
Voucher: Esteves, R.L. 2152 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis palustris* Heering**
Voucher: Rambo, B. 52024 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis pampeana* A.S.Oliveira et al.**
Voucher: Falkenberg, D.B. 5008 (PEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Baccharis paranensis* Heering & Dusén**
Voucher: Dusén, P.K.H. 3667 (R,S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis parvidentata* Malag.**
Voucher: Heiden, G. 838 (JE, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Baccharis patens* Baker**
Voucher: Araújo, D.S.D. 1259 (GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis paucifloscula* DC.**
Voucher: Sellow, F. 486 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Baccharis penningtonii* Heering**
Voucher: Sacco, J.C. 808 (HAS, HB, PACA, PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Baccharis pentaptera* (Less.) DC.**
Voucher: Dutra, J. 1250 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis pentodonta* Malme**
Voucher: Bueno, O. 2635 (HAS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis petraea* Heering**
Voucher: Montes, J.E. 2472 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis phylicifolia* DC.**
Voucher: Brade, A.C. 6639 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis phyteumoides* (Less.) DC.**
Voucher: Schneider, A.A. 1559 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Baccharis platypoda* DC.**
Voucher: Heiden, G. 783 (JE, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis pohlii* (Baker) Deble & A.S.Oliveira**
Voucher: Roth, L. 1623 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Baccharis polyphylla* Gardner**
Voucher: Harley, R.M. 19686 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Baccharis psammophila* Malme**
Voucher: Hatschbach, G. 79144 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Baccharis pseudo-alpestris* Malag.**
Voucher: Martius, C.F.P. 1479 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Baccharis pseudomyriocephala* Malag.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8130 (G, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Baccharis pseudovaccinioides* Malag.**
Voucher: Brade, A.C. 12507 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Baccharis pseudovillosa* Malag. & Vidal**
Voucher: Sehnem, A. 4255 (HUCS, PACA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis psiadioides* (Less.) Joch.Müll.**
Voucher: Klein, R.M. 9226 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis punctulata* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 2204 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis quitensis* Kunth**
Voucher: Roth, L. 1358 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Baccharis ramboi* G.Heiden & Macias**
Voucher: Rambo, B. 46155 (ICN, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis regnellii* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Brade, A.C. 21175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Baccharis reticularia* DC.**
Voucher: Marquete, R. 3736 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis retusa* DC.**
Voucher: Magalhães, G.M. 1536 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis riograndensis* Malag. & Vidal**
Voucher: Vidal, J.E. 37006 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis rivularis* Gardner**
Voucher: Hatschbach, G. 36865 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Baccharis rufidula* (Spreng.) Joch.Müll.**
Voucher: Brade, A.C. 19248 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis sagittalis* (Less.) DC.**
Voucher: Harley, R.M. 27311 (CEPEC, K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17065 (BR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Baccharis scabrifolia* G.Heiden**
Voucher: Rambo, B. 4392 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis selloi* Baker**
Voucher: Klein, R.M. 3464 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis semiserrata* DC.**
Voucher: Pereira, E. 6388 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis serrula* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Magalhães, G.M. 1622 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Baccharis serrulata* (Lam.) Pers.**
Voucher: Braga, J.M.A. 7458 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis sessiliflora* Vahl**
Voucher: Hatschbach, G. 26725 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis singularis* (Vell.) G.M.Barroso**
Voucher: Reitz, R. 3174 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis sphenophylla* Dusén *ex* Malme**
Voucher: Dusén, P.K.H. 3988 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis spicata* (Lam.) Baill.**
Voucher: Hatschbach, G. 32799 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis stylosa* Gardner**
Voucher: Becker, J. 110 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Baccharis subdentata* DC.**
Voucher: Toledo, F.T. 300 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis suberectifolia* A.S.Oliveira & Deble**
Voucher: Hatschbach, G. 51875 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Baccharis subtropicalis* G.Heiden**
Voucher: Heiden, G. 696 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis tarchonanthoides* DC.**
Voucher: Brade, A.C. 12691 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis tridentata* Vahl**
Voucher: Hatschbach, G. 23599 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Baccharis trilobata* A.S.Oliveira & Marchiori**
Voucher: Smith, L.B. 14934 (FLOR, HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Baccharis trinervis* (Lam.) Pers.**
Voucher: Góes, O.C. 670 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Baccharis trineura* Soria & Zardini**
Voucher: Sellow, F. 816 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Baccharis truncata* Gardner**
Voucher: Pabst, G.F.J. 3672 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Baccharis uleana* Malag.**
Voucher: Ule, E.H.G. 1510 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis uncinella* DC.**
Voucher: Meireles, L.D. 3293 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis urvilleana* Brongn.**
Voucher: Reitz, R. 758 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis vincifolia* Baker**
Voucher: Schneider, A.A. 1428 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis vismioides* DC.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Baccharis vitis-idaea* Oliv. *ex* Thurn**
Voucher: Luetzelburg, P. 21673 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Baccharis vulneraria* Baker**
Voucher: Reitz, R. 8185 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Baccharis wagenitzii* (F.H.Hellw.) Joch.Müll.**
Voucher: Rambo, B. 54522 (B, HBR, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Baccharis xiphophylla* Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 27960 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Bahianthus R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
1 espécie (1 endêmica)
***Bahianthus viscosus* (Spreng.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ferreira, S.C. 274 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Baltimora L.

João Bernardo de Azevedo Bringel Jr., Mara Angelina Galvão Magenta
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Baltimora geminata* (Brandegee) Stuessy**
Voucher: Silva, M.A. 4307 (CEN, IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Baltimora recta* L.**
Voucher: Pereira, R. 242CW (IPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Barnadesia Mutis

Mariana Machado Saavedra
1 espécie (não endêmica)
***Barnadesia caryophylla* (Vell.) S.F.Blake**
Voucher: Regnell, A.F. 190 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Barrosoa R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
6 espécies (4 endêmicas)
***Barrosoa apiculata* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pereira, E. 4470 (HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Barrosoa atlantica* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Silva, N.T. 58403 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Barrosoa betonicaeformis* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ferreira, S.C. 379 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Barrosoa candolleana* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Schessl, M. 3302 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Barrosoa organensis* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Saavedra, M.M. 348 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Barrosoa ramboi* (Cabrera) King & Rob.**
Voucher: Reitz, R. 6411 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Cerrado

Bejaranoa R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
1 espécie (1 endêmica)
***Bejaranoa semistriata* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Queiroz, L.P. 1229 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Berroa Beauverd

Benoit Loeuille
1 espécie (não endêmica)
***Berroa gnaphalioides* (Less.) Beauverd**
Voucher: Deble, L.P. 3011 (CNPO, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Bidens L.

Cláudio Augusto Mondin, João Bernardo de Azevedo Bringel Jr., Jimi Nakajima
14 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Bidens alba* (L.) DC.**
Voucher: Mondin, C.A. 2296 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Bidens bipinnata* L.**
Voucher: Mondin, C.A. 686 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Bidens cynapiifolia* Kunth**
Voucher: Ferreira, L. 140 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AC), Nordeste; Amazônia, Cerrado
***Bidens edentula* G.M.Barroso**
Voucher: Anderson, W.R. 7195 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Bidens flagellaris* Baker**
Voucher: Irwin, H.S. 14592 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Bidens gardneri* Baker**
Voucher: Bernacci, L.C. 1677 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Bidens goiana* B.L.Turner**
Voucher: Turner, B.L. 9125 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Bidens graveolens* Mart.**
Voucher: Nakajima, J.N. 843 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Bidens laevis* (L.) Britton et al.**
Voucher: Mondin, C.A. 2517 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Bidens pilosa* L.**
Voucher: Mondin, C.A. 1995 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Bidens rubifolia* Kunth**
Voucher: Heringer, E.P. 1198 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado
***Bidens segetum* Mart. *ex* Colla**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Bidens segetum* var. *patula* (Gardner) Sherff**
Voucher: Gardner, G. 4254 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
Bidens segetum* Mart. *ex* Colla var. *segetum
Voucher: Romero, R. 2277 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Bidens squarrosa* Less.**
Voucher: Magenta, M.A.G. 11 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Bidens subalternans* DC.**
Voucher: Mondin, C.A. 2556 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Bishopalea H.Rob.

Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Bishopalea erecta* H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8729 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Bishopiella R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
1 espécie (1 endêmica)
***Bishopiella elegans* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ferreira, S.C. 400 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Blainvillea Cass.

Mara Angelina Galvão Magenta, Cláudio Augusto Mondin
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Blainvillea acmella* (L.) Philipson**
Voucher: Bringel, J.B.A. 310 (CEN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Blainvillea dichotoma* (Murray) Stewart**
Voucher: Viana, G. 1033 (UFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Blanchetia DC.

Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Blanchetia heterotricha* DC.**
Voucher: Loeuille, B. 394 (HAW, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

Brickellia Elliott

Jimi Nakajima

1 espécie (não endêmica)

***Brickellia diffusa* (Vahl) A.Gray**

Referência: Gray, A. 1852. Smithsonian Contr. Bot. 35:86.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Caatinganthus H.Rob.

Gracineide Almeida, Massimiliano Dematteis

2 espécies (2 endêmicas)

***Caatinganthus harleyi* H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 21507 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Caatinganthus rubropappus* (Soar.Nunes) H.Rob.**

Voucher: Sacramento, A.C. 784 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE); Caatinga

Calea L.

Cláudio Augusto Mondin, João Bernardo de Azevedo Bringel Jr.

53 espécies (41 endêmicas)

***Calea abbreviata* Pruski & Urbatsch**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1071 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Calea acaulis* Baker**

Voucher: Moreira Fº, H. 60 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Calea anomala* Hassl.**

Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1987. Brittonia 39: 201-204.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Calea brittoniana* Pruski**

Voucher: Romero, R. 850 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calea candolleana* (Gardner) Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 71001 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Calea clausseniana* Baker**

Voucher: Romero, R. 855 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Calea clematidea* Baker**

Voucher: Mondin, C.A. 2751 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Calea coronopifolia* Sch.Bip. *ex* Krasch.**

Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1988. Brittonia 40: 341-356.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Calea cuneifolia* DC.**

Voucher: Romero, R. 4539 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Calea cymosa* Less.**

Voucher: Mondin, C.A. 2431 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Calea elongata* (Gardner) Baker**

Voucher: Sevilha, A.C. 3602 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido

***Calea ferruginea* Sch.Bip. *ex* Baker**

Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1987. Brittonia 39: 201-204.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Calea fruticosa* (Gardner) Urbatsch**

Voucher: Nakajima, J.N. 2255 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Calea gentianoides* DC.**

Voucher: Frazão, A. 9910 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Calea graminifolia* Sch.Bip. *ex* Krasch.**

Voucher: Romero, R. 646 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Calea grazielae* J.U.Santos**

Voucher: Joly, A.B. 45 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calea harleyi* H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 15586 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Calea hatschbachii* Pruski & D.J.N.Hind**

Voucher: Hatschbach, G. 61822 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Calea heteropappa* Pruski & Urbatsch**

Voucher: Duarte, A.P. 2618 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calea hispida* (DC.) Baker**

Voucher: Vieira, A.O.S. 12242 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Calea hypericifolia* (Gardner) Baker**

Voucher: Mendonça, R.C. 5364 (IBGE, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Calea irwinii* G.M.Barroso**

Referência: Urbatsch, L.E. et al. 1986. Syst. Bot. 11: 501-514.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Calea kirkbridei* H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 35792 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calea kristiniae* Pruski**

Voucher: Mondin, C.A. 702 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Calea lantanoides* Gardner**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 7856 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Calea lemmatioides* Sch.Bip. *ex* Baker**

Referência: Urbatsch, L.E. et al. 1986. Syst. Bot. 11: 501-514.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calea lutea* Pruski & Urbatsch**

Voucher: Silva, M.N. 76 (INPA, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Calea mediterranea* (Vell.) Pruski**

Referência: Pruski 2005. Sida 21: 2023-2037.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Calea microphylla* (Gardner) Baker**

Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1987. Brittonia 39: 201-204.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Calea multiplinervia* Less.**
Voucher: Romero, R. 4748 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Calea myrtifolia* (DC.) Baker**
Voucher: Nakajima, J.N. 2974 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Pampa
***Calea nervosa* G.M.Barroso**
Voucher: Hatschbach, G. 70475 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Calea nitida* Less.**
Referência: Urbatsch, L.E. et al. 1986. Syst. Bot. 11: 501-514.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Calea oxylepis* Baker**
Referência: Urbatsch, L.E. et al. 1986. Syst. Bot. 11: 501-514.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Calea papposa* Malme**
Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1988. Brittonia 40: 341-356.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Calea parvifolia* (DC.) Baker**
Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1988. Brittonia 40: 341-356.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Calea phyllolepis* Baker**
Voucher: Mondin, C.A. 2520 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Calea pinheiroi* H.Rob.**
Voucher: Sevilha, A.C. 4369 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Calea pinnatifida* (R.Br.) Less.**
Voucher: Mondin, C.A. 2373 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Calea pohliana* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Eiten, G. 3528 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado
***Calea polycephala* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1147 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Calea purpurea* G.M.Barroso**
Voucher: Anderson, W.A. 36632 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Calea quadrifolia* Pruski & Urbatsch**
Voucher: Pastore, J.F.B. 265 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Domínio desconhecido
***Calea ramosissima* Baker**
Voucher: Romero, R. 661 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Calea rotundifolia* (Less.) Baker**
Referência: Urbatsch, L.E. et al. 1986. Syst. Bot. 11: 501-514.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Calea semirii* Pruski & D.J.N.Hind**
Voucher: Mello-Silva, R. 10804 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Calea serrata* Less.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1274 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Calea sickii* (G.M.Barroso) Urbatsch et al.**
Voucher: Bringel, J.B.A. 106 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Calea teucriifolia* (Gardner) Baker**
Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1987. Brittonia 39: 201-204.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Calea tridactylita* Sch.Bip. *ex* Krasch.**
Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1988. Brittonia 40: 341-356.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Calea uniflora* Less.**
Voucher: Mondin, C.A. 2563 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa
***Calea villosa* Sch.Bip. *ex* Baker**
Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1987. Brittonia 39: 201-204.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Calea wedelioides* (Baker) S.F.Blake**
Referência: Urbatsch, L.E. et al. 1986. Syst. Bot. 11: 501-514.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Calyptocarpus Less.

Cláudio Augusto Mondin, Mara Angelina Galvão Magenta
1 espécie (não endêmica)
***Calyptocarpus biaristatus* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Mondin, C.A. 303 (HAS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Campovassouria R.M.King & H.Rob.

Eric Koiti Okiyama Hattori
2 espécies (1 endêmica)
***Campovassouria barbosae* H.Rob.**
Voucher: Barbosa, E. 672 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Campovassouria cruciata* (Vell.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Verdi, M. 775 (FURB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Campuloclinium DC.

Silvana C. Ferreira
15 espécies (11 endêmicas)
***Campuloclinium alternifolium* Gardner**
Referência: Baker, J.G. 1876. Fl. bras. 6(2):1995.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Campuloclinium arenarium* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 1048 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Campuloclinium burchellii* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12910 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Campuloclinium campuloclinioides* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Rodrigues-da-Silva, R. 374 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Campuloclinium chlorolepis* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Batalha, M.A. 109 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Campuloclinium eiteniorum* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Eiten, G. 2592 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Campuloclinium hatschbachii* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 66355 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Campuloclinium hirsutum* Gardner**
Voucher: Anderson, W.R. 7621 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Campuloclinium irwinii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 8543 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Campuloclinium macrocephalum* (Less.) DC.**
Voucher: Souza, V.C. 10397 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado
***Campuloclinium megacephalum (*Mart. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Brade, A.C. 5474 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Campuloclinium parvulum* (Glaz.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Loefgren, A. 2333 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Campuloclinium purpurascens* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Garcia, R.J.F. 504 (HRBC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado
***Campuloclinium riedelii* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Macedo, A. 105 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado
***Campuloclinium tubaracense* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**
Referência: King, R.M. & Robinson, H. 1972. Phytologia 24(3): 172.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Catolesia D.J.N.Hind

Silvana C. Ferreira
2 espécies (2 endêmicas)
***Catolesia huperzioides* Roque et al.**
Voucher: Conceição, A.A. 1804 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Catolesia mentiens* D.J.N.Hind**
Voucher: Ferreira, S.C. 360 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Cavalcantia R.M.King & H.Rob.

Jimi Nakajima
2 espécies (2 endêmicas)
***Cavalcantia glomerata* (G.M.Barroso & R.M.King) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Cavalcante, P. 2084 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Cavalcantia percymosa* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Alvarenga, M. s.n. (RB 90531)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Cerrado

Centratherum Cass.

Gracineide Almeida, Massimiliano Dematteis
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Centratherum camporum* (Hassl.) Malme**
Voucher: Smith, L.B. 118 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Centratherum punctatum* Cass.**
Voucher: Almeida, G.S.S. 797 (HUNEB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Cephalopappus Nees & Mart.

Nadia Roque
1 espécie (1 endêmica)
***Cephalopappus sonchifolius* Nees & Mart.**
Voucher: Santos, T.S. 4131 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Chacoa R.M.King & H.Rob.

Eric Koiti Okiyama Hattori
1 espécie (não endêmica)
***Chacoa pseudoprasiifolia* (Hassl.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Klein, R.M. 5691 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Chaptalia Vent.

Marcelo Monge, Nadia Roque
15 espécies (9 endêmicas)
***Chaptalia araneosa* Casar.**
Referência: Hind, D.J.N. 1999. Kew Bull. 54(4):933-939.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Chaptalia chapadensis* D.J.N.Hind**
Referência: Hind, D.J.N. 1999. Kew Bull. 54 (4):933-939.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chaptalia cipoensis* Roque**
Voucher: Semir, J. CFSC 4758 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chaptalia cordifolia* (Baker) Cabrera**
Voucher: Reitz, R. 6754 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Chaptalia denticulata* (Baker) Zardini**
Referência: Hind, D.J.N. 1999. Kew Bull. 54(4):933-939.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado
***Chaptalia excapa* (Pers.) Baker**
Referência: Burkart, A.E. 1944. Darwiniana 6:505-594.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Chaptalia graminifolia* (Dusén) Cabrera**
Voucher: Souza, V.C. 4071 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Chaptalia hermogenis* M.D.Moraes**
Voucher: Cordeiro, I. 1450 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Chaptalia integerrima* (Vell.) Burkart**
Voucher: Koch, I. 26324 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chaptalia mandonii* Sch.Bip. *ex* Burkart**
Voucher: Martins, F.R. 297 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Chaptalia martii* (Baker) Zardini**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 21365 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chaptalia nutans* (L.) Pol.**
Voucher: Pickel, B.J. (IPA 10471, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chaptalia piloselloides* (Vahl) Baker**
Voucher: Queiroz, L.P. 2721 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Mata Atlântica
***Chaptalia runcinata* Kunth**
Voucher: Ule, E.H.G. 1265 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Chaptalia sinuata* (Less.) Baker**
Voucher: Reitz, R. 13577 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Chevreulia Cass.

Benoit Loeuille
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Chevreulia acuminata* Less.**
Voucher: Hatschbach, G. 2829 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Chevreulia sarmentosa* (Pers.) Blake**
Voucher: Reitz, R. 13349 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Chionolaena DC.

Benoit Loeuille
8 espécies (7 endêmicas)
***Chionolaena arbuscula* DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 29310 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chionolaena capitata* (Baker) Freire**
Voucher: Martinelli, G. 7762 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Chionolaena isabellae* Baker**
Voucher: Brade, A.C. 757 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Chionolaena jeffreyi* H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 19677 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chionolaena latifolia* (Benth.) Baker**
Voucher: Brade, A.C. 15597 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Chionolaena lychnophorioides* Sch.Bip.**
Voucher: Macedo, A. 2801 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chionolaena phylicoides* (Gardner) Baker**
Voucher: Pereira, E. 208 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Chionolaena wittigiana* Baker**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 5896 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Chresta Vell. *ex* DC.

Benoit Loeuille, Massimiliano Dematteis
14 espécies (13 endêmicas)
***Chresta amplexifolia* Dematt. et al.**
Voucher: Pereira, A.C. 15 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chresta angustifolia* Gardner**
Voucher: MacLeish, N.F. 735 (GA,UB,US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chresta curumbensis* (Philipson) H.Rob.**
Voucher: Bernacci, L.C. 2518 (ESA, IAC, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Chresta exsucca* DC.**
Voucher: Rosa, R.F. 68 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Chresta harleyi* H.Rob.**
Voucher: Loeuille, B. 377 (HAW, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Chresta hatschbachii* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 67804 (BHCB, HUEFS, MBM, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Chresta martii* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 16358 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga

***Chresta pinnatifida* (Philipson) H.Rob.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12812 (BR, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chresta plantaginifolia* (Less.) Gardner**
Voucher: Nakajima, J.N. 4240 (HUFU, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Chresta pycnocephala* DC.**
Voucher: Fiaschi, P. 841 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Chresta scapigera* (Less.) Gardner**
Voucher: Anderson, W.R. 10059 (NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Chresta souzae* H.Rob.**
Voucher: Fonseca, M.L. 551 (IBGE, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chresta speciosa* Gardner**
Voucher: Marquete, R. 2673 (IBGE, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chresta sphaerocephala* DC.**
Voucher: Sakane, M. 515 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Chromolaena DC.

Caetano Troncoso Oliveira
71 espécies (45 endêmicas)
***Chromolaena adenolepis* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 51215 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica
***Chromolaena alvimii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 19617 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Chromolaena angusticeps* (Malme) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Brade, A.C. 19484 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Chromolaena arrayana* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Miyagi, P.H. 612 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado
***Chromolaena ascendens* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hashimoto, G. 198 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena asperrima* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Fonseca, M.L. 231 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Chromolaena barbacensis* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 66473 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena barrosoae* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 22797 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chromolaena brunneola* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Arantes, A.A. 1171 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chromolaena caaguazuensis* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 14513 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Chromolaena callilepis* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Brinker, J. 5512 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena campestris* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Meira-Neto, J.A.A. 482 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Chromolaena chaseae* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Magalhães, F.M.R. 18 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Chromolaena christieana* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 49125 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Chromolaena cinereoviridis* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Duarte, A.P. 9922 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena congesta* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Bicudo, L.R.H. 627 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena costatipes* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Romero, R. 3734 (HUFU, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chromolaena cryptantha* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 23052 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena cylindrocephala* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Lombardi, J.A. 3695 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Chromolaena decumbens* Gardner**
Voucher: Lombardi, J.A. 2475 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena elliptica* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Brade, A.C. 7136 (NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena epaleacea* Gardner**
Voucher: Heringer, E.P. 5515 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Chromolaena extensa* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Gardner, G. 4214 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chromolaena ferruginea* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Martinelli, G. 4805 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Chromolaena gentianoides* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2739 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chromolaena hirsuta* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Grombone, M.T. 21432 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena horminoides* DC.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 4239 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena ivaefolia* (L.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 10172 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena kleinii* (Cabrera) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 12163 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Chromolaena laevigata* (Lam.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pinheiro, M.H.O. 299 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena latisquamulosa* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 3227 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Chromolaena leucocephala* Gardner**
Voucher: s.col. 28 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Chromolaena lilacina* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Cervi, A.C. 3261 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Chromolaena margaritensis* (Hassl.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 74621 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Mata Atlântica
***Chromolaena mattogrossensis* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 62707 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Chromolaena maximilianii* (Schrad. *ex* DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Kinoshita, L.S. 13588 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena minasgeraesensis* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Prado, P. s.n. (UEC 129922)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena morii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Bautista, H.P. 404 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Caatinga, Cerrado
***Chromolaena mucronata* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 16228 (INPA, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF); Cerrado
***Chromolaena myriadenia* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 24812 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chromolaena myriocephala* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Mileski, E. 62 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Chromolaena odorata* (L.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Meira-Neto, J.A.A. 575 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Chromolaena orbignyana* (Klatt) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 916 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Chromolaena oxylepis* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Loefgren, A. 4288 (R, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena palmaris* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 256 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Chromolaena parviceps* (Malme) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 3123 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Chromolaena pedalis* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Cordeiro, I. 1299 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena pedunculosa* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Rezende, A.A. 38 (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Chromolaena perforata* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Almeida, G.S.S. 472 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chromolaena pharcidodes* (B.L.Rob. *ex* Gleason) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 362313)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Chromolaena picta* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 15024 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chromolaena porphyrolepis* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Duarte, A.P. 8161 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Chromolaena pseudinsignis* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 36333 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Chromolaena punctulata* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Rosa, N.A. 2341 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Chromolaena pungens* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Bicudo, L.R.H. 865 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Chromolaena revoluta* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Gardner, G. 3247 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
***Chromolaena rhinanthacea* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Brade, A.C. 5707 (R, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Chromolaena sagittifera* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Roque, N. 113 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chromolaena squalida* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Joly, A.B. 781 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena squarroso-ramosa* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pott, A. 4847 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Chromolaena squarrulosa* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Wasum, R. 934 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena stachyophylla* (Spreng.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Loefgren, A. 220 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Chromolaena tecta* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Sobral, M. 3991 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, ES), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Chromolaena thurnii* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Prance, G.T. 9892 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Chromolaena tyleri* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Maguire, B. 29531 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Chromolaena ulei* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Reitz, R. 10469 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Chromolaena umbelliformis* (Dusén) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 16925 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Chromolaena verbenacea* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 13004 (NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Chromolaena verticillata* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Duarte, A.P. 7562 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chromolaena vindex* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Duarte, A.P. 7974 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Chromolaena xylorhiza* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Freitas, L. 835 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Chronopappus DC.

Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Chronopappus bifrons* (DC. *ex* Pers.) DC.**
Voucher: Loeuille, B. 465 (K, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chrysanthellum Rich.

Jimi Nakajima
nenhuma espécie, 1 variedade (não endêmica)
***Chrysanthellum indicum* var. *afroamericanum* B.L.Turner**
Voucher: Irwin, H.S. 24451 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Chrysolaena H.Rob.

Massimiliano Dematteis
15 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Chrysolaena campestris* (DC.) Dematt.**
Voucher: Roque, N. 13005 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Chrysolaena cognata* (Less.) Dematt.**
Voucher: Hagelund, K. 10076 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Chrysolaena cristobaliana* Dematt.**
Voucher: Hatschbach, G. 33804 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Chrysolaena desertorum* (Mart. *ex* DC.) Dematt.**
Voucher: Souza, V.C. 24369 (CTES, ESA, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Chrysolaena dusenii* (Malme) Dematt.**
Voucher: Souza, V.C. 2247 (ESA, MBM, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Chrysolaena flexuosa* (Sims) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 74597 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado
***Chrysolaena lithospermifolia* (Hieron.) H.Rob.**
Voucher: Rambo, B. 31126 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Chrysolaena nicolackii* H.Rob.**
Voucher: Dombrowski, L.T. 14458 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Chrysolaena obovata* (Less.) Dematt.**
Voucher: Oliveira, P.I. 46 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Chrysolaena oligophylla* (Vell.) H.Rob.**
Voucher: Dombrowski, L.T. 4095 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado
***Chrysolaena platensis* (Spreng.) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 32009 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado
***Chrysolaena propinqua* (Hieron.) H.Rob.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Chrysolaena propinqua* var. *canescens* (Chodat) Dematt.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 10925a (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado
Chrysolaena propinqua* (Hieron.) H.Rob. var. *propinqua
Voucher: Souza, V.C. 31935 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado
***Chrysolaena sceptrum* (Chodat) Dematt.**
Voucher: Krapovickas, A. 34393 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Chrysolaena simplex* (Less.) Dematt.**
Voucher: Hatschbach, G. 54623 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Chrysolaena verbascifolia* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Rambo, B. 51957 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado

Cirsium Mill.

Angelo Schneider
1 espécie (não endêmica)
***Cirsium vulgare* (Savi) Ten.**
Voucher: Schneider, A.A. 1178 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Clibadium L.

Mara Angelina Galvão Magenta
3 espécies (1 endêmica)
***Clibadium armani* (Balb.) Sch.Bip. *ex* O.E.Schulz**
Voucher: Souza, V.C. 10811 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Clibadium surinamense* L.**
Voucher: Hoffman, B. 491 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Clibadium sylvestre* (Aubl.) Baill.**
Voucher: Daly, D.C. 8805 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Cololobus H.Rob.

Massimiliano Dematteis
3 espécies (2 endêmicas)
***Cololobus hatschbachii* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 58012 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cololobus longiangustatus* (G.M.Barroso) H.Rob.**
Voucher: Brade, A.C. 18328 (RB, S)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Cololobus rupestris* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Meirelles, S.T. 20669 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Conocliniopsis R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
1 espécie (1 endêmica)
***Conocliniopsis prasiifolia* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ferreira, S.C. 234 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Caatinga, Cerrado

Conyza Less.

Aristônio Magalhães Teles, Rafael Augusto Xavier Borges, Gustavo Heiden
12 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Conyza blakei* (Cabrera) Cabrera**
Voucher: Pereira, E. 5494 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Conyza bonariensis* (L.) Cronquist**
Voucher: Duarte, A.P. 4206 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Conyza canadensis* (L.) Cronquist**
Voucher: Morency, M. 1287 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Conyza catharinensis* Cabrera**
Voucher: Smith, L.B. 7487 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Conyza glandulitecta* Cabrera**
Voucher: Reitz, R. 12252 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Conyza laevigata* (Rich.) Pruski**
Voucher: Daly, D.C. 11038 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Conyza macrophylla* Spreng.**
Voucher: Reitz, R. 8195 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Conyza monorchis* (Griseb.) Cabrera**
Voucher: Markgraf, F. 10292 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Conyza primulifolia* (Lam.) Cuatrec. & Lourteig**
Voucher: Braga, J.M.A. 4519 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Conyza reitziana* Cabrera**
Voucher: Smith, L.B. 10421 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Conyza retirensis* Cabrera**
Voucher: Klein, R.M. 5865 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Conyza sumatrensis* (Retz.) E.Walker**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Conyza sumatrensis* var. *leiotheca* (S.F.Blake) Pruski & G.Sancho**
Voucher: Hatschbach, G. 33557 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Conyza sumatrensis* (Retz.) E.Walker var. *sumatrensis
Voucher: Hatschbach, G. 2199 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Coreopsis L.

Cláudio Augusto Mondin
1 espécie (não endêmica)
***Coreopsis lanceolata* L.**
Voucher: Mondin, C.A. 2984 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Cosmos Cav.

Cláudio Augusto Mondin
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Cosmos bipinnatus* Cav.**
Voucher: Lucchini, F. 76 (IAC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado
***Cosmos caudatus* Kunth**
Voucher: Felippe, G.M. 157 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Cosmos sulphureus* Cav.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1042 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Cotula L.

Angelo Schneider
1 espécie (não endêmica)
***Cotula coronopifolia* L.**
Voucher: Porto, M. 1642 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

Criscia Katinas

Nadia Roque
1 espécie (1 endêmica)
***Criscia stricta* (Spreng.) Katinas**
Voucher: Mimura, I. 210 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Critonia P.Browne

Eric Koiti Okiyama Hattori
1 espécie (não endêmica)
***Critonia morifolia* (Mill.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Malme, G.O.A. 2059 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Critoniopsis Sch.Bip.

Gracineide Almeida, Massimiliano Dematteis
3 espécies (3 endêmicas)
***Critoniopsis magdalenae* (G.M.Barroso) H.Rob.**
Voucher: Brade, A.C. 14190 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Critoniopsis quinqueflora* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Kuniyoshi, Y.S. 5915 (HRCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Critoniopsis stellata* (Spreng.) H.Rob.**
Voucher: Brade, A.C. 16587 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Cyanthillium Blume

1 espécie (não endêmica)
***Cyanthillium cinereum* (L.) H.Rob.**
Voucher: Leoni, L.S. 485 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Cyrtocymura H.Rob.

Polyana Noronha Soares
4 espécies (2 endêmicas)
***Cyrtocymura harleyi* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Mori, S.A. 9933 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Cyrtocymura lanuginosa* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Amorim, A.M. 4106 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Cyrtocymura mattos-silvae* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Mori, S.A. 10197 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Cyrtocymura scorpioides* (Lam.) H.Rob.**
Voucher: Romero, R. 7828 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado

Dasyanthina H.Rob.

Polyana Noronha Soares
2 espécies (2 endêmicas)
***Dasyanthina palustris* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 46743 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Domínio desconhecido
***Dasyanthina serrata* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Magalhães, G.M. 4472 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Dasycondylus R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
7 espécies (7 endêmicas)
***Dasycondylus debeauxii* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 8966 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Dasycondylus hirsutissimus* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Góes, O.C. 209 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Dasycondylus platylepis* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 361 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dasycondylus regnellii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Regnell, A.F. 715 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Dasycondylus resinosus* (Spreng.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Mattos, J.R. 15914a (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Dasycondylus riedelii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Riedel, L. s.n. (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dasycondylus santosii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Santos, T.S. 1713 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Dasyphyllum Kunth

Mariana Machado Saavedra
21 espécies (15 endêmicas), 6 variedades (4 endêmicas)
***Dasyphyllum brasiliense* (Spreng.) Cabrera**
Distribuição: nativa; não endêmica
Dasyphyllum brasiliense* (Spreng.) Cabrera var. *brasiliense
Voucher: Brade, A.C. 17026 (LP, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Dasyphyllum brasiliense* var. *latifolium* (D.Don) Cabrera**
Voucher: Macedo, A. 1155 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dasyphyllum candolleanum* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Saavedra, M.M. 985 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dasyphyllum cryptocephalum* (Baker) Cabrera**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12841 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dasyphyllum donianum* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Saavedra, M.M. 995 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Dasyphyllum flagellare* (Casar.) Cabrera**
Voucher: Brade, A.C. 16553 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Dasyphyllum floribundum* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Gardner, G. 4952 (B, P, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Dasyphyllum fodinarum* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Pirani, J.R. 716 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Dasyphyllum lanceolatum* (Less.) Cabrera**
Voucher: Hoehne, F.C. 2348 (BAF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Dasyphyllum latifolium* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Rojas, T. 6728 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Dasyphyllum leptacanthum* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Gardner, G. 5791 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dasyphyllum orthacanthum* (DC.) Cabrera**
Voucher: Simoens, S. 20 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Dasyphyllum reticulatum* (DC.) Cabrera**
Voucher: Saavedra, M.M. 526 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Dasyphyllum spinescens* (Less.) Cabrera**
Voucher: Reitz, R. 6684 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Dasyphyllum sprengelianum* (Gardner) Cabrera**
Distribuição: nativa; endêmica
***Dasyphyllum sprengelianum* var. *inerme* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Gardner, G. 4944 (BM, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Dasyphyllum sprengelianum* (Gardner) Cabrera var. *sprengelianum
Voucher: Duarte, A.P. 2660 (LP, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Dasyphyllum synacanthum* (Baker) Cabrera**
Voucher: Sarti, S.J. 8477 (MBM, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Dasyphyllum tomentosum* (Spreng.) Cabrera**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Dasyphyllum tomentosum* var. *multiflorum* (Baker) Cabrera**
Voucher: Hatschbach, G. 978 (MBM, S, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
Dasyphyllum tomentosum* (Spreng.) Cabrera var. *tomentosum
Voucher: Hatschbach, G. 14567 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Dasyphyllum trichophyllum* (Baker) Cabrera**
Voucher: Saavedra, M.M. 578 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Dasyphyllum vagans* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Campos-Porto, P. 266 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Dasyphyllum varians* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Gardner, G. 4949 (FI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Dasyphyllum velutinum* (Baker) Cabrera**
Voucher: Teles, A.M. 452 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Dasyphyllum vepreculatum* (D.Don) Cabrera**
Voucher: Pinto, G.C.P. 56-66 (IAL, LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Delilia Spreng.

Mara Angelina Galvão Magenta
1 espécie (não endêmica)
***Delilia biflora* (L.) Kuntze**
Voucher: Guedes, A.P. 36 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Caatinga

Dendrophorbium (Cuatrec.) C.Jeffrey

Rafael Augusto Xavier Borges
12 espécies (11 endêmicas)
***Dendrophorbium brachycodon* (Baker) C.Jeffrey**
Voucher: Brade, A.C. 19333 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Dendrophorbium bradei* (Cabrera) C.Jeffrey**
Voucher: Rizzini, C.T. 358 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dendrophorbium catharinense* (Dusén *ex* Cabrera) C.Jeffrey**
Voucher: Hatschbach, G. 78274 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Dendrophorbium fastigiaticephalum* (Cabrera) C.Jeffrey**
Voucher: Brade, A.C. 20955 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Dendrophorbium fruticosum* (Vell.) C.Jeffrey**
Voucher: Esteves, R.L. 2159 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Dendrophorbium glaziovii* (Baker) C.Jeffrey**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 86 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Dendrophorbium limosum* C.Jeffrey**
Voucher: Ribas, O.S. 3175 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Dendrophorbium paranense* (Malme) Matzenb. & Baptista**
Voucher: Dusén, P.K.H. 6733 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Dendrophorbium pellucidinerve* (Sch.Bip. *ex* Baker) C.Jeffrey**
Voucher: Campos-Porto, P. 719 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Dendrophorbium pluricephalum* (Cabrera) C.Jeffrey**
Voucher: Hatschbach, G. 49342 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Dendrophorbium restingae* A.M.Teles et al.**
Voucher: Cordeiro, I. 1531 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Dendrophorbium subnemoralis* (Dusén) A.M.Teles**
Voucher: Sobral, M. 7668 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Diacranthera R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
3 espécies (3 endêmicas)
***Diacranthera crenata* (Schltdl. *ex* Mart.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Melo, E. 3010 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Diacranthera hebeclinia* H.Rob.**
Voucher: Carvalho, A.M. 6125 (CEPEC, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Diacranthera ulei* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Queiroz, L.P. 13755 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Mata Atlântica

Dimerostemma Cass.

Jimi Nakajima, Marta Dias Moraes, Cláudio Augusto Mondin

20 espécies (12 endêmicas)

***Dimerostemma annuum* (Hassl.) H. Rob.**
Voucher: Moraes, M.D. 629 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Dimerostemma apense* (Chodat) M.D.Moraes**
Voucher: Moraes, M.D. 631 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Dimerostemma arnottii* (Baker) M.D.Moraes**
Voucher: Moraes, M.D. 444 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Dimerostemma asperatum* S.F.Blake**
Voucher: Nakajima, J.N. 2227 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Dimerostemma aspilioides* (Griseb.) M.D.Moraes**
Referência: Moraes, M.D. et al. 2007. Phytologia 89:117.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Dimerostemma bahiense* (H.Rob.) M.D.Moraes**
Voucher: Moraes, M.D. 448 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Dimerostemma bishopii* H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8803 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Dimerostemma brasilianum* Cass.**
Voucher: Moraes, M.D. 405 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Dimerostemma episcopale* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8633 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Dimerostemma goyazense* (Gardner) M.D.Moraes**
Voucher: Mendonça, R.C. 4097 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Dimerostemma grazielae* H.Rob.**
Voucher: Bridgewater, S. 196 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dimerostemma humboldtianum* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Romero, R. 3658 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Dimerostemma lippioides* (Baker) S.F.Blake**
Voucher: Heringer, E.P. 6369 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Dimerostemma myrtifolium* (Chodat) M.D.Moraes**
Voucher: Hatschbach, G. 58625 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Dimerostemma oblongum* (Gardner) M.D.Moraes**
Voucher: Irwin, H.S. 23093 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dimerostemma pseudosilphioides* (Hassl.) M.D.Moraes**
Voucher: Moraes, M.D. 634 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Dimerostemma reitzii* (H.Rob.) M.D.Moraes**
Voucher: Moraes, M.D. 432 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Dimerostemma retifolium* (Sch.Bip. *ex* Baker) S.F.Blake**
Voucher: Batalha, M.A. 2246 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado

***Dimerostemma vestitum* (Baker) S.F.Blake**
Voucher: Romero, R. 4805 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Dimerostemma virgosum* H.Rob.**
Voucher: Paula, J.E. de 1627 (COR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Dissothrix A.Gray

Jimi Nakajima

1 espécie (1 endêmica)

***Dissothrix imbricata* (Gardner) B.L.Rob.**
Voucher: Gardner, G. 1744 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Disynaphia

Eric Koiti Okiyama Hattori

14 espécies (9 endêmicas)

***Disynaphia achillaea* (Chodat) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 49059 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Disynaphia calyculata* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ribas, O.S. 1789 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Disynaphia ericoides* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 2447 (ESA, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Disynaphia filifolia* (Hassl.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ribas, O.S. 5052 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC); Mata Atlântica, Pantanal

***Disynaphia halimifolia* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 53818 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Disynaphia ligulifolia* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Cordeiro, J. 2021 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Disynaphia littoralis* (Cabrera) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Silva, J.M. 3522 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Disynaphia minutiflora* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 19573 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Disynaphia multicrenulata* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Verdi, M. 483 (FURB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Disynaphia praeficta* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 73609 (FURB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Disynaphia radula* (Chodat) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pereira, E. 7938 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Disynaphia senecionidea* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Romero, R. 568 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Disynaphia spathulata* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 79067 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Disynaphia variolata* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Dombrowski, L.T. 11229 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Echinocoryne H.Rob.

Polyana Noronha Soares, Massimiliano Dematteis
6 espécies (6 endêmicas)
***Echinocoryne echinocephala* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 36861 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Echinocoryne holosericea* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Viegas, A.P. 11137 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Echinocoryne pungens* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Dias, T.A.B. 140 (CEN, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Echinocoryne schwenkiaefolia* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Magalhães, G.M. 1567 (BHCB, CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Echinocoryne stricta* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 4292 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Echinocoryne subulata* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Fonseca, M.L. 292 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Eclipta L.

Cláudio Augusto Mondin
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Eclipta elliptica* DC.**
Voucher: Mondin, C.A. 2929 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Eclipta megapotamica* (Spreng.) Sch.Bip. *ex* S.F.Blake**
Voucher: Mondin, C.A. 2729 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Eclipta prostrata* (L.) L.**
Voucher: Mondin, C.A. 2713 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Pampa

Egletes Cass.

Rafael Augusto Xavier Borges, Aristônio Magalhães Teles
1 espécie (não endêmica)
***Egletes viscosa* (L.) Less.**
Voucher: Castellanos, A. 25171 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Eitenia R.M.King & H.Rob.

Caetano Troncoso Oliveira
2 espécies (2 endêmicas)
***Eitenia polyseta* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 15645 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Eitenia praxelioides* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Silva, M.G. 4622 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Elaphandra Strother

João Bernardo de Azevedo Bringel Jr.
1 espécie (não endêmica)
***Elaphandra ulei* (Hieron.) H.Rob.**
Voucher: Silva, G.P. 12815 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, TO, RO); Cerrado

Elephantopus L.

Gracineide Almeida, Massimiliano Dematteis
9 espécies (7 endêmicas)
***Elephantopus biflorus* (Less.) Sch.Bip.**
Voucher: Nakajima, J.N. 1241 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Elephantopus elongatus* Gardner**
Voucher: Heringer, E.P. 8129 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Elephantopus erectus* Gleason**
Voucher: Loefgren, A. 4281 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Elephantopus hirtiflorus* DC.**
Voucher: Jesus, N.G. 1640 (HUNEB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado
***Elephantopus micropappus* Less.**
Voucher: Nakajima, J.N. 2371 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado
***Elephantopus mollis* Kunth**
Voucher: Almeida, G.S.S. 124 (VIC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Elephantopus palustris* Gardner**
Voucher: Irwin, H.S. 15356 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Elephantopus racemosus* Gardner**
Voucher: Duarte, A.P. 10168 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Elephantopus riparius* Gardner**
Voucher: Rizzo, J.A. 5410 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Eleutheranthera Poit. *ex* Bosc

Mara Angelina Galvão Magenta
1 espécie (não endêmica)
***Eleutheranthera ruderalis* (Sw.) Sch.Bip.**
Voucher: Philcox, D. 4073 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Domínio desconhecido

Emilia (Cass.) Cass.

Rafael Augusto Xavier Borges
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Emilia fosbergii* Nicolson**
Voucher: Carauta, J.P.P. 3159 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Emilia sonchifolia* (L.) DC. *ex* Wight**
Voucher: Martinelli, G. 2592 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Enydra Lour.

Cláudio Augusto Mondin
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Enydra anagallis* Gardner**
Voucher: Mondin, C.A. 2512 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Enydra radicans* (Willd.) Lack**
Voucher: Harley, R.M. 16266 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga

Epaltes Cass.

Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Epaltes brasiliensis* DC.**
Voucher: França, F. 3103 (HUEFS, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga

Erechtites Raf.

Rafael Augusto Xavier Borges
5 espécies (2 endêmicas)
***Erechtites goyazensis* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Hatschbach, G. 17824 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Erechtites hieracifolius* (L.) Raf. *ex* DC.**
Voucher: Prance, G.T. 7704 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Erechtites ignobilis* Baker**
Voucher: Macedo, A. 4229 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Erechtites missionum* Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 744 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga
***Erechtites valerianifolius* (Wolf) DC.**
Voucher: Sobral, M. 4150 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Eremanthus Less.

Benoit Loeuille
24 espécies (22 endêmicas)
***Eremanthus arboreus* (Gardner) MacLeish**
Voucher: Thomas, W.W. 11676 (HRB, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Cerrado
***Eremanthus argenteus* MacLeish & H.Schumach.**
Voucher: King, R.M. 8897 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eremanthus auriculatus* MacLeish & H.Schumach.**
Voucher: Loeuille, B. 279 (SPF, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Eremanthus brasiliensis* (Gardner) MacLeish**
Voucher: Gardner, G. 2897 (BM, G, GH, K, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Eremanthus capitatus* (Spreng.) MacLeish**
Voucher: Mori, S.A. 11294 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eremanthus cinctus* Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 41221 (ESA, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Eremanthus crotonoides* (DC.) Sch.Bip.**
Voucher: King, R.M. 8519 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Eremanthus elaeagnus* (Mart. *ex* DC.) Sch.Bip.**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1740 (BHCB,SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Eremanthus erythropappus* (DC.) MacLeish**
Voucher: Carmo, F.F. 881 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Eremanthus glomeratus* Less.**
Voucher: Irwin, H.S. 7926 (NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Eremanthus goyazensis* (Gardner) Sch.Bip.**
Voucher: Fonseca, M.L. 69 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Eremanthus graciellae* MacLeish & H.Schumach.**
Voucher: Schumacher, H. 1048 (GA, K, M, MB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Eremanthus hatschbachii* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 48277 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Eremanthus incanus* (Less.) Less.**
Voucher: Souza, V.C. 11848 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Eremanthus leucodendron* Mattf.**
Voucher: Loeuille, B. 347 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Eremanthus mattogrossensis* Kuntze**
Voucher: Irwin, H.S. 16623 (MBM,NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Eremanthus mollis* Sch.Bip.**
Voucher: Irwin, H.S. 13710 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Eremanthus pabstii* G.M.Barroso**
Voucher: Heringer, E.P. 9229/1442 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Eremanthus pohlii* (Baker) MacLeish**
Voucher: Pohl, J.B.E. 556 (GH, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Eremanthus polycephalus* (DC.) MacLeish**
Voucher: Forzza, R.C. 4103 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Eremanthus rondoniensis* MacLeish & H.Schumach.**
Voucher: Silva, M.G. 4590 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Eremanthus seidelii* MacLeish & H.Schumach.**
Voucher: Schumacher, H. 1006 (GA, K, M, MB, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Eremanthus uniflorus* MacLeish & H.Schumach.**
Voucher: King, R.M. 8820 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Eremanthus veadeiroensis* H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 32752 (GH, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Eupatoriopsis Hieron.

Caetano Troncoso Oliveira
1 espécie (1 endêmica)
***Eupatoriopsis hoffmanniana* Hieron.**
Voucher: Regnell, A.F. 684 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Eupatorium L.

Jimi Nakajima
1 espécie (1 endêmica)
***Eupatorium lineatum* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Romero, R. 1537 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Eurydochus Maguire & Wurdack

Nadia Roque
1 espécie (não endêmica)
***Eurydochus bracteatus* Maguire & Wurdack**
Voucher: Maguire, B. 42186 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Facelis Cass.

Benoit Loeuille
1 espécie (não endêmica)
***Facelis retusa* (Lam.) Sch.Bip.**
Voucher: Reitz, R. 3721 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Flaveria Juss.

Jimi Nakajima
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Flaveria bidentis* (L.) Kuntze**
Voucher: Pereira, E. 105 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Flaveria trinervia* (Spreng.) C.Mohr**
Voucher: Hind, D.J.N. 3373 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

Fleischmannia Sch.Bip.

Eric Koiti Okiyama Hattori
5 espécies (2 endêmicas)
***Fleischmannia dissolvens* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 3529 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Fleischmannia laxa* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Damazio, L.B. 1174 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Fleischmannia microstemon* (Cass.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 55312 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC); Mata Atlântica
***Fleischmannia prasiifolia* (Griseb.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Bautista, H.P. 788 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Fleischmannia remotifolia* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Boone, W. 747 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Galinsoga Ruiz & Pav.

Cláudio Augusto Mondin

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Galinsoga parviflora* Cav.**

Voucher: Mondin, C.A. 2711 (PACA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav.**

Voucher: Mondin, C.A. 2593 (PACA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Gamochaeta Wedd.

Benoit Loeuille

20 espécies (8 endêmicas)

***Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd.**

Voucher: Sendulsky, T. 457 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Gamochaeta calviceps* (Fernald) Cabrera**

Voucher: Lorenzi, H. 873 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Gamochaeta camaquensis* Deble**

Voucher: Deble, L.P. 6348 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Gamochaeta coarctata* (Willd.) Kerguélen**

Voucher: Philcox, D. 4340 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Gamochaeta diffusa* Deble & Marchiori**

Voucher: Deble, L.P. 6348 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Gamochaeta erecta* Deble**

Voucher: Deble, L.P. 6350 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Gamochaeta falcata* (Lam.) Cabrera**

Voucher: Klein, R.M. 8753 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Gamochaeta filaginea* (DC.) Cabrera**

Voucher: Valls, J.F.M. 1274 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Gamochaeta girardiana* Deble & A.S.Oliveira**

Voucher: Deble, L.P. 6356 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Gamochaeta grazielae* (Rizzini) Deble**

Voucher: Markgraf, F. 3675 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Gamochaeta hiemalis* Cabrera**

Voucher: Rambo, B. 476 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Gamochaeta nigrevestis* Deble & Marchiori**

Voucher: Ritter, M.R. 763 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Gamochaeta pensylvanica* (Willd.) Cabrera**

Voucher: Lorenzi, H. 880 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Gamochaeta platensis* (Cabrera) Cabrera**

Voucher: Marchett, F. 102 (UCS, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Gamochaeta purpurea* (L.) Cabrera**

Voucher: Irwin, H.S. 2147 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Gamochaeta rizzinii* Cabrera**

Voucher: Rizzini, C.T. 82 (LP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Gamochaeta simplicicaulis* (Willd. *ex* Spreng.) Cabrera**

Voucher: Loeuille, B. 226 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Gamochaeta sphacelata* (Kunth) Cabrera**

Voucher: Lindeman, J.C. 2777 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Gamochaeta stachydifolia* (Lam.) Cabrera**

Voucher: Bueno, O. 1853 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Gamochaeta subfalcata* (Cabrera) Cabrera**

Voucher: Boone, W. 566 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Gardnerina R.M. King & H. Rob.

Jimi Nakajima

1 espécie (1 endêmica)

***Gardnerina angustata* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Gardner, G. 3809 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Gnaphalium L.

Benoit Loeuille

1 espécie (não endêmica)

***Gnaphalium polycaulon* Pers.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13993 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Gochnatia Kunth

Gisela Sancho, Nadia Roque

20 espécies (12 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica)

***Gochnatia argyrea* (Dusén *ex* Malme) Cabrera**

Voucher: Dusén, P.K.H. 4035 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Gochnatia barrosoae* Cabrera**

Voucher: Eiten, G. 8390 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Gochnatia blanchetiana* (DC.) Cabrera**
Voucher: Roque, N. 2071 (ALCB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Gochnatia cordata* Less.**
Voucher: Rambo, R. 41315 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Gochnatia densicephala* (Cabrera) G.Sancho**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11072 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
***Gochnatia discolor* Baker**
Voucher: Claussen, P. s.n. (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gochnatia floribunda* Cabrera**
Voucher: Pereira, B.A.S. 1398 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
***Gochnatia gardneri* (Baker) Cabrera**
Voucher: Gardner, G. 4183 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Gochnatia hatschbachii* Cabrera**
Voucher: Maguire, B. 49194 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Gochnatia haumaniana* Cabrera**
Voucher: Meyer, T. 18770 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Gochnatia mollisima* (Malme) Cabrera**
Voucher: Malme, G.O.A. 1261 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Gochnatia oligocephala* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Zardini, E.M. 1328 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Gochnatia orbiculata* (Malme) Cabrera**
Voucher: Brade, A.C. 5523 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera**
Voucher: Hatschbach, G. 29835 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera**
Distribuição: nativa; não endêmica
Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera subsp. *polymorpha
Voucher: Widgren, A. 245 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Gochnatia pulchra* Cabrera**
Voucher: Brade, A.C. 7108 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Gochnatia ramboi* Cabrera**
Voucher: Krapovickas, A. 14013 (LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (SC, RS); Cerrado, Pampa
***Gochnatia rotundifolia* Less.**
Voucher: Brade, A.C. 5346 (LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado
***Gochnatia sordida* (Less.) Cabrera**
Voucher: Hatschbach, G. 19690 (K, LP, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Gochnatia velutina* (Bong.) Cabrera**
Voucher: Dusén, P.K.H. 4114 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

Gongylolepis R.H.Schomb.

Nadia Roque
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Gongylolepis benthamiana* R.H.Schomb.**
Referência: Steyermark, J.A. et al. 1997. Fl. Venez. Guayana 286.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia, Cerrado
***Gongylolepis martiana* (Baker) Steyerm. & Cuatrec.**
Voucher: Prance, G.T. 22747 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste; Amazônia, Cerrado
***Gongylolepis oblanceolata* Pruski**
Voucher: Silva 7169 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gorceixia Baker

Massimiliano Dematteis
1 espécie (1 endêmica)
***Gorceixia decurrens* Baker**
Voucher: Tameirão-Neto, E. 3308 (BHCB,ESA,US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Goyazianthus R.M.King & H.Rob.

Eric Koiti Okiyama Hattori
1 espécie (1 endêmica)
***Goyazianthus tetrastichus* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21593 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Graphistylis B.Nord.

Rafael Augusto Xavier Borges
9 espécies (9 endêmicas)
***Graphistylis argyrotricha* (Dusén) B.Nord.**
Voucher: Pereira, E. 5687 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Graphistylis cuneifolia* (Gardner) B.Nord.**
Voucher: Occhioni, P. 1038 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Graphistylis dichroa* (Bong.) D.J.N.Hind**
Voucher: Krieger, L. 8640 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Graphistylis itatiaiae* (Dusén) B.Nord.**
Voucher: Marquete, R. 4076 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Graphistylis oreophila* (Dusén) B.Nord.**
Voucher: Brade, A.C. 16620 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Graphistylis organensis* (Casar.) B.Nord.**
Voucher: Farney, C. 798 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Graphistylis riopretensis* A.M.Teles & B.Nord.**
Voucher: Viana, P.L. 1825 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Graphistylis serrana* (Zardini) B.Nord.**
Voucher: Silva, J.M. 4261 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Graphistylis toledoi* (Cabrera) B.Nord.**
Voucher: Brade, A.C. 21046 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Grazielia R.M.King & H.Rob.

Eric Koiti Okiyama Hattori
11 espécies (8 endêmicas)
***Grazielia bishopii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Macedo, A. 4320 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Grazielia coriacea* (Scheele) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Torezan, J.M. 697 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Grazielia dimorpholepis* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Farah, F.T. 620 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Grazielia gaudichaudeana* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 79109 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Grazielia intermedia* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 79082 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Grazielia mollicoma* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Duarte, A.P. 7649 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Grazielia mollissima* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 35590 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Grazielia multifida* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pirani, J.R. 389 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado
***Grazielia nummularia* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Wasum, R. 510 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Grazielia schultzii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Claussen, P. 26 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Grazielia serrata* (Spreng.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 79093 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Grindelia Willd.

Gustavo Heiden, Rafael Augusto Xavier Borges, Aristônio Magalhães Teles
5 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Grindelia buphtalmoides* DC.**
Voucher: Sobral, M. 7957 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Grindelia puberula* Hook. & Arn.**
Voucher: Rambo, B. 48869 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Grindelia pulchella* Dunal**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Grindelia pulchella* var. *discoidea* (Hook. & Arn.) Adr. Bartoli & Tortosa**
Voucher: Hagelund, K. s.n. (ICN 136477)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Grindelia pulchella* Dunal var. *pulchella
Voucher: Bueno, E.A. 1641 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Grindelia rupestris* Adr.Bartoli et al.**
Referência: Oliveira, A.S. et al. 2005. Balduinia 2:1-3.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn.**
Voucher: Rambo, B. 231 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Guaicaia Maguire

Jimi Nakajima
1 espécie (1 endêmica)
***Guaicaia bilabiata* Maguire**
Voucher: Maguire, B. 60475 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Guayania R.M.King & H.Rob.

Jimi Nakajima
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Guayania bulbosa* (Aristeg.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pipoly, J.J. 6664 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Guayania cerasifolia* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Spruce, R. s.n. (INPA 4663)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guayania roupalifolia* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 9888 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gymnanthemum Cass.

Massimiliano Dematteis
1 espécie (não endêmica)
***Gymnanthemum amygdalinum* (Delile) Sch.Bip. *ex* Walp.**
Voucher: Duarte, A.P. 3733 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Gymnocondylus R.M.King & H.Rob.
Eric Koiti Okiyama Hattori
1 espécie (1 endêmica)
***Gymnocondylus galeopsifolius* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 6182 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Gymnocoronis DC.
Gracineide Almeida
1 espécie (não endêmica)
***Gymnocoronis spilanthoides* DC.**
Voucher: Pires, J.M. 58161 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido

Gyptidium R.M.King & H.Rob.
Silvana C. Ferreira
1 espécie (1 endêmica)
***Gyptidium trichobasis* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Reitz, R. 12629 (HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Gyptis (Cass.) Cass.
Silvana C. Ferreira
4 espécies (1 endêmica)
***Gyptis crassipes* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Brade, A.C. 16175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Gyptis lanigera* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Scaramuzza, C.A.M. 192 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Gyptis pinnatifita* Cass.**
Voucher: Souza, V.C. 7336 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Gyptis vernoniopsis* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Barros, F. 2652 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Hatschbachiella R.M.King & H.Rob.
Gracineide Almeida
2 espécies (1 endêmica)
***Hatschbachiella polyclada* (Dusén *ex* Malme) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 177248)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Hatschbachiella tweedieana* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Coimbra, H.K.R. 1667 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Hebeclinium DC.
Silvana C. Ferreira
1 espécie (não endêmica)
***Hebeclinium macrophyllum* (L.) DC.**
Voucher: Prance, G.T. 2890 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, RN, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado

Heterocoma DC.
1 espécie (1 endêmica)
***Heterocoma albida* (DC. *ex* Pers.) DC.**
Voucher: Loeuille, B. 450 (HAW, K, MO, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Heterocondylus R.M.King & H.Rob.
Jimi Nakajima
9 espécies (6 endêmicas)
***Heterocondylus alatus* (Vell.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 3025 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Heterocondylus amphidyctius* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Lund, P. 877 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Heterocondylus decipiens* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Nakajima, J.N. 1620 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Heterocondylus grandis* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pereira, B.A.S. 913 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Heterocondylus jaraguensis* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Holway, E.W.D. 1574 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Heterocondylus lysimachioides* (Chodat) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Balansa, B. 810 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Heterocondylus pumilus* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Gardner, G. 4842 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Heterocondylus reitzii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Reitz, R. 4785 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Heterocondylus vitalbae* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Forero, E. 6408 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, PI, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado

Heterocypsela H.Rob.
Polyana Noronha Soares
1 espécie (1 endêmica)
***Heterocypsela andersonii* H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 9223 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Hieracium L.
Jimi Nakajima
4 espécies (3 endêmicas)
***Hieracium commersonii* Monnier**
Voucher: Brade, A.C. 12947 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Hieracium ignatianum* Baker**
Voucher: Duarte, A.P. 614 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Hieracium stannardii* D.J.N.Hind**
Voucher: Harley, R.M. 26296 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hieracium warmingii* Baker**
Voucher: Anderson, W.R. s.n. (RB 163006)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoehnephytum Cabrera
Rafael Augusto Xavier Borges
3 espécies (3 endêmicas)
***Hoehnephytum almasense* D.J.N.Hind**
Voucher: Irwin, H.S. 32422 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Hoehnephytum imbricatum* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Hind, D.J.N. 4163 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Hoehnephytum trixoides* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Semir, J. 2597 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

Holocheilus Cass.
Marcelo Monge
6 espécies (2 endêmicas)
***Holocheilus brasiliensis* (L.) Cabrera**
Referência: Mondin, C.A. & Vasques, C.L. 2004. Iheringia 59(2): 161-172.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Holocheilus fabrisii* Cabrera**
Referência: Cabrera, A.L. 1968. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 11: 14.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Holocheilus hieracioides* (D.Don) Cabrera**
Referência: Katinas, L. et al. 2008. Bot. Rev. 74: 617.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Holocheilus illustris* (Vell.) Cabrera**
Referência: Katinas, L. et al. 2008. Bot. Rev. 74: 618.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Holocheilus monocephalus* Mondin**
Referência: Katinas, L. et al. 2008. Bot. Rev. 74: 618.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Holocheilus pinnatifidus* (Less.) Cabrera**
Voucher: Kuhlmann, M. 2771 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica

Hololepis DC.
Benoit Loeuille
2 espécies (2 endêmicas)
***Hololepis hatschbachii* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 61125 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Hololepis pedunculata* (DC. *ex* Pers.) DC.**
Voucher: Loeuille, B. 259 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hymenoxis Endl.
Jimi Nakajima
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hymenoxis anthemoides* (Juss.) Cass.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2250 (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica
***Hymenoxis tweediei* Hook. & Arn.**
Voucher: Tweedie, J. 1837 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Hypochaeris L.
Angelo Schneider
11 espécies (2 endêmicas)
***Hypochaeris albiflora* (Kuntze) Azevêdo-Gonç. & Matzenb.**
Voucher: Azevêdo-Gonçalves, C.F. 583 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Hypochaeris catharinensis* Cabrera**
Voucher: Smith, L.B. 11368 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hypochaeris chillensis* (Kunth) Britton**
Voucher: Azevêdo-Gonçalves, C.F. 505 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Hypochaeris gardneri* Baker**
Voucher: Brade, A.C. 16882 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Hypochaeris glabra* L.**
Voucher: Azevêdo-Gonçalves, C.F. 264 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Hypochaeris lutea* (Vell.) Britton**
Voucher: Azevêdo-Gonçalves, C.F. 236 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Hypochaeris megapotamica* Cabrera**
Voucher: Ritter, M.R. 442 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Hypochaeris neopinnatifida* Azevêdo-Gonç. & Matzenb.**
Voucher: Sobral, M. 5272 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Hypochaeris radicata* L.**
Voucher: Azevêdo-Gonçalves, C.F. 537 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Hypochaeris tropicalis* Cabrera**
Voucher: Ritter, M. 456 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker**
Voucher: Azevêdo-Gonçalves, C.F. 494 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

Hysterionica Willd.

Gustavo Heiden, Rafael Augusto Xavier Borges, Aristônio Magalhães Teles
3 espécies (2 endêmicas)
***Hysterionica montevidenis* Baker**
Voucher: Sobral, M. 3915 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Hysterionica pinnatiloba* Matzenb. & Sobral**
Voucher: Larocca, J. 95-17 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Hysterionica pinnatisecta* Matzenb. & Sobral**
Voucher: Matzenbacher, N.I. 1675 (ICN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Ianthopappus Roque & D.J.N.Hind

Nadia Roque
1 espécie (não endêmica)
***Ianthopappus corymbosus* (Less.) Roque & D.J.N.Hind**
Voucher: Wasum, R. s.n. (PACA 73215, UCS 1529, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Ichthyothere Mart.

Jimi Nakajima, Cláudio Augusto Mondin
19 espécies (12 endêmicas)
***Ichthyothere connata* S.F.Blake**
Voucher: Pereira, R.C. 1519 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Ichthyothere cordata* Malme**
Voucher: Eiten, G. 9746 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Ichthyothere cunabi* Mart.**
Voucher: Maia, L.A. 141 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Ichthyothere davidsei* H.Rob.**
Voucher: Plowman, T. 8511 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Cerrado
***Ichthyothere elliptica* H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 8126 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Ichthyothere granvillei* H.Rob.**
Voucher: Egler, W.A. 47651 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); Cerrado
***Ichthyothere hirsuta* Gardner**
Voucher: Pereira, R.C. 1526 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP); Cerrado
***Ichthyothere integrifolia* (DC.) Baker**
Voucher: Nakajima, J.N. 2861 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Ichthyothere latifolia* Baker**
Voucher: Pereira, R.C. 1521 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Ichthyothere linearis* (Benth.) Baker**
Voucher: Pereira, R.C. 1539 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Ichthyothere mattogrossensis* R.C.A.Pereira & Semir**
Voucher: Cabrera, A.L. 30024 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Ichthyothere mollis* Baker**
Voucher: Romero, R. 4661 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Ichthyothere palustris* Malme**
Voucher: Irwin, H.S. 24843 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Ichthyothere pefoliata* R.C.A.Pereira & Semir**
Voucher: Oliveira-Filho, A.T. 221 (VEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Ichthyothere petiolata* H.Rob.**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2727 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Cerrado
***Ichthyothere rufa* Gardner**
Voucher: Pereira, R.C. 1522 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Ichthyothere suffruticosa* Gardner**
Voucher: Prance, G.T. 15137 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO); Cerrado
***Ichthyothere terminalis* (Spreng.) S.F.Blake**
Voucher: Pereira, R.C. 1480 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Ichthyothere ternifolia* Baker**
Voucher: Warming, E. s.n. (INPA (foto 5457))
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Idiothamnus R.M.King & H.Rob.

Eric Koiti Okiyama Hattori
1 espécie (1 endêmica)
***Idiothamnus pseudorgyalis* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Barros, A.M. 2398 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Imeria R.M.King & H.Rob.

Eric Koiti Okiyama Hattori
1 espécie (não endêmica)
***Imeria memorabilis* (Maguire & Wurdack) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Silva, N.T. 60381 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Inulopsis (DC.) O.Hoffm.

Rafael Augusto Xavier Borges, Aristônio Magalhães Teles
3 espécies (1 endêmica)
***Inulopsis camporum* (Gardner) G.L.Nesom**
Voucher: Heringer, E.P. 5058 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Inulopsis scaposa* (DC.) O.Hoffm.**
Voucher: Fontella, J.P. 156 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Inulopsis stenophylla* Dusén**
Voucher: Ribas, O.S. 5043 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Irwinia G.M.Barroso
Benoit Loeuille, Massimiliano Dematteis
1 espécie (1 endêmica)
***Irwinia coronata* G.M.Barroso**
Voucher: Irwin, H.S. 31174 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Isocarpha R.Br.
Jimi Nakajima
2 espécies (1 endêmica)
***Isocarpha megacephala* Mattf.**
Voucher: Zehntner, L. 1913 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); Caatinga
***Isocarpha oppositifolia* (L.) Cass.**
Referência: Keil, D.J. & Stuessy, T.F. 1981. Syst. Bot. 6: 258-287.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

Isostigma Less.
Cláudio Augusto Mondin, Jimi Nakajima
8 espécies (5 endêmicas)
***Isostigma brasiliense* (Gardner) Benth.**
Voucher: Gardner, G. 4253 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado
***Isostigma crithmifolium* Less.**
Voucher: Mondin, C.A. 2949 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Isostigma peucedanifolium* (Spreng.) Less.**
Voucher: Mondin, C.A. 2614 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa
***Isostigma riedelii* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Riedel, L. s.n. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Isostigma scorzoneraefolium* (Baker) Sherff**
Voucher: Malme, G.O.A. 1584 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Isostigma simplicifolium* Less.**
Voucher: Sello, F. 873 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Isostigma sparsifolium* Guad. Peter**
Voucher: Irwin, H.S. 2543 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Isostigma speciosum* Less.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 4345 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

Jaegeria Kunth
Cláudio Augusto Mondin
1 espécie (não endêmica)
***Jaegeria hirta* (Lag.) Less.**
Voucher: Mondin, C.A. 2630 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Jungia L.f.
Marcelo Monge
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Jungia floribunda* Less.**
Voucher: Bernacci, L.C. 24409 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado
***Jungia selowii* Less.**
Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973. Fl. Ilustr. Catarin. 1: 1-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Koanophyllon Arruda
Eric Koiti Okiyama Hattori
13 espécies (10 endêmicas)
***Koanophyllon adamantium* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 68250 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Koanophyllon andersonii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 6344 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Koanophyllon baccharifolium* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Vidal, J. 706 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Koanophyllon conglobatum* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Bautista, H.P. 3121 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Koanophyllon consanguineum* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Fernandes, D. 680 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Koanophyllon eitenii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Heringer, E.P. 14155 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Koanophyllon lobatifolium* (Cabrera) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Vieira, F.C.S. 1792 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Koanophyllon myrtilloides* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 11758 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Koanophyllon simillimum* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 51539 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado
***Koanophyllon solidaginoides* (Kunth) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 76692 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado, Pantanal

***Koanophyllon thysanolepis* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Mello-Silva, R. 2625 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Koanophyllon tinctorium* Arruda *ex* H.Kost.**
Voucher: Barros, A.M. 6339 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Koanophyllon tricephalotes* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Mexia, Y. 4948 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Lactuca L.

Angelo Schneider
1 espécie (não endêmica)
***Lactuca serriola* L.**
Voucher: Kinupp, V. 2469 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Lagascea Cav.

Mara Angelina Galvão Magenta
1 espécie (não endêmica)
***Lagascea mollis* Cav.**
Voucher: Queiroz, R.T. 865 (UFRN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Lasiolaena R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
7 espécies (7 endêmicas)
***Lasiolaena blanchetii* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Blanchet, J.C. 3698 (G, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lasiolaena carvalhoi* D.J.N.Hind**
Voucher: Ganev, W. 1950 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lasiolaena duartei* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ferreira, S.C. 345 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lasiolaena lychnophorioides* Roque et al.**
Voucher: Ferreira, S.C. 343 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Lasiolaena morii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ferreira, S.C. 344 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lasiolaena pereirae* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pereira, E. 2081 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Lasiolaena santosii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ferreira, S.C. 291 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Lepidaploa (Cass.) Cass.

Massimiliano Dematteis, Gracineide Almeida
52 espécies (39 endêmicas)
***Lepidaploa acutiangula* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Gardner, G. 6044 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado
***Lepidaploa adamantium* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Krapovickas, A. 33481 (CTES, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lepidaploa almasensis* (D.J.N.Hind) H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 26328 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Lepidaploa alvimii* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Bautista, H.P. 3312 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Lepidaploa amambaia* H.Rob.**
Voucher: Gomes, J.C. 2294 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Lepidaploa araripensis* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Thomas, W.W. 10018 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Lepidaploa araujoa* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 5338 (GUA, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lepidaploa arenaria* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Bautista, H.P. 3260 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, BA, SE), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Lepidaploa argyrotricha* (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Caliente, A.D. 1754 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Lepidaploa aurea* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Amorim, A.M. 542 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Lepidaploa bahiana* H.Rob.**
Voucher: Melo, E. 1150 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Lepidaploa balansae* (Chodat) H.Rob.**
Voucher: Reitz, R. 8780 (G, HBR, L, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lepidaploa barbata* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 8431 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lepidaploa canescens* (Kunth) H.Rob.**
Voucher: Hoehne, W. 3183 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Lepidaploa chalybaea* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 7302 (ALCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Cerrado
***Lepidaploa chamissonis* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Carneiro, J. 1432 (CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado
***Lepidaploa cleocalderonae* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Calderón, C.E. 2689 (G, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lepidaploa cotoneaster* (Willd. *ex* Spreng.) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 9310 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lepidaploa coulonioides* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Smith, L.B. 6587 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lepidaploa cuiabensis* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 16049 (K, S, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Lepidaploa decumbens* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 55471 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Lepidaploa edmundoi* (G.M.Barroso) H.Rob.**
Voucher: Davis, P.H. 61054 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Lepidaploa eriolepis* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Macedo, A. 4935 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado
***Lepidaploa gnaphalioides* (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 29058 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Lepidaploa gracilis* (Kunth) H.Rob.**
Voucher: MacLeish, N.F. 755 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Lepidaploa grisea* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 3013 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI, BA); Amazônia
***Lepidaploa hagei* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 25966 (CESJ, ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Lepidaploa helophila* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Lepidaploa juruenensis* H.Rob.**
Voucher: Rosa, N.A. 2027 (US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Lepidaploa lilacina* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 20649 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Lepidaploa luetzelburgii* (Mattf.) H.Rob.**
Voucher: Luetzelburg, P. 1327 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI); Caatinga
***Lepidaploa macahensis* (Glaz. *ex* G.M.Barroso) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 49414 (CORD, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Lepidaploa mucronifolia* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 63200 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga
***Lepidaploa muricata* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 68211 (BHCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul; Cerrado
***Lepidaploa nitens* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Carvalho, A.M. 4005 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Lepidaploa obtusifolia* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Riedel, L. 2178 (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lepidaploa paraensis* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Silva, M.G. 3013 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Lepidaploa persericea* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 17865 (CEPEC, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Lepidaploa persicifolia* (Desf.) H.Rob.**
Voucher: Sucre, D. 2593 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lepidaploa pinheiroi* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 19028 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Lepidaploa pseudaurea* (D.J.N.Hind) H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 16836 (LP, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Lepidaploa pseudomuricata* H.Rob.**
Voucher: Reitz, R. 6521 (BR, G, HBR, K, L, LP, PACA, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lepidaploa psilostachya* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 569 (LP, MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Lepidaploa reflexa* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 7330 (ALCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Lepidaploa remotiflora* (Rich.) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 10917 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Lepidaploa rufogrisea* (A.St.-Hil.) H.Rob.**
Voucher: Belém, R.P. 1976 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lepidaploa salzmannii* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 43889 (C, CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado
***Lepidaploa silvae* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Silva, N.T. 4780 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Lepidaploa sororia* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Nakajima, J.N. 2793 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado
***Lepidaploa spixiana* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 11843 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lepidaploa tombadorensis* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 32642 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Lepidaploa vauthieriana* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Almeida, G.S.S. 180 (HUNEB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Leptoclinium Benth.

Jimi Nakajima
1 espécie (1 endêmica)
***Leptoclinium trichotomum* (Gardner) Benth.**
Voucher: Gardner, G. 3831 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Leptostelma D.Don

Aristônio Magalhães Teles, Rafael Augusto Xavier Borges, Gustavo Heiden
4 espécies (2 endêmicas)
***Leptostelma camposportoi* (Cabrera) A.M.Teles & Sobral**
Voucher: Malme, G.O.A. 312 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Leptostelma catharinensis* (Cabrera) A.M.Teles & Sobral**
Voucher: Reitz, R. 7425 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Leptostelma maxima* D.Don**
Voucher: Nadruz, M. 343 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Leptostelma tweediei* (Hook. & Arn.) D.J.N.Hind & G.L.Nesom**
Voucher: Emmerich, M. 2380 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Lessingianthus H.Rob.

Massimiliano Dematteis, Gracineide Almeida
111 espécies (83 endêmicas)
***Lessingianthus adenophyllus* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Giulietti, A.M. 2351 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Lessingianthus ammophilus* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Heringer, E.P. 6464 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Lessingianthus arachniolepis* (Ekman & Dusén) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 2212 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Lessingianthus arctatus* Dematt.**
Referência: Dematteis, M. 2008. Edinburgh Philos. J. 65 (3): 359-368.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus argenteus* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Gibbs, P.E. 1674 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Lessingianthus argyrophyllus* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Brade, A.C. 7101 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lessingianthus asteriflorus* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Mimura, I. 599 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Lessingianthus bakerianus* Dematt.**
Voucher: Irwin, H.S. 26488 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus bardanoides* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Eiten, G. 2851 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Lessingianthus barrosoanus* Dematt.**
Voucher: Irwin, H.S. 14599 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lessingianthus bishopii* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 24768 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Lessingianthus brevifolius* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Krieger, L. 8137 (CESJ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado
***Lessingianthus brevipetiolatus* (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Brade, A.C. 17604 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lessingianthus buddleiifolius* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Arbockz, G. 3291 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lessingianthus bupleurifolius* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Malme, G.O.A. 3361 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Lessingianthus caiapoensis* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 7518 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Lessingianthus carduoides* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 14540 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus carvalhoi* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Carvalho, A.M. 1016 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Lessingianthus cataractarum* (Hieron.) H.Rob.**
Voucher: Ribas, O.S. 6258 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica
***Lessingianthus cephalotes* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Mello-Silva, R. 5768 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
***Lessingianthus chamaepeuces* (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 34637 (LP, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Lessingianthus clavatus* (Gardner) Dematt.**
Voucher: Gardner, G. 4791 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Lessingianthus compactiflorus* (Mart. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 13155 (SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus constrictus* (Matzenb. & Mafiol.) Dematt.**
Voucher: Krapovickas, A. 44722 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Lessingianthus cordiger* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 28283 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus coriaceus* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 4307 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lessingianthus cristalinae* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 13309 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Lessingianthus declivium* (Malme) Dematt.**
Voucher: Souza, V.C. 17170 (ESA, K, UEC, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Lessingianthus durus* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 5065 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado
***Lessingianthus eitenii* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8313 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Lessingianthus elegans* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Heringer, E.P. 3445 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Lessingianthus erythrophilus* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Hoehne, W. 1657 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lessingianthus exiguus* (Cabrera) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 61765 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Lessingianthus farinosus* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Ganev, W. 69 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus floccosus* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Calago, K. 199 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus flotowioides* (Baker) Dematt.**
Voucher: Manso, P.S. 78 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste; Cerrado
***Lessingianthus foliosus* Dematt.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8133 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Lessingianthus fonsecae* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 24698 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Lessingianthus glabratus* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Kuhlmann, M. 1768 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa
***Lessingianthus glaziovianus* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Martinelli, G. 8995 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lessingianthus graminifolius* (Gardner) Dematt.**
Voucher: Irwin, H.S. 20627 (LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus grandiflorus* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Kuhlmann, M. 2864 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Lessingianthus grearii* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 32161 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Lessingianthus hatschbachii* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 61792 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus heringeri* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Mendonça, R.C. 74 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Lessingianthus hoveaefolius* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Bringel, J.B.A. 144 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus hypochaeris* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Reitz, R. 7464 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido
***Lessingianthus ibitipocensis* Borges & Dematt.**
Voucher: Forzza, R.C. 3124 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus intermedius* (DC.) Dematt.**
Voucher: Rambo, B. 28930 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Lessingianthus irwinii* (G.M.Barroso) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 11397 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus lacunosus* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Fonseca, M.L. 3277 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lessingianthus laevigatus* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 26560 (RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus lanatus* (Cabrera) Dematt.**
Voucher: Hatschbach, G. 18797 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Lessingianthus laniferus* (Cristóbal & Dematt.) Angulo**
Voucher: Klein, R.M. 5027 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lessingianthus lanuginosus* Dematt.**
Voucher: Irwin, H.S. 34015 (MBM, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus lapinhensis* Dematt.**
Voucher: Pirani, J.R. 12129 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus ligulifolius* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8318 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus linearifolius* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Neto, E.T. 3401 (CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus linearis* (Spreng.) H.Rob.**
Voucher: Ganev, W. 231 (BHCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Lessingianthus longicuspis* Dematt.**
Voucher: Hatschbach, G. 74804 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Lessingianthus macrocephalus* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Sobral, M. 4584 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Lessingianthus macrophyllus* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 12074 (ESA, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Lessingianthus mansoanus* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 16430 (ESA, K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Lessingianthus minimus* Dematt.**
Voucher: Hatschbach, G. 37253 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus mollissimus* (D.Don *ex* Hook. & Arn.) H.Rob.**
Voucher: Sobral, M. 5270 (PACA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Lessingianthus monocephalus* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Calago, K. 93 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus morii* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 5330 (CTES, ESA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga

***Lessingianthus myrsinites* H.Rob.**
Voucher: França, F. 3704 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus niederleinii* (Hieron.) H.Rob.**
Voucher: Rambo, B. 51954 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, RS); Cerrado

***Lessingianthus obscurus* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Walter, B.M.T. 1096 (CEN, SPF, SRS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus obtusatus* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Roth, L. 1414 (BHCB, CESJ, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus octandrus* (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 428 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus onopordioides* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Cavalcanti, T.B. 1939 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus plantaginoides* (Kuntze) H.Rob.**
Voucher: Pereira, E. 8493 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lessingianthus polyphyllus* (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 2215 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Lessingianthus profusus* (Dematt. & Cabrera) Angulo**
Voucher: Garcia, W.G. 13949 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Lessingianthus pseudopiptocarphus* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 24081 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus psilophyllus* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 51076 (CTES, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Lessingianthus pulverulentus* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Ratter, J.A. 1528 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Lessingianthus pumillus* (Vell.) H.Rob.**
Voucher: Roth, L. 1614 (BHCB, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Lessingianthus pycnostachyus* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 25391 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus regis* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8158 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus reitzianus* (Cabrera) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 39206 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Lessingianthus rigescens* (Malme) Dematt.**
Voucher: Ratter, J.A. 916 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Lessingianthus roseus* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 186 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus rosmarinifolius* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Ganev, W. 15 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus rubricaulis* (Humb. & Bonpl.) H.Rob.**
Voucher: Hashimoto, G. 366 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Lessingianthus rugulosus* (Sch.Bip.) H.Rob.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 253 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Lessingianthus sancti-pauli* (Hieron.) Dematt.**
Voucher: Dombrowski, L.T. 12955 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Lessingianthus santosii* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Furlan, A. 2046 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus scabrifoliatus* (Hieron.) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 17776 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Lessingianthus scaposus* (G.M.Barroso) H.Rob.**
Voucher: Magalhães, G.M. 17543 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus secundus* (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 59261 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Lessingianthus sellowii* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Krieger, L. 7652 (CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lessingianthus soderstroemii* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 25168 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus souzae* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8290 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Lessingianthus stoechas* (Mart. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8834 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus subcarduoides* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Viana, P.L. 1485 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus subosbcurus* (Malme) H.Rob.**
Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Lessingianthus syncephalus* (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Krieger, L. 8256 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lessingianthus tomentellus* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 28496 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lessingianthus ulei* (Hieron.) H.Rob.**
Voucher: Ribas, O.S. 5060 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Lessingianthus varroniifolius* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Machado, B. 1096 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Lessingianthus venosissimus* (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Krapovickas, A. 40142 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus vepretorum* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Magalhães Gomes, A. 23 (OUPR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Lessingianthus vestitus* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 27180 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus virgulatus* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Macedo, A. 3296 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
***Lessingianthus warmingianus* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Magalhães-Gomes, A. 2501 (OUPR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus westermanii* (Ekman & Dusén *ex* Malme) H.Rob.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 16400 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Lessingianthus xanthophyllus* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 36780 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Lessingianthus zuccarinianus* (Mart. *ex* DC.) H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 7569 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Liabum Adans.

Jimi Nakajima
1 espécie (não endêmica)
***Liabum acuminatum* Rusby**
Voucher: Prance, G.T. 7310 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Litothamnus R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
2 espécies (2 endêmicas)
***Litothamnus ellipticus* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 2502 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Litothamnus nitidus* (DC.) W.C.Holmes**
Voucher: Queiroz, L.P. 3216 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Lomatozona Baker.

Caetano Troncoso Oliveira
4 espécies (4 endêmicas)
***Lomatozona andersonii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 10258 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Lomatozona artemisiifolia* Baker**
Voucher: Duarte, A.P. 8172 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Lomatozona huntii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 17271 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Lomatozona inaequale* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 9826 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Lucilia Cass.

Benoit Loeuille
6 espécies (1 endêmica)
***Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass.**
Voucher: Reitz, R. 596 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Lucilia ferruginea* Baker**
Voucher: Duarte, A.P. 2317 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Lucilia linearifolia* Baker**
Voucher: Lindeman, J.C. 2675 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Lucilia lycopodioides* (Less.) S.E.Freire**
Voucher: Brade, A.C. 16913 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Lucilia nitens* Less.**
Voucher: Reitz, R. 14313 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Lucilia tomentosa* Wedd.**
Voucher: Hatschbach, G. 5989 (INPA, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Lulia Zardini

Marcelo Monge
1 espécie (1 endêmica)
***Lulia nervosa* (Less.) Zardini**
Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973. Fl. Ilustr. Catarin. 1: 37.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Lychnophora Mart.

Benoit Loeuille
35 espécies (35 endêmicas)
***Lychnophora albertinioides* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 4827 (BM, GH, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora bishopii* H.Rob.**
Voucher: Ferreira, S.C. 269 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lychnophora blanchetii* Sch.Bip.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3396 (C, K, GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Lychnophora brunioides* Mart.**
Voucher: Loeuille, B. 466 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora crispa* Mattf.**
Voucher: Hind, D.J.N. PCD 3551 (ALCB, HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lychnophora diamantinana* Coile & Jones**
Voucher: Loeuille, B. 108 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora ericoides* Mart.**
Voucher: Semir, J. CFCR 9572 (F, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Lychnophora gardneri* Sch.Bip.**
Voucher: Forzza, R.C. 1500 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora granmogolensis* (Duarte) Semir**
Voucher: Loeuille, B. 445 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora harleyi* H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 22716 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lychnophora humillima* Sch.Bip.**
Voucher: Riedel, L. 1159 (GH, K, LE, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora jeffreyi* H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 20802 (CEPEC, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Lychnophora markgravii* G.M.Barroso**
Voucher: Mello-Silva, R. 516 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora martiana* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 4824 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora mello-barretoi* G.M.Barroso**
Voucher: Pirani, J.R. 5074 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora morii* H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 22554 (RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lychnophora passerina* (Mart. *ex* DC.) Gardner**
Voucher: Ganev, W. 85 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Lychnophora phylicifolia* DC.**
Voucher: Martius, C.F.P. 500 (M, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Lychnophora pinaster* Mart.**
Voucher: Mello-Silva, R. 1376 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora pohlii* Sch.Bip.**
Voucher: Arbo, M.M. 5203 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora ramosissima* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 4821 (BM, GH, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora regis* H.Rob.**
Voucher: Loeuille, B. 346 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lychnophora reticulata* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 4828 (BM, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora rosmarinifolia* Mart.**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 11940 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Lychnophora salicifolia* Mart.**
Voucher: Semir, J. CFSC 9627 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora santosii* H.Rob.**
Voucher: Conceição, A.A. 698 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lychnophora sellowii* Sch.Bip.**
Voucher: Pirani, J.R. 5178 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora sericea* D.J.N.Hind**
Voucher: Harley, R.M. PCD 4308 (ALCB, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Lychnophora souzae* H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 22690 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora staavioides* Mart.**
Voucher: Mello-Silva, R. 2432 (K, MBM, SPF, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora syncephala* (Sch.Bip.) Sch.Bip.**
Voucher: Sellow, F. 948 (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora tomentosa* (Mart. *ex* DC.) Sch.Bip.**
Voucher: Hatschbach, G. 69584 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophora triflora* (Mattf.) H.Rob.**
Voucher: Luetzelburg, P. 179 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Lychnophora uniflora* Sch.Bip.**
Voucher: Ganev, W. 1598 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Lychnophora villosissima* Mart.**
Voucher: Roth, L. 1660 (CESJ, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lychnophoriopsis Sch.Bip.

Benoit Loeuille
4 espécies (4 endêmicas)
***Lychnophoriopsis candelabrum* (Sch.Bip.) H.Rob.**
Voucher: Pirani, J.R. 4647 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophoriopsis damazioi* (Beauverd) H.Rob.**
Voucher: Loeuille, B. 14 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophoriopsis hatschbachii* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 53058 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Lychnophoriopsis heterotheca* Sch.Bip.**
Voucher: Riedel, L. 1009 (BR, F, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lycoseris Cass.

Nadia Roque
1 espécie (não endêmica)
***Lycoseris boliviana* Britton**
Voucher: Hatschbach, G. 21906 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Macropodina R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
3 espécies (2 endêmicas)
***Macropodina blumenavii* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Reitz, R. 14736 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Macropodina bradei* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Nadruz, M. 1873 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Macropodina reitzii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Smith, L.B. 10501 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Malmeanthus R.M.King & H.Rob.

Eric Koiti Okiyama Hattori
3 espécies (2 endêmicas)
***Malmeanthus catharinensis* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Lourteig, A. s.n. (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Malmeanthus hilarii* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 161 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Malmeanthus subintegerrimus* (Malme) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Wasum, R. 1634 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Mattfeldanthus H.Rob. & R.M.King

Massimiliano Dematteis
2 espécies (2 endêmicas)
***Mattfeldanthus andrade-limae* (G.M.Barroso) Dematt.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 55-2119 (CTES, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga
***Mattfeldanthus mutisioides* H.Rob. & R.M.King**
Voucher: Anderson, W.R. 36985 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Melampodium L.

Jimi Nakajima
2 espécies (1 endêmica)
***Melampodium divaricatum* (Rich. *ex* Pers.) DC.**
Voucher: Rodrigues, L.A. 85 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Nordeste (PB), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Melampodium paniculatum* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 3844 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Melanthera Rohr

Cláudio Augusto Mondin
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Melanthera latifolia* (Gardner) Cabrera**
Voucher: Mondin, C.A. 2704 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), Nordeste (RN, PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Melanthera nivea* (L.) Small**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 2867)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Microgyne Less.

Gustavo Heiden, Aristônio Magalhães Teles
1 espécie (não endêmica)
***Microgyne trifurcata* Less.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Micropsis DC.

Benoit Loeuille

2 espécies (1 endêmica)

***Micropsis dasycarpa* (Griseb.) Beauverd**
Voucher: Deble, L.P. 2897 (CTES, HDCF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Micropsis spathulata* (Pers.) Cabrera**
Voucher: Deble, L.P. 3606 (HDCF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Mikania Willd.

Mara Rejane Ritter, Renata Moura de Liro, Nadia Roque, Jimi Nakajima

198 espécies (140 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 3 variedades (3 endêmicas)

***Mikania acuminata* DC.**
Voucher: Peron, M. 820 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania additicia* B.L.Rob.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 14651 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Mikania alexandreae* G.M.Barroso**
Voucher: Brade, A.C. 10429 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mikania alvimii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8126 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Mikania amazonica* Baker**
Voucher: Ongley, J.C. P21762 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mikania anethifolia* (DC.) Matzenb.**
Voucher: Matzenbacher, N.I. 486 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Mikania argyreiae* DC.**
Voucher: Fontoura, T. s.n. (RB 291729)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania argyropappa* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Warming, E. 268 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania arrojadoi* Mattf.**
Voucher: Duarte, A.P. 8760 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Mikania aschersonii* Hieron.**
Voucher: Croat, T.B. 62699 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia

***Mikania bakeri* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15120 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Mikania banisteriae* DC.**
Voucher: Heringer, E.P. 7041 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Mikania barrosoana* G.M.Barroso**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12872 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mikania belemii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8007 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mikania biformis* DC.**
Voucher: Noblick, L.R. 2800 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mikania bishopii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Heringer, E.P. 8035 (HEPH)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Mikania bradei* B.L.Rob.**
Voucher: Sucre, D. 7223 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Mikania brunnescens* B.L.Rob.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15129 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Mikania buddleiaefolia* DC.**
Voucher: Correia, C.M.B. s.n. (RB 291655)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mikania burchellii* Baker**
Voucher: Rodrigues, R.S. 801 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania cabrerae* G.M.Barroso**
Voucher: Rizzini, C.T. 23 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mikania cacerensis* G.M.Barroso**
Voucher: Hoehne, F.C. 250 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mikania callineura* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Sello, F. 731 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Mikania campanulata* Gardner**
Voucher: Ritter, M.R. 1118 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania camporum* B.L.Rob.**
Voucher: Leite, J.E. 3456 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mikania campos-portoana* G.M.Barroso**
Voucher: Brade, A.C. 10483 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mikania candolleana* Gardner**
Voucher: Sucre, D. 7241 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania capricorni* B.L.Rob.**
Voucher: Ritter, M.R. 630 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Mikania cardiophylla* B.L.Rob.**
Voucher: Brade, A.C. 17040 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania casarettoi* B.L.Rob.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6607 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Mikania chlorolepis* Baker**
Voucher: Ritter, M.R. 1267 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania cipoensis* G.M.Barroso**
Voucher: Duarte, A.P. 2458 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mikania citrodora* W.C.Holmes**
Voucher: Holmes, W.C. 5064 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania clematidifolia* Dusén**
Voucher: Kummrow, R. 2838 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mikania coarctata* Gardner**
Referência: Barroso, G.M. 1958. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 16: 273.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Mikania conferta* Gardner**
Voucher: Lima, H.C. 3596 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania confertissima* Sch.Bip.**
Voucher: Brade, A.C. 10428 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Mikania congesta* DC.**
Voucher: Strudwick, J.J. 3296 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PB), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga
***Mikania cordifolia* (L.f.) Willd.**
Voucher: Ritter, M.R. 1206 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Mikania corymbiifolia* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pilger, R.K.F. 220 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mikania cynanchifolia* Hook. & Arn. *ex* B.L.Rob.**
Voucher: Rodrigues, R.S. 943 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Mikania decora* Poepp. & Endl.**
Referência: Robinson, B.L. 1924. Contr. Gray Herb. 73: 23.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mikania decumbens* Malme**
Voucher: Ritter, M.R. 1282 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania divaricata* Poepp. & Endl.**
Voucher: Sampaio, A.J. 5677 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Mikania diversifolia* DC.**
Voucher: Reitz, R. 4925 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mikania duckei* G.M.Barroso**
Voucher: Ducke, A. 112 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Mikania duidensis* B.L.Rob.**
Referência: Pruski, J.F. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 317.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mikania dusenii* B.L.Rob.**
Voucher: Hagelund, K. 4969 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Mikania elliptica* DC.**
Voucher: Miranda, E.B. 261 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mikania erioclada* DC.**
Voucher: Hoehne, W. 3182 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Mikania eriostrepta* B.L.Rob.**
Voucher: Kuhlmann, M. 1674 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Mikania filgueirasii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Heringer, E.P. 5276 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Mikania firmula* Baker**
Voucher: Santos, T.S. 683 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mikania fulva* Baker**
Voucher: Ritter, M.R. 123 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Mikania gabrieli* Baker**
Voucher: Pires, J.M. 352 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mikania glabra* D.J.N.Hind**
Voucher: CFCR 13435 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Mikania glandulosissima* W.C.Holmes & D.J.N.Hind**
Voucher: Pirani, J.R. H50975 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mikania glauca* Mart. *ex* Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 36574 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mikania glaziovii* Baker**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 1438 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Mikania gleasonii* B.L.Rob.**
Referência: Robinson, B.L. 1924. Contr. Gray Herb. 73: 23.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Mikania glomerata* Spreng.**
Voucher: Ritter, M.R. 1392 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania goyazensis* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Munhoz, C. 665 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mikania grazielae* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8159 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mikania guaco* Kunth**
Voucher: Daly, D.C. 8745 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Mikania guilleminii* B.L.Rob.**
Voucher: Duarte, A.P. 4781 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania hagei* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8101 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mikania hartbergii* W.C.Holmes**
Voucher: Holmes, W.C. 5071 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Mikania hastato-cordata* Malme**
Voucher: Ritter, M.R. 1380 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mikania hastifolia* Baker**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 1420 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Mikania hemisphaerica* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Simão-Bianchini, R. 1252 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania hirsutissima* DC.**
Voucher: Ritter, M.R. 1384 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania hoehnei* B.L.Rob.**
Voucher: Klein, R.M. 770 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mikania hoffmanniana* Dusén**
Voucher: Klein, R.M. 9842 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mikania hookeriana* DC.**
Voucher: Heringer, E.P. 17361 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Mikania inordinata* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8021 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mikania involucrata* Hook. & Arn.**
Voucher: Ritter, M.R. 1209 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mikania itambana* Gardner**
Voucher: Hatschbach, G. 53021 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mikania jeffreyi* D.J.N.Hind**
Voucher: Harley, R.M. 19615 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mikania kubitzkii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Mori, S.A. 12825 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mikania laevigata* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Dalpiaz , S. (ICN 115248)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania lanuginosa* DC.**
Voucher: Reitz, R. 8517 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mikania lasiandrae* DC.**
Voucher: Reitz, R. 8523 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania leiolaena* DC.**
Voucher: Stehmann, J.R. 2366 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania leptotricha* Baker**
Referência: Barroso, G.M. 1958. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 16: 275.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Mikania ligustrifolia* DC.**
Voucher: Reitz, R. 7140 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania lindbergii* Baker**
Distribuição: nativa; endêmica
***Mikania lindbergii* var. *collina* Baker**
Voucher: Martinelli, G. 13426 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania lindleyana* DC.**
Voucher: Carvalho-Leite, S.L. s.n. (ICN 118093)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal
***Mikania linearifolia* DC.**
Voucher: Heringer, E.P. 18388 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania longiacuminata* (Rusby) Rusby**
Voucher: Croat, T.B. 62685 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Mikania longipes* Baker**
Voucher: Widgren, A. 144 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Mikania lucida* S.F.Blake**
Voucher: Tavares, A.S. 120 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Mikania luetzelburgii* Mattf.**
Voucher: Roque, N. 2150 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mikania lundiana* DC.**
Voucher: Ritter, M.R. 1382 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania macedoi* G.M.Barroso**
Voucher: Macedo, A. 4319 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mikania malacolepis* B.L.Rob.**
Voucher: Warming, E. 256 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mikania matthewsii* B.L.Rob.**
Voucher: Rosas Jr., A. 283 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Mikania mattos-silvae* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Mori, S.A. 10430 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mikania megalophylla* W.C.Holmes & McDaniel**
Voucher: Ule, E.H.G. 9887 (L)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Mikania michelangeliana* Steyerm.**
Referência: Pruski, J.F. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 318.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mikania micrantha* Kunth**
Voucher: Ritter, M.R. 1020 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Mikania microcephala* DC.**
Voucher: Heringer, E.P. 1448 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania microdonta* DC.**
Voucher: Leoncini, O. 72 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania microlepis* Baker**
Voucher: Reitz, R. 8953 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mikania microphylla* Sch.Bip.**
Voucher: Pereira, E. 2972 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania microptera* DC.**
Voucher: Matzenbacher, N.I. (ICN 122884)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica
***Mikania morii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Mori, S.A. 9995 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mikania mosenii* Malme**
Voucher: Romero, R. 1988 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania myriocephala* DC.**
Voucher: Blanchet, J.S. 2342 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Mikania nana* W.C.Holmes**
Voucher: Hatschbach, G. 22847 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Mikania nelsonii* D.J.N.Hind**
Voucher: Harley, R.M. 27290 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Mikania neurocaula* DC.**
Voucher: Nakajima, J.N. 1162 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania nigricans* Gardner**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 534 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mikania nigropunctulata* Hieron.**
Referência: Pruski, J.F. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 318.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Mikania nitida* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 3446 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Cerrado
***Mikania nodulosa* Sch.Bip.**
Voucher: Regnell, A.F. 721 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Mikania nummularia* DC.**
Voucher: Duarte, A.P. 2737 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania oblongifolia* DC.**
Voucher: Matzenbacher, N.I. 2329 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania obovata* DC.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 9645 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado
***Mikania obsoleta* (Vell.) G.M.Barroso**
Voucher: Reitz, R. 11212 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mikania obtusata* DC.**
Voucher: Duarte, A.P. 2672 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania ochroleuca* H.Rob.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9886 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Mikania officinalis* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Mikania officinalis* Mart. subsp. *officinalis
Voucher: Reitz, R. 16325 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Mikania officinalis* var. *brachypoda* (DC.) Malme**
Voucher: Duarte, A.P. 2136 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mikania oliveirae* R.Esteves & Capel**
Voucher: Capel, R. 35 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mikania oreophila* Ritter & Miotto**
Voucher: Ritter, M.R. 1277 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mikania orleansensis* Hieron.**
Voucher: Ritter, M.R. 1169 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mikania oxylepis* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Martius, C.F.P. 1626 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Mikania pacei* W.C.Holmes**
Voucher: Hatschbach, G. 40884 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Mikania pachychaeta* (Baker) G.M.Barroso**
Voucher: Barreto, H.L.M. 11623 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania palustris* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Malme, G.O.A. 1510 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mikania paniculata* DC.**
Voucher: Reitz, R. 4656 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Mikania pannosa* Baker**
Voucher: Prance, G.T. 9949 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Mikania paranahybensis* G.M.Barroso**
Voucher: Riedel, L. 1026 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Mikania paranensis* Dusén**
Voucher: Ritter, M.R. 1151 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mikania parodii* Cabrera**
Voucher: Ritter, M.R. 936 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania parviflora* (Aubl.) H.Karst.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1027 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia, Cerrado
***Mikania parvifolia* Baker**
Voucher: Duarte, A.P. 2687 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania periplocifolia* Hook. & Arn.**
Voucher: Ritter, M.R. 1333 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Amazônia, Pampa
***Mikania pernambucensis* Gardner**
Referência: Barroso, G.M. 1958. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 16: 259.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Mikania phaeoclados* Mart.**
Voucher: Duarte, A.P. 1961 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania pilosa* Baker**
Voucher: Regnell, A.F. 722 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Mikania pinnatiloba* DC.**
Voucher: Matzenbacher, N.I. s.n. (ICN 53680)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Mikania pohliana* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Pereira, B.A.S. 1287 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Mikania pohlii* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Heringer, E.P. 16611 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mikania populifolia* Gardner**
Voucher: Heringer, E.P. 5188 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania premnifolia* Gardner**
Voucher: Duarte, A.P. 2053 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mikania pseudogracilis* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Lewinsohn, T. 95108 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mikania pseudohoffmanniana* G.M.Barroso**
Voucher: Reitz, R. 9942 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mikania pseudomicrocephala* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Belém, R.P. 1630 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mikania psilostachya* DC.**
Voucher: Heringer, E.P. 7013 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania purpurascens* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Silva, M.A. 2519 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Mikania ramosissima* Gardner**
Voucher: Nakajima, J.N. 1158 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania reticulata* Gardner**
Voucher: Brade, A.C. 13538 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Mikania retifolia* Sch.Bip.**
Voucher: Hatschbach, G. 53370 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania reynoldsii* W.C.Holmes**
Voucher: Hatschbach, G. 55084 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania rimachii* W.C.Holmes & McDaniel**
Voucher: Austin, D.F. 6954 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mikania roraimensis* H.Rob.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8789 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Mikania rothii* G.M.Barroso**
Voucher: Roth, L. 1643 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania rotundifolia* G.M.Barroso**
Voucher: Riedel, L. 897 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania rufescens* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Hagelund, K. 15664 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mikania salviifolia* Gardner**
Voucher: Ritter, M.R. 1391 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania salzmanniifolia* DC.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 7364 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Mikania santosii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Santos, T.S. 1438 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Mikania sarcodes* Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 36171 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Mikania scabrida* Baker**
Referência: Barroso, G.M. 1958. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 16: 299.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Mikania schenckii* Hieron.**
Voucher: Brade, A.C. 18983 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania sericea* Hook. & Arn.**
Voucher: Klein, R.M. 7840 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Mikania sessilifolia* DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
Mikania sessilifolia* DC. subsp. *sessilifolia
Voucher: Silva, M.A. 5096 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania sessilifolia* var. *regnellii* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Regnell, A.F. 156 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Mikania setigera* Sch.Bip.**
Voucher: Cordeiro, J. 1439 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania simpsonii* W.C.Holmes**
Referência: Pruski, J.F. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 320.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Mikania smaragdina* Dusén *ex* Malme**
Voucher: Hagelund, K. 15954a (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mikania smilacina* DC.**
Voucher: Heringer, E.P. 14776 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania sprucei* Baker**
Voucher: Nelson, B.W. 21060 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Mikania stenomeres* B.L.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 48165 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Mikania stenophylla* W.C.Holmes**
Voucher: Hatschbach, G. 32528 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Mikania stipulacea* Willd.**
Voucher: Hemmendorff, E. 381 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Mikania stygia* B.L.Rob.**
Voucher: Daly, D.C. 6755 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Mikania stylosa* Gardner**
Voucher: Riedel, L. 606 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania subverticillata* Baker**
Voucher: Riedel, L. 607 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania sulcata* (Hook. & Arn.) B.L.Rob.**
Voucher: Gallinal, A. s.n. (ICN 132023)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mikania teixeirae* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 9543 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Mikania ternata* (Vell.) B.L.Rob.**
Voucher: Ritter, M.R. 1105 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania testudinaria* DC.**
Voucher: Vauthier, M. 330 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Mikania thapsoides* DC.**
Voucher: Ritter, M.R. 1258 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa
***Mikania thyrsoidea* Baker**
Voucher: Heringer, E.P. 2402 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania trachypleura* B.L.Rob.**
Voucher: Ritter, M.R. 1375 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

***Mikania triangularis* Baker**
Voucher: Klein, R.M. 1322 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania trichophila* DC.**
Voucher: Carvalho, A.M. 2091 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Mikania trinervis* Hook. & Arn.**
Voucher: Ritter, M.R. 1381 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mikania trinitaria* DC.**
Voucher: Poole, J.M. 2089 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Mikania triphylla* Spreng. *ex* Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 68166 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Mikania ulei* Hieron.**
Voucher: Ritter, M.R. 1388 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mikania variifolia* Hieron.**
Voucher: Ritter, M.R. 643 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Mikania vauthieriana* Baker**
Voucher: Pereira, E. 557 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Mikania viminea* DC.**
Voucher: Matzenbacher, N.I. s.n. (ICN 110880)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Mikania virgata* B.L.Rob.**
Voucher: Duarte, A.P. 2328 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania vismiifolia* DC.**
Voucher: Vauthier, M. 267 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania vitifolia* DC.**
Voucher: Ritter, M.R. 1104 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Mikania warmingii* Sch.Bip.**
Voucher: Pereira, E. 3116 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Minasia H.Rob.

Benoit Loeuille
6 espécies (6 endêmicas)
***Minasia alpestris* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Nakajima, J.N. 4624 (HUFU, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minasia cabralensis* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 64904 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minasia lewinsohnii* Semir & de Jesus**
Voucher: Lewinsohn, T. PIC 96696 (K, MO, R, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minasia pereirae* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 51160 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minasia scapigera* H.Rob.**
Voucher: Loeuille, B. 97 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Minasia splettiae* H.Rob.**
Voucher: Splett, S. 625 (SPF, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Monogereion R.M.King & G.M.Barroso

Eric Koiti Okiyama Hattori
1 espécie (1 endêmica)
***Monogereion carajensis* R.M.King & G.M.Barroso**
Voucher: Secco, R.S. 511 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Moquinia DC.

Nadia Roque, Jimi Nakajima
1 espécie (1 endêmica)
***Moquinia racemosa* (Spreng.) DC.**
Voucher: Pereira, E. 2208 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Morithamnus R.M.King et al.

Silvana C. Ferreira
2 espécies (2 endêmicas)
***Morithamnus crassus* R.M.King et al.**
Voucher: Ferreira, S.C. 331 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Morithamnus ganophyllus* (Mattf.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ferreira, S.C. 357 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Mutisia L.f.

Marcelo Monge
4 espécies (1 endêmica)
***Mutisia campanulata* Less.**
Voucher: Shepherd, G.J. 12821 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Mutisia coccinea* A.St.-Hil.**
Voucher: Morellato, L.P. 1016 (HRCB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Mutisia lutzii* G.M.Barroso**
Voucher: Lutz, A. 1200 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Mutisia speciosa* Aiton *ex* Hook.**
Voucher: Pickel, B.J. 4805 (IAC, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Neblinaea Maguire & Wurdack

Nadia Roque
1 espécie (não endêmica)
***Neblinaea promontoriorum* Maguire & Wurdack**
Voucher: Silva, N.T. 60895 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Neja D.Don
Gustavo Heiden, Aristônio Magalhães Teles
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Neja filiformis* (Spreng.) Nees**
Voucher: Scur, L. 506 (HUCS, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa
***Neja nidorelloides* DC.**
Voucher: Gaudichaud, C. 1048 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Neja pinifolia* (Poir.) G.L.Nesom**
Voucher: Rambo, B. 35262 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

Neocabreria R.M.King & H.Rob.
Eric Koiti Okiyama Hattori
5 espécies (4 endêmicas)
***Neocabreria catharinensis* (Cabrera) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Reitz, R. 8122 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Neocabreria malachophylla* (Klatt) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 72290 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Neocabreria mexiae* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Mexia, Y. 4296 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica
***Neocabreria pennivenia* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 8976 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),
Sul (PR); Mata Atlântica
***Neocabreria serrulata* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 11839 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Noticastrum DC.
Aristônio Magalhães Teles, Rafael Augusto Xavier Borges, Gustavo Heiden
8 espécies (3 endêmicas)
***Noticastrum acuminatum* (DC.) Cuatrec.**
Voucher: Sacco, J.C. 513 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa
***Noticastrum calvatum* (Baker) Cuatrec.**
Voucher: Hatschbach, G. 72611 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Noticastrum decumbens* (Baker) Cuatrec.**
Voucher: Reitz, R. 7658 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa
***Noticastrum diffusum* (Pers.) Cabrera**
Voucher: Hatschbach, G. 8908 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa
***Noticastrum gnaphalioides* (Baker) Cuatrec.**
Voucher: Kuhlmann, M. 1138 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Noticastrum hatschbachii* Zardini**
Voucher: Zardini, E.M. 1104 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa
***Noticastrum malmei* Zardini**
Voucher: Davidse, G. 11091 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Noticastrum psammophilum* (Klatt) Cuatrec.**
Voucher: Klein, R.M. 8649 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

Oiospermum Less.
Massimiliano Dematteis, Gracineide Almeida
1 espécie (1 endêmica)
***Oiospermum involucratum* (Nees & Mart.) Less.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Onoseris Willd.
Nadia Roque
2 espécies (1 endêmica)
***Onoseris brasiliensis* Cabrera**
Voucher: Hatschbach, G. 34719 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Onoseris fraterna* Blake**
Referência: Cabrera, A.L. 1959. Bol. Soc. Argent. Bot. 8: 35.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC);
Mata Atlântica

Ophryosporus Meyen
Eric Koiti Okiyama Hattori
3 espécies (3 endêmicas)
***Ophryosporus freyreysii* (Thunb.) Baker**
Voucher: Heiden, G. 776 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Ophryosporus laxiflorus* Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 51977 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Ophryosporus regnellii* Baker**
Voucher: Esteves, R.L. 2157 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Orthopappus Gleason
Gracineide Almeida, Massimiliano Dematteis
1 espécie (não endêmica)
***Orthopappus angustifolius* (Sw.) Gleason**
Voucher: Almeida, G.S.S. 154 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa

Oyedaea DC.
Mara Angelina Galvão Magenta
2 espécies (1 endêmica)
***Oyedaea bahiensis* Baker**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (INPA (foto 6390))
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Oyedaea ovata* (Gardner) Benth.**
Voucher: Gardner, G. 3852
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Pacourina Aubl.

Polyana Noronha Soares
1 espécie (não endêmica)
***Pacourina edulis* Aubl.**
Voucher: Schinini, A. 27546 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia

Panphalea Lag.

Marcelo Monge
5 espécies (2 endêmicas)
***Panphalea araucariophila* Cabrera**
Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973. Fl. Ilustr. Catarin. 1: 1-124.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Panphalea cardaminifolia* Less.**
Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973. Fl. Ilustr. Catarin. 1:84.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Panphalea maxima* Less.**
Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973. Fl. Ilustr. Catarin. 1:88.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Panphalea ramboi* Cabrera**
Referência: Katinas, L. et al. 2008. Bot. Rev. 74: 641.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Panphalea smithii* Cabrera**
Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973. Fl. Ilustr. Catarin. 1: 82.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Paralychnophora MacLeish

Benoit Loeuille
6 espécies (6 endêmicas)
***Paralychnophora atkinsiae* D.J.N.Hind**
Voucher: Bautista, H.P. 2965 (HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Paralychnophora bicolor* (DC.) MacLeish**
Voucher: Loeuille, B. 451 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Paralychnophora harleyi* (H.Rob.) D.J.N.Hind**
Voucher: Ganev, W. 2239 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Paralychnophora patriciana* D.J.N.Hind**
Voucher: Ganev, W. 1828 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Paralychnophora reflexoauriculata* (G.M.Barroso) MacLeish**
Voucher: França, F. 2452 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga
***Paralychnophora santosii* (H.Rob.) D.J.N.Hind**
Voucher: Ganev, W. 671 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Parapiqueria R.M.King & H.Rob.

Jimi Nakajima
1 espécie (1 endêmica)
***Parapiqueria cavalcantei* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Cavalcante, P. 2162 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Parthenium L.

Cláudio Augusto Mondin, Mara Angelina Galvão Magenta
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Parthenium argentatum* A.Gray**
Voucher: Hoehne, W. 3387 (SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Parthenium hysterophorus* L.**
Voucher: Barreto, K.D. 176 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Pectis L.

Jimi Nakajima, Nadia Roque
13 espécies (11 endêmicas), 5 variedades (4 endêmicas)
***Pectis brevipedunculata* (Gardner) Sch.Bip.**
Voucher: Gardner, G. 3264 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado
***Pectis burchellii* Baker**
Voucher: Burchell, W.J. 9058 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pectis congesta* (Gardner) Sch.Bip.**
Voucher: Eiten, G. 3962 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI); Cerrado
***Pectis decumbens* Baker**
Voucher: Gardner, G. 2649 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga
***Pectis elongata* Kunth**
Voucher: Eiten, G. 4001 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, BA); Caatinga, Cerrado
***Pectis gardneri* Baker**
Voucher: Gardner, G. 4197 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Pectis gracilis* Baker**
Voucher: Regnell, A.F. III-789 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pectis linifolia* L.**
Distribuição: nativa; endêmica
Pectis linifolia* L. var. *linifolia
Voucher: Bautista, H.P. 433 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, SE); Caatinga
***Pectis oligocephala* (Gardner) Sch.Bip.**
Distribuição: nativa; endêmica

***Pectis oligocephala* var. *affinis* (Gardner) Baker**
Voucher: Gardner, G. 2214 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
Pectis oligocephala* (Gardner) Sch.Bip. var. *oligocephala
Voucher: Duarte, A.P. 10327 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE); Caatinga, Cerrado
***Pectis rigida* Baker**
Voucher: Pohl, J.B.E. 398 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Pectis stella* Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 1528b (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Pectis substriata* Rusby**
Voucher: Malme, G.O.A. 3176 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Pectis uniaristata* DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Pectis uniaristata* var. *jangadensis* (S.Moore) D.J.Keil**
Voucher: Irwin, H.S. 21329 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
Pectis uniaristata* DC. var. *uniaristata
Voucher: Hatschbach, G. 60445 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO); Cerrado

Pentacalia Cass.

Rafael Augusto Xavier Borges
2 espécies (2 endêmicas)
***Pentacalia desiderabilis* (Vell.) Cuatrec.**
Voucher: Reitz, R. 3587 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Pentacalia tropicalis* (Cabrera) C.Jeffrey**
Voucher: Pereira, E. 4039 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Perezia Lag.

Marcelo Monge
4 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica)
***Perezia catharinensis* Cabrera**
Voucher: Klein, R.M. 3439 (HBR, LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Perezia cubatanesis* Less.**
Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973. Fl. Ilustr. Catarin. 1: 114-117.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Perezia eryngioides* (Cabrera) Crisci & Martic.**
Referência: Katinas, L. et al. 2008. Bot. Rev. 74: 643.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Perezia multiflora* Less.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Perezia multiflora* Less. subsp. *multiflora
Referência: Vuilleumier, S.B. 1969. Contr. Gray Herb. 199: 1.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Perezia multiflora* subsp. *sonchifolia* (Baker) Vuilleum.**
Referência: Vuilleumier, S.B. 1969. Contr. Gray Herb. 199: 1.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Picrosia D.Don

Angelo Schneider
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Picrosia cabreriana* A.G.Schulz**
Voucher: Klein, R.M. 3484 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Domínio desconhecido
***Picrosia longifolia* D.Don**
Voucher: Klein, R.M. 9238 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Domínio desconhecido

Piptocarpha R.Br.

Benoit Loeuille
29 espécies (22 endêmicas), 9 subespécies (7 endêmicas)
***Piptocarpha angustifolia* Dusén *ex* Malme**
Voucher: Hatschbach, G. 15145 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Piptocarpha axillaris* (Less.) Baker**
Distribuição: nativa; endêmica
Piptocarpha axillaris* (Less.) Baker subsp. *axillaris
Voucher: Smith, G.L. 960 (GA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Piptocarpha axillaris* subsp. *graciellae* (Cabrera) G.Lom.Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 16498 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piptocarpha barrosoana* G.Lom.Sm.**
Voucher: Richards, G.C.G. 6805 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Piptocarpha brasiliana* Cass.**
Voucher: Duarte, A.P. 4814 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Piptocarpha densifolia* Dusén *ex* G. Lom. Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 40170 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Piptocarpha foliosa* Cuatrec.**
Voucher: Prance, G.T. 17370 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia
***Piptocarpha gustavo-valerioana* G.Lom.Sm.**
Voucher: Belém, R.P. 3676 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Piptocarpha leprosa* (Less.) Baker**
Voucher: Smith, G.L. 967 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Piptocarpha lucida* (Spreng.) Benn. *ex* Baker**
Voucher: Duarte, A.P. 5004 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piptocarpha lundiana* (Less.) Baker**
Voucher: Sucre, D. 9528 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Piptocarpha macropoda* (DC.) Baker**
Distribuição: nativa; endêmica

***Piptocarpha macropoda* subsp. *crassifolia* (Baker) G.Lom.Sm.**
Voucher: Irwin, H.S. 5307 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
Piptocarpha macropoda* (DC.) Baker subsp. *macropoda
Voucher: Smith, G.L. 968 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Piptocarpha matogrossensis* H.Rob.**
Voucher: Prance, G.T. 59367 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Piptocarpha notata* (Less.) Baker**
Voucher: Kuhlmann, M. 1686 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Piptocarpha oblonga* (Gardner) Baker**
Distribuição: nativa; endêmica
***Piptocarpha oblonga* subsp. *lepidota* (Sch.Bip.) G.Lom.Sm.**
Voucher: Smith, G.L. 1091 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido
Piptocarpha oblonga* (Gardner) Baker subsp. *oblonga
Voucher: Hatschbach, G. 27504 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Piptocarpha opaca* (Benth.) Baker**
Distribuição: nativa; não endêmica
Piptocarpha opaca* (Benth.) Baker subsp. *opaca
Voucher: Ducke, A. 540 (F, GH, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Piptocarpha organensis* Cabrera**
Voucher: Brade, A.C. 16563 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Piptocarpha poeppigiana* (DC.) Baker**
Voucher: Prance, G.T. 17125 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Piptocarpha prancei* G.Lom.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 10833 (F, K, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Piptocarpha pyrifolia* (DC.) Baker**
Voucher: Pereira, E. 4128 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Piptocarpha quadrangularis* (Vell.) Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 9253 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Piptocarpha ramboi* G.Lom.Sm.**
Voucher: Rambo, B. 54050 (B, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Piptocarpha ramiflora* (Spreng.) Baker**
Voucher: Belém, R.P. 1546 (CEPEC, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Piptocarpha regnellii* (Sch.Bip.) Cabrera**
Voucher: Hatschbach, G. 3236 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Piptocarpha riedelii* (Sch.Bip.) Baker**
Voucher: Hage, J.L. 787 (CEPEC, GA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Piptocarpha robusta* G.M.Barroso**
Voucher: Duarte, A.P. 9758 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Piptocarpha rotundifolia* (Less.) Baker**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Piptocarpha rotundifolia* subsp. hatschbachii G.Lom.Sm.**
Voucher: Irwin, H.S. 16184 (NY, SP, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
Piptocarpha rotundifolia* (Less.) Baker subsp. *rotundifolia
Voucher: Heringer, E.P. 15299 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Piptocarpha sellowii* (Sch.Bip.) Baker**
Voucher: Smith, G.L. 1111 (GA, MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Piptocarpha triflora* (Aubl.) Benn. *ex* Baker**
Voucher: Prance, G.T. 4141 (F, NY, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Piptocarpha verticillata* (Vell.) G.Lom.Sm. *ex* H.Rob.**
Voucher: Pereira, E. 4019 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Piptocoma Cass.

Benoit Loeuille
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Piptocoma discolor* (Kunth) Pruski**
Voucher: Ducke, A. 398 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Piptocoma schomburgkii* (Sch.Bip.) Pruski**
Voucher: Strudwick, J.J. 4182 (NY,US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Piptolepis Sch.Bip.

Benoit Loeuille
9 espécies (9 endêmicas)
***Piptolepis buxoides* (Less.) Sch.Bip.**
Voucher: Damazio, L.B. 12527 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Piptolepis ericoides* Sch.Bip.**
Voucher: Gardner, G. 4750 (BM, GH, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Piptolepis gardneri* Baker**
Voucher: Gardner, G. 4753 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Piptolepis glaziouana* Beauverd**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19550 (G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Piptolepis imbricata* (Gardner) Sch.Bip.**
Voucher: Gardner, G. 4751 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Piptolepis leptospermoides* (Mart. *ex* DC.) Sch.Bip.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Piptolepis martiana* (Gardner) Sch.Bip.**
Voucher: Gardner, G. 4754 (BM, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Piptolepis oleaster* (Mart. *ex* DC.) Sch.Bip.**
Voucher: Martius, C.F.P. 543 (M, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Piptolepis pseudo-myrtus* Sch.Bip.**
Voucher: Loeuille, B. 463 (K, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Piqueriella Cav.

Jimi Nakajima
1 espécie (1 endêmica)
***Piqueriella brasiliensis* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 1571, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Pithecoseris Mart. *ex* DC.

Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Pithecoseris pacourinoides* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Loeuille, B. 350 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga

Planaltoa Taub.

Jimi Nakajima
2 espécies (2 endêmicas)
***Planaltoa lychnophoroides* G.M.Barroso**
Voucher: Irwin, H.S. 32722 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Planaltoa salviifolia* Taub.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 21618 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Platypodanthera R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
1 espécie (1 endêmica), 2 subespécies (2 endêmicas)
***Platypodanthera melissifolia* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Platypodanthera melissifolia* (DC.) R.M.King & H.Rob. subsp. melissifolia**
Voucher: Ferreira, S.C. 235 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Caatinga, Cerrado
***Platypodanthera melissifolia* subsp. riocontensis D.J.N.Hind**
Voucher: Carvalho, A.M. 3727 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Pluchea Cass.

Benoit Loeuille
3 espécies (2 endêmicas)
***Pluchea laxiflora* Hook. & Arn. *ex* Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 2132 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pluchea oblongifolia* DC.**
Voucher: Anderson, W.R. 36385 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pluchea sagittalis* (Lam.) Cabrera**
Voucher: Pirani, J.R. 3506 (NY,SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Podocoma Cass.

Aristônio Magalhães Teles, Rafael Augusto Xavier Borges
7 espécies (6 endêmicas)
***Podocoma asperrima* Dusén *ex* Malme**
Voucher: Dusén, P.K.H. 17815 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Podocoma bellidifolia* Baker**
Voucher: Hoehne, F.C. 1665 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Podocoma blanchetiana* Baker**
Voucher: Heringer, E.P. 16215
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF); Caatinga, Cerrado
***Podocoma hieraciifolia* (Poir.) Cass.**
Voucher: Hatschbach, G. 5468 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Podocoma hirsuta* (Hook. & Arn.) Baker**
Voucher: Bueno, O.L. 2632 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Podocoma notobellidiastrum* (Griseb.) G.L.Nesom**
Voucher: Davis, P.H. 2491 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Podocoma rivularis* (Gardner) G.L.Nesom**
Voucher: Martinelli, G. 3296 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Polymnia L.

Cláudio Augusto Mondin
1 espécie (1 endêmica)
***Polymnia silphioides* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 5216 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Porophyllum Guett.

Jimi Nakajima
7 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Porophyllum angustissimum* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 4259 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Porophyllum bahiense* D.J.N.Hind**
Voucher: Harley, R.M. 26979 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Porophyllum lanceolatum* DC.**
Voucher: Rylands, A.B. 130-1980 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado
***Porophyllum leiocarpum* (Urb.) Rydb.**
Voucher: Hoehne, F.C. 16875 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Porophyllum linifolium* (L.) DC.**
Voucher: Pereira, E. 6710 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Porophyllum obscurum* (Spreng.) DC.**
Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 10779 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado
***Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. subsp. *ruderale
Voucher: Lowrie, S.R. s.n. (RB 245910)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Domínio desconhecido

Praxeliopsis G.M.Barroso

Caetano Troncoso Oliveira
1 espécie (não endêmica)
***Praxeliopsis mattogrossensis* G.M.Barroso**
Voucher: Windisch, P.G. 1948 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

Praxelis Cass.

Caetano Troncoso Oliveira
13 espécies (6 endêmicas)
***Praxelis asperulacea* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Vieira, G. 181 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Praxelis basifolia* (Malme) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pereira, E. 391 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Praxelis capillaris* (DC.) Sch.Bip.**
Voucher: Souza, V.C. 8620 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Polo, M. 9385 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Praxelis grandiflora* (DC.) Sch.Bip.**
Voucher: Hatschbach, G. 47307 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Praxelis insignis* (Malme) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Gates, B.E. 62 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Praxelis kleinioides* (Kunth) Sch. Bip.**
Voucher: Loefgren, A. 4271 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Praxelis missiona* (Malme) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Rambo, B. 53325 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Praxelis odontodactyla* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Riedel, L. 1405 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Praxelis ostenii* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 76098 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Praxelis pauciflora* (Kunth) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Dubs, B. 516 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Praxelis sanctopaulensis* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 8602 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa
***Praxelis splettii* H.Rob.**
Voucher: Splett, S. 251 (BONN, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Prestelia Sch.Bip.

Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Prestelia eriopus* Sch.Bip.**
Voucher: Loeuille, B. 113 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Prolobus R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
1 espécie (1 endêmica)
***Prolobus nitidulus* (Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Carvalho, A.M. 3315 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Proteopsis Mart. & Zucc. *ex* Sch.Bip.

Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Proteopsis argentea* Mart. & Zucc. *ex* Sch.Bip.**
Voucher: Loeuille, B. 21 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Pseudelephantopus Rohr

Massimiliano Dematteis, Gracineide Almeida
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Pseudelephantopus spicatus* (Juss. *ex* Aubl.) Rohr**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 678 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Pseudelephantopus spiralis* Cronquist**
Voucher: Marino, F. 228 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Pseudobrickellia R.M.King & H.Rob.

Jimi Nakajima
3 espécies (3 endêmicas)
***Pseudobrickellia angustissima* (Spreng. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Sello, F. 761 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pseudobrickellia brasiliensis* (Spreng.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Gardner, G. 2898 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO, RO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul; Amazônia, Cerrado
***Pseudobrickellia irwinii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 7854 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

Pseudognaphalium Kirp.

Benoit Loeuille
5 espécies (nenhuma endêmica)
***Pseudognaphalium cheiranthifolium* (Lam.) Hilliard & Burtt**
Voucher: Almeida, G.S.S. 610 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Pseudognaphalium gaudichaudianum* (DC.) Anderb.**
Voucher: Irwin, H.S. 28752 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Pseudognaphalium leucopeplum* (Cabrera) Anderb.**
Voucher: Hagelund, K. 12273 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Pseudognaphalium luteoalbum* (L.) Hilliard & Burtt**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa
***Pseudognaphalium mendocinum* (Phil.) Deble & Marchiori**
Voucher: Hagelund, K. 13255 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Pseudogynoxys (Greenm.) Cabrera

Rafael Augusto Xavier Borges
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Pseudogynoxys cabrerae* H.Rob. & Cuatrec.**
Voucher: Krapovickas, A. 24271 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Pseudogynoxys chenopodioides* (Kunth) Cabrera**
Voucher: Gentry, A.H. 49301 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Pseudogynoxys lobata* Pruski**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5008 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Pseudostifftia H.Rob.

Jimi Nakajima
1 espécie (1 endêmica)
***Pseudostifftia kingii* H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8179 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Pterocaulon Elliott

Benoit Loeuille
11 espécies (nenhuma endêmica)
***Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC.**
Voucher: Ritter, M.R. 644 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Pterocaulon angustifolium* DC.**
Voucher: Lima, L.F. 101 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Pterocaulon balansae* Chodat**
Voucher: Ritter, M.R. 622 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Pterocaulon cordobense* Kuntze**
Voucher: Sobral, M. 1581 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Pterocaulon lanatum* Kuntze**
Voucher: Araújo, G.M. 31 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Pterocaulon lorentzii* Malme**
Voucher: Ritter, M.R. 909 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Pterocaulon polypterum* (DC.) Cabrera**
Voucher: Sobral, M. 4592 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Pterocaulon polystachyum* DC.**
Voucher: Sobral, M. 1672 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Pterocaulon purpurascens* Malme**
Voucher: Bertha, L. s.n. (RB 92722)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Pterocaulon rugosum* (Vahl) Malme**
Voucher: Ritter, M.R. 1140 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Pterocaulon virgatum* (L.) DC.**
Voucher: Ritter, M.R. 627 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Radlkoferotoma Kuntze

Jimi Nakajima
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Radlkoferotoma berroi* (Hutch.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pereira, E. 6795 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Radlkoferotoma cistifolia* (Less.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Rambo, R. 49421 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Radlkoferotoma ramboi* (Cabrera) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pereira, E. 6549 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Raulinoreitzia R.M.King & H.Rob.

Eric Koiti Okiyama Hattori
3 espécies (1 endêmica)
***Raulinoreitzia crenulata* (Spreng.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Krieger, L. 14713 (CESJ, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Raulinoreitzia leptophlebia* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Paiva, M.R.C. s.n. (SPF 176113)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Raulinoreitzia tremula* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 78953 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Richterago Kuntze

Nadia Roque
17 espécies (17 endêmicas)
***Richterago amplexifolia* (Gardner) Kuntze**
Voucher: Roque, N. 212 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago angustifolia* (Gardner) Roque**
Voucher: Roque, N. 410 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago arenaria* (Baker) Roque**
Voucher: Roque, N. 469 (SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago campestris* Roque & J.N.Nakaj.**
Voucher: Souza, V.C. 2002 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago caulescens* Roque**
Voucher: Roque, N. CFSC 13136 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago conduplicata* Roque**
Voucher: Roque, N. 349 (BHCB, SPF, RB, K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago discoidea* (Less.) Kuntze**
Voucher: Hatschbach, G. 47989 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago elegans* Roque**
Voucher: Hatschbach, G. 51149 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago hatschbachii* (Zardini) Roque**
Voucher: Roque, N. 472 (SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago lanata* Roque**
Voucher: Roque, N. 179 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago petiolata* Roque & J.N.Nakaj.**
Voucher: Silva, M.A. 3283 (IBGE, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago polymorpha* (Less.) Roque**
Voucher: Roque, N. CFSC 13138 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago polyphylla* (Baker) Ferreyra**
Voucher: Roque, N. 450 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago radiata* (Vell.) Roque**
Voucher: Roque, N. CFSC 13012 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Richterago riparia* Roque**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12379 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago stenophylla* (Cabrera) Roque**
Voucher: Roque, N. 482 (SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Richterago suffrutescens* (Cabrera) Roque**
Voucher: Barreto, H.L.M. 4744 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Riencourtia Cass.

João Bernardo de Azevedo Bringel Jr., Mara Angelina Galvão Magenta
5 espécies (2 endêmicas)
***Riencourtia latifolia* Gardner**
Voucher: Santos, J.R. 703 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Riencourtia longifolia* Baker**
Voucher: Arbo, M.M. 3100 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Riencourtia oblongifolia* Gardner**
Voucher: Bringel, J.B.A. 201 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Riencourtia pedunculosa* (Rich.) Pruski**
Voucher: Silva, G.P. 9784 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Riencourtia tenuifolia* Gardner**
Voucher: Fonseca, M.L. 4144 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Rolandra Rottb.

Massimiliano Dematteis, Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Rolandra fruticosa* (L.) Kuntze**
Voucher: Belém, R.P. 1014 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga

Salmea DC.
Mara Angelina Galvão Magenta
1 espécie (não endêmica)
***Salmea scandens* (L.) DC.**
Voucher: Pott, A. 4909 (JB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

Santosia R.M.King & H.Rob.
Eric Koiti Okiyama Hattori
1 espécie (1 endêmica)
***Santosia talmonii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ferreira, M.C. 348 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

Scherya R.M.King & H.Rob.
Jimi Nakajima
1 espécie (1 endêmica)
***Scherya bahiensis* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Schery, R.W. 607b (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Schkuhria Roth
Mara Angelina Galvão Magenta
1 espécie (não endêmica)
***Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze**
Voucher: Santoro, J. 741 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

Schlechtendalia Less.
Mariana Machado Saavedra
1 espécie (não endêmica)
***Schlechtendalia luzulifolia* Less.**
Voucher: Pereira, E. 8490 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Semiria D.J.N.Hind
Silvana C. Ferreira
1 espécie (1 endêmica)
***Semiria viscosa* D.J.N.Hind**
Voucher: Ferreira, S.C. 365 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Senecio L.
Aristônio Magalhães Teles
60 espécies (45 endêmicas), 10 variedades (4 endêmicas)
***Senecio adamantinus* Bong.**
Distribuição: nativa; endêmica
Senecio adamantinus* Bong. var. *adamantinus
Voucher: Romero, R. 6570 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Senecio adamantinus* var. *integrifolius* Baker**
Voucher: Soares Nunes s.n. (RB 188465)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Senecio albus* J.N.Nakaj. & A.M.Teles**
Voucher: Romero, R. 1069 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Senecio almasensis* Mattf.**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 1655 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Senecio altimontanus* A.M.Teles & L.D.Meireles**
Voucher: Meireles, L.D. 1657 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Senecio apensis* Cabrera**
Voucher: Hatschbach, G. 58741 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Senecio auritifolius* Cabrera**
Voucher: Dusén, P.K.H. 629 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Senecio brasiliensis* (Spreng.) Less.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Senecio brasiliensis* (Spreng.) Less. var. *brasiliensis
Voucher: Dusén, P.K.H. 302 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Senecio brasiliensis* var. *tripartitus* (DC.) Baker**
Voucher: Regnell, A.F. I-194 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Senecio caparaoensis* Cabrera**
Voucher: Brade, A.C. 17008 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Mata Atlântica
***Senecio claussenii* Decne.**
Voucher: Teles, A.M. 251 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Senecio colpodes* Bong.**
Voucher: Teles, A.M. 258 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Senecio conyzifolius* Baker**
Voucher: Rambo, B. 52184 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Senecio crassiflorus* (Poir.) DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Senecio crassiflorus* var. *maritimus* (Malme) Cabrera**
Voucher: Reitz, R. 5806 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Senecio crassiflorus* var. *subceratophyllus* Cabrera**
Voucher: Rambo, B. 1758 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Senecio dumetorum* Gardner**
Voucher: Teles, A.M. 496 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Senecio emiliopsis* C.Jeffrey**
Voucher: Nakajima, J.N. 825 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Senecio erisithalifolius* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Krieger, L. 11508 (CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Senecio gertii* Zardini**
Voucher: Teles, A.M. 518 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica
***Senecio graciellae* Cabrera**
Voucher: Brade, A.C. 19779 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica
***Senecio grisebachii* Baker**
Distribuição: nativa; endêmica
***Senecio grisebachii* var. *leptotus* Cabrera**
Voucher: Hatschbach, G. 11771 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Senecio harleyi* D.J.N.Hind**
Voucher: Ganev, W. 1966 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica
***Senecio hatschbachii* Cabrera**
Voucher: Teles, A.M. 245 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica
***Senecio hemmendorffii* Malme**
Voucher: Hatschbach, G. 41429 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Senecio heteroschizus* Baker**
Voucher: Rambo, B. 8949 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Senecio heterotrichius* DC.**
Voucher: Cabrera, A.L. 3828 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Senecio hoehnei* Cabrera**
Voucher: Dusén, P.K.H. 6941 (LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica
***Senecio icoglossus* DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Senecio icoglossus* var. *gigantophyllus* Cabrera**
Voucher: Regnell, A.F. II-161 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
Senecio icoglossus* DC. var. *icoglossus
Voucher: Brade, A.C. 17001 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa
***Senecio icoglossus* var. *spledens* Cabrera**
Voucher: Rambo, B. 52186 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Senecio juergensii* Mattf.**
Voucher: Brade, A.C. 5427 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS);
Mata Atlântica
***Senecio kuhlmannii* Cabrera**
Voucher: Brade, A.C. 15840 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Senecio langei* Malme**
Voucher: Ribas, O.S. 4711 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica
***Senecio lanifer* Mart. *ex* C.Jeffrey**
Voucher: Duarte, A.P. 8696 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),
Sul (PR, SC); Cerrado
***Senecio leptolobus* DC.**
Voucher: Rambo, R. 514 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa
***Senecio leptoschizus* Bong.**
Voucher: Hatschbach, G. 40735 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Senecio linearilobus* Bong.**
Voucher: Teles, A.M. 467 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica
***Senecio macrotis* Baker**
Voucher: Joly, A.B. 3767 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Senecio malacophyllus* Dusén**
Voucher: Brade, A.C. 15601 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Senecio nemoralis* Dusén**
Voucher: Occhioni, P. 8698 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica
***Senecio oleosus* Vell.**
Voucher: Damazio, L.B. 1290 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Senecio oligophyllus* Baker**
Voucher: Reitz, R. 1322 (LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Senecio paucijugus* Baker**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11052 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Senecio paulensis* Bong.**
Voucher: Forzza, R.C. 3192 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS);
Mata Atlântica
***Senecio pinnatus* Poir.**
Voucher: Malme, G.O.A. 168 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica
***Senecio platensis* Arechav.**
Voucher: Malme, G.O.A. 1547 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica
***Senecio pohlii* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Lombardi, J.A. 1250 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Senecio promatensis* Matzenb.**
Voucher: Matzenbacher, N.I. 2123 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Senecio pseudostigophlebius* Cabrera**
Voucher: Meireles, L.D. 3310 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Senecio pulcher* Hook. & Arn.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 8921 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Senecio ramboanus* Cabrera**
Voucher: Rambo, R. 54512 (LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Senecio ramentaceus* Baker**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 2855 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Senecio rauchii* Matzenb.**
Voucher: Matzenbacher, N.I. 2414 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Senecio regis* H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8123 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Senecio reitzianus* Cabrera**
Voucher: P.P. João A. Rchr. 609 (LIL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Senecio riograndensis* Matzenb.**
Voucher: Matzenbacher, N.I. 2046 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Senecio rossianus* Mattf.**
Voucher: Brade, A.C. 16610 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Senecio selloi* (Spreng.) DC.**
Voucher: Rambo, R. 48906 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Senecio stigophlebius* Baker**
Referência: Cabrera, A.L. 1959. Bol. Soc. Argent. Bot. 7: 233 –246.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Senecio subarnicoides* Cabrera**
Voucher: Rambo, R. 36355 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Senecio tamoides* DC.**
Voucher: Teles, A.M. 367 (BHCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Senecio trichochocaulon* Baker**
Voucher: Rambo, B. 32413 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Senecio tweediei* Hook. & Arn.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 1761 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Senecio viravira* Hieron.**
Voucher: Wasum, R. 6276 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Senecio westermanii* Dusén**
Voucher: Ribas, O.S. 4253 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Siegesbeckia L.

Mara Angelina Galvão Magenta
1 espécie (não endêmica)
***Siegesbeckia orientalis* L.**
Voucher: Lucchini, F. 34 (IAC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Silybum Adans.

Angelo Schneider
1 espécie (não endêmica)
***Silybum marianum* (L.) Gaertn.**
Voucher: Krantz, W.M. s.n. (FUEL 18646)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Simsia Pers.

Mara Angelina Galvão Magenta
1 espécie (não endêmica)
***Simsia dombeyana* DC.**
Voucher: Roque, N. 645 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Sipolisia Glaz. *ex* Oliv.

Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Sipolisia lanuginosa* Glaz. *ex* Oliv.**
Voucher: Lombardi, J.A. 879 (BHCB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Smallanthus Mack.

Cláudio Augusto Mondin
4 espécies (2 endêmicas)
***Smallanthus araucariophilus* Mondin**
Voucher: Mondin, C.A. 2920 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Smallanthus connatus* (Spreng.) H.Rob.**
Voucher: Mondin, C.A. 2643 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Smallanthus riograndensis* Mondin**
Voucher: Mondin, C.A. 2654 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Smallanthus siegesbeckius* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Lange, R.B. 142 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Soaresia Sch.Bip.

Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Soaresia velutina* Sch.Bip.**
Voucher: Irwin, H.S. 16541 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Solidago L.

Aristônio Magalhães Teles, Rafael Augusto Xavier Borges
1 espécie (não endêmica)
***Solidago chilensis* Meyen**
Voucher: Sucre, D. 2624 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Sommerfeltia Less.
Gustavo Heiden, Aristônio Magalhães Teles
1 espécie (não endêmica)
***Sommerfeltia spinulosa* (Spreng.) Less.**
Voucher: Sacco, J.C. 358 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Sonchus L.
Angelo Schneider
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sonchus asper* (L.) Hill**
Voucher: Arzivenco, L. 181 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa
***Sonchus oleraceus* L.**
Voucher: Silva, L.A.M. 649 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga

Sphaereupatorium (O.Hoffm.) Kuntze *ex* B.L.Rob.
Eric Koiti Okiyama Hattori
1 espécie (1 endêmica)
***Sphaereupatorium scandens* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Souza, V.C. 17171 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Sphagneticola O.Hoffm.
Cláudio Augusto Mondin, João Bernardo de Azevedo Bringel Jr.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Sphagneticola brachycarpa* (Baker) Pruski**
Referência: Pruski, J.F. 1996. Novon 6: 404-418.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Sphagneticola trilobata* (L.) Pruski**
Voucher: Mondin 2531 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Spilanthes Jacq.
Mara Angelina Galvão Magenta, Jimi Nakajima
2 espécies (2 endêmicas)
***Spilanthes nervosa* Chodat**
Voucher: Marquete, R. 2697 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Spilanthes urens* Jacq.**
Voucher: Souza, V.C. 20590 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

Staurochlamys Baker
João Bernardo de Azevedo Bringel Jr.
1 espécie (1 endêmica)
***Staurochlamys burchellii* Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 70899 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

Stenachaenium Benth.
Benoit Loeuille
5 espécies (1 endêmica)
***Stenachaenium adenanthum* Krasch.**
Voucher: Barbosa, E. 810 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Stenachaenium campestre* Baker**
Voucher: Smith, L.B. 10670 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Stenachaenium macrocephalum* Benth. *ex* Benth. & Hook.f.**
Voucher: Wasum, R. 8300 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Stenachaenium megapotamicum* (Spreng.) Baker**
Voucher: Reitz, R. 6405 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Stenachaenium riedelli* Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 41142 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Stenocephalum Sch.Bip.
Massimiliano Dematteis
6 espécies (4 endêmicas)
***Stenocephalum apiculatum* (Mart. *ex* DC.) Sch.Bip.**
Voucher: Anderson, W.R. 36826 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Stenocephalum hexanthum* Sch.Bip.**
Voucher: Hoehne, W. 993 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Stenocephalum hystrix* (Chodat) H.Rob.**
Voucher: Guerra, M. 80 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Domínio desconhecido
***Stenocephalum megapotamicum* (Spreng.) Sch.Bip.**
Voucher: Wasum, R. 3964 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado
***Stenocephalum monticola* (Mart. *ex* DC.) Sch.Bip.**
Voucher: Ganev, W. 15 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Stenocephalum tragiaefolium* (DC.) Sch.Bip.**
Voucher: Shimoya, G. 3635 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Stenopadus S.F.Blake
Nadia Roque
2 espécies (1 endêmica)
***Stenopadus aracaensis* Pruski**
Voucher: Prance, G.T. 29184 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Stenopadus talaumifolius* S.F.Blake**
Voucher: Prance, G.T. 9918 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Stenophalium Anderb.

Benoit Loeuille

5 espécies (5 endêmicas)

***Stenophalium almasense* D.J.N.Hind**
Voucher: Bautista, H.P. 2619 (HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Stenophalium chionaeum* (DC.) Anderb.**
Voucher: Hatschbach, G. 52873 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Stenophalium eriodes* (Mattf.) Anderb.**
Voucher: Luetzelburg, P. 220 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Stenophalium gardneri* (Baker) D.J.N.Hind**
Voucher: Gardner, G. 4934 (K, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stenophalium heringeri* (H.Rob.) Anderb.**
Voucher: Prance, G.T. 8990 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Stevia Cav.

Jimi Nakajima

32 espécies (25 endêmicas)

***Stevia alternifolia* Hieron.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Stevia camporum* Baker**
Voucher: Regnell, A.F. III-679 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Stevia catharinensis* Cabrera & Vittet**
Voucher: Smith, L.B. 11534 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Stevia cinerascens* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Sellow, F. 1949 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Stevia claussenii* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Claussen, P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado

***Stevia collina* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 4839 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Stevia crenulata* Baker**
Voucher: Pohl, J.B.E. 323 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Stevia cruziana* Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 786 (S)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Stevia cryptantha* Baker**
Voucher: Claussen, P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stevia decussata* Baker**
Voucher: Regnell, A.F. III-677 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Stevia dubia* B.L.Rob.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6575 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stevia gardneriana* Baker**
Voucher: Gardner, G. 3811 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Stevia heptachaeta* DC.**
Voucher: Vauthier, M. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Stevia hilarii* B.L.Rob.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1195 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stevia involucrata* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Sellow, F. 3454 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Stevia leptophylla* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Hassler, E. 6617 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Stevia lundiana* DC.**
Voucher: Lund, P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Stevia menthaefolia* Sch.Bip.**
Voucher: Claussen, P. 83 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Stevia morii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8075 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Stevia myriadenia* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Sellow, F. 4447 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Stevia oligocephala* DC.**
Voucher: Vauthier, M. 309 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Stevia ophryophylla* B.L.Rob.**
Voucher: Luederwaldt, H. 744 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Stevia organensis* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 512 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stevia pohliana* Baker**
Voucher: Pohl, J.B.E. 464 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Stevia rebaudiana* (Bertoni) Bertoni**
Voucher: Macedo, A. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Stevia resinosa* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 4839 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Stevia riedelli* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Riedel, L. 546 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch.Bip. *ex* Klotzsch**
Voucher: Commerson, P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Stevia selloi* (Spreng.) B.L.Rob.**
Voucher: Sellow, F. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Stevia urticaefolia* Thunb.**
Voucher: Martius, C.F.P. 772 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Stevia veronicae* DC.**
Voucher: Vauthier, M. 325 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Stevia verticillata* Schltdl.**
Referência: Schlechtendal, D.F.L. 1842. Linnaea 16: 372.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Steyermarkina R.M.King & H.Rob.

Eric Koiti Okiyama Hattori
3 espécies (3 endêmicas)
***Steyermarkina dispalata* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Correa, C.M.B. 332 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Steyermarkina dusenii* (Malme) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Silva, J.M. 3080 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Steyermarkina pyrifolia* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 54408 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Stifftia J.C.Mikan

Anna Carolina Mendonça Pereira
5 espécies (3 endêmicas)
***Stifftia chrysantha* J.C.Mikan**
Voucher: Marquete, R. 694 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Stifftia fruticosa* (Vell.) D.J.N.Hind & Semir**
Voucher: Hoehne, W. s.n. (HUFS 25608, MBM, RB 362720)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Stifftia hatschbachii* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 58038 (HUEFS, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Stifftia parviflora* (Leandro) D.Don**
Voucher: Kawasaki, M.L. s.n. (UEC 27831)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Stifftia uniflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1432 (R, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Stilpnopappus Mart. *ex* DC.

Benoit Loeuille
9 espécies (9 endêmicas)
***Stilpnopappus cearensis* Huber**
Voucher: Lima, A. 2870 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE); Caatinga
***Stilpnopappus laiseae* R.Barros & R.Esteves**
Voucher: Barros, R. 1251 (K, NY, R, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Stilpnopappus pantanalensis* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 60918 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal
***Stilpnopappus pratensis* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 7003 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE); Caatinga
***Stilpnopappus scaposus* DC.**
Voucher: Harley, R.M. 20949 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stilpnopappus semirianus* R.Esteves**
Voucher: Harley, R.M. 21135 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stilpnopappus suffruticosus* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 2204 (BM, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Stilpnopappus tomentosus* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Harley, R.M. 19981 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Stilpnopappus trichospiroides* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Barroso, G.M. 163 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Stomatanthes R.M.King & H.Rob.

Jimi Nakajima
13 espécies (11 endêmicas)
***Stomatanthes corumbensis* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Romero, R. 3963 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Stomatanthes dentatus* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Gardner, G. 3833 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Stomatanthes dictyophyllus* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Romero, R. 2823 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Stomatanthes hirsutus* H.Rob.**
Voucher: Smith, L.B. 15063 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Stomatanthes loefgrenii* (B.L.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Handro, O. 734 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Stomatanthes oblongifolius* (Spreng.) H.Rob.**
Voucher: Fernandes, A.C. s.n. (ICN 158469)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa
***Stomatanthes pernambucensis* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Lützelburg, P. 1256 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Stomatanthes pinnatipartitus* (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Nakajima, J.N. 1217 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Stomatanthes polycephalus* (Sch.Bip. *ex* B.L.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 25023 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Stomatanthes reticulatus* Grossi & J.N.Nakaj.**
Voucher: Nakajima, J.N. 513 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Stomatanthes subcapitatus* (Malme) H.Rob.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 7213 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Stomatanthes trigonus* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Gardner, G. 3270 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Stomatanthes warmingii* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Heringer, E.P. s.n. (RB 97301)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Stomatochaeta (S.F.Blake) Maguire & Wurdack

Nadia Roque
1 espécie (não endêmica)
***Stomatochaeta condensata* (Baker) Maguire & Wurdack**
Referência: Pruski, J.F. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 370-374.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Strophopappus DC.

Benoit Loeuille
9 espécies (9 endêmicas)
***Strophopappus bicolor* DC.**
Voucher: Silva, M.A. 2982 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Strophopappus bullatus* (Krasch.) Sch.Bip. *ex* R. Esteves**
Voucher: Hatschbach, G. 31933 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal
***Strophopappus emarginatus* (Gardner) R.Esteves**
Voucher: Gardner, G. 3259 (BM, BR, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Strophopappus ferrugineus* (Baker) R.Esteves**
Voucher: Pereira, E. 9113 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Strophopappus glomeratus* (Gardner) R.Esteves**
Voucher: Mendonça, R.C. 2566 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado
***Strophopappus pohlii* (Baker) R.Esteves**
Voucher: Filgueiras, T.S. 2316 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Strophopappus regnellii* (Baker) R.Esteves**
Voucher: Dusén, P.K.H. 14825 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Strophopappus speciosus* (Less.) R.Esteves**
Voucher: Martins, F.R. 44 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Strophopappus villosus* (Baker) R.Esteves**
Voucher: Manso, P.S. 32 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Struchium P.Browne

Massimiliano Dematteis, Benoit Loeuille
1 espécie (não endêmica)
***Struchium sparganophorum* (L.) Kuntze**
Voucher: Souza, V.C. 24638 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga

Stylotrichium Mattf.

Silvana C. Ferreira
5 espécies (5 endêmicas)
***Stylotrichium corymbosum* (DC.) Mattf.**
Voucher: Queiroz, L.P. 3486 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Stylotrichium edmundoi* G.M.Barroso**
Voucher: França, F. 5517 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Stylotrichium glomeratum* Bautista et al.**
Voucher: Bautista, H.P. 2301 (HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stylotrichium rotundifolium* Mattf.**
Voucher: Oliveira, E.C. 56 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Stylotrichium sucrei* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Ferreira, S.C. 350 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Symphyopappus Turcz.

Eric Koit Okiyama Hattori
13 espécies (13 endêmicas)
***Symphyopappus angustifolius* Cabrera**
Voucher: Magalhães, G.M. 1694 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Symphyopappus brasiliensis* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Mello-Silva, R. 2974 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Symphyopappus casarettoi* B.L.Rob.**
Voucher: Kummrow, R. 1245 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Symphyopappus compressus* (Gardner) B.L.Rob.**
Voucher: Romero, R. 4846 (HUFU, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Symphyopappus cuneatus* (DC.) Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 13610 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Symphyopappus decemflorus* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 77515 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Symphyopappus decussatus* Turcz.**
Voucher: Forzza, R.C. 3918 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Symphyopappus itatiayensis* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 44485 (MBM, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Symphyopappus lymansmithii* B.L.Rob.**
Voucher: Ribas, O.S. 6683 (ALCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Symphyopappus myricifolius* B.L.Rob.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 155 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Symphyopappus reitzii* (Cabrera) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Smith, L.B. 10036 (HBR, LP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Symphyopappus reticulatus* Baker**
Voucher: Sakuragui, C.M. CFCR 15197 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Symphyopappus uncinatus* H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 25065 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Symphyotrichum Nees

Aristônio Magalhães Teles, Gustavo Heiden, Rafael Augusto Xavier Borges
5 espécies (1 endêmica)
***Symphyotrichum graminifolium* (Spreng.) G.L.Nesom**
Voucher: Arzivenco, L. s.n. (ICN 65033)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Symphyotrichum laeve* (L.) Á.Löve & D.Löve**
Voucher: Hoehne s.n. (RB 363215)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Symphyotrichum martii* (Baker) G.L.Nesom**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Symphyotrichum regnellii* (Baker) G.L.Nesom**
Voucher: Regnell, A.F. 201 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Symphyotrichum squamatum* (Spreng.) G.L.Nesom**
Voucher: Lange, R.B. 1307 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Synedrella Gaertn.

Mara Angelina Galvão Magenta
1 espécie (não endêmica)
***Synedrella nodiflora* (L.) Gaertn.**
Voucher: Frazão, A. s.n. (RB 7066)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga

Tagetes L.

Jimi Nakajima
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Tagetes erecta* L.**
Voucher: Ferreira, L. 127 (INPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Amazônia
***Tagetes minuta* L.**
Voucher: Hatschbach, G. 33414 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tanacetum L.

Jimi Nakajima
1 espécie (não endêmica)
***Tanacetum vulgare* L.**
Voucher: Zuchiwschi, E. 14 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Teixeiranthus R.M.King & H.Rob.

Jimi Nakajima
2 espécies (2 endêmicas)
***Teixeiranthus foliosus* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 669 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado
***Teixeiranthus pohlii* (Sch.Bip. *ex* Baker) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Pohl, J.B.E. 358 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Telmatophila Mart. *ex* Baker

Massimiliano Dematteis, Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Telmatophila scolymastrum* Mart. *ex* Baker**
Voucher: Martius, C.F.P. 2444 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

Tessaria Ruiz & Pav.

Benoit Loeuille
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC.**
Voucher: Reitz, R. 186 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2382 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

Tilesia G.Mey.

Mara Angelina Galvão Magenta
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Tilesia baccata* (L.f.) Pruski**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
***Tilesia baccata* var. *discoidea* (S.F.Blake) Pruski**
Voucher: Campbell, D.G. 8989 (NYBG)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Tithonia Desf. *ex* Juss.

Mara Angelina Galvão Magenta

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A.Gray**
Voucher: Câmara, P.S. 217 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Tithonia rotundifolia* (Mill.) S.F.Blake**
Voucher: King, R.M. 7996 (MO)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Trichocline Cass.

Marcelo Monge

5 espécies (2 endêmicas)

***Trichocline catharinensis* Cabrera**
Voucher: Reitz, R. 10068 (HBR, LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Trichocline linearifolia* Malme**
Voucher: Hatschbach, G. 35370 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Trichocline macrocephala* Less.**
Voucher: Reitz, R. 14668 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Trichocline maxima* Less.**
Referência: Zardini, E.M. 1975. Darwiniana 19: 619-733.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Trichocline speciosa* Less.**
Voucher: Cruz, J.M. 84 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Trichogonia Gardner

Nadia Roque

20 espécies (16 endêmicas)

***Trichogonia arguta* (Humb. et al.) Benth. & Hook.f. *ex* Klatt**
Voucher: Silva, M.R. 366 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Trichogonia attenuata* G.M.Barroso**
Voucher: Eiten, G. 2597 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichogonia campestris* Gardner**
Voucher: Hind, D.J.N. PCD 3342 (ALCB, CEPEC, HRB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Trichogonia chodatii* (Hassl.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 21228 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichogonia cinerea* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 7640 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Trichogonia crenulata* (Gardner) D.J.N.Hind**
Voucher: Varanda CFCR 4468 (ALCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichogonia eupatorioides* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Gardner, G. 4839 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trichogonia grazielae* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8866 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Trichogonia harleyi* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Harley, R.M. 16977 (CEPEC, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Trichogonia hassleri* Mattf.**
Voucher: Hatschbach, G. 74603 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Trichogonia heringeri* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Salgado, O.A. 393 (ALCB, CEPEC, HRB, MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Trichogonia hirtiflora* (DC.) Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Semir, J. 608 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichogonia laxa* Gardner**
Voucher: Anderson, W.R. 36861 (MG, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Trichogonia menthifolia* Gardner**
Voucher: Anderson, W.R. 37010 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Trichogonia prancei* G.M.Barroso**
Voucher: King, R.M. 8812 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Trichogonia salviifolia* Gardner**
Voucher: Souza, V.C. 10932 (ESA, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Trichogonia santosii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Guedes, M.L.S. PCD 3040 (ALCB, CEPEC, HRB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Trichogonia spathulifolia* Mattf.**
Voucher: Lützelburg, P. 412 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Trichogonia tombadorensis* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 39570 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Trichogonia villosa* (Spreng.) Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Guedes, M.L.S. 6277 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Trichogoniopsis R.M.King & H.Rob.

Nadia Roque

3 espécies (3 endêmicas)

***Trichogoniopsis adenantha* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Folli, D.A. 2797 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichogoniopsis morii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: King, R.M. 8178 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Trichogoniopsis podocarpa* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Sucre, D. 5860 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Trichospira Kunth

Polyana Noronha Soares
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Trichospira menthoides* Kunth**
Voucher: Guedes, M.L.S. 13840 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Sul (PR); Amazônia
***Trichospira verticillata* (L.) S.F.Blake**
Voucher: Gardner, G. 3263 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia

Tridax L.

Cláudio Augusto Mondin
1 espécie (não endêmica)
***Tridax procumbens* L.**
Voucher: Magenta, M.A.G. 45 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Trixis P.Browne

Marcelo Monge
15 espécies (10 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze**
Voucher: Udulutsch, R.G. 410 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Trixis calycina* D.Don**
Referência: Katinas, L. 1996. Darwiniana 34(1-4): 27-108.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Trixis glaziovii* Baker**
Voucher: Hoehne s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Trixis glutinosa* D.Don**
Referência: Katinas, L. 1996. Darwiniana 34(1-4): 64.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado
***Trixis lessingii* DC.**
Voucher: Lüderwalt, L. 229 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Trixis nobilis* (Vell.) Katinas**
Voucher: Martins, F.R. 16868 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Trixis ophiorhiza* Gardner**
Distribuição: nativa; não endêmica
Trixis ophiorhiza* Gardner subsp. *ophiorhiza
Voucher: Bongard, G.V. 4266 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Trixis pallida* Less.**
Voucher: Sellow, F. 3266 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Trixis praestans* (Vell.) Cabrera**
Voucher: Silva, J.M. 5874 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Trixis pruskii* D.J.N.Hind**
Referência: Hind, D.J.N. 2000. Kew Bull. 55(2): 381-386.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Trixis spicata* Gardner**
Voucher: Arbo, M.M. 4041 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Trixis thyrsoidea* Dusén *ex* Malme**
Voucher: Smith, A.C. 13940 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Trixis vauthieri* DC.**
Voucher: Harley, R.M. 28224 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Trixis verbascifolia* (Gardner) Blake**
Voucher: Brade, A.C. 20352 (LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Trixis villosa* (Spreng.) Sch.Bip.**
Referência: Brandão et al. 1997. Daphne 7(1): 29.
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

Unxia L.f.

Jimi Nakajima
3 espécies (1 endêmica)
***Unxia camphorata* L.f.**
Voucher: Daly, D.C. 10654 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Unxia kubitzkii* H.Rob.**
Voucher: Kubitzki, K. K-79-103 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Unxia suffruticosa* (Baker) Stuessy**
Voucher: Madison, M.T. 232 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Urolepis (DC.) R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
1 espécie (não endêmica)
***Urolepis hecatantha* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Trigo, J.R. 16685 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Verbesina L.

Cláudio Augusto Mondin, João Bernardo de Azevedo Bringel Jr.
12 espécies (6 endêmicas)
***Verbesina baccharifolia* Mattf.**
Voucher: Ganev, W. 903 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Verbesina bipinnatifida* Baker**
Referência: Blake, S.F. 1925. Amer. J. Bot. 12: 625-640.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Verbesina clausseni* Sch.Bip. *ex* Baker**
Referência: Blake, S.F. 1925. Amer. J. Bot. 12: 625-640.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Verbesina diversifolia* DC.**
Referência: Baker, J.G. 1884. Fl. bras. 6:138-298.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Verbesina floribunda* Gardner**
Referência: Blake, S.F. 1925. Amer. J. Bot. 12:625-640.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
***Verbesina glabrata* Hook. & Arn.**
Voucher: Stehmann, J.R. 184 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado
***Verbesina luetzelburgii* Mattf.**
Voucher: Harley, R.M. 26109 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Verbesina macrophylla* (Cass.) S.F.Blake**
Voucher: Duarte, A.P. 10414 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Verbesina nicotinaefolia* Baker**
Voucher: Proença, C.E.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Verbesina polyanthes* Toledo**
Voucher: Silva, P. 56 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Verbesina pseudoclaussenii* D.J.N.Hind**
Voucher: Freire-Fierro, A. 12508 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Verbesina sordescens* DC.**
Voucher: Mondin, C.A. 2428 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Vernonanthura H.Rob.

Polyana Noronha Soares, Gracineide Almeida
36 espécies (19 endêmicas)
***Vernonanthura almedae* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 11484 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Vernonanthura angulata* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 9593 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Vernonanthura beyrichii* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 49846 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado
***Vernonanthura brasiliana* (L.) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 68123 (HUFU, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Vernonanthura catharinensis* (Cabrera) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 79790 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido
***Vernonanthura chamaedrys* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Pott, A. 12728 (HMS, HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado
***Vernonanthura crassa* (Vell.) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 19881 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Vernonanthura cuneifolia* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Hattori, E.K.O. 817 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado
***Vernonanthura cymosa* (Vell.) H.Rob.**
Voucher: Roth, L. 1387 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Vernonanthura discolor* (Spreng.) H.Rob.**
Voucher: Almeida, G.S.S. 522 (HUNB, VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Vernonanthura divaricata* (Spreng.) H.Rob.**
Voucher: Mori, S.A. 11011 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado
***Vernonanthura fagifolia* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Hind, D.J.N. 4045 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Vernonanthura ferruginea* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Hattori, E.K.O. 816 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado
***Vernonanthura ignobilis* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 7084 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Vernonanthura laxa* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1571 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Vernonanthura lindbergii* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Pereira, E. 8214 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Vernonanthura lucida* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Loeuille, B. 132 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado
***Vernonanthura mariana* (Mart. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Loeuille, B. 95 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado
***Vernonanthura membranacea* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Anderson, W.R. 9726 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Vernonanthura montevidensis* (Spreng.) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 22424 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado
***Vernonanthura mucronulata* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 49545 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Vernonanthura nudiflora* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Sobral, M. 1461 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Vernonanthura oligactoides* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 44803 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Vernonanthura oligolepis* (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 76872 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado
***Vernonanthura paludosa* (Gardner) H.Rob.**
Voucher: Prance, G.T. 7313 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Vernonanthura patens* (Kunth) H.Rob.**
Voucher: Roth, L. 1452 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Vernonanthura petiolaris* (DC.) H.Rob.**
Voucher: Correa, J.A. 140 (HUFU, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Vernonanthura phaeoneura* (Toledo) H.Rob.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 70 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H.Rob.**
Voucher: Nakajima, J.N. 1254 (HUFU, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Vernonanthura piresii* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Maguire, B. 56893 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Vernonanthura rigiophylla* (Kuntze) H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 4026 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Vernonanthura subverticillata* (Sch.Bip. *ex* Baker) H.Rob.**
Voucher: Pirani, J.R. CFCR 11476 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado
***Vernonanthura tweediana* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Carmo, M.R.B. 800 (HUPG, HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Vernonanthura vinhae* (H.Rob.) H.Rob.**
Voucher: Mori, S.A. 12812
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vernonanthura viscidula* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Romero, R. 2283 (HUFU, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Cerrado
***Vernonanthura westiniana* (Less.) H.Rob.**
Voucher: Almeida, G.S.S. 208 (HUNEB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Vernonia Schreb.

Polyana Noronha Soares, Massimiliano Dematteis
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Vernonia echioides* Less.**
Voucher: Brade, A.C. 6648 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vernonia incana* Less.**
Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

Viguiera Kunth

Mara Angelina Galvão Magenta
29 espécies (18 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)
***Viguiera amphychlora* S.F.Blake**
Voucher: Hatschbach, G. 7769 (MBM, RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Viguiera anchusifolia* (DC.) Baker**
Voucher: Magenta, M.A.G. 527 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Viguiera arenaria* Baker**
Referência: Baker, J.G. 1884. Fl. bras. 6 (3): 226.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Viguiera aspiliodies* Baker**
Voucher: Magenta, M.A.G. 477 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Viguiera bakeriana* S.F.Blake**
Voucher: Magenta, M.A.G. 494 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Viguiera bracteata* Gardner**
Voucher: Magenta, M.A.G. 315 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Viguiera corumbensis* Malme**
Voucher: Hatschbach, G. 7490 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Viguiera discolor* Baker**
Voucher: Magenta, M.A.G. 713 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Viguiera filifolia* Sch.Bip. *ex* Baker**
Voucher: Magenta, M.A.G. 360 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Viguiera gardneri* Baker**
Voucher: Magenta, M.A.G. 443 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Viguiera grandiflora* (Gardner) Gardner**
Voucher: Magenta, M.A.G. 371 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Viguiera hispida* Baker**
Voucher: Magenta, M.A.G. 720 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Viguiera kunthiana* Gardner**
Voucher: Magenta, M.A.G. 309 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Viguiera linearifolia* Chodat & Hassl.**
Voucher: Magenta, M.A.G. 690 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Viguiera macrorhiza* Baker**
Voucher: Magenta, M.A.G. 476 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Viguiera megapotamica* Malme**
Voucher: Magenta, M.A.G. 502 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Cerrado
***Viguiera meridionalis* Magenta**
Voucher: Hagelund, K. s.n. (ICN 12804)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Cerrado
***Viguiera nudibasilaris* S.F.Blake**
Voucher: Magenta, M.A.G. 426 (K, SPF, SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Viguiera nudicaulis* Baker**
Voucher: Magenta, M.A.G. 503 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Viguiera oblongifolia* Gardner**
Voucher: Magenta, M.A.G. 355 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Viguiera paranensis* (Malme) Santos**
Voucher: Araki, P.M. s.n. (HUEPG 3506)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Cerrado
***Viguiera pilicaulis* S.F.Blake**
Voucher: Magenta, M.A.G. 420 (HUFU, K, SPF, SPFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Viguiera pilosa* Baker**
Voucher: Magenta, M.A.G. 420 (HUFU, K, SPF, SPFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido
***Viguiera robusta* Gardner**
Distribuição: nativa; endêmica
Viguiera robusta* Gardner var. *robusta
Voucher: Magenta, M.A.G. 666 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Viguiera squalida* S.Moore**
Voucher: Magenta, M.A.G. 308 (HUFU, K, SPF, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste, Sul (PR); Cerrado
***Viguiera tenuifolia* Gardner**
Voucher: Magenta, M.A.G. 482 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Viguiera trichophylla* Dusén**
Voucher: Magenta, M.A.G. 391 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Viguiera tuberosa* Griseb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Viguiera tuberosa* Griseb. var. *tuberosa
Voucher: Lorentz, P.G. 591 (GOET)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa
***Viguiera vernonioides* Baker**
Voucher: Magenta, M.A.G. 460 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

Vinicia Dematt.

Massimiliano Dematteis, Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Vinicia tomentosa* Dematt.**
Voucher: Souza, V.C. 25483 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Vittetia R.M.King & H.Rob.

Silvana C. Ferreira
2 espécies (2 endêmicas)
***Vittetia bishopii* R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Duarte, A.P. 2150 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vittetia orbiculata* (DC.) R.M.King & H.Rob.**
Voucher: Klein, R.M. 4880 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Wedelia Jacq.

João Bernardo de Azevedo Bringel Jr., Cláudio Augusto Mondin
30 espécies (24 endêmicas)
***Wedelia alagoensis* Baker**
Voucher: Gardner, G. 1349 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga
***Wedelia almedae* H.Rob.**
Referência: Robinson, H. 1984. Phytologia 55: 389-314.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Wedelia bahiensis* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 44185 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Wedelia bishopii* H.Rob.**
Voucher: Silva, G.P. 6003 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Wedelia goyazensis* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 3293 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Wedelia hatschbachii* H.Rob.**
Voucher: Hatschbach, G. 25050 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Wedelia heringeri* H.Rob.**
Voucher: Heringer, E.P. 16793 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Wedelia hispidula* (Baker) J.U.Santos**
Voucher: Warming, E. 581 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Wedelia hookeriana* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 2219 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE); Caatinga
***Wedelia kirkbridei* H.Rob.**
Voucher: Bringel, J.B.A. 202 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Wedelia longifolia* Mart. *ex* Baker**
Referência: Baker, J.G. 1884. Fl. bras. 6: 138-298.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Wedelia lundii* DC.**
Referência: Baker, J.G. 1884. Fl. bras. 6:138-298.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Wedelia macedoi* H.Rob.**
Voucher: Romero, R. 3070 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Wedelia macrodonta* DC.**
Referência: Baker, J.G. 1884. Fl. bras. 6: 138-298.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Wedelia modesta* Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 42018 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Wedelia oligocephala* Baker**
Voucher: Pastore, J.F.B. 1166 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Wedelia pallida* Gardner**
Voucher: Bringel, J.B.A. 299 (CEN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido
***Wedelia pertenuis* H.Rob.**
Voucher: Irwin, H.S. 2541 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Wedelia pilosa* Baker**
Voucher: Warming, E. 566 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Wedelia puberula* DC.**
Voucher: Nakajima, J.N. 2374 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Wedelia ramagii* (Ridl.) J.U.Santos**
Referência: Santos, J.U. 1993. Atas Soc. Bot. Brasil, Sec. Rio de Janeiro 3: 118.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado
***Wedelia regis* H.Rob.**
Voucher: Bringel, J.B.A. 280 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Wedelia rudis* (Baker) H.Rob.**
Voucher: Figueiredo, C. 518
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Wedelia souzae* H.Rob.**
Voucher: Shepherd, G.J. 3749 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Wedelia subalpestris* (Baker) J.U.Santos**
Voucher: Irwin, H.S. 25303 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Wedelia subvelutina* DC.**
Voucher: Nakajima, J.N. 1982 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Wedelia trichostephia* DC.**
Referência: Baker, G.J. 1884. Fl. bras. 6: 138-298.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Wedelia vauthieri* DC.**
Referência: Baker, J.G. 1884. Fl. bras. 6: 138-298.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Wedelia veadeiroensis* H.Rob.**
Referência: Robinson, H. 1984. Phytologia 55: 389-314.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Wedelia villosa* Gardner**
Voucher: Gardner, G. 1349 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Wunderlichia Riedel *ex* Benth. & Hook.f.

Fátima Otavina de Souza-Buturi
6 espécies (6 endêmicas)
***Wunderlichia azulensis* Maguire & G.M.Barroso**
Voucher: Souza-Buturi, F.O. 297 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado
***Wunderlichia bahiensis* Maguire & G.M.Barroso**
Voucher: Pereira, E. 2063 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Wunderlichia cruelsiana* Taub.**
Voucher: Saavedra, M.M. 498 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Wunderlichia insignis* Baill.**
Voucher: Santos Lima, J. 13195 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Wunderlichia mirabilis* Riedel *ex* Baker**
Voucher: Souza-Buturi, F.O. 281 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Wunderlichia senaeii* Glaz. *ex* Maguire & G.M.Barroso**
Voucher: Viana, P.L. 1140 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Xanthium L.

Cláudio Augusto Mondin
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Xanthium spinosum* L.**
Voucher: Mondin, C.A. 2577 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Xanthium strumarium* L.**
Voucher: Mondin, C.A. 2712 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

Xerxes J.R.Grant

Benoit Loeuille
1 espécie (1 endêmica)
***Xerxes ekmanianum* (Philipson) J.R.Grant**
Voucher: Felfili, J.M. 352 (IBGE, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Xiphochaeta Poepp.

Benoit Loeuille
1 espécie (não endêmica)
***Xiphochaeta aquatica* Poepp.**
Voucher: Jangoux, J. 390 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

Zinnia L.
Mara Angelina Galvão Magenta
1 espécie (não endêmica)
***Zinnia elegans* Jacq.**
Voucher: Gadelha-Neto, P.C. 1747 (UFPB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

BALANOPHORACEAE
Leandro Jorge Telles Cardoso, João Marcelo Alvarenga Braga
6 gêneros, 11 espécies (4 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica)

Helosis Rich.
1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Helosis cayennensis* (Sw.) Spreng.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Helosis cayennensis* (Sw.) Spreng. subsp. *cayennensis
Voucher: Braga, J.M.A. 4085 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Langsdorffia Mart.
1 espécie (não endêmica)
***Langsdorffia hypogaea* Mart.**
Voucher: Sucre, D. 9284 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Lathrophytum Eichler
1 espécie (1 endêmica)
***Lathrophytum peckoltii* Eichler**
Voucher: Cardoso, L.J.T. 52 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Lophophytum Schott & Endl.
3 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)
***Lophophytum leandri* Eichler**
Voucher: Braga, J.M.A. 1623 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lophophytum mirabile* Schott & Endl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Lophophytum mirabile* subsp. *bolivianum* (Wedd.) B.Hansen**
Voucher: Emmerich, M. 5327 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
Lophophytum mirabile* Schott & Endl. subsp. *mirabile
Voucher: Cardoso, L.J.T. 291 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Lophophytum rizzoi* Delprete**
Voucher: Rizzo, J.A. 2854 (NY, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Ombrophytum Poepp. *ex* Endl.
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Ombrophytum microlepis* B.Hansen**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Ombrophytum peruvianum* Poepp. & Endl.**
Voucher: Prance, G.T. 7664 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Ombrophytum violaceum* B.Hansen**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Scybalium Schott & Endl.
2 espécies (2 endêmicas)
***Scybalium fungiforme* Schott & Endl.**
Voucher: Anderson, W.R. 7412 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Scybalium glaziovii* Eichler**
Voucher: Cardoso, L.J.T. 129 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

BASELLACEAE
Felipe Bastos, Cássia Mônica Sakuragui
2 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Anredera Juss.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis**
Voucher: Sucre, D. 1436 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Anredera tucumanensis* (Lillo & Hauman) Sperling**
Voucher: Duarte, A.P. 236 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Basella L.
1 espécie (não endêmica)
***Basella alba* L.**
Referência: Souza, V.C. & Lorenzi, H. 2008. Botânica Sistemática 263.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

BATACEAE
Cássia Mônica Sakuragui, Nathália de Paiva Krauss Silva
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Batis P.Browne
1 espécie (não endêmica)
***Batis maritima* L.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 1701 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN); Mata Atlântica

BEGONIACEAE

Eliane de Lima Jacques

1 gênero, 208 espécies (184 endêmicas),
45 variedades (39 endêmicas)

Begonia L.

208 espécies (184 endêmicas), 45 variedades (39 endêmicas)

***Begonia acetosa* Vell.**
Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10: t. 50.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia acida* Vell.**
Referência: Candolle, A.P. 1864. Prodr. 15(1): 364.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia aconitifolia* A.DC.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15389 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia admirabilis* Brade**
Voucher: Jacques, E.L. 810 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Begonia aguiabrancensis* L.Kollmann**
Voucher: Demuner, V. 2286 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Begonia albidula* Brade**
Voucher: Jacques, E.L. 807 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Begonia alchemilloides* Meisn. *ex* A.DC.**
Voucher: Vidal, J. s.n. (RB 192396)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Begonia altamiroi* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 18400 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Begonia angraensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 14923 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia angularis* Raddi**
Distribuição: nativa; endêmica

Begonia angularis* Raddi var. *angularis
Voucher: Brade, A.C. 18659 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Begonia angularis* var. *angustifolia* A.DC.**
Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (RB 57271, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica

***Begonia angulata* Vell.**
Distribuição: nativa; endêmica

Begonia angulata* Vell. var. *angulata
Voucher: Brade, A.C. 20860 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Begonia angulata* var. *campos-portoi* Brade**
Voucher: Campos-Porto, P. 3350 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Begonia angulata* var. *serrana* Brade**
Voucher: Pereira, E. 326 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia antonietae* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 20339 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia apparicioi* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 18387 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Begonia arborescens* Raddi**
Distribuição: nativa; endêmica

Begonia arborescens* Raddi var. *arborescens
Voucher: Jacques, E.L. 209 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia arborescens* var. *confertiflora* (Gardner) A.DC.**
Voucher: Gardner, G. 602 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia arborescens* var. *oxyphylla* (A.DC.) S.F.Sm.**
Voucher: s.col. 1828 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia bahiensis* A.DC.**
Voucher: Velloso, H.P. 1103 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Begonia barkleyana* L.B.Sm.**
Voucher: Jacques, E.L. 841 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Begonia besleriifolia* Schott**
Voucher: Jacques, E.L. 802 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Begonia bidentata* Raddi**
Distribuição: nativa; endêmica

Begonia bidentata* Raddi var. *bidentata
Voucher: Konno 384 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Begonia bidentata* var. *insularum* A.DC.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1861. Fl. bras. 4(1): 381.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Begonia biguassuensis* Brade**
Voucher: Reitz, R. 3389 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia bonitoensis* Brade**
Distribuição: nativa; endêmica

Begonia bonitoensis* Brade var. *bonitoensis
Voucher: Pereira, E. 308 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia bonitoensis* var. *intermedia* Brade**
Referência: Brade, A.C. 1957. Rodriguésia 32: 163.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia boraceiensis* Handro**
Voucher: Loefgren, A. 8770 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia bradei* Irmsch.**
Voucher: Piacentin, E.P. 12 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia brevilobata* Irmsch.**
Distribuição: nativa; endêmica
Begonia brevilobata* Irmsch. var. *brevilobata
Voucher: Luederwaldt, H. s.n. (SP 18034)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia brevilobata* var. *subtomentosa* Irmsch.**
Voucher: Edwall, G. CGGSP 3953 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia bullatifolia* L.Kollmann**
Referência: Kollmann, L. 2009. Candollea 64(1): 118.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Begonia cacauicola* L.B.Sm. *ex* S.F.Sm. & Wassh.**
Voucher: Belém, R.P. 1002 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Begonia callosa* L.Kollmann**
Voucher: Fontana, A.P. 5205 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Begonia calvescens* (Brade *ex* L.B.Sm. & R.C.Sm.) E.L.Jacques & Mamede**
Voucher: Falkenberg, D.B. 9332 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Begonia camposportoana* Brade**
Voucher: Reitz, R. 3721 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia capanemae* Brade**
Voucher: Ribas, O.S. 7136 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Begonia caparaoensis* E.L.Jacques & L.Kollmann**
Voucher: Leoni, L.S. 5625 (GFJP, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Begonia caraguatatubensis* Brade**
Voucher: Martinelli, G. 5725 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Begonia cariocana* Brade *ex* L.B.Sm. & Wassh.**
Voucher: Pereira, E. 281 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia catharinensis* Brade**
Voucher: Reitz, R. 268 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Begonia cerasiphylla* L.B.Sm. & Wassh.**
Referência: Smith, L.B. & Wasshausen, D.C. 1982. Phytologia 52: 446.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia coccinea* Hook.**
Voucher: Jacques, E.L. 186 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Begonia collaris* Brade**
Voucher: Jacques, E.L. 258 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia concinna* Schott**
Voucher: Duarte, A.P. s.n. (RB 82102)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia convolvulacea* (Klotzsch) A.DC.**
Voucher: Vieira, C.M. 98 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Begonia cordata* Vell.**
Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10: t. 34.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia cornitepala* Irmsch.**
Voucher: Handro, O. 1061 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia crispula* Brade**
Voucher: Vieira, J. 37 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Begonia cucullata* Willd.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Begonia cucullata* var. *arenosicola* (C.DC.) L.B.Sm. & B.G.Schub.**
Referência: Smith, L.B. & Schubert, B.G. 1941. Darwiniana 5: 106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
Begonia cucullata* Willd. var. *cucullata
Voucher: Alves, M. 2148 (SPF, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Begonia cucullata* var. *spatulata* (Lodd.) Golding**
Referência: Golding, J. 1982. Phytologia 50: 350.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Begonia curtii* L.B.Sm. & B.G.Schub.**
Voucher: Pereira, E. 2241 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Begonia declinata* Vell.**
Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10: t. 44.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia densifolia* Irmsch.**
Voucher: Martinelli, G. 3027 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia dentatiloba* A.DC.**
Voucher: Jacques, E.L. 150 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia depauperata* Schott**
Voucher: Jacques, E.L. 14 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Begonia descoleana* L.B.Sm. & B.G.Schub.**
Voucher: Reitz, R. 7984 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Begonia dietrichiana* Irmsch.**
Voucher: Martinelli, G. 3104 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Begonia digitata* Raddi**
Distribuição: nativa; endêmica
Begonia digitata* Raddi var. *digitata
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 100 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Begonia digitata* var. *rufescens* Irmsch.**
Referência: Irmscher, E. 1957. Webbia 12: 475.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Begonia echinosepala* Regel**
Distribuição: nativa; endêmica
Begonia echinosepala* Regel var. *echinosepala
Voucher: Reitz, R. 4199 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia echinosepala* var. *elongatifolia* Irmsch.**
Referência: Irmscher, E. 1953. Bot. Jahrb. Syst. 76: 66.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia edmundoi* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 21198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia egregia* N.E.Br.**
Voucher: Lima, J.S. s.n. (RB 48058)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Begonia epibaterium* Mart. *ex* A.DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Begonia epibaterium* var. *angustialata* A.DC.**
Referência: Candolle, A.P. de 1864. Prodr. 15(1): 361.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
Begonia epibaterium* Mart. *ex* A.DC. var. *epibaterium
Voucher: Santos, T.S. 3408 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Begonia epipsila* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 18573 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia erecta* Vell.**
Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10: t. 43.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia espiritosantensis* E.L.Jacques & Mamede**
Voucher: Nascimento, J. s.n. (RB 97104)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Begonia euryphylla* L.B.Sm. *ex* S.F.Sm. & Wassh.**
Voucher: Santos, T.S. 1842 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Begonia exigua* Irmsch.**
Voucher: Heringer, E.P. 8270 (HB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Begonia fabulosa* L.B.Sm. & Wassh.**
Referência: Smith, L.B. & Wasshausen, D.C. 1982. Phytologia 52: 445.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia fagifolia* Otto & A.Dietr.**
Voucher: Brade, A.C. 19144 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia fellereriana* Irmsch.**
Referência: Irmscher, E. 1959. Bot. Jahrb. Syst. 78: 187.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Begonia fernandocostae* Irmsch.**
Distribuição: nativa; endêmica
Begonia fernandocostae* var. *fernadocostae
Voucher: Gomes-da-Silva, S.J. 378 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia fernandocostae* var. *proxima* Irmsch.**
Voucher: Amaral, A. 26a (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia fischeri* Schrank**
Voucher: Sugiyama, M. 1376 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Begonia fluminensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 15835 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia forgetiana* Hemsl.**
Voucher: Forget s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia friburgensis* Brade**
Voucher: Pereira, E. 561 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia fruticosa* (Klotzsch) A.DC.**
Voucher: Giordano, L.C. 2793 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Begonia fulvosetulosa* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 20116 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia fuscocaulis* Brade**
Voucher: Capanema, Br. s.n. (RB 75945)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia gardneri* A.DC.**
Voucher: Duarte, A.P. 3082 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Begonia garuvae* L.B.Sm. & R.C.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Smith, R.C. 1971. Fl. Ilustr. Catarin. 1(Begon.): 91.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia gehrtii* Irmsch.**
Voucher: Marquete, R. 1689 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Begonia glabra* Aubl.**
Voucher: Fiaschi, R. 3284 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Begonia grisea* A.DC.**
Voucher: Forzza, R.C. 355 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Begonia guaduensis* Kunth**
Voucher: Rosa, M.A. 1984 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Begonia hammoniae* Irmsch.**
Voucher: Reitz, R. 1000 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia handroi* Brade**
Voucher: Handro, O. 681 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia herbacea* Vell.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Begonia herbacea* var. *ellipticifolia* Irmsch.**
Referência: Irmscher 1953. Bot. Jahrb. Syst. 76: 38.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Begonia herbacea* Vell. var. *herbacea
Voucher: Jacques, E.L. 185 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Begonia heringeri* Brade**
Voucher: Heringer, E.P. 1737 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Begonia herteri* Irmsch.**
Voucher: Herter, G.F. 4051 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia hilariana* A.DC.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1795 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia hirtella* Link**
Voucher: Pinto, G.C.P. 04-82 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Begonia hispida* Schott**
Voucher: Jacques, E.L. 133 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Begonia hoehneana* Irmsch.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33002 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia hookeriana* Gardner**
Voucher: Sucre, D. 10687 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Begonia hugelii* (Klotzsch) A.DC.**
Voucher: Pessoa, S.V.A. 250 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Begonia humilis* Aiton**
Distribuição: nativa; não endêmica
Begonia humilis* Aiton var. *humilis
Voucher: Michelangeli, F.A. 1354 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (CE, AL), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Begonia humilis* var. *porteriana* (Fisch. et al.) A.DC.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1861. Fl. bras. 4(1): 344.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Begonia ibitiocensis* E.L.Jacques & Mamede**
Voucher: Braga, J.M.A. 666 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Begonia incisoserrata* (Klotzsch) A.DC.**
Voucher: Sucre, D. 2930 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Begonia inconspicua* Brade**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6517 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Begonia inculta* Irmsch.**
Distribuição: nativa; endêmica
Begonia inculta* Irmsch. var. *inculta
Voucher: Edwall, G. CGGSP 4392 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia inculta* var. *vestita* Handro**
Voucher: Handro, O. 845 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia insularis* Brade**
Voucher: Duarte, A.P. 3376 (RB 73324)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia integerrima* Spreng.**
Voucher: Proença, S.L. 53 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Begonia isopterocarpa* Irmsch.**
Voucher: Reitz, R. 3971 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Begonia itaguassuensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 18200 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Begonia itatiaiensis* Brade**
Voucher: Braga, J.M.A. 1947 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Begonia itatinensis* Irmsch. *ex* Brade**
Voucher: Leitman, M. 241 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia itupavensis* Brade**
Voucher: Hatschbach, G. 11713 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Begonia jocelinoi* Brade**
Voucher: Sampaio, J.J. 9 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia juliana* Loefgr. *ex* Irmsch.**
Voucher: Franco, G.A.D.C. 1398 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Begonia jureiensis* S.J.Gomes da Silva & Mamede**
Voucher: Rossi, L. 563 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia konderreisiana* L.B.Sm. & R.C.Sm.**
Voucher: Reitz, R. 6632 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia kuhlmannii* Brade**
Voucher: Jacques, E.L. 808 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Begonia lanceolata* Vell.**
Voucher: Giordano, L.C. 1476 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Begonia lanstyakii* Brade**
Voucher: Braga, J.M.A. 2053 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia larorum* L.B.Sm. & Wassh.**
Voucher: Luederwaldt, H. s.n. (B, SP 8787)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia lealii* Brade**
Voucher: Agra, M.F. 5122 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL); Caatinga
***Begonia leopoldinensis* L.Kollmann**
Referência: Kollmann, L. 2009. Candollea 64(1):120.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Begonia lindmanii* Brade**
Voucher: Jacques, E.L. 771 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Begonia lineolata* Brade**
Voucher: Reitz, R. 4215 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia longibarbata* Brade**
Voucher: Braga, J.M.A. 4502 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Begonia longimaculata* Irmsch.**
Referência: Smith, S.F. 2008. Begoniaceae In: Daly, D.C. Silveira, M. eds. Primeiro Catálogo da Flora do Acre, Brasil, Rio Branco, AC, EDUFAC 555p. il.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Begonia lossiae* L.Kollmann**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 11398 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Begonia lubbersii* E.Morren**
Voucher: Duarte, A.P. s.n. (HB, RB 69713)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia lunaris* E.L.Jacques**
Voucher: Jacques, E.L. 1670 (RBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia luxurians* Scheidw.**
Distribuição: nativa; endêmica
Begonia luxurians* Scheidw. var. *luxurians
Voucher: Sylvestre, L.S. 920 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Begonia luxurians* var. *sampaioana* Brade**
Voucher: Sampaio, A.J. 810 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Begonia machrisiana* L.B.Sm. & B.G.Schub.**
Referência: Smith, L.B. & Schubert, B.G. 1961. Los Angeles County Mus. Contr. Sci. 47: 1.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Begonia maculata* Raddi**
Voucher: Sucre, D. 7686 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Begonia magdalenensis* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 14175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia matogrossensis* L.B.Sm. *ex* S.F.Sm. & Wassh.**
Referência: Smith, L.B. & Wasshausen, D.C. 1999. Selbyana 20(1): 17.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Begonia mattos-silvae* L.B.Sm. *ex* S.F.Sm. & Wassh.**
Voucher: Mattos Silva, L.A. 660 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Begonia maynensis* A.DC.**
Voucher: Daly, D.C. 13258 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Begonia membranacea* A.DC.**
Voucher: Riedel, L. 592 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Begonia moysesii* Brade**
Voucher: Krieger, L. 17383 (CESJ, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Begonia neglecta* A.DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
Begonia neglecta* A.DC. var. *negleta
Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1859. Ann. Sci. Nat., Bot. IV, 11: 139.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Begonia neglecta* var. *caulescens* A.DC.**
Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1864. Prodr. 15(1): 369.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Begonia neocomensium* A.DC.**
Voucher: Hage, J.L. 362 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Begonia novalombardiensis* L.Kollmann**
Voucher: Fontana, A.P. 2834 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Begonia novogranatae* A.DC.**
Voucher: Walter, B.M.T. 3708 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Begonia nubicola* L.B.Sm. & B.G.Schub.**
Referência: Steyermark,
J.A. 1997. Fl. Venez. Guayana 3:397-403.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Begonia nuda* Irmsch.**
Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1683 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Begonia obscura* Brade**
Voucher: Duarte, A.P. s.n. (RB 99869)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica
***Begonia occhionii* Brade**
Voucher: Mansano, V.F. 182 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Begonia odeteiantha* Handro**
Voucher: Souza, M.C. 458 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica
***Begonia olsoniae* L.B.Sm. & B.G.Schub.**
Voucher: Brade, A.C. 18795 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Begonia organensis* Brade**
Voucher: Martinelli, G. 4428 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica
***Begonia paleata* Schott *ex* A.DC.**
Voucher: Pessoa, S.V.A. 359 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica
***Begonia paranaensis* Brade**
Voucher: Hatschbach, G. 8941 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica
***Begonia parilis* Irmsch.**
Voucher: s.col. 176 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Begonia parvifolia* Schott**
Referência: Sprengel, K.P.J. 1827. Syst. Veg. 4(2): 408.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Begonia parvistipulata* Irmsch.**
Referência: Irmscher 1953. Bot. Jahrb. Syst. 76: 49.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia paulensis* A.DC.**
Voucher: Brade, A.C. 14556 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica
***Begonia peltifolia* Schott**
Referência: Sprengel, K.P.J. 1827. Syst. Veg. 4(2): 408.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Begonia pentaphylla* Walp.**
Referência: Walpers, W.G. 1843. Repert. Bot. Syst. 2: 209.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Begonia perdusenii* Brade**
Voucher: Jacques, E.L. 774 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Begonia peristegia* Stapf**
Voucher: Sanders, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Begonia pernambucensis* Brade**
Voucher: Kuhlmann, E. 02 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica
***Begonia peruibensis* Handro**
Voucher: Pires, A.S. s.n. (HB 69180)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Begonia petasitifolia* Brade**
Voucher: Pereira, E. 2008 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Begonia pickelii* Irmsch.**
Voucher: Pickel, B.J. 2857 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica
***Begonia pilgeriana* Irmsch.**
Voucher: Reitz, R. 3722 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia pinheironis* L.B.Sm. *ex* S.F.Sm. & Wassh.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 1898 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica
***Begonia piresiana* Handro**
Voucher: Pires, A.S. s.n. (SP 53970)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica
***Begonia platanifolia* Schott**
Voucher: Hatschbach, G. 46298 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica
***Begonia pluvialis* L.B.Sm. *ex* S.F.Sm. & Wassh.**
Voucher: Hatschbach, G. 21328 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Begonia polyandra* Irmsch.**
Voucher: Reitz, R. 5704 (HB, HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Begonia polygonifolia* A.DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Begonia polygonifolia* var. *differens* L.B.Sm. *ex* S.F.Sm. & Wassh.**
Voucher: Santos, T.S. 3383 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica
Begonia polygonifolia* A.DC. var. *polygonifolia
Voucher: Brade, A.C. 19403 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica
***Begonia prieurii* A.DC.**
Referência: Steyermark,
J.A. 1997. Fl. Venez. Guayana 3:397-403.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Begonia princeps* A.DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Begonia princeps* var. *parviflora* A.DC.**
Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1861. Fl. bras. 4(1): 357.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
Begonia princeps* A.DC. var. *princeps
Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1861. Fl. bras. 4(1_: 357.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica
***Begonia pseudolubbersii* Brade**
Voucher: Forzza, R.C. 2869 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Begonia pulchella* Raddi**
Voucher: Giordano, L.C. 2796 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Begonia radicans* Vell.**
Voucher: Jacques, E.L. 842 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Begonia ramentacea* Paxton**
Voucher: Nadruz, M. 1886 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia reniformis* Dryand.**
Voucher: Zappi, D. CFSC 10180 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Begonia riedelii* A.DC.**
Voucher: Pereira, E. 274 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Begonia rossmanniae* A.DC.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12689 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Begonia rotunda* Vell.**
Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10: t. 38.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia rubropilosa* A.DC.**
Voucher: Amorim, A.M. 3369 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia rufa* Thunb.**
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12685 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Begonia rufosericea* Toledo**
Voucher: Gentry, A.H. 49323 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia ruhlandiana* Irmsch.**
Voucher: Harley, R.M. 50523 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Begonia rupium* Irmsch.**
Referência: Irmscher, E. 1953. Bot. Jahrb. Syst. 76: 59.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia ruschii* L.Kollmann**
Voucher: Fontana, A.P. 2765 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Begonia russelliana* L.B.Sm. *ex* S.F.Sm. & Wassh.**
Voucher: Russell, G.F. s.n. (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Begonia rutilans* A.DC.**
Voucher: s.col. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Begonia salesopolensis* S.J.Gomes da Silva & Mamede**
Voucher: Gomes-da-Silva, S.J. 307 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia sanguinea* Raddi**
Voucher: Pereira, E. 283 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia santoslimae* Brade**
Voucher: Jacques, E.L. 813 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Begonia saxicola* A.DC.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 80-8877 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL); Amazônia, Caatinga
***Begonia saxifraga* A.DC.**
Voucher: Riedel, L. 592 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Begonia scharffiana* Regel**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
***Begonia scharffiana* var. *minor* W.Watson**
Referência: Watson, W. 1889. Gard. Chron. ser. 3 6:388.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
Begonia scharffiana* Regel var. *scharffiana
Referência: Regel, E.A. 1888. Gartenflora 37:127, 661, p. 146.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Begonia scharffii* Hook.**
Voucher: Falkenberg, D.B. 9307 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia semidigitata* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 15834 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia semiovata* Liebm.**
Referência: Steyermark, J.A. 1997. Fl. Venez. Guayana 3:403.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Begonia semperflorens* Link & Otto**
Voucher: Hatschbach, G. 13885 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Begonia serranegrae* L.B.Sm. *ex* S.F.Sm. & Wassh.**
Voucher: Hatschbach, G. 25785 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Begonia smilacina* A.DC.**
Voucher: Callejas, R. 1568 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Begonia solananthera* A.DC.**
Voucher: Jacques, E.L. 46 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Begonia solitudinis* Brade**
Voucher: Reitz, R. 2697 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia spinibarbis* Irmsch.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2987)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia squamipes* Irmsch.**
Voucher: Falkenberg, D.B. 9666 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Begonia stenolepis* L.B.Sm. & R.C.Sm.**
Voucher: Reitz, R. 4623 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Begonia stenophylla* A.DC.**
Voucher: Riedel, L. 1920 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Begonia subacida* Irmsch.**
Referência: Irmscher, E. 1959. Bot. Jahrb. Syst. 78: 183.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Begonia subvillosa* Klotzsch**
Voucher: Jacques, E.L. 817 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Begonia sylvatica* Meisn. *ex* A.DC.**
Referência: Candolle, A.P. de 1864. Prodr. 15(1): 365.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Begonia sylvestris* A.DC.**
Voucher: Jacques, E.L. 1740 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia toledoana* Handro**
Voucher: Forzza, R.C. 4792 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia tomentosa* Schott**
Distribuição: nativa; endêmica
***Begonia tomentosa* var. *eriocaulis* (Vis.) A.DC.**
Referência: Candolle, A.P. de 1864. Prodr. 15(1): 373.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
Begonia tomentosa* Schott var. *tomentosa
Voucher: Brade, A.C. 18572 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia ulmifolia* Willd.**
Voucher: Jacques, E.L. 806 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Begonia undulata* Schott**
Voucher: Pereira, E. 4037 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Begonia valdensium* A.DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Begonia valdensium* var. *angustior* Irmsch.**
Voucher: Luederwaldt, H. s.n. (SP 18004)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Begonia valdensium* A.DC. var. *valdensium
Voucher: Jacques, E.L. 419 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Begonia valida* Goebel**
Referência: Goebel, K.I. 1915. Flora 108: 347.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Begonia velloziana* Walp.**
Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10:35.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Begonia venosa* Skan *ex* Hook.**
Voucher: Rossi, L. 1078 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia vicina* Irmsch.**
Voucher: Luederwaldt, H. s.n. (SP 8785)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia windischii* L.B.Sm. *ex* S.F.Sm. & Wassh.**
Voucher: Windisch, P.G. 263 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Begonia wollnyi* Herzog**
Voucher: Daly, D.C. 1861 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

BERBERIDACEAE

João Renato Stehmann
1 gênero, 4 espécies (3 endêmicas)

Berberis L.

4 espécies (3 endêmicas)
***Berberis campos-portoi* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 17020 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Berberis glazioviana* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 21293 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Berberis kleinii* Mattos**
Voucher: Reitz, R. 7184 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Berberis laurina* Billb.**
Voucher: Stehmann, J.R. 1358 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

BIGNONIACEAE

Lúcia G. Lohmann
32 gêneros, 391 espécies (177 endêmicas)

Adenocalymma Mart. *ex* Meisn.

68 espécies (40 endêmicas)
***Adenocalymma adenophorum* (Sandwith) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 12814 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Adenocalymma allamandiflorum* (Bureau *ex* K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Spruce, R. 715 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica
***Adenocalymma apparicianum* J.C.Gomes**
Voucher: Duarte, A.P. 1249 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN); Caatinga
***Adenocalymma axillare* (K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Castellanos, A. 24120 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Adenocalymma bipinnatum* (S.Moore) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 37531 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Adenocalymma biternatum* (A.Samp.) L.G.Lohmann**
Voucher: Sampaio, A. 5207 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Adenocalymma bracteatum* (Cham.) DC.**
Voucher: Forero, E. 6339 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Adenocalymma bracteolatum* DC.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5453 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Adenocalymma bracteosum* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 13026 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Adenocalymma bullatum* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 7771 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Adenocalymma campicola* (Pilg.) L.G.Lohmann**
Voucher: Irwin, H.S. 16639 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Adenocalymma cidii* (A.H.Gentry *ex* Hauk) L.G.Lohmann**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6013 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Adenocalymma cladotrichum* (Sandwith) L.G.Lohmann**
Voucher: Lohmann, L.G. 389 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Adenocalymma comosum* (Cham.) DC.**
Voucher: Silva, M.M. 294 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Adenocalymma contractum* (A.H.Gentry *ex* Hauk) L.G.Lohmann**
Voucher: Daly, D.C. 1171 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Adenocalymma coriaceum* A.DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 48372 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Adenocalymma croatii* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Prance, G.T. 14308 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Adenocalymma cymbalum* (Cham.) Bureau & K.Schum.**
Voucher: Sellow, F. 1613 (K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Adenocalymma dichilum* A.H.Gentry**
Voucher: Fernandes, A. 6185 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga
***Adenocalymma divaricatum* Miers**
Voucher: Queiroz, L.P. 6142 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Adenocalymma dusenii* Kraenzl.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 8215 (K, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Adenocalymma flaviflorum* (Miq.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 12812 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Adenocalymma flavum* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Bautista, H.P. 3228 (G, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Adenocalymma fruticosum* A.H.Gentry**
Voucher: Harley, R.M. 20943 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Adenocalymma gracielzae* A.H.Gentry**
Voucher: Santos, G. dos 200 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Cerrado
***Adenocalymma hatschbachii* A.H.Gentry**
Voucher: Hatschbach, G. 311 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Adenocalymma heterophyllum* Kraenzl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 7849 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Adenocalymma hirtum* (Mart. *ex* DC.) Bureau & K.Schum.**
Voucher: Gentry, A.H. 58947 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Adenocalymma hypostictum* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15257 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Adenocalymma imperatoris-maximilianii* (Wawra) L.G.Lohmann**
Voucher: Moraes, J.C. 2010 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA); Cerrado
***Adenocalymma impressum* (Rusby) Sandwith**
Voucher: Maas, P.J.M. 12673 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Adenocalymma inundatum* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 47793 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Adenocalymma involucratum* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 50137 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga
***Adenocalymma juliae* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Ducke, A. 11510 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Adenocalymma longilineum* (A.Samp.) L.G.Lohmann**
Voucher: Lowrie, S.R. 579 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Adenocalymma magnificum* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Gentry, A.H. 49078 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Adenocalymma magnoalatum* Scud.**
Voucher: Scudeller, V.V. 191 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Adenocalymma marginatum* (Cham.) DC.**
Voucher: França, F. 2080 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica, Pampa
***Adenocalymma molle* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 13343 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Adenocalymma moringifolium* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 12811 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Adenocalymma neoflavidum* L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 13138 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Adenocalymma nervosum* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Hatschbach, G. 46304 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Adenocalymma nodosum* (Silva Manso) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 344596 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Adenocalymma paucifoliolatum* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 36907 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Adenocalymma paulistarum* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Gentry, A.H. 21483 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Adenocalymma pedunculatum* (Vell.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 21368 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Adenocalymma peregrinum* (Miers) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 22478 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado
***Adenocalymma prancei* A.H.Gentry**
Voucher: Gentry, A.H. 12818 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Adenocalymma pseudopatulum* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Daly, D.C. 8359 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Adenocalymma pubescens* (Spreng.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 42805 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Adenocalymma purpurascens* Rusby**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2590 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Adenocalymma racemosum* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 782 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Adenocalymma reticulatum* Bureau *ex* K.Schum.**
Voucher: Duarte, A.P. 6140 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Adenocalymma salmoneum* J.C.Gomes**
Voucher: Vieira, J.N. 20 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Adenocalymma salzmanii* DC.**
Voucher: Mori, S.A. 112 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Adenocalymma scabriusculum* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 39073 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Adenocalymma scansile* Miers**
Voucher: Hatschbach, G. 19831 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Adenocalymma schomburgkii* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Egler, W.A. 847 (IAN, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Adenocalymma subincanum* Huber**
Voucher: Lohmann, L.G. 472 (HPZ, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Adenocalymma subsessilifolium* DC.**
Voucher: Gentry, A.H. 49706 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Adenocalymma subspicatum* A.H.Gentry**
Voucher: Oliveira, E. 1067 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA, PI, CE); Caatinga, Cerrado
***Adenocalymma tanaeciicarpum* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 12820 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Adenocalymma ternatum* (Vell.) Mello *ex* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Gentry, A.H. 49742 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Adenocalymma trichocladum* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 44126 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste; Caatinga
***Adenocalymma trifoliatum* (Vell.) R.C.Laroche**
Voucher: Lombardi, J.A. 2363 (BHCB, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Adenocalymma ubatubense* Assis & Semir**
Voucher: Romero, R. 74 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Adenocalymma uleanum* Kraenzl.**
Voucher: Prance, G.T. 74 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Adenocalymma velutinum* (A.H.Gentry *ex* Hauk) L.G.Lohmann**
Voucher: Prance, G.T. 5224 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Amphilophium Kunth

26 espécies (9 endêmicas)
***Amphilophium aschersonii* Ule**
Voucher: Lohmann, L.G. 390 (HPZ, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Amphilophium bauhinioides* (Bureau *ex* Baill.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 59209 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Amphilophium blanchetii* (DC.) Bureau & K.Schum.**
Voucher: Harley, R.M. 21578 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Amphilophium bracteatum* (Cham.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 7507 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Amphilophium crucigerum* (L.) L.G.Lohmann**
Voucher: Daly, D.C. 6943 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Amphilophium cuneifolium* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Prance, G.T. 1291 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Amphilophium dasytrichum* (Sandwith) L.G.Lohmann**
Voucher: Marinho, L.R. 340 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Amphilophium dolichoides* (Cham.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 6391 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Amphilophium elongatum* (Vahl) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 23542 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Amphilophium falcatum* (Vell.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 18505 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Amphilophium frutescens* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 46986 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Amphilophium glaziovii* Bureau *ex* K.Schum.**
Voucher: Rizzini, C.T. 428 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Amphilophium granulosum* (Klotzsch) L.G.Lohmann**
Voucher: Lohmann, L.G. 470 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Amphilophium laeve* (Sandwith) L.G.Lohmann**
Voucher: Zarucchi, J.L. 2600 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Amphilophium magnoliifolium* (Kunth) L.G.Lohmann**
Voucher: Prance, G.T. 2969 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Amphilophium mansoanum* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Nee, M. 34758 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Amphilophium neoglaziovii* L.G.Lohmann**
Voucher: Saldanha, J. 7445 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Amphilophium obovatum* (Sandwith) L.G.Lohmann**
Voucher: Silva, N.T. 4703 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth**
Voucher: Silva, T.R.S. 133 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Amphilophium parkeri* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 12976 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Amphilophium perbracteatum* A.H.Gentry**
Voucher: Silva, M.M. 426 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Amphilophium porphyrotrichum* (Sandwith) L.G.Lohmann**
Voucher: Pires, J.M. s.n. (IAN, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Amphilophium pulverulentum* (Sandwith) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 13297 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Amphilophium reticulatum* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Rodrigues, W.A. 4610 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Amphilophium rodriguesii* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Lohmann, L.G. 475 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Amphilophium scabriusculum* (Mart. *ex* DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Anderson, W. 35669 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Anemopaegma Mart. *ex* Meisn.

34 espécies (11 endêmicas)
***Anemopaegma acutifolium* DC.**
Voucher: Gentry, A.H. 21440 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Anemopaegma album* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Harley, R.M. 19050 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Anemopaegma arvense* (Vell.) Stellfeld *ex* de Souza**
Voucher: Hatschbach, G. 20046 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Anemopaegma brevipes* S.Moore**
Voucher: Moore, S. 1009 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado

***Anemopaegma chamberlaynii* (Sims) Bureau & K.Schum.**
Voucher: Ganev, W. 2866 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Anemopaegma chrysoleucum* (Kunth) Sandwith**
Voucher: Kawasaki, M.L. 339 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Anemopaegma citrinum* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Arbo, M.M. 5655 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Anemopaegma flavum* Morong**
Voucher: Nee, M.H. 34510 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal
***Anemopaegma floridum* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Gentry, A.H. 12837 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Anemopaegma foetidum* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Prance, G.T. 15766 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Anemopaegma glaucum* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Heringer, E.P. 18500 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Anemopaegma goyazense* K.Schum.**
Voucher: Heringer, E.P. 10289 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Anemopaegma gracile* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12999 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Anemopaegma heringeri* J.C.Gomes**
Voucher: Heringer, E.P. 1147 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Anemopaegma hilarianum* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Harley, R.M. 53411 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Anemopaegma insculptum* (Sandwith) A.H.Gentry**
Voucher: Thomas, W.W. 4939 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Anemopaegma ionanthum* A.H.Gentry**
Voucher: Gentry, A.H. 13004 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Anemopaegma jucundum* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Schomburgk, R. 877 (BR, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Anemopaegma karstenii* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Chagas, J.C. s.n. (BR, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Anemopaegma laeve* DC.**
Voucher: Heringer, E.P. 739 (G, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Anemopaegma longidens* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Gentry, A.H. 13083 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Anemopaegma longipetiolatum* Sprague**
Voucher: Hatschbach, G. 39405 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Anemopaegma mirabile* (Sandwith) A.H.Gentry**
Voucher: Castellanos, A. 25351 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Cerrado
***Anemopaegma oligoneuron* (Sprague & Sandwith) A.H.Gentry**
Voucher: Silveira, M. 805 (HPZ, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Anemopaegma pabstii* A.H.Gentry**
Voucher: Hatschbach, G. 47360 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Anemopaegma pachyphyllum* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11592 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Anemopaegma paraense* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Delprete, P.G. 7862 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Anemopaegma parkeri* Sprague**
Voucher: Fernandes, A. 5071 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Anemopaegma patelliforme* A.H.Gentry**
Voucher: Harley, R.M. 10959 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal
***Anemopaegma prostratum* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 11983 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Anemopaegma salicifolium* (Kunth) Sandwith**
Voucher: Humboldt, F.H.A. 1027 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Anemopaegma scabriusculum* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Walter, B.M.T. 252 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Anemopaegma setilobum* A.H.Gentry**
Voucher: Duarte, A.P. 8861 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Anemopaegma velutinum* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 55071 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Cerrado

Bignonia L.

19 espécies (2 endêmicas)

***Bignonia aequinoctialis* L.**
Voucher: Gentry, A.H. 69106 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Bignonia binata* Thunb.**
Voucher: Hatschbach, G. 40618 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Bignonia bracteomana* (K.Schum. *ex* Sprague) L.G.Lohmann**
Voucher: Ule, E.H.G. 5497 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Bignonia callistegioides* Cham.**
Voucher: Pabst, G.F.J. 6548 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Bignonia campanulata* Cham.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2801 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Bignonia convolvuloides* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Harley, R.M. 26440 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Bignonia corymbosa* (Vent.) L.G.Lohmann**
Voucher: Lohmann, L.G. 499 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Bignonia costata* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6077 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Bignonia decora* (S.Moore) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 46153 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Bignonia diversifolia* Kunth**
Voucher: Prance, G.T. 18216 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado, Pantanal

***Bignonia hyacinthina* (Standl.) L.G.Lohmann**
Voucher: Daly, D.C. 12148 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Bignonia lilacina* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Lohmann, L.G. 474 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Bignonia microcalyx* G.Mey.**
Voucher: Lowe, J. 4190 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Bignonia nocturna* (Barb.Rodr.) L.G.Lohmann**
Voucher: Lohmann, L.G. 451 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Bignonia prieurei* DC.**
Voucher: Forero, E. 6329 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Cerrado

***Bignonia ramentacea* (Mart. *ex* DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Harley, R.M. 21556 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Bignonia sciuripabula* (K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Prance, G.T. 7513 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Bignonia sordida* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Mori, S.A. 17263 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Bignonia uleana* (Klotzsch) L.G.Lohmann**
Voucher: Krukoff, B.A. 5612 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Callichlamys Miq.

1 espécie (não endêmica)

***Callichlamys latifolia* (Rich.) K.Schum.**
Voucher: Lohmann, L.G. 423 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Crescentia L.

1 espécie (não endêmica)

***Crescentia amazonica* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 552 (F, IAN, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cuspidaria DC.

15 espécies (5 endêmicas)

***Cuspidaria argentea* (Wawra) Sandwith**
Voucher: Sucre, D. 9193 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA); Caatinga

***Cuspidaria bracteata* Bureau *ex* Baill.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11225 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Cuspidaria cinerea* (Bureau *ex* K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 12857 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cuspidaria convoluta* (Vell.) A.H.Gentry**
Voucher: Hatschbach, G. 22995 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuspidaria emmonsii* A.H.Gentry**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 782 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cuspidaria floribunda* (DC.) A.H.Gentry**
Voucher: Daly, D.C. 9160 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cuspidaria inaequalis* (DC. *ex* Splitg.) L.G.Lohmann**
Voucher: Prance, G.T. 7761 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA),
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Cuspidaria lachnaea* (Bureau) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 52037 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Cuspidaria lateriflora* (Mart.) DC.**
Voucher: Lowrie, S.R. 273 (MO, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cuspidaria multiflora* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 44130 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga
***Cuspidaria octoptera* A.H.Gentry**
Voucher: Peixoto, J.A. 92 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado
***Cuspidaria puberula* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Ribeiro, T. 252 (G, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Cuspidaria pulchra* (Cham.) L.G.Lohmann**
Voucher: Irwin, H.S. 15830 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica
***Cuspidaria sceptrum* (Cham.) L.G.Lohmann**
Voucher: Irwin, H.S. 5614 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Cuspidaria subincana* A.H.Gentry**
Voucher: Gentry, A.H. 12825 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, RO); Amazônia

Cybistax Mart. *ex* Meisn.

1 espécie (não endêmica)
***Cybistax antisyphilitica* (Mart.) Mart.**
Voucher: Gentry, A.H. 50048 (EAC, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Digomphia Benth.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Digomphia densicoma* (Mart. *ex* DC.) Pilg.**
Voucher: Fróes, R.L. 28082 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia
***Digomphia laurifolia* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 28969 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia

Dolichandra Cham.

8 espécies (1 endêmica)
***Dolichandra chodatii* (Hassl.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 6966 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica
***Dolichandra cynanchoides* Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 14451 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica
***Dolichandra dentata* (K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Lindeman, J.C. 3497 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica
***Dolichandra quadrivalvis* (Jacq.) L.G.Lohmann**
Voucher: Mori, S.A. 11194 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Dolichandra steyermarkii* (Sandwith) L.G.Lohmann**
Voucher: Silveira, M. 1595 (HPZ, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia
***Dolichandra uncata* (Andrews) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 6373 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal
***Dolichandra unguiculata* (Vell.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 39143 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Dolichandra unguis-cati* (L.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 21478 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa, Pantanal

Fridericia Mart.

59 espécies (24 endêmicas)
***Fridericia arthrerion* (Mart.) L.G.Lohmann**
Voucher: Riedel, L. 947 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Cerrado, Pantanal
***Fridericia bahiensis* (Schauer *ex*. DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Coleman, J.R. 482 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado
***Fridericia bracteolata* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3361 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Fridericia candicans* (Rich.) L.G.Lohmann**
Voucher: Prance, G.T. 26142 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

***Fridericia caudigera* (S.Moore) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 15744 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Fridericia celastroides* (Bureau *ex* K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Souza, V.C. 8361 (ESA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Fridericia chica* (Bonpl.) L.G.Lohmann**
Voucher: Silveira, M. 1480 (HPZ, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fridericia cinerea* (Bureau *ex* K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Duarte, A.P. 9535 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Fridericia cinnamomea* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 23760 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Fridericia claussenii* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Santos, T.S. 3471 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Fridericia conjugata* (Vell.) L.G.Lohmann**
Voucher: Daly, D.C. 8832 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Fridericia corchoroides* (Cham.) L.G.Lohmann**
Voucher: Belém, R.P. 1456 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Mata Atlântica
***Fridericia crassa* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gardner, G. 2468 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Cerrado
***Fridericia craterophora* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Heringer, E.P. 6689 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Fridericia cuneifolia* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 47447 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Fridericia dichotoma* (Jacq.) L.G.Lohmann**
Voucher: Daly, D.C. 7277 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Fridericia dispar* (Bureau *ex* K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 44133 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado
***Fridericia egensis* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 12806 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Fridericia elegans* (Vell.) L.G.Lohmann**
Voucher: Brade, A.C. 20092 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Fridericia erubescens* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Ferreira, M.S.G. 193 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Fridericia fagoides* (Cham.) L.G.Lohmann**
Voucher: Smith, D.N. 68 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Fridericia fanshawei* (Sandwith) L.G.Lohmann**
Voucher: Lohmann, L.G. 471 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Fridericia florida* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 8799 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Fridericia formosa* (Bureau) L.G.Lohmann**
Voucher: Irwin, H.S. 27973 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Fridericia japurensis* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Marinho, L.R. 34 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Fridericia lasiantha* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15254 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Fridericia lauta* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Prance, G.T. 5212 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Fridericia leucopogon* (Cham.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 49503 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Fridericia limae* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Harley, R.M. 16926 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga
***Fridericia mollis* (Vahl) L.G.Lohmann**
Voucher: Ule, E.H.G. 7611 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO); Amazônia
***Fridericia monophylla* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Pires, J.M. 14491 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Fridericia mutabilis* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 12578 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Fridericia nicotianiflora* (Kraenzl.) L.G.Lohmann**
Voucher: Lohmann, L.G. 484 (HPZ, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AC, RO); Amazônia
***Fridericia nigrescens* (Sandwith) L.G.Lohmann**
Voucher: Lohmann, L.G. 469 (HPZ, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Fridericia oligantha* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Lohmann, L.G. 483 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Fridericia ornithophila* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10294a (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Fridericia paradoxa* (Sandwith) L.G.Lohmann**
Voucher: Ule, E.H.G. 7067 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga
***Fridericia parviflora* (Mart. *ex* DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Duarte, A.P. 9534 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Fridericia patellifera* (Schltdl.) L.G.Lohmann**
Voucher: Lohmann, L.G. 412 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fridericia pearcei* (Rusby) L.G.Lohmann**
Voucher: Goeldi, A. 4234 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Fridericia platyphylla* (Cham.) L.G.Lohmann**
Voucher: Prance, G.T. 7782 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Fridericia pliciflora* (Mart. *ex* DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Fernandes, A. 5634 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (MA, PI, CE); Caatinga
***Fridericia poeppigii* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Anderson, W.R. 7782 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Fridericia prancei* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Prance, G.T. 11834 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Fridericia pubescens* (L.) L.G.Lohmann**
Voucher: Albuquerque, B.W. 1254 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Fridericia pulchella* (Cham.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hoehne, W. 3651 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado
***Fridericia rego* (Vell.) L.G.Lohmann**
Voucher: Folli, D.A. 1288 (CVRD, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Fridericia samydoides* (Cham.) L.G.Lohmann**
Voucher: Williams, L.O. 5535 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Fridericia simplex* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Irwin, H.S. 24959 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Fridericia speciosa* Mart.**
Voucher: Silva-Castro, M.M. 960 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Fridericia spicata* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Ule, E.H.G. 5476 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Fridericia subincana* (Mart.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 49454 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Fridericia subverticillata* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11230 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga
***Fridericia trachyphylla* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6653 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Fridericia trailii* (Sprague) L.G.Lohmann**
Voucher: Lohmann, L.G. 482 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Fridericia triplinervia* (Mart. *ex* DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 12853 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Fridericia tuberculata* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Silva, N.T. 2131 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Fridericia tynanthoides* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Trinta, Z.A. 6762 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Fridericia verrucosa* (Standl.) L.G.Lohmann**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8885 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Godmania Hemsl.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Godmania aesculifolia* (Kunth) Standl.**
Voucher: Lohmann, L.G. 436 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia

***Godmania dardanoi* (J.C.Gomes) A.H.Gentry**
Voucher: Gentry, A.H. 50148 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado

Handroanthus Mattos

24 espécies (12 endêmicas)
***Handroanthus albus* (Cham.) Mattos**
Voucher: Gentry, A.H. 49862 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Handroanthus arianeae* (A.H.Gentry) S.Grose**
Voucher: Peixoto, A.L. 3066 (AAU, COL, F, G, MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Handroanthus barbatus* (E.Mey.) Mattos**
Voucher: Ducke, A. 185 (F, IAN, MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Handroanthus botelhensis* (A.H.Gentry) S.Grose**
Voucher: Gentry, A.H. 58849 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Handroanthus bureavii* (Sandwith) S.Grose**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8806 (BG, C, G)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Handroanthus capitatus* (Bureau & K.Schum.) Mattos**
Voucher: Prance, G.T. 4179 (INPA, MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Handroanthus catarinensis* (A.H.Gentry) S.Grose**
Voucher: Hatschbach, G. 21093 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Handroanthus chrysotrichus* (Mart. *ex* DC.) Mattos**
Voucher: Gentry, A.H. 21500 (MO, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica
***Handroanthus cristatus* (A.H.Gentry) S.Grose**
Voucher: Farias, G. 34 (CVRD, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; S
udeste (ES); Mata Atlântica
***Handroanthus heptaphyllus* Mattos**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 337 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Handroanthus impetiginosus* Mattos**
Voucher: Irwin, H.S. 17131 (MO, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Handroanthus incanus* (A.H.Gentry) S.Grose**
Voucher: Maguire, B. 56594 (COL, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Handroanthus obscurus* (Bureau & K.Schum.) Mattos**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5243 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Handroanthus ochraceus* (Cham.) Mattos**
Voucher: Gentry, A.H. 58770 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Handroanthus pedicellatus* (Bureau & K.Schum.) Mattos**
Voucher: Hatschbach, G. 48146 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Handroanthus pulcherrimus* (Sandwith) Mattos**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4734 (MO, P)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Handroanthus pumilus* (A.H.Gentry) S.Grose**
Voucher: Hatschbach, G. 49779 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Handroanthus riodocensis* (A.H.Gentry) S.Grose**
Voucher: Folli, D.A. 100 (CVRD, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Handroanthus selachidentatus* (A.H.Gentry) S.Grose**
Voucher: Pinto, G.C.P. 349 (HRB, MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Handroanthus serratifolius* (A.H.Gentry) S.Grose**
Voucher: Krukoff, B.A. 5518 (MO, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Handroanthus spongiosus* (Rizzini) S.Grose**
Voucher: Lima, H. 13247 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Handroanthus uleanus* (Kraenzl.) S.Grose**
Voucher: Ule, E.H.G. 7970 (G, K, L, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Handroanthus umbellatus* (Sond.) Mattos**
Voucher: Lima, H. 2206 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Handroanthus vellosoi* (Toledo) Mattos**
Voucher: Gentry, A.H. 49602 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Jacaranda Juss.

35 espécies (31 endêmicas)
***Jacaranda bracteata* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Hatschbach, G. 47013 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Jacaranda brasiliana* (Lam.) Pers.**
Voucher: Blanchet, J.S. 3774 (BG, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacaranda bullata* A.H.Gentry**
Voucher: Fróes, R.L. 29414 (IAN, K, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Jacaranda campinae* A.H.Gentry & Morawetz**
Voucher: Krukoff, B.A. 1482 (BM, G, K, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Jacaranda carajasensis* A.H.Gentry**
Voucher: Silva, M. 3040 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Jacaranda caroba* (Vell.) DC.**
Voucher: Ule, E.H.G. 4587 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Jacaranda copaia* (Aubl.) D.Don**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10592 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Jacaranda crassifolia* Morawetz**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17706 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Jacaranda cuspidifolia* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. 531 (BM, G, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Jacaranda decurrens* Cham.**
Voucher: Maguire, B. 56295 (COL, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Jacaranda duckei* Vattimo**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18171)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE); Amazônia, Caatinga
***Jacaranda egleri* Sandwith**
Voucher: Egler, W.A. 950 (HB, IAN, K, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Jacaranda glabra* (DC.) Bureau & K.Schum.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9776 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Jacaranda grandifoliolata* A.H.Gentry**
Voucher: Harley, R.M. 17362 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Jacaranda intricata* A.H.Gentry & Morawetz**
Voucher: Morawetz, W. 22-151280 (MO, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Jacaranda irwinii* A.H.Gentry**
Voucher: Irwin, H.S. 32250 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Jacaranda jasminoides* (Thunb.) Sandwith**
Voucher: Gentry, A.H. 49497 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Jacaranda macrantha* Cham.**
Voucher: Gentry, A.H. 49206 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Jacaranda macrocarpa* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Spruce, R. 2571 (BR, G, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Jacaranda micrantha* Cham.**
Voucher: Hatschbach, G. 36665 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Jacaranda microcalyx* A.H.Gentry**
Voucher: Gentry, A.H. 49997 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Jacaranda montana* Morawetz**
Voucher: Gentry, A.H. 49383 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Jacaranda mutabilis* Hassl.**
Voucher: Irwin, H.S. 16936 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal
***Jacaranda obovata* Cham.**
Voucher: Gentry, A.H. 50019 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Jacaranda oxyphylla* Cham.**
Voucher: Gentry, A.H. 49893 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Jacaranda paucifoliolata* Mart. *ex* DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 9986 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Jacaranda praetermissa* Sandwith**
Voucher: Harley, R.M. 21284 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA); Cerrado
***Jacaranda puberula* Cham.**
Voucher: Carvalho, A.M. 846 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Jacaranda pulcherrima* Morawetz**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15262 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Jacaranda racemosa* Cham.**
Voucher: Irwin, H.S. 22023 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Jacaranda rufa* Silva Manso**
Voucher: Heringer, E.P. 2861 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Jacaranda rugosa* A.H.Gentry**
Voucher: Andrade-Lima, D. 71-6556 (IPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Jacaranda simplicifolia* K.Schum. *ex* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Irwin, H.S. 26487 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Jacaranda subalpina* Morawetz**
Voucher: Morawetz, W. 33-19275 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Jacaranda ulei* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Harley, R.M. 15200 (CEPEC, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Lundia DC.

12 espécies (8 endêmicas)

***Lundia cordata* (Vell.) DC.**
Voucher: Harley, R.M. 54645 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Lundia corymbifera* (Vahl) Sandwith**
Voucher: Daly, D.C. 8552 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lundia damazii* DC.**
Voucher: Damazio, L.B. 269 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lundia densiflora* DC.**
Voucher: Gentry, A.H. 12841 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Lundia erionema* DC.**
Voucher: Lohmann, L.G. 371 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Lundia gardneri* Sandwith**
Voucher: Castellanos, A. 24291 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lundia glazioviana* Kraenzl.**
Voucher: Mori, S.A. 11261 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Lundia helicocalyx* A.H.Gentry**
Voucher: Sucre, D. 9211 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Cerrado

***Lundia neolonga* L.G.Lohmann**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4107 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Lundia obliqua* Sond.**
Voucher: Hatschbach, G. 42796 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Lundia puberula* Pittier**
Voucher: Croat, T.B. 62706 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Lundia virginalis* DC.**
Voucher: Carvalho, P.D. 300 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Manaosella J.C.Gomes

1 espécie (não endêmica)

***Manaosella cordifolia* (DC.) A.H.Gentry**
Voucher: Gentry, A.H. 13319 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Mansoa DC.

11 espécies (5 endêmicas)

***Mansoa alliacea* (Lam.) A.H.Gentry**
Voucher: Fróes, R.L. 1970 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Mansoa angustidens* (DC.) Bureau & K.Schum.**
Voucher: Silva, J.S. 641 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mansoa difficilis* (Cham.) Bureau & K.Schum.**
Voucher: Lohmann, L.G. 500 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Mansoa glaziovii* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14120 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Mansoa hirsuta* DC.**
Voucher: Hatschbach, G. 42333 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

***Mansoa hymenaea* (DC.) A.H.Gentry**
Voucher: Saldanha, J. 4997 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Mansoa lanceolata* (DC.) A.H.Gentry**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9529 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Mansoa onohualcoides* A.H.Gentry**
Voucher: Peixoto, A.L. 1059 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Mansoa parvifolia* (A.H.Gentry) A.H.Gentry**
Voucher: Ule, E.H.G. 10 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Mansoa standleyi* (Steyerm.) A.H.Gentry**
Voucher: Silva, N.T. 3381 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Mansoa verrucifera* (Schltdl.) A.H.Gentry**
Voucher: Forero, E. 6340 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

Martinella Baill.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Martinella iquitoensis* A.Samp.**
Voucher: Gentry, A.H. 13024 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Martinella obovata* (Kunth) Bureau & K.Schum.**
Voucher: Lohmann, L.G. 544 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

Neojobertia Baill.
2 espécies (2 endêmicas)
***Neojobertia candolleana* (Mart. *ex* DC.) Bureau & K.Schum.**
Voucher: Hatschbach, G. 39543 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado
***Neojobertia mirabilis* (Sandwith) L.G.Lohmann**
Voucher: Castellanos, A. 25315 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga

Pachyptera DC. *ex* Meisn.
3 espécies (2 endêmicas)
***Pachyptera aromatica* (Barb.Rodr.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 12832 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Pachyptera kerere* (Aubl.) Sandwith**
Voucher: Daly, D.C. 1394 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Pachyptera ventricosa* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Maguire, B. 56083 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Paratecoma Kuhlm.
1 espécie (1 endêmica)
***Paratecoma peroba* (Record) Kuhlm.**
Voucher: Folli, D.A. 137 (CVRD, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Perianthomega Bureau *ex* Baill.
1 espécie (não endêmica)
***Perianthomega vellozoi* Bureau**
Voucher: Duarte, A.P. 4014 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Pleonotoma Miers
13 espécies (6 endêmicas)
***Pleonotoma albiflora* (Salzm. *ex* DC.) A.H.Gentry**
Voucher: Nunes, T.S. 775 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Pleonotoma bracteata* A.H.Gentry**
Voucher: Sampaio, A.J. 4904 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pleonotoma castelnaei* (Bureau) Sandwith**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9952 (C, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pleonotoma clematis* (Kunth) Miers**
Voucher: Harley, R.M. 27074 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Pleonotoma dendrotricha* Sandwith**
Voucher: Gentry, A.H. 11202 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Pleonotoma fluminensis* (Vell.) A.H.Gentry**
Voucher: Gentry, A.H. 59119 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Pleonotoma jasminifolia* (Kunth) Miers**
Voucher: Prance, G.T. 14368 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Pleonotoma melioides* (S.Moore) A.H.Gentry**
Voucher: Lowrie, S.R. 324 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Pleonotoma orientalis* Sandwith**
Voucher: Irwin, H.S. 31482 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Pleonotoma pavettiflora* Sandwith**
Voucher: Croat, T.B. 62418 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal
***Pleonotoma stichadenia* K.Schum.**
Voucher: Sellow, F. 417 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Pleonotoma tetraquetra* (Cham.) Bureau**
Voucher: Heringer, E.P. 406 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Pleonotoma variabilis* (Jacq.) Miers**
Voucher: Lohmann, L.G. 399 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Pyrostegia C.Presl
2 espécies (1 endêmica)
***Pyrostegia millingtonioides* Sandwith**
Voucher: Ducke, A. 12046 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2821 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Sparattosperma Mart. *ex* Meisner
2 espécies (1 endêmica)
***Sparattosperma catingae* A.H.Gentry**
Voucher: Carvalho, A. 1867 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Sparattosperma leucanthum* (Vell.) K.Schum.**
Voucher: Daly, D.C. 7407 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Stizophyllum Miers
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Stizophyllum inaequilaterum* Bureau & K.Schum.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2916 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Stizophyllum perforatum* (Cham.) Miers**
Voucher: Sellow, F. s.n. (NY 313145)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica
***Stizophyllum riparium* (Kunth) Sandwith**
Voucher: Albuquerque, B.W. 1380 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Tabebuia Gomes *ex* DC.
12 espécies (6 endêmicas)
***Tabebuia aurea* (Silva Manso) Benth. & Hook.f. *ex* S.Moore**
Voucher: Harley, R.M. 16448 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Tabebuia cassinoides* (Lam.) DC.**
Voucher: Peixoto, A.L. 3014 (CVRD, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica
***Tabebuia elliptica* (DC.) Sandwith**
Voucher: Gentry, A.H. 50006 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL,
SE), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tabebuia fluviatilis* (Aubl.) DC.**
Voucher: Fróes, R.L. 1770 (F, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia
***Tabebuia insignis* (Miq.) Sandwith**
Voucher: Hatschbach, G. 24616 (C, MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb.**
Voucher: Hatschbach, G. 49232 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal
***Tabebuia obtusifolia* (Cham.) Bureau**
Voucher: Folli, D.A. 87 (CVRD, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica
***Tabebuia pilosa* A.H.Gentry**
Voucher: Prance, G.T. 9197 (M, MG, MO, P, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Tabebuia reticulata* A.H.Gentry**
Voucher: Magalhães, G.M. 14141 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica
***Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero *ex* A.DC.**
Voucher: Heringer, E.P. 16891 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Tabebuia roseoalba* (Ridl.) Sandwith**
Voucher: Gentry, A.H. 50216 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Tabebuia stenocalyx* Sprague & Stapf**
Voucher: Folli, D.A. 628 (CVRD, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Tanaecium Sw.
11 espécies (2 endêmicas)
***Tanaecium bilabiatum* (Sprague) L.G.Lohmann**
Voucher: Croat, T.B. 62655 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Tanaecium cyrtanthum* (Mart. *ex* DC.) Bureau & K.Schum.**
Voucher: Martius, C.F.P. 1860 (G, M)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Tanaecium duckei* A.Samp.**
Voucher: Ducke, A. 19137 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica
***Tanaecium jaroba* Sw.**
Voucher: Ducke, A. 2073 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal
***Tanaecium neobrasiliense* (Baill.) L.G.Lohmann**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 745 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Tanaecium pyramidatum* (Rich.) L.G.Lohmann**
Voucher: Daly, D.C. 8502 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Tanaecium revillae* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**
Voucher: Silva, M. 429 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia
***Tanaecium selloi* (Spreng.) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 15518 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN,
PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tanaecium tetragonolobum* (Jacq.) L.G.Lohmann**
Voucher: Santos, G. dos 116 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia
***Tanaecium truncatum* (A.Samp.) L.G.Lohmann**
Voucher: Gentry, A.H. 12772 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
Pantanal

***Tanaecium xanthophyllum* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (MO 2967)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado

Tecoma Juss.

1 espécie (não endêmica)
***Tecoma stans* (L.) Juss. *ex* Kunth**
Referência: Kunth 1819. Nov. Gen. Sp. Pl. 3:144.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Tynanthus Miers

11 espécies (4 endêmicas)
***Tynanthus cognatus* (Cham.) Miers**
Voucher: Miers, J. 8061 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Tynanthus elegans* Miers**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4124 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Tynanthus fasciculatus* (Vell.) Miers**
Voucher: Gentry, A.H. 58708 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Tynanthus gondotianus* (Bureau *ex* Baill.) Bureau**
Voucher: Gentry, A.H. 13040 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tynanthus labiatus* (Cham.) Miers**
Voucher: Gentry, A.H. 59208 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Tynanthus micranthus* Corr.Mello *ex* K.Schum.**
Voucher: Mello, J.C. 26 (K, MO, P, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Tynanthus panurensis* (Bureau *ex* Baill.) Sandwith**
Voucher: Santos, G. 126 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Tynanthus polyanthus* (Bureau *ex* Baill.) Sandwith**
Voucher: Daly, D.C. 8457 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Tynanthus pubescens* A.H.Gentry**
Voucher: Gentry, A.H. 49049 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal
***Tynanthus schumannianus* (Kuntze) A.H.Gentry**
Voucher: Daly, D.C. 8386 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Tynanthus villosus* A.H.Gentry**
Voucher: Lohmann, L.G. 476 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Xylophragma Sprague

6 espécies (3 endêmicas)
***Xylophragma harleyi* (A.H.Gentry *ex* M.M.Silva & L.P.Queiroz) L.G.Lohmann**
Voucher: Hatschbach, G. 46555 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado
***Xylophragma heterocalyx* (Bureau & K.Schum.) A.H.Gentry**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 14109 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado
***Xylophragma myrianthum* (Cham. *ex* Steud.) Sprague**
Voucher: Sampaio, A. 847 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Xylophragma platyphyllum* (DC.) L.G.Lohmann**
Voucher: Daly, D.C. 8383 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Xylophragma pratense* (Bureau & K.Schum.) Sprague**
Voucher: Ule, E.H.G. 9778 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal
***Xylophragma seemannianum* (Kuntze) Sandwith**
Voucher: Ule, E.H.G. 7847 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Zeyheria Mart.

2 espécies (1 endêmica)
***Zeyheria montana* Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 15374 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Zeyheria tuberculosa* (Vell.) Bureau *ex* Verl.**
Voucher: Duarte, A.P. 7412 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

BIXACEAE

Eduardo Lleras
2 gêneros, 6 espécies (nenhuma endêmica)

Bixa L.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Bixa arborea* Huber**
Voucher: Goeldi, A. 8311 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Bixa excelsa* Gleason & Krukoff**
Voucher: Thomas, W. 4807 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC); Amazônia

***Bixa orellana* L.**
Voucher: Oliveira, A.R.S. 846 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado

Cochlospermum Kunth
3 espécies (nenhuma endêmica)
***Cochlospermum orinocense* (Kunth) Steud.**
Voucher: Austin, D.F. 7095 (MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Cochlospermum regium* (Mart. *ex* Schrank) Pilg.**
Voucher: Pires, J.M. 16176 (MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, RN), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado
***Cochlospermum vitifolium* (Willd.) Spreng.**
Voucher: Strudwick, J.J. 4372 (INPA, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (CE, RN, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

BONNETIACEAE
Volker Bittrich
2 gêneros, 8 espécies (1 endêmica)

Archytaea Mart.
1 espécie (não endêmica)
***Archytaea triflora* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. 3163 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Bonnetia Mart.
7 espécies (1 endêmica)
***Bonnetia holostyla* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 12315, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia
***Bonnetia neblinae* Maguire**
Voucher: Farney, C. 837 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Bonnetia paniculata* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Ducke, A. 345 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Bonnetia roraimae* Oliv.**
Referência: Oliver, D. 1886. Timehri 5: 190.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Domínio desconhecido
***Bonnetia sessilis* Benth.**
Referência: Bentham, G. 1842. London J. Bot. 2: 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Bonnetia stricta* (Nees) Nees & Mart.**
Voucher: Queiroz, L.P. 1814 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Bonnetia tristyla* Gleason**
Referência: Gleason, H.A. 1931. Mem. Torrey Bot. Club 58: 396.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

BORAGINACEAE
José Iranildo Miranda de Melo, Larissa Cavalheiro da Silva, María Natividad Sánchez de Stapf, Neusa Taroda Ranga
8 gêneros, 121 espécies (48 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

Cordia L.
45 espécies (21 endêmicas)
***Cordia aberrans* I.M.Johnst.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 531 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Cordia acutifolia* Fresen.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 529 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia
***Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Cham.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 487 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Cordia americana* (L.) Gottschling & J.S.Mill.**
Referência: Gottschling, M. & Miller, J.S. 2006. Syst. Bot. 31(2): 364.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Cordia anabaptista* Cham.**
Voucher: Belém, R.P. 3293 (CEPEC, MO, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Cerrado
***Cordia bicolor* A.DC.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1430 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Cordia brasiliensis* (I.M.Johnst.) Gottschling & J.S.Mill.**
Referência: Gottschling, M. & Miller, J.S. 2006. Syst. Bot. 31(2): 365.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Cordia collococca* L.**
Voucher: Amaral, I.L. 647 (K, MG, MO, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Cordia decipiens* I.M.Johnst.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6048 (BM, G, K, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Cordia ecalyculata* Vell.**
Voucher: Hatschbach, G. 6649 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cordia exaltata* Lam.**
Voucher: Pires, J.M. 52302 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cordia fallax* I.M.Johnst.**
Voucher: Silva, N.T. 60744 (INPA, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Cordia gardneri* I.M.Johnst.**
Voucher: Gardner, G. 5126 (BM, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Cordia glabrata* (Mart.) A.DC.**
Voucher: Ratter, J.A. 4369 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cordia glazioviana* (Taub.) Gottschling & J.S.Mill.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1306 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Cordia goeldiana* Huber**
Voucher: Goeldi, A. 8319 (BM, G, K, P, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Cordia hatschbachii* J.S.Mill.**
Voucher: Almeida, C. 1959 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Cordia incognita* Gottschling & J.S.Mill.**
Referência: Gottschling, M. & Miller, J.S. 2006. Syst. Bot. 31(2): 365.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Cordia insignis* Cham.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 403 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado
***Cordia kingstoniana* J.S.Mill.**
Voucher: Prance, G.T. 7181 (K, MO, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Cordia latiloba* I.M.Johnst.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 1106 (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cordia lomatoloba* I.M.Johnst.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5497 (BM, G, INPA, K, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Cordia magnoliifolia* Cham.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 14287 (G, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Cordia mayoi* Taroda**
Voucher: Harley, R.M. 18983 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Cordia naidophila* I.M.Johnst.**
Voucher: Killip, E.P. 30008 (GH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Cordia nervosa* Lam.**
Voucher: Pires, J.M. 52572 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Cordia nodosa* Lam.**
Voucher: Lima, J. 474 (HRB, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Cordia ochnacea* DC.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 610 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Cordia panicularis* Rudge**
Voucher: Mori, S.A. 17567 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cordia rufescens* A.DC.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 246 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Cordia sagotii* I.M.Johnst.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 3042 (PACA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), Nordeste, Sudeste; Amazônia
***Cordia scabrifolia* A.DC.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 512 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Sudeste (SP); Amazônia
***Cordia sellowiana* Cham.**
Voucher: Ratter, J.A. 1979 (MO, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cordia sericicalyx* A.DC.**
Voucher: Prance, G.T. 4446 (K, MO, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia
***Cordia silvestris* Fresen.**
Voucher: Maas, P.J.M. 13095
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Cordia sprucei* Mez**
Voucher: Silva, A.S.L. 659 (INPA, MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Cordia superba* Cham.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 287 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cordia taguahyensis* Vell.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 530 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cordia tetrandra* Aubl.**
Voucher: Pires, J.M. 16656 (MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cordia toqueve* Aubl.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 510 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Cordia trachyphylla* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 61540 (CEPEC, G, M, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cordia trichoclada* DC.**
Voucher: Almeida, J. 43 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. *ex* Steud.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 286 (HUEFS, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Cordia ucayaliensis* I.M.Johnst.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8443 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cordia ulei* I.M.Johnst.**
Voucher: Prance, G.T. 7674
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Euploca Nutt.

17 espécies (6 endêmicas)
***Euploca barbata* (DC.) J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Stapf 243 (HUEFS, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Euploca filiformis* (Lehm.) J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1540 (HRCB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Euploca fruticosa* (L.) J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Carvalho, A.M.V. 2683 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga
***Euploca hassleriana* (Chodat) J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Hatschbach, G. 48440 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Euploca humistrata* (Cham.) J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Oliveira, P. 239 (BHCB, BHMH)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Euploca krapovickasii* J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Krapovickas, A. 22780 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Euploca lagoensis* (Warm.) Diane & Hilger**
Voucher: Queiroz, R.T. 285 (PEUFR, UFRN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Euploca ocellata* (Cham.) J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Pedersen, T. 11664 (HST)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Euploca pallescens* (I.M.Johnst.) J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Pott, A. 3634 (CPAP, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Euploca paradoxa* (Mart.) J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Hatschbach, G. 55170 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Domínio desconhecido
***Euploca parciflora* (Mart.) J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Pereira, R. 1938 (IBGE, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado
***Euploca polyphylla* (Lehm.) J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Melo, J.I.M. 513 (MOSS, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Euploca pottii* J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Pott, A. 1397 (CPAP, CTES, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Euploca procumbens* (Mill.) Diane & Hilger**
Voucher: Melo, J.I.M. 565 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Euploca rodaliae* J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Miranda, A.M. 2399 (HST)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Euploca salicoides* (Cham.) J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Semir, J. 20649 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Euploca ternata* (Vahl) J.I.M.Melo & Semir**
Voucher: Queiroz, R.T. 285 (PEUFR, UFRN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Heliotropium L.

9 espécies (1 endêmica)
***Heliotropium amplexicaule* Vahl**
Voucher: Sobral, M. 4499 (FLOR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Heliotropium angiospermum* Murray**
Voucher: Mello-Silva, R. 533 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Heliotropium curassavicum* L.**
Voucher: Melo, J.I.M. 431 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PB), Sul (RS); Caatinga, Pampa
***Heliotropium elongatum* (Lehm.) I.M.Johnst.**
Voucher: Melo, J.I.M. 439 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Heliotropium indicum* L.**
Voucher: Gomes, A.P.S. 476 (PEUFR, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Heliotropium leiocarpum* Morong**
Voucher: Jarenkow, J.A. 2765 (HBR, PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Heliotropium nicotianaefolium* Poir.**
Voucher: Schlindwein, C. 349 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Heliotropium phylicoides* Cham.**
Voucher: Falkenberg, D.B. 5147 (FLOR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Heliotropium transalpinum* Vell.**
Voucher: Harley, R.M. 21925 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Lepidocordia Ducke

1 espécie (não endêmica)
***Lepidocordia punctata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 534965)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

Moritzia

2 espécies (1 endêmica)
***Moritzia dusenii* I.M.Johnst.**
Referência: Johnst., I.M. 1927. Contr. Gray Herb. 78:19.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Moritzia tetraquetra* Brand**
Referência: Johnst., I.M. 1927. Contr. Gray Herb. 78:14.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Rotula Lour.

2 espécies (2 endêmicas)
***Rotula lycioides* (Mart.) I.M.Johnst.**
Voucher: Lima, A. 52-1149 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado
***Rotula pohlii* (Kuhlm.) E.F.Guim. & Mautone**
Voucher: Bringel, J.B.A. 49-8020 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Tournefortia L.

18 espécies (5 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Tournefortia andrade-limae* J.I.M.Melo**
Referência: Melo, J.I.M. 2007. Hoehnea 34(2): 156.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga
***Tournefortia angustiflora* Ruiz & Pav.**
Voucher: Santos, J.U. 535 (CH 2007, HRB 19194)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Tournefortia bicolor* Sw.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5775
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Tournefortia breviflora* DC.**
Voucher: Cavalheiro, L. 002 (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Tournefortia candidula* (Miers) Johnst.**
Voucher: Gardner, G. 1078 (BM, NY, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tournefortia cuspidata* Kunth**
Voucher: Silveira, M. 1082 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Tournefortia floribunda* Kunth**
Voucher: Ule, E.H.G. 169 (R 198573)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tournefortia gardneri* A.DC.**
Voucher: Brade, A.C. 7067 (G)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Tournefortia mapirensis* Lingelsh.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9712
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Tournefortia melanochaeta* DC.**
Voucher: Melo, E. 3056 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Tournefortia membranacea* (Gardner) DC.**
Referência: Candolle, A.L.P.P. 1845. Prodr. 9:530.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tournefortia paniculata* Cham.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tournefortia paniculata* var. *austrina* I.M.Johnst.**
Voucher: Melo, E. 1179 (HUEFS 19979)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Tournefortia rubicunda* Salzm. *ex* A.DC.**
Referência: Candolle, A.L.P.P. 1845. Prodr. 9:526.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tournefortia salicifolia* A.DC.**
Voucher: Andreata, R.H.P. 546 (RB 230224)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Tournefortia salzmannii* DC.**
Referência: Hilger, H.H. & Diane, N. 2003. Bot. Jahrb. Syst. 125(1): 47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tournefortia subsessilis* Cham.**
Referência: Johnston, I.M. 1930. Contr. Gray Herb. 82/83-84.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Tournefortia syringaefolia* Vahl**
Voucher: Silveira, M. 1487
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Tournefortia villosa* Salzm. *ex* DC.**
Referência: PRODR. 1845. Syst. Nat. [Candolle] 9: 524.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Varronia P.Browne
27 espécies (12 endêmicas)
***Varronia bracelinae* (I.M.Johnst.) Borhidi**
Voucher: Mexia, Y. 5617 (BM, G, MO, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Varronia buddleoides* (Rusby) J.S.Mill.**
Voucher: Ducke, A. 1129 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Varronia calocephala* (Cham.) Friesen**
Voucher: França, F. 4650 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Varronia campestris* (Warm.) Borhidi**
Referência: Borhidi, A. et al. 1988. Acta Bot. Hung. 34: 390.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Varronia caput-medusae* (Taub.) Friesen**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15273 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Varronia corchorifolia* (A.DC.) Borhidi**
Voucher: Stapf, M.N.S. 232 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Varronia curassavica* Jacq.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 538 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Varronia dardani* (Taroda) J.S.Mill.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 7316 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga
***Varronia globosa* Jacq.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 322 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga
***Varronia grandiflora* Desv.**
Referência: Borhidi, A. et al. 1988. Acta Bot. Hung. 34: 385.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia
***Varronia guazumaefolia* Desv.**
Referência: Borhidi, A. et al. 1988. Acta Bot. Hung. 34:391.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Varronia harleyi* (Taroda) J.S.Mill.**
Voucher: Stapf 313 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Varronia intonsa* (I.M.Johnst.) J.S.Mill.**
Referência: Miller, J.S. 2007. Novon 17:373.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Varronia leucocephala* (Moric.) J.S.Mill.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 255 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA); Caatinga
***Varronia leucomalla* (Taub.) Borhidi**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4146 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Varronia leucomalloides* (Taroda) J.S.Mill.**
Voucher: Giulietti, A.M. 2478 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE, PB, BA); Cerrado, Caatinga
***Varronia multispicata* (Cham.) Borhidi**
Voucher: Stapf, M.N.S. 534 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado
***Varronia paucidentata* (Friesen) Friesen**
Referência: Borhidi, A. et al. 1988. Acta Bot. Hung. 34: 386.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Varronia poliophylla* (Fresen.) Borhidi**
Voucher: Belém, R.P. 2468 (BM, CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Varronia polycephala* Lam.**
Voucher: França, F. 953 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Varronia sessilifolia* (Cham.) Borhidi**
Voucher: Harley, R.M. 53888 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Varronia setigera* (I.M.Johnst.) J.S.Mill.**
Referência: Miller, J.S. 2007. Novon 17(3): 372-375.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Varronia spinescens* (L.) Borhidi**
Referência: Borhidi, A. et al. 1988. Acta Bot. Hung. 34: 388.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Varronia tarodaea* J.S.Mill.**
Voucher: Stapf, M.N.S. 532 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Varronia truncata* (Fresen.) Borhidi**
Referência: Borhidi, A. 1988. Acta Bot. Hung. 34: 388.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Varronia urticifolia* (Cham.) J.S.Mill.**
Referência: Miller, J.S. 2007. Novon 17: 375.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Varronia villicaulis* (Fresen.) Borhidi**
Referência: Borhidi, A. et al. 1988. Acta Bot. Hung. 34: 388.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

BRASSICACEAE
Vinícius Castro Souza
10 gêneros, 15 espécies (nenhuma endêmica)

Brassica L.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Brassica juncea* (L.) Czern.**
Voucher: Pinto, G.R.M. s.n. (ESA 27781)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Brassica rapa* L.**
Voucher: Moreau, A.J.A. 1 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Capsella L.
1 espécie (não endêmica)
***Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.**
Voucher: Souza, R. s.n. (ESA 418)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Cardamine L.
1 espécie (não endêmica)
***Cardamine bonariensis* Pers.**
Voucher: Isaac, M.S. 5 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

Coronopus L.
1 espécie (não endêmica)
***Coronopus didymus* (L.) Sm.**
Voucher: Barreto, K.D. 2501 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Lepidium L.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Lepidium aletes* J.F.Macbr.**
Voucher: Hatschbach, G. 22361 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lepidium bonariense* L.**
Voucher: Marinis, G. 357 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica
***Lepidium ruderale* L.**
Voucher: Guerra, M. 451 (SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica
***Lepidium virginicum* L.**
Voucher: Moreau, A.J.A. 2 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Raphanus L.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Raphanus raphanistrum* L.**
Voucher: Pinto, G.R.M. s.n. (ESA 27785)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Raphanus sativus* L.**
Voucher: Wasum, R. 12781 (MO)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Rapistrum Crantz
1 espécie (não endêmica)
***Rapistrum rugosum* (L.) All.**
Voucher: Angheber, S. s.n. (ESA 2924)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Rorippa Scop.
1 espécie (não endêmica)
***Rorippa palustris* (L.) Besser**
Voucher: Daly, D.C. 11030 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Sinapis L.
1 espécie (não endêmica)
***Sinapis arvensis* L.**
Voucher: Mautone, L. 107 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Thlaspi L.
1 espécie (não endêmica)
***Thlaspi arvense* L.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 798 (IAC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

BROMELIACEAE
Rafaela Campostrini Forzza, Andrea Costa, José Alves Siqueira Filho, Gustavo Martinelli
42 gêneros, 1.207 espécies (1.030 endêmicas), 9 subespécies (8 endêmicas), 83 variedades (63 endêmicas)

Acanthostachys Klotzsch
2 espécies (1 endêmica)
***Acanthostachys pitcairnioides* (Mez) Rauh & Barthlott**
Voucher: Blanchet, J.S. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Acanthostachys strobilacea* (Schult. & Schult.f.) Klotzsch**
Voucher: Sucre, D. 8313 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Aechmea Ruiz & Pav.
172 espécies (141 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas), 21 variedades (16 endêmicas)
***Aechmea aguadocensis* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Leme, E.M.C. 7370 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea alba* Mez**
Voucher: Martinelli, G. 11121 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Aechmea alopecurus* Mez**
Voucher: Thomas, W.W. 13714 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Aechmea amicorum* B.R. Silva & H. Luther**
Voucher: Berg, W. 40 (CEPEC, HB, R, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea amorimii* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 2991 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea ampla* L.B.Sm.**
Voucher: Magalhães, G.M. 19656 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea andersoniana* Leme & H.Luther**
Voucher: Leme, E.M.C. 4365 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea andersonii* H.Luther & Leme**
Referência: Luther, H. & Leme, E.M.C. 1998.
J. Bromeliad Soc. 48(3): 127.
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea angustifolia* Poepp. & Endl.**
Voucher: Prance, G.T. 15312 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Aechmea apocalyptica* Reitz**
Voucher: Martinelli, G. 14882 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aechmea aquilega* (Salisb.) Griseb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aechmea aquilega* (Salisb.) Griseb. var. *aquilega
Voucher: Fontoura, T. 404 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL);
Amazônia, Mata Atlântica
***Aechmea araneosa* L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 15635 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea atrovittata* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Leme, E.M.C. 6519 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Aechmea azurea* L.B.Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 19158 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea bahiana* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.
Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1844.
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Aechmea bambusoides* L.B.Sm. & Reitz**
Voucher: Braga, P.I.S. 1551 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Aechmea beeriana* L.B.Sm. & M.A.Spencer**
Voucher: Silveira, M. 1268 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Aechmea bicolor* L.B.Sm.**
Voucher: Amorim, A.M. 5255 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea blanchetiana* (Baker) L.B.Sm.**
Voucher: Sucre, D. 8317 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea blumenavii* Reitz**
Voucher: Reitz, R. 3559 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Aechmea bocainensis* E.Pereira & Leme**
Voucher: Gurken, L.C. 9 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Aechmea brevicollis* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.
Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 1782-1784.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aechmea bromeliifolia* (Rudge) Baker**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Aechmea bromeliifolia* var. *albobracteata* Philcox**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 960 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, DF); Caatinga, Cerrado
Aechmea bromeliifolia* (Rudge) Baker var. *bromeliifolia
Voucher: Forzza, R.C. 805 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Aechmea bruggeri* Leme**
Voucher: Bruegger, M.C. s.n. (CESJ, HB 79628)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Aechmea burle-marxii* E.Pereira**
Voucher: Carvalho, A.M. 6766 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Aechmea caesia* E.Morren *ex* Baker**
Voucher: Martinelli, G. 11720 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aechmea callichroma* Read & Baensch**
Referência: Read, R.W. & Luther, H.E. 1991. Selbyana 12: 60.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Mata Atlântica
***Aechmea calyculata* (E.Morren) Baker**
Voucher: Reitz, R. 4753 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Aechmea canaliculata* Leme & H.Luther**
Voucher: Amorim, A.M. 904 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea candida* E.Morren *ex* Baker**
Voucher: Thomas, W.W. 9111 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Aechmea capitata* (Schult. & Schult.f.) Baker**
Voucher: Leme, E.M.C. 3041 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea capixabae* L.B.Sm.**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1607 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea cariocae* L.B.Sm.**
Voucher: Silva, B.R. 467 (HB, R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aechmea carvalhoi* E.Pereira & Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 7750 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea castanea* L.B.Sm.**
Voucher: Leme, E.M.C. 1142 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea castelnavii* Baker**
Voucher: Martinelli, G. 15057 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO);
Amazônia, Mata Atlântica
***Aechmea catendensis* J.A.Siqueira & Leme**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1090 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Aechmea caudata* Lindm.**
Voucher: Pereira, E. 10713 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aechmea cephaloides* J.A.Siqueira & Leme**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 939 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Aechmea chantinii* (Carrière) Baker**
Distribuição: nativa; não endêmica
Aechmea chantinii* (Carrière) Baker var. *chantinii
Voucher: Holst, B.K. 8227 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia
***Aechmea chrysocoma* Baker**
Voucher: Pontes, R.A. 131 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica
***Aechmea coelestis* (K.Koch) E.Morren**
Voucher: Costa, A.F. 415 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aechmea comata* (Gaudich.) Baker**
Voucher: Duarte, A.P. 3197 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Aechmea conifera* L.B.Sm.**
Voucher: Sousa, G.M. 490 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Aechmea constantinii* (Mez) L.B.Sm.**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1294 (MAC, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica
***Aechmea contracta* (Mart. *ex* Schult.f.) Baker**
Voucher: Maas, P.J.M. 12727 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia
***Aechmea correia-araujoi* E.Pereira & Moutinho**
Voucher: Leme, E.M.C. 804 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea corymbosa* (Mart. *ex* Schult. & Schult.f.) Mez**
Voucher: Maas, P.J.M. 12693 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aechmea curranii* (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer**
Voucher: Amorim, A.M. 1079 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Aechmea cylindrata* Lindm.**
Voucher: Reitz, R. 3670 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aechmea dealbata* E.Morren *ex* Baker**
Voucher: Faria, A.P.G. 157 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aechmea depressa* L.B.Sm.**
Voucher: Jardim, J.G. 3062 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea digitata* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Amorim, A.M. 3581 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea discordiae* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 822 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea disjuncta* (L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Thomas, W.W. 13313 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea distichantha* Lem.**
Voucher: Forzza, R.C. 1435 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Aechmea echinata* (Leme) Leme**
Voucher: Jardim, J.G. 1148 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea egleriana* L.B.Sm.**
Distribuição: nativa; endêmica
Aechmea egleriana* L.B.Sm. var. *egleriana
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.
Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):1863.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Aechmea egleriana* var. *major* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1964. Mem. New York Bot. Gard.
10(5): 40.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Aechmea emmerichiae* Leme**
Voucher: Pontes, R.A. 142 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PB, BA); Mata Atlântica
***Aechmea entringeri* Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. 936 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea eurycorymbus* Harms**
Voucher: Pontes, R.A. 234 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PB, PE, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Aechmea farinosa* (Regel) L.B.Sm.**
Voucher: Jardim, J.G. 251 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea fasciata* (Lindl.) Baker**
Voucher: Carauta, J.P.P. 380 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aechmea fernandae* (E.Morren) Baker**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.
Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):1940.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Aechmea flavorosea* E.Pereira**
Voucher: Sucre, D. 11032 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aechmea floribunda* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 6632 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Aechmea fosteriana* L.B.Sm.**
Distribuição: nativa; endêmica
Aechmea fosteriana* L.B.Sm. subsp. *fosteriana
Voucher: Foster, M.B. 177 (R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea fosteriana* subsp. *rupicola* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 1987. Bradea 4: 392.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea fraudulosa* Mez**
Voucher: Reitz, R. 6811 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea froesii* (L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1474 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica
***Aechmea fulgens* Brongn.**
Voucher: Martinelli, G. 15331 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica
***Aechmea gamosepala* Wittm.**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
Aechmea gamosepala* Wittm. var. *gamosepala
Voucher: Schwacke, C.A.W. 13359 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica (?);
Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Aechmea gamosepala* var. *nivea* Reitz**
Voucher: Reitz, R. 9093 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Aechmea glandulosa* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 4380 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea gracilis* Lindm.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 9863 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aechmea grazielae* Martinelli & Leme**
Voucher: Sucre, D. 10983 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aechmea guainumbiorum* J.A.Siqueira & Leme**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1184 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Aechmea guarapariensis* E.Pereira & Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 92 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea guaratingensis* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Leme, E.M.C. 7767 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea guaratubensis* E.Pereira**
Voucher: Leinig, M. 506 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Aechmea gurkeniana* E.Pereira & Moutinho**
Voucher: Gurken, L.C. 5 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea gustavoi* J.A.Siqueira & Leme**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1091 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Aechmea huebneri* Harms**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(3):1813-4.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Aechmea incompta* Leme & H.Luther**
Referência: Leme, E.M.C. & Luther, H. 1998.
Selbyana 19: 186.
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea joannis* Strehl**
Referência: Strehl, T. 2004. Divulg. Mus. Ci. Tecnol.
UBEA/PUCRS 9: 26.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Aechmea kertesziae* Reitz**
Voucher: Hatschbach, G. 57174 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aechmea kleinii* Reitz**
Voucher: Reitz, R. 935 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Aechmea lactifera* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 796 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Aechmea laevigata* Leme**
Voucher: Silva, E. s.n. (HB 89557)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea lamarchei* Mez**
Voucher: Forzza, R.C. 2114 (CESJ, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Aechmea lanata* (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer**
Voucher: Curran, H.M. 138 (US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea leonard-kentiana* H.Luther & Leme**
Voucher: Thomas, W.W. 11487 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea leppardii* Philcox**
Voucher: Leppard 540 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Aechmea leptantha* (Harms) Leme & J.A. Siqueira**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1227 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL, SE);
Caatinga, Mata Atlântica

***Aechmea leucolepis* L.B.Sm.**
Voucher: Kolmann, J.L. 4449 (MBML, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea lilacinantha* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 997 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aechmea lingulata* (L.) Baker**
Referência: Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste - Biodiversidade, Conservação e suas Bromélias 389-391.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Aechmea lingulatoides* Leme & H.Luther**
Referência: Leme, E.M.C. & Luther, H. 1998. Selbyana 19: 187.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Aechmea linharesii* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 1999. Harvard Pap. Bot. 4: 135-168.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea longifolia* (Rudge) L.B.Sm. & M.A.Spencer**
Voucher: Holst, B.K. 8198 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Aechmea lymanii* W.Weber**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 982 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea maasii* Gouda & W.Till**
Voucher: Farney, C. 287 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Aechmea macrochlamys* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 244 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea marauensis* Leme**
Voucher: Jardim, J.G. 3044 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica
***Aechmea marginalis* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Medeiros Jr., J.S. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Aechmea melinonii* Hook.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1862.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Aechmea mertensii* (G.Mey.) Schult. & Schult.f.**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1479 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica
***Aechmea milsteiniana* L.B.Sm. & R.W.Read**
Referência: Smith, L.B. & Read, R.W. 1979. J. Bromeliad Soc. 29: 21.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Aechmea miniata* Beer *ex* Baker**
Voucher: Martinelli, G. 6047 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea mira* Leme & H.Luther**
Voucher: Leme, E.M.C. 3722 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea mollis* L.B.Sm.**
Voucher: Amorim, A.M. 2055 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea mulfordii* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 84 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea multiflora* L.B.Sm.**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1436 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Aechmea murcae* (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer**
Referência: Smith, L.B. & Spencer, M.A. 1992. Phytologia 72: 98.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aechmea muricata* (Arruda) L.B.Sm.**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1443 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Aechmea mutica* L.B.Sm.**
Voucher: Kolmann, J.L. 4527 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Aechmea nudicaulis* var. *nordestina* J.A.Siqueira & Leme**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1454 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Mata Atlântica
Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. var. *nudicaulis
Voucher: Fontoura, T. 387 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aechmea organensis* Wawra**
Voucher: Sucre, D. 9732 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Aechmea orlandiana* L.B.Sm.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Aechmea orlandiana* subsp. *belloi* E.Pereira & Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 699 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Aechmea orlandiana* L.B.Sm. subsp. *orlandiana
Voucher: Hatschbach, G. 59440 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea ornata* Baker**
Voucher: Martinelli, G. 2582 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aechmea paradoxa* (Leme) Leme**
Voucher: Seidel, A. 1100 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea paratiensis* Leme & Fraga**
Voucher: Silva, B.R. 136 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aechmea patentissima* (Mart. *ex* Schult. & Schult.f.) Baker**
Voucher: Araújo, D.S.D. 5093 (GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Aechmea pectinata* Baker**
Voucher: Martinelli, G. 15847 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Aechmea pedicellata* Leme & H.Luther**
Voucher: Kautsky, R.A. 937 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea penduliflora* André**
Voucher: Campbell, D.G. 8921 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia
***Aechmea perforata* L.B.Sm.**
Voucher: Sousa, G.M. 315 (MBML, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea pernambucentris* J.A.Siqueira & Leme**
Voucher: Baracho, G.S. 761 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); Mata Atlântica
***Aechmea phanerophlebia* Baker**
Voucher: Brade, A.C. 20905 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Aechmea pimenti-velosoi* Reitz**
Voucher: Reitz, R. 4051 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Aechmea pineliana* (Brong. *ex* Planch.) Baker**
Voucher: Costa, A.F. 750 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Aechmea podantha* L.B.Sm.**
Voucher: Vieira, C.M. 971 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea poitaei* (Baker) L.B.Sm. & M.A.Spencer**
Referência: Smith, L.B. & Spencer, M.A. 1992. Phytologia 72: 96-8.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aechmea polyantha* E.Pereira & Reitz**
Referência: Pereira, E. & Reitz, R. 1974. Bradea 1: 385.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aechmea prancei* L.B.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 7681 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia
***Aechmea prava* E.Pereira**
Voucher: Seidel, A. 628 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aechmea pseudonudicaulis* Leme**
Voucher: Seidel, A. 1074 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea purpureorosea* (Hook.) Wawra**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Aechmea racinae* L.B.Sm.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Aechmea racinae* var. *erecta* L.B.Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 19415 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Aechmea racinae* L.B.Sm. var. *racinae
Voucher: Martinelli, G. 15626 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea racinae* var. *tubiformis* E.Pereira**
Voucher: Seidel, A. 622 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea ramosa* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Aechmea ramosa* var. *festiva* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 770 (GH, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Aechmea ramosa* Mart. *ex* Schult. & Schult.f. var. *ramosa
Voucher: Wendt, T. 159 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Aechmea ramusculosa* Leme**
Voucher: Hatschbach, G. 48762 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea recurvata* (Klotzsch) L.B.Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Aechmea recurvata* var. *albobracteata* Strehl**
Referência: Strehl, T. 2004. Divulg. Mus. Ci. Tecnol. UBEA/PUCRS 9: 28.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Aechmea recurvata* var. *benrathii* (Mez) Reitz**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1868.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Aechmea recurvata* var. *ortgiesii* (Baker) Reitz**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):1866.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul; Mata Atlântica
Aechmea recurvata* (Klotzsch) L.B.Sm. var. *recurvata
Voucher: Hatschbach, G. 37030 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Aechmea roberto-seidelii* E.Pereira**
Voucher: Seidel, A. 621 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea rodriguesiana* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1946-1948.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aechmea rubens* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1803.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Aechmea rubiginosa* Mez**
Voucher: Silveira, M. 3604 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Aechmea rubroaristata* Leme & Fraga**
Voucher: Leme, E.M.C. 1662 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Aechmea rubrolilacina* Leme**
Voucher: Seidel, A. 1139 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea saxicola* L.B.Sm.**
Voucher: Sousa, G.M. 319 (CVRD, SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Aechmea seideliana* W.Weber**
Referência: Weber, W. 1986. Feddes Repert. 97: 113.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea seidelii* (Leme) L.B.Sm. & M.A.Spencer**
Referência: Smith, L.B. & Spencer, M.A. 1992. Phytologia 72: 98.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Aechmea serragrandensis* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1500 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Aechmea setigera* Mart. *ex* Schult.f.**
Voucher: Dias-Melo, R. 356 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Aechmea sphaerocephala* Baker**
Voucher: Araújo, D.S.D. 8600 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Aechmea squarrosa* Baker**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15486 (K)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Aechmea sucreana* Martinelli & C.Vieira**
Voucher: Martinelli, G. 15559 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea sulbahianensis* Leme et al.**
Voucher: Leme, E.M.C. 6720 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea tentaculifera* Leme et al.**
Voucher: Thomas, W.W. 14218 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea tillandsioides* (Mart. *ex* Schult. & Schult.f.) Baker**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.
Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):1901.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM, RO); Amazônia
***Aechmea tocantina* Baker**
Voucher: Lima, H.C. 5675 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Aechmea tomentosa* Mez**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 478 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Aechmea triangularis* L.B.Sm.**
Voucher: Silva, B.R. 1109 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea triticina* Mez**
Voucher: Silva, B.R. 66 (R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Aechmea turbinocalyx* Mez**
Voucher: Martinelli, G. 8937 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea vanhoutteana* (Van Houtte) Mez**
Voucher: Canela, M.B.F. 24 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Aechmea victoriana* L.B.Sm.**
Voucher: Faria, A.P.G. 79 (MBML, RFA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea viridostigma* Leme & H.Luther**
Voucher: Silva, E. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea warasii* E.Pereira**
Voucher: Kautsky, R.A. 604 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Aechmea weberi* (E.Pereira & Leme) Leme**
Voucher: Martinelli, G. 8929 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Aechmea weilbachii* Didr.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Aechmea weilbachii* var. *albipetala* Leme & A.F.Costa**
Voucher: Costa, A.F. s.n. (RB 77798)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Aechmea weilbachii* Didr. var. *weilbachii
Voucher: Vidal, J. 3507 (R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Aechmea werdermannii* Harms**
Voucher: Martinelli, G. 15043 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PB, PE, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Aechmea williamsii* (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer**
Referência: Smith, L.B. & Spencer, M.A. 1992. Phytologia 72: 98.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Aechmea winkleri* Reitz**
Voucher: Winkler, S. 21 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Aechmea wittmackiana* (Regel) Mez**
Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 340.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Alcantarea (E.Morren *ex* Mez) Harms

26 espécies (26 endêmicas)
***Alcantarea benzingii* Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 77794)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Alcantarea burle-marxii* (Leme) J.R.Grant**
Voucher: Burle Marx, R. s.n. (HB 77777)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Alcantarea distractila* Leme & C.C.Paula**
Voucher: Leme, E.M.C. 5601 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Alcantarea duarteana* (L.B.Sm.) J.R.Grant**
Voucher: Duarte, A.P. 9017 (HB, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Alcantarea extensa* (L.B.Sm.) J.R.Grant**
Voucher: Forzza, R.C. 5044 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Alcantarea farneyi* (Martinelli & A.F.Costa) J.R.Grant**
Voucher: Farney, C. 1217 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Alcantarea geniculata* (Wawra) J.R.Grant**
Voucher: Martinelli, G. 15517 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Alcantarea glaziouana* (Leme) J.R.Grant**
Voucher: Carauta, J.P.P. 3345 (GUA, HB, HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Alcantarea hatschbachii* (L.B.Sm. & R.W.Read) Leme**
Voucher: Hatschbach, G. 29085 (MBM, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Alcantarea heloisae* J.R.Grant**
Voucher: Forzza, R.C. 4159 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Alcantarea imperialis* (Carriere) Harms**
Voucher: Forzza, R.C. 3202 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Alcantarea longibracteata* Leme & Fraga**
Voucher: Leme, E.M.C. 7346 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Alcantarea martinellii* Versieux & Wand.**
Voucher: Braga, P.I.S. 1558 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Alcantarea nahoumii* (Leme) J.R.Grant**
Voucher: Noblick, L.R. 3752 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Alcantarea nevaresii* (Leme) J.R.Grant**
Voucher: Costa, A.F. 372 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Alcantarea nigripetala* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Leme, E.M.C. 7381 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Alcantarea odorata* (Leme) J.R.Grant**
Voucher: Duarte, A.P. 14058 (HBR, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Alcantarea patriae* Versieux & Wand.**
Voucher: Versieux, L.M. 365 (BHCB, HUEFS, MBML,
R, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica
***Alcantarea regina* (Vell.) Harms**
Voucher: Forzza, R.C. 4305 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Alcantarea roberto-kautskyi* Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. 1053 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Alcantarea simplicisticha* Leme & A.P.Fontana**
Voucher: Leme, E.M.C. 7355 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Alcantarea tortuosa* Versieux & Wand.**
Voucher: Versieux, L.M. 240 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Alcantarea trepida* Versieux & Wand.**
Voucher: Forzza, R.C. 5072 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Alcantarea turgida* Versieux & Wand.**
Voucher: Versieux, L.M. 260 (BHCB, MBM,
RB, SEL, SP, SPF, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica
***Alcantarea vasconcelosiana* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 7650 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Alcantarea vinicolor* (E.Reitz) J.R.Grant**
Voucher: Martinelli, G. 15727 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

Ananas Mill.

7 espécies (1 endêmica)
***Ananas ananassoides* (Baker) L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 5082 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
TO, RO), Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica
***Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. & Schult.f.**
Voucher: Martinelli, G. 2905 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica
***Ananas comosus* (L.) Merril**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1089 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica
***Ananas fritzmuelleri* Camargo**
Voucher: Reitz, R. 3874 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Ananas lucidus* Mill.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5735 (B)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Ananas nanus* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**
Voucher: Leme, E.M.C. 6769 (HB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte, Nordeste (PE, AL); Amazônia, Mata Atlântica

***Ananas parguazensis* Camargo & L.B.Sm.**
Referência: Smith,
L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 2056.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia

Araeococcus Brongn.

8 espécies (6 endêmicas)
***Araeococcus chlorocarpus* (Wawra) Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Carvalho, A.M. 7107 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Araeococcus flagellifolius* Harms**
Voucher: Dias-Melo, R. 291 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Araeococcus goeldianus* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1493-2142.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Araeococcus micranthus* Brongn.**
Voucher: Kuhlmann, M. 61 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Araeococcus montanus* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 4371 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Araeococcus nigropurpureus* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Leme, E.M.C. 6732 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Araeococcus parviflorus* (Mart. *ex* Schult. & Schult. f.) Lindm.**
Voucher: Martinelli, G. 15427 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Araeococcus sessiliflorus* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Thomas, W.W. 9094 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

Billbergia Thunb.

48 espécies (35 endêmicas), 5 variedades (4 endêmicas)
***Billbergia acreana* H.Luther**
Voucher: Daly, D.C. 10162 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia
***Billbergia alfonsijoannis* Reitz**
Voucher: Hatschbach, G. 40362 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Billbergia amandae* W.Weber**
Referência: Weber, W. 1986. Feddes Repert. 97: 115.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Billbergia amoena* (Lodd.) Lindl.**
Distribuição: nativa; endêmica
Billbergia amoena* (Lodd.) Lindl. var. *amoena
Voucher: Costa, A.F. 6 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Billbergia amoena* var. *robertiana* E.Pereira & Leme**
Voucher: Costa, A.F. 523 (R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Billbergia amoena* var. *stolonifera* E.Pereira & Moutinho**
Voucher: Leme, E.M.C. 215b (R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Billbergia brachysiphon* L.B.Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Billbergia brachysiphon* L.B.Sm. var. *brachysiphon
Voucher: Lowrie, S.R. 692 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Billbergia brachysiphon* var. *paraensis* L.B.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 12039 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AC); Amazônia
***Billbergia bradeana* L.B.Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 19720 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Billbergia brasiliensis* L.B.Sm.**
Voucher: Marquete, R. 1971 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Billbergia buchholtzii* Mez**
Referência: Mez, C. 1934. Pflanzenr. (Engler) 32: 192.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Billbergia castelensis* E.Pereira**
Voucher: Seidel, A. 664 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Billbergia chlorantha* L.B.Sm.**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2164 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Billbergia dasilvae* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 1999. Harvard Pap. Bot. 4: 147.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Billbergia decora* Poepp. & Endl.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.
Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 2024.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Billbergia distachia* (Vell.) Mez**
Voucher: Castellanos, A. 24020 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Billbergia domingosmartinsis* E.Gross**
Referência: Gross, E. 1989. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 65: 65.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Billbergia elegans* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 8738 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Billbergia euphemiae* E.Morren**
Voucher: Martinelli, G. 15710 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Billbergia fosteriana* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):1996.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Billbergia horrida* Regel**
Voucher: Brade, A.C. 18587 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Billbergia iridifolia* (Nees & Mart.) Lindl.**
Voucher: Brade, A.C. 18257 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Billbergia kautskyana* E.Pereira**
Voucher: Kautsky, R.A. 592 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Billbergia kuhlmannii* L.B.Sm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 64489)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MS), Sul; Cerrado
***Billbergia laxiflora* L.B.Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 19174 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Billbergia leptopoda* L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 15521 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Billbergia lietzei* E.Morren**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1988-1990.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Billbergia lymanii* E.Pereira & Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. 670 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Billbergia macracantha* E.Pereira**
Voucher: Seidel, A. 670 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Billbergia macrocalyx* Hook.**
Voucher: Foster, M.B. 542 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Billbergia magnifica* Mez**
Voucher: Hatschbach, G. 1610 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste, Sudeste, Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Billbergia meyeri* Mez**
Voucher: Pereira, E. 7479 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Billbergia minarum* L.B.Sm.**
Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ 9143, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Billbergia morelii* Brongn.**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 806 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, PB, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Billbergia morreniana* Baker**
Referência: Baker 1889. Handb. Bromel.:74.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Billbergia nana* E.Pereira**
Voucher: Seidel, A. 642 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Billbergia nutans* H.H.Wendl. *ex* Regel**
Voucher: Hatschbach, G. 42189 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Billbergia oxysepala* Mez**
Voucher: Daly, D.C. 7664 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Billbergia pohliana* Mez**
Voucher: Heringer, E.P. 1919 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Billbergia porteana* Brong. *ex* Beer**
Voucher: Lima, A. 55-2097 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Billbergia pyramidalis* (Sims) Lindl.**
Voucher: Marquete, R. 1464 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul; Mata Atlântica
***Billbergia reichardtii* Wawra**
Voucher: Pereira, E. 10597 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Billbergia robert-readii* E.Gross & Rauh**
Voucher: Daly, D.C. 12899 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia
***Billbergia rupestris* L.B.Sm.**
Voucher: Pardo, M. 87 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Billbergia sanderiana* E.Morren**
Voucher: Wendt, T. 238 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Billbergia saundersii* Bull**
Voucher: Amorim, A.M. 5074 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Billbergia seidelii* L.B.Sm. & Reitz**
Voucher: Kautsky, R.A. 5945 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Billbergia tweedieana* Baker**
Voucher: Araújo, D.S.D. 8654 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Billbergia violacea* Beer**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):2019.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Billbergia vittata* Brong.**
Voucher: Sucre, D. 5812 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ), Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Billbergia zebrina* (Herb.) Lindl.**
Voucher: Castellanos, A. 23163 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Brocchinia Schult. & Schult.f.

4 espécies (1 endêmica)

***Brocchinia amazonica* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1984. J. Bromeliad Soc. 34: 106-107.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Brocchinia hechtioides* Mez**
Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Brocchinia paniculata* Schult. & Schult.f.**
Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Brocchinia tatei* L.B.Sm.**
Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Bromelia L.

37 espécies (27 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Bromelia antiacantha* Bertol.**
Voucher: Monteiro, R.F. 263 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Bromelia araujoi* P.J.Braun et al.**
Referência: Braun, P.J. et al. 2008. Bromelie 2008: 91.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Bromelia arenaria* Ule**
Voucher: Forzza, R.C. 3834 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga

***Bromelia auriculata* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1677.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Bromelia balansae* Mez**
Voucher: Smith, L.B. 9259 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Bromelia binotii* E.Morren *ex* Mez**
Voucher: Pirani, J.R. 2422 (NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Bromelia braunii* Leme & E.Esteves**
Voucher: Silva, B.R. 1250 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Bromelia charlesii* P.J.Braun et al.**
Referência: Braun, P.J. et al. 2009. Bromelie 1: 29.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Bromelia eitenorum* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1667.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Bromelia epiphytica* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1670.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bromelia estevesii* Leme**
Voucher: Esteves, E. 361 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Bromelia exigua* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22192 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bromelia glaziovii* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22189 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Bromelia goeldiana* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1668-1669.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Bromelia goyazensis* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22190 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bromelia grandiflora* Mez**
Voucher: Leme, E.M.C. 2200 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bromelia gurkeniana* E.Pereira & Moutinho**
Distribuição: nativa; endêmica

***Bromelia gurkeniana* var. *funchiana* E.Pereira & Leme**
Referência: Pereira, E. & Leme, E.M.C. 1985. Revista Brasil. Biol. 45: 635.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Bromelia gurkeniana* E.Pereira & Moutinho var. *gurkeniana
Voucher: Gurken, S. 19 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Bromelia horstii* Rauh**
Referência: Rauh, W. 1985. J. Bromeliad Soc. 35: 54.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Bromelia interior* L.B.Sm.**
Voucher: Monteiro, R.F. 122 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Bromelia irwinii* L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 16599 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bromelia karatas* L.**
Voucher: Pontes, R. 503 (JPB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Cerrado, Mata Atlântica

***Bromelia laciniosa* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1656.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Bromelia lagopus* Mez**
Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 188.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Mata Atlântica

***Bromelia legrellae* (E.Morren) Mez**
Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 179.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Bromelia lindevaldae* Leme & E.Esteves**
Voucher: Silva, B.R. 1223 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bromelia macedoi* L.B.Sm.**
Voucher: Silva, B.R. 1143 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bromelia minima* Leme & E.Esteves**
Voucher: Leme, E.M.C. 4716 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bromelia morreniana* (Regel) Mez**
Voucher: Prance, G.T. 16484 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Bromelia oliveirae* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1966. Phytologia 13: 149.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Bromelia regnellii* Mez**
Voucher: Regnell, A.F. II-285 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Bromelia reversacantha* Mez**
Voucher: Monteiro, R.F. 130 (B, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Bromelia rondoniana* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1677.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia
***Bromelia scarlatina* (*hortus ex* Henricq) E.Morren**
Voucher: Plowman, T.C. 7032 (F, GH, USM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte; Amazônia
***Bromelia serra* Griseb.**
Voucher: Monteiro, R.F. 233 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado
***Bromelia sylvicola* S.Moore**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1667.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Bromelia tubulosa* L.B.Sm.**
Voucher: Pires, J.M. 1661 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Bromelia villosa* Mez**
Voucher: Silva, B.R. 1234 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Canistropsis (Mez) Leme

11 espécies (11 endêmicas)
***Canistropsis albiflora* (L.B.Sm.) H.Luther & Leme**
Voucher: Kolmann, J.L. 785 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Canistropsis billbergioides* (Schult. & Schult.f.) Leme**
Voucher: Martinelli, G. 853 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Canistropsis burchellii* (Baker) Leme**
Voucher: Smith, L.B. 15397 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Canistropsis correia-araujoi* (E.Pereira & Leme) Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 625 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Canistropsis elata* (E.Pereira & Leme) Leme**
Voucher: Sucre, D. 4893 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Canistropsis exigua* (E.Pereira & Leme) Leme**
Voucher: Castellanos, A. 23193 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Canistropsis marceloi* (E.Pereira & Moutinho) Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 717 (HB, RB, US, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Canistropsis microps* (E.Morren *ex* Mez) Leme**
Voucher: Araújo, D.S.D. 4106 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Canistropsis pulcherrima* (E.Pereira) Leme**
Voucher: Gurken, L.C. 1491 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Canistropsis seidelii* (L.B.Sm. & Reitz) Leme**
Voucher: Martinelli, G. 5713 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Canistropsis simulans* (E.Pereira & Leme) Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 3169 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Canistrum E.Morren

13 espécies (13 endêmicas)
***Canistrum alagoanum* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Martinelli, G. 15337 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Canistrum aurantiacum* E.Morren**
Voucher: Martinelli, G. 15102 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Canistrum auratum* Leme**
Voucher: Seidel, A. 1049 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Canistrum camacaense* Martinelli & Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 3045 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Canistrum fosterianum* L.B.Sm.**
Voucher: Jardim, J.G. 3067 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Canistrum guzmanioides* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 4378 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Canistrum improcerum* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Leme, E.M.C. 6211 (HB, MAC, RB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Canistrum lanigerum* H.Luther & Leme**
Voucher: Berg, O. 195 (HB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Canistrum montanum* Leme**
Voucher: Forzza, R.C. 1276 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Canistrum pickelii* (A.Lima & L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 959 (UFP, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Canistrum sandrae* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 4345 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Canistrum seidelianum* W.Weber**
Voucher: Fiaschi, P. 1917 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Canistrum triangulare* L.B.Sm. & Reitz**
Voucher: Pereira, E. 2246 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Catopsis Griseb.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Catopsis berteroniana* (Schult. & Schult.f.) Mez**
Voucher: Smith, L.B. 15390 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Catopsis sessiliflora* (Ruiz & Pav.) Mez**
Voucher: Foster, M.B. 54 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Connellia

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Connellia augustae* (M.R. Schomb.) N.E.Br.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop. Monogr. 14: 1-658.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Connellia caricifolia* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop. Monogr. 14; 1-658.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Connellia nahoumii* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 1996. Bromélia 3(2): 13-14.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Connellia quelchii* N.E.Br.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop. Monogr. 14: 1-658.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Cottendorfia Schult. & Schult.f.

1 espécie (1 endêmica)
***Cottendorfia florida* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Forzza, R.C. 3830 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Cryptanthus Otto & A.Dietr.

70 espécies (69 endêmicas)
***Cryptanthus acaulis* (Lindl.) Beer**
Voucher: Martinelli, G. 12201 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Cryptanthus alagoanus* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Pontes, R.A. 205 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, PB, AL); Mata Atlântica
***Cryptanthus arelii* H.Luther**
Referência: Luther, H.E. 1999. Cryptanthus Soc. J. 14(2): 54-55.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Cryptanthus bahianus* L.B.Sm.**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1221 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PB, PE, BA, AL); Caatinga
***Cryptanthus beuckeri* E.Morren**
Voucher: Hatschbach, G. 58155 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus bibarrensis* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 5016 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cryptanthus bivittatus* (Hook.) Regel**
Voucher: Foster, M.B. 1192 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Cryptanthus bromelioides* Otto & A.Dietr.**
Voucher: Martinelli, G. 11689b (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cryptanthus burle-marxii* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 5056 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Cryptanthus capitatus* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1117 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus capitellatus* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 10089 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus caracensis* Leme & E.Gross**
Voucher: Leme, E.M.C. 1853 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Cryptanthus caulescens* I.Ramírez**
Voucher: Kautsky, R.A. 537 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus colnagoi* Rauh & Leme**
Voucher: Colnago, E. s.n. (HB 73715)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cryptanthus coriaceus* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1114 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus correia-araujoi* Leme**
Voucher: Araújo, L.K.C. s.n. (HB 77760)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus crassifolius* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. et al. 2008. J. Bromeliad Soc. 58: 17.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Cryptanthus delicatus* Leme**
Voucher: Nahoum, P.I. s.n. (HB 77791)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cryptanthus diamantinensis* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 1999. Harvard Pap. Bot. 4: 137.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Cryptanthus dianae* Leme**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1088 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica
***Cryptanthus dorothyae* Leme**
Voucher: Araújo, D.S.D. 1072 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Cryptanthus duartei* L.B.Sm.**
Voucher: Duarte, A.P. s.n. (RB 76607)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cryptanthus exaltatus* H.Luther**
Voucher: Kautsky, R.A. 542 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus felixii* J.A.Siqueira & Leme**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1422 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Cryptanthus fernseeoides* Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus ferrarius* Leme & C.C.Paula**
Voucher: Leme, E.M.C. 6544 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cryptanthus fosterianus* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 2431 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Cryptanthus giganteus* Leme & A.P.Fontana**
Voucher: Leme, E.M.C. 6919 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus glazioui* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15672a (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica
***Cryptanthus grazielae* H.Luther**
Voucher: Barroso, G.M. s.n. (HB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus incrassatus* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 172 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus lacerdae* Antoine**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(3): 1599.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Cryptanthus latifolius* Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. 7070 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus lavrasensis* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 2007. J. Bromeliad Soc. 57: 260.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica
***Cryptanthus leopoldo-horstii* Rauh**
Referência: Rauh, W. 1988. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 65: 68.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cryptanthus leuzingerae* Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 81970)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus lutherianus* I.Ramírez**
Voucher: Ramirez, I. 516 (MO, RB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus lyman-smithii* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 4342 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cryptanthus marginatus* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 243 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus maritimus* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 179 (GH, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus microglazioui* I.Ramírez**
Voucher: Luther, H. 2965 (SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus minarum* L.B.Sm.**
Voucher: Mello-Matos, A. s.n. (R 46186)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Cryptanthus odoratissimus* Leme**
Voucher: Martinelli, G. 273 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus osiris* W.Weber**
Voucher: Bleher, A. s.n. (HAL)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Cryptanthus pickelii* L.B.Sm.**
Voucher: Leme, E.M.C. 5057 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Cryptanthus praetextus* E.Morren & Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 58490 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus pseudoglazioui* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1560 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus pseudopetiolatus* Philcox**
Voucher: Harley, R.M. 18221 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cryptanthus pseudoscaposus* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 208 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus regius* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 6372 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Cryptanthus reisii* Leme**
Voucher: Reis Jr. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cryptanthus reptans* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Leme, E.M.C. 6591 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Cryptanthus roberto-kautskyi* Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. 535 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus ruthae* Philcox**
Voucher: Harley, R.M. 18507 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cryptanthus sanctaluciae* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 8215 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus scaposus* E.Pereira**
Voucher: Kautsky, R.A. 577 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus schwackeanus* Mez**
Voucher: Martinelli, G. 4739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Cryptanthus seidelianus* W.Weber**
Voucher: Seidel, A. 963 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cryptanthus sergipensis* I.Ramírez**
Voucher: Jardim, J.G. 489 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica
***Cryptanthus sinuosus* L.B.Sm.**
Voucher: Leme, E.M.C. 7686 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cryptanthus teretifolius* Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. 1032 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus tiradentesensis* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 6116 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Cryptanthus ubairensis* I.Ramírez**
Voucher: Leme, E.M.C. 7788 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cryptanthus venecianus* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 11825 (CEPEC, MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus vexatus* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 3014 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cryptanthus viridovinosus* Leme**
Voucher: Linhares, S. 678 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Cryptanthus warasii* E.Pereira**
Referência: Pereira, E. 1978. Bradea 2: 252.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cryptanthus warren-loosei* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 1993. Cryptanthus Soc. J. 8(2-3): 17.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Cryptanthus whitmanii* Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 77786)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Cryptanthus zonatus* (Visiani) Beer**
Voucher: Lima, A. 54-1929 (IPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

Deuterocohnia Mez

1 espécie (1 endêmica)
***Deuterocohnia meziana* Kuntze *ex* Mez**
Voucher: Forzza, R.C. 827 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

Disteganthus Lem.

1 espécie (1 endêmica)
***Disteganthus calatheoides* (L.B.Sm.) L.B.Sm. & R.W.Read**
Referência: Smith, L.B. & Read, R.W. 1976. Phytologia 33: 433.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

Dyckia Schult. & Schult.f.

115 espécies (99 endêmicas)
***Dyckia agudensis* Irgang & Sobral**
Voucher: Sobral, M. 5581 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa
***Dyckia alba* S.Winkl.**
Voucher: Winkler, S. 747 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Dyckia argentea* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 17280a (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica
***Dyckia aurea* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1967. Phytologia 14: 488.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia beateae* E.Gross & Rauh**
Referência: Gross, E. & Rauh, W. 1991. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 79: 7.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Dyckia brachyphylla* L.B.Sm.**
Voucher: Irwin, H.S. 22383 (NY, P, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia brachystachya* Rauh & E.Gross**
Referência: Gross, E. & Rauh, W. 1988. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 65: 8.
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste; Domínio desconhecido
***Dyckia bracteata* (Wittm.) Mez**
Voucher: Lima, H.C. 2569 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Dyckia brasiliana* L.B.Sm.**
Voucher: Irwin, H.S. 34233 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Dyckia braunii* Rauh**
Voucher: Braun, P. 690 (B, HEID)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia brevifolia* Baker**
Voucher: Smith, L.B. 13930 (HBR, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Dyckia burchellii* Baker**
Voucher: Burchell, W.J. 8178 (B, BR, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia burle-marxii* L.B.Sm. & R.W.Read**
Referência: Smith, L.B. & Read, R.W. 1977. Phytologia 38: 137.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Domínio desconhecido
***Dyckia cabrerae* L.B.Sm. & Reitz**
Voucher: Reitz, R. 14069 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Dyckia choristaminea* Mez**
Voucher: Rambo, B. s.n. (B, PACA 48832)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste,
Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Dyckia cinerea* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 18570 (B, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Dyckia commixta* Hassl.**
Voucher: Hatschbach, G. 16942 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Dyckia consimilis* Mez**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 13427 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Dyckia coximensis* L.B.Sm. & Reitz**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop. Monogr. 14: 561-562.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Dyckia crocea* L.B.Sm.**
Voucher: Lindeman, J.C. 3048 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Dyckia dawsonii* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1957. Los Angeles County Mus. Contr. Sci. 17: 2.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia delicata* Larocca & Sobral**
Voucher: Larocca, J. 96-001 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica

***Dyckia deltoidea* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1967. Phytologia 14: 485.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado
***Dyckia densiflora* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica
***Dyckia dissitiflora* Schult.**
Voucher: Machado, C.G. 34 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Dyckia distachya* Hassl.**
Voucher: Hatschbach, G. 61064 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Dyckia domfelicianensis* Strehl**
Referência: Strehl, T. 2004. Vidalia 2: 26-36.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa
***Dyckia duckei* L.B.Sm.**
Voucher: Lima, M.P.M. 54 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Dyckia dusenii* L.B.Sm.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 18081 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Dyckia elata* Mez**
Voucher: Schawcke, W. 8739 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido
***Dyckia elisabethae* S.Winkl.**
Voucher: Winkler, S. 741 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Dyckia elongata* Mez**
Voucher: Sellow, F. 58 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Dyckia eminens* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22192a (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia encholirioides* (Gaudich.) Mez**
Voucher: Martinelli, G. 15886 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Dyckia espiritosantensis* Leme & A.P.Fontana**
Voucher: Leme, E.M.C. 6930 (MBML, RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dyckia estevesii* Rauh**
Voucher: Esteves, E. s.n. (B 100138319, HEID)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia excelsa* Leme**
Voucher: Burle Marx, R. s.n. (RB 324436)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Dyckia ferox* Mez**
Voucher: Pereira, E. 496 (RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Dyckia ferruginea* Mez**
Voucher: Pereira, E.E. 383 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Dyckia fosteriana* L.B.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 27198 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Dyckia frigida* Hook.f.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 4059 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Dyckia glandulosa* L.B.Sm. & Reitz**
Voucher: Magalhães, G.M. 18959 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia goehringii* E.Gross & Rauh**
Referência: Gross, E. & Rauh, W. 1991. Trop. Subtrop.
Pflanzenwelt 79: 12.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio
desconhecido
***Dyckia goiana* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1967. Phytologia 14: 479.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia granmogulensis* Rauh**
Referência: Rauh, W. 1988. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 65: 11.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia hatschbachii* L.B.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 2725 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Dyckia hebdingii* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1971. Phytologia 21: 90.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa
***Dyckia hohenbergioides* Leme & E.Esteves**
Voucher: Pereira, E.E. 385 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Domínio desconhecido
***Dyckia horridula* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 22194 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado
***Dyckia ibicuiensis* Strehl**
Referência: Strehl, T. 1997. Bromélia 4(4): 14-16.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Dyckia ibiramensis* Reitz**
Voucher: Smith, L.B. 7623 (HBR, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Dyckia irmgardiae* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1966. Phytologia 13: 150.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa
***Dyckia irwinii* L.B.Sm.**
Voucher: Hunt, D.R. 5841 (K)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT), Sul; Cerrado
***Dyckia joanae-marcioi* P.J.Braun et al.**
Referência: Braun, P.J. et al. 2008. Bromelie 2008: 36.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia julianae* Strehl**
Referência: Strehl, T. 2004. Vidalia 2: 26-36.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Dyckia lagoensis* Mez**
Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 483.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia leptostachya* Baker**
Voucher: Smith, L.B. 5846 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Dyckia limae* L.B.Sm.**
Voucher: Pontes, R.A. 284 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE);
Caatinga, Mata Atlântica
***Dyckia lindevaldae* Rauh**
Voucher: Braun, P. 691 (B, HEID)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia linearifolia* Baker**
Voucher: Forzza, R.C. 114 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Dyckia lutziana* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1943. Arq. Bot. Estado São Paulo 2(1): 107.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Dyckia macedoi* L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 100 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia machrisiana* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1957. Los Angeles County Mus. Contr. Sci. 17: 7.
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Dyckia maracasensis* Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 7019 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Dyckia maritima* Baker**
Voucher: Pereira, E. 8468 (HB, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Dyckia marnier-lapostollei* L.B.Sm.**
Voucher: Braun, P. 460 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia martinellii* B.R. Silva & Forzza**
Voucher: Martinelli, G. 14413 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dyckia mello-barretoi* L.B.Sm.**
Voucher: Barreto, H.L.M. 2122 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia microcalyx* Baker**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 57722)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR); Mata Atlântica
***Dyckia milagrensis* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 1999. Harvard Pap. Bot. 4: 135-168.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Dyckia minarum* Mez**
Voucher: Regnell, A.F. II-283 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Dyckia mirandiana* Leme & Z.J.G.Miranda**
Voucher: Leme, E.M.C. 6380 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia monticola* L.B.Sm. & Reitz**
Voucher: Reitz, R. 4789 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Dyckia nana* Leme & O.B.C.Ribeiro**
Voucher: Leme, E.M.C. 7484 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia nervata* Rauh**
Referência: Rauh, W. 1987. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 60: 21.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;
Domínio desconhecido
***Dyckia odorata* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1964. Phytologia 10: 485.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia orobanchoides* Mez**
Voucher: Tamberlik s.n. (B 100157405)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado
***Dyckia paraensis* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974.
Fl. Neotrop. Monogr. 14: 1-658.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dyckia pauciflora* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Hatschbach, G. 39429 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia paucispina* Leme & E.Esteves**
Referência: Leme, E.M.C. & Pereira, E.E. 2003. Vidalia 1: 21-30.
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Dyckia pectinata* L.B.Sm. & Reitz**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12632 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia pernambucana* L.B.Sm.**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 460 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE);
Caatinga, Mata Atlântica
***Dyckia platyphylla* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1970. Phytologia 19: 283.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Dyckia polycladus* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 3096 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Dyckia princeps* Lem.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop. Monogr. 14; 1-658.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia pseudococcinea* L.B.Sm.**
Voucher: Silva, B.R. 885 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dyckia pumila* L.B.Sm.**
Voucher: Irwin, H.S. 7365 (B, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia racemosa* Baker**
Voucher: Gardner, G. 4015 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia racinae* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 3095 (B, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Dyckia rariflora* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Forzza, R.C. 233 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia reitzii* L.B.Sm.**
Voucher: Reitz, R. 2690 (HBR, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Dyckia remotiflora* Otto & A.Dietr.**
Voucher: Sacco, J.C. 1200 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa
***Dyckia retardata* S.Winkl.**
Voucher: Winkler, S. 7424 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa
***Dyckia retroflexa* S.Winkl.**
Voucher: Winkler, S. 7410 (HPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Dyckia rigida* Strehl**
Referência: Strehl, T. 2004. Vidalia 2: 26-36.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS);
Domínio desconhecido

***Dyckia saxatilis* Mez**
Voucher: Forzza, R.C. 230 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica
***Dyckia schwackeana* Mez**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 5857 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica
***Dyckia secunda* L.B.Sm.**
Voucher: Irwin, H.S. 14723 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Dyckia selloa* (K.Koch) Baker**
Voucher: Sellow, F. 3339 (B, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica
***Dyckia sellowiana* Mez**
Voucher: Sellow, F.B. 52 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Dyckia sickii* L.B.Sm.**
Voucher: Sick, H. 613 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dyckia silvae* L.B.Sm.**
Voucher: Silva, T.N. 784 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dyckia simulans* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 570 (GH, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia sordida* Baker**
Voucher: Forzza, R.C. 234 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia spinulosa* L.B.Sm. & Reitz**
Voucher: Duarte, A.P. 7409 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia stenophylla* L.B.Sm.**
Voucher: Irwin, H.S. 9728 (B, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia tenebrosa* Leme & H.Luther**
Referência: Leme, E.M.C. & Luther, H. 1999. Selbyana 19: 183.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia tenuis* Mez**
Voucher: Gardner, G. 3479 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado
***Dyckia trichostachya* Baker**
Voucher: Demuner, V. 1078 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado,
Mata Atlântica
***Dyckia tuberosa* (Vell.) Beer**
Voucher: Bernacci, L.C. 28400 (ESA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR,
SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Dyckia uleana* Mez**
Voucher: Duarte, A.P. 10352 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Dyckia ursina* L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 193 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia vaginosa* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15497 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido
***Dyckia warmingii* Mez**
Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 481.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Dyckia weddelliana* Baker**
Voucher: Irwin, H.S. 11929 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado

Edmundoa Leme

3 espécies (3 endêmicas)
***Edmundoa ambigua* (Wand. & Leme) Leme**
Voucher: Oliveira, A. 1114 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica
***Edmundoa lindenii* (Regel) Leme**
Voucher: Martinelli, G. 15829 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Edmundoa perplexa* (L.B.Sm.) Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 2956 (HB, RB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

Eduandrea Leme et al.

1 espécie (1 endêmica)
***Eduandrea selloana* (Baker) Leme et al.**
Voucher: Martinelli, G. 2708 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Encholirium Mart. *ex* Schult. & Schult.f.

24 espécies (24 endêmicas)
***Encholirium agavoides* Forzza & Zappi**
Voucher: Forzza, R.C. 5475 (CEPEC, K, MBM, RB, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Encholirium belemii* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Belém, R.P. 3797 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Encholirium biflorum* (Mez) Forzza**
Voucher: Forzza, R.C. 1466 (BHCB, MBM, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Encholirium brachypodum* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Taylor, N.P. 1546 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Encholirium bradeanum* L.B.Sm.**
Voucher: Smith, L.B. 5652 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Encholirium ctenophyllum* Forzza & Zappi**
Voucher: Forzza, R.C. 5455 (CEPEC, K, NY, MBM, RB, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido
***Encholirium disjunctum* Forzza**
Voucher: Forzza, R.C. 1570 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Encholirium eddie-estevesii* Leme & Forzza**
Voucher: Forzza, R.C. 1046 (CEN, NY, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Encholirium erectiflorum* L.B.Sm.**
Voucher: Sousa, G.M. s.n. (SP, SPF, TEPB 9749)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga
***Encholirium gracile* L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 930 (NY, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Encholirium heloisae* (L.B.Sm.) Forzza & Wand.**
Voucher: Forzza, R.C. 145 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encholirium horridum* L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 929 (HB, MBM, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Encholirium irwinii* L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 801 (BHCB, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Encholirium longiflorum* Leme**
Voucher: Teixeira 380 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), S udeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Encholirium luxor* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Forzza, R.C. 940 (BHCB, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Encholirium lymanianum* E.Pereira & Martinelli**
Voucher: Martinelli, G. 400 (GUA, HB, K, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Encholirium magalhaesii* L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 472 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Encholirium maximum* Forzza & Leme**
Voucher: Forzza, R.C. 1234 (CEPEC, HB, K, MBM, NY, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Encholirium pedicellatum* (Mez) Rauh**
Voucher: Forzza, R.C. 1504 (SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Encholirium reflexum* Forzza & Wand.**
Voucher: Forzza, R.C. 800 (BHCB, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Encholirium scrutor* (L.B.Sm.) Rauh**
Voucher: Forzza, R.C. 1488 (BHCB, K, MBM, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Encholirium spectabile* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Martinelli, G. 7669 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Encholirium subsecundum* (Baker) Mez**
Voucher: Forzza, R.C. 199 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Encholirium vogelii* Rauh**
Voucher: Forzza, R.C. 173 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Fernseea Baker

2 espécies (2 endêmicas)
***Fernseea bocainensis* E.Pereira & Moutinho**
Voucher: Gurken, S. 13 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Fernseea itatiaiae* (Wawra) Baker**
Voucher: Brade, A.C. 12725 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Fosterella L.B.Sm.

3 espécies (2 endêmicas)
***Fosterella batistiana* Ibisch et al.**
Voucher: Fernandes-da-Silva, J.B. s.n. (FR, HB, LPB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Fosterella hatschbachii* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Hatschbach, G. 30497 (HB, MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Fosterella windischii* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Windisch, P.G. 2044 (HB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido

Guzmania Ruiz & Pav.

9 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Guzmania brasiliensis* Ule**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 1290.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Guzmania lingulata* (L.) Mez**
Voucher: Jardim, J.G. 2848 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica
***Guzmania melinonis* Regel**
Voucher: Campbell, D.G. 8976 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Guzmania monostachia* (L.) Rusby *ex* Mez**
Voucher: Martinelli, G. 15066 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE); Mata Atlântica
***Guzmania nubicola* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1312.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guzmania patula* Mez & Wercklé**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 1293.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guzmania roezlii* (E.Morren) Mez**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 1292.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Guzmania sanguinea* (André) André *ex* Mez**
Distribuição: nativa; não endêmica
Guzmania sanguinea* (André) André *ex* Mez var. *sanguinea
Voucher: Martinelli, G. 15067 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica
***Guzmania vittata* (Mart. *ex* Schult.f.) Mez**
Voucher: Silveira, M. 1238 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Hohenbergia Schult. & Schult.f.

40 espécies (39 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas)
***Hohenbergia aechmeioides* Leme**
Voucher: Menescal, R. s.n. (RB 495810)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Mata Atlântica
***Hohenbergia arcuata* Leme & M.Machado**
Voucher: Machado, M. s.n. (RB 495806)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Hohenbergia augusta* (Vell.) E.Morren**
Voucher: Martinelli, G. 15027 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Hohenbergia barbarespina* Leme & Fraga**
Voucher: Leme, E.M.C. 4363 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia belemii* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Jardim, J.G. 2737 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia blanchetii* (Baker) E.Morren *ex* Mez**
Voucher: Mori, S.A. 11522 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Hohenbergia brachycephala* L.B.Sm.**
Voucher: Faria, A.P.G. 118 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia burle-marxii* Leme & W.Till**
Voucher: Burle Marx, R. s.n. (HB 77780)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia castellanosii* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Carvalho, A. 79 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia catingae* Ule**
Distribuição: nativa; endêmica
Hohenbergia catingae* Ule var. *catingae
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1236 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Hohenbergia catingae* var. *elongata* M.B.Foster**
Referência: Foster, M.B. 1961. J. Bromeliad Soc. 11: 77.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga
***Hohenbergia catingae* var. *eximbricata* L.B.Sm. & R.W.Read**
Referência: Smith, L.B. & Read, R.W. 1976. Phytologia 33: 436.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hohenbergia catingae* var. *extensa* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Harley, R.M. 16171 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hohenbergia conquistensis* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 2003. J. Bromeliad Soc. 53: 169.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia correia-araujoi* E.Pereira & Moutinho**
Voucher: Araújo, D.S.D. 14 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia edmundoi* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Pereira, E. s.n. (HB 10680)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Hohenbergia eriantha* (Brongn. *ex* Baker) Mez**
Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 269.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido
***Hohenbergia estevesii* E.Pereira & Moutinho**
Referência: Pereira, E. & Moutinho, J.L. 1980. Bradea 3: 87.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Hohenbergia flava* Leme & C.C.Paula**
Referência: Leme, E.M.C. & Paula, C.C. 2004. Vidalia 2: 21-29.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia hatschbachii* Leme**
Voucher: Hatschbach, G. 6338 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia horrida* Harms**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1493 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Mata Atlântica
***Hohenbergia humilis* L.B.Sm. & R.W.Read**
Referência: Smith, L.B. & Read, R.W. 1976. Phytologia 33: 437.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Hohenbergia itamarajuensis* Leme & Baracho**
Voucher: Leme, E.M.C. 805 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia lanata* E.Pereira & Moutinho**
Voucher: Leme, E.M.C. 814 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia lemei* H.Luther & K.Norton**
Voucher: Luther, H. 3092 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia leopoldo-horstii* E.Gross**
Referência: Gross, E. 1991. J. Bromeliad Soc. 41: 66.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Hohenbergia littoralis* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 46 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia membranostrobilus* Mez**
Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 269.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Hohenbergia minor* L.B.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 50052 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia mutabilis* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 11040 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Hohenbergia oxoniensis* W.Weber**
Referência: Weber, W. 1982. Feddes Repert. 94: 595.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Domínio desconhecido
***Hohenbergia pabstii* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Castellanos, A. 27049 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Hohenbergia pennae* E.Pereira**
Referência: Pereira, E. 1982. Bradea 3: 383.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Hohenbergia ramageana* Mez**
Voucher: Martinelli, G. 15100 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Hohenbergia reconcavensis* Leme & Fraga**
Voucher: Linhares, S. 936 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Hohenbergia ridleyi* (Baker) Mez**
Voucher: Martinelli, G. 15346 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, SE); Mata Atlântica
***Hohenbergia rosea* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Seidel, A. 623 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Hohenbergia salzmannii* (Baker) E.Morren *ex* Mez**
Voucher: Amorim, A.M. 4160 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia sandrae* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 2003. J. Bromeliad Soc. 53: 174.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Hohenbergia stellata* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1432 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PI, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Hohenbergia undulatifolia* Leme & H.Luther**
Referência: Leme, E.M.C. & Luther, H. 1998. J. Bromeliad Soc. 48: 153.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Hohenbergia utriculosa* Ule**
Voucher: Jardim, J. 4419 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hohenbergia vestita* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1972. Phytologia 24: 446.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Lindmania Mez

5 espécies (2 endêmicas)
***Lindmania argentea* L.B.Sm.**
Voucher: Farney, C. 850 (INPA, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lindmania dendritica* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**
Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lindmania maguirei* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**
Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lindmania nubigena* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**
Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lindmania piresii* L.B.Sm. et al.**
Referência: Smith, L.B. 1986. Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 689-721.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Lymania R.W.Read

9 espécies (9 endêmicas)
***Lymania alvimii* (L.B.Sm. & R.W.Read) R.W.Read**
Voucher: Thomas, W.W. 10871 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Lymania azurea* Leme**
Voucher: Martinelli, G. 15422 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Lymania brachycaulis* (E.Morren *ex* Baker) L.F.Sousa**
Voucher: Sousa, L.O.F. 443 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Lymania corallina* (Brong. *ex* Beer) R.W.Read**
Voucher: Martinelli, G. 15426 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Lymania globosa* Leme**
Voucher: Thomas, W.W. 10714 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Lymania languida* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 6724 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Lymania marantoides* (L.B.Sm.) R.W.Read**
Referência: Sousa, L.O.F. & Wendt, T. 2008. Bot. J. Linn. Soc. 157: 47-66.
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Lymania smithii* R.W.Read**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 797 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica
***Lymania spiculata* Leme & Forzza**
Voucher: Sousa 418 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

Navia Mart. *ex* Schult. & Schult.f.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Navia affinis* L.B.Sm.**
Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Navia crispa* L.B.Sm.**
Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Navia myriantha* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop. Monogr. 14: 1-658.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Navia piresii* L.B.Sm. et al.**
Voucher: Pires, J.M. 15014 (US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Neoglaziovia Mez

3 espécies (3 endêmicas)
***Neoglaziovia burle-marxii* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 1990. J. Bromeliad Soc. 40: 102.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;
Domínio desconhecido
***Neoglaziovia concolor* C.H.Wright**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 2037.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Neoglaziovia variegata* (Arruda) Mez**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 2036-2037.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

Neoregelia L.B.Sm.

107 espécies (100 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Neoregelia abendrothae* L.B.Sm.**
Voucher: Sucre, D. 10938 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia alvimii* Roeth**
Distribuição: nativa; endêmica
Neoregelia alvimii* Roeth var. *alvimii
Referência: Roeth, J. 1992. Bromelie 1992(3): 75-6.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Domínio desconhecido

***Neoregelia alvimii* var. *donatii* Roeth**
Referência: Roeth, J. 1992. Bromelie 1992: 76.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Neoregelia amandae* W.Weber**
Referência: Weber, W. 1979. Bradea 3: 26.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Neoregelia ampullacea* (E.Morren) L.B.Sm.**
Voucher: Sucre, D. 7952 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia angustibracteolata* E.Pereira & Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 691 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia angustifolia* E.Pereira**
Voucher: Seidel, A. 677 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia atroviridifolia* W.Weber & Röeth**
Referência: Weber, W. 1982. Feddes Repert. 93: 337-341.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Neoregelia azevedoi* Leme**
Voucher: Martinelli, G. 15411 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Neoregelia bahiana* (Ule) L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 2683 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Neoregelia binotii* (Antoine) L.B.Sm.**
Voucher: Smith, L.B. 2097 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Neoregelia bragarum* (E.Pereira & L.B.Sm.) Leme**
Voucher: Braga, P.I.S. 64 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia brevifolia* L.B.Sm. & Reitz**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1493-2142.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia brigadeirensis* C.C.Paula & Leme**
Voucher: Paula, C.C. 1268 (GFJP, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Neoregelia brownii* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 2174 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Neoregelia burle-marxii* R.W.Read**
Distribuição: nativa; endêmica
Neoregelia burle-marxii* subsp. *burlemarxii
Referência: Read, R.W. 1996. J. Bromeliad Soc. 46: 261-4.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Neoregelia burle-marxii* subsp. *meeana* R.W.Read**
Referência: Read, R.W. 1996. J. Bromeliad Soc. 46: 263.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Neoregelia camorimiana* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Araújo, L.K.C. 46 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia capixaba* E.Pereira & Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. 866 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia carcharodon* (Baker) L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 15543 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia carinata* Leme**
Voucher: Fontoura, T. s.n. (HB 84090)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia carolinae* (Beer) L.B.Sm.**
Voucher: Costa, A.F. 403 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia chlorosticta* (Baker) L.B.Sm.**
Voucher: Sucre, D. 2257 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Neoregelia coimbrae* E.Pereira & Leme**
Voucher: Martinelli, G. 10601 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia compacta* (Mez) L.B.Sm.**
Voucher: Braga, J.M.A. 4380 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia concentrica* (Vell.) L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 1716 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia coriacea* (Antoine) L.B.Sm.**
Voucher: Jesus, J.A. 1484 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia correia-araujoi* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Araújo, L.K.C. 42 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia crispata* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 3015 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Neoregelia cruenta* (R.Graham) L.B.Sm.**
Voucher: Farney, C. 3349 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia cyanea* (Beer) L.B.Sm.**
Voucher: Heringer, E.P. 2548 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Neoregelia dayvidiana* Leme & A.P.Fontana**
Voucher: Leme, E.M.C. 7566 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia diversifolia* E.Pereira**
Voucher: Forzza, R.C. 4981 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia doeringiana* L.B.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 61207 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Neoregelia dungsiana* E.Pereira**
Voucher: Farney, C. 2500 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia eleutheropetala* (Ule) L.B.Sm.**
Voucher: Hopkins, M.J.G. 1437 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Neoregelia eltoniana* W.Weber**
Voucher: Sucre, D. 3630 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia farinosa* (Ule) L.B.Sm.**
Voucher: Leoni, L.S. 2345 (GFJP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia fluminensis* L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 11835 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia fosteriana* L.B.Sm.**
Voucher: Leme, E.M.C. 1371 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia gavionensis* Martinelli & Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 376 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia gigas* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 8524 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia guttata* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 4893 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia hoehneana* L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 15908 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia ibitipocensis* (Leme) Leme**
Voucher: Forzza, R.C. 3338 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia indecora* (Mez) L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 12181 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia inexspectata* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 1998. Canistropsis - Bromélias da Mata Atlântica 1-143.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia johannis* (Carrière) L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 1528 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia kautskyi* E.Pereira**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 3929 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia kerryi* Leme**
Voucher: Amorim, A.M. 4806 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Neoregelia kuhlmannii* L.B.Sm.**
Voucher: Kuhlmann, M. 2652 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia lactea* H.Luther & Leme**
Voucher: Strang, H.E. 623 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia laevis* (Mez) L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 15873 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Neoregelia leprosa* L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 8007a (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica
***Neoregelia leucophoea* (Baker) L.B.Sm.**
Voucher: Costa, A.F. 508 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia leviana* L.B.Sm.**
Voucher: Carauta, J.P.P. 3033 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Neoregelia lilliputiana* E.Pereira**
Voucher: Kautsky, R.A. 409 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia lillyae* W.Weber**
Referência: Weber, W. 1982. Feddes Repert. 94: 599.
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica
***Neoregelia longipedicellata* Leme**
Voucher: Martinelli, G. 16007 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia longisepala* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Leme, E.M.C. 445 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Neoregelia lymaniana* R.Braga & Sucre**
Voucher: Costa, A. 413 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia macahensis* (Ule) L.B.Sm.**
Voucher: Leme, E.M.C. 1376 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia macrosepala* L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 11897 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia maculata* L.B.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 55780 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Neoregelia macwilliamsii* L.B.Sm.**
Voucher: Smith, L.B. 15432 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia magdalenae* L.B.Sm. & Reitz**
Voucher: Martinelli, G. 9009 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia margaretae* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1493-2142.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Neoregelia marmorata* (Baker) L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 13099 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia martinellii* W.Weber**
Voucher: Leme, E.M.C. 141 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia meeana* Reitz**
Referência: Reitz, R. 1975. Sellowia 26: 40.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Neoregelia melanodonta* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 897 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia menescalii* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 703 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia mucugensis* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 1998. Canistropsis - Bromélias da Mata Atlântica 1-143.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Neoregelia myrmecophila* (Ule *ex* G.Karsten & H.Schenk) L.B.Sm.**
Voucher: Costa, A. 194 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Neoregelia nevaresii* Leme & H.Luther**
Voucher: Leme, E.M.C. 3776 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia nivea* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 1996. J. Bromeliad Soc. 46: 219.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Neoregelia odorata* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 1999. Harvard Pap. Bot. 4: 140.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Neoregelia olens* (Hook.f.) L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1939. Contr. Gray Herb. 124: 10.
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica
***Neoregelia oligantha* L.B.Sm.**
Voucher: Monteiro, R.F. 38 (K, MBM, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Neoregelia pascoaliana* L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 15477 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia pauciflora* L.B.Sm.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 8162 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia paulistana* E.Pereira**
Voucher: Leme, E.M.C. 1188 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia pernambucana* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1000 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica
***Neoregelia petropolitana* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1002 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia pineliana* (Lem.) L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1936. Contr. Gray Herb. 114: 5.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Neoregelia pontualii* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 5520 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia princeps* (Baker) L.B.Sm.**
Voucher: Leme, E.M.C. 683 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia punctatissima* (Ruschi) Ruschi**
Voucher: Fraga, C.N. 428 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia richteri* W.Weber**
Referência: Weber, W. 1982. Feddes Repert. 93: 341.
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica
***Neoregelia roethii* W.Weber**
Referência: Weber, W. 1982. Feddes Repert. 93: 342.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia rubrifolia* Ruschi**
Referência: Ruschi, A. 1954. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitao. Ser. Bot. 15: 1.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia rubrovittata* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1865 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia ruschii* Leme & B.R.Silva**
Voucher: Martinelli, G. 15201 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia sanguinea* Leme**
Voucher: Hatschbach, G. 65300 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia sapiatibensis* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Araújo, D.S.D. 40 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia sarmentosa* (Regel) L.B.Sm.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 11966 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia schubertii* Röth**
Referência: Röth, J. 1982. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 42: 31.
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica
***Neoregelia seideliana* L.B.Sm. & Reitz**
Voucher: Seidel, A. 71a (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia silvomontana* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Leme, E.M.C. 5288 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia simulans* L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 4979 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Neoregelia smithii* W.Weber**
Referência: Weber, W. 1982. Feddes Repert. 93: 345.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Mata Atlântica
***Neoregelia spectabilis* (T.Moore) L.B.Sm.**
Voucher: Vieira, C.M. 1131 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia tenebrosa* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 2218 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia tigrina* (Ruschi) Ruschi**
Voucher: Kautsky, R.A. 701 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia tristis* (Beer) L.B.Sm.**
Voucher: Aximoff, I. 45 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia uleana* L.B.Sm.**
Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (R 46406)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neoregelia wilsoniana* M.B.Foster**
Voucher: Harley, R.M. 18251 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Neoregelia zaslawskyi* E.Pereira & Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. 738 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Neoregelia zonata* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 197 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Nidularium Lem.

44 espécies (44 endêmicas)
***Nidularium albiflorum* (L.B.Sm.) Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 4275 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Nidularium alegrense* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Leme, E.M.C. 7855 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Nidularium altimontanum* Leme**
Voucher: Sucre, D. 2497 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nidularium alvimii* W.Weber**
Voucher: Seidel, A. 938 (HAL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Nidularium amazonicum* (Baker) Linden & E.Morren *ex* Lindm.**
Voucher: Hatschbach, G. 16207 (HBR, MBM, RFA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Nidularium amorimii* Leme**
Voucher: Amorim, A.M. 1738 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Nidularium angustibracteatum* Leme**
Voucher: Araújo, L.K.C. s.n. (HB, RB 324433, SEL, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Nidularium angustifolium* Ule**
Voucher: Seidel, A. 1103 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nidularium antoineanum* Wawra**
Voucher: Sucre, D. 3083 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Nidularium apiculatum* L.B.Sm.**
Voucher: Leme, E.M.C. 720 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nidularium atalaiaense* E.Pereira & Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 87 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nidularium azureum* (L.B.Sm.) Leme**
Voucher: Heringer, E.P. 1536 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Nidularium bicolor* (E.Pereira) Leme**
Voucher: Seidel, A. 644 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Nidularium bocainense* Leme**
Voucher: Martinelli, G. 7773 (RB, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Nidularium campo-alegrense* Leme**
Voucher: Hatschbach, G. 57143 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Nidularium camposportoi* (L.B.Sm.) Wand. & B.A.Moreira**
Voucher: Martinelli, G. 1121 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Nidularium cariacicaense* (W.Weber) Leme**
Voucher: Martinelli, G. 11977 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Nidularium catarinense* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1525 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Nidularium corallinum* (Leme) Leme**
Voucher: Brade, A.C. 15217 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nidularium espiritosantense* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 847 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Nidularium ferdinandocoburgii* Wawra**
Voucher: Monteiro, R.F. 24 (CEPEC, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Nidularium ferrugineum* Leme**
Voucher: Seidel, A. 1026 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Nidularium fradense* Leme**
Voucher: Martinelli, G. 10655 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nidularium fulgens* Lem.**
Voucher: Martinelli, G. 526 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nidularium innocentii* Lem.**
Voucher: Martinelli, G. 15721 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Nidularium itatiaiae* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 118 (GH, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nidularium jonesianum* Leme**
Voucher: Silva, J.C. 404 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Nidularium kautskyanum* Leme**
Voucher: Martinelli, G. 8075 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Nidularium linehamii* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1540 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Nidularium longiflorum* Ule**
Voucher: Forzza, R.C. 1746 (CESJ, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Nidularium mangaratibense* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 4795 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nidularium marigoi* Leme**
Voucher: Forzza, R.C. 3232 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Nidularium minutum* Mez**
Voucher: Martinelli, G. 15940 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nidularium organense* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1779 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nidularium picinguabense* Leme**
Voucher: Martinelli, G. 4197 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Nidularium procerum* Lindm.**
Voucher: Martinelli, G. 2568 (GUA, HB, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Nidularium purpureum* Beer**
Voucher: Martinelli, G. 1229 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Nidularium rosulatum* Ule**
Voucher: Martinelli, G. 5625 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nidularium rubens* Mez**
Voucher: Hoehne, F.C. 8624 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Nidularium rutilans* E.Morren**
Voucher: Sucre, D. 3013 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Nidularium scheremetiewii* Regel**
Voucher: Sucre, D. 1713 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nidularium serratum* Leme**
Voucher: Martinelli, G. 1119 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Nidularium utriculosum* Ule**
Voucher: Leme, E.M.C. 769 (HB, RB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Nidularium viridipetalum* Leme**
Voucher: Menescal, R. s.n. (HB 78484)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Orthophytum Beer

58 espécies (57 endêmicas)
***Orthophytum albopictum* Philcox**
Voucher: Martinelli, G. 5525 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum alvimii* W.Weber**
Referência: Weber, W. 1986. Feddes Repert. 97: 126.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Orthophytum amoenum* (Ule) L.B.Sm.**
Voucher: Noblick, L.R. 2822 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum atalaiense* J.A.Siqueira & Leme**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1307 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica
***Orthophytum benzingii* Leme & H.Luther**
Referência: Leme, E.M.C. & Luther, H. 1998. J. Bromeliad Soc. 48: 150.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Orthophytum boudetianum* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Fernandes, H.Q.B. 3002 (HB, MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Orthophytum braunii* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 1994. Pabstia 5: 14.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Orthophytum burle-marxii* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Martinelli, G. 5335 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum catingae* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 2007. J. Bromeliad Soc. 57: 204.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum cearence* Leme & F.Monteiro**
Voucher: Monteiro, F.J.S. 201 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga
***Orthophytum compactum* L.B.Sm.**
Voucher: Leme, E.M.C. 8005 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Orthophytum conquistense* Leme & M.Machado**
Voucher: Leme, E.M.C. 6019 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum diamantinense* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 7166 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Orthophytum disjunctum* L.B.Sm.**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 840 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Orthophytum duartei* L.B.Sm.**
Voucher: Duarte, A.P. 3910 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Orthophytum eddie-estevesii* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 2000. J. Bromeliad Soc. 50: 55.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Orthophytum estevesii* (Rauh) Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 2004. J. Bromeliad Soc. 54: 37.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Orthophytum falconii* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 4938 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Orthophytum foliosum* L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 5073 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Orthophytum fosterianum* L.B.Sm.**
Voucher: Fontana, A.P. 2959 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Orthophytum glabrum* (Mez) Mez**
Voucher: Duarte, A.P. 10372 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Orthophytum graomogolense* Leme & C.C.Paula**
Voucher: Leme, E.M.C. 7191 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Orthophytum grossiorum* Leme & C.C.Paula**
Referência: Leme, E.M.C. & Paula, C.C. 2003. Vidalia 1: 2.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Orthophytum gurkenii* Hutchison**
Voucher: Gurken, L.C. 1002 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Orthophytum harleyi* Leme & M.Machado**
Voucher: Machado, M. 180 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum hatschbachii* Leme**
Voucher: Forzza, R.C. 3825 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum heleniceae* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 2004. J. Bromeliad Soc. 55: 66-74.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum horridum* Leme**
Voucher: Nahoum, P.I. s.n. (HB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Orthophytum humile* L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 3761 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Orthophytum itambense* Versieux & Leme**
Voucher: Versieux, L.M. 149 (BHCB, HB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Orthophytum jabrense* G.S.Baracho & J.A.Siqueira**
Voucher: Pontes, R.A. 267 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Mata Atlântica
***Orthophytum lanuginosum* Leme & C.C.Paula**
Voucher: Leme, E.M.C. 5603 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Orthophytum lemei* E.Pereira & I.A.Penna**
Referência: Pereira, E. & Penna, I.A. 1985. Bol. Mus. Bot. Munic. 62: 3.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Orthophytum leprosum* (Mez) Mez**
Voucher: Duarte, A.P. 3636 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Orthophytum lucidum* Leme & H.Luther**
Voucher: Leme, E.M.C. 3659 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Orthophytum lymanianum* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Machado, M. s.n. (RB 493384)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Orthophytum macroflorum* Leme & M.Machado**
Voucher: Leme, E.M.C. 6007 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum magalhaesii* L.B.Sm.**
Voucher: Leme, E.M.C. 7907 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Orthophytum maracasense* L.B.Sm.**
Voucher: Harley, R.M. 51391 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Orthophytum mello-barretoi* L.B.Sm.**
Voucher: Fontana, A.P. 2450 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Orthophytum mucugense* Wand.& Conc.**
Voucher: Martinelli, G. 5521 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum navioides* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 5145 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum ophiuroides* Louzada & Wand.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 2532 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum piranianum* Leme & C.C.Paula**
Voucher: Leme, E.M.C. 7189 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Orthophytum pseudovagans* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Demuner, V. 2270 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Orthophytum riocontense* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 5787 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum rubiginosum* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 7992 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Domínio desconhecido
***Orthophytum rubrum* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 2444 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Orthophytum sanctum* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 846 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Orthophytum saxicola* Ule**
Voucher: Carvalho, A.M. 563 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Orthophytum schulzianum* Leme & M.Machado**
Voucher: Leme, E.M.C. 5881 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Orthophytum striatifolium* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 7085 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Orthophytum sucrei* H.Luther**
Referência: Luther, H. 1997. Selbyana 18: 95.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Orthophytum teofilo-otonense* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Leme, E.M.C. 7919 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Orthophytum toscanoi* Leme**
Referência: Leme, E.M.C. 2003. J. Bromeliad Soc. 53: 23.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Orthophytum triunfense* J.A.Siqueira & Leme**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1255 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Mata Atlântica
***Orthophytum vagans* M.B.Foster**
Voucher: Foster, M.B. s.n. (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Orthophytum zanonii* Leme**
Voucher: Fontana, A.P. 2324 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Pitcairnia L'Hér.

53 espécies (35 endêmicas)
***Pitcairnia abyssicola* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Leme, E.M.C. 7573 (HB, MBML, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pitcairnia albiflos* Herb.**
Voucher: Forzza, R.C. 4222 (MBM, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pitcairnia anomala* Hoehne**
Voucher: Hoehne, F.C. 5151 (R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Pitcairnia azouryi* Martinelli & Forzza**
Voucher: Martinelli, G. 15977 (CEPEC, K, MBM, MO, NY, RB, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Pitcairnia barbatostigma* Leme & A.P.Fontana**
Voucher: Fontana, A.P. 2339 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pitcairnia beycalema* Beer**
Voucher: Tatagiba, F.C.P. 138 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pitcairnia bradei* Markgr.**
Voucher: Forzza, R.C. 3760 (MBM, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pitcairnia burchellii* Mez**
Voucher: Burchell, W.J. 8116 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido
***Pitcairnia burle-marxii* R.Braga & Sucre**
Voucher: Duarte, A.P. 14057 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pitcairnia buscalionii* W.Till**
Referência: Till, W. 2003. Vidalia 1: 35.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido
***Pitcairnia capixaba* Leme & Fraga**
Voucher: Silva, B.R. 988 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pitcairnia caricifolia* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Martinelli, G. 7009 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Pitcairnia carinata* Mez**
Voucher: Martinelli, G. 15221 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Pitcairnia corallina* Linden & André**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop. Monogr. 14(1): 286.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pitcairnia corcovadensis* Wawra**
Voucher: Forzza, R.C. 4194 (K, MBM, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pitcairnia crinita* E.Pereira & Martinelli**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9719 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Pitcairnia cristalinensis* (Leme) D.C.Taylor & H.Rob.**
Voucher: Forzza, R.C. 2513 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Pitcairnia ctenophylla* L.B.Sm.**
Voucher: Rosa, N.A. 2261 (INPA, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pitcairnia curvidens* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Monteiro, R.F. 23 (K, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Pitcairnia decidua* L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 4977 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Pitcairnia diversifolia* Leme & A.P.Fontana**
Voucher: Fontana, A.P. 5704 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pitcairnia egleri* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. 1962. Phytologia 8: 228.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia
***Pitcairnia encholirioides* L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 3440 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pitcairnia ensifolia* Mez**
Voucher: Pohl, J.B.E. 2037 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Pitcairnia flammea* Lindl.**
Voucher: Forzza, R.C. 1463 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Pitcairnia glauca* Leme & A.P.Fontana**
Voucher: Leme, E.M.C. 7393 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Pitcairnia glaziovii* Baker**
Voucher: Martinelli, G. 8755 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Pitcairnia hatschbachii* E.Pereira**
Referência: Pereira, E. 1977. Bradea 2: 173.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Pitcairnia inaequalis* W.Weber**
Referência: Weber, W. 1986. Feddes Repert. 97: 93.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Pitcairnia insularis* Tatagiba & R.J.V. Alves**
Voucher: Alves, R.J.V. 6981 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pitcairnia irwiniana* L.B.Sm.**
Voucher: Paula-Souza, J. 3995 (ESA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Pitcairnia kirkbridei* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2813 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Pitcairnia limae* L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 15056 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica
***Pitcairnia luschnathii* W.Weber**
Referência: Weber, W. 1986. Feddes Repert. 97: 95.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Pitcairnia maidifolia* (C.Morren) Decne.**
Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Pitcairnia matogrossensis* E.Pereira & Leme**
Referência: Pereira, E. & Leme, E.M.C. 1986. Bradea 4: 269.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
***Pitcairnia neeana* (L.B.Sm. *ex* H.Luther) J.R.Grant**
Voucher: Nee, M. 34712 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia
***Pitcairnia norteﬂuminensis* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 4646 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pitcairnia patentiflora* L.B.Sm.**
Voucher: Fróes, R.L. 28422 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pitcairnia piepenbringii* Rauh & E.Gross**
Referência: Ruah, W. & Gross, E. 1988. Bromelie 1988: 1.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste; Cerrado
***Pitcairnia platypetala* Mez**
Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 438.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido
***Pitcairnia pulverulenta* Ruiz & Pav.**
Voucher: Maas, P.J.M. 13140 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Pitcairnia rondonicola* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Pipoly, J.J. 6623 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Pitcairnia rubiginosa* Baker**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop. Monogr. 14(1): 285.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Pitcairnia sastrei* L.B.Sm. & R.W.Read**
Referência: Smith, L.B. & Read, R.W. 1975. Phytologia 30: 290.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP); Amazônia
***Pitcairnia sprucei* Baker**
Voucher: Costa, M.A.S. 147 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Pitcairnia staminea* Lodd.**
Voucher: Silva, B.R. 1044 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pitcairnia suaveolens* Lindl.**
Voucher: Martinelli, G. 3334 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pitcairnia torresiana* L.B.Sm.**
Voucher: Leme, E.M.C. 7095 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Pitcairnia uaupensis* Baker**
Voucher: Nascimento, O.C. 807 (INPA, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Pitcairnia ulei* L.B.Sm.**
Voucher: Irwin, H.S. 5782 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Pitcairnia wendtiae* Tatagiba & B.R. Silva**
Voucher: Silva, B.R. 968 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pitcairnia windischii* E.Pereira & L.B.Sm.**
Voucher: Windisch, P.G. 1592 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Portea Brongn. & K.Koch

8 espécies (8 endêmicas)
***Portea alatisepala* Philcox**
Voucher: Mori, S.A. 10922 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Portea filifera* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 62 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Portea fosteriana* L.B.Sm.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 7681 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Portea grandiflora* Philcox**
Voucher: Harley, R.M. 18441 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Portea kermesina* K.Koch**
Voucher: Leme, E.M.C. 2976 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Portea nana* Leme & H.Luther**
Voucher: Jardim, J.G. 843 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Portea petropolitana* (Wawra) Mez**
Voucher: Amorim, A.M. 2545 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Portea silveirae* Mez**
Voucher: Carvalho, A.M. 40 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Pseudananas (Hassl.) Harms

1 espécie (não endêmica)
***Pseudananas sagenarius* (Arruda) Camargo**
Voucher: Martinelli, G. 6023 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Puya Molina

1 espécie (não endêmica)
***Puya floccosa* (Linden) E.Morren *ex* Mez**
Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Quesnelia Gaudich.

20 espécies (20 endêmicas), 3 variedades (3 endêmicas)
***Quesnelia alvimii* Leme**
Voucher: Seidel, A. 1132 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
***Quesnelia arvensis* (Vell.) Mez**
Voucher: Araújo, D.S.D. 4137 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Quesnelia augusto-coburgii* Wawra**
Voucher: Forzza, R.C. 2200 (CESJ, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Quesnelia clavata* Amorim & Leme**
Voucher: Amorim, A.M. 5351 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Quesnelia conquistensis* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 5667 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Quesnelia dubia* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 5152 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Quesnelia edmundoi* L.B.Sm.**
Distribuição: nativa; endêmica
Quesnelia edmundoi* L.B.Sm. var. *edmundoi
Voucher: Pereira, E. 1522 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Quesnelia edmundoi* var. *intermedia* E.Pereira & Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 9 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Quesnelia edmundoi* var. *rubrobracteata* E.Pereira**
Voucher: Vieira, C.M. 966 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Quesnelia humilis* Mez**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 74876)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Quesnelia imbricata* L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 14991 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Quesnelia indecora* Mez**
Voucher: Martinelli, G. 4695 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Quesnelia kautskyi* C.M.Vieira**
Voucher: Vieira, C.M. 967 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Quesnelia koltesii* Amorim & Leme**
Voucher: Amorim, A.M. 5443 (CEPEC, HB, MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Quesnelia lateralis* Wawra**
Voucher: Forzza, R.C. 2423 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Quesnelia liboniana* (De Jongle) Mez**
Voucher: Sucre, D. 2263 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Quesnelia marmorata* (Lem.) R.W.Read**
Voucher: Giordano, L.C. 2105 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Quesnelia quesneliana* (Brongn.) L.B.Sm.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 1837 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Quesnelia seideliana* L.B.Sm.**
Voucher: Vieira, C.M. 962 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Quesnelia strobilispica* Wawra**
Voucher: Vieira, C.M. 419 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Quesnelia testudo* Lindm.**
Voucher: Martinelli, G. 15897 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Quesnelia violacea* Wand. & S.L.Proença**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 2240 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Racinaea M.A.Spencer & L.B.Sm.

3 espécies (2 endêmicas)
***Racinaea aerisincola* (Mez) M.A.Spencer & L.B.Sm.**
Voucher: Sucre, D. 7147 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Racinaea domingos-martinsis* (Rauh) J.R.Grant**
Voucher: Moutinho, J.L. 100 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Racinaea spiculosa* (Griseb.) M.A.Spencer & L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 2775 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Ronnbergia E.Morren & Andre

4 espécies (4 endêmicas)
***Ronnbergia brasiliensis* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Martinelli, G. 15391 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ronnbergia carvalhoi* Martinelli & Leme**
Voucher: Martinelli, G. 9695 (CEPEC, MBM, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ronnbergia neoregelioides* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 4368 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Ronnbergia silvana* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 5305 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Tillandsia L.

82 espécies (49 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 15 variedades (6 endêmicas)
***Tillandsia adpressiflora* Mez**
Voucher: Daly, D.C. 9495 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Tillandsia aeranthos* (Loisel.) L.B.Sm.**
Voucher: Santos, E.M. 2627 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Tillandsia afonsoana* T. Strehl**
Voucher: Strehl, T. 499 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tillandsia anceps* Lodd.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2):846-848.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (CE); Amazônia
***Tillandsia araujei* Mez**
Distribuição: nativa; endêmica
Tillandsia araujei* Mez var. *araujei
Voucher: Forzza, R.C. 1633 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia araujei* var. *minima* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Penna, I.A. s.n. (HB 70661)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia arequitae* (André) André *ex* Mez**
Voucher: Matzenbacher, N.I. s.n. (HB 70665)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tillandsia arhiza* Mez**
Voucher: Versieux, L.M. 90 (RFA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG); Cerrado
***Tillandsia barrosoae* W.Till**
Voucher: Barroso, G.M. s.n. (HB 39691)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Tillandsia bella* Strehl**
Referência: Strehl, T. 2000. Iheringia, Bot. 54: 24.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tillandsia bergeri* Mez**
Voucher: Tardivo, R.C. 294 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tillandsia brachyphylla* Baker**
Voucher: Martinelli, G. 2564 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia bulbosa* Hook.f.**
Voucher: Martinelli, G. 15533 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica
***Tillandsia burle-marxii* Ehlers**
Voucher: Burle Marx, R. s.n. (WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

***Tillandsia candida* Leme**
Voucher: Seidel, A. 975 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Tillandsia carminea* W.Till**
Voucher: Martinelli, G. 12976 (RB, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia castelensis* Leme & W.Till**
Voucher: Leitão, R.V. s.n. (RB 495805)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Tillandsia catimbauensis* Leme et al.**
Voucher: Maciel, B.S.B. s.n. (UFP 41590)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga
***Tillandsia chapeuensis* Rauh**
Voucher: Leme, E.M.C. 6625 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia complanata* Benth.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 724-726.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Tillandsia confinis* L.B.Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tillandsia confinis* L.B.Sm. var. *confinis
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 704-705.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tillandsia copynii* Gouda**
Voucher: Lombardi, J.A. 4464 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Tillandsia crocata* (E.Morren) Baker**
Voucher: Brade, A.C. 19581 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Tillandsia didisticha* (E.Morren) Baker**
Voucher: Hatschbach, G. 15779 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia domingos-martinis* Rauh**
Referência: Rauh, W. 1991. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 79: 17.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Tillandsia dura* Baker**
Voucher: Martinelli, G. 3595 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Tillandsia duratii* Vis.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tillandsia duratii* var. *saxatilis* (Hassl.) L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 861-863.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Tillandsia elongata* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tillandsia elongata* var. *subimbricata* (Baker) L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2):773.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Tillandsia eltoniana* E.Pereira**
Voucher: Kautsky, R.A. 871 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Tillandsia fasciculata* Sw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tillandsia fasciculata* Sw. var. *fasciculata
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 946-952.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Tillandsia fendleri* Griseb.**
Distribuição: nativa; endêmica
Tillandsia fendleri* Griseb. var. *fendleri
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 696-698.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tillandsia gardneri* Lindl.**
Voucher: Sucre, D. 5416 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia geminiflora* Brongn.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tillandsia geminiflora* Brongn. var. *geminiflora
Voucher: Costa, A.F. 878 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia geminiflora* var. *incana* (Wawra) Mez**
Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 595.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia globosa* Wawra**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tillandsia globosa* var. *alba* E.Pereira**
Voucher: Araújo, L.K.C. s.n. (HB 69483)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Tillandsia globosa* Wawra var. *globosa
Voucher: Sucre, D. 3958 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia globosa* var. *major* L.B.Sm.**
Voucher: Doering, R. s.n. (SP 39949)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Tillandsia grao-mogolensis* Silveira**
Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 10012 (MBM, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Tillandsia grazielae* D.Sucre & R.Braga**
Voucher: Sucre, D. 2278 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia heubergeri* Ehlers**
Voucher: Martinelli, G. 6071 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia horstii* Rauh**
Voucher: Horst, L. s.n. (HEID)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Tillandsia itaubensis* T. Strehl**
Voucher: Strehl, T. 172 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tillandsia jonesii* T. Strehl**
Voucher: Tardivo, R.C. 288 (SP, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tillandsia juncea* (Ruiz & Pav.) Poiret**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1418 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Tillandsia kautskyi* E.Pereira**
Voucher: Kautsky, R.A. 371 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Tillandsia kegeliana* Mez**
Voucher: Lima, A. 67-4998 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica
***Tillandsia leonamiana* E.Pereira**
Voucher: Seidel, A. 668 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Tillandsia limae* L.B.Sm.**
Voucher: Lima, A. 58-3144 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Tillandsia limarum* E.Pereira**
Referência: Pereira, E. 1979. Bradea 2: 323.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Tillandsia linearis* Vell.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 4586 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia loliacea* Mart. *ex* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Sucre, D. 8956 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia lorentziana* Griseb.**
Voucher: Carneiro, C.E. 156 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia mallemontii* Glaz. *ex* Mez**
Voucher: Araújo, D.S.D. 6936 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia milagrensis* Leme**
Voucher: Nahoum, P.I. s.n. (HB 73937)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Tillandsia minasgeraisensis* Ehlers & W.Till**
Referência: Ehlers, R. & Till, W. 2008. J. Bromeliad Soc. 58(6): 245-9.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Tillandsia monadelpha* (E.Morren) Baker**
Voucher: Fernandes-da-Silva, J.B. s.n. (RB 493404)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Tillandsia montana* Reitz**
Voucher: Reitz, R. 5910 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Tillandsia neglecta* E.Pereira**
Voucher: Pereira, E. s.n. (HB 50230)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia nuptialis* R.Braga & Sucre**
Voucher: Braga, P.I.S. 1566 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia organensis* Ehlers**
Voucher: Ehlers, R. 8141 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia paraensis* Mez**
Voucher: Pontes, R.A. 129 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Tillandsia parvispica* Baker**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13258 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado
***Tillandsia pohliana* Mez**
Voucher: Martinelli, G. 15246 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia polystachia* (L.) L.**
Voucher: Forzza, R.C. 2734 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia polzii* Ehlers**
Referência: Ehlers, R. 1997. Bromelie 1997: 11.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tillandsia pruinosa* Sw.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 4052 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia pseudomontana* W.Weber & Ehlers**
Referência: Weber, W. & Ehlers, R. 1982. Feddes Repert. 94: 618.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Tillandsia reclinata* E.Pereira & Martinelli**
Voucher: Martinelli, G. 7413 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia recurvata* (L.) L.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2017 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia recurvifolia* Hook.**
Voucher: Tardivo, R.C. 435 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Tillandsia rohdenardinii* Strehl**
Referência: Strehl, T. 2004. Vidalia 2: 34.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tillandsia roseiflora* Ehlers & W.Weber**
Voucher: Martinelli, G. 10645 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia seideliana* E.Pereira**
Voucher: Seidel, A. 789 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Tillandsia setacea* Sw.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 920-922.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Tillandsia sprengeliana* Klotzsch *ex* Mez**
Voucher: Araújo, L.K.C. 3 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia streptocarpa* Baker**
Voucher: Monteiro, R.F. 12 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia stricta* Sol.**
Distribuição: nativa; endêmica

***Tillandsia stricta* var. *disticha* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 826.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
Tillandsia stricta* Sol. var. *stricta
Voucher: Martinelli, G. 15304 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia sucrei* E.Pereira**
Voucher: Sucre, D. 1715 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia tenuifolia* L.**
Voucher: Forzza, R.C. 3137 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia thiekenii* Ehlers**
Referência: Ehlers, R. 1993. J. Bromeliad Soc. 43: 151.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tillandsia toropiensis* Rauh**
Voucher: Rauh, W. 56059 (HEID)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tillandsia tricholepis* Baker**
Voucher: Brade, A.C. 20620 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, PB), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia turneri* Baker**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tillandsia turneri* var. *orientalis* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 758-759.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tillandsia usneoides* (L.) L.**
Voucher: Pontes, R.A. 240 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tillandsia winkleri* Strehl**
Referência: Strehl, T. 2000. Iheringia, Bot. 54: 28.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Tillandsia xiphioides* Ker Gawl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tillandsia xiphioides* Ker Gawl. subsp. *xiphioides
Voucher: Tardivo, R.C. 284 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Vriesea Lindl.

194 espécies (186 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 30 variedades (26 endêmicas)
***Vriesea agostiniana* E.Pereira**
Voucher: Pereira, E. 10746 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea altimontana* E.Pereira & Martinelli**
Voucher: Martinelli, G. 8747 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea altodaserrae* L.B.Sm.**
Voucher: Castellanos, A. 22367 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vriesea altomacaensis* A.F.Costa**
Voucher: Costa, A.F. 435 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea amadoi* Leme**
Voucher: Nahoum, P.I. s.n. (HB 77789)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea amethystina* E.Morren**
Voucher: Ribeiro, R. s.n. (R 199085)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea appariciana* E.Pereira & Reitz**
Voucher: Duarte, A.P. s.n. (HB 60771)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea arachnoidea* A.F.Costa**
Voucher: Costa, A.F. 425 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea atra* Mez**
Voucher: Costa, A.F. 436 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea atrococcinea* Rauh**
Voucher: Castellar, A. 11 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea atropurpurea* A.Silveira**
Voucher: Moura, R.L. 654 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Vriesea bahiana* Leme**
Voucher: Linhares, S. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vriesea barbosae* J.A.Siqueira & Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1207 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Vriesea barilletii* E.Morren**
Voucher: Seidel, A. 1950 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea belloi* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1138 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea biguassuensis* Reitz**
Voucher: Reitz, R. 4134 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Vriesea billbergioides* E.Morren *ex* Mez**
Distribuição: nativa; endêmica
***Vriesea billbergioides* var. *ampla* L.B.Sm.**
Voucher: Brade, A.C. 21157 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Vriesea billbergioides* E.Morren *ex* Mez var. *billbergioides
Voucher: Brade, A.C. 9320 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea bituminosa* Wawra**
Voucher: Costa, A.F. 440 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea blackburniana* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 5292 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Vriesea bleherae* Roth & W. Weber**
Voucher: Costa, A.F. 805 (R, SEL, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea botafogensis* Mez**
Voucher: Sucre, D. 10095 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea brassicoides* (Baker) Mez**
Voucher: Smith, L.B. 6430 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea breviscapa* (E.Pereira & I.A.Penna) Leme**
Voucher: Kolmann, J.L. 8287 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea brusquensis* Reitz**
Voucher: Hatschbach, G. 10899 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vriesea cacuminis* L.B.Sm.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12296 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Vriesea calimaniana* Leme & W.Till**
Voucher: Kautsky, R.A. 1045 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea capixabae* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 675 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea carinata* Wawra**
Distribuição: nativa; endêmica
Vriesea carinata* Wawra var. *carinata
Voucher: Martinelli, G. 15759 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vriesea carinata* var. *flavo-miniata* Leme**
Voucher: Martinelli, G. 8079 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea carinata* var. *mangaratibensis* Leme & A.F.Costa**
Voucher: Leme, E.M.C. 656 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea cearensis* L.B.Sm.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 2385 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica
***Vriesea chapadensis* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 495 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Vriesea chrysostachys* E.Morren**
Voucher: Silveira, M. 1237 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Vriesea cipoensis* O.B.C.Ribeiro et al.**
Referência: Ribeiro, O.B.C. et al. 2009. J. Bromeliad Soc. 59(1): 8.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vriesea clausseniana* (Baker) Mez**
Voucher: Silva, J.L. s.n. (RB 339025)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Vriesea colnagoi* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Kautsky, R.A. 70 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea corcovadensis* (Britten) Mez**
Voucher: Castellanos, A. 23929 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vriesea correia-araujoi* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Araújo, L.K.C. 7 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea costae* B.R. Silva & Leme**
Voucher: Cardoso, D. 155 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea crassa* Mez**
Voucher: Martinelli, G. 13259 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Vriesea croceana* Leme & G.K.Brown**
Voucher: Croce, G. s.n. (HB 84093)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea debilis* Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. 974 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea declinata* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 671 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Vriesea delicatula* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 295 (GH, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea densiflora* Mez**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 15672b (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vriesea diamantinensis* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1817 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vriesea dictyographa* Leme**
Voucher: Carvalho, L.F.N. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vriesea drepanocarpa* (Baker) Mez**
Voucher: Amorim, A.M. 777 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Vriesea duvaliana* E.Morren**
Voucher: Amorim, A.M. 782 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vriesea eltoniana* E.Pereira**
Voucher: Costa, A.F. 773 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea ensiformis* (Vell.) Beer**
Distribuição: nativa; endêmica
***Vriesea ensiformis* var. *bicolor* L.B.Sm.**
Voucher: Hoehne s.n. (SP 8629)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
Vriesea ensiformis* (Vell.) Beer var. *ensiformis
Voucher: Hatschbach, G. 6411 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vriesea erythrodactylon* E.Morren**
Distribuição: nativa; endêmica
Vriesea erythrodactylon* E.Morren var. *erythrodactylon
Voucher: Barros, F. 2038 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vriesea erythrodactylon* var. *rubropunctata* E.Pereira & Moutinho**
Voucher: Moutinho, J.L. s.n. (HB 71213)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea euclidiana* Leme & G.K.Brown**
Voucher: Leme, E.M.C. 5919 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea exaltata* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 502a (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Vriesea fabioi* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 3448 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Vriesea fenestralis* Linden & André**
Voucher: Pereira, E. 2230 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea fidelensis* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1409 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea flammea* L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 9799 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vriesea flava* A.F.Costa et al.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 2187 (R, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vriesea fluminensis* E.Pereira**
Voucher: Vieira, C.M. 305 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea fontanae* Fraga & Leme**
Voucher: Fraga, C.N. 1164 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea fontellana* Leme & G.K.Brown**
Voucher: Leme, E.M.C. 692 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea fontourae* B.R. Silva**
Voucher: Torres, E.L.L. s.n. (RB 419195)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea fosteriana* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 947 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea fradensis* A.F.Costa**
Voucher: Farney, C. 111 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea freicanecana* J.A.Siqueira & Leme**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 740 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Vriesea friburgensis* Mez**
Distribuição: nativa; endêmica
Vriesea friburgensis* Mez var. *friburgensis
Voucher: Glaziou, A.F.M. 16467 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Vriesea friburgensis* var. *paludosa* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 145 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vriesea friburgensis* var. *tucumanensis* (Mez) L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 347 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vriesea funebris* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 896 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea garlippiana* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 3582 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea gastiniana* Leme & G.K.Brown**
Voucher: Croce, G. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea gigantea* Gaudich.**
Distribuição: nativa; endêmica
Vriesea gigantea* Gaudich. var. *gigantea
Voucher: Castellanos, A. 23880 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vriesea gigantea* var. *seideliana* Roeth**
Voucher: Seidel, A. 940 (HAL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea goniorachis* (Baker) Mez**
Voucher: Braga, P.I.S. 859 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea gracilior* (L.B.Sm.) Leme**
Voucher: Foster, M.B. 267 (GH, R, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea graciliscapa* W.Weber**
Referência: Weber, W. 1986. Feddes Repert. 97: 104.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vriesea gradata* (Baker) Mez**
Distribuição: nativa; endêmica
***Vriesea gradata* var. *bicolor* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Costa, A.F. 700 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Vriesea gradata* (Baker) Mez var. *gradata
Voucher: Forzza, R.C. 1745 (ESA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea grandiflora* Leme**
Voucher: Croce, G. s.n. (HB 87018)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea guttata* Linden & André**
Voucher: Martinelli, G. 15819 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vriesea harrylutheri* Leme & G.K.Brown**
Voucher: Leme, E.M.C. 4084 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea heliconioides* (Kunth) Hook. *ex* Walp.**
Voucher: Croat, T.B. 62386 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Vriesea heterostachys* (Baker) L.B.Sm.**
Voucher: Costa, M.R. 418 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Vriesea hieroglyphica* (Carrière) E.Morren**
Distribuição: nativa; endêmica
Vriesea hieroglyphica* (Carrière) E.Morren var. *hieroglyphica
Voucher: Franco, G.A.D.C. 443 (MBM, SPF, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica
***Vriesea hieroglyphica* var. *zebrina* Ruschi**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 9110 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea hoehneana* L.B.Sm.**
Voucher: Kirizawa, M. 2852 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Vriesea hydrophora* Ule**
Voucher: Costa, A.F. 431 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea incurvata* Gaudich.**
Voucher: Sousa, V.C. 9054 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vriesea inflata* (Wawra) Wawra**
Voucher: Martinelli, G. 4625 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vriesea interrogatoria* L.B.Sm.**
Voucher: Costa, A.F. 776 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea itatiaiae* Wawra**
Voucher: Brade, A.C. 15173 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea jonesiana* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1387 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Vriesea jonghei* (K.Koch) E.Morren**
Voucher: Castellanos, A. 23983 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea joyae* E.Pereira & I.A.Penna**
Distribuição: nativa; endêmica
Vriesea joyae* E.Pereira & I.A.Penna var. *joyae
Voucher: Araújo, L.K.C. 36 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea joyae* var. *parvula* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Araújo, L.K.C. 58 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea kautskyana* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Martinelli, G. 8015 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea lancifolia* (Baker) L.B.Sm.**
Voucher: Forzza, R.C. 3879 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vriesea languida* L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 8081 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea leptantha* Harms**
Voucher: Costa, A.F. 256 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea lidicensis* Reitz**
Voucher: Reitz, R. 7581 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea limae* L.B.Sm.**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1134 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Vriesea linharesiae* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Linhares, S. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vriesea longicaulis* (Baker) Mez**
Voucher: Farney, C. 767 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Vriesea longiscapa* Ule**
Voucher: Costa, A.F. 414 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea longistaminea* C.C.Paula & Leme**
Voucher: Paula, C.C. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Vriesea lubbersii* (Baker) E.Morren**
Voucher: Costa, A.F. 426 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Vriesea macropoda* (Baker) Mez**
Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 554.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul; Mata Atlântica
***Vriesea maculosa* Mez**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 1108.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Vriesea maguirei* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 1097.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vriesea medusae* Versieux**
Referência: Versieux, L.M. 2008. Bot. J. Linn. Soc. 158(4): 713.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vriesea menescalii* E.Pereira & Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 693 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea michaelii* W.Weber**
Voucher: Bleher, A. s.n. (HAL)
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica
***Vriesea minarum* L.B.Sm.**
Voucher: Vieira, C.M. 849 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Vriesea minor* (L.B.Sm.) Leme**
Voucher: Pereira, E. 2861 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Vriesea minuta* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 2995 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vriesea mitoura* L.B.Sm.**
Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 1153.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Vriesea modesta* Mez**
Voucher: Wendt, T. 164 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea mollis* Leme**
Voucher: Araújo, L.K.C. s.n. (RB 407905)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea monacorum* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 693 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Vriesea morrenii* Wawra**
Voucher: Martinelli, G. 15499 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Vriesea muelleri* Mez**
Voucher: Martinelli, G. 15881 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vriesea multifoliata* Leme & G.K.Brown**
Voucher: Oliveira, R. s.n. (RB 495804)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea nanuzae* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1820 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vriesea neoglutinosa* Mez**
Voucher: Araújo, D.S.D. 4352 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vriesea noblickii* Martinelli & Leme**
Voucher: Noblick, L.R. 4358 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vriesea oleosa* Leme**
Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1457 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL); Mata Atlântica
***Vriesea oligantha* (Baker) Mez**
Voucher: Duarte, A.P. 1982 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Vriesea pabstii* McWilliams & L.B.Sm.**
Voucher: Smith, L.B. 15424 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica
***Vriesea paradoxa* Mez**
Voucher: Luschnath s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vriesea paraibica* Wawra**
Voucher: Costa, A.F. 804 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea paratiensis* E.Pereira**
Voucher: Costa, A.F. 464 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Vriesea pardalina* Mez**
Voucher: Kuhlmann, E. s.n. (RB 258610)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Vriesea parviflora* L.B.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 8085 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea parvula* Rauh**
Voucher: Pfister, G. s.n. (HEID)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Vriesea pastuchoffiana* Glaz.**
Voucher: Leme, E.M.C. 3134 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea pauciflora* Mez**
Voucher: Ule, E.H.G. 4048 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea pauperrima* E.Pereira**
Voucher: Forzza, R.C. 2205 (CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Vriesea penduliflora* L.B.Sm.**
Voucher: Monteiro, R.F. 22 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea pereirae* L.B.Sm.**
Voucher: Pereira, E. 2235 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea philippocoburgii* Wawra**
Voucher: Castellanos, A. 23854 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vriesea pinottii* Reitz**
Voucher: Hatschbach, G. 18453 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vriesea platynema* Gaudich.**
Voucher: Hatschbach, G. 15258 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vriesea platzmannii* E.Morren**
Voucher: Wanderley, M.G.L. 253 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vriesea plurifolia* Leme**
Voucher: Araújo, L.K.C. s.n. (HB 72850)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea poenulata* (Baker) E.Morren *ex* Mez**
Voucher: Castellanos, A. 23930 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea procera* (Mart. *ex* Schult. & Schult.f.) Wittm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Vriesea procera* var. *debilis* Mez**
Voucher: Martinelli, G. 8497 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
Vriesea procera* (Mart. *ex* Schult. & Schult.f.) Wittm. var. *procera
Voucher: Thomas, W.W. 10061 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica
***Vriesea procera* var. *rubra* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 166 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea procera* var. *tenuis* L.B.Sm.**
Voucher: Costa, A.F. 692 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea pseudoatra* Leme**
Voucher: Moura, R.L. 942 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea pseudoligantha* Philcox**
Referência: Phlicox 1992. Kew Bull. 47: 261.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Vriesea psittacina* var. *decolor* Wawra**
Voucher: Wawra II-226 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl. var. *psittacina
Voucher: Costa, A.F. 720 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea punctulata* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Araújo, L.K.C. 54 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea racinae* L.B.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 61618 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Vriesea rafaelii* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 3410 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Vriesea rastrensis* Leme**
Voucher: Seidel, A. 1088 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (SC); Mata Atlântica
***Vriesea rectifolia* Rauh**
Referência: Rauh, W. 1984. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 50: 16.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Vriesea recurvata* Gaudich.**
Voucher: Amorim, A.M. 3424 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vriesea regnellii* Mez**
Voucher: Regnell, A.F. 1799 (B, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea reitzii* Leme & A.F.Costa**
Voucher: Leme, E.M.C. 1654 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vriesea repandostachys* Leme**
Voucher: Martinelli, G. 15756 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea revoluta* B.R. Silva**
Voucher: Kautsky, R.A. 837 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea rhodostachys* L.B.Sm.**
Voucher: Santos, T.S. 4216 (CEPEC, MBM, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea roberto-seidelii* W.Weber**
Voucher: Leme, E.M.C. 835A (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vriesea rodigasiana* E.Morren**
Voucher: Marquete, R. 907 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vriesea roethii* W.Weber**
Voucher: Bleher, A. s.n. (HB 70027)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea rubra* (Ruiz & Pav.) Beer**
Voucher: Ule, E.H.G. 5615
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Vriesea rubyae* E.Pereira**
Voucher: Pereira, E. 10641 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea ruschii* L.B.Sm.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Vriesea ruschii* subsp. *leonii* Leme**
Voucher: Leoni, L.S. 1968 (GFJP, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Vriesea ruschii* L.B.Sm. subsp. *ruschii
Voucher: Foster, M.B. 799 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea sanctateresensis* Leme & L.Kollmann**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 4350 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea sandrae* Leme**
Voucher: Menescal, R. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Vriesea saundersii* (Carrière) E.Morren *ex* Mez**
Voucher: Sucre, D. 4346 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea saxicola* L.B.Sm.**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 12086 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Vriesea sazimae* Leme**
Voucher: Sazima, M. 32328 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Vriesea scalaris* E.Morren**
Distribuição: nativa; endêmica
Vriesea scalaris* E.Morren var. *scalaris
Voucher: Silva-Neto, S.J. 31 (RB, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vriesea scalaris* var. *viridis* Mez**
Referência: Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006. Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste - Biodiversidade, Conservação e suas Bromélias 361.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste; Mata Atlântica
***Vriesea sceptrum* Mez**
Voucher: Strang, H. 285 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Vriesea schunkii* Leme**
Voucher: Kautsky, R.A. 951 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea schwackeana* Mez**
Voucher: Schwacke, C.A.W. 9290 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica
***Vriesea secundiflora* Leme**
Voucher: Menescal, R. s.n. (HB 73719)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea segadas-viannae* L.B.Sm.**
Voucher: Smith, L.B. 6755 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vriesea seideliana* W.Weber**
Voucher: Costa, A.F. 526 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea serrana* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Penna, I.A. 27 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea silvana* Leme**
Voucher: Silva, E.F. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Vriesea simplex* (Vell.) Beer**
Voucher: Costa, A.F. 521 (R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea simulans* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1802 (HB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vriesea sincorana* Mez**
Voucher: Ule, E.H.G. 7131 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Caatinga, Cerrado
***Vriesea sparsiflora* L.B.Sm.**
Voucher: Costa, A.F. 352 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea stricta* L.B.Sm.**
Voucher: Versieux, L.M. 258 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Vriesea sucrei* L.B.Sm. & R.W.Read**
Voucher: Sucre, D. 3808 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea taritubensis* E.Pereira & I.A.Penna**
Distribuição: nativa; endêmica
***Vriesea taritubensis* var. *brevisepala* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Penna, I.A. 28 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
Vriesea taritubensis* E.Pereira & I.A.Penna var. *taritubensis
Voucher: Araújo, L.K.C. 37 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Vriesea teresopolitana* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 6224 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea thyrsoidea* Mez**
Voucher: Martinelli, G. 9083 (K, RB, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea tijucana* E.Pereira**
Voucher: Pereira, E. 10685 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea triangularis* Reitz**
Voucher: Reitz, R. 5828 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Vriesea triligulata* Mez**
Voucher: Costa, A.F. 370 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea unilateralis* (Baker) Mez**
Voucher: Braga, P.I.S. 855 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Vriesea vagans* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**
Voucher: Ribeiro, R. 493 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Vriesea vellozicola* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Martinelli, G. 2849 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea vidalii* L.B.Sm. & Handro**
Voucher: Vidal, J. 3267 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea vulpinoidea* L.B.Sm.**
Voucher: Foster, M.B. 356 (GH, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica
***Vriesea warmingii* E.Morren**
Voucher: Braga, J.M.A. 7383 (MBM, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea wawranea* Antoine**
Voucher: Leme, E.M.C. 1970 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Vriesea weberi* E.Pereira & I.A.Penna**
Voucher: Seidel, A. 996 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Vriesea zonata* Leme & J.A.Siqueira**
Voucher: Leme, E.M.C. 6624 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

Werauhia J.R.Grant
1 espécie (não endêmica)
***Werauhia gladioliflora* (H.Wendl.) J.R.Grant**
Referência: Grant, J.R. 1995. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 31.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Wittrockia Lindm.
6 espécies (6 endêmicas)
***Wittrockia cyathiformis* (Vell.) Leme**
Voucher: Martinelli, G. 15782 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Wittrockia gigantea* (Baker) Leme**
Voucher: Forzza, R.C. 3600 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Wittrockia paulistana* Leme**
Voucher: Silva, J.C. s.n. (HB 87009)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Wittrockia spiralipetala* Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 1071 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Wittrockia superba* Lindm.**
Voucher: Martinelli, G. 9293 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Wittrockia tenuisepala* (Leme) Leme**
Voucher: Seidel, A. 1133 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

BRUNELLIACEAE
Paula Leitman
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Brunellia Ruiz & Pav.
1 espécie (não endêmica)
***Brunellia neblinensis* Steyerm. & Cuatrec.**
Voucher: Ewel, J. 209 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

BURMANNIACEAE

Paul Maas, Hiltje Maas-van de Kamer

8 gêneros, 26 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

Apteria Nutt.

1 espécie (não endêmica)

***Apteria aphylla* (Nutt.) Barnhart *ex* Small**
Voucher: Maas, P.J.M. 12956 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Burmannia L.

12 espécies (4 endêmicas)

***Burmannia alba* Mart.**
Voucher: Smith, L.B. 9551 (HBR, NY, P, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Burmannia aprica* (Malme) Jonker**
Voucher: Ule, E.H.G. 3467 (HBG, R, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Burmannia australis* Malme**
Voucher: Ule, E.H.G. 4115 (HBG, R, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Burmannia bicolor* Mart.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 637 (BM, F, IAN, MO, NY, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Burmannia capitata* (Walter *ex* J.F.Gmel.) Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 8035 (HB, HBR, LIL, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Burmannia damazii* P.Beauv.**
Voucher: Macedo, A. 3698 (RB, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Burmannia flava* Mart.**
Voucher: Brade, A.C. 13499 (RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado

***Burmannia grandiflora* Malme**
Voucher: Malme, G.O.A. 1436 (B, G, R, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Burmannia jonkeri* Benthem & Maas**
Voucher: Irwin, H.S. 12827 (K, NY, U, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Burmannia polygaloides* Schltr.**
Voucher: Prance, G.T. 14469 (GH, IAN, K, NY, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Burmannia tenella* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 12443 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Burmannia tenera* (Malme) Jonker**
Voucher: Regnell, A.F. III-1238 p.p. (S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado

Campylosiphon Benth.

1 espécie (não endêmica)

***Campylosiphon purpurascens* Benth.**
Voucher: Spruce, R. 2492 p.p. (BM, BR, K, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Cymbocarpa Benth.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Cymbocarpa refracta* Miers**
Voucher: Reitz, R. 1851 (HBR, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cymbocarpa saccata* Sandwith**
Voucher: Prance, G.T. 11856 (INPA, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Dictyostega Miers

1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Dictyostega orobanchoides* (Hook.) Miers**
Distribuição: nativa; não endêmica

Dictyostega orobanchoides* (Hook.) Miers subsp. *orobanchoides
Voucher: Reitz, R. 1038 (HBR, RB, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Dictyostega orobanchoides* subsp. *parviflora* (Benth.) Snelders & Maas**
Voucher: Prance, G.T. 15024 (IAN, INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

Gymnosiphon Blume

7 espécies (nenhuma endêmica)

***Gymnosiphon breviflorus* Gleason**
Voucher: Maas, P.J.M. 12687 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Gymnosiphon capitatus* (Benth.) Urb.**
Voucher: Spruce, R. 2880 (BR, G, K, NY, OXF, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gymnosiphon cymosus* (Benth.) Benth. & Hook.f.**
Voucher: Prance, G.T. 11875 (INPA, MG, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Gymnosiphon divaricatus* (Benth.) Benth. & Hook.f.**
Voucher: Prance, G.T. 15354 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Gymnosiphon fimbriatus* (Benth.) Urb.**
Voucher: Spruce, R. 2930 (B, BM, BR, E, GH, NY, OXF, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gymnosiphon minutus* Snelders & Maas**
Voucher: Prance, G.T. 16162 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Gymnosiphon tenellus* (Benth.) Urb.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5275 (G, HBG, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Hexapterella Urb.
1 espécie (não endêmica)
***Hexapterella gentianoides* Urb.**
Voucher: Prance, G.T. 5071 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Miersiella Urb.
1 espécie (não endêmica)
***Miersiella umbellata* (Miers) Urb.**
Voucher: Brade, A.C. 18292 (RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

BURSERACEAE
Douglas C. Daly
7 gêneros, 100 espécies (20 endêmicas), 9 subespécies (3 endêmicas), 7 variedades (2 endêmicas)

Bursera
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Bursera simaruba* (L.) Sarg.**
Voucher: Prance, G.T. 28745 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Bursera tomentosa* Triana & Planch.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (NY, RB 34767)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Commiphora Jacq.
1 espécie (não endêmica)
***Commiphora leptophloeos* (Mart.) J.B.Gillett**
Voucher: Ducke, A. 1315 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Crepidospermum Hook.f.
4 espécies (1 endêmica)
***Crepidospermum atlanticum* Daly**
Voucher: Thomas, W.W. 11293 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Crepidospermum goudotianum* (Tul.) Triana & Planch.**
Voucher: Daly, D.C. 1477 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia
***Crepidospermum prancei* Daly**
Voucher: Prance, G.T. 22664 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Crepidospermum rhoifolium* (Benth.) Triana & Planch.**
Voucher: Prance, G.T. 11212 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia

Dacryodes Vahl
13 espécies (2 endêmicas)
***Dacryodes belemensis* Cuatrec.**
Voucher: Pires, J.M. 10-18 (MG, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dacryodes chimantensis* Steyerm. & Maguire**
Voucher: Prance, G.T. 22870 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Dacryodes cuspidata* (Cuatrec.) Daly**
Voucher: Pires, J.M. 976 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dacryodes edilsonii* Daly**
Voucher: Daly, D.C. 11921 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Dacryodes glabra* (Steyerm.) Cuatrec.**
Voucher: Miranda, F.E. 402 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Dacryodes hopkinsii* Daly**
Voucher: Daly, D.C. 4169 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dacryodes microcarpa* Cuatrec.**
Voucher: Lima, H.C. 3313 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Dacryodes negrensis* Daly & M.C.Martinez**
Voucher: Ducke, A. s.n. (NY, RB 37636)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Dacryodes nitens* Cuatrec.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6639 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Dacryodes paraensis* Cuatrec.**
Voucher: Souza, V.C. 18433 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Dacryodes peruviana* (Loes.) H.J.Lam**
Voucher: Fróes, R.L. 21430 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Dacryodes roraimensis* Cuatrec.**
Voucher: Silva, N.T. 60711 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Dacryodes sclerophylla* Cuatrec.**
Voucher: Silva, N.T. 60711 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Protium Burm.f.
65 espécies (12 endêmicas), 9 subespécies (3 endêmicas), 7 variedades (2 endêmicas)
***Protium altsonii* Sandwith**
Voucher: Plowman, T. 9490 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Protium amazonicum* (Cuatrec.) Daly**
Voucher: Prance, G.T. 10191 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia
***Protium apiculatum* Swart**
Voucher: Rosa, N.A. 1787 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Protium aracouchini* (Aubl.) Marchand**
Voucher: Prance, G.T. 8295 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Protium bahianum* Daly**
Voucher: Thomas, W.W. 6062 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Protium brasiliense* (Spreng.) Engl.**
Voucher: Santos, T.S. 331 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Protium calanense* Cuatrec.**
Voucher: Maas, P.J.M. 9242 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Protium calendulinum* Daly**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9731 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Protium carnosum* A.C.Sm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7432 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Protium carolense* Daly**
Voucher: Daly, D.C. 5574 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Protium crassipetalum* Cuatrec.**
Voucher: Campbell, D.G. P21923 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Protium crenatum* Sandwith**
Voucher: Prance, G.T. 27314 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Protium cuneatum* Swart**
Voucher: Krukoff, B.A. 8154 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Protium dawsonii* Cuatrec.**
Voucher: Irwin, H.S. 26650 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Protium decandrum* (Aubl.) Marchand**
Voucher: Plowman, T. 9506 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Protium demerarense* Swart**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1438 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Protium divaricatum* Engl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Protium divaricatum* Engl. subsp. *divaricatum
Voucher: Maas, P.J.M. 8951
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Protium divaricatum* subsp. *krukovii* (Swart) Daly**
Voucher: Daly, D.C. 4242 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Protium elegans* Engl.**
Voucher: Prance, G.T. 12128 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Protium ferrugineum* (Engl.) Engl.**
Voucher: Prance, G.T. 29731 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Protium gallosum* Daly**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10739 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Protium giganteum* Engl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Protium giganteum* var. *crassifolium* (Engl.) Daly**
Voucher: Rabelo, B.V. 3660 (HAMAB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
Protium giganteum* Engl. var. *giganteum
Voucher: Daly, D.C. 1885 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Protium glabrescens* Swart**
Voucher: Amaral, I.L. 252 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Protium glaziovii* Swart**
Voucher: Folli, D.A. 110 (CVRD, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Protium grandifolium* Engl.**
Voucher: Prance, G.T. 23834 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia
***Protium guacayanum* Cuatrec.**
Voucher: Stevenson, D.W. 897 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Protium guianense* (Aubl.) Marchand**
Voucher: Daly, D.C. 1068 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Protium hebetatum* Daly**
Voucher: Prance, G.T. 3927 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Protium heptaphyllum* (Aubl.) Marchand**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Protium heptaphyllum* subsp. *cordatum* (Huber) Daly**
Voucher: Silva, M.G. 5806 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
Protium heptaphyllum* (Aubl.) Marchand subsp. *heptaphyllum
Voucher: Rosa, N.A. 648 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica
***Protium heptaphyllum* subsp. *ulei* (Swart) Daly**
Voucher: Prance, G.T. 15675 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Protium icicariba* (DC.) Marchand**
Distribuição: nativa; endêmica
Protium icicariba* (DC.) Marchand var. *icicariba
Voucher: Lima, H.C. 1686 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Protium icicariba* var. *talmonii* Daly**
Voucher: Folli, D.A. 868 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Protium inodorum* Daly**
Voucher: Pires, J.M. 1918 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Protium kleinii* Cuatrec.**
Voucher: Moraes, P.L.R. 2104 (HBR, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Protium klugii* J.F.Macbr.**
Voucher: Prance, G.T. 23862 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Protium krukovii* Swart**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10515a (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO); Amazônia
***Protium laxiflorum* Engl.**
Voucher: Vieira, M.G. 872 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Protium leptostachyum* Cuatrec.**
Voucher: Daly, D.C. 5413 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Protium llanorum* Cuatrec.**
Voucher: Daly, D.C. 5550 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Protium meridionale* Swart**
Voucher: Rosa, N.A. 2157 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Protium morii* Daly**
Voucher: Daly, D.C. 4049 (HAMAB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Protium nitidifolium* (Cuatrec.) Daly**
Voucher: Prance, G.T. 10820 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Protium nodulosum* Swart**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10737 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Protium occultum* Daly**
Voucher: Pires, J.M. 1945 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Protium opacum* Swart**
Distribuição: nativa; não endêmica
Protium opacum* Swart subsp. *opacum
Voucher: Rosa, N.A. 738 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Protium opacum* subsp. *rabelianum* Daly**
Voucher: Daly, D.C. 3824 (HAMAB, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Protium ovatum* Engl.**
Voucher: Anderson, W.R. 36842 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Protium pallidum* Cuatrec.**
Voucher: Rosa, N.A. 2927 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Protium paniculatum* Engl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Protium paniculatum* var. *modestum* Daly**
Voucher: Plowman, T. 12620 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia
Protium paniculatum* Engl. var. *paniculatum
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10606 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Protium paniculatum* var. *riedelianum* (Engl.) Daly**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5241 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Protium peruvianum* Swart**
Voucher: Silveira, M. 594 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Protium pilosellum* Swart**
Voucher: Krukoff, B.A. 1433 (BM, F, GH, MICH, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Protium pilosissimum* Engl.**
Voucher: Thomas, W.W. 4789 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Protium pilosum* (Cuatrec.) Daly**
Voucher: Rosa, N.A. 1755 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Protium polybotryum* (Turcz.) Engl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Protium polybotryum* subsp. *blackii* (Swart) Daly**
Voucher: Silva, N.T. 2395 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
Protium polybotryum* (Turcz.) Engl. subsp. *polybotryum
Voucher: Silva, N.T. 57855 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Protium puncticulatum* J.F.Macbr.**
Voucher: Lohmann, L.G. 595 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Protium reticulatum* (Engl.) Engl.**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1066 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Protium rhynchophyllum* (Rusby)**
Voucher: Sothers, C.A. 27 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Protium robustum* (Swart) D.M.Porter**
Voucher: Prance, G.T. 22715 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Protium rubrum* Cuatrec.**
Voucher: Prance, G.T. 14803 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Protium sagotianum* Marchand**
Voucher: Freitas, M.A. 1113 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia

***Protium spruceanum* (Benth.) Engl.**
Voucher: Prance, G.T. 2808 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Protium strumosum* Daly**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5326 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Protium subserratum* (Engl.) Engl.**
Voucher: Campbell, D.G. 8603 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Protium tenuifolium* (Engl.) Engl.**
Voucher: Boom, B.M. 8686 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Protium trifoliolatum* Engl.**
Voucher: Daly, D.C. 4176 (HAMAB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Protium unifoliolatum* Engl.**
Voucher: Silveira, M. 1404
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Protium urophyllidium* Daly**
Voucher: Prance, G.T. 3268 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Protium warmingianum* Marchand**
Voucher: Carvalho, A. 6328 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Protium widgrenii* Engl.**
Voucher: Kuhlmann, M. 167 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Tetragastris Gaertn.

6 espécies (3 endêmicas)
***Tetragastris altissima* (Aubl.) Swart**
Voucher: Prance, G.T. 30302 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Tetragastris breviacuminata* Swart**
Voucher: Daly, D.C. 4072 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Tetragastris catuaba* Soares da Cunha**
Voucher: Carvalho, A.M. 4777 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Tetragastris hostmanni* (Engl.) Kuntze**
Voucher: Coêlho, L. 234 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Tetragastris occhionii* (Rizzini) Daly**
Voucher: Jardim, J.G. 2620 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Tetragastris panamensis* (Engl.) Kuntze**
Voucher: Prance, G.T. 10512 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia

Trattinnickia Willd.

9 espécies (2 endêmicas)
***Trattinnickia boliviana* (Swart) Daly**
Voucher: Daly, D.C. 4081 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste; Amazônia
***Trattinnickia burserifolia* Mart.**
Voucher: Pires, J.M. 1849 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Trattinnickia demerarae* Sandwith**
Voucher: Balée, W.L. 876 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Trattinnickia ferruginea* Kuhlm.**
Voucher: Costa 28650 (BHCB, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Trattinnickia glaziovii* Swart**
Voucher: Thomas, W.W. 4040 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Trattinnickia lancifolia* (Cuatrec.) Daly**
Voucher: Prance, G.T. 20636 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Trattinnickia mensalis* Daly**
Voucher: Spada, J. 6578 (CVRD, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Trattinnickia peruviana* Loes.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8291 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Trattinnickia rhoifolia* Willd.**
Voucher: Pires, J.M. 48858 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MS); Amazônia

CABOMBACEAE

Maria do Carmo Estanislau do Amaral
1 gênero, 4 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Cabomba Aubl.

4 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)
***Cabomba aquatica* Aubl.**
Voucher: Secco, R.S. 250 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, AL, SE), Sudeste (ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Cabomba caroliniana* A.Gray**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cabomba caroliniana* A.Gray var. *caroliniana
Voucher: Anderson, L.O. 140 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal

***Cabomba caroliniana* var. *flavida* Orgaard**
Voucher: Abreu, L.C. 367 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica
***Cabomba furcata* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Aona, L.Y.S. 96-09 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Cabomba haynesii* Wiersema**
Voucher: Hatschbach, G. 51432 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES); Mata Atlântica, Pantanal

CACTACEAE

Daniela Zappi, Nigel Taylor, Marlon Machado
37 gêneros, 233 espécies (174 endêmicas), 94 subespécies (80 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

Arrojadoa Britton & Rose

6 espécies (6 endêmicas)
***Arrojadoa bahiensis* (P.J.Braun & Esteves) N.P.Taylor & Eggli**
Voucher: Queiroz, L.P. 4384 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Arrojadoa dinae* Buining & Brederoo**
Voucher: Forzza, R.C. 2540 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Arrojadoa eriocaulis* Buining & Brederoo**
Voucher: Harley, R.M. 25518 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Arrojadoa marylanae* Soares Filho & M.Machado**
Voucher: Machado, M. 28 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Arrojadoa penicillata* (Gürke) Britton & Rose**
Voucher: Taylor, N.P. 761 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Arrojadoa rhodantha* (Gürke) Britton & Rose**
Voucher: Duarte, A.P. 9551 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

Arthrocereus A.Berger

4 espécies (4 endêmicas), 3 subespécies (3 endêmicas)
***Arthrocereus glaziovii* (K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Barreto, H.L.M. 2213 (BHMG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Arthrocereus melanurus* (K.Schum.) Diers et al.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Arthrocereus melanurus* subsp. *magnus* N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Zappi, D. 262 (CESJ, HRCB, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Arthrocereus melanurus* (K.Schum.) Diers, P.J.Braun & Esteves subsp. *melanurus
Voucher: Barreto, H.L.M. 65044 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Arthrocereus melanurus* subsp. *odorus* (Ritter) N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Zappi, D. 193 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Arthrocereus rondonianus* Backeb. & Voll**
Voucher: Harley, R.M. 26989 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Arthrocereus spinosissimus* (Buining & Brederoo) Ritter**
Voucher: Buining, H. 328 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Brasilicereus Backeb.

2 espécies (2 endêmicas)
***Brasilicereus markgrafii* Backeb. & Voll**
Voucher: Zappi, D. CFCR 9829 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Brasilicereus phaeacanthus* (Gürke) Backeb.**
Voucher: Taylor, N.P. 1570 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

Brasiliopuntia (K.Schum.) A.Berger

1 espécie (não endêmica)
***Brasiliopuntia brasiliensis* (Willd.) A.Berger**
Voucher: Zappi, D. 354 (K, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Cereus Mill.

12 espécies (9 endêmicas), 6 subespécies (4 endêmicas)
***Cereus adelmarii* (Rizzini & Mattos) P.J.Braun**
Voucher: Coimbra-Filho, A. 232053 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado, Pantanal
***Cereus albicaulis* (Britton & Rose) Luetzelb.**
Voucher: Taylor, N.P. 1376 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Cerrado
***Cereus bicolor* Rizzini & A.Mattos**
Voucher: Magalhães, L.C.S. 3 (CGMS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado
***Cereus fernambucensis* Lem.**
Distribuição: nativa; endêmica
Cereus fernambucensis* Lem. subsp. *fernambucensis
Voucher: Zappi, D. 226 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Cereus fernambucensis* subsp. *sericifer* (Ritter) N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Taylor, N.P. 781 (HRCB, MBML, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Cereus hexagonus* (L.) Mill.**
Voucher: Sanaiotti, T. 256 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia
***Cereus hildmannianus* K.Schum.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Cereus hildmannianus* K.Schum. subsp. *hildmannianus
Voucher: Zappi, D. 187 (HRCB, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cereus hildmannianus* subsp. *uruguayanus* (R.Kiesling) N.P.Taylor**
Voucher: Hunt, D.R. 25754 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa
***Cereus insularis* Hemsl.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 2222 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Cereus jamacaru* DC.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Cereus jamacaru* subsp. *calcirupicola* (F.Ritter) N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Zappi, D. CFSC 10124 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Cereus jamacaru* DC. subsp. *jamacaru
Voucher: Taylor, N.P. 1500 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga
***Cereus kroenleinii* N.P.Taylor**
Voucher: Schessl, M. 3475 (K, ULM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal
***Cereus mirabella* N.P.Taylor**
Voucher: Harley, R.M. 25513 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Cereus saddianus* (Rizzini & Mattos) P.J.Braun**
Voucher: Mattos-Filho, A. 3648 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado, Pantanal
***Cereus spegazzinii* F.A.C.Weber**
Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 42.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Cipocereus Ritter

6 espécies (6 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)
***Cipocereus bradei* (Backeb. & Voll) Zappi & N.P.Taylor**
Voucher: Zappi, D. CFCR 13235 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cipocereus crassisepalus* (Buining & Brederoo) Zappi & N.P.Taylor**
Voucher: Zappi, D. CFCR 11822 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cipocereus laniflorus* N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Zappi, D. 240 (BHCB, HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Cipocereus minensis* (Werderm.) Ritter**
Distribuição: nativa; endêmica
***Cipocereus minensis* subsp. *leiocarpus* N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Zappi, D. CFCR 13236 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Cipocereus minensis* (Werderm.) Ritter subsp. *minensis
Voucher: Rego, J.O. 850 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Cipocereus pleurocarpus* F.Ritter**
Voucher: Ritter, F. 1327 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Cipocereus pusilliflorus* (Ritter) Zappi & N.P.Taylor**
Voucher: Taylor, N.P. 1486 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Coleocephalocereus Backeb.

7 espécies (7 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas)
***Coleocephalocereus aureus* Ritter**
Voucher: Harley, R.M. 25186 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Coleocephalocereus braunii* Diers & Esteves**
Voucher: Horst, K.I. 470 (KOELN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Coleocephalocereus buxbaumianus* Buining**
Distribuição: nativa; endêmica
Coleocephalocereus buxbaumianus* Buining subsp. *buxbaumianus
Voucher: Taylor, N.P. 771 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Domínio desconhecido
***Coleocephalocereus buxbaumianus* subsp. *flavisetus* (Ritter) N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Taylor, N.P. 754 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Coleocephalocereus fluminensis* (Miq.) Backeb.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Coleocephalocereus fluminensis* subsp. *decumbens* (Ritter) N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Harley, R.M. 25403 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
Coleocephalocereus fluminensis* (Miq.) Backeb. subsp. *fluminensis
Voucher: Zappi, D. 469 (K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Coleocephalocereus goebelianus* (Vaupel) Buining**
Voucher: Taylor, N.P. 1458 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Coleocephalocereus pluricostatus* Buining & Brederoo**
Voucher: Taylor, N.P. 776 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Coleocephalocereus purpureus* (Buining & Brederoo) Ritter**
Voucher: Harley, R.M. 25532 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

Discocactus Pfeiff.

10 espécies (8 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)
***Discocactus bahiensis* Britton & Rose**
Voucher: Taylor, N.P. 1387 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga
***Discocactus catingicola* Buining & Brederoo**
Voucher: Harley, R.M. 25558 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Discocactus diersianus* Esteves**
Voucher: Pereira, E.E. 87 (KOELN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Discocactus ferricola* Buining & Brederoo**
Voucher: Horst, K.I. 195 (U)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal
***Discocactus hartmanii* (K.Schum.) Britton & Rose**
Voucher: Braun, P.J. 229 (ZSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado
***Discocactus heptacanthus* (Rodrigues) Britton & Rose**
Voucher: Ramos, J.F. 6503 (K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Discocactus horstii* Buining & Brederoo**
Voucher: Horst, K.I. 360 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Discocactus placentiformis* (Lehm.) K.Schum.**
Voucher: Zappi, D. CFCR 11297 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Discocactus pseudoinsignis* N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Zappi, D. CFCR 12045 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Discocactus zehntneri* Britton & Rose**
Distribuição: nativa; endêmica
***Discocactus zehntneri* subsp. *boomianus* (Buining & Brederoo) N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Harley, R.M. 27395 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido
Discocactus zehntneri* Britton & Rose subsp. *zehntneri
Voucher: Rose, J.N. 19779 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Echinopsis Zucc.

3 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Echinopsis calochlora* K.Schum.**
Voucher: Braun, P. 236 (ZSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal
***Echinopsis oxygona* (Link & Otto) Pfeiff. & Otto**
Voucher: s.col. s.n. (RB 200783)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Echinopsis rhodotricha* K.Schum.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Echinopsis rhodotricha* subsp. *chacoana* (Schatz) P.J.Braun & Esteves**
Voucher: Garcia, J.S. s.n. (CGMS 17590)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

Epiphyllum Haw.

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)
***Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 66-18 (IPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Domínio desconhecido
***Epiphyllum phyllanthus* (L.) Haw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Epiphyllum phyllanthus* (L.) Haw. var. *phyllanthus
Voucher: Prance, G.T. 2849
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado

Espostoopsis Buxb.

1 espécie (1 endêmica)
***Espostoopsis dybowskii* (Rol.-Goss.) Buxb.**
Voucher: Zappi, D. 125 (HRCB, SPF, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Facheiroa Britton & Rose

3 espécies (3 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)
***Facheiroa cephaliomelana* Buining & Brederoo**
Distribuição: nativa; endêmica
Facheiroa cephaliomelana* Buining & Brederoo subsp. *cephaliomelana
Voucher: Jardim, J.G. 3486 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Facheiroa cephaliomelana* subsp. *estevesii* (P.J.Braun) N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Eggli, U. 1315 (ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Facheiroa squamosa* (Gürke) P.J.Braun & Esteves**
Voucher: Taylor, N.P. 1418 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Facheiroa ulei* (Gürke) Werderm.**
Voucher: Guedes, M.L.S. 3025 (ALCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Frailea Britton & Rose

11 espécies (4 endêmicas), 6 subespécies (3 endêmicas)
***Frailea buenekeri* W.R.Abraham**
Distribuição: nativa; endêmica
Frailea buenekeri* W.R.Abraham subsp. *buenekeri
Voucher: Bueneker s.n. (KOELN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido
***Frailea buenekeri* subsp. *densispina* Hofacker & Herm.**
Voucher: Hofacker, A. 54 (PACA, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Frailea castanea* Backeb.**
Voucher: Ritter, F. 1363a (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Frailea cataphracta* (Dams) Britton & Rose**
Voucher: Horst, K.I. 376 (U, ZSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal
***Frailea curvispina* Buining & Brederoo**
Voucher: Horst, K.I. 322 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Frailea fulviseta* Buining & Brederoo**
Voucher: Horst, K.I. 353 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Frailea gracillima* (Lem.) Britton & Rose**
Distribuição: nativa; não endêmica

Frailea gracillima* (Lem.) Britton & Rose subsp. *gracillima
Referência: Hunt, D.R. et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Frailea gracillima* subsp. *horstii* (F.Ritter) P.J.Braun & Esteves**
Voucher: Horst, K.I. 1353 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Frailea mammifera* Buining & Brederoo**
Voucher: Horst, K.I. 345 (ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Frailea phaeodisca* (Speg.) Speg.**
Referência: Hunt, D.R. et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 125.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Frailea pumila* (Lem.) Britton & Rose**
Voucher: Horst, K.I. 695 (K, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Frailea pygmaea* (Speg.) Britton & Rose**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Frailea pygmaea* subsp. *albicolumnaris* (F.Ritter) Hofacker**
Voucher: Horst 1385a (U)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Pampa
Frailea pygmaea* (Speg.) Britton & Rose subsp. *pygmaea
Voucher: Ritter 1368 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Frailea schilinzkyana* (K.Schum.) Britton & Rose**
Voucher: Mottram, R. s.n. (K 74412)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Gymnocalycium Pfeiff. *ex* Mittler

4 espécies (nenhuma endêmica), 3 subespécies (1 endêmica)
***Gymnocalycium anisitsii* (K.Schum.) Britton & Rose**
Voucher: Braun, P. 230 (B, K, ZSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal
***Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. *ex* Mittler**
Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Gymnocalycium horstii* Buining**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Gymnocalycium horstii* subsp. *buenekeri* (Swales) P.J.Braun & Hofacker**
Voucher: Swales, G. 261 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa
Gymnocalycium horstii* Buining subsp. *horstii
Voucher: Horst, K.I. 79 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Gymnocalycium marsoneri* Y.Itô**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Gymnocalycium marsoneri* subsp. *matoense* (Buining & Brederoo) P.J.Braun & Esteves**
Voucher: Buining, H. 452 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Harrisia Britton

2 espécies (1 endêmica)
***Harrisia adscendens* (Gürke) Britton & Rose**
Voucher: Andrade-Lima, D. 1219 (IPA, PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Harrisia balansae* (K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Hoehne, F.C. 3858 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

Hatiora Britton & Rose

6 espécies (6 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)
***Hatiora cylindrica* Britton & Rose**
Voucher: Sant'Ana, S.C. 319 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Hatiora epiphylloides* (Porto & Werderm.) Buxb.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Hatiora epiphylloides* subsp. *bradei* (Porto & A.Cast.) Barthlott & N.P.Taylor**
Voucher: Brade, A.C. 15225 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
Hatiora epiphylloides* (Porto & Werderm.) Buxb. subsp. *epiphylloides
Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8896)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Hatiora gaertneri* (Regel) Barthlott**
Voucher: Capanema, C. s.n. (RB 8832)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hatiora herminiae* (Porto & Castell.) Backeb. *ex* Barthlott**
Voucher: Campos-Porto, P. 3361 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Hatiora rosea* (Lagerh.) Barthlott**
Voucher: Dusén, P.K.H. 8984 (NY, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Hatiora salicornioides* (Haw.) Britton & Rose**
Voucher: Zappi, D. CFCR 10849 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Hylocereus (A.Berger) Britton & Rose

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Hylocereus setaceus* (Salm-Dyck) R.Bauer**
Voucher: Taylor, N.P. 1548 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose**
Voucher: Taylor, N.P. 787 (HRCB, K, ZSS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

Leocereus Britton & Rose
1 espécie (1 endêmica)
***Leocereus bahiensis* Britton & Rose**
Voucher: Taylor, N.P. 1416 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Lepismium Pfeiff.
4 espécies (1 endêmica)
***Lepismium cruciforme* (Vell.) Miq.**
Voucher: Breier, T.B. 1133 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lepismium houlletianum* (Lem.) Barthlott**
Voucher: Martinelli, G. 4298 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Lepismium lumbricoides* (Lem.) Barthlott**
Voucher: Hatschbach, G. 72426 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lepismium warmingianum* (K.Schum.) Barthlott**
Voucher: Zappi, D. 3 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Melocactus Link & Otto
19 espécies (17 endêmicas), 13 subespécies (13 endêmicas)
***Melocactus azureus* Buining & Brederoo**
Distribuição: nativa; endêmica
Melocactus azureus* Buining & Brederoo subsp. *azureus
Voucher: Zappi, D. 139 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Melocactus azureus* subsp. *ferreophilus* (Buining & Brederoo) N.P.Taylor**
Voucher: Zappi, D. 138 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Melocactus bahiensis* (Britton & Rose) Luetzelb.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Melocactus bahiensis* subsp. *amethystinus* (Buining & Brederoo) N.P.Taylor**
Voucher: Zappi, D. CFCR 12095 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
Melocactus bahiensis* (Britton & Rose) Luetzelb. subsp. *bahiensis
Voucher: Taylor, N.P. 1582 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Melocactus braunii* Esteves**
Voucher: Pereira, E.E. 479 (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Melocactus concinnus* Buining & Brederoo**
Voucher: Zappi, D. 174 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Melocactus conoideus* Buining & Brederoo**
Voucher: Zappi, D. 179 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Melocactus deinacanthus* Buining & Brederoo**
Voucher: Zappi, D. 150 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Melocactus ernestii* Vaupel**
Distribuição: nativa; endêmica
Melocactus ernestii* Vaupel subsp. *ernestii
Voucher: Harley, R.M. 27388 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Melocactus ernestii* subsp. *longicarpus* (Buining & Brederoo) N.P.Taylor**
Voucher: Zappi, D. 163 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Melocactus estevesii* P.J.Braun**
Voucher: Pereira, E.E. 157 (K, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Melocactus glaucescens* Buining & Brederoo**
Voucher: Harley, R.M. 27393 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Melocactus lanssensianus* P.J.Braun**
Voucher: Zappi, D. 223 (HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Caatinga
***Melocactus levitestatus* Buining & Brederoo**
Voucher: Zappi, D. 155 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Melocactus neryi* K.Schum.**
Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 188.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Melocactus oreas* Miq.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Melocactus oreas* subsp. *cremnophilus* (Buining & Brederoo) P.J.Braun**
Voucher: Harley, R.M. 27385 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Melocactus oreas* Miq. subsp. *oreas
Voucher: Horst, K.I. 137 (U, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Melocactus pachyacanthus* Buining & Brederoo**
Distribuição: nativa; endêmica
Melocactus pachyacanthus* Buining & Brederoo subsp. *pachyacanthus
Voucher: Taylor, N.P. 1386 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Melocactus pachyacanthus* subsp. *viridis* N.P.Taylor**
Voucher: Zappi, D. 140 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Melocactus paucispinus* Heimen & R.J.Paul**
Voucher: Zappi, D. 144 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Melocactus salvadorensis* Werderm.**
Voucher: Harley, R.M. 25595 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Melocactus smithii* (Alexander) Buining *ex* G.D.Rowley**
Voucher: Milliken, W. 310 (E, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Melocactus violaceus* Pfeiff.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Melocactus violaceus* subsp. *margaritaceus* N.P.Taylor**
Voucher: Zappi, D. 115 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); Mata Atlântica
***Melocactus violaceus* subsp. *ritteri* N.P.Taylor**
Voucher: Zappi, D. 130 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
Melocactus violaceus* Pfeiff. subsp. *violaceus
Voucher: Pereira, O.J. 2124 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Melocactus zehntneri* (Britton & Rose) Luetzelb.**
Voucher: Taylor, N.P. 1441 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

Micranthocereus Backeb.

9 espécies (9 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)
***Micranthocereus albicephalus* (Buining & Brederoo) F.Ritter**
Voucher: Harley, R.M. 25519 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Micranthocereus auriazureus* Buining & Brederoo**
Voucher: Zappi, D. CFCR 9925 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Micranthocereus dolichospermaticus* (Buining & Brederoo) F.Ritter**
Voucher: Taylor, N.P. 1431 (BHCB, CEPEC, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Micranthocereus estevesii* (Buining & Brederoo) F.Ritter**
Voucher: Horst, K.I. 432 (U, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Micranthocereus flaviflorus* Buining & Brederoo**
Voucher: Harley, R.M. 27392 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Micranthocereus polyanthus* (Werderm.) Backeb.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Micranthocereus polyanthus* subsp. *alvini* M.Machado & Hofacker**
Voucher: Machado, M. 32 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Micranthocereus polyanthus* (Werderm.) Backeb. subsp. *polyanthus
Voucher: Zappi, D. 176 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Micranthocereus purpureus* (Gürke) F.Ritter**
Voucher: Harley, R.M. 27429 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Micranthocereus streckeri* Van Heek & Van Criek.**
Voucher: Taylor, N.P. 1415 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Micranthocereus violaciflorus* Buining**
Voucher: Taylor, N.P. 1514 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Nopalea Salm-Dyck

1 espécie (não endêmica)
***Nopalea cochenillifera* (L.) Salm-Dyck**
Voucher: Pickel, B.J. 9216 (IPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Opuntia Mill.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Opuntia dillenii* (Ker Gawl.) Haw.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 64-4267 (IPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Opuntia ficus-indica* (L.) Mill.**
Voucher: Matos-Silva, L.A. 2334 (CEPEC, K)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Opuntia monacantha* Haw.**
Voucher: Souza, V.C. 4849 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Parodia Speg.

24 espécies (11 endêmicas), 11 subespécies (7 endêmicas)
***Parodia alacriportana* Backeb. & Voll**
Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 218.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Parodia arnostiana
Voucher: Horst, K.I. 338 p.p. (U)
Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sul (RS); Pampa
***Parodia buiningii* (Buxb.) N.P.Taylor**
Voucher: Buining, H. 90 (U)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Parodia carambeiensis* Buining & Brederoo**
Voucher: Horst, K.I. 140a (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Parodia concinna* (Monv.) N.P.Taylor**
Voucher: Uebelmann, W. 77 (K, U)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul; Pampa
***Parodia crassigibba* (Ritter) N.P.Taylor**
Voucher: Horst, K.I. 1394 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Parodia erinacea* (Haw.) N.P.Taylor**
Voucher: Pedersen, T.M. 11593 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Parodia fusca* (Ritter) Hofacker & P.J.Braun**
Voucher: Horst, K.I. 1379 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Parodia haselbergii* (Haage ex Rümpler) Brandt**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Parodia haselbergii* subsp. *graessneri* (K.Schum.) Hofacker & P.J.Braun**
Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 220.
Distribuição: subespontânea; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
Parodia haselbergii* subsp. *haselbergi
Voucher: s.col. s.n. (K 000251233)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa
***Parodia herteri* (Werderm.) N.P.Taylor**
Voucher: Horst, K.I. 20 (K)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Parodia horstii* (Ritter) N.P.Taylor**
Voucher: Horst, K.I. 1269 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Parodia leninghausii* (K.Schum.) F.H.Brandt**
Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 220.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa
***Parodia linkii* (Lehm.) R.Kiesling**
Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 220.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica
***Parodia magnifica* (F.Ritter) F.H.Brandt**
Voucher: Horst, K.I. 1270 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Parodia mammulosa* (Lem.) N.P.Taylor**
Voucher: Ritter, F. 4 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Parodia mueller-melchersii* (Backeb.) N.P.Taylor**
Voucher: Abraham, W.R. 253 (KOELN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Parodia muricata* (Otto) Hofacker**
Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 221.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Parodia neohorstii* (S.Theun.) N.P.Taylor**
Voucher: Horst, K.I. 1403 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Parodia ottonis* (Lehm.) N.P.Taylor**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Parodia ottonis* subsp. *horstii* (F.Ritter) Hofacker**
Voucher: Horst, K.I. 1027c (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Parodia ottonis* (Lehm.) N.P.Taylor subsp. *ottonis
Voucher: Horst, K.I. 79 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa
***Parodia oxycostata* (Buining & Brederoo) Hofacker**
Distribuição: nativa; endêmica
***Parodia oxycostata* subsp. *gracilis* (F.Ritter) Hofacker**
Voucher: Horst, K.I. 1378 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Parodia oxycostata* (Buining & Brederoo) Hofacker subsp. *oxycostata
Voucher: Horst, K.I. 229 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Parodia rechensis* (Buining) Brandt**
Voucher: Bueneker, H. s.n. (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Parodia rudibuenekeri* (W.R.Abraham) Hofacker & P.J.Braun**
Voucher: Bueneker, H. 355 (KOELN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Parodia schumanniana* (K.Schum.) Brandt**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Parodia schumanniana* subsp. *claviceps* (F.Ritter) Hofacker**
Voucher: Horst, K.I. 1283 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Parodia schumanniana* (K.Schum.) Brandt subsp. *schumanniana
Voucher: Zappi, D. 105 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa,
Pantanal
***Parodia scopa* (Spreng.) N.P.Taylor**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Parodia scopa* subsp. *neobuenekeri* (F.Ritter) Hofacker & P.J.Braun**
Voucher: Bueneker, H. 1397 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
Parodia scopa* (Spreng.) N.P.Taylor subsp. *scopa
Voucher: Horst, K.I. 63 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Parodia scopa* subsp. *succinea* (F.Ritter) Hofacker**
Voucher: Bueneker, H. 1399 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Pereskia Mill.

7 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)
***Pereskia aculeata* Mill.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 15850 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Pereskia aureiflora* Ritter**
Voucher: Harley, R.M. 19992 (B, K, SPF, U, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Pereskia bahiensis* Gürke**
Voucher: Taylor, N.P. 1377 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Pereskia grandifolia* Haw.**
Distribuição: nativa; endêmica
Pereskia grandifolia* Haw. subsp. *grandifolia
Voucher: Taylor, N.P. 24802 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Pereskia grandifolia* subsp. *violacea* (Leuenb.) N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Taylor, N.P. 25218 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Pereskia nemorosa* Rojas Acosta**
Voucher: Langeron s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido
***Pereskia sacharosa* Griseb.**
Voucher: Moore, S. 955 (BM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Pantanal
***Pereskia stenantha* Ritter**
Voucher: Taylor, N.P. 1423 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Pilosocereus Byles & Rowley

28 espécies (25 endêmicas), 16 subespécies (16 endêmicas)
***Pilosocereus albisummus* P.J.Braun & Esteves**
Voucher: Pereira, E.E. 123 (UFG, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Pilosocereus arrabidae* (Lem.) Byles & Rowley**
Voucher: Zappi, D. 229 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Pilosocereus aureispinus* (Buining & Brederoo) Ritter**
Voucher: Zappi, D. 147 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Pilosocereus aurisetus* (Werderm.) Byles & G.D.Rowley**
Distribuição: nativa; endêmica
***Pilosocereus aurisetus* subsp. *aurilanatus* (Ritter) Zappi**
Voucher: Taylor, N.P. 24909 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Pilosocereus aurisetus* (Werderm.) Byles & G.D.Rowley subsp. *aurisetus
Voucher: Rego, J.O. 850 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pilosocereus azulensis* N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Harley, R.M. 25220 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Pilosocereus brasiliensis* (Britton & Rose) Backeb.**
Distribuição: nativa; endêmica
Pilosocereus brasiliensis* (Britton & Rose) Backeb. subsp. *brasiliensis
Voucher: Pereira, O.J. 2120 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Pilosocereus brasiliensis* subsp. *ruschianus* (Buining & Brederoo) Zappi**
Voucher: Taylor, N.P. 783 (HRCB, K, MBML, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
***Pilosocereus catingicola* (Gürke) Byles & Rowley**
Distribuição: nativa; endêmica
Pilosocereus catingicola* (Gürke) Byles & Rowley subsp. *catingicola
Voucher: Taylor, N.P. 1401 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Pilosocereus catingicola* subsp. *salvadorensis* (Werderm.) Zappi**
Voucher: Taylor, N.P. 1616 (ASE, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Pilosocereus chrysostele* (Vaupel) Byles & G.D.Rowley**
Voucher: Santos, F.A.R. 69 (ALCB, HUEFS, PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE); Caatinga
***Pilosocereus densiareolatus* F.Ritter**
Voucher: Zappi, D. 168 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Pilosocereus flavipulvinatus* (Buining & Brederoo) Ritter**
Voucher: Zappi, D. 216 (HRCB, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE); Caatinga, Cerrado
***Pilosocereus flexibilispinus* P.J.Braun & Esteves**
Voucher: Pereira, E.E. 145 (UFG, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Pilosocereus floccosus* Byles & Rowley**
Distribuição: nativa; endêmica
Pilosocereus floccosus* Byles & Rowley subsp. *floccosus
Voucher: Zappi, D. CFSC 10923 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pilosocereus floccosus* subsp. *quadricostatus* (Ritter) Zappi**
Voucher: Taylor, N.P. 25146 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pilosocereus fulvilanatus* (Buining & Brederoo) Ritter**
Distribuição: nativa; endêmica
Pilosocereus fulvilanatus* (Buining & Brederoo) Ritter subsp. *fulvilanatus
Voucher: Taylor, N.P. 1513 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pilosocereus fulvilanatus* subsp. *rosae* (P.J.Braun) Zappi**
Voucher: Horst, K.I. 546 (K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Pilosocereus glaucochrous* (Werderm.) Byles & G.D.Rowley**
Voucher: Queiroz, L.P. 4041 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Pilosocereus gounellei* (F.A.C.Weber) Byles & Rowley**
Distribuição: nativa; endêmica
Pilosocereus gounellei* (F.A.C.Weber) Byles & Rowley subsp. *gounellei
Voucher: Andrade-Lima, D. 1085 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Pilosocereus gounellei* subsp. *zehntneri* (Britton & Rose) Zappi**
Voucher: Taylor, N.P. 1455 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Pilosocereus jauruensis* (Buining & Brederoo) P.J.Braun**
Voucher: Horst-Uebelmann 454 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
***Pilosocereus machrisii* (E.Y.Dawson) Backeb.**
Voucher: Dawson 15110 (R, RSA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Pilosocereus magnificus* (Buining & Brederoo) Ritter**
Voucher: Taylor, N.P. 25533 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Pilosocereus multicostatus* Ritter**
Voucher: Taylor, N.P. 1517 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Pilosocereus oligolepis* (Vaupel) Byles & G.D.Rowley**
Voucher: Luetzelburg, P. 20406 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Pilosocereus pachycladus* F.Ritter**
Distribuição: nativa; endêmica
***Pilosocereus pachycladus* F.Ritter subsp. pachycladus**
Voucher: Zappi, D. 128 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Pilosocereus pachycladus* subsp. *pernambucoensis* (Ritter) Zappi**
Voucher: Agra, M.F. 2393 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga
***Pilosocereus parvus* (Diers & Esteves) P.J.Braun**
Voucher: Pereira, E.E. 194 (KOELN, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Pilosocereus pentaedrophorus* (Cels) Byles & Rowley**
Distribuição: nativa; endêmica

Pilosocereus pentaedrophorus* (Cels) Byles & Rowley subsp. *pentaedrophorus
Voucher: Taylor, N.P. 1633 (HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga, Mata Atlântica
***Pilosocereus pentaedrophorus* subsp. *robustus* Zappi**
Voucher: Harley, R.M. 25544 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Pilosocereus piauhyensis* (Gürke) Byles & G.D.Rowley**
Voucher: Zappi, D. 211 (HRCB, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN); Caatinga
***Pilosocereus splendidus* Ritter**
Referência: Ritter, F. 1979. Kakteen Südamerika 1: 69.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Pilosocereus tuberculatus* (Werderm.) Byles & G.D.Rowley**
Voucher: Taylor, N.P. 1623 (HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga
***Pilosocereus ulei* (K.Schum.) Byles & G.D.Rowley**
Voucher: Duarte, A.P. 12 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Pilosocereus vilaboensis* (Diers & Esteves) P.J.Braun**
Voucher: Pereira, E.E. 20 (KOELN, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Praecereus Buxb.

1 espécie (1 endêmica)
***Praecereus euchlorus* (F.A.C.Weber) N.P.Taylor**
Voucher: Piacentin, E.P. 429 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Pseudoacanthocereus F.Ritter

1 espécie (1 endêmica)
***Pseudoacanthocereus brasiliensis* (Britton & Rose) Ritter**
Voucher: Rose 20107 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

Pseudorhipsalis

1 espécie (não endêmica)
***Pseudorhipsalis ramulosa* (Salm-Dyck) Barthlott**
Voucher: Prance, G.T. 7512 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Quiabentia Britton & Rose

1 espécie (1 endêmica)
***Quiabentia zehntneri* (Britton & Rose) Britton & Rose**
Voucher: Leuenberger, B. 3078 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), S udeste (MG); Caatinga

Rhipsalis Gaertn.

32 espécies (29 endêmicas), 10 subespécies (8 endêmicas)
***Rhipsalis agudoensis* N.P.Taylor**
Voucher: Horst-Uebelmann 821 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Rhipsalis baccifera* (J.M.Muell.) Stearn**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rhipsalis baccifera* (J.M.Muell.) Stearn subsp. *baccifera
Voucher: Rocha, E.A. 404 (IPA, JPB, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, CE, PB, PE); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhipsalis baccifera* subsp. *hileiabaiana* N.P.Taylor & Barthlott**
Voucher: Hage, J.G. 695 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Rhipsalis baccifera* subsp. *shaferi* (Britton & Rose) Barthlott & N.P.Taylor**
Voucher: Aona, L.Y.S. 957 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Rhipsalis burchellii* Britton & Rose**
Voucher: Godoy, S.A.P. 727 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Rhipsalis campos-portoana* Loefgr.**
Voucher: Pôrto, C. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Rhipsalis cereoides* (Backeb. & Voll) Backeb.**
Voucher: Voll, O. s.n. (RB 10258)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Rhipsalis cereuscula* Haw.**
Voucher: Zappi, D. 2 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Rhipsalis clavata* F.A.C.Weber**
Voucher: Taylor, N.P. 1643 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Rhipsalis crispata* (Haw.) Pfeiff.**
Voucher: Zappi, D. 249 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Rhipsalis dissimilis* (G.Lindb.) K.Schum.**
Voucher: Scaramuzza, C.A.M. 461 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Rhipsalis elliptica* G.Lindb. *ex* K.Schum.**
Voucher: Taylor, N.P. 1644 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Rhipsalis ewaldiana* Barthlott & N.P.Taylor**
Voucher: Taylor, N.P. s.n. (K 000250258)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rhipsalis floccosa* Salm-Dyck *ex* Pfeiff.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Rhipsalis floccosa* Salm-Dyck *ex* Pfeiff. subsp. *floccosa
Voucher: Taylor, N.P. 1615 (ASE, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica
***Rhipsalis floccosa* subsp. *oreophila* N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Harley, R.M. 26400 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Rhipsalis floccosa* subsp. *pulvinigera* (G.Lindb.) Barthlott & N.P.Taylor**
Voucher: Zappi, D. 241 (BHCB, HRCB, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Rhipsalis grandiflora* Haw.**
Voucher: Romão, G.O. 728 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Rhipsalis hoelleri* Barthlott & N.P.Taylor**
Voucher: Orssich s.n. (BONN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Rhipsalis juengeri* Barthlott & N.P.Taylor**
Voucher: Zappi, D. 259 (CESJ, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica
***Rhipsalis lindbergiana* K.Schum.**
Voucher: Nic-Lughadha, E. 233 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Rhipsalis mesembryanthemoides* Haw.**
Voucher: Sucre, D. 10069 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rhipsalis neves-armondii* K.Schum.**
Voucher: Zappi, D. 270 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Rhipsalis oblonga* Loefgr.**
Voucher: Campos-Porto, P. 109 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Rhipsalis olivifera* N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Martinelli, G. 9038 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Rhipsalis ormindoi* N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Correia, C.M.B. 164 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rhipsalis pacheco-leonis* Loefgr.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Rhipsalis pacheco-leonis* subsp. *catenulata* (Kimnach) Barthlott & N.P.Taylor**
Voucher: Rauh, W. 67560 (BONN, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Rhipsalis pacheco-leonis* Loefgr. subsp. *pacheco-leonis
Voucher: Rose, J.N. 20707 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rhipsalis pachyptera* Pfeiff.**
Voucher: Taylor, N.P. 1649 (HRCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Rhipsalis paradoxa* (Salm-Dyck *ex* Pfeiff.) Salm-Dyck**
Distribuição: nativa; endêmica
Rhipsalis paradoxa* (Salm-Dyck *ex* Pfeiff.) Salm-Dyck subsp. *paradoxa
Voucher: Taylor, N.P. 1647 (HRCB, K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Rhipsalis paradoxa* subsp. *septentrionalis* N.P.Taylor & Barthlott**
Voucher: Uebelmann, W. 1507 (BONN, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), S udeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica
***Rhipsalis pentaptera* A.Dietr.**
Voucher: Frazão, A. s.n. (RB 7061)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Rhipsalis pilocarpa* Loefgr.**
Voucher: Souza, V.C. 9123 (ESA, HRCB, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Rhipsalis pulchra* Loefgr.**
Voucher: Mattos, J.R. 14991 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Rhipsalis puniceodiscus* G.Lindb.**
Voucher: Taylor, N.P. 1646 (HRCB, K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Rhipsalis russellii* Britton & Rose**
Voucher: Santos, T.S. 1352 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Rhipsalis sulcata* F.A.C.Weber**
Voucher: Simon s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Rhipsalis teres* (Vell.) Steud.**
Voucher: Rossi, L. 1588 (K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Rhipsalis trigona* Pfeiff.**
Voucher: Zappi, D. s.n. (SPF 85788)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Schlumbergera Lem.

6 espécies (6 endêmicas)
***Schlumbergera kautskyi* (Horobin & McMillan) N.P.Taylor**
Voucher: Kautsky, R.A. 67558 (BONN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Schlumbergera microsphaerica* (K.Schum.) Hoevel**
Voucher: Occhioni, P. 1143 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Schlumbergera opuntioides* (Loefgr. & Dusén) D.R.Hunt**
Voucher: Zappi, D. 60 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Schlumbergera orssichiana* Barthlott & McMillan**
Voucher: Serafim, H. 28 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Schlumbergera russelliana* (Hook.) Britton & Rose**
Voucher: Gardner, G. 429 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Schlumbergera truncata* (Haw.) Moran**
Voucher: Sucre, D. 3181 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Selenicereus (A.Berger) Britton & Rose
1 espécie (não endêmica)
***Selenicereus anthonyanus* (Alexander) D.R.Hunt**
Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 262.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Stephanocereus A.Berger
2 espécies (2 endêmicas)
***Stephanocereus leucostele* (Gürke) A.Berger**
Voucher: Zappi, D. 133 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Stephanocereus luetzelburgii* (Vaupel) N.P.Taylor & Eggli**
Voucher: Souza, V.C. 5252 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Strophocactus Britton & Rose
1 espécie (não endêmica)
***Strophocactus wittii* (Schum.) Britton & Rose**
Voucher: Witt s.n. (B, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Tacinga Britton & Rose
6 espécies (6 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas)
***Tacinga braunii* Esteves**
Voucher: Taylor, N.P. 760 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Tacinga funalis* Britton & Rose**
Voucher: Andrade-Lima, D. 55-2116 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga
***Tacinga inamoena* (K.Schum.) N.P.Taylor & Stuppy**
Distribuição: nativa; endêmica
Tacinga inamoena* (K.Schum.) N.P.Taylor & Stuppy subsp. *inamoena
Voucher: Zappi, D. CFCR 11973 (SPF)
Distribuição: subespontânea; endêmica;
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Tacinga inamoena* subsp. *subcylindrica* M.Machado & N.P.Taylor**
Voucher: Machado, M. 25 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Tacinga palmadora* (Britton & Rose) N.P.Taylor & Stuppy**
Voucher: Santos, F.A.R. 11 (ALCB, HUEFS, PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga
***Tacinga saxatilis* (Ritter) N.P.Taylor & Stuppy**
Distribuição: nativa; endêmica
***Tacinga saxatilis* subsp. *estevesii* (P.J.Braun) N.P.Taylor & Stuppy**
Voucher: Pereira, E.E. 191 (UFG, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
Tacinga saxatilis* (Ritter) N.P.Taylor & Stuppy subsp. *saxatilis
Voucher: Taylor, N.P. 1429 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Tacinga werneri* (Eggli) N.P.Taylor & Stuppy**
Voucher: Taylor, N.P. 1555 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

Uebelmannia Buining
3 espécies (3 endêmicas), 5 subespécies (5 endêmicas)
***Uebelmannia buiningii* Donald**
Voucher: Horst, K.I. 141 (U, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Uebelmannia gummifera* (Backeb. & Voll) Buining**
Distribuição: nativa; endêmica
Uebelmannia gummifera* (Backeb. & Voll) Buining subsp. *gummifera
Voucher: Barreto, H.L.M. s.n. (RB 64065)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Uebelmannia gummifera* subsp. *meninensis* (Buining) P.J.Braun & Esteves**
Voucher: Horst, K.I. 108 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Uebelmannia pectinifera* Buining**
Distribuição: nativa; endêmica
***Uebelmannia pectinifera* subsp. *flavispina* (Buining & Brederoo) P.J.Braun & Esteves**
Voucher: Horst, K.I. 361 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Uebelmannia pectinifera* subsp. *horrida* (P.J.Braun) P.J.Braun & Esteves**
Voucher: Horst, K.I. 550 (K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Uebelmannia pectinifera* Buining subsp. *pectinifera
Voucher: Horst, K.I. 106 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

CALCEOLARIACEAE
Vinícius Castro Souza
1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Calceolaria L.
1 espécie (não endêmica)
***Calceolaria tripartita* Ruiz & Pav.**
Voucher: Souza, V.C. 28017 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

CALYCERACEAE
Mara Angelina Galvão Magenta
2 gêneros, 4 espécies (2 endêmicas)

Acicarpha Juss.
2 espécies (1 endêmica)
***Acicarpha spathulata* R.Br.**
Voucher: Mattos, J.R. 13553 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Acicarpha tribuloides* Juss.**
Referência: Jussieu, A. 1803. Ann. Mus. Par. II/318.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Boopis Juss.
2 espécies (1 endêmica)
***Boopis bupleuroides* (Less.) C.A. Müll.**
Voucher: Mattos, J.R. 15948 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pantanal
***Boopis itatiaiae* Dusén**
Voucher: Shepherd, G.J. 97-6 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

CAMPANULACEAE
Ana Odete Santos Vieira, Silvana Aparecida Pires de Godoy
6 gêneros, 57 espécies (38 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 1 variedade (1 endêmica)

Centropogon C.Presl
Ana Odete Santos Vieira
1 espécie (não endêmica)
***Centropogon cornutus* (L.) Druce**
Voucher: Silva, M.A. 2750 (FUEL, IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Hippobroma G.Don
Ana Odete Santos Vieira
1 espécie (não endêmica)
***Hippobroma longiflora* (L.) G.Don**
Voucher: Bacellar 10 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Lobelia L.
Ana Odete Santos Vieira
22 espécies (14 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)
***Lobelia anceps* L.f.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lobelia aquatica* Cham.**
Voucher: Hunt 5784 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Lobelia brasiliensis* A.O.S.Vieira & G.J.Sheph.**
Voucher: Prance, G.T. 59034 (K, M, NY, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado
***Lobelia camporum* Pohl**
Voucher: Shepherd, G.J. 12187 (MBM, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Lobelia exaltata* Pohl**
Voucher: Vieira, A.O.S. 417 (FUEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lobelia fastigiata* Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 22038 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (DF, MS); Caatinga, Pantanal
***Lobelia fervens* Thunb.**
Referência: Lammers, T.G. 2007. World Checkl. & Bibliogr. Campanulaceae, ed. 2: 46.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lobelia fistulosa* Vell.**
Voucher: Vieira, A.O.S. 13327 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul; Cerrado, Mata Atlântica
***Lobelia glazioviana* Zahlbr.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 8148 (BR, G, LE,)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lobelia hassleri* Zahlbr.**
Voucher: Hassler, E. 8970 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido
***Lobelia hederacea* Cham.**
Voucher: Brade, A.C. 5609 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Lobelia hilaireana* (Kanitz) E.Wimm.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 54 (BPU, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Lobelia imperialis* E.Wimm.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Lobelia imperialis* var. *kanitzii* E.Wimm.**
Voucher: Semir, J. 17286 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Lobelia langeana* Dusén**
Voucher: Dusén, P.K.H. 3329 (NY, R, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Lobelia nummularioides* Cham.**
Voucher: Vieira, A.O.S. 12255 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Lobelia organensis* Gardner**
Voucher: Leite 4121 (BR, FCAB, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lobelia paranaensis* R.Braga**
Voucher: Tessmann, G. s.n. (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (PR); Mata Atlântica
***Lobelia reniformis* Cham.**
Referência: Chamisso, A. 1833. Linnaea 8: 210.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lobelia santos-limae* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 13251 (B, RB (HT), W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Lobelia stellfeldii* R.Braga**
Voucher: Stellfeld, C. 4998 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Mata Atlântica
***Lobelia thapsoidea* Schott**
Voucher: Vieira, A.O.S. 14389 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Lobelia xalapensis* Kunth**
Voucher: Hatschbach, G. 23164 (MBM, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Siphocampylus Pohl

Silvana Aparecida Pires de Godoy
27 espécies (21 endêmicas)
***Siphocampylus amoenus* Planch.**
Referência: Lemiere, C.H. 1851. Fl. Serres Jard. Eur. 6: 273.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Siphocampylus betulifolius* (Cham.) G.Don**
Referência: Don, G. 1834. Gen. Hist. 3: 703.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Siphocampylus brevidens* Regel**
Referência: Fischer, F.E.L. et al. 1868. Index Seminum (LE) 1868: 84.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Siphocampylus capribarba* E.Wimm.**
Referência: Wimmer, F.E. 1924. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 14: 254.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido
***Siphocampylus convolvulaceus* (Cham.) G.Don**
Voucher: Ferreira, G.M.P. 179 (PMSP, SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Siphocampylus corymbiferus* Pohl**
Voucher: Pires, J.M. s.n. (SPF 47289)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Siphocampylus densidentatus* E.Wimm.**
Referência: Wimmer, F.E. 1931. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 29: 79.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Siphocampylus duploserratus* Pohl**
Voucher: Godoy, S.A.P. 2001 (SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Siphocampylus eichleri* Kanitz**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1878. Fl. bras. 6(4): 148.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado
***Siphocampylus fimbriatus* Regel**
Voucher: Liebsch, D. s.n. (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica
***Siphocampylus fluminensis* (Vell.) E.Wimm.**
Voucher: Hatschbach, G. 20268 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Siphocampylus fulgens* Dombrain**
Voucher: Ribas, O.S. 866 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Siphocampylus humilis* E.Wimm.**
Referência: Engler, H.G.A. (ed.) 1953. Pflanzenr. (Engler), IV, 276b: 332.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Siphocampylus imbricatus* (Cham.) G.Don**
Voucher: Conceição, A. 1002 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Siphocampylus lauroanus* Handro & M.Kuhlm.**
Voucher: Godoy, S.A.P. 1949 (SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Siphocampylus longipedunculatus* Pohl**
Voucher: Godoy, S.A.P. 1714 (SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Siphocampylus lycioides* (Cham.) G.Don**
Voucher: Melo, E. 355 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
***Siphocampylus macropodus* (Thunb.) G.Don**
Voucher: Godoy, S.A.P. 2006 (SPFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Siphocampylus nitidus* Pohl**
Referência: Pohl, J.E. 1831. Pl. Bras. Icon. Descr. 2: 110.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Siphocampylus psilophyllus* Pohl**
Referência: Pohl, J.E. 1831. Pl. Bras. Icon. Descr. 2: 113.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Siphocampylus queluzensis* E.Wimm.**
Referência: Wimmer, E. 1935. Rev. Sudamer. Bot. 2: 91.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Siphocampylus sulfureus* E.Wimm.**
Voucher: Godoy, S.A.P. 1564 (SPFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Siphocampylus umbellatus* (Kunth) G.Don**
Voucher: Torres s.n (FUEL 23964)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica
***Siphocampylus verticillatus* (Cham.) G.Don**
Voucher: L.B. Smith & Pe. R. Reitz 14384 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Siphocampylus viscidus* E.Wimm.**
Voucher: Ule, E.H.G. 4575
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Siphocampylus warmingii* Kanitz**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1878. Fl. bras. 6(4): 148.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido
***Siphocampylus westinianus* (Thunb.) Pohl**
Voucher: Gentry, A.H. 49261 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Triodanis
Ana Odete Santos Vieira
1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)
***Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl.**
Distribuição: nativa; endêmica(?)
***Triodanis perfoliata* subsp. *biflora* (Ruiz & Pav.) Lammers**
Referência: Lammers, T.G. 2007. World Checkl. & Bibliogr. Campanulaceae 603.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Domínio desconhecido
Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. subsp. *perfoliata
Referência: Lammers, T.G. 2007. World Checkl. & Bibliogr. Campanulaceae 603.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

Wahlenbergia
Ana Odete Santos Vieira
5 espécies (3 endêmicas)
***Wahlenbergia brasiliensis* Cham.**
Voucher: Duarte, A.P. 8187 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica
***Wahlenbergia intermedia* Zahlbr.**
Referência: Zahlbruckner, A. 1900. Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 50: 518.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Wahlenbergia linarioides* (Lam.) DC.**
Voucher: Estevan, D.A. 931 (FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Wahlenbergia perrottetii* (A.DC.) Thulin**
Referência: Lammers, T.G. 2007. World Checkl. & Bibliogr. Campanulaceae 628.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); Domínio desconhecido
***Wahlenbergia schwackeana* Zahlbr.**
Referência: Lammers, T.G. 2007. World Checkl. & Bibliogr. Campanulaceae 632.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

CANELLACEAE
Ariane Luna Peixoto, Fábio de Barros
1 gênero, 4 espécies (4 endêmicas)

Cinnamodendron Endl.
4 espécies (4 endêmicas)
***Cinnamodendron axillare* Endl. *ex* Walp.**
Voucher: Paulino, R. s.n. (MO, RB 47141, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Cinnamodendron dinisii* Schwacke**
Voucher: Hatschbach, G. 1040 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica
***Cinnamodendron occhionianum* F.Barros & J.Salazar**
Voucher: Barros, F. 3080 (BH, MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Cinnamodendron sampaioanum* Occhioni**
Voucher: Occhioni, P. 711 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

CANNABACEAE
Sérgio Romaniuc Neto, Roseli B. Torres, Melanie Diniz
2 gêneros, 7 espécies (4 endêmicas)

Celtis L.
6 espécies (4 endêmicas)
***Celtis ehrenbergiana* (Klotzsch) Liebm.**
Voucher: Kuhlmann, M. 991 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Celtis fluminensis* Carauta**
Voucher: Pirani, J.R. 3257 (IAC, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Celtis iguanaea* (Jacq.) Sarg.**
Voucher: Mattos, J.R. 15696 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Celtis orthacanthos* Planch.**
Voucher: Equipe do Horto Florestal (NY, RB 55420)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Celtis pubescens* (Kunth) Spreng.**
Voucher: Souza, V.C. 11338 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Celtis spinosa* Spreng.**
Voucher: Loefgren, A. 914 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Trema Lour.
1 espécie (não endêmica)
***Trema micrantha* (L.) Blume**
Voucher: Souza, V.C. 11435 (ESA, HRCB, IAC, SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

CANNACEAE

Hiltje Maas-van de Kamer, Paul Maas
1 gênero, 4 espécies (1 endêmica)

Canna L.

4 espécies (1 endêmica)

***Canna glauca* L.**
Voucher: Drouet, F. 2312 (F, GH, R, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Canna indica* L.**
Voucher: Eiten, G. 4477 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Canna paniculata* Ruiz & Pav.**
Voucher: Dusén, P.K.H. 759 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Cerrado

***Canna pedunculata* Sims**
Voucher: Ule, E.H.G. 1384 (HBG, M, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

CAPPARACEAE

Maria Bernadete Costa-e-Silva, Xavier Cornejo, Juliana Souza Marques
19 gêneros, 56 espécies (25 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

Anisocapparis Cornejo & Iltis

Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
1 espécie (não endêmica)

***Anisocapparis speciosa* (Griseb.) Cornejo & Iltis**
Voucher: Pereira, E. 301 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Capparidastrum (DC.) Hutch.

Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
4 espécies (nenhuma endêmica)

***Capparidastrum frondosum* (Jacq.) Cornejo & Iltis**
Voucher: Fróes, R.L. 30210 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Capparidastrum macrophyllum* (Kunth) Hutch.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5788 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Capparidastrum osmanthum* (Diels) Cornejo & Iltis**
Voucher: Daly, D.C. 8467 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Capparidastrum sola* (J.F.Macbr.) Cornejo & Iltis**
Voucher: Prance, G.T. 6189 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Cleome L.

Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques
15 espécies (6 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Cleome crenopetala* DC.**
Voucher: Vidal, J. 0213 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Pampa

***Cleome dendroides* Schult. & Schult.f.**
Voucher: Kollmann, L. 6809 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cleome eosina* J.F.Macbr.**
Voucher: Hatschbach, G. 29527 (C, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Domínio desconhecido

***Cleome horrida* Mart. *ex* Schult.**
Voucher: Edwall, G. 1875 (SP, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Cleome latifolia* Vahl *ex* DC.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4070 (INPA, NY, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Cleome microcarpa* Ule**
Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 1612 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cleome parviflora* Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica

Cleome parviflora* Kunth subsp. *parviflora
Voucher: Daly, D.C. 8525 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Cleome parviflora* subsp. *psoraleaeifolia* (DC.) Iltis**
Referência: Iltis, H.H. 1978. Selbyana 4: 274.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cleome regnelli* Eichler**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6615 (RB, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Cleome rosea* Vahl *ex* DC.**
Voucher: Santos Lima, J. 404 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Cleome rutidosperma* DC.**
Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 1242 (IAN, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Cleome siliculifera* Eichler**
Voucher: Pereira, E. 2803 (PEUFR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cleome titubans* Speg.**
Voucher: Sacco, J.C. 1112 (HB, PEL, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Cleome trachycarpa* Klotzsch *ex* Eichler**
Voucher: Hatschbach, G. 41441 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Cleome virens* J.F.Macbr.**
Voucher: Silveira, M. 1099 (NY, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Cleome viridiflora* Schreb.**
Voucher: Ratter, J.A. 4940 (NY, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Cleoserrata Iltis

Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques
2 espécies (1 endêmica)
***Cleoserrata bahiana* Iltis & Costa e Silva**
Voucher: Gavilanes, M.L. 1174 (ESAL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
***Cleoserrata paludosa* (Willd. *ex* Eichler) Iltis**
Voucher: Pickel, B.J. 772 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Colicodendron Mart.

Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
3 espécies (3 endêmicas)
***Colicodendron bahianum* Cornejo & Iltis**
Voucher: Santos, T.S. 2692 (CEPEC, NY, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Colicodendron martianum* Cornejo**
Voucher: Jardim, J.G. 4754 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Colicodendron yco* Mart.**
Voucher: Laurênio, A. 262 (NY, PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga

Crateva L.

Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
1 espécie (não endêmica)
***Crateva tapia* L.**
Voucher: Berg, C.C. P19759 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Cynophalla (DC.) J.Presl

Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
6 espécies (2 endêmicas)
***Cynophalla amplissima* (Lam.) Iltis & Cornejo**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 4839 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia
***Cynophalla declinata* (Vell.) Iltis & Cornejo**
Voucher: Amorim, A.M. 3497 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Pantanal
***Cynophalla flexuosa* (L.) J.Presl**
Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 2840 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (RN, PE, SE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Cynophalla hastata* (Jacq.) J.Presl**
Voucher: Costa e Silva, M.B. 2171 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Cynophalla mattogrossensis* (Pilg.) Cornejo & Iltis**
Voucher: Robert, A. 778 (B, BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
***Cynophalla retusa* (Griseb.) Cornejo & Iltis**
Voucher: Ratter, J.A. 6069 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Dactylaena Schrad. *ex* Schult.f.

Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques
3 espécies (3 endêmicas)
***Dactylaena micrantha* Schrad. *ex* Schult.f.**
Voucher: Pickel, B.J. 3635 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga, Mata Atlântica
***Dactylaena microphylla* Eichler**
Voucher: Carvalho, A.M. 710 (CEPEC, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dactylaena pohliana* Eichler**
Voucher: Santos, T.S. 2957 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Domínio desconhecido

Gynandropsis (L.) Briq.

Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques
1 espécie (não endêmica)
***Gynandropsis gynandra* (L.) Briq.**
Voucher: Blanchet, J.S. 1032 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, BA, AL); Domínio desconhecido

Haptocarpum Ule

Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques
1 espécie (1 endêmica)
***Haptocarpum bahiense* Ule**
Voucher: Ule, E.H.G. 7245 (IPA (foto))
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Hemiscola Raf.

Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques
2 espécies (1 endêmica)
***Hemiscola aculeata* (L.) Raf.**
Voucher: Oliveira, F.C. 234 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hemiscola diffusa* (Banks *ex* DC.) Iltis**
Voucher: Queiroz, L.P. 761 (UFRN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Mesocapparis (Eichler) Cornejo & Iltis
Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
1 espécie (1 endêmica)
***Mesocapparis lineata* (Dombey *ex* Pers.) Cornejo & Iltis**
Voucher: Daly, D.C. 576 (IAN, NY, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Monilicarpa Cornejo & Iltis
Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
1 espécie (1 endêmica)
***Monilicarpa brasiliana* (Banks *ex* DC.) Cornejo & Iltis**
Voucher: Pirani, J.R. 3519 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Morisonia L.
Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
1 espécie (não endêmica)
***Morisonia oblongifolia* Britton**
Voucher: Krukoff, B.A. 5431 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Neocalyptrocalyx Hutch.
Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
5 espécies (4 endêmicas)
***Neocalyptrocalyx eichleriana* (Urb.) Iltis & Cornejo**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 6711 (B, F, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Neocalyptrocalyx grandipetala* (Maguire & Steyerm.) Cornejo & Iltis**
Voucher: Silva, N.T. 60719 (K, MO, NY, US, S, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Neocalyptrocalyx leprieurii* (Briq.) Iltis**
Voucher: Prance, G.T. 8974 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Neocalyptrocalyx longifolium* (Mart.) Cornejo & Iltis**
Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 188 (PEUFR, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga
***Neocalyptrocalyx nectarea* (Vell.) Hutch.**
Voucher: Carvalho, A.M. 6330 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Physostemon Mart.
Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques
4 espécies (2 endêmicas)
***Physostemon guianense* (Aubl.) Malme**
Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 1575 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Physostemon lanceolatum* Mart. & Zucc.**
Voucher: Gardner, G. 2395 (CGE, F, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga
***Physostemon rotundifolium* Mart. & Zucc.**
Voucher: Queiroz, L.P. 9064 (HUEFS, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Pantanal
***Physostemon tenuifolium* Mart. & Zucc.**
Voucher: Heringer, E.P. 818 (ASE, IPA, PEUFR, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga

Preslianthus Iltis & Cornejo
Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Preslianthus detonsus* (Triana & Planch.) Iltis & Cornejo**
Voucher: Daly, D.C. 4405 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Preslianthus schunkei* (J.F.Macbr.) Iltis & Cornejo**
Voucher: Rosas, A. 331 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC); Amazônia

Steriphoma Spreng.
Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
1 espécie (não endêmica)
***Steriphoma peruvianum* Spruce *ex* Eichler**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 12419a (IAN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Tarenaya J.Presl
Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Tarenaya hassleriana* (Chodat) Iltis**
Voucher: Edwall, G. 1784 (SP, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Tarenaya spinosa* (Jacq.) Raf.**
Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 1522 (PEUFR, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

CARDIOPTERIDACEAE
Bruno Machado Teles Walter, Rodrigo Duno De Stefano
2 gêneros, 9 espécies (1 endêmica)

Citronella D.Don
7 espécies (1 endêmica)
***Citronella apogon* (Griseb.) R.A.Howard**
Voucher: Hatschbach, G. 14456 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Citronella engleriana* (Loes.) R.A.Howard**
Voucher: Hatschbach, G. 32229 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Citronella gongonha* (Mart.) R.A.Howard**
Voucher: Irwin, H.S. 18214 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Citronella megaphylla* (Miers) R.A.Howard**
Voucher: Hoehne, F.C. 29752 (F, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Citronella melliodora* (Sleumer) R.A.Howard**
Voucher: Daly, D.C. 10363 (HPZ, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Citronella mucronata* (Ruiz & Pav.) D.Don**
Voucher: Landrum, L.R. 4454 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica
***Citronella paniculata* (Mart.) R.A.Howard**
Voucher: Regnell, A.F. 381 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Dendrobangia Rusby
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Dendrobangia boliviana* Rusby**
Voucher: Silva, M.B. 132 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Dendrobangia multinervia* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1084 (IAN, K, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

CARICACEAE
Eduardo Lleras
3 gêneros, 9 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

Carica L.
1 espécie (não endêmica)
***Carica papaya* L.**
Voucher: Borges, R.A.X. 16 (UB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Jacaratia A.DC.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Jacaratia corumbensis* Kuntze**
Voucher: Brazão, J.E.M. 120 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Jacaratia digitata* (Poepp. & Endl.) Solms**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10763 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Jacaratia heptaphylla* (Vell.) A.DC.**
Voucher: Barros, W.D. 236 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Jacaratia spinosa* (Aubl.) A.DC.**
Voucher: Pereira, E. 1115 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Vasconcellea A.St.-Hil.
4 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Vasconcellea glandulosa* A.DC.**
Voucher: Irwin, H.S. 11315 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Vasconcellea microcarpa* (Jacq.) A.DC.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Vasconcellea microcarpa* subsp. *heterophylla* (Poepp. & Endl.) V.M.Badillo**
Voucher: Silveira, M. 1131 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Vasconcellea monoica* (Desf.) A.DC.**
Voucher: Fonseca-Kruel, V.S. 657 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica, Cerrado
***Vasconcellea quercifolia* A.St.-Hil.**
Voucher: Pereira, B.A.S. 2262 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Cerrado

CARYOCARACEAE
Ghillean T. Prance, Herison Medeiros de Oliveira
2 gêneros, 16 espécies (3 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica)

Anthodiscus G.Mey.
4 espécies (nenhuma endêmica)
***Anthodiscus amazonicus* Gleason & A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7017 (BM, BR, F, G, IAN, INPA, K, LE, MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Anthodiscus mazarunensis* Gilly**
Voucher: Black, G.A. 48-2594 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Anthodiscus obovatus* Benth. *ex* Wittm.**
Voucher: Pires, J.M. 1010 (A, COL, IAN, INPA, NY, P, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Anthodiscus peruanus* Baill.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10662 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Caryocar L.
12 espécies (3 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica)
***Caryocar brasiliense* Cambess.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Caryocar brasiliense* Cambess. subsp. *brasiliense
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 625 (F, MPU, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado
***Caryocar brasiliense* subsp. *intermedium* (Wittm.) Prance & Freitas**
Voucher: Torrend, C. 26608 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Caryocar coriaceum* Wittm.**
Voucher: Ducke, A. 2235 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Caryocar cuneatum* Wittm.**
Voucher: Prance, G.T. 58515 (INPA, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado
***Caryocar dentatum* Gleason**
Voucher: Krukoff, B.A. 1294 (A, BM, F, G, K, MO, NY, P, S, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Caryocar edule* Casar.**
Voucher: Spada, J. 126 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Caryocar glabrum* (Aubl.) Pers.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Caryocar glabrum* (Aubl.) Pers. subsp. *glabrum
Voucher: Prance, G.T. 2740 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste; Amazônia
***Caryocar glabrum* subsp. *parviflorum* (A.C.Sm.) Prance & M.F.Silva**
Voucher: Krukoff, B.A. 6599 (A, BM, BR, F, G, K, MO, NY, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Caryocar gracile* Wittm.**
Voucher: Spruce, R. 2550 (BM, C, CGE, F, G, GH, GOET, K, LD, LE, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Caryocar microcarpum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, P, RB 17835)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado
***Caryocar montanum* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 9931 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Caryocar nuciferum* L.**
Voucher: Fróes, R.L. 23167 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Caryocar pallidum* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7011 (A,BM,F,LE,MO,NY,RB,S,U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Caryocar villosum* (Aubl.) Pers.**
Voucher: Prance, G.T. 3945 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

CARYOPHYLLACEAE

Cláudia Elena Carneiro
17 gêneros, 42 espécies (3 endêmicas)

Agrostema L.

1 espécie (não endêmica)
***Agrostema githago* L.**
Voucher: Albuquerque, E. s.n. (ICN 64309)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Arenaria L.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Arenaria groenlandica* (Retz.) Spreng.**
Voucher: Falkenberg, D.B. 5907 (FLOR, PEL)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC); Pampa
***Arenaria lanuginosa* (Michx.) Rohrb.**
Voucher: Meirelles, S.T. 316 (HUEFS, UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Cardionema A.DC.

1 espécie (não endêmica)
***Cardionema ramosissima* (Weinm.) A.Nelson & J.F.Macbr.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 260 (PEL)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Pampa, Mata Atlântica

Cerastium L.

8 espécies (nenhuma endêmica)
***Cerastium commersonianum* Ser.**
Voucher: Hatschbach, G. 22100 (HB, MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Cerastium dicrotrichum* Fenzl *ex* Rohrb.**
Voucher: Meireles 680 (HUEFS, UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Cerastium glomeratum* Thuill.**
Voucher: Souza, V.C. 997 (ESA, HRCB, SPSF,UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa
***Cerastium humifusum* Cambess.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 567 (PEL)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Cerastium mollissimum* Poir.**
Voucher: Kuhlmann s.n. (HRCB 29116)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa
***Cerastium rivulare* Cambess.**
Voucher: Hatschbach, G. 59216 (BHCB, MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, Cerrado
***Cerastium selloi* Schltdl. *ex* Rohrb.**
Voucher: Jarenkow, J.A. 2742 (PEL)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Cerastium semidecandrum* L.**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 57306)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Dianthus L.

4 espécies (nenhuma endêmica)
***Dianthus barbatus* L.**
Voucher: Beltrão, R. s.n. (SMDB 1473)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Dianthus caryophyllus* L.**
Voucher: Zanetti, G.D. s.n. (SMDB 6442)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Pampa
***Dianthus chinensis* L.**
Voucher: Santoro, J. s.n. (HRCB 29104)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Dianthus plumaris* L.**
Voucher: Marugama, T.N. s.n. (VIC 8707)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Drymaria Willd. *ex* Schult.

1 espécie (não endêmica)
***Drymaria cordata* (L.) Willd. *ex* Roem. & Schult.**
Voucher: Noblick, L.R. 4270 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

Gypsophila L.

1 espécie (não endêmica)
***Gypsophila paniculata* L.**
Voucher: Moura, 537 (HRCB, JPB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Paronychia Mill.

6 espécies (2 endêmicas)
***Paronychia brasiliana* A.DC.**
Voucher: Gomes s.n. (HB 45803, PACA 63963, PEL 1435)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Paronychia camphorosmoides* Cambess.**
Voucher: Harley, R.M. 53661 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Paronychia communis* Cambess.**
Voucher: Souza, V.C. 7188 (ESA, HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Paronychia fasciculata* Chaudhri**
Voucher: Roth, L. s.n. (CESJ 1680, HRCB 33794, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Paronychia revoluta* C.E.Carneiro & Furlan**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 32134)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Paronychia setigera* (Gillies *ex* Hook. & Arn.) F.Herm.**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 26088)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Polycarpaea Lam.

1 espécie (não endêmica)
***Polycarpaea corymbosa* (L.) Lam.**
Voucher: Miranda, E.B. 188 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Polycarpon L.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Polycarpon depressum* Nutt.**
Voucher: Pott, A. 8084 (CPAP, HRCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica
***Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (HRCB 29109, SP 23078)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado

Sagina L.

4 espécies (1 endêmica)
***Sagina apetala* Ard.**
Voucher: Handro, O. s.n. (HRCB 31522, SP 48437)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Sagina chilensis* Naudin *ex* Gay**
Voucher: Pivetta, S.J.P. 477 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Sagina humifusa* (Cambess.) Fenzl *ex* Rohrb.**
Voucher: Rau, G. s.n. (SMDB 195)
Distribuição: subespontânea; endêmica; Sul (RS); Pampa
***Sagina procumbens* L.**
Voucher: Luis, F.S.C. s.n. (SMDB 317)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Saponaria L.

1 espécie (não endêmica)
***Saponaria officinalis* L.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (HRCB 27748, SP 11773)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Silene L.

5 espécies (nenhuma endêmica)
***Silene alba* (Mill.) E.H.L.Krause**
Voucher: Camargo, O. 1422 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Silene antirrhina* L.**
Voucher: Hatschbach, G. 7275 (HB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa
***Silene armeria* L.**
Voucher: Souza, J.P. 2013 (ESA, HRCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Silene dioica* (L.) Clairv.**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 40201)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Silene gallica* L.**
Voucher: Souza, V.C. 10110 (ESA, HRCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Spergula L.
1 espécie (não endêmica)
***Spergula arvensis* L.**
Voucher: Kaczmarech, R. s.n. (HRCB 29785, UEPG 1920)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Spergularia (Pers.) J.Presl & C.Presl
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Spergularia grandis* (Pers.) Cambess.**
Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 51705)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa
***Spergularia marina* (L.) Griseb.**
Voucher: Andrade-Lima, D. 71-6534 (HRCB, IPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Stellaria L.
1 espécie (não endêmica)
***Stellaria media* (L.) Vill.**
Voucher: Harley, R.M. 28648 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

Vaccaria Wolf
1 espécie (não endêmica)
***Vaccaria pyramidata* Medik.**
Voucher: Stremel s.n. (HRCB 29782, UEPG 3851)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

CELASTRACEAE
Julio Antonio Lombardi, Milton Groppo
18 gêneros, 134 espécies (60 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica)

Anthodon Ruiz & Pav.
1 espécie (não endêmica)
***Anthodon decussatum* Ruiz & Pav.**
Voucher: Marquete, R. 1649 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Celastrus
1 espécie (não endêmica)
***Celastrus liebmanii* Standl.**
Voucher: Leoni, L.S. 7013 (GFJP, SPFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Cheiloclinium Miers
10 espécies (1 endêmica)
***Cheiloclinium anomalum* Miers**
Voucher: Lombardi, J.A. 998 (BHCB, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Cheiloclinium articulatum* (A.C.Sm.) A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8836 (A, BM, F, G, K, MICH, MO, NY, P, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia
***Cheiloclinium belizense* (Standl.) A.C.Sm.**
Voucher: Lombardi, J.A. 7628 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Cheiloclinium cognatum* (Miers) A.C.Sm.**
Voucher: Silveira, M. 1009 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Cheiloclinium gleasonianum* (A.C.Sm.) A.C.Sm.**
Voucher: Amorim, A.M. 6108 (CEPEC, HRCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Cheiloclinium hippocrateoides* (Peyr.) A.C.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 2851 (MG, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Cheiloclinium obtusum* A.C.Sm.**
Voucher: Rosas Jr., A. 282 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Cheiloclinium pedunculatum* (A.C.Sm.) A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8760 (A, BM, F, G, K, MICH, MO, NY, P, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cheiloclinium puberulum* Lombardi**
Voucher: Rosa, N.A. 1811 (MG, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Cheiloclinium serratum* (Cambess.) A.C.Sm.**
Voucher: Souza, V. 213 (CVRD, HRCB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Cuervea Miers
2 espécies (1 endêmica)
***Cuervea crenulata* Mennega**
Voucher: Heringer, E.P. 9883 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Cuervea kappleriana* (Miq.) A.C.Sm.**
Voucher: Ducke, A. 782 (F, IAN, K, MG, MO, NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

Elachyptera A.C.Sm.
4 espécies (1 endêmica)
***Elachyptera coriacea* Lombardi**
Voucher: Harley, R.M. 24221 (BHCB, K, NY, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Elachyptera festiva* (Miers) A.C.Sm.**
Voucher: Folli, D.A. 4100 (CVRD, HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Elachyptera floribunda* (Benth.) A.C.Sm.**
Voucher: Daly, D.C. 8508 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Elachyptera micrantha* (Cambess.) A.C.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 35756 (BM, C, HRB, MBM, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Fraunhofera Mart.

1 espécie (1 endêmica)
***Fraunhofera multiflora* Mart.**
Voucher: Heringer, E.P. 768 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

Goniodiscus Kuhlm.

1 espécie (1 endêmica)
***Goniodiscus elaeospermus* Kuhlm.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 116792)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Hippocratea L.

1 espécie (não endêmica)
***Hippocratea volubilis* L.**
Voucher: Jardim, J.G. 3607 (BHCB, CEPEC, HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Hylenaea Miers

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Hylenaea comosa* Miers**
Voucher: Prance, G.T. 28759 (F, GH, K, MG, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Hylenaea praecelsa* (Miers) A.C.Sm.**
Voucher: Daly, D.C. 9374 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Hylenaea unguiculata* Mennega**
Voucher: Thomas, W. 5384 (MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Maytenus Molina

48 espécies (34 endêmicas)
***Maytenus acanthophylla* Reissek**
Voucher: Silva, L.A.M. 1579 (CEPEC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
***Maytenus aquifolia* Mart.**
Voucher: Groppo, M. 1834 (SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Maytenus ardisiaefolia* Reissek**
Voucher: Collares, J.E.R. 15 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Maytenus basidentata* Reissek**
Voucher: Constantino, D. s.n. (RB 136614)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Maytenus boaria* Molina**
Voucher: Hatschbach, G. 30745 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Maytenus brasiliensis* Mart.**
Voucher: Leoni, L.S. 6056 (GFJP, SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Maytenus cassineformis* Reissek**
Voucher: Sobral, M. 4256 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Maytenus catingarum* Reissek**
Voucher: Silva, L.A. 1610 (CEPEC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Maytenus cestrifolia* Reissek**
Voucher: Martins 12348 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Maytenus communis* Reissek**
Voucher: Sucre, D. 7709 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Maytenus comocladiaeformis* Reissek**
Voucher: Sellow, F. 2088 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Maytenus dasyclada* Mart.**
Voucher: Dias, M.C. s.n. (UEC 50673)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Maytenus distichophylla* Mart. *ex* Reissek**
Voucher: Carvalho, A.M. 929 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Maytenus ebenifolia* Reissek**
Voucher: Silva, M.G. 3893 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Maytenus erythroxyla* Reissek**
Voucher: Carauta, J.P.P. 960 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Maytenus evonymoides* Reissek**
Voucher: Kuhlmann, M. 1943 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Maytenus floribunda* Reissek**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 13 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Maytenus glaucescens* Reissek**
Voucher: Sucre, D. 6731 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica
***Maytenus gonoclada* Mart.**
Voucher: Martius, C.F.P. 301 (M, F (foto))
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica
***Maytenus guianensis* Klotzsch *ex* Reissek**
Voucher: Freitas, M.A. 727 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Maytenus horrida* Reissek**
Voucher: Ratter, J.A. 2655 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Maytenus ilicifolia* Mart. *ex* Reissek**
Referência: Mabberley, D.J. 1990. Feddes Repert. 101:274.
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado, Mata Atlântica
***Maytenus imbricata* Reissek**
Voucher: Ule, E.H.G. 2467 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Maytenus krukovii* A.C.Sm.**
Voucher: Daly, D.C. 6954 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Maytenus laevis* Reissek**
Voucher: Cowan, R.S. 31244 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Maytenus laurina* Briq.**
Voucher: Spruce, R. 2284 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Maytenus littoralis* Carv.-Okano**
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 848 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Domínio desconhecido
***Maytenus longifolia* Reissek *ex* Loes.**
Voucher: Martinelli, G. 2854 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Maytenus macrocarpa* (Ruiz & Pav.) Briq.**
Voucher: Daly, D.C. 6954 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Maytenus macrophylla* Mart.**
Voucher: Hage, J.L. 237 (CEPEC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Maytenus magnifolia* Loes.**
Voucher: Daly, D.C. 10417 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Maytenus micrantha* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6596 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Maytenus myrsinoides* (Kunth) Urb.**
Voucher: Fróes, R.L. 1904 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia
***Maytenus obtusifolia* Mart.**
Voucher: Hatschbach, G. 51439 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, RN, PB), Sudeste (ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Maytenus officinalis* Mabb.**
Voucher: Hatschbach, G. 30797 (MBM, MY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido
***Maytenus opaca* Reissek**
Voucher: Harley, R.M. 22552 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Maytenus patens* Reissek**
Voucher: Santos, T.S. 3642 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Maytenus quadrangulata* (Schrad.) Loes.**
Voucher: Noblick, L.R. 502 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Maytenus radlkoferiana* Loes.**
Voucher: Sellow, F. 2218 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido
***Maytenus rigida* Mart.**
Voucher: Silva, J.S. 507 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Cerrado
***Maytenus robusta* Reissek**
Voucher: Miyagi, P.H. 637 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Maytenus rupestris* Pirani & Carv.-Okano**
Voucher: Furlan, A. CFSC 7506 (K, NY, RB, SP, SPF, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Maytenus salicifolia* Reissek**
Voucher: Lindberg, S.O. 379 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Maytenus samyedaformis* Reissek**
Voucher: Martinelli, G. 10424 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Maytenus schumanniana* Loes.**
Voucher: Barros, F. 1007 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Maytenus subalata* Reissek**
Voucher: Pôrto, C. 2784 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Maytenus truncata* Reissek**
Voucher: Araújo, A. 108 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Maytenus urbaniana* Loes.**
Voucher: Souza, V.C. 8968 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Peritassa Miers

13 espécies (7 endêmicas)
***Peritassa calypsoides* (Cambess.) A.C.Sm.**
Voucher: Lopes, M.M.M. 487 (CEPEC, HRCB, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Peritassa campestris* (Cambess.) A.C.Sm.**
Voucher: Lombardi, J.A. 4175 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica
***Peritassa dulcis* (Benth.) Miers**
Voucher: Prance, G.T. 2967 (NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado
***Peritassa flaviflora* A.C.Sm.**
Voucher: Lombardi, J.A. 3929 (BHCB, ESA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Peritassa glabra* (A.C.Sm.) Lombardi**
Voucher: Maas, P.J.M. 13311 (F, K, NY, P, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Peritassa hatschbachii* Lombardi**
Voucher: Lombardi, J.A. 7015 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Peritassa huanucana* (Loes.) A.C.Sm.**
Voucher: Pardo, M. 49 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Peritassa laevigata* (Hoffmanns. *ex* Link) A.C.Sm.**
Voucher: Thomas, W.W. 10930 (BHCB, CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Peritassa longifolia* Lombardi**
Voucher: Verveloet, R.R. 230 (BHCB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Peritassa manaoara* Lombardi**
Voucher: Vicentini, A. 789 (IAN, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Peritassa mexiae* A.C.Sm.**
Voucher: Lombardi, J.A. 1305 (BHCB, ESA, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Peritassa pruinosa* (Seem.) A. C. Sm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10894 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Peritassa sadleri* Lombardi**
Voucher: Lombardi, J.A. 5205 (BHCB, MBM, MBML, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Plenckia Reissek

2 espécies (1 endêmica)
***Plenckia bahiensis* Loes.**
Referência: Loesener, T. 1923. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 8: 535.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Plenckia populnea* Reissek**
Voucher: Groppo 635 (F, G, K, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Prionostemma Miers

1 espécie (não endêmica)
***Prionostemma aspera* (Lam.) Miers**
Voucher: Lowrie, S.R. 353 (GH, MG, MO, NY, R, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Pristimera Miers

4 espécies (1 endêmica)
***Pristimera celastroides* (Kunth) A.C.Sm.**
Voucher: Lombardi, J.A. 6950 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Cerrado
***Pristimera nervosa* (Miers) A.C.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 50695 (C, CTES, G, HRB, MA, MBM, MICH, MO, NY, S, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Pristimera sclerophylla* Lombardi**
Voucher: França, F. 5062 (HRCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga
***Pristimera tenuiflora* (Mart. *ex* Peyr.) A.C.Sm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2140 (MG, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

Salacia L.

23 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)
***Salacia amplectens* A.C.Sm.**
Voucher: Prance, G.T. 14191 (C, GH, K, NY, R, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Salacia arborea* (Schrank) Peyr.**
Voucher: Farney, C. 4341 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Salacia caloneura* A.C.Sm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 852 (MICH, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Salacia cauliflora* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8202 (BM, F, K, MICH, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Salacia cordata* (Miers) Mennega**
Voucher: Daly, D.C. 10015 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Salacia crassifolia* (Mart. *ex* Schult.) G.Don**
Voucher: Fonseca, M.L. 409 (EAC, IBGE, HRCB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado
***Salacia elliptica* (Mart. *ex* Schult.) G.Don**
Voucher: Irwin, H.S. 12060 (HB, MBM, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Salacia gigantea* Loes.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2944 (MG, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Salacia grandifolia* (Mart. *ex* Schult.) G.Don**
Voucher: Lombardi, J.A. 6851 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Salacia impressifolia* (Miers) A.C.Sm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 116 (MG, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Salacia insignis* A.C.Sm.**
Voucher: Ducke, A. 2090 (IAC, IAN, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Salacia juruana* Loes.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5867 (B†, G, K, L, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Salacia kanukuensis* A.C.Sm.**
Voucher: Souza, S.A.M. 958 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Salacia maburensis* Mennega**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 7463)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Salacia macrantha* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4547 (BM, F, K, M, MICH, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
***Salacia miqueliana* Loes.**
Voucher: Irwin, H.S. 47156 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Salacia mosenii* A.C.Sm.**
Voucher: Romero, R. 99 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
Salacia multiflora (Lam.) DC.
Distribuição: nativa; não endêmica
***Salacia multiflora* subsp. *mucronata* (Rusby) Mennega**
Voucher: Silva, M. 2587 (HRCB, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Salacia multiflora* (Lam.) DC. subsp. *multiflora
Voucher: Krukoff, B.A. 8637 (BM, F, K, MICH, MO, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Salacia negrensis* Lombardi**
Voucher: Fróes, R.L. 22909 (IAN, NY, SPF, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Salacia nemorosa* Lombardi**
Voucher: Demuner, V. 621 (BHCB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Salacia opacifolia* (J.F.Macbr.) A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4762 (BM, F, FLAS, G, K, M, MICH, MO, NY, SP, US, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Salacia solimoesensis* A.C.Sm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 2973 (MG, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Salacia ulei* Loes.**
Voucher: Amaral, I.L. 443 (MG, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Schaefferia Jacq.

1 espécie (não endêmica)
***Schaefferia argentinensis* Speg.**
Voucher: Lindeman, J.C. 1255 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

Semialarium N.Hallé

1 espécie (não endêmica)
***Semialarium paniculatum* (Mart. *ex* Schult.) N.Hallé**
Voucher: Marquete, R. 3534 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Tontelea Miers

17 espécies (8 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)
***Tontelea attenuata* Miers**
Voucher: Figueiredo, C. 712 (HRCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Tontelea congestiflora* (A.C.Sm.) A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5613 (A, BM, F, G, K, M, MICH, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Tontelea corcovadensis* (Glaz.) A.C.Sm.**
Voucher: Verveloet, R.R. 1003 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Tontelea cylindrocarpa* (A.C.Sm.) A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4559 (BM, F, G, K, MICH, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Tontelea emarginata* A.C.Sm.**
Voucher: Maguire, B. 47117 (CTES, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Tontelea fluminensis* (Peyr.) A.C.Sm.**
Voucher: Lombardi, J.A. 1545 (BHCB, ESA, HUEFS, SPF, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Tontelea lanceolata* (Miers) A.C.Sm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (BHCB, CTES, RB 20877)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Tontelea laxiflora* (Benth.) A.C.Sm.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5285 (F, K, MG, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE); Amazônia, Mata Atlântica
***Tontelea leptophylla* A.C.Sm.**
Voucher: Martinelli, G. 12063 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Tontelea martiana* (Miers) A.C.Sm.**
Voucher: Marquete, R. 289 (BHCB, HRB, IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Tontelea mauritioides* (A.C.Sm.) A.C.Sm.**
Voucher: Carvalho, A.M. 6732 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica
***Tontelea micrantha* (Mart. *ex* Schult.) A.C.Sm.**
Voucher: Hatschbach, G. 50034 (C, CTES, MBM, K, MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Tontelea miersii* (Peyr.) A.C.Sm.**
Voucher: Lombardi, J.A. 1500 (BHCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica
***Tontelea nectandrifolia* (A.C.Sm.) A.C.Sm.**
Voucher: Plowman, T. 9528 (F, MG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Tontelea ovalifolia* (Miers) A.C.Sm.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Tontelea ovalifolia* subsp. *richardii* (Peyr.) Görts & Mennega**
Referência: Mennega, A.M.W. 1992. Novon 2: 233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Tontelea petiolata* (A.C.Sm.) Mennega**
Voucher: Krukoff, B.A. 5141 (A, G, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tontelea tenuicula* (Miers) A.C.Sm.**
Voucher: Melo, M.M.R.F. 1052 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

CERATOPHYLLACEAE

Cláudia Petean Bove
1 gênero, 3 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)

Ceratophyllum L.

3 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)
***Ceratophyllum demersum* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ceratophyllum demersum* var. *apiculatum* (Cham.) Asch.**
Voucher: Glaziou 6230 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Ceratophyllum demersum* L. var. *demersum
Voucher: Bove, C.P. 1378 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
***Ceratophyllum muricatum* Cham.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ceratophyllum muricatum* subsp. *australe* (Griseb.) Les**
Voucher: Spruce, R. 1583 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Ceratophyllum submersum* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Ceratophyllum submersum* var. *echinatum* (A.Gray) Wilmot-Dear**
Referência: Wilmot-Dear, M. 1985. Kew Bull. 40: 266.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

CHLORANTHACEAE

Paula Leitman
1 gênero, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Hedyosmum Sw.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Hedyosmum brasiliense* Miq.**
Referência: Todzia, C.A. 1988. Fl. Neotrop. Monogr. 48: 1-138.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ, ES), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Hedyosmum neblinae* Todzia**
Voucher: Maguire, B. 60494 (TEX)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hedyosmum racemosum* (Ruiz & Pav.) G.Don**
Referência: Todzia, C.A. 1988. Fl. Neotrop. Monogr. 48: 1-138.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

CHRYSOBALANACEAE

Ghillean T. Prance, Cynthia Sothers
7 gêneros, 278 espécies (107 endêmicas), 17 subespécies (5 endêmicas), 16 variedades (5 endêmicas)

Acioa Aubl.

Ghillean T. Prance, Cynthia Sothers
4 espécies (1 endêmica)
***Acioa edulis* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 14015 (FHO, INPA, K, MG, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Acioa guianensis* Aubl.**
Voucher: Pires, J.M. 50490 (G, IAN, K, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Acioa schultesii* Maguire**
Voucher: Schultes, R.E. 9958 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Acioa somnolens* Maguire**
Voucher: Mota, C.D.A. s.n. (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Chrysobalanus L.

Ghillean T. Prance, Cynthia Sothers
2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)
***Chrysobalanus icaco* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Chrysobalanus icaco* L. subsp. *icaco
Voucher: Araújo, D.S.D. 2151 (GUA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Chrysobalanus venezuelanus* Prance**
Voucher: Sothers, C.A. 962 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Couepia Aubl.

Cynthia Sothers

59 espécies (29 endêmicas), 10 subespécies (4 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Couepia amaraliae* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 29261 (INPA, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia belemii* Prance**
Voucher: Belém, R.P. 3146 (CEPEC, FHO, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Couepia bernardii* Prance**
Voucher: Krukoff, B.A. 6635 (BM, BR, K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia bondarii* Prance**
Voucher: Carvalho, A.M. 3249 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Couepia bracteosa* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 20768 (FHO, INPA, K, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Couepia canomensis* (Mart.) Benth. *ex* Hook.f.**
Voucher: Souza, M.A.D. 467 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Couepia carautae* Prance**
Voucher: Spada, J.S. 031-78 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Couepia caryophylloides* Benoist**
Distribuição: nativa; não endêmica

Couepia caryophylloides* Benoist subsp. *caryophylloides
Voucher: Mori, S.A. 20044 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Couepia caryophylloides* subsp. *glabra* Prance**
Voucher: Medeiros 58 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Couepia cataractae* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, K, RB 15136, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Couepia chrysocalyx* (Poepp. & Endl.) Benth. *ex* Hook. f.**
Voucher: Monteiro, O.P. 454 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Couepia cidiana* Prance**
Voucher: Martinelli, G. 7052 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Couepia coarctata* Prance**
Voucher: Carvalho, A.M. 1106 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Couepia cognata* (Steud.) Fritsch**
Distribuição: nativa; não endêmica

Couepia cognata* (Steud.) Fritsch var. *cognata
Voucher: Fróes, R.L. 28080 (IAN, NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia dolichopoda* Prance**
Voucher: Silva, A.S.L. 452 (INPA, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia elata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, P, RB 25001, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Couepia eriantha* Spruce *ex* Hook.f.**
Voucher: Silva, M.B. 1408 (MG, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Couepia excelsa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, K, P, RB 9758, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Couepia foveolata* Prance**
Voucher: Rosa, N.A. 1713 (FHO, IAN, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia froesii* Prance**
Voucher: Fróes, R.L. 32164 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Couepia glabra* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 1494 (FHO, INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia grandiflora* (Mart. & Zucc.) Benth.**
Voucher: Amaral Jr., A. 3 (BOTU, HRCB, K, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Couepia guianensis* Aubl.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Couepia guianensis* subsp. *divaricata* (Huber) Prance**
Voucher: Pires, J.M. 51314 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Couepia guianensis* subsp. *glandulosa* (Miq.) Prance**
Voucher: Silva, N.T. 4521 (FHO, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Couepia guianensis* Aubl. subsp. *guianensis
Voucher: Prance, G.T. 14347 (FHO, INPA, K, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Couepia habrantha* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 7252 (A, F, BM, BR, IAN, K, MO, NY, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Couepia impressa* Prance**
Distribuição: nativa; endêmica

***Couepia impressa* subsp. *cabraliae* Prance**
Voucher: Belém, R.P. 2837 (CEPEC, FHO, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Couepia impressa* Prance subsp. *impressa
Voucher: Pontual, I. 66-280 (IPA, PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Couepia insignis* Fritsch**
Voucher: Amorim, A.M. 481 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Couepia joaquinae* Prance**
Voucher: Conceição, M.A. 176 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Couepia krukovii* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6208 (A, BM, BR, F, K, MO, NY, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Couepia latifolia* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 6005 (A, BM, BR, F, K, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Couepia leitaofilhoi* Prance**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 639 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Couepia longipendula* Pilg.**
Voucher: Prance, G.T. 16143 (FHO, INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Couepia longipetiolata* Prance**
Voucher: Santos, T.S. 2935 (CEPEC, FHO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Couepia macrophylla* Spruce *ex* Hook.f.**
Voucher: Silveira, M. 934 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Couepia magnoliifolia* Benth. *ex* Hook.f.**
Voucher: Prance, G.T. 20729 (FHO, G, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Couepia maguirei* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 16035 (FHO, INPA, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Couepia marleneae* Prance**
Voucher: Silva, M.F. 822 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Couepia meridionalis* Prance**
Voucher: Mosén, H. 3377 (K, LE, P, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Couepia monteclarensis* Prance**
Voucher: Farney, C. 1451 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Couepia morii* Prance**
Voucher: Mori, S.A. 21398 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Couepia multiflora* Benth.**
Voucher: Amaral, I.L. 1448 (INPA, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Couepia obovata* Ducke**
Voucher: Costa, M.A.S. 350 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Couepia ovalifolia* (Schott) Benth. *ex* Hook.f.**
Voucher: Sothers, C.A. 1534 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Couepia paraensis* (Mart. & Zucc.) Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Couepia paraensis* subsp. *cerradoana* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 58519 (F, M, MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Couepia paraensis* subsp. *glaucescens* (Spruce *ex* Hook.f.) Prance**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10527 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado
Couepia paraensis* (Mart. & Zucc.) Benth. subsp. *paraensis
Voucher: Martinelli, G. 12267 (INPA, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia
***Couepia parillo* DC.**
Voucher: Amaral, I.L. 1698 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Couepia parvifolia* Prance**
Voucher: Oliveira, C.A.L. 1713 (GUA, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Couepia pernambucensis* Prance**
Voucher: Santos, T.S. 322 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica
***Couepia racemosa* Benth. *ex* Hook.f.**
Voucher: Spruce, R. 2322 (G, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Couepia rankiniae* Prance**
Voucher: Oliveira, A.A. 433 (INPA, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Couepia reflexa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, K, NY, P, RB 19757, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Couepia robusta* Huber**
Voucher: Sothers, C.A. 171 (INPA, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Couepia rufa* Ducke**
Voucher: Carvalho, A.M. 6477 (CEPEC, G, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Couepia schottii* Fritsch**
Voucher: Spada, J.S. 148 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Couepia spicata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, NY, P, RB 25002, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Couepia stipularis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (G, INPA, K, NY, P, RB 35583, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Couepia subcordata* Benth. *ex* Hook.f.**
Voucher: Lleras, E. P17392 (FHO, INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Couepia trapezioana* Cuatrec.**
Voucher: Pires, J.M. 315 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Couepia uiti* (Mart. & Zucc.) Benth. *ex* Hook.f.**
Voucher: Prance, G.T. 26302 (CEN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Couepia ulei* Pilg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5547 (G, INPA, K, L, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Couepia venosa* Prance**
Voucher: Martinelli, G. 11935 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Couepia williamsii* J.F.Macbr.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10599 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Exellodendron Prance

Ghillean T. Prance, Cynthia Sothers

5 espécies (3 endêmicas)

***Exellodendron barbatum* (Ducke) Prance**
Voucher: Ducke, A. s.n. (F, NY, P, R, RB 16385)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Exellodendron cordatum* (Hook.f.) Prance**
Voucher: Pereira, B.A.S. 1612 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Exellodendron coriaceum* (Benth.) Prance**
Voucher: Prance, G.T. 24216 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Exellodendron gardneri* (Hook.f.) Prance**
Voucher: Anderson, W.R. 6873 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Exellodendron gracile* (Kuhlm.) Prance**
Voucher: Martinelli, G. 2189 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Hirtella L.

Ghillean T. Prance, Cynthia Sothers

68 espécies (28 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)

***Hirtella angustifolia* Schott *ex* Spreng.**
Voucher: Mattos, J.R. 9184 (K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Cerrado

***Hirtella araguariensis* Prance**
Voucher: Pires, J.M. 51537 (IAN, INPA, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Hirtella arenosa* Prance**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8257 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Hirtella bahiensis* Prance**
Voucher: Belém, R.P. 2756 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hirtella barnebyi* Prance**
Voucher: Cordeiro, M.R. 703 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Hirtella barrosoi* Prance**
Voucher: Equipe do Horto Florestal s.n. (NY, RB 136922)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hirtella bicornis* Mart. & Zucc.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Hirtella bicornis* Mart. & Zucc. var. *bicornis
Voucher: Amaral, I.L. 1022 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Hirtella bicornis* var. *pubescens* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, MG 15299, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Hirtella brachystachya* Spruce *ex* Hook.f.**
Voucher: Spruce, R. 2268 (BM, BR, C, CGE, GH, GOET, LD, LE, NY, OXF, P, RB, TCD, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hirtella bullata* Benth.**
Voucher: Pires, J.M. 16939 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Hirtella burchellii* Britton**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10430 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Hirtella ciliata* Mart. & Zucc.**
Voucher: Hatschbach, G. 50541 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Hirtella conduplicata* Prance**
Voucher: Albuquerque, B.A. 887 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hirtella corymbosa* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Mori, S.A. 10470 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hirtella couepiiflora* Prance**
Voucher: Irwin, H.S. 17367 (IAN, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Hirtella davisii* Sandwith**
Voucher: Daly, D.C. 259 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Hirtella dorvalii* Prance**
Voucher: Ducke, A. 1330 (A, IAN, MG, NY, R, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Hirtella duckei* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, MG 6756, P, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Hirtella elongata* Mart. & Zucc.**
Voucher: Amaral, I.L. 39 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Hirtella eriandra* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 15134 (FHO, INPA, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Hirtella excelsa* Standl. *ex* Prance**
Voucher: Krukoff, B.A. 4786 (A, BM, F, FI, K, MICH, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Hirtella fasciculata* Prance**
Voucher: Rodrigues, W.A. 5947 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Hirtella floribunda* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Badini, J. 3236 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hirtella glabrata* Pilg.**
Voucher: Prance, G.T. 23508 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Hirtella glandistipula* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 15057, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Hirtella glandulosa* Spreng.**
Voucher: Cavalcante, P.B. 3373 (FHO, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Hirtella glaziovii* Taub.**
Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (NY, SP 1119)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Hirtella gracilipes* (Hook.f.) Prance**
Voucher: Harley, R.M. 21649 (K, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hirtella guainiae* Spruce *ex* Hook.f.**
Voucher: Prance, G.T. 6008 (F, INPA, K, P, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Hirtella hebeclada* Moric. *ex* DC.**
Voucher: Pirani, J.R. 372 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica
***Hirtella hispidula* Miq.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12696 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Hirtella hoehnei* Pilg.**
Voucher: Shepherd, G.J. 7443 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado, Amazônia
***Hirtella insignis* Briq. *ex* Prance**
Voucher: Thomas, W.W. 8923 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Hirtella juruensis* Pilg.**
Voucher: Hoehne, F.C. 1809 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido
***Hirtella kuhlmannii* Pilg.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 1990 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Hirtella lancifolia* Ducke**
Voucher: Sperling, C.R. 6327 (MG, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Hirtella longifolia* Benth. *ex* Hook.f.**
Voucher: Spruce, R. 2904 (BM, BR, CGE, OXF, P, TCD, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hirtella longipedicellata* Prance**
Voucher: Weber, A.C. 1704 (HUAM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hirtella macrophylla* Benth. *ex* Hook.f.**
Voucher: Rosa, N.A. 3607 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Hirtella magnifolia* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 23974 (FHO, INPA, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hirtella martiana* Hook.f.**
Voucher: Ganev, W. 1070 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Hirtella mucronata* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 3653 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hirtella myrmecophila* Pilg.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 1899 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Hirtella obidensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17113)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Hirtella paniculata* Sw.**
Voucher: Cavalcante, P.B. 2477 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Hirtella paraensis* Prance**
Voucher: Tavares, A.S. 218 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Hirtella parviunguis* Prance**
Voucher: Santos, T.S. 1512 (CEPEC, FHO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Hirtella physophora* Mart. & Zucc.**
Voucher: Mota, C.D.A. 1131 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Hirtella pilosissima* Mart. & Zucc.**
Voucher: Rosa, N.A. 3651 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Hirtella pimichina* Lasser & Maguire**
Voucher: Fróes, R.L. 29118 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hirtella piresii* Prance**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10203 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Hirtella punctillata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15044)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Hirtella racemosa* Lam.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Hirtella racemosa* var. *hexandra* (Willd. *ex* Roem. & Schult.) Prance**
Voucher: Daly, D.C. 8871 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Hirtella racemosa* var. *hispida* Prance**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5847 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
Hirtella racemosa* Lam. var. *racemosa
Voucher: Lima, L. 247 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Hirtella radamii* Prance**
Voucher: Silva, J.C. 100 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Hirtella rasa* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5525 (NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Hirtella rodriguesii* Prance**
Voucher: Rodrigues, W.A. 6735 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Hirtella santosii* Prance**
Voucher: Santos, T.S. 300 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hirtella scaberula* Spruce *ex* Hook.f.**
Voucher: Spruce, R. 2418 (BM, BR, CGE, K, OXF, P, TCD, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hirtella scabra* Benth.**
Voucher: Prance, G.T. 29721 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hirtella schultesii* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 15820 (FHO, INPA, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hirtella sprucei* Benth. *ex* Hook.f.**
Voucher: Santos, T.S. 570 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Hirtella subglanduligera* Pilg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 9414 (L, MG, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Hirtella subscandens* Spruce *ex* Hook.f.**
Voucher: Prance, G.T. 15604 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Hirtella suffulta* Prance**
Voucher: Pires, J.M. 6943 (IAN, NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Hirtella tentaculata* Poepp.**
Voucher: Silva, N.T. 2170 (BISH, IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Hirtella tenuifolia* Prance**
Voucher: Daly, D.C. 681 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Hirtella tocantina* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16274, P, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Hirtella triandra* Sw.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Hirtella triandra* subsp. *punctulata* (Miq.) Prance**
Voucher: Sucre, D. 5730 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
Hirtella triandra* Sw. subsp. *triandra
Voucher: Hage, J.L. 564 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Hirtella ulei* Pilg.**
Voucher: Ule, E.H.G. 6150 (HBG, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Licania Aubl.

Ghillean T. Prance, Cynthia Sothers
125 espécies (40 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica), 10 variedades (5 endêmicas)
***Licania adolphoduckei* Prance**
Voucher: Ducke, A. 488 (IAN, K, MO, R, RB, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania affinis* Fritsch**
Voucher: Black, G.A. 50-9808 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Licania alba* (Bernoulli) Cuatrec.**
Voucher: Mori, S.A. 17547 (MG, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Licania amapaensis* Prance**
Voucher: Pires, J.M. 51198 (IAN, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Licania angustata* Prance**
Voucher: Krukoff, B.A. 8445 (A, BM, BR, F, K, LA, LE, MO, NY, P, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania anneae* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 25652 (AAU, FHO, K, MG, MO, NY, P, RB, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Licania apetala* (E.Mey.) Fritsch**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Licania apetala* var. *aperta* (Benth.) Prance**
Voucher: Prance, G.T. 2962 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
Licania apetala* (E.Mey.) Fritsch var. *apetala
Voucher: Daly, D.C. 8360 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado
***Licania apiculata* Prance**
Voucher: Rodrigues, W.A. 3970 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania aracaensis* Prance**
Voucher: Pires, J.M. 15027 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania arachnoidea* Fanshawe & Maguire**
Voucher: Fróes, R.L. 20910 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania araneosa* Taub.**
Voucher: Irwin, H.S. 18229 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado
***Licania arborea* Seem.**
Voucher: Lima, J. 231 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Licania arianeae* Prance**
Voucher: Folli, D.A. 228 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Licania bahiensis* Prance**
Voucher: Velloso, H.P. 736 (NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Licania belemii* Prance**
Voucher: Belém, R.P. 3211 (NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Licania bellingtonii* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 7000 (INPA, NY, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Licania blackii* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 58989 (NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Licania bracteata* Prance**
Voucher: Ducke, A. 293 (A, F, IAN, K, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Licania brittoniana* Fritsch**
Voucher: Daly, D.C. 7890 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Licania canescens* Benoist**
Voucher: Prance, G.T. 12227 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica
***Licania caudata* Prance**
Voucher: Coêlho, D. s.n. (INPA 3946, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Licania cidii* Prance**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8352 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania conferruminata* Prance**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9032 (CAS, INPA, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Licania cordata* Prance**
Voucher: Pipoly, J.J. 6780 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania coriacea* Benth.**
Voucher: Sothers, C.A. 1029 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Licania crassivenia* Spruce *ex* Hook.f.**
Voucher: Spruce, R. 2678 (BM, BR, CGE, K, OXF, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania cymosa* Fritsch**
Voucher: Mattos, L.A. 1136 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Licania davillaefolia* Benoist**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6737 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Licania davillifolia* Benoist**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 6737 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Licania dealbata* Hook.f.**
Voucher: Hatschbach, G. 64582 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Licania densiflora* Kleinhoonte**
Voucher: Prance, G.T. 10492 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia
***Licania discolor* Pilg.**
Voucher: Rosa, N.A. 3120 (FHO, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Licania divaricata* Benth.**
Voucher: Fróes, R.L. 31898
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Licania egleri* Prance**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 727 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Licania elliptica* Standl.**
Voucher: Prance, G.T. 15026 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Licania emarginata* Spruce *ex* Hook.f.**
Voucher: Spruce, R. 2699 (BM, BR, CGE, F, GH, GOET, LD, LE, NY, OXF, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania ferreirae* Prance**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8442 (CAS, INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania fritschii* Prance**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 35564)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Licania gardneri* (Hook.f.) Fritsch**
Voucher: Hatschbach, G. 33215 (MBM, NY, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Licania glabriflora* Prance**
Voucher: Rosa, N.A. 1165 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Licania glazioviana* Warm.**
Voucher: Duarte, A.P. 4839 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Licania gracilipes* Taub.**
Voucher: Prance, G.T. 17948 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia
***Licania granvillei* Prance**
Voucher: Silva, N.T. 60697 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania guianensis* (Aubl.) Griseb.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 8940 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Licania harlingii* Prance**
Voucher: Silveira, M. 935 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Licania hebantha* Mart. *ex* Hook.f.**
Voucher: Rodrigues, W.A. 10501 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania heteromorpha* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Licania heteromorpha* var. *glabra* (Mart. *ex* Hook.f.) Prance**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10383 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); Amazônia
Licania heteromorpha* Benth. var. *heteromorpha
Voucher: Daly, D.C. 7041 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Licania heteromorpha* var. *revoluta* Prance**
Voucher: Nelson, B.W. 1058 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania heteromorpha* var. *subcordata* Fritsch**
Voucher: Farney, C. 1809 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania hirsuta* Prance**
Voucher: Silva, N.T. 2096 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); Amazônia

***Licania hoehnei* Pilg.**
Voucher: Prance, G.T. 19161 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Licania humilis* Cham. & Schltdl.**
Voucher: Silva, M.G. 5026 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Licania hypoleuca* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Licania hypoleuca* var. *foveolata* Prance**
Voucher: Rodrigues, W.A. 8319 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Licania hypoleuca* Benth. var. *hypoleuca
Voucher: Oliveira, C.A.L. 1484 (GUA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Licania impressa* Prance**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 25032)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Licania incana* Aubl.**
Voucher: Prance, G.T. 29037 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Licania indurata* Pilg.**
Voucher: Góes, O.C. 152 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Licania intrapetiolaris* Spreng. *ex* Hook.f.**
Voucher: Prance, G.T. 20012 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Licania irwinii* Prance**
Voucher: Palheta, E. 2903.332912 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania joseramosii* Prance**
Voucher: Monteiro, O.P. 29 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania krukovii* Standl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5070 (A, BM, K, LE, M, MICH, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania kunthiana* Hook.f.**
Voucher: Carvalho, A.M. 3792 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Licania laevigata* Prance**
Voucher: Daly, D.C. 9214 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Licania lamentanda* Prance**
Voucher: Amorim, A.M. 1129 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Licania lanceolata* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 29834 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Licania lata* J.F.Macbr.**
Voucher: Amaral, I.L. 466 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Licania latifolia* Benth. *ex* Hook.f.**
Voucher: Sothers, C.A. 897 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Licania laxiflora* Fritsch**
Voucher: Rosa, N.A. 1795 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Licania leptostachya* Benth.**
Voucher: Steward, W.C. 130 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, RO), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Licania licaniiflora* (Sagot) Blake**
Voucher: Prance, G.T. 2978 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Licania littoralis* Warm.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Licania littoralis* var. *cuneata* Kuhlm.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 208 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
Licania littoralis* Warm. var. *littoralis
Voucher: Lino, A.M. 71 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE); Mata Atlântica
***Licania longipedicellata* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, P, RB 2603, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania longipetala* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 28693 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO); Amazônia, Cerrado
***Licania longistyla* (Hook.f.) Fritsch**
Voucher: Silveira, M. 1620 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado
***Licania maguirei* Prance**
Voucher: Maguire, B. 56470 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Licania majuscula* Sagot**
Voucher: Daly, D.C. 814 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Licania maranhensis* Prance**
Voucher: Lisbôa, M.A. 2462 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia
***Licania marleneae* Prance**
Voucher: Silva, M.F. 873 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania maxima* Prance**
Voucher: Maguire, B. 47081 (IAN, MG, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Licania membranacea* Sagot *ex* Laness.**
Voucher: Pires, J.M. 10542 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Licania micrantha* Miq.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Licania micrantha* Miq. subsp. *micrantha
Voucher: Sothers, C.A. 636 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Licania miltonii* Prance**
Voucher: Silva, M.G. 4296 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Licania minutiflora* (Sagot) Fritsch**
Voucher: Prance, G.T. 10883 (INPA, NY, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Licania mollis* Benth.**
Voucher: Pires, J.M. 13957 (IAN, INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Licania naviculistipula* Prance**
Voucher: Belém, R.P. 3814 (FHO, NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Licania nelsonii* Prance**
Voucher: Rodrigues, W.A. 10501 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania niloi* Prance**
Voucher: Silva, N.T. 392 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Licania nitida* Hook.f.**
Voucher: Pirani, J.R. 3496 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Licania oblongifolia* Standl.**
Voucher: Cordeiro, M.R. 759 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Licania occultans* Prance**
Voucher: Steward, W.C. P17669 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Licania octandra* (Hoffmanns. *ex* Roem. & Schult.) Kuntze**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Licania octandra* subsp. *grandifolia* Prance**
Voucher: Lleras, E. P17270 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
Licania octandra* (Hoffmanns. *ex* Roem. & Schult.) Kuntze subsp. *octandra
Voucher: Furlan, A. 678 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Licania octandra* subsp. *pallida* (Hook.f.) Prance**
Voucher: Coêlho, L. 1955 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Licania orbicularis* Spruce *ex* Hook.f.**
Voucher: Cordeiro, J. 98 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania ovalifolia* Kleinhoonte**
Voucher: Rosa, N.A. 1061 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Licania pallida* Spruce *ex* Sagot**
Voucher: Prance, G.T. 14070 (INPA, K, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Licania paraensis* Prance**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, NY, RB 18818)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia
***Licania parviflora* Benth.**
Voucher: Santos, M.R. 162 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Licania parvifolia* Huber**
Voucher: Rosa, N.A. 1988 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado
***Licania parvifructa* Fanshawe & Maguire**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5589 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Licania piresii* Prance**
Voucher: Pires, J.M. 50435 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Licania polita* Spruce *ex* Hook.f.**
Voucher: Spruce, R. 2676 (BM, BR, C, CGE, E, F, GH, GOET, LD, LE, NY, OXF, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Licania prismatocarpa* Spruce *ex* Hook.f.**
Voucher: Sothers, C.A. 925 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania pruinosa* Benoist**
Voucher: Irwin, H.S. 47836 (F, IAN, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Licania reticulata* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 17950 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); Amazônia
***Licania riedelii* Prance**
Voucher: Lima, H.C. 2178 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Licania rigida* Benth.**
Voucher: Sucre, D. 10299 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado
***Licania robusta* Sagot**
Voucher: Oliveira, E. 230 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Licania rodriguesii* Prance**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 18812)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Licania rufescens* Klotzsch *ex* Fritsch**
Voucher: Silva, N.T. 474 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Licania salzmannii* (Hook.f.) Fritsch**
Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (NY, RB 48110)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Licania sandwithii* Prance**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 677 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania santosii* Prance**
Voucher: Carvalho, A.M. 353 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Licania savannarum* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 17816 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania sclerophylla* (Hook.f.) Fritsch**
Voucher: Ratter, J.A. 7877 (E, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado
***Licania silvae* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 58968 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia
***Licania silvatica* Glaz. *ex* Prance**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 10702 (B, C, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Licania sothersiae* Prance**
Voucher: Sothers, C.A. 959 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania spicata* Hook.f.**
Voucher: Heringer, E.P. 2813 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Licania sprucei* (Hook.f.) Fritsch**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1878 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Licania stewardii* Prance**
Voucher: Steward, W.C. P20251 (INPA, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Licania teixeirae* Prance**
Voucher: Teixeira, L.O.A. 728 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Licania tocantina* Prance**
Voucher: Silva, M.G. 3508 (INPA, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Licania tomentosa* (Benth.) Fritsch**
Voucher: Heringer, E.P. 12160 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia
***Licania triandra* Mart. *ex* Hook.f.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 9290 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Licania turbinata* Benth.**
Voucher: Belém, R.P. 3165 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica
***Licania unguiculata* Prance**
Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23599)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia
***Licania urceolaris* Hook.f.**
Voucher: Spruce, R. 2422 (BM, BR, CGE, E, GH, GOET, LD, LE, NY, OXF, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Licania vaupesiana* Killip & Cuatrec.**
Voucher: Mota, C.D.A. 2637 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Licania wurdackii* Prance**
Voucher: Prance, G.T. 15426 (FHO, INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Parinari Aubl.

Ghillean T. Prance, Cynthia Sothers
15 espécies (6 endêmicas)
***Parinari alvimii* Prance**
Voucher: Santos, T.S. 457 (FHO, CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Parinari brasiliensis* (Schott) Hook.f.**
Voucher: Schott 4222 (K, NY, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Parinari campestris* Aubl.**
Voucher: Pires, J.M. 14508 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado
***Parinari cardiophylla* Ducke**
Voucher: Fróes, R.L. 29070 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Parinari excelsa* Sabine**
Voucher: Santos, M.R. 166 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Parinari klugii* Prance**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 7291 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Parinari leontopitheci* Prance**
Voucher: Amorim, A.M. 1261 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Parinari littoralis* Prance**
Voucher: Belém, R.P. 1833 (BR, IAN, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Parinari maguirei* Prance**
Voucher: Fróes, R.L. 23180 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Parinari montana* Aubl.**
Voucher: Maas, P.J.M. 12762 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Parinari obtusifolia* Hook.f.**
Voucher: Pereira, B.A.S. 2996 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado
***Parinari occidentalis* Prance**
Voucher: Nelson, B.W. 630 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Parinari parvifolia* Sandwith**
Voucher: Sothers, C.A. 991 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Parinari rodolphii* Huber**
Voucher: Pires, J.M. 10690 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Parinari sprucei* Hook.f.**
Voucher: Spruce, R. 2539 (BM, BR, C, CGE, E, GH, GOET, LD, LE, NY, OXF, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

CISTACEAE

Cássia Mônica Sakuragui, Nathália de Paiva Krauss Silva

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Helianthemum Mill.

1 espécie (não endêmica)

***Helianthemum brasiliense* (Lam.) Pers.**
Voucher: Reitz, R. 726 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

CLETHRACEAE

Elsie Franklin Guimarães, Erika Medeiros

1 gênero, 2 espécies (1 endêmica), 3 variedades (2 endêmicas)

Clethra L.

2 espécies (1 endêmica), 3 variedades (2 endêmicas)

***Clethra scabra* Pers.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Clethra scabra* var. *laevigata* (Meisn.) Sleumer**
Voucher: Farney, C. 580 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Clethra scabra* Pers. var. *scabra
Voucher: Martinelli, G. 13436 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Clethra scabra* var. *venosa* (Meisn.) Sleumer**
Referência: Sleumer, H.O. 1967. Bot. Jahrb. Syst. 87: 142.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Clethra uleana* Sleumer**
Voucher: Reitz, R. 4112 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

CLUSIACEAE

Volker Bittrich

19 gêneros, 205 espécies (102 endêmicas), 13 subespécies (9 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

Calophyllum L.

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Calophyllum angulare* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 1442 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Calophyllum brasiliense* Cambess.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 18761 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Calophyllum longifolium* Willd.**
Voucher: Rozza, A. 312 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Calophyllum pachyphyllum* Planch. & Triana**
Voucher: Spruce, R. 2148 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Caraipa Aubl.

22 espécies (11 endêmicas), 5 subespécies (2 endêmicas)

***Caraipa ampla* Ducke**
Voucher: Fróes, R.L. 32976 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Caraipa aracaensis* Kubitzki**
Voucher: Prance, G.T. 28951 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa costata* Spruce *ex* Benth.**
Voucher: Sothers, C.A. 293 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa densifolia* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Caraipa densifolia* Mart. subsp. *densifolia
Voucher: Prance, G.T. 12172 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Caraipa densifolia* subsp. *rondoniana* Kubitzki**
Voucher: Kuhlmann, E. 2172 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Cerrado

***Caraipa duckeana* Kubitzki**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24077)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa foveolata* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8022)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Caraipa grandifolia* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Caraipa grandifolia* Mart. subsp. *grandifolia
Voucher: Chagas, J. s.n. (INPA 3469)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Domínio desconhecido

***Caraipa grandifolia* subsp. *lacerdaei* (Barb.Rodr.) Kubitzki**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15657)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Caraipa heterocarpa* Ducke**
Voucher: Vicentini, A. 1101 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa llanorum* Cuatrec.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Caraipa llanorum* Cuatrec. subsp. *llanorum
Voucher: Fróes, R.L. 28711 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa longisepala* Kubitzki**
Voucher: Prance, G.T. 28951 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa minor* Huber**
Voucher: Huber, J. s.n. (MG 1900)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Caraipa multinervia* Kubitzki**
Voucher: Kubitzki, K. 79-202 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa myrcioides* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11405)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Caraipa odorata* Ducke**
Voucher: Pruski, J.F. 3200 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa punctulata* Ducke**
Voucher: Vicentini, A. 717 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Caraipa racemosa* Cambess.**
Voucher: Egler, A. 47666 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia
***Caraipa richardiana* Cambess.**
Voucher: Irwin, H.S. 47834 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia
***Caraipa rodriguesii* Paula**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1761 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Caraipa savannarum* Kubitzki**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35414)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
***Caraipa spuria* Barb.Rodr.**
Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1887. Ternstroem 5 f. C.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia
***Caraipa tereticaulis* Tul.**
Voucher: Prance, G.T. 4527 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Caraipa valioi* Paula**
Voucher: Coêlho, L. 419 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Chrysochlamys Poepp.

3 espécies (nenhuma endêmica)
***Chrysochlamys membranacea* Planch. & Triana**
Voucher: Rodrigues, W.A. 10568 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Chrysochlamys ulei* Engl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 5528 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Chrysochlamys weberbaueri* Engl.**
Voucher: Prance, G.T. 12158 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Clusia L.

67 espécies (23 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas)
***Clusia aemygdioi* Gomes da Silva & B.Weinberg**
Voucher: Silva, A.G. 1230 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Clusia amabilis* Maguire**
Voucher: Maguire, B. 40381 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Clusia amazonica* Planch. & Triana**
Voucher: Spruce, R. 2878 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Clusia brachystyla* Maguire**
Voucher: Prance, G.T. 9605 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Clusia burchellii* Engl.**
Voucher: Anderson, W.R. 10240 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Clusia burle-marxii* Bittrich**
Voucher: Amaral, M.C.E. 93-20a (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Clusia candelabrum* Planch. & Triana**
Voucher: Spruce, R. 2431 (GH, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia
***Clusia cerroana* Steyerm.**
Voucher: Cordeiro, M.R. 319 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia columnaris* Engl.**
Voucher: Spruce, R. 1980 (BM, G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Clusia crassifolia* Planch. & Triana**
Voucher: Maguire, B. 40444 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Clusia criuva* Cambess.**
Distribuição: nativa; endêmica
Clusia criuva* Cambess. subsp. *criuva
Voucher: Matthes, L.A.F. 9354 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido
***Clusia criuva* subsp. *parviflora* Vesque**
Voucher: Ferreira, V.F. 61 (ESA, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Clusia dardanoi* G.Mariz &Maguire**
Voucher: Mariz, G. 287 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Clusia diamantina* Bittrich**
Voucher: Amaral, M.C.E. 93-11a (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Clusia drouetiana* L.B.Sm.**
Voucher: Drouet, F. 2101 (G, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia
***Clusia favum* P.F.Stevens**
Voucher: Daly, D.C. 5560 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia flavida* (Benth.) Pipoly**
Voucher: Vicentini, A. 999 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia
***Clusia fluminensis* Planch. & Triana**
Voucher: Gaudichaud, C. 781 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Clusia fockeana* Miq.**
Voucher: Oliveira, E. 5842 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia
***Clusia fragrans* Gardner**
Voucher: Martinelli, G. 6174 (RB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Clusia gardneri* Planch. & Triana**
Voucher: Gardner, G. 4098 (BM, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Clusia grammadenioides* Pipoly**
Voucher: Pires, J.M. 15766 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia grandiflora* Splitg.**
Voucher: Nelson, B.W. 1608 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Amazônia

***Clusia hammeliana* Pipoly**
Voucher: Prance, G.T. 23951 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia hexacarpa* Gleason**
Voucher: Gentry, A.H. 46596 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia hilariana* Schltdl.**
Distribuição: nativa; endêmica
Clusia hilariana* Schltdl. subsp. *hilariana
Voucher: Belém, R.P. 2824 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
***Clusia hilariana* subsp. *pilgeriana* (Mansf.) Bittrich**
Voucher: Lima, A. 57-2839 (IPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Mata Atlântica
***Clusia hoffmannseggiana* Schltdl.**
Voucher: Pires, J.M. 51245 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PE); Domínio desconhecido
***Clusia immersa* C.M.Vieira**
Voucher: Farney, C. 1424 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Clusia insignis* Mart.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1130 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia
***Clusia lanceolata* Cambess.**
Voucher: Franco, A.L.M. 29327 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica
***Clusia leprantha* Mart.**
Voucher: Maas, P.J.M. 514 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Clusia longipes* (Ducke) Bittrich**
Voucher: Ducke, A. 1632 (F, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido
***Clusia lopezii* Maguire**
Voucher: Prance, G.T. 15492 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia loretensis* Engl.**
Voucher: Rosas Jr., A. 360 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia
***Clusia martiana* Engl.**
Voucher: Pires, J.M. 16725 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Clusia melchiorii* Gleason**
Voucher: Hatschbach, G. 59729 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Clusia microstemon* Planch. & Triana**
Voucher: Prance, G.T. 5296 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Clusia minor* L.**
Voucher: Prance, G.T. 28730 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Clusia nemorosa* G.Mey.**
Voucher: Schultes, R.E. 24606 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Clusia obdeltifolia* Bittrich**
Voucher: Queiroz, L.P. 1956 (CEPEC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Clusia obovata* (Spruce *ex* Planch. & Triana) Pipoly**
Referência: Ribeiro, J.E.L.S. et 1508 INPA, UEC.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Clusia octandra* (Poepp.) Pipoly**
Voucher: Fróes, R.L. 26264 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia opaca* Maguire**
Voucher: Schultes, R.E. 10192 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia organensis* Planch. & Triana**
Voucher: Martinelli, G. 11742 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Clusia pachyphylla* Gleason**
Voucher: Prance, G.T. 29234 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia panapanari* (Aubl.) Choisy**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1317 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Clusia paralicola* G.Mariz**
Voucher: Andrade-Lima, D. 242 (IPA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica
***Clusia penduliflora* Engl.**
Voucher: Brito, J.M. 15 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Clusia pernambucensis* G.Mariz**
Voucher: Mariz, G. 225 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Clusia platystigma* Eyma**
Voucher: Cowan, R.S. 38147 (RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia
***Clusia poeppigiana* Engl.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8777 (BR, GH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia polysepala* Engl.**
Voucher: Spruce, R. 604 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Clusia pusilla* Steyerm.**
Voucher: Cordeiro, M.R. 398 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Clusia renggerioides* Planch. & Triana**
Voucher: Vicentini, A. 863 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Clusia riedeliana* Engl.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 27392 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Clusia rosea* Jacq.**
Voucher: Duarte, A.P. 6182 (MO, RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste; Amazônia, Mata Atlântica
***Clusia savannarum* Maguire**
Voucher: Prance, G.T. 29641 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia schomburgkiana* (Planch. & Triana) Benth. *ex* Engl.**
Voucher: Prance, G.T. 9862 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Clusia schultesii* Maguire**
Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1043 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia scrobiculata* Benoist**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1838 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Clusia sellowiana* Schltdl.**
Voucher: Belém, R.P. 3071 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); Mata Atlântica
***Clusia sipapoana* (Maguire) Pipoly**
Voucher: Pires, J.M. 16970 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia spathulaefolia* Engl.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1518 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Clusia spiritu-sanctensis* G.Mariz & B.Weinberg**
Voucher: Weinberg, B. 199 (R, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Clusia studartiana* C.M.Vieira & Gomes da Silva**
Voucher: Vieira, C.M. 100 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Clusia viscida* Engl.**
Voucher: Schultes, R.E. 9081 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clusia weddelliana* Planch. & Triana**
Voucher: Anderson, W.R. 9541 (NY, UB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado
***Clusia williamsii* Steyerm.**
Voucher: Maguire, B. 60412 (F, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Clusiella Planch. & Triana

2 espécies (1 endêmica)
***Clusiella axillaris* (Engl.) Cuatrec.**
Voucher: Vicentini, A. 742 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia
***Clusiella impressinervis* Hammel**
Voucher: Ducke, A. 1625 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Dystovomita (Engl.) D'Arcy

1 espécie (não endêmica)
***Dystovomita brasiliensis* D'Arcy**
Voucher: Krukoff, B.A. 8714 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Garcinia L.

7 espécies (2 endêmicas)
***Garcinia albuquerquei* (M.E.Berg) Bittrich**
Voucher: Schultes, R.E. 24535 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Garcinia benthamiana* (Planch. & Triana) Pipoly**
Referência: Pipoly, J.J. 2008. Nuevo Cat. Fl. Vasc. Venezuela 332.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Garcinia calyptrata* (Schltdl.) Bittrich**
Voucher: Riedel, L. 3 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Garcinia gardneriana* (Planch. & Triana) Zappi**
Voucher: Gardner, G. 1922 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Garcinia leptophylla* Bittrich**
Voucher: Spruce, R. 2441 (BR, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia
***Garcinia macrophylla* Mart.**
Voucher: Prance, G.T. 7874 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Garcinia madruno* (Kunth) Hammel**
Voucher: Souza, M.A.D. 32 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Haploclathra Benth.

3 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)
***Haploclathra grandiflora* Aspl.**
Voucher: Melin, D. 88 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Haploclathra leiantha* (Benth.) Benth.**
Voucher: Ducke, A. 656 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Haploclathra paniculata* (Mart.) Benth.**
Distribuição: nativa; endêmica
Haploclathra paniculata* (Mart.) Benth. var. *paniculata
Voucher: Spruce, R. 1915 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia
***Haploclathra paniculata* var. *verticillata* (Ducke) Lleras**
Voucher: Ducke, A. 257 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Kielmeyera Mart. & Zucc.

46 espécies (45 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)
***Kielmeyera abdita* Saddi**
Voucher: Saddi, N. 1228 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Kielmeyera albopunctata* Saddi**
Voucher: Saddi, N. ES-18 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Kielmeyera altissima* Saddi**
Voucher: Heringer, E.P. 86 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Kielmeyera amplexicaulis* S.Moore**
Voucher: Saddi, N. 1180 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Kielmeyera anisosepala* Saddi**
Voucher: Martins, R.P. 9247 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Kielmeyera appariciana* Saddi**
Voucher: Duarte, A.P. 9097 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Kielmeyera argentea* Choisy**
Voucher: Saddi, N. BA-03 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Kielmeyera bifaria* Saddi**
Voucher: Saddi, N. MG-27 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Kielmeyera coriacea* Mart. & Zucc.**
Voucher: Meira-Neto, J.A.A. 727 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Kielmeyera corymbosa* Mart. & Zucc.**
Voucher: Sciamarelli, A. 89 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Kielmeyera cuspidata* Saddi**
Voucher: Harley, R.M. 15920 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
***Kielmeyera decipiens* Saddi**
Voucher: Romaniuc-Neto, S. 113 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica
***Kielmeyera divergens* Saddi**
Voucher: Luetzelburg, P. 7199 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Kielmeyera elata* Saddi**
Voucher: Belém, R.P. 1044 (CEPEC, IAN, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Kielmeyera excelsa* Cambess.**
Voucher: Duarte, A.P. 5742 (HB, RB, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Kielmeyera gracilis* Wawra**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11800 (BM, C, K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Kielmeyera grandiflora* (Wawra) Saddi**
Voucher: Yamamoto, K. 8442 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Kielmeyera humifusa* Cambess.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 20705 (BR, C, G, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Kielmeyera insignis* Saddi**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 3878 (C, K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Kielmeyera itacarensis* Saddi**
Voucher: Harley, R.M. 18340 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Kielmeyera juruenensis* Saddi**
Voucher: Hoehne 5430 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Kielmeyera juruensis* Saddi**
Voucher: Hoehne, F.C. 5430 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Kielmeyera lathrophyton* Saddi**
Voucher: Kuhlmann, M. 1199 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Kielmeyera marauensis* Saddi**
Voucher: Belém, R.P. 3464 (CEPEC, IAN, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Kielmeyera membranacea* Casar.**
Voucher: Duarte, A.P. 5448 (HB, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Kielmeyera neglecta* Saddi**
Voucher: Saddi, N. BA-06 (RB, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Kielmeyera neriifolia* Cambess.**
Voucher: Semir, J. 4781 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Kielmeyera obtecta* Saddi**
Voucher: Saddi 1380 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Kielmeyera occhioniana* Saddi**
Voucher: Saddi, N. ES-17 (G, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Kielmeyera petiolaris* Mart.**
Voucher: Martins, R.P. 9248 (E, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
***Kielmeyera pulcherrima* L.B.Sm.**
Voucher: Irwin, H.S. 32952 (C, F, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Kielmeyera pumila* Pohl**
Voucher: Sendulsky, T. 863 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Kielmeyera regalis* Saddi**
Voucher: Irwin, H.S. 19989 (G, HB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Kielmeyera reticulata* Saddi**
Voucher: Davies, P. 61049 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Kielmeyera rizziniana* Saddi**
Voucher: Saddi, N. RJ-02 (G, HB, M, RB, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Kielmeyera rosea* Mart. & Zucc.**
Voucher: Duarte, A.P. 10932 (BHMH, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado
***Kielmeyera rubriflora* Cambess.**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 4632 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Kielmeyera rufotomentosa* Saddi**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6648 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Kielmeyera rugosa* Choisy**
Voucher: Blanchet, J.S. 3268 (BM, BR, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica
***Kielmeyera rupestris* Duarte**
Voucher: Duarte, A.P. 8996 (BHMH, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Kielmeyera sigillata* Saddi**
Voucher: Mello-Filho, L.E. 2540 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Kielmeyera similis* Saddi**
Voucher: Macedo, A. 3534a (RB, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado
***Kielmeyera speciosa* A.St.-Hil.**
Voucher: Yamamoto, K. 9950 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Kielmeyera tomentosa* Cambess.**
Referência: Cambessèdes, J. 1828. Fl. bras. merid. 1: 308.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado
***Kielmeyera trichophora* Saddi**
Voucher: Robert, A. 605 (BM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Kielmeyera variabilis* Mart. & Zucc.**
Distribuição: nativa; endêmica
***Kielmeyera variabilis* subsp. *paranaensis* (Saddi) Bittrich**
Voucher: Souza, V.C. 4683 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado
Kielmeyera variabilis* Mart. & Zucc. subsp. *variabilis
Voucher: Ratter, J.A. 4917 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

Lorostemon Ducke

4 espécies (2 endêmicas)
***Lorostemon bombaciflorum* Ducke**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 966 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lorostemon coelhoi* Paula**
Voucher: Vicentini, A. 923 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lorostemon colombianum* Maguire**
Voucher: Maguire, B. 60420 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Lorostemon negrense* Fróes**
Voucher: Fróes, R.L. 28729 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mahurea Aubl.

2 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)
***Mahurea exstipulata* Benth.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Mahurea exstipulata* subsp. *duckei* (Huber) Kubitzki**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23779)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
Mahurea exstipulata* Benth. subsp. *exstipulata
Voucher: Prance, G.T. 10479 (M, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Mahurea palustris* Aubl.**
Voucher: Silva, A. 495 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Mammea L.

1 espécie (não endêmica)
***Mammea americana* L.**
Voucher: Hage, J.L. 1153 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia

Marila Sw.

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Marila laxiflora* Rusby**
Voucher: Daly, D.C. 4198 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Marila tomentosa* Poepp.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 10162a (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Moronobea Aubl.

5 espécies (2 endêmicas)
***Moronobea candida* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21276)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Moronobea coccinea* Aubl.**
Voucher: Ferreira, E. 167-57 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia
***Moronobea intermedia* Engl.**
Voucher: Ule, E.H.G. 8663 (B, F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
***Moronobea pulchra* Ducke**
Voucher: Vicentini, A. 1175 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Moronobea riparia* Spruce *ex* Planch. & Triana**
Referência: Planchon & Triana 1860. Ann. Sci. Nat., Bot. 14: 296.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Platonia Mart.

1 espécie (1 endêmica)
***Platonia insignis* Mart.**
Voucher: Davidse, G. 17799 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

Symphonia L.f.

1 espécie (não endêmica)
***Symphonia globulifera* L.f.**
Voucher: Prance, G.T. 2631 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Tovomita Aubl.

30 espécies (9 endêmicas)
***Tovomita acutiflora* M.S. de Barros & G. Mariz**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1840 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tovomita amazonica* (Poepp.) Walp.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1745 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita bahiensis* Engl.**
Voucher: Vinha, S.G. da 50 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Tovomita brevistaminea* Engl.**
Voucher: Thomas, W.W. 10482 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica
***Tovomita caloneura* A.C.Sm.**
Voucher: Nascimento, J.R. 512 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tovomita carinata* Eyma**
Voucher: Nelson, B.W. 2089 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tovomita choisyana* Planch. & Triana**
Voucher: Bittrich, V. 95-174 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica
***Tovomita duckei* Huber**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 13648)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Tovomita froesii* Maguire**
Voucher: Fróes, R.L. 23887 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tovomita fructipendula* (Ruiz & Pav.) Cambess.**
Voucher: Krukoff, B.A. 8770 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica
***Tovomita glazioviana* Engl.**
Voucher: Lima, H.C. 2170 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido
***Tovomita gracilipes* Planch. & Triana**
Voucher: Spruce, R. 3079 (BM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tovomita grata* Sandwith**
Voucher: Nascimento, J.R. 517 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tovomita guianensis* Aubl.**
Voucher: Daly, D.C. 674 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica
***Tovomita humilis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 36717 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tovomita krukovii* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 4887 (BM, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tovomita laurina* Planch. & Triana**
Voucher: Spruce, R. 2431 (G, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tovomita leucantha* (Schltdl.) Planch. & Triana**
Voucher: Riedel, L. 830 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Tovomita longifolia* (Rich.) Hochr.**
Voucher: Beck, H.T. 173 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia
***Tovomita macrophylla* (Poepp.) Walp.**
Voucher: Poeppig, E.F. 2682 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia
***Tovomita mangle* G.Mariz**
Voucher: Mariz, G. 197 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Tovomita martiana* Engl.**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 324 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia
***Tovomita micrantha* A.C.Sm.**
Voucher: Krukoff, B.A. 5071 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tovomita obovata* Engl.**
Voucher: Hopkins, M. 1476 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia
***Tovomita rubella* Spruce *ex* Planch. & Triana**
Voucher: Spruce, R. 3143 (BM, G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tovomita schomburgkii* Planch. & Triana**
Voucher: Vicentini, A. 1081 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia
***Tovomita spruceana* Planch. & Triana**
Voucher: Spruce, R. 2428 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia
***Tovomita stigmatosa* Planch. & Triana**
Voucher: Krukoff, B.A. 5681
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Tovomita tenuiflora* Benth. *ex* Planch. & Triana**
Voucher: Spruce, R. 3391 (BR, G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tovomita umbellata* Benth.**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1731 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Tovomitidium Ducke

2 espécies (2 endêmicas)
***Tovomitidium clusiiflorum* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 25031 (K, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tovomitidium speciosum* (Ducke) Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18069)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Tovomitopsis Planch. & Triana

2 espécies (2 endêmicas)
***Tovomitopsis paniculata* (Spreng.) Planch. & Triana**
Voucher: Silva, A.F. 1340 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica
***Tovomitopsis saldanhae* Engl.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 13576 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

COMBRETACEAE

Nilda Marquete, Maria da Conceição Valente

5 gêneros, 79 espécies (27 endêmicas), 5 variedades (3 endêmicas)

Buchenavia Eichler

24 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Buchenavia acuminata* Exell & Stace**
Referência: Exell, A.W. & Stace, C.A. 1963. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3(1):3-46.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Buchenavia amazonia* Alwan & Stace**
Voucher: Fróes, R.L. 26237 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Buchenavia callistachya* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25021)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Buchenavia congesta* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 2003 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Buchenavia fanshawei* Exell & Maguire**
Voucher: Ducke, A. 2278 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Buchenavia grandis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8853)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Buchenavia guianensis* (Aubl.) Alwan & Stace**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1718 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Buchenavia hoehneana* N.F.Mattos**
Voucher: Rezende, G.S.J. 167 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Buchenavia iguaratensis* N.F.Mattos**
Voucher: Kuhlmann, M. 2755 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Buchenavia kleinii* Exell**
Distribuição: nativa; endêmica

Buchenavia kleinii* Exell var. *kleinii
Voucher: Marquete, R. 2056 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Buchenavia kleinii* var. *paulensis* N.F.Mattos**
Referência: Mattos, N.F. 1975. Loefgrenia 63:1-2.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Buchenavia macrophylla* Spruce *ex* Eichler**
Voucher: Spruce, R. 2507 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Buchenavia nitidissima* (Rich.) Alwan & Stace**
Referência: Alwan, A.-R.A. & Stace, C.A. 1985. Nordic J. Bot. 5(5):449.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Buchenavia ochroprumna* Eichler**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 234824)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Buchenavia oxycarpa* (Mart.) Eichler**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 12385)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Buchenavia pabstii* Marquete & C.Valente**
Voucher: Silva, I.A. 226 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Buchenavia pallidovirens* Cuatrec.**
Voucher: Guedes, T.N. 499 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE); Amazônia

***Buchenavia parvifolia* Ducke**
Voucher: Assunção, P.A.C.I. 450 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Buchenavia rabelloana* N.F.Mattos**
Voucher: Mattos 15570 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Buchenavia reticulata* Eichler**
Voucher: Maguire, B. s.n. (RB 88007)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Buchenavia sericocarpa* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1481 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Buchenavia suaveolens* Eichler**
Voucher: Nascimento, O.C. 185 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PI); Amazônia

***Buchenavia tetraphylla* (Aubl.) R.A.Howard**
Voucher: Souza, V.S. 90 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Buchenavia tomentosa* Eichler**
Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1978 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Buchenavia viridiflora* Ducke**
Voucher: Ducke, A. 1378 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia

Combretum Loefl.

24 espécies (5 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)

***Combretum argenteum* Bertol.**
Voucher: Vieira, M. 68 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Combretum assimile* Eichler**
Voucher: Martinelli, G. 2282 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Combretum brevistylum* Eichler**
Voucher: Poeppig, E.F. 2494 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Combretum cacoucia* Exell**
Voucher: Pereira, E. 3221 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
***Combretum discolor* Taub.**
Voucher: Mori, S.A. 13473 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Combretum duarteanum* Cambess.**
Voucher: Bezerra Neta, M.T. 143 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Combretum fruticosum* (Loefl.) Stuntz**
Voucher: Sylvestre, L.S. 1093 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Combretum glaucocarpum* Mart.**
Voucher: Sarmento, A.C. 749 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Combretum gracile* Schott**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 2092 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Combretum hilarianum* D.Dietr.**
Voucher: Duarte, A.P. 8486 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado
***Combretum lanceolatum* Pohl *ex* Eichler**
Voucher: Sucre, D. 7907 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Combretum laurifolium* Mart.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Combretum laurifolium* Mart. var. *laurifolium
Voucher: Ferreira, C.A.C. 5221 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Combretum laurifolium* var. *nitidum* (Spruce *ex* Eichler) Marquete & C.Valente**
Voucher: Oliveira, E. 1681 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia
***Combretum laxum* Jacq.**
Voucher: Pirani, J.R. 3731 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Combretum leprosum* Mart.**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 9792 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Combretum llewelynii* J.F.Macbr.**
Voucher: Silveira, M. 773 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Combretum mellifluum* Eichler**
Distribuição: nativa; não endêmica
Combretum mellifluum* Eichler var. *mellifluum
Voucher: Mendonça, R.C. 4320 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Combretum monetaria* Mart.**
Voucher: Harley, R.M. 54086 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga
***Combretum pisonioides* Taub.**
Voucher: Pereira, E. 1086 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA); Caatinga
***Combretum pyramidatum* Desv.**
Voucher: Ferreira, C.A.C. 370 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
***Combretum rotundifolium* Rich.**
Voucher: Martinelli, G. 6960 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia
***Combretum rupicola* Ridl.**
Voucher: Ridley, L. 59 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica
***Combretum sprucei* Eichler**
Voucher: Ducke, A. 2224 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica
***Combretum ulei* Exell**
Voucher: Ule, E.H.G. 5075 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Combretum vernicosum* Rusby**
Voucher: Philcox, D. 4461 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Conocarpus L.

1 espécie (não endêmica)
***Conocarpus erectus* L.**
Voucher: Arbockz, G. 2448 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Laguncularia C.F.Gaertn.

1 espécie (não endêmica)
***Laguncularia racemosa* (L.) C.F.Gaertn.**
Voucher: Marquete, N.F.S. 454 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Terminalia L.

29 espécies (15 endêmicas)

***Terminalia actinophylla* Mart.**
Voucher: Martinelli, G. 3886 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Terminalia acuminata* (Allemão) Eichler**
Voucher: Glaziou, A.F.M. 5468 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Terminalia adamantium* Cambess.**
Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Terminalia amazonia* (J.F.Gmel.) Exell**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17678)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Terminalia argentea* Mart.**
Voucher: Duarte, A.P. 7581 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Terminalia australis* Cambess.**
Voucher: Farney, C. 3292 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Terminalia camuxa* Pickel**
Voucher: Moraes, J.C. 1336 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Terminalia catappa* L.**
Voucher: Pinheiro, R.S. 2252 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Terminalia crispialata* (Ducke) Alwan & Stace**
Voucher: Pires, J.M. 14025 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Terminalia dichotoma* E.Mey.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17691)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Terminalia eichleriana* Alwan & Stace**
Voucher: Amorim, A.M. 554 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Terminalia fagifolia* Mart.**
Voucher: Martinelli, G. 6240 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Terminalia glabrescens* Mart.**
Voucher: Araújo, D.S.D. 92 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Terminalia guyanensis* Eichler**
Referência: Eichler, A.W. 1867. Fl. bras. 14(2):88.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Terminalia hylobates* Eichler**
Referência: Eichler, A.W. 1870. Vidensk. Meddel. Dansk Natuhist. Foren. Kjøbenhavn 195.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Terminalia januariensis* DC.**
Voucher: Marquete, N.F.S. 597 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Terminalia kuhlmannii* Alwan & Stace**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 6688 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Terminalia lucida* Hoffmanns. *ex* Mart.**
Voucher: Sucre, D. 15563 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Terminalia mameluco* Pickel**
Voucher: Moraes, J.C. 1338 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Terminalia obidensis* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17675)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Terminalia oblonga* (Ruiz & Pav.) Steud.**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25020)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Terminalia phaeocarpa* Eichler**
Voucher: Macedo, A. 1150 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Terminalia quintalata* Maguire**
Voucher: Prance, G.T. 28874 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Terminalia ramatuella* Alwan & Stace**
Voucher: Fróes, R.L. 21421 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Terminalia reitzii* Exell**
Voucher: Reitz, R. 12194 (BM, HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Terminalia riedelii* Eichler**
Voucher: Riedel, L. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Terminalia triflora* (Griseb.) Lillo**
Voucher: Farney, C. 4070 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Terminalia uleana* Engl. *ex* Alwan & Stace**
Voucher: Ule, E.H.G. 1004 (HBG, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Terminalia virens* (Spruce *ex* Eichler) Alwan & Stace**
Voucher: Farney, C. 1833 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

COMMELINACEAE

Lidyanne Yuriko Saleme Aona

14 gêneros, 74 espécies (37 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica), 9 variedades (3 endêmicas)

Aneilema R.Br.

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Aneilema brasiliense* C.B.Clarke**
Voucher: Melo, E. 1359 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aneilema umbrosum* (Vahl) Kunth**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Aneilema umbrosum* subsp. *ovato-oblongum* (P.Beauv.) J.K.Morton**
Referência: Kunth, K.S. 1843. Enum. Pl. [Kunth] 4: 71.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Buforrestia C.B.Clarke

1 espécie (não endêmica)

***Buforrestia candolleana* C.B.Clarke**
Voucher: Leprier s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); Amazônia

Callisia Loefl.

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Callisia filiformis* (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt**
Voucher: Melo, E. 4455 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado

***Callisia monandra* (Sw.) Schult.f.**
Voucher: Davis, P.H. 59802 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Callisia repens* L.**
Voucher: Queiroz, L.P. 4595 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (RJ), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica

Commelina L.

9 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)

***Commelina benghalensis* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Commelina benghalensis* L. var. *benghalensis
Voucher: Klein, A. 16015 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Commelina diffusa* Burm.f.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Commelina diffusa* Burm.f. subsp. *diffusa
Voucher: Melo, E. 3371 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Commelina erecta* L.**
Distribuição: nativa; não endêmica

Commelina erecta* L. subsp. *erecta
Voucher: França, F. 5179 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Commelina erecta* var. *angustifolia* (Michx.) Fernald**
Referência: Handlos, W.L. 1940. Rhodora 41: 439.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Commelina obliqua* Vahl**
Voucher: Noblick, L.R. 3156 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado

***Commelina platyphylla* Klotzsch *ex* Seub.**
Referência: Seubert, M. 1855. Fl. bras. 3(1): 265.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Commelina rufipes* Seub.**
Distribuição: nativa; não endêmica

***Commelina rufipes* var. *glabrata* (D.R.Hunt) Faden & D.R.Hunt**
Voucher: Silveira, M. 583 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

Commelina rufipes* Seub. var. *rufipes
Voucher: Leoni, L.S. 6112 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Commelina schomburgkiana* Klotzsch**
Referência: Schomburgk, R.H. 1841. Reis. Br.-Guiana [Ri. Schomburgk] 1064.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado

***Commelina singularis* Vell.**
Referência: Vellozo, J.M.C. 1829. Fl. Flumin. Icon. 31.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Commelina villosa* C.B.Clarke *ex* Chodat & Hassl.**
Voucher: Irwin, H.S. 32000 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado, Mata Atlântica

Dichorisandra J.C.Mikan

27 espécies (22 endêmicas)

***Dichorisandra acaulis* Cogn.**
Voucher: Aona, L.Y.S. 933 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dichorisandra albomarginata* Linden *ex* Regel**
Voucher: Fiaschi, P. 953 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Dichorisandra begoniaefolia* Kunth**
Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dichorisandra densiflora* Ule**
Voucher: Steward, W.C. 12869 (K, NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Dichorisandra fluminensis* Brade**
Voucher: Polland, C. s.n. (RB 94400)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dichorisandra gaudichaudiana* Kunth**
Voucher: Guedes, R.R. 623 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dichorisandra glaziovii* Taub.**
Voucher: Giulietti, A.M. 1674 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica
***Dichorisandra hexandra* (Aubl.) Kuntze *ex* Hand.-Mazz.**
Voucher: Ducke, A. 1173 (IAN, NY, RB, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dichorisandra hirtella* (Nees & Mart.) Mart. *ex* Schult. f.**
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Dichorisandra incurva* Mart. *ex* Schult.f.**
Voucher: Aona, L.Y.S. 679 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Dichorisandra interrupta* Mart. *ex* Schult.f.**
Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Mata Atlântica
***Dichorisandra leucophthalmos* Hook.**
Voucher: Thomas, W.W. 13398 (CEPEC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica
***Dichorisandra neglecta* Brade**
Voucher: Brade, A.C. 20561 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Dichorisandra oxypetala* Hook.**
Voucher: Mautone, L. 591 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dichorisandra paranaënsis* D.Maia et al.**
Voucher: Aona, L.Y.S. 1006 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica
***Dichorisandra penduliflora* Kunth**
Voucher: Hage, J.L. 1944 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Dichorisandra perforans* C.B.Clarke**
Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3202 (HRCB, UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
***Dichorisandra picta* Hook.f.**
Referência: Hooker, J.D. 1854. Bot. Mag. 80: t. 4760.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Dichorisandra procera* Mart. *ex* Schult & Schult.f.**
Voucher: Aona, L.Y.S. 938 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica
***Dichorisandra puberula* Nees & Mart.**
Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica
***Dichorisandra pubescens* Mart. *ex* Schult & Schult.f.**
Voucher: Aona, L.Y.S. 1007 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
***Dichorisandra radicalis* Nees & Mart.**
Voucher: Aona, L.Y.S. 984 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Dichorisandra saundersii* Hook.f.**
Referência: Hooker, J.D. 1875. Bot. Mag. 101: t. 6165.
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica
***Dichorisandra tejucensis* Mart. *ex* Schult & Schult.f.**
Voucher: Kollmann, L.J.C. 1658 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica
***Dichorisandra thyrsiflora* J.C.Mikan**
Voucher: Aona, L.Y.S. 99-36 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica
***Dichorisandra ulei* J.F.Macbr.**
Voucher: Daly, D.C. 8093 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Dichorisandra villosula* Mart. *ex* Schult & Schult.f.**
Voucher: Mori, S.A. 9021 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Floscopa Lour.

4 espécies (1 endêmica), 4 variedades (3 endêmicas)
***Floscopa elegans* Huber**
Voucher: Prance, G.T. 7415
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Floscopa glabrata* (Kunth) Hassk.**
Distribuição: nativa; não endêmica
Floscopa glabrata* (Kunth) Hassk. var. *glabrata
Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12371 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Floscopa glabrata* var. *glandulosus* C.B.Clarke**
Referência: Clarke, C.B. 1881. Monogr. Phan. [A.DC. & C.DC.] 3: 270.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica
***Floscopa glabrata* var. *hirsuta* (Kunth) C.B.Clarke**
Referência: Clarke, C.B. 1881. Monogr. Phan. [A.DC. & C.DC.] 3: 270.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste; Mata Atlântica
***Floscopa peruviana* Hassk. *ex* C.B.Clarke**
Voucher: Daly, D.C. 7357 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Floscopa robusta* (Seub.) C.B.Clarke**
Distribuição: nativa; endêmica
Floscopa robusta* (Seub.) C.B.Clarke var. *robusta
Voucher: Silveira, M. 856 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Geogenanthus Ule
1 espécie (não endêmica)
***Geogenanthus poeppigii* (Miq.) Faden**
Voucher: Daly, D.C. 8670 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Gibasis Raf.
1 espécie (não endêmica)
***Gibasis geniculata* (Jacq.) Rohweder**
Voucher: Leoni, L.S. 2909 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

Murdannia Royle
5 espécies (4 endêmicas)
***Murdannia gardneri* G.Brückn.**
Voucher: Sasaki, D. 1934 (K)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Murdannia nudiflora* (L.) Brenan**
Referência: Brenan, J.P.M. 1952. Kew Bull. 7: 189.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Murdannia paraguayensis* (C.B.Clarke *ex* Chodat) G.Brückn.**
Voucher: Harley, R.M. 10489 (NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia
***Murdannia schomburgkiana* (Kunth) G.Brückn.**
Referência: Engler, H.G.A. (ed.) 1930. Nat. Pflanzenfam. 15a: 173.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado
***Murdannia semifoliata* (C.B.Clarke *ex* S.Moore) G.Brückn.**
Voucher: Kuhlmann, J.G. 89 (R, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Plowmanianthus Faden & C.R.Hardy
1 espécie (não endêmica)
***Plowmanianthus grandiflorus* Faden & C.R.Hardy**
Voucher: Hardy, C.R. 140 (AMAZ, BH, US, USM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Siderasis Raf.
1 espécie (1 endêmica)
***Siderasis fuscata* (Lodd.) H.E.Moore**
Voucher: Gardner, G. 847 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Tinantia Scheidw.
2 espécies (nenhuma endêmica)
***Tinantia erecta* (Jacq.) Schltdl.**
Voucher: Sucre, D. 3103 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica
***Tinantia sprucei* C.B.Clarke**
Voucher: Spruce, R. 763 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL); Amazônia, Caatinga

Tradescantia Ruppius *ex* L.
10 espécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Tradescantia ambigua* Mart.**
Referência: Martius, C.F.P. von 1830. Syst. Veg. 7: 1170.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tradescantia anagallidea* Seub.**
Referência: Seubert, M. 1855. Fl. bras. 3(1): 249.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Tradescantia cerinthoides* Kunth**
Referência: Kunth, C. 1843. Enum. Pl. 4: 83.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Tradescantia crassula* Link & Otto**
Voucher: Trinta, E.F. 2589 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Tradescantia cymbispatha* C.B.Clarke**
Referência: Clarke, C.B. 1881. Monogr. Phan. 3: 296.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
***Tradescantia fluminensis* Vell.**
Voucher: Vidal, J. 5116 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Tradescantia umbraculifera* Hand.-Mazz.**
Voucher: Waechter, J.L. 2427 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica
***Tradescantia valida* G.Brückn.**
Referência: Brückner, G. 1932. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 11: 510.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido
***Tradescantia zanonia* (L.) Sw.**
Voucher: Daly, D.C. 10811 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica
***Tradescantia zebrina* Bosse**
Distribuição: nativa; não endêmica
Tradescantia zebrina* Bosse var. *zebrina
Voucher: Daly, D.C. 10055 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, Sudeste; Amazônia

Tripogandra Raf.
7 espécies (4 endêmicas)
***Tripogandra brasiliensis* Handlos**
Voucher: Eiten, G. 4458 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Tripogandra diuretica* (Mart.) Handlos**
Voucher: Leitão-Filho, H.F. 475 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tripogandra elata* D.R.Hunt**
Voucher: Irwin, H.S. 14051 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Tripogandra glandulosa* (Seub.) Rohweder**
Voucher: Hatschbach, G. 40593 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Tripogandra neglecta* Handlos**
Referência: Handlos, W.L. 1975. Rhodora 77: 287.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica
***Tripogandra serrulata* (Vahl) Handlos**
Voucher: Prance, G.T. 16762 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Tripogandra warmingiana* (Seub.) Handlos**
Referência: Handlos, W.L. 1975. Rhodora 77: 311.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Este livro foi produzido em dois volumes por Andrea Jakobsson Estúdio
para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro no inverno de 2010
– Ano Internacional da Biodiversidade –
elaborado com tipos MetaSerif e impresso em papel pólen soft 70 g/m²
nas oficinas da Gráfica Santa Marta.

ISBN 978-65-88742-42-0

JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Andrea Jakobsson Estúdio