

تأثير التظليل على إنبات بذور ونمو شتلات الينكى دنيا (البشملة) (*Eriobotrya japonica*.lindl) Loquat

سليمان محمد كوكو الزبياري ياسين محمد عبدالله جنان يوسف داؤد يوسف
قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة دهوك/العراق المعهد التقني/اربيل المعهد التقني/الموصل
E-mail: d.sulaimankako@yahoo.com

الخلاصة

أجريت هذه الدراسة في مشتل المعهد التقني الموصلي في محافظة نينوى خلال موسم النمو 2008 و 2009 لدراسة تأثير نسبة التظليل (Zero, 50, 75%) على إنبات البذور وتأثيرها على نمو شتلات الينكى دنيا (طول الساق وقطر الساق وعدد الأوراق وعدد التفرعات وطول التفرعات وطول الجذور). وذلك باستخدام شبكة بلاستيكية خضراء اللون (ساران). أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي لمعاملات التظليل ولموسم النمو 2008 و 2009 والتدخل بينهما على إنبات بذور الينكى دنيا (البشملة) ونمو الشتلات ولاسيما طول الساق وقطر الساق وعدد التفرعات وطول التفرعات وطول الجذور وطفل التفرعات وطول الجذور. وان معاملة التظليل 50% لموسم النمو كانت المعاملة الأفضل بين المعاملات في نسبة الإنبات بينما المعاملة المكشوفة لموسم النمو 2008 هي الأفضل في عدد الأوراق وقطر الساق وطول الجذور وعدد التفرعات وطولها لموسم النمو 2009. في حين كانت معاملة التظليل 50% هي الأفضل في طول الساق لموسم النمو 2008.

كلمات دالة: التظليل، الإنبات، البشملة، *Eriobotrya japonica*.

تاريخ تسليم البحث: 2011/9/6 وقبوله: 2012/4/9

المقدمة

نبات ينكي دنيا (البشملة) شجرة تحت الاستوائية مستديمة الخضرة، تنتمي إلى العائلة الوردية Rosaceae وتؤكد المصادر أن موطنها الأصلي هو المنطقة الشرقية الوسطى من الصين ومنها انتشرت إلى اليابان منذ أقدم العصور حيث انتشرت فيها ومنها أخذت اسمها البشملة اليابانية ولا يعرف بالضبط متى أدخلت إلى العراق أغا داود، (1991) وحسن، (1998) وعلى نطاق الوطن العربي فجدها تزرع كمحصول رئيسي في فلسطين وسوريا وبكميات قليلة في مصر وقد ثبتت نجاحها في العراق. تزرع البشملة (ينكي دنيا) في قبرص ويونان وأسبانيا وتونس وتركيا (Taskin و Erdal, 2011) وتزرع كأشجار زينة نظراً للجمال أزهارها ورائحتها الزكية وتحتوي ثمار البشملة على السكريات والدهون والبروتين والكالسيوم والحديد والفسفور وألياف ورماد بالإضافة إلى الماء(Bal, 2003). تنمو أشجار البشملة في جميع المناطق التي تصلح لنمو وزراعة أشجار الحمضيات لا سيما المناطق الساحلية والقريبة من الأنهر وعموماً المناخ البارد خلال جزء من السنة مع تساقط الأمطار بمعدل 125-35 سم يعتبر جيد لنمو البشملة (الخفاجي وأخرون, 1990). تستخدم الثمار للأكل الطازج بعد النضج وقد تترك على الأشجار حتى تصل مرحلة النضج الكامل وتصبح لونها أصفر أو برتقالي عند تمام النضج حيث تستخدم عندها في صناعة الحلويات والمربيات أو في الطبخ. وتتكاثر البشملة ببذور لإنتاج شتلات للتطعيم عليها بأصناف موثوقة ومرغوبة وتزرع البذور خلال أشهر نيسان ومايو وحزيران بمجرد استخراجها من الثمار الناضجة مباشرة في المرافق في المشتل أو في أكياس بلاستيكية وبمعدل بذرتين وبعد الإنبات تفرد الشتلات بحيث يبقى شتلة واحدة في كل كيس (عثمان وأخرون, 1998). وان الأشجار البذرية أبطأ في بلوغها وإثمارها و مختلفة في صفاتها عن الأشجار المكثرة خضرريا (الأشجار المطعمية). تعاني بعض بذور الفاكهة ومنها البشملة من مشكلة الإنبات حيث الإنبات غير منتظم وقد لا يكتمل إلا بعد فترة طويلة قبل (45-50) يوم أو أكثر وهناك اختلاف في نسبة الإنباتات من سنة إلى أخرى وهذا يعني أن الظروف البيئية تلعب دوراً كبيراً في إنبات بذور هذه الأشجار وكذلك عوامل الخدمة. إن شتلات وأشجار الينكى دنيا المزروعة بالطريقة المكشوفة قد تتعرض إلى أضرار بيئية ولا سيما أضرار أشعة الشمس المباشرة التي تؤدي إلى احتراق أوراق الشتلات والأشجار ويؤدي إلى ضعف النمو في الشتلات وان أجزاء عملية التظليل عليها قد يقلل من هذه الإضرار. وفي العراق فإن نسبة الإشعاع الشمسي عالية جداً، وخاصة في فصل الصيف بحيث ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير

جداً مما يؤدي أحياناً إلى الحد من نمو وتطور النباتات الخضرية والشمرية. إن معرفة العوامل المؤثرة على إنبات البذور والنباتات الخضرية يعد الأساس في تحسينها ومن هذه العوامل الإضاءة وكميتهما الواسعة للشتلات. واهتم الباحثون كثيراً بأشجار الفاكهة لأهميتها الاقتصادية والغذائية وشملت عنایتهم كافة النواحي المتعلقة بزراعة البذور والأشجار وإنتاج الشتلات ومنها تأثير الضوء على النباتات الخضرية إذ ذكر Palmer و Jackson (1977) في دراسة على أشجار التفاح المطعم على أصل التفاح M26 حيث تم حجب الإضاءة بنسبة 75.62% و 89% عند مرحلة الإزهار الكامل لموسمين متتاليين فكان للتظليل تأثير مباشر إذ قلل عدد النباتات الخضرية الجديدة. وقد أوضح Darnell و Ferree (1983) في دراسة أجروها في على أشجار التفاح أن التداخل بين عوامل البيئة المختلفة اثر على استجابة الأشجار للنمو وان 75% من التظليل قلل نمو الأفرع وقلل عدد الأوراق.

أما Lindhagen (1985) في دراسة أجراها على أشجار التفاح المثمرة حديثاً لبيان تأثير الإضاءة ودرجة الحرارة في النباتات الخضرية وظهور الأفرع، وجده أن للإضاءة الجيدة تأثيراً واضحاً في زيادة عدد التفرعات على الشجرة عن تلك الأشجار التي تصلها إضاءة أقل. لقد ذكر Chaudhry (2001) عدم حدوث اختلاف معنوي في نمو شتلات *Acacia nilotica*, *Prosopis cineraria*, *Leucaena leucocephala*, *Eucalypts -camaldulensis* والشمس المباشر. وقد بين Poole و Conover (1977) في دراستهما على نمو نبات *Ficus benjamina* تحت نسب تظليل صفر و 40% و 80% من الإضاءة الطبيعية إن ارتفاع النبات قد ازداد وبشكل معنوي وقل قطر الساق، ووجد Collard وأخرون (1977) إن نسبة الفروع في نبات *F. benjamina* ازدادت عند التظليل 80%. وكذلك بين Poole و Conover (1978) وجداً أفضل ارتفاع للنباتات *F. benjamina* عندما زيدت نسبة التظليل إلى 80%. وجاء في دراسة Honjo وأخرون (1992) و Asada و Ogasawara (1997) التي أجرواها على أشجار الكثري والتفاح، إذ بينوا أن زيادة نسبة التظليل قد قللت من نمو الأفرع الخضرية، وبعود السبب في الاختلاف إلى اختلاف شدة الإضاءة المتوفرة. لذا أجريت هذه الدراسة لزيادة نسبة إنبات البذور ولمعرفة إمكانية نجاح نمو هذه الشتلات وتطورها تحت ظروف التظليل المختلفة وحمايتها من الإشعاعات الشمسية ودرجات الحرارة المرتفعة خلال مراحل النمو الحضري وتطورها.

مواد البحث وطرائقه

أجريت هذه الدراسة في مشتل المعهد التقني/الموصل في محافظة نينوى خلال موسمي النمو 2008 و 2009 لدراسة تأثير نسبة التظليل (Zero, 50, 75%) أي من شدة الإضاءة الطبيعية المتوفرة 50 و 100% على التتابع على إنبات ونمو شتلات الينكي دنيا. وقد تضمنت الدراسة استخدام التضليل بنسبة (75, 50, Zero) من شدة الإضاءة الطبيعية المتوفرة وباستخدام شبكة بلاستيكية خضراء اللون (ساران). وكان معدل شدة الإضاءة لفترة الدراسة 901.2 واط /م² في الشمس و 461.102 واط /م² في ظل و 375.827 واط /م² في ظل 50% و 325.827 واط /م² في 75% ظل لموسم النمو 2008 و شدة الإضاءة 822.7 واط /م² في الشمس و 434.44 واط /م² في 50% ظل و 325.827 واط /م² في 75% ظل لموسم النمو 2009. وتم قياس شدة الإضاءة في منطقة الدراسة باستخدام جهاز قياس شدة الإضاءة Lux-meter. حيث استخدمت البذور التي جمعت من أشجار بذرية نامية ومنتخبة بعمر 17 سنة لدراسة أفضل طريقة لإنتاج الشتلات باستخدام السaran لتخفيف شدة الإضاءة والحرارة خلال الصيف.

وزرعت بذور ينكي دنيا بعد استخراجها من الثمار وغسلها جيداً بتاريخ 2008/6/23 وفي 2009/6/24 في تربة مزيجية (45.26% رمل و 24.23% طين و 30.51% غرين) واستعملت كل معاملة على 180 بذرة واستعملت 60 بذرة للمكرر الواحد وبثلاث مكررات زرعت البذور في إطار فخارية بمعدل 20 بذرة في كل طبق على عمق 3 سم وغطيت البذور بنفس تربة الزراعة وكبست قليلاً لثبيتها في محلاتها وكان الري يجري حسب الحاجة والتصميم التجاري للدراسة كان على وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة Randomize Complete Bloke Design (R.C.B.D) (Anonymous, 2007).

وتم دراسة الصفات الآتية: نسبة الإنبات وارتفاع الشتلات (سم) وقطر الشتلات (ملم) وعدد الأوراق للشتلات وعدد التفرعات وطول التفرعات وطول الجذور.

الجدول (1): درجات الحرارة الصغرى والعظمى والرطوبة النسبية خلال موسم النمو 2008 و 2009.
Table (1): Maximum and minimum temperature and rate humidity during season growth 2008and 2009.

معدل الرطوبة النسبية % Rate % humidity%	درجات الحرارة العظمى م Temperate maximum	درجات الحرارة الصغرى م Temperate minimum		الشهر Month	السنة year
27	39.8	21.6	June	حزيران	2008
28	42.1	25.7	July	تموز	2
27	45.1	27.3	August	آب	3
34	38.1	20.2	September	أيلول	4
52	30.7	16.2	October	تشرين الأول	5
59	18.9	6.3	November	تشرين الثاني	6
65	14.3	0.5	December	كانون الأول	7
31	40.6	23.4	June	حزيران	2009
25	43.7	27.1	July	تموز	2
31	43.3	26.3	August	آب	3
29	38.8	20.9	September	أيلول	4
40	32.6	15.5	October	تشرين الأول	5
53	23.0	8.0	November	تشرين الثاني	6
64	13.3	0.9	December	كانون الأول	7

* أخذت البيانات من دائرة الأنواء الجوية العراقية في الرشيدية

النتائج والمناقشة

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود فروقات معنوية في نسب الإنبات بين المعاملات ويتبين من الجدول (2) إن أعلى نسبة إنبات حصلت عند معاملة الظل 50% حيث تفوقت معنويًا على المعاملة المكشوفة ومعاملة الظل 75% والتي تفوقت هي الأخرى على المعاملة المكشوفة. وكان للموسم النمو تأثيرا غير معنويًا في نسبة الإنبات بالرغم من أن موسم النمو 2008 أعطى أعلى نسبة إنبات بلغت 56.55%. وفي حالة التداخل بين المواسم وتاثير الظل فان أعلى نسبة إنبات كانت في المعاملة الظل 50% في موسم النمو 2008. ويتبين أيضاً من الجدول (2) إن للظل تأثير معنوي في عدد الأوراق المتكونة على الشتلات وقد أعطت المعاملة المكشوفة أعلى معدل في عدد الأوراق والتي تفوقت معنويًا على معاملة الظل 50% ولم تختلف معنويًا مع معاملة الظل 75%. أما بالنسبة لتأثير الموسم كان هناك اختلاف معنوي حيث تفوق موسم النمو 2008 معنويًا على موسم النمو 2009 في عدد الأوراق المتكونة على الشتلات وقد يعود السبب إلى العوامل البيئية من حرارة ورطوبة. أما بالنسبة إلى التداخل بين الظل والموسم فان معاملة الشمس في موسم النمو 2008 أعطت أعلى عدد من الأوراق وهذا يتفق مع نتائج Darnell و Ferree (1983). ويلاحظ من الجدول نفسه أن للظل تأثير معنوي في طول ساق الشتلات وكان أعلى معدل لطول ساق الشتلات في معاملة الظل 75% التي تفوقت معنويًا على معاملتي الشمس والظل 50% التي تفوقت هي الأخرى على معاملة الشمس في هذه الصفة، وقد يعود السبب إلى تثبيط الضوء لاستطالة الساق من خلال تقليل مستوى الجبرلينات الداخلية المتوفرة في النبات. ذكر Devlin (1975) أن للضوء تأثير مثبط لاستطالة الساق عند مقارنة النباتات النامية في الضوء مع النباتات النامية في الظلام. وهذا يتفق مع ما ذكره Poole و Conover (1977) في نبات *Ficus benjamina*. أما بالنسبة لتأثير الموسم فان المعاملتين لم تختلفا معنويًا فيما بينهما في هذه الصفة ولموسمي النمو 2008 و 2009.

وبالنسبة للتداخل بين الظل والموسم فان أعلى معدل في طول الساق كان في معاملة الظل 75% في موسم النمو 2008. وتشير النتائج الموضحة في الجدول (2) أن للظل تأثيراً معنويًا في قطر الساق وان أعلى معدل حصل عليه في هذه الصفة كانت في المعاملة المكشوفة والتي تفوقت معنويًا على معاملة الظل 50% و

75% التي لم تختلفا معنويًا فيما بينهما في هذه الصفة. وهذا يتفق مع نتائج Chaudhry (2001) في شتلات- *Acacia nilotica*, *Prosopis cineraria*, *Leucaena leucocephala*, *Eucalypts*- *camaldulensis* و لا يتفق مع نتائج Conover و Poole (1977) في *Ficus benjamina*. أما بالنسبة لتأثير الموسم فان الموسمين لم تختلف معنويًا فيما بينهما في هذه الصفة. وكان للتدخل بين الموسم والظل تأثير معنوي في قطر ساق الشتلات وان معاملة الشمس في موسم النمو 2007 أعطت أعلى القيم في هذه الصفة.

الجدول (2): تأثير الظل وموسم النمو على النمو الخضري لشتلات البشمرة.

Table (2): Effect of shade and growth season on growth vegetative of logout seedlings.

تأثير الموسم Season effect	الظل Shade			الموسم Season	الصفات المدروسة Measurements
	ظل Shade %75	ظل Shade %50	شمس Sun		
56.85 a	49.55 b	77.50 a	43.500 c	2008	نسبة الابتهاج Termination %
55.13 a	47.70 b	75.70 a	42.00 c	2009	
	48.62 b	76.60 a	42.75 c	تأثير الظل Shade effect	
6.90 a	6.51 b	6.60 b	7.95 a	2008	عدد الأوراق Leave number
5.71 b	6.33 b c	5.24 c	5.30 c	2009	
	6.42 a b	5.92 b	7.07 a	تأثير الظل Shade effect	
11.70 a	14.56 a	10.6 b	6.41 c	2008	طول الساق stem length
10.7 a	14.06 a	12.0 a b	5.90 c	2009	
	14.3 a	11.3 b	6.02 c	تأثير الظل Shade effect	
2.30 a	2.13 b	2.30 a b	2.55 a	2008	قطر الساق stem diameter
2.15 a	2.07 b	2.07 b	2.21 a b	2009	
	2.100 b	2.20 b	2.50 a	تأثير الظل Shade effect	

القيم ذات الأحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلاتها كل على إنفراد لا تختلف معنويًا" حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 5%.

ويلاحظ من الجدول (3) أيضاً أن للظل تأثير معنوي في عدد التفرعات المكونة على الشتلات وان معاملة الشمس أعطت أعلى القيم في هذه الصفة التي تفوقت معنويًا على معاملتي الظل 50% والظل 75% على التوالي. وهذا يتفق مع نتائج Palme و Jackson (1977) في أشجار التفاح وهذا لا يتفق مع نتائج Collard وآخرون (1977) في التفاح. وقد يعود السبب إلى تعرض النباتات لشدة إضاءة عالية لها دور في النتائج المتحصل عليها من خلال الأكسدة الضوئية للأوكسجينات (عبدول، 1987). وبالنسبة إلى تأثير الموسم فان موسم النمو 2008 أعطى أعلى معدل في هذه الصفة وتتفوق معنويًا على موسم النمو 2009 وقد يعود السبب إلى العوامل البيئية من حرارة ورطوبة. أما بالنسبة للتدخل فان معاملة الشمس أعطت أعلى القيم في هذه الصفة في موسم النمو 2009. ويلاحظ من الجدول نفسه أن للظل تأثير معنوي في طول التفرعات المكونة على الشتلات وقد أعطت معاملة الشمس أعلى القيم في طول التفرعات المكونة على الشتلات. وكان لموسم النمو تأثير معنوي في هذه الصفة وتتفوق موسم النمو 2009 معنويًا على موسم النمو 2008 في هذه الصفة وقد يعود السبب إلى العوامل البيئية من حرارة ورطوبة. ويتبين أيضًا أن للتدخل تأثير معنوي

في طول التفرعات المكونة على الشتلات وكان أعلى معدل في معاملة الشمس في موسم النمو 2009. وهذه النتائج تتفق مع ما توصل إليه Lakso (1992) في طول التفرعات المكونة. وتشير النتائج الموضحة في الجدول (3) أن للظل والموسم والتدخل بينهما تأثير غير معنوي في طول الجذور المكونة على الشتلات في البشمرة بالرغم من أن معاملة الشمس وكذلك موسم النمو 2009 والتدخل بين الشمس وموسم النمو 2009 أعطت أعلى معدل في هذه الصفة. أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي لمعاملات التظليل و الموسمي النمو 2008 و 2009 والتدخل بينهما على إنبات بذور الينكي الدنيا (البشمرة) (نمو الشتلات (طول الساق وقطر الساق وعدد الأوراق وعدد التفرعات وطول التفرعات وطول الجذور).

الجدول (3): تأثير الظل وموسم النمو على عدد التفرعات وطولها وطول الجذور المكونة على شتلات البشمرة.

Table : (3) Effect of shade and growth season on numbers branch, length branch and length root of logout seedlings.

تأثير الموسم Season effect	الظل Shade			الموسم Season	الصفات المدروسة Measurements
	ظل Shade %75	ظل Shade %50	شمس Sun		
0.35 a	0.00 c	0.00 d	1.07 b	2008	عدد التفرعات branch number
030 b	0.00 f	0.00 e	1.10 a	2009	
	0.00 c	0.00 b	1.08 a	تأثير الظل Shade effect	
0.86 b	0.00 d	0.00c	3.45 b	2008	طول التفرعات branch length
0.91 a	0.00 f	0.00 e	3.62 a	2009	
	0 .00 c	0.00 b	3.54 a	تأثير الظل Shade effect	
18.05 a	18.15 a	17.70 a	18.80 a	2008	طول الجذور Root length
16.80 a	16.200 a	17.14 a	17.41 a	2009	
	17.28 a	17.42 a	18.11 a	تأثير الظل Shade effect	

القيم ذات الأحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخلاتها كل على إنفراد لا تختلف معنويًا" حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 5%.

وان معاملة التظليل 50% لموسم النمو 2008 كانت المعاملة الأفضل بين المعاملات في نسبة الإنبات بينما معاملة الشمس لموسم النمو 2008 هي الأفضل في عدد الأوراق وقطر الساق وطول الجذور. ولعدد التفرعات وطولها لموسم النمو 2009 ومعاملة التظليل 75% هي الأفضل في طول الساق لموسم النمو 2008.

EFFECT OF SHADING IN SEEDS GERMINATION AND GROWTH OF SEEDLINGS LOGUAT *Eriobotrya japonica lindl.*

Suliman M.Kako Al-
Zebari

Hort. Dept, College of
Agriculture, Dohuk Univ.

Yaseen M. Abdulla

Tech. Institute of Erbil

Genan Y. D. Yuosif

Tech. Institute of Mosul

E-mail: d.sulaimankako@yahoo.com

ABSTRACT

This study were conducted in the Nursery of the Technical Institute/Mosul/Iraq, during two growing seasons 2008and 2009, to study the effect of shading percentage (zero, 50% and 75%) from the total sun light on germination of seeds and their effect on growth (stem length, stem diameter, leaves number, number of branches, length of branches, length of roots) by used color green plastic (Saran). The results indicated that are significant effects of shading treatments for two growing seasons 2008 and 2009 and the interaction between them on germination of Loquat seeds and their effect on growth (stem length, stem diameter, leaves number, number of branches, length of branches, length of roots). The treatment of shading percentage (50%) in 2008 growing season was the best treatment which gave the highest means in germination of seeds as compared with the other treatment, but the sun treatment in 2008 growing season was the best treatment in (stem length, stem diameter, leaves number, length of roots and number of branches and their lengths in 2009 grown season) The treatment of sun shading percentage in 2008 growing season was the best treatment in stem length.

Key words: Shading, germination, Loquat. *Eriobotrya japonica*.

Received: 6/9/2011 Accepted: 9/4/2012

المصادر

- أغا, جواد ذنون وداود عبدالله داود. (1991) إنتاج الفاكهة المستديمة الخضراء. الجزء الثاني, دار الكتب للطباعة والنشر, جامعة الموصل, العراق.
- حسن, طه الشيخ (1998) أشجار الفاكهة في بلاد العرب زراعتها, أصنافها, خدمتها وفوائدها. دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة, دمشق, سوريا.
- الخفاجي, مكي علوان, سهيل عليوي عطرة وعلاء عبد الرزاق محمد (1990) الفاكهة المستديمة الخضراء. جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العراق.
- عبدول, كرييم صالح (1987) منظمات النمو النباتية الجزء الأول. مديرية دار الكتب للطباعة والنشر, جامعة الموصل.
- عثمان, عبد الفتاح, محمد نظيف حاج وأبو زيد محمود عطا الله (1998) محاصيل الفاكهة المستديمة الخضراء والمتساقطة الأوراق, منشأة المعارف بالإسكندرية, مصر.
- Anonymous (2001) User's Guide: Statistics, Release Edition. SAS Institute Inc. Cary, NC. USA.
- Asada T. and M. Ogasawara (1997) Effect of shading on shoot formation in young apple (*Malus pumila*) trees. *Bulletin of The Faculty of Agriculture Hirosaki University*. No. 60 : 1-10
- Collard, R. C., J. N. Joiner, C. A. Conover & D.B. Mc Connell (1977). Influence of shade and fertilizer on light compensation point of *ficus benjamina* L. *Journal American Society Horticulture Science* 102 (4): 447-449.
- Conover, C. A. & R. T. Poole (1977). Effect of cultural practices on acclimatization of *Ficus benjamina* L. *American. Society Horticulture Science* 102 (5): 529-531.
- Conover, C. A. & R. T. Poole (1978). How shade and fertilizer levels affect acclimatization. *American Nursery* 107 (10): 90-93.

- Chaudhry, Abdul Khaliq (2001). Effect of shade on growth performance of four tree species: post field planting. *Pakistan journal of Agriculture Science.* 38 (3-4).
- Darnell R. L. and D. C. Ferree (1983) The Influence of environment on apple Tree growth, leaf wax formation, and foliar absorption. *American Society Horticulture Science 108 (3): 506-511*
- Devlin, R. M. (1975). Plant Physiology, Third Edition Divan. No. Strand Company. New York.
- Honjo H., Asakura T. and F. Kamota (1992). Effect of light intensity on current growth and flowering in the next spring of the Japanese pear (*Pyrus pyrifolia*) cultivar. "Hosui" *Bulletin of the Fruit Tree Research Station, Japan.* 23: 67-76.
- Jackson J. E. and J. W. Palmer (1977) Effects of shade on growth and cropping of apple trees. I. Experimental details and effects on vegetative growth. *Journal of Horticultural Science* 52:245-252.
- Pathak, R. K, AND H. O. Gautam (1985) Loguat. In Fruits of India. Tropical and Subtropical (ed. T. K. Bose) Naya Froash. India.
- Lakso A. N. (1992) The simplified dry matter production model for apple: estimation of canopy photosynthesis in discontinuous canopies. *Acta Horticulture.* 313: 45-50.
- Lindhagen M. (1996) Branching In Young Apple Trees (*Malus domestica* Borkh) In Relation To Irradiance and Temperature. Alnarp (Sweden).SLU. P.27.
- Taskin M. and S. Erdal (2011) Utilization of waste loquat (*Eriobotrya japonica* Lindl.) kernel extract for a new cheap substrate for fungal fermentations. *Romanian Biotechnological Letters.* 16, (1).