

## تأثير بذور الحلبة وورق الزيتون في بعض الصفات الفسلجية لأمهات الدجاج البياض

صائب يونس عبد الرحمن

رؤى ناظم شهاب العبيدي

قسم الثروة الحيوانية / كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل

Saebyounis@yahoo.com

### الخلاصة

أجريت هذه الدراسة على آباء وأمهات دجاج بياض من نوع ISA\_BROWN لمعرفة تأثيرات بذور الحلبة وورق الزيتون في الأداء الفسلجي . استخدمت طيور بعمر 84 أسبوع قسمت الى 3 مجاميع كل مجموعة ضمت (6 مكررات ) ( 5دجاجة /ديك) لكل مكرر، وربيت طيور المعاملة الاولى على عليقة قياسية، والمعاملة الثانية على عليقة قياسية مضاف إليها 10غم/ كغم عليقة مجروش بذور الحلبة ، والمعاملة الثالثة على عليقة قياسية مضاف إليها 10 غم/ كغم عليقة مجروش ورق الزيتون ، وأستمرت المعاملات يومياً لمدة 8 أسابيع ، تم سحب نماذج الدم في نهاية الاسبوع الرابع (الفترة الاولى ) وفي نهاية الاسبوع الثامن (الفترة الثانية) من التجربة ، بينت النتائج أن المعاملة ببذور الحلبة وورق الزيتون أدت الى تحسين الأداء الفسلجي في آباء وأمهات الدجاج البياض من خلال تحسين صفات الدم حيث أرتفع معنوياً العدد الكلي لخلايا الدم الحمر، تركيز الهيموكلوبين وحجم الخلايا المرصوفة وتحسنت مقاييس الدم معنوياً ، وتوقفت معاملة بذور الحلبة وورق الزيتون في النسبة المئوية للخلايا اللمفاوية ، وفي قيم زمن التخثر، وعدد الأقراص الدموية ، وأنخفضت النسبة المئوية للخلايا المتغايرة ، والنسبة المئوية للخلايا المتغايرة / الخلايا اللمفاوية مقارنة مع مجموعة السيطرة ، وتوقفت الذكور في معظم الصفات الدموية معنوياً مقارنة مع الإناث وكانت أفضل التداخلات في معاملات بذور الحلبة وورق الزيتون وعند مستوى احتمال ( $p \leq 0.05$ ).  
كلمات الدالة : بذور الحلبة ، ورق الزيتون ، الصفات الفسلجية ، امهات دجاج البياض

تاريخ تسلم البحث 2012 /2/15 وقبوله 2012 /4/30

### المقدمة

تعد حقول الآباء من المصادر الرئيسية لتجهيز الدجاج البياض وبالنظر الى طبيعة برامج التغذية والرعاية في مثل هذه الحقول فان هذه الآباء أصبحت عرضة لحالات الأذى التأكسدي الناجمة عن طبيعة التغذية والفعاليات الفسلجية لهذه الطيور مما دفع الباحثين الى تعزيز مستوى مضادات الأكسدة (خليل، 2003) وذلك من خلال استخدام الإضافات العلفية النباتية التي تحسن من كفاءة استخدام الغذاء والأداء الفسلجي بدلاً من المضادات الحيوية والهرمونات (Abbas، 2010). ورافق أتباع طرق التحسين الوراثي انخفاض كبير في مناعة الطيور ومقاومتها للأمراض وأدى الى زيادة إصابتها بالأمراض (Saif وآخرون، 2003) والأمراض التي تنتج بسبب عدم أنتظام عمليات الأيض مثل الحبن (Ascitis) ومتلازمة الموت المفاجئ (SDS) (Sudden Death Syndrome) ومتلازمة نزف الكبد الدهني في الدجاج البياض من أهم هذه المشاكل وتعرف بـ (FIHS) (Fatty liver haemorrhagic syndrome) (Gonzales وآخرون، 2000) و القطان ، 2006) ، ورافق التطور في صناعة الدواجن تغير في الكثير من الوظائف الفسلجية للدواجن وهذا يتطلب دراسة وفهم العمليات الفسلجية التي تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية (الحسني ، 2000) لذلك لابد من إرساء علمية لصناعة الدواجن ومعالجة المشكلات التي تواجهها (القيم وآخرون ، 2002) ، وهذا أدى الى التوجه لأستخدام بعض النباتات الطبية التي تستخدم كمضادات للأكسدة (Wangenstein وآخرون، 2004) ، ولإضافة بذور الحلبة وأوراق الزيتون الى علائق الدواجن الكلمات الدالة: بذور الحلبة ، ورق الزيتون ، الصفات الفسلجية، أمهات دجاج البياض.

أهمية كبيرة من حيث تحسين في الأداء الفسلجي فضلاً عن تحسن حالة مضادات الأكسدة في الدجاج البياض (القطان، 2006) ، وقد أشار عبد الرحمن (1995) الى أن بذور الحلبة وورق الزيتون أو مستخلصاتهما يمكن أن تعمل كمادة مضادة للأكسدة . وتحتوي بذور الحلبة وأوراق الزيتون على الزيوت الضرورية التي تستخدم كمضادات حيوية بدل المضادات الحيوية والهرمونات الصناعية ذات التأثيرات الجانبية السيئة لصحة الإنسان والحيوان (Abbas، 2010) وبسبب الكلفة العالية والتأثيرات الصحية السيئة فأن معظم دول العالم

البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني

قد حرمتم استخدام الهرمونات الصناعية (Hussein, 1996 و Chowdhury وآخرون ، 2004 ) ، بالإضافة الى قابلية هذه النباتات على تحسين معامل التحويل الغذائي وزيادة وزن الذبيحة وبذلك تقلل من العمر عند التسويق وخفض كلفة التربية (Javed وآخرون ، 2009) . هدفت الدراسة الحالية الى معرفة تأثيرات إضافة مجروش بذور الحلبة وورق الزيتون الى علائق أمهات الدجاج البياض في بعض الصفات الفسلجية لأمهات الدجاج البياض.

#### مواد البحث وطرائقه

أستخدم في هذه الدراسة آباء وأمهات الدجاج البياض نوع ISA Brown 90 دجاجة و18 ديك بعمر 84 أسبوع ، ربيت في قاعة من النوع نصف المفتوح تحت ظروف التربية القياسية و غذية الطيور على عليقة إنتاجية وقدم العلف وفق الدليل المقدم من شركة ISA Brown وحسبت مكونات العليقة وتركيبها الكيماوي وفق ما قرره المجلس الوطني للأبحاث (N.R.C) (1994) ، بنسبة بروتين 18.31% أما الطاقة المحسوبة فبلغت 2837.9 كيلوسعرة / كغم . وقد قسمت الى 3 معاملات وكانت مجاميع المعاملات كما يلي:  
1-معاملة السيطرة T<sub>1</sub>: غذيت طيور مجموعة السيطرة على العليقة القياسية وبواقع (125 غرام/طير/يوم) وضمت 30 دجاجة معدل الوزن (0.06 ± 0.04) كغم و6 ديك معدل الوزن (3.59 ± 0.07) كغم .  
2- معاملة بذور الحلبة T<sub>2</sub> : غذيت طيور مجموعة بذور الحلبة على العليقة القياسية مضاف إليها مجروش بذور الحلبة (10 غرام/كغم عليقة) وبواقع (125 غرام/طير/يوم) وضمت 30 دجاجة معدل الوزن (2.00 ± 0.045) كغم و6 ديك معدل الوزن (3.30 ± 0.12) كغم.  
3- معاملة ورق الزيتون T<sub>3</sub> : غذيت طيور مجموعة ورق الزيتون على العليقة القياسية مضاف إليها مجروش ورق الزيتون (10 غرام/كغم عليقة) وبواقع (125 غرام/طير/يوم) وضمت 30 دجاجة معدل الوزن (2.00 ± 0.036) كغم و6 ديك معدل الوزن (3.30 ± 0.09) كغم .  
وكانت تداخلات المعاملات كمايلي: T<sub>1</sub>: السيطرة للفترة الاولى ذكور ، T<sub>2</sub>: السيطرة للفترة الاولى إناث ، T<sub>3</sub>:سيطرة للفترة الثانية ذكور ، T<sub>4</sub>:سيطرة للفترة الثانية إناث ، T<sub>5</sub>:حلبة للفترة الاولى ذكور ، T<sub>6</sub>:حلبة للفترة الاولى إناث ، T<sub>7</sub>:حلبة للفترة الثانية ذكور ، T<sub>8</sub>: حلبة للفترة الثانية إناث ، T<sub>9</sub>: ورق زيتون للفترة الاولى ذكور ، T<sub>10</sub>: ورق زيتون للفترة الاولى إناث ، T<sub>11</sub>: ورق زيتون للفترة الثانية ذكور ، T<sub>12</sub>: ورق الزيتون للفترة الثانية إناث .

جمعت نماذج الدم في نهاية الأسبوعين الرابع (الفترة الاولى) والثامن (الفترة الثانية) من الدراسة ، إذ تم سحب 5مل من الدم مباشرة من منطقة الوريد الجناحي ( wing vein ) بواسطة أبرة طبية سعة 5مل بعد تعقيم منطقة السحب ، وقسم الدم الى قسمين القسم الأول وضع في أنابيب زجاجية خالية من مانع التخثر لغرض الحصول على مصل الدم ، ووضع الأنابيب في الثلجة ثم بعد ذلك تم فصل المصل بواسطة جهاز الطرد المركزي وبسرعة 3000دورة / دقيقة لمدة 15 دقيقة وحفظت نماذج مصل الدم بدرجة (-20/ م °) لحين إجراء الفحوصات الكيموحيوية والقسم الثاني وضع في أنابيب بلاستيكية حاوية على مانع تخثر k2-EDTA بتركيز 1ملغم/1مللتر لغرض إجراء الفحوصات الفسلجية للدم .

تمت دراسة الصفات الفسلجية الآتية: العدد الكلي لخلايا الدم الحمر (R.B.C.) ، العدد الكلي لخلايا الدم البيض (W.B.C.) ، العدد التفريقي لخلايا الدم البيض (D.L.C.) ، عدد الصفائح الدموية Thrombocytes Count وتم حسابها وفق ماجاء في Campbell (1995) وحجم الخلايا المرصوصة (P.C.V) ، نسبة الخلايا المتغايرة /اللمفاوية (H / L Ratio) ، تركيز الهيموكلوبين (Hb) ، معدل حجم الكرية (M.C.V) ، معدل هيموكلوبين الكرية (M.C.H.) ، معدل تركيز هيموكلوبين الكرية (M.C.H.C.) ، معدل ترسيب خلايا الدم الحمر (E.S.R.) ، زمن التخثر Clotting time إذ تم حسابه وفق Jain (1986) . أجري التحليل الإحصائي باستخدام التصميم العشوائي الكامل (CRD) وباستخدام تجربة عاملية ذات ثلاثة عوامل في هذه التجربة للبيانات الخاصة بمعايير الدم الفسلجية ضمن برنامج التحليل الإحصائي الجاهز SAS (2001) لتحليل البيانات ، ولاختبار معنوية الفروقات بين المتوسطات فقد استعمل اختبار دنكن متعدد الحدود Duncan's (multiple range Test) (Steel و Torrie ، 1980 )

#### النتائج والمناقشة

يتضح من الجدول ( 1 ) وجود تفوق معنوي لقيم العدد الكلي لخلايا الدم الحمر (RBC) والهيموكلوبين (Hb) وحجم خلايا الدم المرصوصة (PCV %) في الذكور مقارنة مع الإناث ، وأنعكس

ذلك على الأرتفاع المعنوي لمعدل هيموكلوبين الكرية (MCH) معدل هيموكلوبين الكرية (MCHC) وأنخفاض معدل حجم الكرية (MCV) في الذكور مقارنة مع الإناث عند مستوى احتمال ( $p \leq 0.05$ ) ، كذلك يتضح من الجدول ( 1 ) عدم وجود تأثير معنوي للفترات في صفات الدم ، بينما أدت المعاملة ببذور الحلبة وورق الزيتون الى أرتفاع معنوي في RBC و Hb و PCV % وأنخفاض معنوي في MCH , MCV مقارنة مع مجموعة السيطرة وأنخفاض MCHC معنوياً في معاملة الحلبة مقارنة مع مجموعة السيطرة . ويتبين من الجدول (2) أفضل نتائج التداخل المعنوية في RBC و Hb في المعاملات (5 و 7 و 9 و 11) التي شملت المعاملة بالحلبة وورق الزيتون للذكور في الفترتين وفي حجم خلايا الدم المرصوفة PCV % ظهرت أفضل التداخلات في المعاملتين ( 5 و 7) وكانت للذكور المعاملة بالحلبة في الفترتين الأولى والثانية ، وبالنسبة لصفة MCV فقد تفوقت المعاملة الثانية معنوياً عند مستوى احتمال ( $p \leq 0.05$ ) (سيطرة إناث في الفترة الأولى) ، فيما يخص MCH حققت المعاملة الأولى زيادة معنوية ( $p \leq 0.05$ ) (سيطرة ذكور في الفترة الأولى) ، في حين سجلت أعلى التداخلات في صفة MCH في المعاملات (1 و 3 و 5 و 7 و 9 و 11) والتي كانت لصالح الذكور في الفترتين ( الأولى والثانية) ولمعاملات السيطرة والحلبة والزيتون .

تعتبر الفحوصات الدموية من أحد الطرق المهمة في معرفة صحة الطيور وأهمها معرفة العدد الكلي لخلايا الدم الحمر والبيض ونسبة الخلايا المتغيرة الى الخلايا للمفاوية في معاملات الحلبة وورق الزيتون مقارنة مع مجموعة السيطرة ، وجاءت نتائج الدراسة الحالية متفقة مع ما أشار إليه بكر (2010) في دجاج ISA-Brown عند استخدامه المستخلصات المائية للنباتات (الشاي الأخضر واليانسون) حيث أدى الى تفوق معنوي في عدد خلايا الدم الحمر وتركيز الهيموكلوبين مقارنة مع مجموعة السيطرة وعند مستوى معنوية ( $p \leq 0.05$ ) من خلال تقليل الجهد التأكسدي الذي تتعرض له خلايا الدم الحمر في الدم نتيجة لفعل الجذور الحرة من خلال دور كل من الشاي الأخضر ونبات اليانسون التي تعمل كمضادات للأكسدة وأحتوائها العديد من العناصر المعدنية والفيتامينات . وأشار الباحث صلاح (2008) في دراسته على آباء فروج اللحم أن المعاملة ببذور الحلبة أدت الى أرتفاع معنوي في العدد الكلي لخلايا الدم الحمر (RBC) والهيموكلوبين (Hb) وحجم خلايا الدم المرصوفة (PCV%) مقارنة مع المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين و فيتامين A و C ، وربما يعود ذلك الى تأثير المواد التي تعمل كمضادات للأكسدة والتي توجد في بذور الحلبة وورق الزيتون والتي تساعد على تقوية أغشية الخلايا من خلال تكوين مركبات معقدة مع الحوامض الدهنية لأغشية الخلايا (Erin وآخرون، 1984) ويرفع نسب الصفات الفسلجية في الدم الجدول (1) : تأثير الجنس والفترة والمعاملة ببذور الحلبة وورق الزيتون في بعض الصفات الدموية في آباء و أمهات الدجاج البياض ( المعدل  $\pm$  SE ) :

Table (1): Effect of sex ,period ,fenugreek seeds and olive leaves treatment on some hematological characters in laying hen breeders:

نسبة معدل هيموكلوبين الكرية % M.C.H.C	معدل هيموكلوبين الكرية (pg) M.C.H	معدل حجم الكرية مايكرون M.C.V	حجم خلايا الدم المرصوفة % Packed Cell Volume	تركيز الهيموكلوبين غرام/100مل دم Hemoglobin Concentration	العدد الكلي لخلايا الدم الحمر خلية/ملم <sup>3</sup> × 10 <sup>6</sup> Red Blood Cells	الصفات Characters	
						المعاملات Treatment	
39.70a 0.71 ±	40.21a 0.93 ±	101.89b 1.97 ±	30.32a 0.60 ±	11.94a 0.24 ±	3.02 a 0.08 ±	ذكور Males	الجنس sex
25.30b 0.63 ±	28.21b 0.60 ±	111.6a 2.44 ±	28.77b 0.44 ±	7.25b 0.12 ±	2.60b 0.06 ±	إناث Females	
32.80a 1.38 ±	34.32a 1.24 ±	106.3a 2.39 ±	29.69a 0.56 ±	9.70a 0.44 ±	2.82a 0.08 ±	الأولى 1 <sup>st</sup> period	الفترات periods
32.61a 1.40 ±	34.43a 1.33 ±	106.92a 2.32 ±	29.44a 0.53 ±	9.62a 0.43 ±	2.80a 0.08 ±	الثانية 2 <sup>st</sup> period	
33.98a 1.76 ±	37.64a 1.83 ±	112.75a 2.72 ±	26.00b 0.31 ±	8.73b 0.42 ±	2.33b 0.06 ±	سيطرة Control	المعاملات treatments
31.13b 1.63 ±	31.89b 1.26 ±	103.04b 2.60 ±	31.87a 0.47 ±	10.05a 0.57 ±	3.10a 0.08 ±	حلبة 10 غم/كغم Fenugreek	
33.00ab 1.69 ±	33.60b 1.36 ±	104.11b 2.95 ±	30.8a 0.46 ±	10.21a 0.56 ±	3.00a 0.07 ±	زيتون 10 غم/كغم Olive leaves	

\*الحروف المختلفة عمودياً تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال ( $p \leq 0.05$ ).

الجدول (2) : تأثير معاملات التداخل لكل من الجنس والفترة والمعاملة في بعض الصفات الدموية في آباء و أمهات الدجاج البياض ( المعدل  $\pm$  SE ):

Table (2):Effect of interaction of sex , period and treatment on some hematological characters in laying hen breeders:

نسبة معدل هيموكلوبين الكرية M.C.H.C%	معدل هيموكلوبين الكرية (pg) بيكوغرام M.C.H	معدل حجم الكرية (fm) M.C.V	حجم خلايا الدم المرصوصة % Packed Cell Volume	تركيز الهيموكلوبين غرام /100مل دم Hemoglobin Concentration	العدد الكلي لخلايا الدم الحمر خلية/ <sup>3</sup> ملم <sup>3</sup> Red <sup>6</sup> 10 Blood Cells	الصفات Characters  المعاملات Treatment
42.55a 1.66 $\pm$	44.17a 2.44 $\pm$	106.69abc 5.14 $\pm$	26.33b 0.55 $\pm$	10.90b 0.37 $\pm$	2.50bcd 0.14 $\pm$	التداخل Interaction
						T (1)
26.41b 1.46 $\pm$	31.18c 1.88 $\pm$	118.74a 6.22 $\pm$	26.00d 0.96 $\pm$	6.80c 0.15 $\pm$	2.21d 0.11 $\pm$	T (2)
38.74a 2.61 $\pm$	42.63ab 3.38 $\pm$	110.34abc 5.06 $\pm$	25.71b 0.42 $\pm$	9.94b 0.6 $\pm$	2.36cd 0.12 $\pm$	T (3)
26.13b 1.32 $\pm$	30.55c 2.74 $\pm$	116.23ab 5.09 $\pm$	26.00c 0.70 $\pm$	6.76c 0.18 $\pm$	2.26d 0.14 $\pm$	T (4)
37.58a 0.81 $\pm$	37.45b 0.68 $\pm$	99.49bc 4.16 $\pm$	34.00a 0.51 $\pm$	12.76a 0.23 $\pm$	3.41a 0.10 $\pm$	T (5)
24.34b 1.45 $\pm$	26.24c 0.21 $\pm$	106.43bc 6.74 $\pm$	30.33 bc 0.80 $\pm$	7.38c 0.31 $\pm$	2.81b 0.11 $\pm$	T (6)
38.80a 1.82 $\pm$	37.63b 1.80 $\pm$	97.36c 3.9 2 $\pm$	33.00a 0.85 $\pm$	12.73a 0.32 $\pm$	3.40a 0.11 $\pm$	T (7)
23.79b 1.82 $\pm$	26.23c 0.53 $\pm$	108.88abc 5.36 $\pm$	30.16cd 0.47 $\pm$	7.33c 0.30 $\pm$	2.79b 0.09 $\pm$	T (8)
40.13a 1.34 $\pm$	39.68ab 1.40 $\pm$	98.77bc 4.11 $\pm$	32.00b 0.81 $\pm$	12.86a 0.27 $\pm$	3.26a 0.14 $\pm$	T (9)
25.79b 2.02 $\pm$	27.18c 0.83 $\pm$	108.00abc 6.58 $\pm$	29.50c 0.95 $\pm$	7.53c 0.41 $\pm$	2.75b 0.08 $\pm$	T (10)
40.59a 1.22 $\pm$	39.29ab 1.82 $\pm$	97.26c 5.30 $\pm$	31.66abc 0.98 $\pm$	12.80a 0.16 $\pm$	3.28a 0.12 $\pm$	T (11)
25.50b 1.46 $\pm$	28.24c 0.71 $\pm$	112.42abc 6.30 $\pm$	30.16b 0.79 $\pm$	7.65c 0.31 $\pm$	2.71bc 0.11 $\pm$	T (12)

\*الحروف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال ( $p \leq 0.05$ ).

(Tappel, 1980) حيث تثبط من تأثير المواد المؤكسدة وتمنع تأثيراتها وهذا ينعكس بالمحافظة على مستويات المعايير الدموية قيد الدراسة إذ أن الدم يتكون في نخاع العظام والذي يعتبر من أكبر الأعضاء الموجودة في الجسم ، حيث أن الخلية الجذعية هي النواة الأساسية التي تتكون منها خلايا الدم الحمر والصفائح الدموية والتي قد تتعرض للتحلل نتيجة لتناول بعض الأدوية أو نتيجة الإصابة بالخمج (Ganong ، 1991 ) ، وتزداد حساسية خلايا الدم الحمر للتحلل عند نقص بعض الأنزيمات أو المواد الضرورية اللازمة للمحافظة على ثبات أغشية الخلايا الحمر ، وأن المواد المؤكسدة قد تؤدي إلى تلف Hb وتكون ترسبات داخل الخلايا الحمر تدعى أجسام هينز (Heinz bodies) ويعمل على تحلل خلايا الدم الحمر وبالتالي انخفاض الحاصل في خلايا الدم الحمر (RBC) والهيموكلوبين (Hb) وحجم خلايا الدم المرصوصة (PCV%) (Jain ، 1989) والذي ينعكس على الأرتفاع في معدل حجم الكرية MCV ومعدل هيموكلوبين الكرية MCH الذي يحدث بسبب تحفز نخاع العظم الذي يعمل على تكوين وإضافة خلايا دم حمر غير مكتملة النضج إلى الدم محاولة تعويض النقص الحاصل في RBC (Robert ، 1977) ، ويعزز ذلك الأرتباط المعنوي السالب بين RBC وكل من MCH و MCHC (صلاح، 2008). وقد أشار Kandil and EL-Kadi (1986) إلى أن الخلايا اللمفاوية يزداد عددها نتيجة زيادة الاستجابة

المناعية التي تتطور مع تقدم العمر. ولم تتفق نتائج الدراسة الحالية مع كل من القطان (1998) الحمداني (2002) في الأرانب ، والنعمي (1999) في دراسته على فروج اللحم ، والباحث Gupta وآخرون (1992) الذين أشاروا إلى أن إعطاء أوراق الحلبة الخضراء إلى الجرذان أدى إلى خفض العدد الكلي لكريات الدم الحمر بسبب أحتواء بذور الحلبة على مادة الصابونين Saponin والتي تسبب تحلل كريات الدم الحمر (سعد الدين ، 1986). ويلاحظ من الجدول (3) عدم وجود فرق معنوي في النسبة المئوية لعدد الخلايا اللمفاوية و المتغايرة و الحمضة والقعدة للذكور مقارنة مع الإناث ولكن لوحظ هنالك تفوق معنوي للذكور في النسبة المئوية للخلايا المتغايرة / الخلايا اللمفاوية في الذكور مقارنة مع الإناث ، ويتبين من الجدول (3) أنخفاض معنوي في النسبة المئوية للخلايا المتغايرة / الخلايا اللمفاوية في الذكور مقارنة مع الإناث ، ويلاحظ من الجدول (3) عدم وجود أي تأثير معنوي للفترات في معايير الدم المدروسة ، ويتبين من الجدول (3) وجود تفوق معنوي في المعاملة ببذور الحلبة وورق الزيتون في النسبة المئوية للخلايا اللمفاوية مقارنة مع مجموعة السيطرة ، وأنخفضت النسبة المئوية للخلايا المتغايرة في مجاميع المعاملات مقارنة مع مجموعة السيطرة وبشكل معنوي ، ولم يلاحظ أي فرق معنوي في المعاملات في النسب المئوية لكل من الخلايا الحمضة ، الوحيدة النواة والقعدة مقارنة مع مجموعة السيطرة ،

الجدول (3) : تأثير الجنس والفترة والمعاملة ببذور الحلبة وورق الزيتون في العدد التفريقي لخلايا الدم البيض في آباء و أمهات الدجاج البيض ( المعدل  $\pm$  SE ) :

Table (3):Effect of sex ,period ,fenugreek seeds and olive leaves treatment on D.L.C in laying hen breeders:

المعاملات Treatment	الصفات Characters						
	% الخلايا المتغايرة إلى الخلايا اللمفاوية H/L	% الخلايا القعدة Basophilic cell	% الخلايا الوحيدة النواة Monocytes cells	% الخلايا الحمضة Eosinophils cells	% الخلايا المتغايرة Hetrophilis cells	% الخلايا اللمفاوية Lymphocytes cells	
الجنس sex	0.27b 0.01±	1.32a 0.12±	9.89a 0.27±	2.67a 0.16±	18.57b 0.84±	67.59a 0.76 ±	ذكور Males
	0.31a 0.01±	1.05a 0.12±	8.68b 0.29±	2.20a 0.17±	18.51b 0.69±	67.11a 0.74 ±	إناث Females
الفترات periods	0.28a 0.01±	1.19a 0.12±	9.36a 0.36±	2.41a 0.15±	20.13a 0.72±	67.69a 0.72±	الأولى 1 <sup>st</sup> period
	0.30a 0.01±	1.19a 0.13±	9.25a 0.27±	2.47a 0.18±	19.27a 0.87±	67.02a 0.78±	الثانية 2 <sup>st</sup> period
المعاملات treatments	0.40a 0.01±	1.16a 0.14±	9.33a 0.38±	2.25a 0.19±	25.29a 0.76±	62.04b 0.74±	سيطرة Control
	0.23b 0.006±	1.20a 0.17±	9.29a 0.42±	2.50a 0.20±	17.04b 0.43±	70.00a 0.29 ±	حلبة 10غم/كغم Fenugreek
	0.23b 0.006±	1.20a 0.15±	9.29a 0.29±	2.58a 0.23±	16.79b 0.39±	70.04a 0.34±	زيتون 10غم/كغم Olive leaves

\*الحروف المختلفة عمودياً تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال ( $p \leq 0.05$ ).

ويتبين من الجدول (4) أن أفضل التداخلات في % للخلايا اللمفاوية كانت في المعاملات (5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12) التي تشمل المعاملة ببذور الحلبة وورق الزيتون للجنسين وللفترتين مقارنة مع تداخلات السيطرة ، وترافق ذلك مع تحسين النسبة المئوية للخلايا المتغايرة التي أنخفضت في هذه المعاملات وكانت أقل القيم معنوياً في المعاملة (9) الخاصة بمعاملة ورق الزيتون للذكور في الفترة الأولى وأنعكس ذلك على تحسن نتائج التداخلات معنوياً في المعاملات المذكورة في صفة النسبة المئوية للخلايا المتغايرة / الخلايا اللمفاوية . وكانت أفضل النتائج في التداخلات في صفة الخلايا الوحيدة النواة في معاملة الحلبة للذكور في الفترة الثانية .

تبين النتائج الموضحة في الجدول (3) أن المعاملة ببذور الحلبة وورق الزيتون حسنت من المستويات الطبيعية للنسب التفريقية لخلايا الدم البيض ونسبة الخلايا المتغايرة / الخلايا اللمفاوية مقارنة مع مجموعة السيطرة وأن هذا التحسن المعنوي قد يكون نتيجة لوجود المواد المضادة للأوكسدة الخلوية ، وأن تأثير

المعاملات في النسبة التفريقية لخلايا الدم البيض جاءت متفقة مع ما توصل إليه صلاح (2008) حيث لاحظ أن معاملة ذكور أمهات فروج اللحم ببيروكسيد الهيدروجين أدت الى ارتفاع معنوي في نسبة الخلايا المتغايرة /الخلايا اللمفاوية مقارنة مع معاملات الحلبة وفيتامين A و C بسبب تأثير الأجهاد المحدث في الطيور من خلال التأثير على الجذور الحرة الناتجة من المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين والذي يعكس على النسبة المئوية للخلايا المتغايرة الى الخلايا اللمفاوية ، وقد تم تقييم التأثير الوقائي لمستخلص بذور الحلبة الغني بمتعدد الفينول poly phenol ضد بيروكسيد الهيدروجين المحدث للأكسدة عند الأشخاص الطبيعيين والمرضى بداء السكر (Kaviarasan وآخرون ، 2004) . وأكد Liew وآخرون (2003) حصول ارتفاع معنوي في خلايا الدم البيض عند تعريض فروج اللحم للأجهاد . وبينت النتائج أن خلاصة بذور الحلبة تحوي مضادات للأكسدة تحمي التركيب الخلوي من مزار الأكسدة ، وبذلك فقد أعطت هذه النتائج دعماً للتأثير النافع لبذور الحلبة عند استخدامها داخل الجسم ( Kaviarasan and Anuradha ، 2007 )  
الجدول (4) : تأثير معاملات التداخل لكل من الجنس والفترة والمعاملة في العدد التفريقي لخلايا الدم البيض في آباء و أمهات الدجاج البياض ( المعدل  $\pm$  SE ):

Table (4):Effect of interaction of sex , period and treatment on D.L.C in laying hen breeders:

\*الحروف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال ( $p \leq 0.05$ ).

الصفات المعاملات Treatment	الخلايا اللمفاوية Lymphocytes cells	الخلايا المتغايرة Hetrophilis cells	الخلايا الحمضة Eosinophils cells	الخلايا الوحيدة النواة Monocytes cells	الخلايا القعدة Basophis cell	% الخلايا المتغايرة إلى الخلايا اللمفاوية H/L
التداخل Interaction	64.83 b 1.85 ±	21.83 b 1.16±	2.33 a 0.33±	9.83 ab 1.01±	1.16 a 0.40±	0.33 b 0.02±
T (1)	61.00 c 1.15±	26.50 a 1.11±	2.33 a 0.49±	9.00 ab 1.03±	1.16 a 0.03±	0.43 a 0.02±
T (2)	60.85 c 1.37±	26.42 a 1.71±	2.14 a 0.40±	9.57 ab 0.57±	1.28 a 0.18±	0.43 a 0.03±
T (3)	61.60 c 0.97±	26.40 a 1.16±	2.20 a 0.37±	8.80 ab 0.37±	1.00 a 0.31±	0.42 a 0.02±
T (4)	70.50 a 0.56±	15.66 def 0.55±	2.50 a 0.22±	10.00 ab 0.73±	1.33 a 0.33±	0.21 c 0.007 ±
T (5)	69.33 a 0.49±	18.66 c 0.49±	2.16 a 0.47±	8.66 ab 0.98±	1.16 a 0.30±	0.26 c 0.007 ±
T (6)	70.00 a 0.73±	15.16 ef 0.79±	3.00 a 0.51±	10.50 a 0.67±	1.33 a 0.33±	0.21 c 0.01±
T (7)	70.16 a 0.60±	18.66 c 0.42±	2.33 a 0.42±	8.00 b 0.73±	1.00 a 0.44±	0.26 c 0.005 ±
T (8)	70.66 a 0.88±	15.00 f 0.51±	3.16 a 0.30±	9.50 ab 0.50±	1.33 a 0.33±	0.20 c 0.009 ±
T (9)	69.83 a 0.60±	18.00 cde 0.44±	2.00 a 0.36±	9.16 ab 0.54±	1.00 a 0.25±	0.25 c 0.008 ±
T (10)	69.83 a 0.70±	15.66 def 0.71±	3.00 a 0.51±	10.00 ab 0.73±	1.50 a 0.34±	0.22 c 0.01±
T (11)	69.83 a 0.70±	18.50 cd 0.42±	2.16 a 0.54±	8.50 ab 0.56±	1.00 a 0.36±	0.26 c 0.008 ±
T (12)						

وأشار الباحث Siegal (1980) إلى أن حالات الإجهاد التي تتعرض لها الطيور تؤدي إلى زيادة إفراز هرمون المحرض لكثرة الكظر من الغدة النخامية وهرمون الكورتيكوستيرون من قشرة الكظر وهذا يؤدي إلى زيادة العدد الكلي لخلايا الدم البيض ونسبة الخلايا المتغايرة وأنخفاض نسبة الخلايا اللمفاوية ، ويتعزز هذا من خلال ملاحظة وجود معامل ارتباط معنوي سالب بين العدد الكلي لخلايا الدم البيض ونسبة

الخلايا اللمفاوية (Campbell ، 1995) ، ومعامل ارتباط معنوي موجب بين العدد الكلي لخلايا الدم البيض ونسبة الخلايا المتغايرة ونسبة الخلايا المتغايرة / الخلايا اللمفاوية ، ومعامل ارتباط معنوي سالب بين نسبة الخلايا اللمفاوية والعدد الكلي لخلايا الدم البيض ونسبة الخلايا المتغايرة / الخلايا اللمفاوية (صلاح ، 2008) . وأوضح Siegal و Gould (1983) أن قيمة نسبة الخلايا المتغايرة / الخلايا اللمفية هي أحد المقاييس المهمة في الكشف عن مستوى الإجهاد الذي تتعرض له الطيور ، حيث إن الخلايا اللمفية والمتغايرة هي أكثر أنواع الخلايا البيض تأثراً بالظروف الأجهادية التي تتعرض لها الطيور وتتغير أعدادها نتيجة لعوامل الإجهاد.

ويتبين من الجدول ( 5 ) أنه لم يكن هنالك أي تأثير معنوي للجنس وللفترات وللمعاملات في العدد الكلي لخلايا الدم البيض . كذلك يوضح الجدول ( 5 ) أن قيم زمن التخثر كانت الأفضل معنوية في الذكور مقارنة مع الإناث (55.94 ثانية للذكور ، 66.85 ثانية للإناث) ، وكذلك كانت قيم زمن التخثر أفضل معنوية في معاملي بذور الحلبة وورق الزيتون (54.37 ثانية و 49.37 ثانية ) على التوالي مقارنة مع معاملة السيطرة (80.0 ثانية ) وتحت مستوى احتمال (  $p \leq 0.05$  ) . وترافق ذلك مع التحسن المعنوي في عدد الأقرص الدموية في الذكور (  $20.11 \pm 0.76 \times 10^3$  ) مقارنة مع الإناث (  $8.32 \pm 0.60 \times 10^3$  ) ، وكذلك في معاملي بذور الحلبة وورق الزيتون (  $20.45 \pm 0.64 \times 10^3$  و  $22.61 \pm 0.51 \times 10^3$  ) على التوالي مقارنة مع مجموعة السيطرة (  $14.65 \pm 0.39 \times 10^3$  ) تحت مستوى احتمال (  $p \leq 0.05$  ) .  
الجدول (5) : تأثير الجنس والفتره والمعاملة ببذور الحلبة وورق الزيتون في بعض الصفات الفسلجية في آباء وأمهات الدجاج البياض ( المعدل  $\pm$  SE ):

Table (5): Effect of sex ,period ,fenugreek seeds and olive leaves treatment on some physiological characters in laying hen breeders:

\*الحروف المختلفة عمودياً تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال (  $p \leq 0.05$  ).

عدد الصفيحات الدموية / $mm^3 \times 10^3$ Thrombocytes	زمن التخثر / ثا Clotting time	العدد الكلي لخلايا الدم البيض الف خلية / $10^3 \times$ ملم <sup>3</sup> White Blood Cells	الصفات Characters	
			المعاملات Treatment	
20.11 a 0.76±	55.94b 2.94±	18.32 a 0.39±	ذكور Males	الجنس sex
8.32 b 0.60±	66.85 a 3.44±	18.22 a 0.17±	إناث Females	
19.32 a 0.66±	63.33 a 3.22±	18.39 a 0.31±	الأولى 1 <sup>st</sup> period	الفترات periods
19.15 a 0.75±	59.16 a 3.37±	18.16 a 0.30±	الثانية 2 <sup>st</sup> period	
14.65 bc 0.39±	80.00 a 3.33±	18.25 a 0.43±	سيطرة Control	المعاملات treatments
20.45 b 0.64±	54.37 b 2.82±	18.28 a 0.38±	حلبة 10غم/كغم Fenugreek	
22.61 a 0.51±	49.37 b 2.77±	18.29 a 0.33±	زيتون 10 غرام/كغم Olive leaves	

ويتبين من الجدول ( 6 ) أنه لم يكن هنالك أي تأثير معنوي للتدخلات في العدد الكلي لخلايا الدم البيض . كذلك يوضح الجدول ( 6 ) أن قيم زمن التخثر كانت الأفضل معنوية في المعاملات (5 و 7 و 9 و 11) الخاصة بمعاملي بذور الحلبة وورق الزيتون للذكور في الفترتين وتلتها معاملات الإناث (6 و 8 و 10 و 12) في زمن التخثر . وترافق ذلك مع التحسن المعنوي في عدد الأقرص الدموية في التدخلات التي ضمن

المعاملات ( 5 و 7 و 9 و 11) الخاصة ببذور الحلبة وورق الزيتون للذكور في الفترتين . أن عدم وجود فروقات معنوية في العدد الكلي لخلايا الدم البيض للمعاملات مقارنة مع مجموعة السيطرة يوضح عدم وجود أي تأثير ضار لبذور الحلبة وورق الزيتون على الجهاز المناعي للطيور وبسبب قدرة هذه المواد المضادة للأكسدة والذي انعكس على زيادة بناء خلايا الدم ومنها الصفائح الدموية ، وأن ارتفاع عددا الأقراص الدموية في المعاملات مقارنة مع مجموعة السيطرة يتفق مع (AL-Daraji وآخرون 2002) الجدول (6) : تأثير معاملات التداخل لكل من الجنس والفترة والمعاملة في بعض الصفات الفسلجية في آباء وأمهات الدجاج البياض ( المعدل  $\pm SE$  ):

Table (6):Effect of intraction of sex , period and treatment on some physiological characters in laying hen breeders:

عددالصفائح الدموية/ $mm^3$ $10^3 \times$ Thrombocytes	زمن التخثر ثا / Clotting time	العدد الكلي لخلايا الدم البيض الف خلية/ $10^3 \times$ ملم <sup>3</sup> White Blood Cells	الصفات Characters المعاملات Treatment
15.46 d 1.01±	70.00 bc 5.00±	18.57 a 1.30±	التداخل Interaction T (1)
14.39 d 0.88±	90.00 ab 6.70±	18.07 a 0.53±	T (2)
14.24 d 0.64±	75.00 a 4.62±	18.34 a 0.96±	T (3)
14.57 d 0.66±	87.00 a 8.74±	17.95 a 0.47±	T (4)
21.99 ab 0.75±	52.50 cde 6.42±	18.84 a 1.16±	T (5)
19.21 bc 1.01±	62.50 bcd 4.60±	18.33 a 0.36±	T (6)
21.90 ab 1.47±	47,50 de 6.02±	17.63 a 0.91±	T (7)
18.70 c 1.46±	55.00 cde 5.00±	18.33 a 0.42±	T (8)
23.99 a 0.97±	45.00 bcde 5.47±	18.19 a 0.63±	T (9)
20.90 abc 0.53±	60.00 bcde 5.47±	18.33 a 0.44±	T (10)
24.04 a 1.03±	42.50 e 4.60±	18.34 a 1.12±	T (11)
21.51 abc 0.97±	50.00 de 5.00±	18.29 a 0.41±	T (12)

\*الحروف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال ( $p \leq 0.05$ ). الذي أشار الى أن تعزيز حالة مضادات الأكسدة في أمهات فروج اللحم فاوبرو أدى الى ارتفاع معنوي في عدد الأقراص الدموية وتتفق مع صلاح (2008) الذي أشار الى أن المعاملة ببذور الحلبة ترفع النسبة المئوية للصفائح الدموية وتخفض زمن التخثر معنويًا مقارنة مع مجموعة السيطرة والمعاملة ببيروكسيد الهيدروجين التي أنخفضت فيها النسبة المئوية للصفائح الدموية وأزداد زمن التخثر مقارنة مع معاملات الحلبة وفيتامين C ومجموعة السيطرة وذلك لقدرتها على إزالة المركبات الوسطية الفعالة للأوكسجين (Oberley , Loven ,1985) .

## FFECT OF FENUGREEK SEEDS AND OLIVE LEAVES ON SOME PHYSIOLOGICAL CHARACTERS OF LAYING HEN BREEDERS

Saeb Younis Abdul-Rahman                      Ruaa Nathem Shihab Al-Obaidy  
Animal Resources Dept. College of Agric. & Forestry Mosul University / Iraq  
Email: Saebyounis@yahoo.com

### ABSTRACT

This study was conducted on laying hen breeders ( ISA Brown ) to study the effect of Fenugreek seeds and Olive leaves on the physiological performance . 90 hens and 18 cocks (84 weeks age) were divided into 3 groups 16 replicates : 5 hens +1 cock each) , The groups .Were treated daily for 8 weeks as following: 1<sup>st</sup> group reared on standard ration .2<sup>nd</sup> reared on standard ration supplemented with crushed Fenugreek seeds (10 gm/kg ration) . 3<sup>rd</sup> reared on standard ration supplemented with crushed Olive leaves (10 gm/kg ration). Blood samples were collected at the end of 4<sup>th</sup> week (1<sup>st</sup> period) and 8<sup>th</sup> week (2<sup>nd</sup> period) .

Results revealed that treatment with Fenugreek seeds and Olive leaves improved the physiological performance of layer hen breeders , and showed a significant increase in RBCs ,Hb , PCV % and blood indicis , also treatments caused an improvement in lymphocyte % , clotting time , thrombocytes count, H/L ratio as compared with control . In regard to the sex , the hematological parameters were better in males as compared with females The best results for the interaction effects were recorded in interaction of Fenugreek seeds and Olive leaves treated group at (P ≤ 0.05) .

Key Words: Fenugreek seed, Olive leaves, Reproductive Performance , Laying hen breeders .

Received: 15\2\ 2012: Accepted: 30 /4 / 2012

### المصادر

- بكر، أركان برع محمد (2010) . تأثير المستخلصات المائية النباتية الشاي الاخضر والينسون على الاداء الانتاجي والفسلجي والتغيرات النسجية والميكروبية للأمعاء الدقيقة لدجاج البيض وفروج اللحم . أطروحة دكتوراه . علوم الثروة الحيوانية (فسلجة طيور داجنة) . كلية الزراعة جامعة تكريت .
- الجميلي، طارق خلف حسن(2010).تقييم تأثير البرامج المختلفة للفشلش الأجارى في الأداء الإنتاجى وبعض الصفات الفسلجية للدجاج البياض .(أطروحة دكتوراه). علوم الثروة الحيوانية (إدارة حيوان) .كلية الزراعة والغابات - جامعة الموصل .
- الحسني ، ضياء حسن (2000) . فسلجة الطيور الداجنة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد . دار الكتب للطباعة والنشر بغداد .
- الحمداني ، خالد حساني سلطان (2002) . تأثير ورق الزيتون وبذور الحلبة في بعض الصفات الفسلجية والإنتاجية في الأرانب . رسالة ماجستير ، كلية الزراعة والغابات - جامعة الموصل .
- خليل ، محمد فاضل محمد علي ، (2003) . تأثير الإجهاد الحراري في بعض الصفات الإنتاجية والفسلجية في أمهات فروج اللحم والنسل الناتج . (أطروحة دكتوراه) ، كلية الزراعة والغابات ، جامعة الموصل .
- سعد الدين ، شروق محمد كاظم (1986) . الاعشاب الطبية . دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة والاعلام ، الطبعة الاولى.
- صلاح ، سنان عصام الدين (2008) . تأثير استخدام فيناميني A و C وبذور الحلبة في بعض الصفات الفسلجية والانسجية لذكور أمهات فروج اللحم . رسالة ماجستير . علوم الثرو الحيوانية (فسلجة طيور داجنة ) . كلية الزراعة والغابات- جامعة الموصل .

- عبد الرحمن ، صائب يونس (1995) . تأثير الجوع وداء السكر التجريبي على مستويات الكلوتاثيون وزناخة الدهن في أنسجة الجردان ، (أطروحة دكتوراه) ، كلية الطب البيطري ، جامعة الموصل .
- القطان ، منتهى محمود داود (1998) . تأثير بعض النباتات المخفضة لكوكوز الدم (بذور الحلبة ، ورق الزيتون) في بعض الصفات الفسلجية ومعامل التحويل الغذائي للارانب . (رسالة ماجستير) كلية الزراعة والغابات ، جامعة الموصل .
- القطان ، منتهى محمود داود (2006) . تأثير استخدام بعض مضادات الأكسدة في الأداء الإنتاجي وبعض الصفات الفسلجية في الدجاج البياض . أطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة والغابات - جامعة الموصل .
- القيم ، ماجدة عبد الخالق ، العذاري ، عبد المطلب كريم وتوما ، باسم شابا (2002) . تخفيض نسبة الكوليسترول في بيض المائدة باستخدام بذور الحلبة ، مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري ، 1(2) : 77-70 .
- النعيمي ، سعد محمد علي (1999) . تأثير بعض النباتات المخفضة لكلوكوز الدم في بعض الصفات الفسلجية والكيميائية الحياتية ومعامل التحويل الغذائي لدجاج اللحم . رسالة ماجستير ، كلية الزراعة والغابات - جامعة الموصل .
- Abbas , Rabia J. . (2010) . Effect of using fenugreek, parsley and Sweet basil seeds as feed additives on the performance of broiler chickens. . Department of Animal Production, College of Agriculture, University of Basra, Basra, Iraq . *International Journal of Poultry Science* 9 (3): 278-282.
- Al-Daraji, H. J. ; B.T. O. Al-Tikriti and A. A. Al-Rawi (2002) . Study of the hematological traits of indigenous cocks reared during summer months . *The Iraqi Journal of Agriculture Science.* , 33 (2) : 233-238.
- Anonymous. (1994) . Nutrient Requirement Of Poultry . National Research Council . National Academy Press , Washington D.C.
- Anonymous.( 2002 ). Statistical Analysis Systems. Software, V.9, SAS Institute, Cary, NC.
- Campbell, T. W. (1995) . Avian Hematology and Cytology . Second Edition,. lowe State Press . C.
- Chowdhury, V.S., M. Noshibori, and Y. Yoshimura. (2004). Changes of the Mrna expression of TGF $\beta$  receptor types II and III in the interior pituitary during induced molting in hens. *Journal of Poultry Science* 41:140-146.
- EL-Kadi,A. and O. Kandil.(1986). The effect of *Nigella sativa* (the black seed) on immunity . Presented at the 4th International Conference On Islamic Medicine.Karachi , Pakistan , November.
- Erin, A. N. ; M. M. Spirin ; L. V. Tabidzc and V. E. Kagan (1984) . Formation of  $\alpha$ -tocopherol complexes with fatty acids ahypothetical mechanisum of stabilization of biomembranes by vitamin E . *Biological Chemical. Biological Physical Acta* 774 : 96-102 .
- Ganong, W. F. (1991) . Review Of Medical Physiology. Appleton and Lange , Connecticut Department Of Physiology University Of California SanFrancisco ,California .
- Gonzales, A. J. M. ; M. E. S. Oporta ; A. Pro-Martinez and Y. C. Lopezcoello (2000) . Feed restriction and salbutamol to control ascites syndrome in broilers : 1-productive performance and carcass traits . *Publicado Como Articulo en Agrociencia* 34 : 283-292 .

- Gonzales, E; J. Buyse ; M. M. Loddi ; T. S. Takite ; N. Buys and E. Decuypere (1998) . Performance, Incidence of metabolic disturbances and endocrine variables of food metabolic disturbances -restricted male broiler chickens . British. *Poultry Science.*, 39 : 671-678 .
- Gupta, K. ; G. P. Barta ; D. S. Wable and K. S. Dhindsa (1992) . Effect of conventional and non-conventional green leafy vegetable on hematological indices and blood constituents of rats . *Journal of Food Science.* (Abstract) 29 (3) : 182-184 .
- Hussein, A. S., (1996).Induced moulting procedures in laying fowl . *World's Poultry Science Journal.* 52:175-187.
- Jain, N. (1986) . Ced : Schalms Veterinary Hematology. lea and Febiger , U.S.A., pp. 267-282 .
- Jain, S. K. (1989) . The neonatal erythrocyte and its oxidative susceptibility . *Seminars in Hematology* , 26 : 268-300 .
- Javed, M., F.R. Durrani, A. Hafees, R.U. Khan and I. Ahmad,( 2009). Effect of aqueous extract of plant mixture on carcass quality of broiler chicks. *ARPN Journal of Agriculture Biology Science.*, 4: 37-40.
- Kaviarasan, S., and C.V. Anuradha. (2007). Fenugreek (*Trigonella foenum graecum*) seed polyphenols protect liver from alcohol toxicity: a role on hepatic detoxification system and apoptosis. *Phamazie.* 62(4):299-304.
- Kaviarasan, S., Vijayalakshmi, K., CV. Anuradha, (2004). Poly- phenol rich extract of fenugreek seeds protect erythrocytes from oxidation damage. *Plant Foods Human Nutrition.* Fall; 59(4):143-7.
- Loven, D. P. and L. W. Oberley, (1985) . Free radicals, insulin action and diabetes. In : , Superoxide Dismutase And Disease State . Oberley L. W, Boca Ratan. FL, CRC . pp. 151 – 190 .
- Robert, S. H. (1977) . Acute blood loss anemia . In : . Hematology Willims , W. J. ; Bentten E. ; Ers, Lev. A. J. ; Rundles, R. W. McGraw Hill Book Company , Blackstone Publications, USA , pp. 618-621 .
- Saif, Y. M. ; H. J. Barnes ; A. M. Fadly ; J. R. Glisson ; L. R. Mc Dougald and D. E. Swagne (2003) . Disease Of Poultry 11th ed . Iowa State Press . Blackwell Publishing Company . USA .
- Siegal, H. S. (1980) . Physiological stress in birds . *Biology Science.* 30 : 529-534.
- Siegal, H. S. and N. R. Gould (1983) . High temperature and corticosteroid in the lymphocytes of domestic fowl . *GEN. Comp. Endocrinol.* , 48 : 348-354 .
- Steel ,R.G.D., and J.H. Torrie.(1980). Principles and Procedures Of Statistics .2nd . ed . Mc Graw- Hill Book Co., Inc. New York , NY . Sturkie , P.D. 1976 .
- Tappel, A. L. (1980) . Vitamin E and selenium protection from in Vitro peroxidation . *Annals of the New York Academy of Sciences,* 355:18-28.
- Wangensteen , H.; Samuelsen , A.B. and K.E. Malterud , (2004). Antioxidant activity in extracts from Cariander .*Food Chemistry* .88:293-297.