

Annls Soc. Entomol. Belg. 56: 351-352. 1912
 Assemblée mensuelle du 5^e ^{octobre} ~~septembre~~ 1912
 31-X-1912

[31 Oct. 1912]
 351

FOURMIS DES HAUTES FAGNES

par J. Bondroit

Je crois utile de publier les quelques documents que j'ai rassemblés sur la faune myrmécologique des Hautes Fagnes. A vrai dire, ils ne contiennent pas grand'chose de neuf, M. A. REICHENSBERGER, de Bonn, ayant publié un intéressant travail sur les *Formicidæ* de la Province Rhénane, mais ils préciseront l'intérêt de la région au point de vue zoogéographique.

Les espèces marquées d'un astérisque sont des reliques glaciaires.

PONERINÆ

Ponera coarctata LATR. — Ça et là; ne paraît pas rare.

MYRMICINÆ

Myrmica lævinodis NYL. — c. c. Sexués en août, septembre et octobre.

Myrmica ruginodis NYL. — c. c. Sexués en août, septembre et octobre.

Myrmica scabrinodis NYL. — c. c. Sexués en août, septembre et octobre.

(*Myrmica rugulosa* NYL. — Nassogne.)

Myrmica Schencki EM. — a. r. Fagnes et rochers.

**Myrmica sulcinodis* NYL. — Stavelot, r. r.

**Myrmica lobicornis Arduennæ* BONDR. — Hockai, r. r.

Myrmecina graminicola LATR. — Pas rare.

(*Leptothorax unifasciatus* LATR. — Houffalize, Province Rhénane.)

(*Leptothorax tuberum* F. — Province Rhénane [REICHENSBERGER].)

(*Leptothorax corticalis* SCHENCK. — Province Rhénane.)

(*Leptothorax interruptus* SCHENCK. — Province Rhénane.)

Leptothorax Nylanderi FOERST. — Aix-la-Chapelle (FOERSTER).

Leptothorax nigriceps MAYR. — Hockai, Remouchamps, Prusse. Sous les écorces et dans les interstices des rocailles.

Leptothorax muscorum NYL. — Hockai, dans les rocailles, r.

Leptothorax acervorum F. — Sous les écorces et dans les rocailles, sexués en août et septembre, c. c.

Stenammas Westwoodi WESTW. — Pas rare.

Tetramorium cæspitum L. — a. c.

Formicoxenus nitidulus NYL. — Francorchamps, avec *F. rufa* L., Aix-la-Chapelle (FOERSTER), sans doute pas rare.

(*Strongylognathus testaceus* SCHENCK. — Province Rhénane.)

(*Anergates atratulus* SCHENCK. — Province Rhénane.)

DOLICHODERINÆ

(*Dolichoderus quadripunctatus* L. — Prusse.)

Tapinoma erraticum LATR. — Houffalize, Hautes Fagnes (REICHENSBERGER).

FORMICINÆ

Lasius niger L. — c. c.

(*Lasius alienus* FOERSTER, Aix-la-Chapelle [FOERSTER].)

N'ayant encore trouvé le *L. alienus* que dans la région calcaire, où il abonde, je ne pense pas qu'il se prenne dans les Fagnes.

(*Lasius brunneus* LATR. — Spa.)

Lasius flavus DE G. — c. c., sexués en août et septembre.

(*Lasius umbratus* NYL. — Province Rhénane.)

Lasius mixtus NYL. — Hockai, une ♀.

(*Lasius affinis* SCHENCK. — Province Rhénane.)

**Lasius bicornis* FOERSTER. — Aix-la-Chapelle (FOERSTER), Hautes Fagnes, une ♀.

Lasius fuliginosus LATR. — Pas rare.

Formica sanguinea LATR. — c. c.

**Formica exsecta* NYL. — Signalée d'Aix-la-Chapelle par FOERSTER; il s'agit sans doute de la *F. exsecto-pressilabris*.

**Formica exsecto-pressilabris* FOR. — c. c. dans les bois et les fagnes, ailés en août, septembre.

**Formica pressilabris* NYL. — Ça et là, ailés en août et septembre.

Formica rufa L. — c. dans les bois.

Formica pratensis DE G. — c. dans les bois.

Formica pratensis var. *nigricans* EM. — Hertogenwald.

Formica fusca L. — c. c. sexués en août et septembre.

(*Formica cunicularia* LATR. — Nassogne.)

**Formica picea* NYL. — Pas rare, dans les Fagnes.

(*Polyergus rufescens* LATR. — Province Rhénane, Grand Duché de Luxembourg.)

**Camponotus herculeanus* L. — Province Rhénane, Hockai.

Camponotus ligniperda LATR. — Cité des Hautes Fagnes par M. LAMEERE, sans doute par erreur.