

*W. G. H. H. H.*

NOUVELLES FOURMIS DES PHILIPPINES

Par CARLO MENOZZI

*Chiavari, Italy*

Separate from

THE PHILIPPINE JOURNAL OF SCIENCE

Published by the Bureau of Science of the Philippine Government

Manila, P. I.

VOLUME 28, No. 3, NOVEMBER, 1925

MANILA  
BUREAU OF PRINTING  
1925

212263

## NOUVELLES FOURMIS DES PHILIPPINES

Par CARLO MENOZZI

*Chiavari, Italy*

UNE PLANCHE

Les intéressantes fourmis décrites ci-dessous m'on été communiquées ou données par M. C. F. Baker, professeur aux Philippine College of Agriculture de Los Baños, que en remercie bien vivement. Elles montrent que la faune myrmecologique des Iles Philippines est encore assez peu.

## DORYLINÆ

*Aenictus bakeri* sp. nov.

*Mâle*.—Brun roussâtre; pattes, mandibules, antennes roux brunâtre clair. Pilosité dressée, sur les mandibules, les scapes et les pattes, et d'un couleur jaunâtre. Pubescence assez dense sur les funicules, sur les côtés du thorax et sur l'abdomen. Lisse et luisant surtout sur la tête et le thorax, avec une fine ponctuation pilifère.

Tête, avec les yeux, d'un tiers plus large que longue fortement concave en devant, à bord cervical légèrement convexe, et l'antérieur faiblement échancré au milieu. Derrière la tête, les bords de l'occiput sont à peu près droits fort convergent vers l'articulation, et prolongées en un col. Les mandibules deux fois plus longues que la largeur de la tête, et environ cinq fois plus longues que leur largeur maxime; subcylindrique, presque droites dans leur moitié basale se recourbent assez dans leur tiers terminal qui finit en pointe aigue. Fossettes antennaires profondes, occupant à peu près la moitié de l'espace entre les yeux et les arêtes frontal. Celles-ci se terminent au niveau du milieu des yeux. Scape fortement comprimé dans son moitié distale, environs une fois plus long que large, atteint l'ocelle postérieur. Premier article du funicule presque deux fois plus long que épais, les deux suivantes à peine plus épais que longs, tous les autres, excepté le dernier, beaucoup plus épais que longs. Yeux grands et occupant tout les côtés de la tête. Ocelles, assez grands, perché sur une eminence du vertex; l'intervalle qui sépare l'ocelles laté-

raux du median est près de deux fois plus large que leur diamètre, et celui qui le sépare des yeux plus de trois fois.

Thorax ainsi large que la tête; pronotum très courte, peu convexe devant; mesonotum dirigé horizontalement d'arrière en avant, deux fois plus long que large; scutellum assez proéminent; face declive de l'épinotum vertical, et un peu cachée sous le scutellum. Noeud du pédicule bien plus large que long, les bords latéraux convexes, relevés, et peu prolongés en arrière, face supérieure fortement concave.

Gastre cylindrique, non plus épais que le thorax. Stipites de l'armure génitale triangulaires, les volselle glabre, étroites et beaucoup plus longue que les valvules de la paramère interne, lesquels sont parallèles et longuement bifurqué.

Pattes courtes; cuisses brusquement et fortement renflées dans leur tiers distal.

Ailes enfumées de brun roussâtre.

Long. 7.3 mill.

Iligan, Lanao, Mindanao.

Je ne crois pas faire erreur en rattachant cette forme à *A. punctiventris* Em. dont il diffère par sa taille plus grande, par ses ocelles perché sur une éminence du vertex, mais surtout par la conformation de sa tête (voir la fig. 1).

*Stictoponera stylata* sp. nov.

*Ouvrière*.—Corps couleur de poix; epistome, mandibules, antennes, hanches, tibias, et tarses roux brunâtre clair, cuisses brun foncé. Pilosité des pattes et antennes pas très longue, clairsemés et de couleur roussâtre. Assez luisante. Sculpture consistant en points-fossettes très grossiers, assez confluentes sur la tête et le thorax, plus espacés sur le pétiole et le postpétiole dont est en partie, postérieurement, lisse comme le reste de l'abdomen. Une pubescence courte sort des fossettes, et ne se remarque guère que de profil.

Tête beaucoup plus large derrière que devant, environ un tiers plus longue que large, profondément et largement échan-crée à son bord occipital, avec les angles postérieur fort saillants. Mandibules triangulaires, submates, espacement striées. Epistome rugueux, fortement empréssionée le long du bord antérieur qui est avancé en pointe, au milieu, sur la bouche. Aire frontale petite mais bien distincte. Arêtes frontales écartées l'une de l'autre et faiblement sinuées. Le scape dépasse le bord occipital d'un tiers, sa moitié distale est plus épaisse que l'autre moitié laquelle est un peu arquée. Les articles 1 à 7 du funicle sont

bien plus longs que épais, les trois suivants à peu près subégaux, l'article terminal est plus de deux fois et demi ainsi long qu'épais. Yeux fortement bombés, et placés au dessus du milieu des côtés de la tête.

Dos du thorax médiocrement convexe; suture promésonotale et mésoépinotale imprimées par un très faible sillon mais bien visible. Le pronotum à deux épaules distinctes, subdentiformes, ainsi long que large. Mésonotum une fois et demi plus long que large. Profil de l'épinotum faiblement anguleux; la face basale derrière est ainsi large que longue, plane, et d'une moitié plus courte que la déclive; celle-ci descend en pente douce, avec ses bords très nets. Pétiole  $\frac{1}{4}$  plus long que large, derrière il est  $\frac{1}{3}$  plus large que devant; les côtés convergents en avant dans leur tiers antérieur; vu de profil la face supérieure de cet article est fort convexe et s'abaisse fortement en arrière; le dessous présente vers l'articulation antérieure une large appendice triangulaire dirigée en avant. Article du postpétiole beaucoup plus large et  $\frac{1}{3}$  plus long que le pétiole, avec les côtés convexe; la face antérieure tronqué et uni à celle inférieure par un angle aigu.

Premier article du gastre plus large que long, presque ainsi large que la moitié de la longueur du postpétiole.

Hanche de pattes postérieures armée d'une courte épine.

Long. 8.7 mill.

Mount Maquiling, Laguna, Luzon.

Cette espèce diffère de *S. biroï* Em. par sa plus grande taille (5.5 mill. en *S. biroï*), par la tête plus long que large, par les yeux déplacés en arrière du milieu des côtés de la tête, et par la grande appendice au dessous du pétiole.

*Trapeziopelta philippinensis* sp. nov.

*Ouvrière*.—D'un brun de poix ca et la un peu roussâtre; mandibules, antennes, épistome, arêtes frontales, pattes, et extrémité de l'abdomen roussâtre. Partout des gros points espacés; le mesonotum, l'épinotum, et le pédicule fortement striées longitudinalement et mats, le reste sans sculpture fondamental et luisante. Une pilosité fine, pas très longue, abondante sur la tête, scapes et pattes, très rare, mais beaucoup plus longue (environ le double) sur le reste du corps; les funicules ont une fine pubescence.

Tête (sans les mandibules) distinctement un peu plus large que longue, à côtés convexe, le bord postérieur faiblement concave. Mandibules linéaires, presque ainsi longue que la  $\frac{2}{3}$  de la tête, assez luisantes, avec quelques points d'ou sortens des poils

très fins; au delà du milieu de leur longueur le bord masticateur est armé de deux dents qui sont réunies par une crête longitudinale, depuis ces dents elles sont fortement creusées en forme de faux, munis, après l'entaillure, d'un petit dent, et finissant en pointe aiguë. Epistome formant un bord étroit le long de la bouche, surplombé par les arêtes frontales entre lesquelles il se prolonge un peu en forme de coin; la partie plus haute de l'épistome s'avance en un long lobe qui est pourvu au bord antérieur d'une profonde échancrure en demi-lune limitée latéralement par deux appendices dentiformes obliquement tronquées. Arêtes frontales relativement petits, et peu élargies en avant. Sillon frontal profond surtout en arrière, n'atteignant pas le milieu de la longueur de la tête. Le scape atteint assez exactement le bord postérieur de la tête. Articles 2 à 7 du funicule un peu plus longs que épais, les dernières quatre formant une massue bien distincte, et ils sont (excepté le dernière) un tiers plus longs que épais. Yeux bien développés, ovales et situés en avant du milieu des côtés de la tête.

Thorax étroit, un peu plus étroit que la tête; son profil dorsal faiblement convexe. Pronotum à côtés obtusament bordées, distinctement plus large que long, avec les angles antérieurs arrondis. Suture promésonotale bien distincte. Métanotum petit, plus courte que le pronotum. Suture mésoépinothale fortement imprimée et formant une ligne concave. Face declive de l'épinothum plus courte que la basale à laquelle elle passe par une courbe très peu rapide. Noeud du pédicule élevé, verticalement tronqué devant et derrière, presque ainsi long que large, à côtés un peu comprimés et parallèles; vu de profil la face supérieure de cet article est convexe et s'abaisse faiblement en avant. Postpétiole très convexe, un tiers plus large derrière que devant, ou il est de la même largeur que le pétiole; la devant et les côtés à peine convexe; le dessous présente vers l'articulation antérieure un petit dent. L'article suivant de l'abdomen plus long que le postpétiole, et bien plus large.

Long. 6.3 mill.

Tangkulan, Bukidnon, Mindanao.

Cette espèce est voisine de *T. bidens* Em., mais bien distincte par sa taille plus grande, par la sculpture de mésonotum, épinothum et du pédicule, et par le lobe médian de l'épistome plus échancré et pour cela plus distinctement bidenté. C'est la première espèce du genre habitant les Iles Philippines.

*Centromyrmex donisthorpei* sp. nov.

*Femelle*.—D'un jaune roussâtre à peine teint de brun sur la tête et le mésonotum; pattes et antennes jaunâtres sale.

Tête ovale-rectangulaire, à côtés médiocrement convexes, rétrécie devant, plus faiblement derrière, presque ainsi longue (sans les mandibules) que large, avec la face occipitale concave; submat, par une fine sousculpture, avec de nombreux points assez gros, plus confluentes sur les joues et sur le front, un peu plus espacés sur l'occiput; fossettes antennaires finement striées. Pubescence nulle; pilosité courte peu abondante et oblique. Mandibules fortement courbées en bas, lisses, à fine ponctation éparses d'ou sortent des poils dressés, bord masticateur long, finement et entièrement denticulé. Bord antérieur de l'épistome faiblement arqué, proéminent un peu en bosse devant les arêtes frontales, entre lesquelles son extrémité postérieure est longuement insinuée en con. Arêtes frontales assez écartées, avec un lobe médiocrement prononcé à leur partie antérieure. Sillon frontal fort marqué, postérieurement il atteint une large fossette triangulaire entre laquelle est placé l'ocelle impair. Le scape dépasse d'une fois son épaisseur le bord postérieur de la tête. Premier article du funicule beaucoup plus long que le suivant, tous, sauf le dernier, plus larges que long. Yeux plats, situés un peu en avant du milieu des côtés, ainsi grands que la distance qui les sépare du bord antérieur de la tête. L'intervalle entre l'ocelle antérieur et les latéraux à peine plus grand que le diamètre de ces derniers.

Pilosité du thorax encore plus courte et moins abondante que chez la tête; les gros points encore plus espacés et marquées seulement sur le scude du mesonotum, l'intervalles entre ces points presque lisses et luisant; le reste du thorax finement chagrinée. Le pronotum forme une demi-lune exacte, avec le bord antérieur tranchant et un peu saillant au milieu. Le mesonotum surplombe un peu le pronotum, et moins large que celui-ci, à peine plus long que large et bordé antérieurement. Scutellum petit, ses angles antérieurs fort prolongées en avant entre l'écaille du mesonotum et les mesopleures. Epinotum avec la face basale longue comme  $\frac{1}{4}$  de la hauteur de la déclive.

Pédicule et abdomen luisantes; le premier tout à fait lisse, le second avec des points comme chez la tête et l'écaille du mesonotum, mais beaucoup plus petits; l'un et l'autre à pilosité habituelle.

Noeud du pedicule arrondie au sommet, à face antérieure concave et postérieure convexe, un peu petiolé devant. Sous le pedicule une épine pointue.

Abdomen faiblement rétréci entre ses deux premier segments.

Ailes assez fortement enfumées de brun, densément pubescentes et à nervures brunes; trois cellules cubitales, une discoidale, et la cellule radiale fermée.

Long. 7 mill.

Iligan (19444) et Kolambugan, Mindanao; deux exemplaires.

*Euponera* (*Trachymesopus*) *myropola* sp. nov.

*Femelle*.—Jaune roussâtre, plus dilué sur les appendices; gastre brun jaunâtre. Tête et thorax opaques, finement et densément réticulé-ponctué; pedicule et gastre lisses et luisantes. Pubescence assez abondante, courte sur la tête et le thorax, plus longue sur le gastre.

Tête rectangulaire, environ un tiers plus longue que large, ainsi étroite derrière que devant, le bord postérieur droit, la face occipitale concave. Palpes maxillaires de deux articles. Mandibules luisant, lisses avec quelques petits points épars d'ou sortent des poils dressés, le bord basal ainsi long comme une moitié du bord masticateur, celui-ci armé des 7 petits dents. Epistome court, convexe et fortement carené, son bord antérieur prolongé en avant et pourvu au milieu d'une courte pointe. Le scape atteint environ le 5<sup>me</sup> ou le 6<sup>me</sup> postérieur de la tête. Articles 2 à 6 du funicule presque le double plus épais que long; l'avant dernier est encore un peu plus large que long et le dernier deux fois et demi plus long que large et à peine plus long que les deux articles précédents réunis. Yeux placés au cinquième antérieur des côtés de la tête. Sillon frontal très marqué, et atteignant l'ocelle median. Ocelles petits.

Thorax un peu plus étroit que la tête, le dos plat sur le profil. Pronotum distinctement plus long que large, sa plus grande largeur un peu en arrière du milieu. Mesonotum petit presque ainsi long que le pronotum. Scutellum et metanotum petits, ces dernier un peu enforcé et caché sous le scutellum. Face basale de l'épinotum trapézoïdale, un quart à un tiers plus large que longue, convexe d'une côte à l'autre; face declive faiblement concave au centre, les bords convexes en haut, forment un angle net mais moussé avec la face basale. Ecaïlle du pedicule ainsi haute que l'épinotum; vu de profil elle est presque ainsi large à la base qu'au sommet et deux fois plus haute que longue, le

devant convexe d'une côte à l'autre, la face postérieure concave; vu de dessus elle est deux fois plus large que longue, en demi cercle devant, concave derrière. Postpétiole postérieurement une demi fois plus large que le noeud du pétiole, et un quart plus large que long.

Gastre médiocrement étranglé entre le postpétiole et le segment suivant, celui-ci pas plus long de celui-la, mais bien plus large.

Long. 5.7 mill.

Los Baños, Laguna, Luzon.

Cette espèce est bien distincte de *E. darwini* For. et forme voisines par sa taille plus petite, par l'épistome fortement caréné et par les dents des mandibules petites. Elle est aussi moins poilue.

*Liomyrmex tagalanus* sp. nov.

*Femelle*.—Noire brunâtre; mandibules, antennes, pattes, et bord postérieur de chaque segments du gastre rouge brunâtre. Tête, thorax, pédicule, et pattes submats; gastre luisant; lisse, ou très finement chagriné, sauf le mesopleure, l'épinotum et péduncule stries; ces stries, très denses dans le pétiole et postpétiole, s'affancet peu à peu sur la face basale de l'épinotum autant que postérieurement est presque poli. Seulement quelques poils dressés autour de la bouche, et vers l'extrémité de l'abdomen. Pubescence adjacente très fine, assez abondant partout, surtout sur le thorax, scapes et pattes.

Tête rectangulaire, longue 2 mill. et large 1.6 mill., à bord occipital légèrement concave. Mandibules lisses, avec quelques points pilifères épars, très épaisses et massives, armées de 4 dents, le dernier plus robuste. Epistome convexe de haut en bas, le bord antérieur largement mais peu profondément échancré. Arêtes frontales très courtes, ne dépassant pas le niveau du bord antérieur des yeux. Fossettes antennaires profondes. Antennes des 11 articles. Le scape n'atteint pas le tiers postérieur de la tête. Premier article du funicule ainsi long que les trois suivantes, 2-6 plus du double larges que longs, les trois derniers forment une massue presque ainsi long que le  $\frac{2}{3}$  du reste de funicule. Yeux faiblement convexes, assez grands, placés un peu en avant du milieu des côtés de la tête. Ocelles situées au fond des petites fossettes.

Thorax beaucoup plus étroit que la tête, rectangulaire, deux fois et demi plus long que large à côtés presque parallèles, un peu rentrant au milieu. Pronotum court, bordé d'un arête nette.

Disque du mesonotum plus étroit en avant que en arrière, a bord antérieur arrondi, le postérieur tronqué avec les angles obliquement emussés. Le scutellum ainsi grand que la face basale de l'épinotum. Le metanotum très étroit et à peine manifeste en dessus. Les deux faces de l'épinotum subégales formant ensemble un angle très arrondi.

Le noeud du pétiole vu par dessus est deux fois plus large que long, avec les côtés prolongés en pointe en avant, assez concave d'avant en arrière et légèrement silloné en long au milieu; vu de côté il est beaucoup plus haut que long; en dessous est pourvue d'une très large appendice. Postpétiole plus large que le noeud du pétiole, un tiers plus large que long, fortement et largement concave dans la moitié antérieur; ses côtés font légèrement saillie en dehors et les angles antérieurs sont un peu prolongés en avant; au dessus on remarque un fort dent assez long, avec l'apex recourbé en arrière.

Gastre étroit, allongé et cylindrique, presque comme chez les femelles de *Solenopsis*. Pattes courtes et robuste; fémur comprimés, surtout l'antérieurs.

Ailes jaunâtres clair, à nervures brun foncé.

Long. 9.3 mill.

Kolambugan, Lanao, Mindanao.

*Vollenhovia ambitiosa* sp. nov.

*Femelle*.—D'un roux brunâtre ou d'un brun rougeâtre; membres et mandibules d'un jaune roussâtre. Pilosité à demi-couchée sur le corps et sur les membres, assez abondant, mais pas longue, passant à la pubescence et entièrement roussâtre ou d'un rouge jaunâtre. Dessus de la tête, pronotum et mesonotum (y compris les flancs des ces deux segments) sauf un espace longitudinal lisse au milieu de ce segment, régulièrement et fortement ridés reticulés; scutellum, épinotum, péduncule et gastre lisses et luisants.

Tête à peine plus longue que large; les côtés faiblement convexes, le bord postérieur presque droit, la face occipitale concave. Mandibules submates, courtes, avec quelques gros points, armées de cinq dents. Epistome étroit fortement bicaréné et creusé au milieu de son bord antérieur. Aire frontale petite mais très bien distincte et luisante. Arêtes frontales ainsi longs que une moitié de l'intervalle entre ses extrémités antérieurs. Le scape, arqué a la base, un peu épais dans sa moitié distale, atteint presque le milieu de la tête. Articles 2 à 9 du funicule bien plus larges que longs. Massue nettement des trois articles.

Les yeux situés au milieu des côtés de la tête. Ocelles petits; le médian est atteint par un sillon frontal faiblement marqué, mais large, sans sculpture et assez luisant.

Thorax non plus large que la tête. Pronotum subbordé antérieurement, à angles très nets. Face declive de l'épinotum oblique, concave, quatre fois plus longue que la face basale. Pédicule du pétiole pas plus long que son noeud; ce dernier faiblement biconcave de profil, obtus en haut, et bien plus haut que long; au dessous de l'extrémité antérieure une petite appendice comprimé. Postpétiole convexe, plus large que long, et plus bas que le noeud du pétiole; le dessous est pourvu d'un dent au bord antérieur.

Gastre relativement petit.

Long. 6.3 mill.

Tangkulan, Bukidnon, Mindanao.

Le dent au-dessous du postpétiole caractérisé très bien cette nouvelle espèce de *Vollenhovia*.

*Crematogaster* (*Physocrema*) *bakeri* sp. nov.

*Ouvrière*.—D'un brun rougeâtre clair; dessus de la tête et extrémité du gastre brunâtres. Assez luisante. Faiblement chagriné et parsemée de très petits points pilifères. Sans poils dressées, sauf une rangée le long du bord antérieur de l'épistome, le reste avec une fine pubescence adjacente éparses.

Tête carrée, un peu plus longue que large, ainsi large devant que derrière, à côtés faiblement convexes, et échancrée derrière. Mandibules fortement striées pontuées, à bord externe à peine convexe, armées de 4 (ou 5?) dents. Epistome peu convexe en avant, plus fortement en arrière, son bord antérieur arqué au milieu, échancré sur les côtés. Arêtes frontales un peu rapprochées devant, divergeant médiocrement en arrière ou elles sont prolongées jusqu'au bord antérieur des yeux. Ceux-ci ovales, plutôt petits, et placés en arrière du milieu des côtés de la tête. Le scape grêle et faiblement courbé à la base, dépasse le bord occipital d'environ deux fois son épaisseur. Articles 2 à 6 du funicule un peu plus épais que longs. Massue des trois articles. Fossettes antennaires profondes.

Promésonotum assez petit, beaucoup plus étroit que la tête et divisé de l'épinotum par un fort étranglement et par une suture mésoépinotale bien distincte. Epinotum ainsi large que la tête, et plus large, presque de  $\frac{1}{2}$  que le promésonotum; le profil est fortement convexe (gibbeux) dans sa moitié antérieure pendant que sa moitié postérieure est plane, très oblique d'arrière en

avant, et profondément concave le long de la ligne médian longitudinale. Cette concavité est prolongé un peu sur la face declive, atteignant environ la milieu de sa hauteur, laquelle est de  $\frac{1}{4}$  plus courte que la basale, avec les côtés verticales, subbordées et réunis a celles de la basale par un angle obtus. Sur les flancs de ce segment l'on remarque placé au-dessous du stigmaté une éminence cratériforme, pourvu à l'apex d'un trou subtriangulaire, et parcouru des stries convergent du bas en haut.

Pétiole ovoïde, trois fois plus long que sa plus grande largeur et concave dans sa face supérieure. Postpétiole à peine plus large que long, vu de profil il est convexe et beaucoup plus haut que le pétiole.

Gastre relativement petit. Pattes longues et grêles.

Long. 4.7 mill.

Davao, Mindanao (6947).

Je ne puis rattacher cet forme à aucune des espèces de sous-genre *Physocrema* connues; le pétiole et l'épinotum sont assez caractéristiques.

*Crematogaster* (*Atopogyne* ?) *vitalisi* sp. nov.

*Femelle*.—Tête et thorax d'un brun noirâtre; mandibules, antennes, pattes, pedicule, et gastre d'un brun jaunâtre. Pubescence jaunâtre, adjacente, longue, assez abondant sans être très dens, partout le corps. Densément et finement strié, avec des points épars; la face declive de l'épinotum et les flancs du thorax avec des striés plus grossières.

Tête bien plus longue que large, longue (sans les mandibules) 2.8 mill. et large 1.97 mill. a la hauteur des yeux; à côtés presque droit. Bord postérieur faiblement concave, et angles postérieurs très peu arrondis. Mandibules grandes, subopaques, fortement striées avec une abondante ponctuation pilifères; leur bord externe est peu courbé, le bord masticateur est concave et armé de cinq dents, plus ou moins émoussée, excepté l'apicale aigue. Epistome fortement convexe, à bord antérieur un peu avancé en lob dans son tiers médian, et biéchancré lateralement. Aire frontales indistincte. Pas de sillon frontal. Fossettes clypéales bien marquées. Arêtes frontales droit, courtes, c'est a dire, un peu moins longues que leur intervalle postérieur. Le scape qui atteint l'ocelle médian, est arqué et épaissi à l'extrémité. Premier article du funicule presque ainsi long que les deux suivantes, articles 2-6 à peine plus longs que épais. Mas-

sue des trois (ou quatre?) articles. Yeux situés au milieu des côtés de la tête.

Thorax plus étroit que la tête. Mesonotum du double plus long que large; celle-ci et le scutellum forment une faible convexité sur le profil. Face basale de l'épinotum de deux tiers plus courte que la declive et pourvu de deux petits tubercules. Pétiole petit, en ovale transverse, un peu moins de deux fois plus large que long. Postpétiole globuleux, ainsi large que long, distinctement élargi devant et rétréci en derrière, à côtés très convexes sans trace d'impression ou de sillon longitudinal.

Ailes longues, teintées de brun roussâtre, avec les nervures brunes. Une cellule cubitale et une radiale fermée.

Pattes courtes; le premier article des tarsi postérieurs peu plus long que la tibia.

Long. 8.6 mill.

Iligan, Lanao, Mindanao.

Il s'agit d'une espèce fort aberrant qui je place provisoirement dans le sous-genre *Atopogyne* pour avoir certaines affinités avec *C. (Atopogyne) depressa* Latreille.



## ILLUSTRATION

### PLANCHE 1

- FIG. 1. *Aenictus bakeri* sp. nov.; *a*, Tête de face; *b*, armure génitale de profil.
2. *Stictoponera stylata* sp. nov.; *a*, Tête de face; *b*, profil de l'épinotum et du pédicule.
3. *Trapeziopelta philippinensis* sp. nov. Tête de face.
4. *Centromyrmex donisthorpei* sp. nov.; *a*, Tête de face; *b*, épinotum et pédicule de profil.
5. *Liomyrmex tagalanus* sp. nov. Pédicule de profil.
6. *Crematogaster (Physocrema) bakeri* sp. nov. Thorax et pédicule de profil.




PLANCHE 1.