

NOTAS E INFORMAÇÕES/NOTES AND INFORMATION

SOBRE O ENCONTRO DE *CAVERNICOLA PILOSA* BARBER, 1937, NO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL

Almério de Castro Gomes*
José Luiz Alves Pereira**

RSPU-B/375

GOWES, A. de C. & PEREIRA, J. L. A. *Sobre o encontro de Cavernicola pilosa Barber, 1937, no Estado do Paraná, Brasil.* Rev. Saúde públ., S. Paulo, 11:427-8, 1977.

RESUMO: *Relata-se o encontro de Cavernicola pilosa entre gravetos existentes no terraço de um domicílio habitado, distrito de Paiquerê, município de Londrina, Estado do Paraná. Apresenta-se também a distribuição geográfica atual deste triatomíneo.*

UNITERMOS: *Triatomíneos. Cavernicola pilosa, Londrina, PR, Brasil*

Durante as investigações sobre a determinação do índice de infestação domiciliar por *Triatoma infestans*, no Distrito de Paiquerê, município de Londrina, Estado do Paraná, foi encontrado um exemplar fêmea de *Cavernicola pilosa*. Este triatomíneo estava morto entre os gravetos existentes sobre o peitoril do terraço de um domicílio habitado. Constatamos, também, que tais gravetos caíram de um orifício localizado no forro deste terraço, cujo interior servia de toca a gambás (*Didelphis*). Posteriormente, investigamos todo o forro na tentativa de encontrar mais exemplares e até mesmo um novo ecótopo para o *Cavernicola pilosa*, sem contudo obtermos sucesso.

A distribuição geográfica desta espécie compreende, além do Panamá, a Colômbia (Groot¹, 1950 e D'Alessandro e col.², 1971), Venezuela (Pifano e Ortiz³, 1952) e Brasil, assinalados nos Estados de Mato Grosso, Pará, Espírito Santo, Amazonas (Neiva & Lent⁴, 1941; Dias e col.⁵, 1942; Lent & Jurbert⁶, 1969; Almeida⁷, 1972) e agora no Paraná.

Este material encontra-se depositado na Coleção do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, sob o nº E-5523.

* Do Departamento de Patologia Geral da Universidade Estadual de Londrina e do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP — Av. Dr. Arnaldo, 715 — São Paulo, SP — Brasil.

** Acadêmico de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Londrina — Caixa Postal 2111 — Londrina, PR — Brasil.

RSPU-B/375

GOMES, A. de C. & PEREIRA, J. L. A. [On the finding of *Cavernicola pilosa* Barber, 1937, in the State of Paraná, Brazil]. *Rev. Saúde públ.*, S. Paulo, 11: 427-8, 1977.

ABSTRACT: *The occurrence of Cavernicola pilosa among brushwood in the dwelling-house terrace of Paiquerê district, county of Londrina, State of Paraná, Brazil, is described. The actual geographical distribution is also presented.*

UNITERMS: *Triatominae*. *Cavernicola pilosa*. Londrina, PR, Brazil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALMEIDA, F. B. de Triatomíneos da Amazônia: encontro de três espécies naturalmente infectadas por *Trypanosoma* semelhante ao *cruzi*, no Estado do Amazonas (*Hemiptera, reduviidae*). *Acta Amazônica*, 1: 89-93, 1972.
2. D'ALESSANDRO, A. et al. Distribution of triatomine transmitted trypanosomiasis in Colombia and new record of the bugs and infections. *J. med. Entomol.*, 8: 159-72, 1971.
3. DIAS, E. et al. Investigações sobre esquistripanose de morcegos no Estado do Pará. Encontro do barbeiro *Cavernicola pilosa* como transmissor. *Rev. bras. Biol.*, 2: 103-10, 1942.
4. GROOT, H. Trypanosomiasis humanas. *Rev. Hig.*, Bogotá, 24: 250-2, 1950.
5. LENT, H. & JURBERT, J. O gênero *Cavernicola* Barber, 1937 com um estulo sobre a genitalia externa (*Hemiptera, Reduviidae, Triatominae*). *Rev. bras. Biol.*, 29: 317-27, 1969.
6. NEIVA, A. C. & LENT, H. Sinopse dos triatomídeos. *Rev. Entomol.*, Rio de Janeiro, 12: 61-92, 1941.
7. PIFANO, C. & ORTIZ, I. *Cavernicola pilosa* Barber, 1937 (*Hemiptera Heteroptera: Triatominae*) su presencia en Venezuela. *Rev. Sanid. Asist. Soc.*, 17: 245-8, 1952.

Recebido para publicação em 04/03/1977

Aprovado para publicação em 28/03/1977