

Carl Pleijel

The D.H. Hill Library



North Carolina State College

SPECIAL COLLECTIONS

QK91
S6
v.1



142310

This book must not b.
taken from the Librar
building.

18 Sep 59 E

18 Sep 59 E

Jun '62

MAY 19 1964

AUG 10 1968

2-19-72

SPR

JUN 1971

19 Jun 71

22 JUN 71

0

DUE Va
6 13.84

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:G:Æ M:TS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL: EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI,
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES PLANTARUM.

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS.

AD

GENERA RELATAS.

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE DIGESTAS.

TOMUS I.

Cum Privilegio S. R. M:ts Sueciæ & S. R. M:ts Polonicae ac Elektoris Saxon.

HOLMIÆ,
IMPENSIS LAURENTII SALVII.
1753.

Ignoto Genere proprio
nulla descriptio, quis accurata tradita,
certam demonstrat,
sed plerumque fallit.
CÆSALP. prefai.

STORMAGTIGSTE ALLERNÄDIGSTE
KONUNG OCH DROTTNING
ADOLPH FRIDERIC,
LOVISA ULRICA,
SVERIGES GÖTHES OCH VENDES
KONUNG OCH DROTTNING!



DRA MAJESTETER är jag
allerunderdåligst skyldig detta verk,
frukten af min måsta och båsta les-
nad, det jag nu under EDR A
MAJESTETERS milda regering fått med
nögdt och roligt finne fullborda.

*EDRE MAJESTETER hafva, i-
från första lyckeliga ankomsten til riket, stådse
ansett mig med blida strålar, kallat mig som of-
taft til Sit Hof, och betygat emot mig all Kon-
gelig nåd.*

*EDRE MAJESTETER hafva ock
gifvit den Vetenskapen, som jag idkat ljus och anse-
ende i Sit Rike, då EDRE MAJESTE-
TER ej allenast allernådigst låtit Skaparens
underverk för sig beskrifvas, utan ock hopkallat
allehanda jordenes inbyggare af alla tre Natu-
rens riken, samt befalt dem inlogeras uti sina
präktiga lust-slott Ulriksdahl och Drottningholm,
der desse, liksom deputerade från hela vida verl-
den, så dagligt företräde för MAJESTE-
TENS ögon.*

*Tror mig altså ej säga för mycket, då jag
rent ut bekänner, at ifrån den visa Konung Sa-
lomens tid och Drotningens af rika Arabien, in-
ga Potentater gjordt på den Alsmågtiga Skapa-
rens underverk större akning.*

*Ty bör och skal denna Vetenskapen tävla med
alla andra minnesmärken, at göra EDR A
MAJESTETERS namn odödeliga, då den
in-*

inpræglar dem i Naturens egen bok, som årligen
d nya upplägges, at blifva med Jordklotet lika
beständig.

Himmelen göre **EDRA MAJESTE-
TERS** dagar och regering lång och lyckelig.
så vist jag lefver och dör

EDRA KONG. MAJESTETERS

allerunderdänigste och tropliktigste
tjänare och undersåte
CARL LINNÆUS.

LECTORI ÆQUO.

Homo sui conscius observat MUNDUM esse omnipo-tentis theatrum, undique adornatum summis Omni-sciæ sapientiæ miraculis, se vero in hunc, tamquam Hospitem introductum, ut hisce deliciis sese delectan-do magnificentiam Domini agnoscat. Indignus profecto is censendus hospes, qui, pecoris instar, tantum gulæ in-servit, nec magnalia possessoris intueri atque æstimare novit.

HOSPITES ut digni evadamus orbis, opera hæc Crea-toris scrutari nobis necesse est, quæ ita cum nostris com-modis combinavit summum Ens, ut eis, unde omnia no-stra bona desumimus, carere nulla ratione quæamus; & quo magis hæc intelligimus, eo etjam plura in usum generis humani cedunt.

COGNITIONEM horum ut rite acquiramus, singula distincta *Idea* & distincto *Nomine* complecti oportet, qui-bus sepositis copia rerum nos obruat necesse est, & com-mercium omne, deficiente communi lingua, cessabit.

SCIENTIA NATURÆ inde inter Homines nata est, quæ comprehendit sub *Physica* & *Chemia* Elementa, sub *Zoologia*, *Botanica*, *Lithologia* tria Naturæ regna.

REM HERBARIAM heic libare lubet, quæ quondam paucarum plantarum erat Scientia; hodie vero copia delectorum evasit omnium amplissima.

INVENTORUM recentioris ævi indefessis laboribus notitiam debemus plurium Plantarum, quam omnibus priscorum temporum eruditis, inter quos imprimis no-minandi *Clusius*, *Columna*, *Bauhini*, *Hermannus*, *Rheede*, *Sherardus*, *Rajus*, *Plukenetius*, *Tournefortius*, *Plumierius*, *Vaillantius*, *Dillenius*, *Gmelinus*. &c.

NOTI-

LECTORI.

NOTITIA plantarum constabat quondam Nominibus arbitrariis, memoriae tabulæ infixis, quam vacillantem Icenes sublevabant.

SYSTEMATICORUM sapientia indagavit ordinem qui memoriae succurreret, & scientiam solidis fundamentis inaedificaret, quem debemus Principibus Viris Gesnero, Cœsalpino, Bauhino, Morisono, Hermanno, Tournefortio, Vaillantio, Dillenio, aliisque.

ARIADNEUM hoc filum Systematicorum terminabatur Generibus, quod tentavi ad *Species* usque extende-re, confectis legitimis haruni differentiis, ut etjam in hisce sua sibi constaret certitudo, quum *omnis vera cognitio cognitione specierum innitatur*; hac enim difi- ciente vacillat & historia, ut in plerisque Peregrinatorum diariis.

SPECIES plantarum ut mihi familiares redderem, peragravi Alpes Lapponicas: totam Sueciam: partem Norvegiae, Daniæ, Germaniae, Belgii, Angliae, Galliae: perquisivi deinde HORTOS Botanicos: Parisinum, Oxonensem, Chelsojanum, Hartecampensem, Leidensem, Ultrajectinum, Amstelædamensem, Upsaliensem aliosque: evolvi etjam HERBARIA Burseri, Hermanni, Cliffor-tii, Burmanni, Gronovii, Royeni, Sloanei, Sberardi, Bobarti, Milleri, Suriani, Tournefortii, Vaillantii, Jussiei, Bæckii &c. Meo suasu DISCIPULI quondam dilectissimi: P. Kalmius Canadam, F. Hasselquist Aegyptum, P. Osbeck Chinam, P. Løfeling Hispaniam, Montin Lapponiam adire, plantasque lectas mecum communicarunt. E variis terris demum misere Amici BOTANICI semina plantasque siccias non paucas, uti B. Jussieu, Royenus, J. Gesnerus, Wachendorfius, Sibtorpius, Montius, Gleditschius, Krascheninnikoffius, Minuartius, Velezius, nec non Q. Munchhausen L. B. S. C. Bielke L. B. J. Ratgeb Equ. Demi-

LECTORI.

doff Nob. Collinson, Torèn, Braad, aliisque Cliffordi omnes quas in duplo habuit: Lagerström indiae orientalis plurimas: Gronovius plerasque Virginicas & Gmelinus Sibericas facile omnes, at Sauvagesius integrum suum thesaurum plantarum dedit, exemplo raro & inaudito, unde factum, ut copiam plantarum obtinuerim non mediocrem.

DIFFERENTIAS Specificas antehac Plantis non paucis imposui in Flora Lapponica, Suecica, Zeylanica, in Horto Cliffortiano, Upsaliensi. Iisdem principiis institere præstantissimi Botanici Gronovius, Royenus, Wachendorff, Gorter, B. Jussieus, Le Monier, Gvetard, Dalibard, Sauvages, Colden, Hill, inque non paucis Hallerus, Gmelinus aliquique, quorum opera plurimæ Species evasere ratæ & evidentes.

NOMINA hæc passim dispersa in gratiam studiosorum consultum duxi colligere, acquisitas dein plantas addere, inque unum Systema reducere; at vero pluribus Speciebus observatis, præstantioribus notis detectis, aptioribus Terminis cufis, debui interdum differentias emendare, antea quamvis optimas.

Characteres essentiales pro NOMINE SPECIFICO constituere non levidense opus est; requirit enim Specierum plurium accuratam cognitionem, harum attentissimam partium indagationem, differentium selectionem, Terminorum denique artis propriam applicationem, ut evadant compendiosissimi tutissimique.

NON VISAS plantas heic omisi, toties elusus ab auctoribus, ne dubia certissimis miscerem, si vero aliquando contigerit non sufficienter inspexisse plantam, vel specimen imperfectum obtinuisse, signo † hoc notavi, ut alii eandem accuratius examinent.

Non

LECTORI.

Non nominatas in hoc Libello plantas, si quis ad me mittere velit, eas in proxima editione V. D. recensebo cum honorifica recensione datoris.

NUMERUM plantarum totius orbis longe parciorem esse, quam vulgo creditur, satis certo calculo intellexi, utpote qui vix ac ne vix 10000 attingat.

TRIVIALIA nomina in margine apposui, ut missis ambagibus, uno quamlibet Herbam nomine complecti queamus; hæc vero absque selectu potui, quippe quem alius dies poscit. Caveant autem quam sanctissime omnes sani Botanici, umquam proponere nomen triviale sine iusfficienti differentia specifica, ne ruat in pristinam barbariem scientia.

SYNONYNA paucissima in EUROPÆIS plantis adhibui, contentus C. Baubino & Iconographo præstantiore; in EXOTICIS vero plura, quum difficiliora minusque trita sint.

DESCRIPTIONES tantum in obscuris adhibere necesse fuit, easque sine ambagibus, ut obtinerem compendium tironibus gratum.

LOCA natalia more meo adjeci, inque notissimis *Fruticantes* ♂, *Perennes* ♀, *Biennes* ♂, *Annuas* ☽ notavi.

GENERALA nonnulla nova, nonnulla immutata adhibui, quæ in nova editione Generum plantarum propediem sistere animus est.

ADVERSARIORUM tela nunquam retorsi: acerrima convitia, insimulationes, cavillationes, buccinationes, (præstantiorum longe Virorum, omni ævo, laboris præmia) tranquillo animo sustinui, nec suis auctoribus hæc invideo, si inde ipsis apud vulgus gloria maior.

LECTORI.

jor. Fero hæc, quæ in me ne capillum quidem mutant, & cur non ferrem iniquos, qui a veris Botanicis & quidem consummatissimis, quibus assurgere debent illi, summis cumulatus sum encomiis. Parem deinde adversariis referre gratiam, nec anni ingraevescentes, nec munus, quo fungor, nec mei mores patiuntur. Quod mihi supereft brevioris ævi, tranquillus utilioribus observationibus impemdam. Res naturales enim proprio privilegio munitæ persistunt, ut quemadmodum errores in his commissi a nullo defendi, ita nec veritates observationibus innixæ a toto eruditorum orbe conculcari possint; judices itaque provoco seros Nepotes:

*Pascitur in vivis litor, post fata quiescit,
Tum suus ex merito quemque tuetur honos.*

Dabam 1753 d. 2 Maji. Upsaliæ.

AU-

A U C T O R E S

REFORMATORES.

- PROPRIA Genera plantarum. *Lugdb.* 1752. oct.
 Philosophia Botanica. *Holmiae.* 1751. oct.
 Hortus Cliffortianus. *Amstel.* 1737. fol.
 Hortus Upsaliensis. *Holmiae* 1748. oct.
 Flora Suecica. *Holmiae* 1745. oct.
 Flora Lapponica. *Amstel.* 1737. oct.
 Flora Zeylanica. *Holmiae* 1747. oct.
 Viridarium Cliffortian. *Amstel.* 1737. oct.
 Materia Medica. *Holmiae* 1749. oct.
 Amoenitat. Academ. 1. *Lipsiae.* 1749. oct.
 Amoenitat. Academ. 2. *Holmiae* 1751. oct.
 Iter Oelandicum. *Holmiae* 1745. oct. suec.
 Iter Gotlandicum. *Holmiae* 1745. oct. suec.
 Iter Westrogothicum. *Holmiae* 1747. oct. suec.
 Iter Scanicum. *Holmiae.* 1751. oct. suec.
 Acta Upsaliens. R. soc. *Holmiae* 1740. &c. quart.
 Acta Stockh. R. soc. *Holmiae* 1739. &c. oct. suec.

* *

KALM PETR. Plantæ canadenses propediem edendæ.

HASSELQUIST FR. Pl. ægypti in act. upf. & epistolis.

OSBECK PETR. Pl. chinenses in literis, Msc.

LOEFLING PETR. Pl. hispanicae in epistolis, Msc.

* * *

- GRONOVIUS J. F. Flora virginica 1. 2. *Leidae* 1739. oct.
 ROYEN ADR. Flora leidenensis. *Leidae* 1740. oct.
 GORTER DAY. Floræ geiro-zulphan. *Hardeburg.* 1745. oct.
 JUSSIEU B. Pl. rariores vatis in lit. & act. paris.
 GUETTARD M. Observations sur les plantes. *Paris.* 1747. oct.
 DALIBARD M. Flora parisiensis. *Paris.* 1749. duod.
 SAUVAGES FR. Flora monspeliensis. *Hagae* 1751. oct.
 COLDEN CONR. Plantæ coldinghamiæ. act. upf. 1743. quart.
 WACHENDORFF E. J. Hortus Ultrajectinus. *Traject.* 1747. oct.
 HALLER ALB. Stirpes helveticae. *Götting.* 1742. Fol.
 LUDVIG. C. G. Genera Aphotismi, *Lips.* 173. oct.
 GMELIN J. G. Flora Sibirica 1. 2. *Petropol.* 1750. &c. quart.
 MONIER. LUD. GUIL. cat. des pl. en Auvergne &c. *Par.* 1745. p.
 BÜTTNER D. G. Plantæ cunonis. *Amstel.* 1750. oct.
 HILL JOH. Historis of plantis. *Lond.* 1751. fol.
 MITCHEL JOH. Genera pl. virglnic. *E. N. C.*
 MONTI CAJET Genus Aldrovandæ &c. *Inst. Bonon.* Vol. 2.
 SESLERUS LEONH. Epistola de vitaliana. *Venet.* 1750. fol.

USI-

USITATI ORES.

*

Bauhini	<i>pinax.</i>		
Bauhini	<i>Historia pl.</i>		
Camerarii	<i>epitome.</i>		
Columnæ	<i>ecphrasis.</i>		
Clusii	<i>historia.</i>		
Dodonæi	<i>pemptades.</i>	Lobelii	<i>Icones.</i>
Fuchsii	<i>historia.</i>	Brunsfelsii	<i>Historia.</i>
Dalechampii	<i>historia.</i>	Tabernæmontani	<i>Historia.</i>
Marcgravii	<i>brasilia.</i>		
Alpinus	<i>exotica.</i>	Cornuti	<i>Canadenses</i>
Laetelii	<i>prussica.</i>	Renealimi	<i>Specimen.</i>

* *

Morisoni	<i>historia. 2. 3.</i>		
Raji	<i>historia. 1. 2. Supplementum 3. Synopsis 3:ta</i>		
Plukenetii	<i>Almagestum, Phytographia.</i>		
Petiveri	<i>gazaphylacium.</i>		
Sloani	<i>Jamaica.</i>		
Hermannii	<i>Hort. lugdbat. Paradisus.</i>		
Rheede	<i>Hort. malab.</i>		
Commelinii	<i>Hort. amstel. 1. 2. Præludia.</i>		
Breynii	<i>Centuria. Prodromus a filio.</i>		
Dodarti	<i>memoires.</i>	Rivini	<i>Ordines.</i>
Tournefortii	<i>institutiones.</i>		
Plumieri	<i>Genera, Species, Americana, Filices.</i>		
Fewillæi	<i>peruviana.</i>		
Isnard	<i>acta parisina.</i>		
Bocconis	<i>Museum, Siculæ plantæ.</i>		
Barrelieri	<i>Icones.</i>		

* * *

Boerhavii	<i>Hortus lugd-batavus.</i>		
Kæmpferi	<i>Amœnitates exoticæ.</i>		
Scheuchzerti	<i>Gramina; Itinera alpina.</i>		
Michelii	<i>Genera nova.</i>		
Vaillantii	<i>Acta parisina. Flora parisina.</i>		
Monti	<i>Gramina.</i>	Tilli	<i>Hortus pisanus.</i>
Buxbaum	<i>Centuria.</i>		
Catesby	<i>Carolina 1. 2. 3.</i>	Martyni	<i>Centuria.</i>
Burmanni	<i>Zeylanica, africnarum decades.</i>		
Armanni	<i>Ruthenica, Herbarium.</i>		
Dillenii	<i>Elthamenses, Musci.</i>		
Segueri	<i>Verona.</i>		

* * * * * *

Clas-

MONANDRIA

MONOGYNIA.

CANNÆ.

1. CANNÆ foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis *Indica.*

Roy. lugdb. 11. *Fl. zeyl.* 1. *Hort. upf.* 1.

Canna spatulis bitloris. *Hort. cliff.* 1.

Arundo indica latifolia. *Bauh. pin.* 19.

Habitat inter tropicos Asie, Africæ, Americæ. 2.

2. CANNÆ foliis lanceolatis petiolatis nervosis.

angustifol. 1

Canna foliis lanceolatis petiolatis. *Hort. cliff.* 1.

Arundo indica florida angustifolia. *Moris hist.* 3. p. 250.
f. S. t. 14. f. 6.

Habitat inter tropicos Americæ: Umbrosa spongiosa. 4.

3. CANNÆ foliis lanceolatis petiolatis enervibus *Roy. glauca.*
lugdb. 11.

Canna foliis enervibus. *Virid. cliff.* 104.

Cannoides. *Hort. cliff.* 488.

Canna Acorus glaucophyllum, ampliore flore, iridis pa-
lustris facie. *Dill. elth.* 69. t. 59. f. 69.

Habitat in Carolina? 2.

AMOMUM,

AMOMUM scapo nudo, spica ovata. *Hort. cliff.* 3. *Zingiber.*

Hort. upf. 1. *Flor. zeyl.* 3. *Mat. med.* 1. *Roy. lugdb.*

12.

Zingiber. *Bauh. pin.* 35.

Habitat in Indiis inter tropicos. 2.

2. AMOMUM scapo nudo, spica oblonga obtusa. *Hort. Zerumbet*
cliff. 3. *Hort. upf.* 1. *Fl. zeyl.* 2. *Roy. lugdb.* 12.

Zingiber latifolium sylvestre. *Herm. lugdb.* 636. t. 637.

Habitat in India. 2.

3. AMOMUM scapo bracteis alternis laxis caule bre- *Cardamom.*
viore. *Fl. zeyl.* 4. *Mat. med.* 2.

Elettari 2. *Rheed. mal.* 11. p. 9. t. 6.

Habitat in India. 2.

2 MONANDRIA MONOGYNIA.

- Gran. perad.* 4. AMOMUM scapo vestito racemoso. ✕
Amomum caule racemoso. *Mat. med.* 3.
Grana paradisi officinatum. *Baub. pin.* 413.
Habitat in Madagascar, Guinea.

COSTUS,

- rabiens* 1. COSTUS. *Hort. cliff.* 2. *Hort. upf.* 2. *Fl. zeyl.* 5.
Mat. med. 4. *Roy. lugdb.* 11.
Costus arabicus. *Baub. pin.* 36. *Mer. surin.* 36. t. 36.
Habitat in India utraque. ✕

ALPINIA.

- temosa*, 1. ALPINIA *Roy. lugdb.* 12.
Alpina racemosa alba, cannacori foliis. *Plum. Gen.* 16
Paco seroca *Marcgr. bras.* 48.
Habitat in America calidiore. ✕

MARANTA.

- arundinacea* 1. MARANTA. *Hort. cliff.* 2 * *Roy. lugdb.* 11.
Maranta arundinacea, cannacori folio. *Plum. gen.* 16
Mart. cent. 39. ⊖
Habitat in America calidiore. ✕

CURCUMA.

- rotunda*, 1. CURCUMA foliis lanceolato-ovatis; nervis lateralibus rarissimis.
Curcuma foliis ovatis utrinque acuminatis: nervis lateralibus paucissimis. *Roy. lugdb.* 12. *Fl. zeyl.* 6.
Manja-kua. *Rheed. mal.* 11. p. 19. t. 10. *
Habitat in India. ✕
- longa*, 2. CURCUMA foliis lanceolatis: nervis lateralibus numerosissimis.
Curcuma foliis lanceolatis utrinque acuminatis: nervis lateralibus numerosissimis. *Roy. lugdb.* 12. *Fl. zeyl.* 7.
Mat. med. 5.
Curcuma radice longa. *Herm. lugdb.* 208. t. 209.
Habitat in India. ✕

KAEMPFERIA.

- Galanga*, 1. KAEMPFERIA foliis ovatis sessilibus. *Fl. zeyl.* 8.
Mat. med. 5.
Kaempferia. *Hort. cliff.* 2. t. 3. *Roy. lugdb.* 12..

Wanhom. *Kaempf. amoen.* 901. t. 902.
Habitat in India. ♀

2. KAEMPFERIA foliis lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl. rotunda.*
 9. *Mat. med.* 9
Zedoaria rotunda. *Baub. pin.* 31
Habitat in India. ♀

BOERHAVIA.

- BOERHAVIA caule erecto. *erecta.*
Boerhavia, solani folio, erecta glabra. Amm. herb. 241.
Habitat in Vera Cruc. ♀
2. BOERHAVIA caule diffuso. *diffusa.*
Boerhavia diffusa. Fl. zeyl. 10. *Hort. upf.* 4.
Boerhavia foliis ovatis. Hort. cliff. 17. *Roy. lugdb.* 234.
Talu-dama. Rheed. mal. 7. p. 105. t. 56:
Habitat in India. ♀
3. BOERHAVIA caule scandente. *scandens.*
Solanum bacciferum americanum, fructu corymboso.
Pluk. alm. 349. t. 226. f. 7.
Valerianella, alsines folio, scandens. Sloan: flor 91. *hist.*
 1. p. 210. *Raj. suppl.* 244.
Antanisophyllum icardens, alsines majoris folio. Vail.
 aet. 1722. p. 258.
Habitat in Jamaica ad urbem jago de la vega. ♀
4. BOERHAVIA caule repente. *repente*
Boerhavia nubica inior. Vail. sex. 53.
 β *Boerhavia nubica minima. Vail. sex.* 55.
Habitat in Nubia inter Mocho & Tangos. ♀

SALICORNIA.

1. SALICORNIA articulis apice crassioribus obtusis. *europaea.*
Mat. mea. 8. *herbacea.*
Salicornia herbacea. Fl. suec. 1.
Salicornia annua. Sauv. monsp. 7.
Salicornia. Hort. cliff. 490. *Roy. lugdb.* 205
 β *Salicornia sempervivens. Sauv. monsp.* 7. *fruticosa.*
Kali geniculatum majus. Baub. pin. 289.
Habitat in Europæ litoribus maritimis. ♂ ⊖
Conferantur annua & sempervirens utrum specie distincta?
2. SALICORNIA articulis obtusis basi incrassatis, spicis *arabica.*
ovatis.

A :

Kali

*Kali geniculatum majus. Baub. pin. 289. Moris. bist.
p. 610. f. 5. t. 33 f. 7. Raj. bist. 211.
Habitat in Arabia.*

- virginia.* 3. **SALICORNIA** articulis apice compressis emarginatis bifidis.
*Salicornia caulinum ramorumque articulis apice bicornibus. Gron. virg. 129.
Habitat in Virginia, & ad Salinas Saxoniae. ☺*
- raspica.* 4. **SALICORNIA** articulis cylindricis, spicis filiformibus.
*Kali arborescens, tamarisci facie. Buxb. cent. 1. t. 11. f. 1
Habitat in squalidis maris Caspii & Mediæ h.*

HIPPURIS.

- vulgaris* 1. **HIPPURIS.** *Fl. lapp. 1. Fl. suec. 2. Hort. cliff. 3.
Roy. lugdb. 205. Dalib. paris. 1.
Equilettum palustre, brevioribus foliis, polyspermum.
Baub. pin. 35.
Habitat in Europæ fontibus. ✎*

DIGYNIA.

CORISPERMUM.

- hyssopifol.* 1. **CORISPERMUM** floribus lateralibus. *Hort. upf. 2.
Corispernum floribus alternis. Hort. cliff. 3. Jt. gotl.
316. Roy. lugdb. 205. Sauv. monsp. 52.
Corispernum hyssopifolium. Juss. act. 1712. p. 244.
Habitat ad Volgam Tartariæ, Gillan Borussiæ, Monspe-
lli arenosis. ☺*
- squarrosum.* 2. **CORISPERMUM** spicis squarrofisis. *Hort. upf. 3. *
Rhagroslis foliis arundinaceis. Buxb. cent. 3. p. 30. t 55.
Habitat ad Wolgam Tartariæ, inque desertis Cossaco-
rum. ☺*

BLITUM.

- capitatum.* 1. **BLITUM** capitellis spicatis terminalibus. *Hort. upf. 3.
Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis,
capitulis summis nudis. Virid. cliff. 1. Roy. lugdb. 206.
Blitum foliis triangularibus dentatis. Hort. cliff. 28.
Atriplex baccifera. Ray. bist. 197.
Habitat in Europa: præsertim in comit. Tyrolensi. ☺*
- wirgatum.* 2. **BLITUM** capitellis sparsis lateralibus. *Hort. upf. 3.
Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis,*

*tis, capsulis summis foliosis. Hort. cliff. 495. Roy.
lugdb. 206.*

*Atriplex sylvestris, mori fructu. Baub. pin. 119.
Habitat in Tataria, Hispania. ⊖*

CINNA.

1. CINNA.

arundinaceæ.

Habitat in Canada, unde semina per D. Kalm. 2

Gramen magnitudine Avenæ sativæ. Folia fere arundinacea, leviuscula. Panicula densa, flaccida. Flores conferti, secundi, lateribus calycis & petalo majore scabri. Arista infra apicem Glumæ majoris petali brevissima. Gramen inamœnum stamine uno spectabile.

Classis II.

DIANDRIA

MONOGYNIA.

NYCTANTHES.

- arbor tristis.* 1. NYCTANTHES caule tetragono, foliis ovatis acuminatis, pericarpiis membranaceis compressis. *Fl. zeyl.* 11.
- Arbor tristis myrto similis. *Baub. pin.* 469.
Manja-pumeram. *Rheed. mal.* 1. p. 35. t. 21.
Habitat in India. 5
- Sambac,* 2. NYCTANTHES foliis inferioribus cordatis obtusis, superioribus ovatis acutis. *Hort. upf.* 4.
Nyctanthes caule volubili, foliis subovatis acutis. *Hort. cliff.* 5. *Hort. upf.* 4.* *Flor. zeyl.* 12. *Roy. lugab.* 398.
Jasminum arabicum. *Clas. cur.* 3. t. 3. *Angl. hort.* t. 27.
Habitat in India. 5
- undulata* 3. NYCTANTHES foliis ovatis acuminatis undulatis, ramis teretibus.
Jasminum indicum, flore polypetalo exalbido, fructu minori. *Ray. hist.* 1601.
Tsieriegam-mulla. *Rheed. mal.* 6. p. 97. t. 55.
Habitat in Malabar. 5
- hirsuta,* 4. NYCTANTHES petiolis pedunculisque villosis. ◎
Rava-pou. *Rheed. mal.* 4. p. 99. t. 48.
Habitat in India. 5
- angustifolia.* 5. NYCTANTHES foliis obtusis lanceolatis ovatisque Jasminum indicum angustifolium, fructu gemino. *Tour. upf.* 172. 598.
Katu-pitsiegam mulla. *Rheed. mal.* 6. p. 93. t. 53. *Raj. hist.* 1602.
Habitat in Malabaræ arenosis. 5

JASMINUM.

1. JASMINUM foliis oppositis pinnatis. *Hort. cliff.* 5. *officinale.*
Hort. upf. 5. *Mat. med.* 9. *Roy. lugdb.* 397.
Jasminum vulgatius, flore albo. *Baub. pin.* 397:
Habitat in India. 5
2. JASMINUM foliis oppositis ternatis. *Hort. cliff.* 5. *azoricum.*
Fl. zey! 13. *Roy. lugdb.* 397.
Jasminum azoricum trifoliatum. *Comm. hort.* 1. p. 159.
 2. 82.
Habitat in India.
3. JASMINUM foliis alternis ternatis simplicibusque, fraticane.
 ramis angulatis. *Hort. cliff.* 5. *Hort. upf.* 5. *Roy.*
lugdb. 397. *Sauv. monsp.* 174.
Jasminum luteum vulgo dictum bacciferum. *Baub. pin.*
 398.
Habitat in Europa australi. 5
4. JASMINUM. foliis alternis ternatis pinnatisque, ra- *humile.*
 mis angulatis. *Hort. upf.* 5.
Jasminum foliis alternis ternatis acuminatis. *Hort. cliff.*
 6. *Roy. lugdb.* 398.
Jasminum humile luteum. *Baub. pin.* 397.
Habitat - - - - - 5
5. JASMINUM foliis alternis ternatis pinnatisque, ra- *odoratissim.*
 mis teretibus. *Hort. upf.* 5.
Jasminum foliis alternis ternatis obtusis. *Hort. cliff.* 5.
Roy. lugdb. 397.
Jasminum indicum flavum odoratissimum. *Ferr. cult.* 93.
Habitat in India? 5

LIGUSTRUM.

1. LIGUSTRUM. *Hort. cliff.* 6. *Fl. suec.* 4. *Roy. lugdb.* *vulgars.*
 398. *Dalib. paris.* 2.
Ligustrum germanicum. *Baub. pin.* 475
Habitat in Europæ callibus glareofis. 5

PHILLYREA.

1. PHILLYREA foliis lanceolatis subintegerrimis. *Hort.* *angustifol.*
upf. 5.

Phillyrea foliis ovato-lanceolatis via crenatis. *Hort. cliff.*
4. *Roy. lugdb.* 398.

Phillyrea ligustrifolio. *Baub. pin.* 476.

2. *Phillyrea* foliis lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 4.
Roy. lugdb. 398.

Phillyrea angustifolia 1. 2. *Baub. pin.* 476.

Habitat in Europa australioris collibus. ♂

latifolia. 2. **PHILLYREA** foliis cordato-ovatis serratis. *Hort. cliff.*
4. *Hort. upf.* 6. *Roy. lugdb.* 398.

Phillyrea latifolia spinosa. *Baub. pin.* 476.

Phillyrea folio leviter ferrato. *Baub. pin.* 476

Habitat in Europa australi. ♂

OLEA.

europæa. 1. **CLEA** foliis lanceolatis.

Olea foliis lanceolatis, ramis teretiusculis. *Hort. cliff.* 4.
Mat. med. 10. *Roy. lugdb.* 398.

Olea sativa. *Baub. pin.* 472.

2. *Olea* foliis lanceolatis, ramis tetragonis. *Hort. cliff.* 4.
Roy. lugdb. 399.

Olea sylvestris, folio duro subtus incano. *Baub. pin.* 472.

Habitat in Europa australi. ♂

capensis. 2. **OLEA** foliis ovatis. *Hort. cliff.* 4. *Roy. lugdb.* 399.

Ligustrum capense sempervirens, folio crasso subrotundato. *Dill. eltb.* 193. t. 170. f. 194.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♂

CHIONANTHUS.

virginica. 1. **CHIONANTHUS** pedunculis trifidis trifloris.

Chionanthus. *Hort. cliff.* 17. *Gron. virg.* 10. *Roy. lugdb.* 17.

Amelanchier virginiana, laurocerasi folio. *Pet. sicc.* 241. *Gatesb. carol.* 1. p. 68. t. 68.

Habitat in America septentrionali. ♂

zeylanica. 2. **CHIONANTHUS** pedunculis paniculatis multifloris.

Fl. zeyl. 14.

Arbor zeylanica, cotini foliis subtus lanugine villosis. *Burm. zeyl.* 31.

Habitat in Zeylona. ♂

SYRINGA.

1. SYRINGA foliis ovato cordatis. *Hort. cliff.* 6. *Hort. vulgaris.*
upf. 6. *Roy. lugdb.* 397. *Dalib. paris.* 2.
Syringa cærulea. *Baub. pin.* 398.
Habitat versus Persiam. 5

2. SYRINGA foliis lanceolatis. *persica.*
 a. Syringa foliis lanceolatis integris. *Hort. cliff.* 6. *Hort.*
upf. 6. *Roy. lugdb.* 397.
 b. Syringa foliis lanceolatis integris dissectisque laciniata.
Hort. cliff. 6. *Hort. upf.* 6. *Roy. lugdb.* 397.
Ligustrum foliis laciniatis. *Baub. pin.* 476.
Habitat in Persia? 5

ERANTHEMUM.

1. ERANTHEMUM. *Fl. zeyl.* 15. * *Aman. acad.* 385. * *capense.*
Ephemerum lychnidis flore africanum. *Herm. parad.* 153.
Amm. herb. 232.
Habitat in Æthiopia.

CIRCÆA.

1. CIRCÆA caule erecto, racemis pluribus. *lutetiana.*
Circæa. *Fl. suec.* 5. *Hort. cliff.* 7. *Roy. lugdb.* 303.
Dalib. paris. 3.
Solanifolia Circæa dicta major. *Baub. pin.* 168. *It. w-*
goth. 213.
 2. Circæa canadensis latifolia, flore albo. *Tournef. inst. caudensis.*
301.
Habitat in Europæ & Americæ borealis nemoribus. 2
Hæc sesquipedalis caule erecto, Racemis terminali & la-
teralibus; Perianthium consistentia calycina, s. corol-
la longe crassius, rufiusque, nec corolla concolor.

3. CIRCÆA caule adscendente, racemo unico. *alpina.*
Circæa calyce colorato. *Fl. lapp.* 3.
Solanifolia Circæa alpina. *Baub. pin.* 168.
Habitat ad radices montium in frigidis Europæ. 2
Planta vix digitæ longitudine, magis procumbens, calyce
colorato, uti corolla; differt quidem a priori, attamen
nimis affinis.

VERONICA.

* *Spicatæ.*

1. VERONICA spicis terminalibus, foliis quaternis qui- *virginica.*
nisve. *Vero-*

Veronica foliis quaternis quinisve. *Hort. cliff.* 7 * *Gron.*

virg. 4. *Roy. lugdb.* 301. *Cold. noveh.* 3.

Veronica virginiana procerior, foliis ternis, quaternis & etiam quinis caulem amplexantibus, spicis florum candidissimis. *Plnk. alm.* 383. t. 70. f. 2.

Habitat in Virginia. 2.

spuria. 2. **VERONICA** spicis terminalibus, foliis ternis æqualiter ferratis. *Hort. upf.* 7. *

Veronica spicata angustifolia. *Baeh. pin* 246.

Veronica mas surrecta elatior. *Barr. rar.* 155. t. 391.
Habitat in Europa australiore, Sibiria. 2.

maritima. 3. **VERONICA** spicis terminalibus, foliis ternis inæquilater ferratis.

Veronica floribus spicatis, foliis ternis. *Fl. suec.* 6.

Veronica foliis sœpius ternis. *Virid. cliff.* 2. *Hort. cliff.* 7. *Roy. lugdb.* 301.

Veronica caule erecto, spicis pluribus, foliis lanceolatis ferratis. *Fl. lapp.* 4.

Habitat in maritimis Europæ macris apricis. 2.

longifolia. 4. **VERONICA** spicis terminalibus, foliis oppositis lanceolatis ferratis acuminatis. *Hort. upf.* 7. *

Veronica spicata latifolia. *Baeh. pin* 246.

Veronica i. erectior latifolia. *Clus. hist.* 1. p. 346.

β. *Veronica spicata longifolia altera.* *Amm. ruth.* 26.

γ. *Veronica spicata, urticae folio.* *Amm. ruth.* 26.

Habitat in Tataria, Austria, Suecia. 2.

incana. 5. **VERONICA** spicis terminalibus, foliis oppositis crenatis obtusis, caule erecto tomentoso. *Hort. upf.* 7. *

Veronica caule fruticoso, foliis oblongis: inferioribus crenatis petiolatis; superioribus sessilibus integerrimis. *Roy. lugdb.* 530.

Veronica spicata lanuginosa & incana, floribus cœruleis. *Amm. ruth.* 30.

Habitat in Ucrania, Samara. 2.

spicata. 6. **VERONICA** spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis, caule adscendente simplicissimo.

Veronica floribus spicatis, foliis oppositis, caule erecto. *Fl. suec.* 7. *Dalib. paris.* 3.

Veronica foliis oppositis, caule spica terminato. *Hort. cliff.* 8. *Roy. lugdb.* 302.

Veronica spicata minor. *Baeh. pin.* 247.

Habitat in Europæ borealis campis. 2.

7. VERONICA spicis terminalibus, foliis oppositis ob- *hybrida*.
tuse serratis scabris, caule erecto.
Veronica spicata cambrobritannica, bugulæ subhirsuto
folio. *Raj. syn.* 3. p. 278. t. II. f. 1.
Habitat in Europa rarius.
Obs. *Folia veronicae sequentis, Caulis praecedentis, sed*
spicae maiores pallidiores. 2
8. VERONICA spicis lateralibus pedunculatis, foliis op- *officinalis*.
positis, caule procumbente. *Mat. med.* II.
Veronica floribus spicatis, foliis oppositis, caule procum-
bente. *Fl. suec.* 8. *Dalib. paris.* 3.
Veronica caule repente, scapis spicatis, foliis oppositis o-
vatis strigosis. *Fl. lapp.* 5. *Hort. cliff.* 8. *Roy. lugdb.*
302.
Veronica mas supina & vulgatissima. *Baub. pin.* 246.
Habitat in Europæ sylvestribus sterilibus. 2
- * * *Corymboso-racemosæ.*
9. VERONICA corymbo terminali, scapo nudo.
Veronica foliis ovatis radicalibus, caule nudo. *Roy. aphylla*.
Lugdb. 302.
Veronica alpina pumila, caule aphylo. *Bocc. mus.* 2.
p. 17. t. 1.
Veronica parua saxatilis, caulinulis nudis. *Pluk. alm.* 384.
t. II. f. 3. *Segu. ver.* 241. t. 31. f. 2.
Chamaedrys alpina minima hirsuta. *Baub. pin.* 247.
Habitat in alpibus Europæ australioris. 2.
10. VERONICA corymbo terminali, caule adscendente *bellidioides*.
diphylo.
Veronica caule non ramoso, foliis obtusis crenatis, flo-
ribus congestis terminato, foliis ovatis subasperis. *Halt.*
helv. 531. t. 12. f. 1.
Veronica alpina, bellidis folio. *Baub. pin.* 247. *prod.* II
Burs. XII: 27.
Habitat in Helvetia, Pyrenæis. 2
11. VERONICA corymbo terminali, foliis oppositis *Bonarota*.
serrato dentatis, calycibus linearibus.
Bonarota. *Mich. gen.* 19. t. 15. f. 12.
Pæderota *Gen. pl.* II.
Chamaedrys alpina saxatilis. *Baub. pin.* 248.
Habitat in alpibus Italicis. 2
12. VERONICA corymbo terminali, foliis oppositis, ca- *alpina*
lycibus hispidis.

Veronica floribus corymbosis terminalibus, calycibus hispidis. Fl. suec. 13.

Veronica caule floribus terminato, foliis ovatis crenatis. Fl. lapp. 7. t. 9. f. 4.

Veronica caule inferne procumbente fruticoso, foliis ovatis oppositis. racemo terminali. Roy. lugdb. 302.

Veronica alpina frutescens. Baub. pin. 247.

Habitat in alpibus Europæ. 2

Serpentifolia. 13. VERONICA racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis.

Veronica floribus solitariis subcorymbosis, foliis ovatis glabris crenatis. Fl. suec. 14. Dalib. paris. 4.

Veronica foliis inferioribus oppositis ovatis. superioribus alternis lanceolatis, floribus solitariis. Hort. cliff. 9.

Gron. virg. 4. Roy. lugdb. 302. Cola. noveb. 1.

Veronica floribus sparsis, foliis ovatis crenatis glabris. Fl. lapp. 6.

Veronica pratensis serpyllifolia. Baub. pin. 247.

Habitat in Europa & America septentrionali ad vias, agrorum. 2

Beccabunga. 14. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. Fl. suec. 11. Dalib. paris. 7.

Veronica foliis oppositis laevibus crenatis, floribus racemosis lateralibus. Roy. lugdb. 302.

Veronica foliis oppositis laevibus crenatis, floribus laxe spicatis ex aliis Hort. cliff. 8. Gron. virg. 4.

Anagallis aquatica major (minorque), folio subrotundo. Baub. pin. 252.

Habitat in Europa ad rivulos. 2

Augall. ▽ 15. VERONICA racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto. Fl. suec. 10. Dalib. paris. 7.

Veronica foliis oppositis laevibus crenatis, floribus laxe spicatis ex aliis. Gron. virg. 4.

Veronica aquatica major, folio oblongo. Baub. pin. 252.

Habitat in Europa ad fossas. ◎

Scutellata. 16. VERONICA racemis lateralibus pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. Fl. suec. 9. Dalib. paris. 7.

Veronica foliis linear-lanceolatis integris, racemis laxe floriferis Fl. lapp. 9. Hort. cliff. 10. Roy. lugdb. 302.

Veronica aquatica angustifolia scutellata. Baub. pin. 252.

Habitat in Europæ inundatis. 2

17. VERONICA racemis lateralibus, foliis multifidis. *multifida*.
Veronica montana, folio vario. *Buxb. cent.* 1. p. 24.
t. 38.
Habitat in Armeniæ, Iberiæ graminosis. ♀
18. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis rugo-*Chamædrysis*.
dentatis, caule debili. Fl. suec. 12. *Dalib. paris.* 4.
Veronica foliis oppositis plicatis dentatis, scapis ex alis
inferioribus laxe spicatis. Hort. cliff. 8. *Roy. lugdb.* 303.
Veronica foliis cordatis sessilibus oppositis, racemis la-
xè floriferis. Fl. lapp. 8.
Chamædrys spuria minor rotundifolia. Bauh. pin. 249.
Habitat in Europæ pratis. ♀
19. VERONICA racemis lateralibus, foliis cordatis *ru- latifolia*.
gofis dentatis, caule stricto.
Veronica foliis oppositis plicatis dentatis, scapis ex alis
superioribus laxe spicatis. Hort. cliff. 9. *Roy. lugdb.*
303.
Veronica pratincola omnium maxima. Buxb. cent. 1. p.
23. t. 34.
Chamædrys spuria major latifolia Bauh. pin. 248.
Habitat in Helvetia, Bithynia. ♀
- *** *Pedunculis unifloris.*
20. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis incisis *agrestis*.
pedunculo brevioribus. Fl. suec. 17. *Dalib. paris.* 6.
Veronica foliis cordatis crenatis, floribus solitariis pe-
dunculatis. Roy. lugdb. 303.
Veronica foliis alternis cordatis crenatis, floribus solita-
riis. Hort. cliff. 9.
Alsine chamaedryfolia, flosculis pediculis oblongis insi-
dentibus. Bauh. pin. 250.
Habitat in Europæ cultis, arvis. ⊖
21. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis incisi *arvensis*.
pedunculo longioribus. Fl. suec. 16. *Dalib. paris.* 5.
Veronica foliis oppositis cordatis crenatis, floribus soli-
tariis sessilibus. Hort. cliff. 9. *Gron. virg.* 4. *Roy.*
lugdb. 303.
Alsine veronicæ foliis, flosculis caulinis adhærentibus.
Bauh. pin. 250.
Habitat in Europæ arvis, cultis. ⊖
22. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis planis *pedatafolia*.
quinquelobis. Fl. suec. 18. *Dalib. paris.* 6.

Vero-

Veronica foliis alternis cordatis quinquelobis, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 303.

Al sine hederulæ folio. *Baub. pin.* 250.

23. *Veronica chia*, cymbalariæ folio, verna, flore albo: umbilico virescente. *Tournef. cor.* 7. *Buxb. cent.* I. p. 25. t. 39. f. 1.

Habitat in Europæ ruderatis. ◎

* Obs. *Semina umbilicata sunt huic propria.*

triphylos. 23. **VERONICA** floribus solitariis, foliis, digitato-partitis pedunculo brevioribus. *Fl. suec* 19. *Dalib. paris.* 6. *Veronica* foliis alternis: inferioribus quinquepartitis; superioribus tripartitis, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 302.

Veronica triphyllus cærulea. *Baub. pin.* 250.

Habitat in Europæ agris. ◎

verna. 24. **VERONICA** floribus solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo longioribus. *Fl. suec.* 20. *Veronica humilis* erecta montana, flore parvo cæruleo. *Dill. app.* 38.

Habitat in Suecia, Germania, Hispania aridis apricis. ◎

romana. 25. **VERONICA** floribus solitariis subsessilibus, foliis oblongis subdentatis, caule erecto. *Veronica minima*, clinopodii minoris folio glabro, romana. *Bocc. mus.* 2. p. 29. t. 102. *Vaill. paris.* 201. t. 23. f. 3. *Raj. suppl.* 423.

Veronica erecta, acini folio glabro, floribus cæruleis. *Dill. app.* 39.

Habitat in Europæ australioris agris. ◎

Planta nostra gerit folia magis oblonga, quam illa a Vallatio picta.

peregrina. 26. **VERONICA** floribus solitariis sessilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtusis integerrimis, caule erecto. *Fl. suec.* 15. *

Veronica terrestris annua, folio polygoni, flore albo.

Morif. hist. 2. p. 322. f. 3. t. 24. f. 19.

Habitat in Europæ hortis, arvisque. ◎

marilandica. 27. **VERONICA** floribus solitariis sessilibus, foliis linearibus, caulibus diffusis.

Veronica caulibus procumbentibus, foliis linearibus, floribus sessilibus lateralibus. *Gron. virg.* 4.

Habitat in Virginia.

JUSTICIA.

- JUSTICIA arborea, foliis lanceolato-ovatis, bracteis *Adhatoda*, ovatis persistentibus, corollarum galea concava. *Fl. zeyl.* 16. *Hort. upi.* 7.
- Justicia* foliis ovato-lanceolatis, spicis foliolis, florum galea concava. *Hort. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 291.
- Adhatoda zeylanensis*. *Herm. lugdb.* 642. t. 643. *Pluk. alm.* 9. t. 173. f. 3.
- Habitat in Zeylona.* ♂
2. JUSTICIA arborea, foliis lanceolato-ovatis, bracteis *Ecbolium*, ovatis deciduis mucronatis, corollarum galea reflexa. *Fl. zeyl.* 17.
- Adhatoda*, spica longissima, flore reflexo. *Burm. zeyl.* 7. t. 4. f. 1.
- Carim-curini*. *Rheed. mal.* 2. p. 31. t. 20. *Pluk. alm.* 126. t. 171 f. 4.
- Habitat in Malabarria, Zeylona.* ♂
3. JUSTICIA fruticosa, foliis lanceolato-ovatis, bracteis *Betonica*, ovatis acuminatis venoso-reticulatis coloratis. *Fl. zeyl.* t 8. *
- Betonica frutescens*. *Bont. jav.* 146.
- Bem-curini*. *Rheed. mal.* 2. p. 126. t. 21.
- Habitat in India.* ♂
4. JUSTICIA fruticosa, foliis lanceolatis integerrimis, pendunculis trifloris ancipitibus, bracteis calyce brevioribus.
- Justicia* foliis linear-lanceolatis, floribus saepius solitariis. *Hort. cliff.* 10. *Roy. lugdb.* 291.
- Ecbolii* indici s. *Adhatodæ* cucullatis floribus aemula, hyssopifolia planta ex insulis fortunatis. *Pluk. alm.* 132. t. 280. f. 1.
- Habitat in insulis Fortunatis.* ♂
5. JUSTICIA procumbens, foliis lanceolatis integerrimis, spicis terminalibus lateralibusque alternis, bracteis setaceis. *Fl. zeyl.* 19. *
- Euphrasia*, alines angustiore folio, rubiæ modo spicata, golcondea. *Pluk. alm.* 142. t. 56. f. 3.
- Habitat in Zeylona.* ♀
6. JUSTICIA repens, foliis ovatis subcrenatis, spicis terminalibus, bracteis lanceolatis. *Fl. zeyl.* 20. *
- Adhatoda* spicata, flosculos ex foliolis membranaceis. *Burm. zeyl.* 7. t. 3. f. 2.
- Habitat in Zeylona.* ♀

- chinensis.* 7. JUSTICIA herbacea, foliis ovatis, floribus lateralibus, pedunculis trifloris, bracteis ovalibus.
Habitat in China.
Caules angulati, pedales, inferne ramosi. folia opposita, petiolata, ovata, acuminata, obtusiuscula, vix crenata. Ex alis pedunculi duo s. tres, singuli breves apice triflori, involucro diphyllo, seracco, nudo, bracteis ovatis, obtusis, longitudine floris, minimis.
- echioides.* 8. JUSTICIA foliis lanceolato-linearibus obtusis sessilibus, racemis adscendenteli-secundis, bracteis setaceis.
*Fl. zeyl. 21. **
Euphrasia affinis indica echioidea. Herit. lugdb. 668. t. 669 Peetumba. Rheed. mal. 9. p. 87 t. 46.
Habitat in India.
- sexangularis.* 9. JUSTICIA foliis ovatis integerrimis, bracteis cuneiformibus, ramis sexangularibus.
Justicia annua, hexangulari caule, foliis circæ conjugatis, flore miniato. Amm. herb. 274. Hort. cliff. 10. Euphrasia, altissima majori folio, flore galeato pallide luteo, jamaicensis. Pluk. alm. 142. t. 279. f. 6.
Habitat in Vera cruce, Jamaica. ◎
- nudata* 10. JUSTICIA foliis lanceolato-ovatis integerrimis, pendunculis dichotomis.
Pulcolli. Rheed. mal. 9. p. 135. t. 69.
Habitat in India Toren.
Rami obsolete angulati. Folia lato-lanceolata s. lanceolato-ovata, obtuse acuminata, integerrima, minus glabra. Pedunculi dichotomi, longitudine foliorum. Flores sessiles, bracteis minimis, lineatis. Calyces minimi. Corolla tubus filiformis, longus. Limbi labium superius lineare, angustum, brevius, reflexum; L. inserius aequale, trifidum. Stamina extra fauces prominentia. Stylus capillaris, persistens.
- purpurea.* 11. JUSTICIA foliis ovatis utrinque mucronatis integerrimis glabris, caule geniculato, spicis secundis.
Habitat in China. Osbeck.
Caulis herbaceus, brachiatus. Folia lato-ovata, apice & basi mucronata, glabra, petiolata, integerrima. Articuli caulis & rami supra basin Geniculo tumido, quod supra angustius evadit, notantur. Spicae ad latera & apices ramorum, secundæ. Bracteæ angustæ, lanceolatae, longitudine capsularum. Corolla purpurea: labiis cretis; altero linearis angustissimo; altero lato trilobo. Stamina duo, purpurea, longitudine corollæ.

GRA-

GRATIOLA.

1. GRATIOLA floribus pedunculatis, foliis lanceolatis *officinalis*, ferratis. *Mat. med.* 18.
Gratiola. Riv. mon. 157. *Hort. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 292.
Dalib. paris. 8. *Sauv. monsp.* 137.
Gratiola centauroides. Baub. pin. 279.
Habitat in Lusatia, Gallia & australioribus Europæ humidiusculis. ♀
2. GRATIOLA floribus pedunculatis, foliis ovatis cre- *dubia* natis. *Gron. virg.* 129.
Ruellia pedunculis solitariis unifloris longitudine foliorum. Gron. virg. 73. *.
Habitat in Virginiam aquofis.
Foliola duo ista floralia, que in precedente & sequente, in hac defunt.
3. GRATIOLA foliis lanceolatis obtusis subdentatis. *virginiana.*
Gron. virg. 6. *.
Habitat in Virginia.
4. GRATIOLA floribus subsessilibus. *peruviana*
Gratiola latiore folio, flore albo. Fewill. peruv. 3. t. 47.
Habitat in Peru.

PINGVICULA.

1. PINGVICULA nectarii apice incrassato. *lusitanica.*
Viola palustris, Pinguicula dicta, lusitanica. Grif. lusit.
Habitat in Lusitania. ♀
2. PINGVICULA nectario cylindraceo longitudine pe- *vulgaris:* tali. *Fl. lapp.* 11. *Fl. suec.* 21. *Roy. lugdb.* 304.
Sanicula montana, flore calcari donato. Baub. pin. 243.
Habitat in Europæ uliginosis. ♀
3. PINGUICULA nectario conico petalo breviore. *Fl. alpina:*
lapp. 12. t. 12. f. 3. *. *Fl. suec.* 22.
Pingvicula flore albo minore, calcari brevissimo. Raj.
bist. 752.
Habitat in Alpibus Lapponicis. ♀
4. PINGVICULA scapo villoso. *Fl. lapp.* 13. t. 12. f. 2. *villosa.*
Fl. suec. 23.
Habitat in Lapponia, Sibiria. ♀

UTRICULARIA.

- vulgaris.* 1. UTRICULARIA nectario conico. *Fl. lapp.* 14. *Fl. suec.* 24. *Fl. zeyl.* 22. *Roy. lugdb.* 304.
Lentibularia. *Riv. mon.* 78. *
- Millefolium aquaticum lenticulatum. *Bauh. pin.* 141.
Habitat in Europæ fossis paludibus profundioribus. &
Nectarium subulatum, longitudine labii inferioris; cui
 approximatum; faux clausa palato gibbo. *Planta no-*
bis duplex: altera *MAJOR* a Rivino delineata, caly-
 ce postice rotundato. Altera *MINOR* calyce postice
 transverso, ♂ quasi truncato; crescent conjunctim
- minor.* 2. UTRICULARIA nectario carinato. *Fl. suec.* 25. *
 Millefolium palustre galericulatum minus. *Pluk. alm.*
 251. t. 99. f. 6.
Aparine aquis innatans trevisana, foliis percepier capre-
 olis donata. *Bocc. mus.* 1. p. 23. t. 4.
Habitat in Europæ fossis rarius.
Nectarium obsoletum, deorsum spectans; faux absque
 gibbo palato, pervia ♂ bians.
- subulata.* 3. UTRICULARIA nectario subulato. *Gron. virg.* 6.
Habitat in Virginia.
- gibba.* 4. UTRICULARIA nectario gibbosof.
 Utricularia florum nectario gibbosof, scapo nunc uniflo-
 ro nunc bifloro. *Gron. virg.* 129.
Habitat in Virginia.
- bifida.* 5. UTRICULARIA scapo nudo bifido.
Habitat in China. Osbeck.
 Caulis filiformis, digitæ longitudine, bifidus s. duplii ra-
 cemō, nudus. Flores alterni, lutei: labio superiore la-
 teribus acuto.
- cernua.* 6. UTRICULARIA scapo nudo, squamis alternis va-
 gis subulatis. *Fl. zeyl.* 23. *
 Nelipu. *Kheed. mal.* 9. p. 137. t. 70.
Habitat in Zeylona.
- foliosa.* 7. UTRICULARIA caule folioso. †
 Linaria palustris, fœniculi folio. *Plum. spec.* 6.
Habitat in Americes Gallia æquinoctiali.

VERBENA.

* *Diandræ dispermæ.*

- arubica.* 1. VERBENA diandra, spicis longissimis foliosis.

Ver-

- Verbena* foliis ovatis acuminatis, spica foliosa. *Hort.*
cliff. 10. *
- Verbena* orubica, tenuissimis folio, primulæ veris flore, fili-
 quis & seminibus longissimis. *Pluk. alm.* 383. t. 228.
 f. 4. ♂ t. 327. f. 7.
- Sherardia* urticæ folio subrotundato, floribus violaceis.
Ehret. pict. t. 5. f. 1.
- Habitat* in Oruba insula americæ septentrionalis.
2. VERBENA diandra, spicis longissimis carnosis subnudis. *jamaicensis.*
- Verbena* foliis obtuse ovalibus, spica carnosa nuda. *Hort.*
cliff. 10. *Roy. lugdb.* 327.
- Verbena* folio subrotundo ferrato, flore cæruleo. *Sloan.*
hist. 171. t. 107. f. 1.
- Habitat* in Jamaica ♂ Caribæis. ♀ ⊖
3. VERBENA diandra, spicis ovatis, foliis lanceolatis ~~stœchadifol.~~
 ferrato-plicatis, caule fruticoso. *Roy. lugdb.* 327.
- Sherardia* nodiflora, stœchadis ferratifolii folio. *Vaill.*
sex. 49.
- Lavandula*, foliis crenatis latioribus, americana frute-
 scens. *Plum. spec.* 6.
- Habitat* in America Galliæ æquinoctialis.
4. VERBENA diandra, spicis laxis, calycibus alternis ~~prismaticis~~.
 prismaticis truncatis aristatis, foliis ovatis obtusis.
- Verbena* minima, chamædryos folio, *Sloan. jam.* 64.
- Habitat* in Jamaica.
5. *Verbena* diandra, spicis laxis, calycibus fructus reflexo-*mexicana.*
 pendulis subglobosis hispidis.
- Verbena mexicana*, trachelii folio, fructu apatinæ: *Dill.*
elth. 407. t. 302. f. 389.
- Habitat* in Mexico.
6. VERBENA diandra, calycibus subrotundis erectiusculis,
 seminibus echinatis. *lapponica,*
- Scorodonia* floribus spicatis purpurascentibus pentapeta-
 loidibus. *Sloan. jam.* 66.
- Blairia* *Houst. Amm. herb.* 277.
- Habitat* in Jamaica.
7. VERBENA diandra, spicis longis, calycibus aristatis, *curassavica.*
 foliis ovatis argute serratis.
- Veronica* similis fruticosa curassavica. *Herm. parad.* 240.
- Kempfera*. *Houst. m. ff.*
- Habitat* in Curassao Americes.

* *Tetrandrae, Tetrasperme.*

- nodiflora.* 8. VERBENA tetrandra, spicis capitato-conicis, foliis ferratis, caule repente. *Fl. zeyl.* 399.
Verbena foliis verticaliter ovatis, spicis globosis. *Hort. cliff.* 11.
Verbena foliis verticaliter ovatis, spicis solitariis ovatis.
Roy. lugdb. 327.
Verbena caule repente, foliis oblongis superne crenatis, pedunculis solitariis capitatis. *Gron. virg.* 7.
Verbena nodiflora. *Baub. pin.* 269. *prodr.* 125
Habitat in Virginia. ☽
- bonariensis.* 9. VERBENA tetrandra, spicis fasciculatis, foliis lanceolatis amplexicaulibus. *Hort. upf.* 8.
Verbena foliis lanceolatis, floribus congestis fastigiatis.
Hort. cliff. 11. *Roy. lugdb.* 326..
Verbena bonariensis altissima, lavendulæ canariensis folio, spica lavendulæ. *Dill. elth.* 406. *t.* 300. *f.* 387
Habitat in agro Bonariensi. ♀
- hastata.* 10. VERBENA tetrandra, spicis longis acuminatis, foliis hastatis. *Hort. upf.* 8.
Verbena foliis lanceolatis ferratis, spicis filiformibus paniculatis. *Roy. lugdb.* 327.
Verbena americana altissima, spica multiplici, urticæ foliis angustis, floribus cæruleis. *Herm. parad.* 242. *t.* 242.
Habitat in Canadæ humidis. ♀
- articulifolia.* 11. VERBENA tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis indivisis ferratis petiolatis. *Hort. upf.* 9.
Verbena foliis ovatis, caule erecto, spicis filiformibus paniculatis. *Hort. cliff.* 11. *Gron. virg.* 7. *Roy. lugdb.* 327.
Verbena recta canadensis, urticæ foliis. *Moris. hist.* 3. *p.* 418. *f.* 11. *t.* 25. *f.* 3.
Habitat in Virginie, Canadæ aridis. ♀
- buriae.* 12. VERBENA tetrandra, spicis filiformibus, foliis multifido-laciniatis, caulibus numerosis. *Hort. upf.* 8.
Veronica humilior, foliis incisis. *Clayt. virg.* 8.
Habitat in Canada, Virginia. ♀
- officinalis.* 13. VERBENA tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario.
Verbena foliis multifido-laciniatis, spicis filiformibus *Hort.*

Hort. cliff. 11. Fl. svec. 26. Roy. lugdb. 327. Dalib. paris. 9. Sauv. monsp. 279.

Verbena communis, flore cæruleo. Baub. pin. 269.

Habitat in Europæ mediterraneæ ruderatis. ⊖

14. VERBENA tetrandra, spicis filiformibus solitariis, *Supina*.
foliis bipinnatifidis.

Verbena tenuifolia. Baub. pin. 269.

Verbena supina. Clus. hist. 2. p. 46.

Habitat in Hispania.

LYCOPUS

1. LYCOPUS foliis sinuato-serratis.

europæus.

Lycopus foliis indivisis. Fl. svec. 27. Dalib. paris. 9.

Lycopus. Hort. cliff. 11. Roy. lugdb. 326.

Marrubium palustre glabrum. Baub. pin. 230.

Habitat in Europæ ripis humentibus. ♀

2. LYCOPUS foliis æqualiter serratis.

virginicus.

Lycopus foliis lanceolatis tenuissime serratis. Gron. virg. 8.

Habitat in Virginia. ♀

AMETHYSTEÆ.

1. AMETHYSTEÆ. *Hort. upf. 9. Amœn. acad. 386. * cærulea.*

Amerhyistica montana erecta, foliis exiguis digitatis trifidis ferratis, florculis cum coma e cæruleo-janthinis.

Amm. ruth. 4. Hall. act. upf. 1742, p. 51. f. 1.

Habitat in Sibiricæ montosis. ⊖

ZIZIPHORA.

1. ZIZIPHORA capitulis terminalibus, foliis ovatis. *capitata.*

Ziziphora foliis lanceolatis, floribus terminaticribus.

Hort. cliff. 305. Roy. lugdb. 313.

Clinopodium fistulosum pumilum indiæ occidentalis, summo caule floridum. Plak. alm. III. t. 164. f. 4. ⊖

Habitat in Syria.

2. ZIZIPHORA floribus lateralibus, foliis lanceolatis.

rennior.

Ziziphora foliis lanceolatis, floribus ex alis. Hort. cliff.

305.

Ziziphora foliis lanceolatis, floribus lateralibus. Roy. lugdb. 313. Hort. upf. 9.

Acinos syriaca, folio mucronato, capsulis hirsutis. Moris. hist. 3. p. 404. f. 11. t. 19. f. 3. 4.

Habitat in Syria? ⊖

- ccineoides.* 3. **ZIZIPHORA** floribus lateralibus, foliis ovatis.
Clinopodium supinum incanum. Amm. ruth. 66?
Habitat in Siberia. ♂
Habitus Thymi Acinos, sed majora quintuplo omnia. Folia
Z. capitatae; Flores laterales ut in Z. tenuiore 2, sed
copioiores. Calyces similiter hispidi; stamina extra cor-
olla tubum protruſa..

MONARDA.

- fistulosa.* 1. **MONARDA** capitulis terminalibus, caule obtus-an-gulo. *Hort. apf. 12.*
Monarda floribus capitatis, caule obtuso. Vit. cliff. 3.
Roy. lugdb. 313.
Monarda. Hort. cliff. 11.
Origanum fistulosum canadense. Corn. canad. 13. 1. 14.
Habitat in Canada. ♀
- didyma.* 2. **MONARDA** floribus capitatis sub-didynamis, caule acutangulo.
Monarda caule acute angulato, capitulis terminalibus.
Hort. cliff. 495. Cold. noveb. 7.
Monarda floribus capitatis verticillatisque, caule acute
angulato, foliis lanceolato ferratis glabris. Bätn. cun.
226.
Habitat in Pensilvania, Noveboraco.
- clinopodia.* 3. **MONARDA** floribus capitatis, foliis levibus ferratis.
Monarda foliis ovato-lanceolatis, verticillis lateralibus
dichotomis corymbosis, foliis inæqualiter ferratis. Gron.
virg. 9.
Habitat in Virginia. ♀
Radix repens. Facies plantæ præcedentis quoad statu-
ram, at folia gerit Clinopodii incani omnino; neque
bæsi spica rubra, nec flores tetrandri; foliisque gla-
berrimis distincta a prima; Folia ovato-oblonga, acu-
minata, profunde serrata, petiolata, utrinque levia.
Caulis quadrangularis, magis quam in prima, minus
argente quam in secunda. Flores in capitulum bracteis
radiatum, pallidi.
- punctata.* 4. **MONARDA** floribus verticillatis, corollis puncta-tis. *Hort. apf. 12.*
Monarda floribus verticillatis. Hort. cliff. 495. Gron.
virg. 9. Roy. lugdb. 313.
Clinopodium virginianum angustifolium, quovis verti-
cillo

cillo duodecim foliolis rubentibus cincto. *Pluk. alm.*
III. t. 24. f. 1.
Habitat in Virginia. ◎

5. MONARDA floribus verticillatis, corollis involucro *ciliata*,
 longioribus.

Monarda spica interrupta, involucris longitudine verti-
 cillorum lanceolatis. *Gron. virg. 9.* *

Clinopodium angustifolium non ramosum, flore cæru-
 leo: labio trifidis atropurpureis maculis ornato. *Pluk.*
alm. 10. t. 164. f. 3. *Moris. hist. 3. p. 374. f. 11. t.*
8. f. 6.

Habitat in Virginia.

ROSMARINUS.

1. ROSMARINUS. *Hort. cliff. 14.* *Hort. upf. 11.* *Mat. officinalis,*
med. 16. *Roy. lugdb. 310.*

Rosmarinus spontaneus, latiore folio. *Bauh. pin. 217.*

2. Rosmarinus hortensis, angustiore folio. *Bauh. pin. 217.*
Habitat in Hispania, G. narboneusi, Galilæa. b

SALVIA.

1. SALVIA foliis linear-lanceolatis denticulatis, floti- *egyptiaca*.
 bus petiolatis. *Hort. cliff. 13.* * *Roy. lugdb. 309.*
Horminum egyptium minimum ramosissimum. Lippi.
Boerb. lugdb. 1. p. 66.

Habitat in Ægypto.

2. SALVIA foliis lanceolatis, calycibus diphyllis. *cretica.*
Habitat in Creta.

3. SALVIA foliis radicalibus lyratis dentatis, corollarum *lyrata*.
 galea brevissima.

Salvia corollarum labio superiore breviore; fauce paten-
te. Gron. virg. 8.

Horminum virginianum erectum, urticæ foliis, flore mi-
nore; Moris. hist. 3. p. 395. f. 11. t. 13. f. 31.

Habitat in Virginia.

4. SALVIA foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, *officinalis*.
 floribus spicatis, calycibus acutis. *Hort. cliff. 12.* *Hort.*
upf. 10. *Mat. med. 13.* *Roy. lugdb. 307.* *Sauv. mons.*
143.

Salvia major. Bauh. pin. 237.

5. Salvia minor aurita & non aurita. *Bauh. pin. 237.*
Habitat in Europa australi. b

- pomifera.* 5. **SALVIA** foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus obtusis. *Hort. cliff.* 12. *Roy. lugdb.* 307.
Salvia cretica frutescens pomifera, foliis longioribus incanis & crispis. *Tournef. cor.* 10. *itin.* 1. p. 92. t. 92.
Salvia baccifera. *Baub. pin.* 237.
Habitat in Creta.
- urticifolia.* 6. **SALVIA** foliis ovato-oblongis duplicato-serratis, calycibus tridentatis: lacinia summa tridentata. *Gron. virg.* 8.
Horminum virginianum erectum, urticæ foliis, flore minore. *Morif. hist.* 3. p. 395. f. 11. t. 13. f. 31.
Habitat in Virginia.
- viridis.* 7. **SALVIA** foliis oblongis crenatis, corollarum galea semi-orbiculata, calycibus fructiferis reflexis.
Salvia foliis ovato-oblongis obtusis æqualiter crenatis. corollarum galea semi-orbiculata. *Hort. upf.* 11. *
Horminum coma viridi. *Tournef. inst.* 178.
Habitat - - - - ⊖
- Horminum.* 8. **SALVIA** foliis obtusis crenatis, bracteis summis stellatis majoribus coloratis. *Vir. cliff.* 4. *Hort. cliff.* 12. *Mat. med.* 14. *Roy. lugdb.* 310.
Horminum sativum. *Baub. pin.* 238.
Habitat in Græcia, Apulia. ⊖
- sylvestris.* 9. **SALVIA** foliis cordato-lanceolatis acutis, bracteis coloratis flore brevioribus.
Horminum sylvestre salvifolium majus maculatum. *Baub. pin.* 239.
Horminum sylvestre v. *Clus. hist.* 2. p. 31.
Horminum sylvestre salvisolum minus. *Baub. pin.* 239.
Habitat in Austria inferioris, Bohemie agrorum marginibus, vineis. 2
- haematoles.* 10. **SALVIA** foliis cordato-ovatis rugosis tormentosis, calycibus hispidis, radice tuberosa. †
Horminum sanguineum, asphodeli radice. *Triumph. obs.* 69. t. 69.
Horminum sylvestre maculatum tuberosum. *Honuphr.*
Horminum sylvestre majus haematoles glabrum, flore caeruleo, italicum. *Barr. rar.* 234. & 185.
Habitat in Italia.
Habitus Phlomidis & teneritudo Salviæ; Calyces pilis rectis, extantibus undique hispida sunt.

11. *SALVIA* foliis cordato-oblongis crenatis: summis *pratenfis*.
amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea
glutinosis.
Salvia foliis ovatis inciso-crenatis, verticillis subnudis.
Hort. cliff. 12. *Flor. suec.* 28. *Hort. upf.* 10. *Roy.*
lugdb. 310. *Dalib. paris.* 10.
Horinum pratense, foliis serratis. *Bauh. Pin.* 238.
- β. *Gallitrichum sylvestre*, flore majore albo. *Bauh. hist.*
3. p. 312.
Varicias β *dissertfoliis latioribus, obtusioribus, magis ca-*
nescientibus; floribus albis galea dimidio minore, serius
florentibus.
12. *SALVIA* foliis cordatis obtusis crenatis subtomen- *dominica*.
tosis, corollis calyce angustioribus.
Habitat in Domingo.
13. *SALVIA* foliis serratis sinuatis, corollis calyce an- *verbenacea*.
gustioribus. *Virid. cliff.* 17. *Gron. virg.* 8. *Roy. lugdb.*
309. *Dalib. paris.* 9. *Sauv. monsp.* 278.
Salvia foliis pinnatim incisis glabris. *Hort. cliff.* 12.
Horinum sylvestre, lavendulæ flore. *Bauh. pin.* 239?
Horinum sylvestre, inciso folio, parvo flore, italicum.
Barr. ic. 220. 208.
Horinum verbenacea laciniis angustifolium. *Triumf. obs.*
66. t. 66.
Habitat in Europæ paenam. 2
14. *SALVIA* foliis obtusis erosis, staminibus corolla du- *pyrenaica*.
plo longioribus. *Roy. longdb.* 309.
Horinum pyrenaicum glutinosum anguriæ folio. *Herm.*
parad. 187. t. 187.
Habitat in Pyrenæis.
15. *SALVIA* foliis ovatis utrinque acuminatis serratis. *mexicana*.
Hort. cliff. 13. *Roy. lugdb.* 308.
Sclarea mexicana altissima facie heliotropii, *Dill. elth.*
339. t. 254. f. 330.
Habitat in Mexicæ humentibus. 5
16. *SALVIA* foliis ovatis basibus mucronato-tuberosis, spi- *hispanica*.
cis imbricatis, calycibus trifidis.
Horinum sylvestre, lavendulæ flore. *Bauh. pin.*
239?
Sclarea hispanica. *Tabern. hist.* 764. ic. 374.
Habitat in Italia. *D. Rathgeb*; in Hispania. *Löfling*. ⊙
Caulis sesquipedalis, tetragonus, obtusus, quadrifolatus,
B 5 *super-*

superne pilis reflexis albis vestitus. Folia ovata, acuta, rugosa, serrata, basi acuta; petiolis basi utrinque obtuso mucrone prominentibus. Spica tetragona, imbricata Bracteis ovatis, longitudine calycum, ciliatis. Calyces sub singula squama s̄epe 5, ore tridentati, acuti, dente superiore solitario, inferioribus duobus. Corolla cærulea: limbo longitudine calycis: galea breviore subvilloso; labio inferiore trifido, obtuso, integerrimo, basi maculis 2. pallidis.

- indica.* 17. *SALVIA* foliis cordatis acute crenatis: summis sessilibus, verticillis subnudis remotissimis. *Roy. lugdb.* 15. *Sclearia indica*, floribus variegatis. *Tournef. inst.* 179.
Habitat in India.
- verticillata.* 18. *SALVIA* foliis cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollarum labio inferiore incurvabentibus. *Hort. upf.* 11. *
Salvia foliis cordato-sagittatis dentatis. *Hort. cliff.* 495.
Roy. lugdb. 309
Horminum sylvestre latifolium verticillatum. *Baub. pin.* 238.
Habitat in Austriae, Misniæ cultis & ruderatis. ☺
- glutinosa.* 19. *SALVIA* foliis cordato-sagittatis ferratis acutis. *Hort. cliff.* 13. *Hort. upf.* 11. *Roy. lugdb.* 308. *Sauv. monsp.* 146.
Horminum luteum glutinosum. *Baub. pin.* 238.
Habitat in Europæ lutoſis. ✕
- canariensis.* 20. *SALVIA* foliis hastato-triangularibus oblongis crenatis obtusis. *Hort. cliff.* 13. *Hort. upf.* 10. *Roy. lugdb.* 308.
Horminum canariense tomentosum, hastato folio. *Moris. hift.* 3. p. 394. f. 11. t. 13. f. 17.
Habitat in Canariis. Ȣ
- afr. caerulea.* 21. *SALVIA* foliis subrotundis ferratis: basi truncatis dentatis. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 308.
Salvia africana fruteicens; folio scorodoniae, flore violaceo. *Comm. hort.* 2. p. 181. t. 91.
Habitat ad Cap. b. spei, locis argillosis. Ȣ
- afr. lutea.* 22. *SALVIA* foliis subrotundis integerrimis: basi truncatis dentatis. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 308.
Salvia africana frutescens, folio subrotundo glauco, flore magno aureo. *Comm. hort.* 2. p. 183. t. 92.
Habitat ad Cap. b. spei juxta rivulos Ȣ
23. *SAL-*

23. *SALVIA* foliis rugosis oblongo-cordatis serratis, flo- *Sclarea*,
ralibus calyce longioribus concavis acuminatis. *Hort.*
cliff. 12. *Hort. upf.* 10. *Mat. med.* 15. *Roy. lugdb.*
309. *Dalib. paris.* 9.
Salvia foliis cordato-ovatis obscure undulatis, foliolis
floralibus lanceolato-concavis. *Guett. stamp.* 263.
Horminum Sclarea dielum. *Baub. pin.* 239.
Habitat in Syria, Italia. ♂
24. *SALVIA* foliis rugosis pinnatifidis lanatis. *seratophylla*.
Salvia foliis simplicibus dentato-pinnatis asperis. *Hort.*
cliff. 13. *Roy. lugdb.* 308.
Salvia foliis simplicibus dentato-pinnatis rugosis verru-
cosis. *Hort. upf.* 10.
Horminum rugoso verrucosoque folio cornu cerviex-
primente. Pluk. alm. 186. *t.* 194. *f. 5. Herm. pa-*
rad. 186. *t.* 186.
Habitat in Persia. ☽
25. *SALVIA* foliis oblongis dentato-angulatis hirsutis, *Aethiopis*,
verticillis lanatis, corollarum labio fuscato.
Salvia foliis lanceolatis sinuato-dentatis: floralibus ver-
ticilos comprimentibus. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.*
308.
Aethiopis foliis sinuosis. *Baub. pin.* 241.
β. *Aethiopis laciniatis* foliis. *Barr. rar.* 24. *t.* 188.
γ. *Marum egypticum. Velt. alp.* 212. *t.* 212.
Habitat in Illyria, Græcia, Africa. ☽
Labium inferius antice coharet & saccum format.
26. *SALVIA* foliis compositis pinnatis. *Hort. cliff.* 13. *pinnata*,
Roy. lugdb. 309.
Salvia orientalis latifolia hirsutissima viscosa pinnata,
flore & calyce purpureis, inodora. *Bærh. lugdb.* 1.
p. 167. t. 167.
Horminum arabicum, alatis foliis, flore rubello. Pluk.
alm. 186. *t.* 194. *f. 6.*
Habitat in Oriente & Arabia.
27. *SALVIA* foliis cordatis inæqualiter basi excisis, caule *nudum*,
subnudo, spicis ante florescentiam cernuis.
Habitat in Imperio Rutheno. ♀

DIANTHERA

1. *DIANTHERA*. *Gron. virg.* 6. *
Habitat in Virginia.

americana.

COL-

COLLINSONIA.

- canadensis.* 1. COLLINSONIA. Hort. cliff. 14. t. 5. Cold. noveb. 8.
Habitat in Virginie, Canadæ sylvis. 2

MORINA.

- Persica.* 1. MORINA Hort. cliff. 14. Roy. lugdb. 236.
Morina orientalis, carlinæ folio. Tournef. cor. 48. itin.
3. p. 132. t. 132.
Habitat in Persia ad Hispaham. 2

DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM.

- odoratum.* 1. ANTHOXANTHUM spica ovato-oblonga, flosculis subpedunculatis arista longioribus.
Anthoxanthum flosculis diandris. Hort cliff. 25. Roy. lugdb. 58.
Anthoxanthum Fl. succ. 29. Dalib. paris. 10.
Gramen pratense, spica flavescente. Baub. pin. 3. Scheuchz. gram. 88.
Habitat in Europa pratis. 2
- indicum* 2. Anthoxanthum spica linearis, flosculis sessilibus arista brevioribus. Fl. zeyl. 25. *
Habitat in India.
- paniculatum* 3. ANTHOXANTHUM floribus paniculatis. Aman. acad. 145.
Gramen spartum, panicula flavescente. Rudb. elys. 1. f. 14.
Habitat in Europa australiore.

TRIGYNIA.

PIPER.

- alatum.* 1. PIPER foliis ovatis subseptemnerviis glabris, petiolis simplicissimis. Fl. zeyl. 26. * Mat. med. 26.
Piper rotundum nigrum. Baub. pin. 411. Pluk. alm. 297. l. 437. f. 1.
Malago-codi. Rheed. mal. 7. p. 23. t. 12.
Habitat in India. 3
- Betle.* 2. PIPER foliis ovatis oblongisculis acuminatis septinerviis, petiolis bidentatis. Fl. zeyl. 27. *
Piper

- Piper qui Saururus foliis septinerviis oblongo-acuminatis.
Burm. zeyl. 193. t. 82. f. 2.
Beetla-codi. Rheed. mal. 7. p. 29. t. 15.
Habitat in India. 5
3. PIPER foliis ovatis acutiusculis subtus scabris: nervis *Malamiris.*
 quinque subtus elevatis. *Fl. zeyl.* 26. *
Frutex americanus, spica longa gracili. Pluk. alm. 297.
t. 215. f. 2.
Amalago. Rheed. mal. 7. p. - - - t. 16
Habitat in India utraque.
4. PIPER foliis cordatis subseptinerviis venosis. *Fl. zeyl. Siribon*
*29. **
Betela quem Sirib-boa vocant: Bont. jav. 91. t. 91.
Habitat in India.
5. PIPER foliis cordatis petiolatis sessilibusque. *Fl. zeyl. longum*
*30. * Mai. med.* 20.
Piper longum orientale. Bauh. pin. 412
Piper longum, pistolochiae foliis absque pediculis, made-
raspatanum. Pluk. alm. 297. t. 104. f. 4.
Cattu-tirpali. Rheed. mal. 7. p. 27. t. 14.
Habitat in India.
6. PIPER foliis lanceolato-ovatis quinquenerviis rugosis. *Amalago.*
Piper longum arboreum altius, folio nervoso minore, spi-
ca gracili & breviore. Sloan. hist. I. p. 134. t. 87. f. 1.
Piper frutex, spica longa gracili. Pluk. alm. 297. t. 215.
f. 2.
Saururus foliis lanceolato-ovatis quinquenerviis rugosis.
Hort. cliff. 140.
Habitat in Jamaica.
7. PIPER foliis cordatis quinquenerviis reticulatis. *reticulatum.*
Saururus botryoides major arborescens, foliis plantagi-
neis. Plum. amer. 57. t. 75.
Jaborandi. Marcgr. bras. 37. *Pif. bras.* 97.
Habitat in Martinica, Brasilia.
8. PIPER foliis ovato-lanceolatis: nervis alternis, spicis *aduncis*
uncinatis.
Piper longum, folio nervoso pallide viridi, humilius.
Sloan. hist. I. p. 135. t. 87. f. 2.
Saururus foliis ovato-lanceolatis: nervis alternis. Hort.
cliff. 140. *Roy. lugdb.* 8.
Saururus arborescens, fructu adunco. Plum. amer. 58. t. 77.
Habitat in Jamaica.

- pellucidum.* 9. PIPER foliis cordatis petiolatis, caule herbaceo.
 Piper foliis cordatis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 6.
 t. 4. * *Roy. lugdb.* 8.
 Saururus minor procumbens botryitis, folio crasso cor-
 dato. *Plum. amer.* 54. t. 72.
Habitat in America calidiore. ◎
- acuminatum* 10. PIPER foliis lanceolato-ovatis nervosis carnosis.
 Saururus alius humilis, folio carnosō & acuminato. *Plum.*
amer. 54. t. 71.
Habitat in America calidiore.
- obtusifolium.* 11. PIPER foliis obverse ovatis enerviis.
 Saururus humilis, folio carnosō subrotundo. *Plum. amer.*
 53. t. 70.
Habitat in America calidiore.
- rotundifol.* 12. PIPER foliis orbiculatis solitariis carnosis.
 Saururus repens, folio orbiculari nummulariæ facie. *Plum.*
amer. 52. t. 69.
Habitat in America calidiore.
- maculofum.* 13. PIPER foliis peltatis ovatis.
 Saururus hederaceus, caulis maculosis, major. *Plum.*
amer. 60. t. 66.
Habitat in Domingo.
- pelatum.* 14. PIPER foliis peltatis orbiculato-cordatis obtusis repan-
 dis, spicis umbellatis.
 Sanrurus arborescens, foliis amplis rotundis & umbili-
 catis. *Plum. amer.* 56. t. 74.
Habitat in America calidiore.
- difachyon.* 15. PIPER foliis ovatis, spicis conjugatis.
 Saururus hederaceus, caulis maculosis, minor. *Plum.*
amer. 51. t. 67.
Habitat in Americes Gallia æquinoctiali.
- umbellatum.* 16. PIPER foliis cordatis subrotundis acutis venosis, spi-
 cis umbellatis.
 Saururus arborescens, foliis amplis cordatis non umbilica-
 catis. *Plum. amer.* 53. t. 73.
Habitat in Domingo.
- trifolium.* 17. PIPER foliis ternis subrotundis.
 Saururus hederaceus triphyllus, folio rotundo. *Plum.*
amer. 52. t. 68.
Habitat in Americes Gallia æquinoctiali.

Classis III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

VALERIANA.

1. VALERIANA floribus monandris caudatis, foliis lan- *rubra*,
ceolatis integerrimis. *Hort. cliff.* 15. *Hort. upf.* 14.
Roy. lugdb. 235. *Dalib. paris.* 12.
Valeriana rubra. *Baub. pin.* 165.
Habitat in Gallia, Helvetia, Italiæ ruderatis. 2
2. VALERIANA floribus monandris, foliis pinnatifidis. *calcitrapæ.*
Hort. upf. 14.
Valeriana foliis pinnato-laciniatis, floribus monandris.
Irid. cliff. 4. *Hort. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 235. *Sauv.*
monsp. 275.
Valeriana foliis calcitrapæ. *Baub. pin.* 164.
Valeriana sylvestris, foliis tenuissime divisis. *Baub. pin.*
165.
Habitat in Lusitania. ◎
3. VALERIANA floribus diandris ringentibus, foliis o- *cornucopiae*.
vatis sessilibus. *Hort. cliff.* 15. *Hort. upf.* 13. *Roy.*
lugdb. 235.
Valeriana peregrina purpurea albave. *Baub. pin.* 164.
prodr. 87.
Habitat in Americæ, Mauritaniæ, Siciliæ, Hispaniæ ar-
vis. ◎
4. VALERIANA floribus triandris dioicis, foliis pinnatis. *dioica..*
Valeriana dioica. *It. cel.* 46. *Fl. suec.* 31. *Dalib. paris.* 11.
Valeriana, foliis caulinis pinnatis, sexu distincta. *Hort.*
cliff. 16.
Valeriana, foliis caulinis pinnatis, polygamia. *Kir. cliff.*
5. *Roy. lugdb.* 235.
Valeriana palustris minor & *Valeriana palustris* inodora
parum laciniata, *Baub. pin.* 86.
Valeriana alpina minor. *Baub. pin.* 165. *prodr.* 87.
Habitat in Europæ campis uliginosis. 2
5. VALERIANA floribus triandiis, foliis omnibus pin- *officinalis*.
natis. *Mat. med.* 21. *Hort. cliff.* 15. *Fl. suec.* 30.
Roy. lugdb. 234. *Dalib. paris.* 11.

Vale-

Valeriana sylvestris major. Baub. pin. 164. Fl. lapp. 14.
Habitat in Europæ nemoribus paludosis. 2

Pnu.

6. **VALERIANA** floribus triandris, foliis caulinis pinnatis; radicalibus indivisis. Hort. upf. 13. Mat. med. 22.
Valeriana foliis infulinis integris; proximis laciniatis; caulinis pinnatis. Hort. cliff. 15. Roy. lugdb. 234.
Valeriana hortensis. Baub. pin. 164.
Habitat in Alsatia. 2
Caule non sulcato & folioli extensoribus majoribus a. V. officinali etjam differt.

ripteris.

7. **VALERIANA** floribus triandris, foliis radicalibus cordatis; caulinis ternatis lanceolatis ferratis.
Valeriana floribus triandris, foliis radicalibus cordatis, aliis laciniatis. Sauv. monsp. 276.
Valeriana alpina prima. Baub. pin. 165. prodr. 86. t. 86.
Valeriana alpina altera. Baub. pin. 165.
Valeriana alpina minor, planta palmaris. Pluk. alm. 380. t. 231. f. 7.
Valeriana minima, planta uncialis. Pluk. alm. 380. t. 231. f. 8.
Habitat in alpibus Helvetiæ.
Involucra propria sunt diphylla, setacea. 4

montana.

8. **VALERIANA** floribus triandris, foliis ovato-oblongis subdentatis, caule simplici.
Valeriana foliis omnibus integris ex ovato-acuminatis leviter dentatis. Hall. helv. 664. it. 8.
Valeriana montana, subrotundo folio. Baub. pin. 165.
Valeriana alpina, scrophulariæ folio. Baub. pin. 164. prodr. 87. *
Valeriana alpina, nardo celtice similis, inodora. Pluk. alm. 380. t. 232. f. 2.
Nardo celticae similis inodora. Baub. pin. 165.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Rhæticis, Pyrenæis. 2

celtica.

9. **VALERIANA** floribus triandris, foliis ovato-oblongis obtusis integerrimis. Mat. med. 23.
Valeriana foliis ovatis obtusis minime dentatis. Hall. helv. 664.
Nardus ex apulia. Baub. pin. 165.
Nardus celtica dioscoridis. Baub. pin. 165.
Nardus celtica altera. Baub. pin. 166.
Nardus celtica. Baub. hist. 3. p. 205.
Spica celtica fastigio flosculorum ordine differens. Cam. epit. 14.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Valesiæ. 2

10.

10. VALERIANA floribus triandris, foliis lanceolatis *tuberosa*.
integerrimis: caulinis basi pinnatis.
Nardus montana, radice olivari. *Bauh. pin.* 165.
11. Nardus montana, radice oblonga. *Bauh. pin.* 165.
Nardus montana, longius radicata. *Cam. epit.* 16.
Habitat in Dalmatia, Sicilia, Galloprovincia. 2
11. VALERIANA floribus triandris, foliis subdentatis; ra- *saxatilis*.
dicalibus ovatis, pedunculis communibus elongatis.
Valeriana alpina nardo celtice similis. *Bauh. pin.* 165.
Valeriana sylvestris alpina 2 *saxatilis*. *Clas. hist.* 1. p.
56. *bona*.
Nardo Celticæ similis inodora. *Bauh. pin.* 165. *prodri.*
88. *Bors. I III:* 122.
Habitat in alpibus Styriae, Austriae. 2
12. VALERIANA floribus triandris, foliis cordatis fer- *pyrenaica*.
taris petiolatis: summis ternatis. *Hort. cliff.* 15. *Roy.*
lugdb. 235.
Valeriana maxima pyrenaica, cacaliæ folio. *Tournef. inst.*
131.
Valeriana canadensis. *Riv. mon.* 6.
Valeriana orientalis, alliariæ folio, flore albo. *Buxb. cent.*
2. p. 19. t. 11.
Habitat in Pyrenæis? 2
13. VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus cor- *Chinenis*.
datis repando-lobatis.
Habitat in China. *Olbæk.*
Caules herbacei, erecti, plus quam pedales, ramis floriferis oppositis; Folia opposita, petiolata, glabra, cordata, acuta, lobis lateralibus utrinque binis obtusis. Rami et caules terminati umbellulis involucello cinctis. Semina nuda.
14. VALERIANA floribus triandris, caule dichotomo, *Locusta*
foliis linearibus. *Fl. suec.* 32. *Hort. upf.* 14. *Dalib.*
perif. 12.
Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis integris.
Vir. cliff. 5.
- a. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis integris, *olitoria*.
fructu simplici. *Hort. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 235.
Valeriana campestris inodora major. *Bauh. pin.* 165.
15. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis serratis, *vesicularia*.
calycibus inflatis. *Hort. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 235.
Valeriana cretica, fructu vesiculari. *Tournef. cor.* 6. *Boerb.*
lugdb. 1. p. 75. t. 75.

- coronata.* 2. *Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis dentatis, fructu sexdentato.* *Hort. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 235.
Valeriana semine stellato. *Bauh. pin.* 165.
- dentata.* 3. *Valeriana caule dichotomo, foliis oblongis subserratis, seminis corona tridentata.* *Hall. helv.* 666. *Dalib. paris.* 12.
Locusta major. *Riv. mon.* 6.
- radicata.* 4. *Valeriana caule dichotomo, capitulis terminalibus involucro cinctis.* *Gron. virg.* 10.
Valeriana marilandica, foliis oblongis obtusis. *Raj. suppl.* 3. p. 244.
Habitat a. in Europæ, B. Cretæ, Y. Lusitaniæ, d. Europæ australioris, e. Marilandiae arvis. ☽
- mixta.* 15. **VALERIANA** floribus triandris, caule quadrifido, foliis imis bipinnatifidis, seminis pappo plumoso. *Sauv. monsp.* 275. †
Valerianella semine umbilicato hirsuto minore. *Morif. umb.*
Habitat Monspelii.
- Sibirica.* 16. **VALERIANA** floribus tetrandris æqualibus, foliis pinnatifidis, seminibus palca ovali adnatis. *Hort. upf.* 13.
Valeriana lutca humilis, *Amm. ruth.* 18. n. 25, t. 3.
Habitat in Sibiriae campis. ☽

HIRTELLA.

- americana.* 1. **HIRTELLA**, *Hort. cliff.* 17. *
Habitat in America meridionali. 5.

OLAX.

- zeylanica.* 1. **OLAX**. *Fl. zeyl.* 34. * *Aman. acad.* 1. p. 387.
Arbor stercorearia zeylanica glandifera. *Burm. zeyl.* 26.
Habitat in Zeylona. 5.

TAMARINDUS.

- indica.* 1. **TAMARINDUS**. *Hort. cliff.* 18. *Mat. med.* 28.
Hort. upf. 15. *Fl. zeyl.* 14. *Roy. lugdb.* 465.
Siliqua arabica, quæ Tamarindus. *Bauh. pin.* 403.
Balam-pulli. *Rheed. mal.* 1. p. 39. t. 23.
Habitat in India, America, Ægypto, Arabia. 5

CNEORUM.

- tricoccon.* 1. **CNEORUM**. *Hort. cliff.* 18. *Roy. lugdb.* 119.
Cha-

Chamælea tricoccos. Baub. pin. 462.

Chamælea. Cam. epit. 973.

Habitat in Hispaniæ, Narbonæ glareofis. 5.

MELOTHRIA.

1. MELOTHRIA. *Hort. cliff.* 490; * *Hort. nps.* 15. *pendula.*
Gron. virg. 10. *Roy. lugdb.* 528.

Cucumis parva repens virginiana, fructu minimo. Pluk.
alm. 123. t. 85. f. 5.

Cucumis minima, fructu ovali nigro lævi. Sloan. hist. 1;
p. 227. t. 142. f. 1.

Habitat in Canada, Virginia, Jamaica. ◎

LOEFLINGIA.

1. LOEFLINGIA. *hispanica.*
Illecebrum procumbens ramosum, floribus laterilibus

imbricatis. Læst. descr. VI. 34.

Habitat in Hispaniæ collibus apricis. ◎

Caules profusi Schleranthi s. Herniariae, viscidii. Folia
subulata, brevissima, utrinque dente notata. Spicæ
breves, squarroso, axillares, Bracteis imbricatis, subu-
latis, dentatis:

POLYCNEUM.

1. POLYCNEUM Saut. monsp. 45. *arvensis.*
Salsola caule repente, foliis & stipulis sessilibus subula-

tis cartilagineis. Dalib. paris. 80.

Chenopodium foliis subulatis prismaticis, floribus soli-
tariis sessilibus axillaribus. Grett. stamp. 14.

Chenopodium annuum humifusum, folio breviori & ca-
pillaceo. Tournef. inst. 506.

Caniphorata vaginis spinosis. Hall. helv. 183.

Campherata congener. Baub. pin. 486.

Herniaria foliis longis angustis acuminatis & glabris.
Magn. char. 51.

Habitat in Galliæ, Italiæ, Germaniæ arvis.

CASSYTHA;

1. CASSYTHA Osbeck. *filiformis.*
Cuscuta altera s. major. Camel. Luz. 1. p. 1. n. 1. Pet.

gaz. 77. t. 49. f. 12.

Cuscuta baccifera barbadensium a maritimis. Pluk. alm.
126. t. 172. f. 2.

Acatia-valli. Rheed mal. 7 p. 83. t. 44. Raj. suppl. 551
C 2 Ha-

Habitat in India.

Habitus & omnia Cuscute, ac fructificatio diversissima.

CROCUS.

- sativus.* 1. CROCUS spatha univalvi radicali, corolla tubo longissimo.
Crocus floribus fructui impositis: tubo longissimo. *Roy. lugd. 41. Hort. upf. 15. Mat. med. 27.*
vernus. 2. Crocus flore fructui imposito. *Hort. cliff. 18.*
- officinalis.* a. Crocus autumnalis sativus. *Moris. bist. 2. p. 335. f. 4 t. 2. f. 1.*
Crocus sativus. *Baub. pin. 65.*
b. Crocus vernus latifolius. I-XI. & I-VI. *Baub. pin. 65. 66.*
Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenæis, Lusitanicis, Tracicis. 2
- Bulbocodium.* 2. CROCUS spatha diphylla flori approximata, tubo corollæ brevi.
Crocus flore fructui imposito: tubo brevi. *Roy. lugd. 41. Sisyrinchium minus angustifolium, flore majore variegato. Baub. pin. 41.*
Sisyrinchium asprellum, angusto folio, alterum. *Col. eijkbr. 2. p. 5. t. 7. f. 1.*
Bulbocodium crocifolium, flore magno albo fundo luteo. *Tournes. cor. 50.*
Habitat in alpibus Italicis. 2

IXIA.

- africana.* 1. IXIA floribus capitatis, spathis laceris.
Ixia. *Hort. cliff. 490. * Roy. lugd. 20.*
Ixia foliis ad radicem nervosis gramineis, floribus ac fructu convolutis. *Burm. afric. 191. t. 70. f. 2.*
Bermudiana capensis, capitulis lanuginosis. *Pet. sicc. 242.*
Grimen eriophorum africanum, flore lanato. *Pfluk. mant. 98.*
Habitat ad Cap. b. Spei. 2
- chinensis.* 2. IXIA foliis ensiformibus, floribus remotis. *Hort. upf. 16.*
Bermudiana, iridis folio majori, flore croceo eleganter punctato. *Krauf. Hort. 25. t. 25.*
Baleincanda-Schularmandi. *Rheed. mal. 11. p. 73. t. 37.*
Habitat in India. 2

GLADIOLUS.

- communis.* 1. GLADIOLUS foliis ensiformibus, floribus distantibus.
Gladio-

- Gladiolus foliis ensiformibus. *Hort. cliff.* 20. *Hort. nps.*
16.
Gladiolus caule simplicissimo, foliis ensiformibus. *Roy.*
lugdb. 19.
Gladiolus floribus uno verso dispositis. *Baub. pin.* 41.
Habitat in Europa australi. 2
2. GLADIOLUS foliis ensiformibus, floribus imbricatis. *imbricatus.*
Habitat in Russia citeriore. 2
Flores parvi versus unum latus imbricati.
3. GLADIOLUS foliis linearibus, caule simplicissimo, *spicatus.*
floribus spicatis. *Roy. lugdb.* 19.
Habitat in Africa. 2
4. GLADIOLUS foliis linearibus, floribus distantibus, *angustus.*
corolarum tubo limbis longiore.
Gladiolus caule simplicissimo, foliis linearibus, floribus
alternis. *Roy. lugdb.* 19.
Gladiolus foliis linearibus. *Hort. cliff.* 20. * t. 6.
Habitat in Africa. 2
5. GLADIOLUS caule ramoso, foliis linearibus. *Roy. ramosus.*
lugdb. 19.
Habitat in Africa. 2
6. GLADIOLUS caule ramoso, capitulis pedunculatis, *capitatus.*
radice tuberosa.
Habitat in Africa. 2
Planta est maxima; floribus cæruleis.

ANTHOLYZA.

1. ANTHOLYZA stamine uno declinato. *ringens.*
Gladiolo æthiopico similis planta angustifolia. *Comm.*
hort. 1. t. 41. *Rudb. elys.* 2. p. 237.
Gladiolus floridus rictum referens coccineus: suprema
lacinia erecta & fistulosa. *Breyn. ic.* 21. t. 8. f. 1.
Habitat in Æthiopia. 2
2. ANTHOLYZA staminibus omnibus adscendentibus. *Cunonis.*
Cunonia floribus sessilibus, spathis maximis. *Büttn. cun.*
211. t. 1.
Gladiolus æthiopicus, flore coccineo. *Corn. canad.* 78.
t. 79. *Morif. hist.* 2. p. 421. f. 4. t. 23. f. 1.
Habitat ad Cap. b. Spei. 2
Utrum hæc sit distincti generis planta, tum primum elu-
cescat, cum præcedentis flores examinentur ulterius.

IRIS

* *Barbatæ nectariis petalorum reflexorum.*

- susiana.* 1. IRIS corollis barbatis, caule foliis longiore unifloro.
Hort. cliff. 18. *Roy. lugdb.* 17.
Iris susiana, flore maximo ex albo nigricante. *Baub. pin.*
31. theatr. 579
Habitat in Oriente; venit constantinopoli in Belgium
1573. 2
Caulis teres; Germen trigono-teretiusculum; Petala 3 in-
teriora majora reflexa,
- germanica.* 2. IRIS corollis barbatis, caule foliis longiore multifloro.
Hort. cliff. 18. *Hort. upf.* 16, *Mat. med.* 24. *Roy.*
lugdb. 17.
Iris vulgaris germanica s. sylvestris. *Baub. pin.* 30.
Iris hortensis latifolia. *Baub. pin.* 31,
Habitat in Germania editis. 2
- aphylla.* 3. IRIS corollis barbatis, scapo nudo longitudine foliorum
 multifloro. *Roy. lugdb.* 17.
Iris latifolia, caule aphylo. *Baub. pin.* 32,
Habitat - - - - 2
- variegata.* 4. IRIS corollis barbatis, caule subfolioso longitudine fo-
 liorum multifloro. *Roy. lugdb.* 17, *Hort. upf.* 16.
Iris corollis barbatis, caule altitudine caulis multiflori.
Hort. cliff. 19.
Iris latifolia pannonica, colore multiplici. *Baub. pin.* 31.
Habitat in Hungaria. 2
- biflora.* 5. IRIS corollis barbatis, caule foliis breviore multifloro.
Hortus, upf. 17.
Iris corollis barbatis, foliis caulem multiflorum super-
antibus. *Hort. cliff.* 19. *Roy. lugdb.* 17.
Chamæiris major saturate purpurea binora. *Baub. pin.*
33
Habitat in Lusitanie rupibus. 2
- pumila.* 6. IRIS corollis barbatis, caule foliis breviore unifloro.
Iris corollis barbatis, foliis caulem uniflorum superantibus.
Hort. cliff. 19. *Roy. lugdb.* 17.
Chamæiris minor, flore purpureo. *Baub. pin.* 33
Habitat in Austræ, Pannoniæ, collibus apicis. 2
- * * *Imberbes: petalis deflexis levibus*
- Pseudacorus.* 7. IRIS corollis imberibus, petalis interioribus trigmate
 minoribus, foliis ensiformibus. *Hort. cliff.* 19. *Fl.*
suec. 33. *mat. med.* 25. *Acc-*

Acorus adulterinus. Baub. pin. 34. theatr. 634.

Habitat in Europa ad ripas paludum fossarum. 4

8. IRIS corollis imberibus, petalis internis longitudine *fatidissima*,
stigmatis, foliis ensiformibus. Hort. cliff. 19. Roy.
lugdb. 18. Dalib. paris. 13. Sauv. monsp. 41.

Gladiolus foetidus. Baub. pin. 30.

Spathula foetida Xyris. Baub. hist. 2. p. 731. Dod. perapt.
247.

Habitat in Gallia, Anglia, Hetruria. 2

9. IRIS corollis imberibus, germinibus trigonis, caule *sibirica*,
tereti, foliis linearibus. Hort. cliff. 19. Hort. upf. 17.

Roy. lugdb. 78. Hall. helv. 2. So. Gmel. sibir. 1. p. 28.

Iris pratensis angustifolia non foetida altior. Baub. pin.
32, theatr. 597.

Habitat in Austræ, Helvetiæ, Sibiriæ pratis. 2

10. IRIS corollis imberibus, germinibus subtrigonis, caule *versicolor*,
tereti, foliis ensiformibus.

Iris americana versicolor, stylo crenato. Dill. eltb. 188.
t. 155. f. 188.

Iris americana versicolor, stylo non crenato. Dill. eltb.
187. t. 155. f. 187.

Iris latifolia virginiana, florum petalis repandis purpureis,
Ebret. pid. t. 6. f. 2.

Habitat in Virginia, Marilandia, Pensylvia. 2

11. IRIS corollis imberibus, germinibus trigonis, caule *virginica*,
ancipi. Gron. virg. 11.

Habitat in Virginia. 2

12. IRIS corollis imberibus, germinibus sexangularibus, *spuria*,
caule tereti, foliis sublinearibus. Hort. cliff. 19. Hort.

upf. 17. Roy. lugdb. 16.

Iris pratensis angustifolia, folio foetido, Baub. pin. 32.

Habitat in Germaniæ pratis. 2

13. IRIS corollis imberibus, germinibus sexangularibus, *graminea*,
caule ancipi, foliis linearibus. Hort. cliff. 19. Hort.

upf. 17. Roy. lugdb. 18

Iris angustifolia prunum redolens minor Baub. pin. 33.

Habitat in Austria ad radices montium 2

14. IRIS corollis imberibus, caule unifloro foliis breviore, *verna*,
radice fibrosa. Gron. virg. 10.

Iris virginiana pumila L. Chamæiris verna angustifolia,
C 4 flore

flore purpuro cæruleo odorato. *Plak. alm.* 198. 1.
196, f. 6.

Habitat in Virginia. ♀

tuberosa.

15. IRIS corollis imberbibus, foliis tetragonis. *Vir. cliff.*
6. *Hort. cliff.* 20. *Nat. med.* 26. *Roy. lugdb.* 18.
Iris tuberosa, folio anguloſo. *Baub. pin.* 40.
Hermodactylus folio quadrangulo. *Tournef. cor.* 50.
Habitat in Arabia & Oriente. ♀

Xiphium.

16. IRIS corollis imberbibus, foliis subulato-canaliculatis
caule brevioribus. *Hort. upf.* 17.
Iris foliis margine conniventibus, corollis imberbibus.
Hort. cliff. 20.
Iris caulescens, foliis margine conniventibus, corollis
imberbibus. *Roy. lugdb.* 18.
Iris bulbosa latifolia, caule donata. *Baub. pin.* 38.
β. *Iris bulbosa cæruleo-violacea.* *Baub. pin.* 40.

Habitat in Hispania. ♀

persica.

17. IRIS corollis imberbibus, foliis subulato-canaliculatis
caule longioribus.
Iris scaulis, foliis margine conniventibus, corollis im-
berbibus. *Roy. lugdb.* 18.
Xiphion persicum præcox, flore variegato. *Tournef.*
infl. 363.
Habitat in Persia. ♀

Sisyrinchium 18. IRIS corollis imberbibus, foliis canaliculatis, bulbis
germinis superimpositis.

Sisyrinchium majus. *Baub. pin.* 40. *Clus. hist.* 1. p. 216.

β. *Sisyrinchium medium.* *Baub. pin.* 41.

Sisyrinchium minus. *Clus. hist.* 216.

Habitat in Hispania, Lusitania. ♀

Colore est petalorum purpureo macula lutea loco barbae; bul-

bis (non tunicatis simplicibus ut in bulbosis Xiphiis 16.

17, sed) ex gemino bulbo altero alteri impasto, ut in

Gladjolo, Croco.

COMMELINA.

* *Dipetalæ dictæ.*

communis.

- I. COMMELINA corollis inæqualibus, foliis ovato-lan-
ceolatis acutis, caule procumbente glabro, *Hort. upf.* 18.
Commelina foliis ovato-lanceolatis, caule procumbe-
nte glabro, petalis duobus majoribus. *Virid. cliff.* 6.
Hort. cliff. 21. *Roy. lugdb.* 17. *Gron. virg.* 130.

Com-

Commelina procumbens annua, saponariæ folio. *Dill.*
elth. 93. t. 78. f. 69.

Habitat in America. ◎

2. COMMELINA corollis inæqualibus, foliis lanceolatis glabris obtusis, caule repente.

Commelina radice perenni, foliis lanceolatis, caule repente glabro, petalis duobus majoribus. *Hort. ultr.*
323.

Commelina procumbens, flore luteo. *Roy. lugdb.* 538.

Habitat in Aethiopia. ♀

Differit a prima petalis istis majoribus reniformibus luteis, tertio ovario filamentis longioribus æquali, vaginis foliorum ciliatis, involucro non reticulato.

3. COMMELINA corollis inæqualibus, foliis ovatis oblonghalenfis. tatis, caule repente.

Ephemerium benghalense serpens, folio sebrotundo brevi, phalangoides. *Pluk. aim.* 130. *t. 27. f. 3.*

Habitat in Benghalia.

4. COMMELINA corollis inæqualibus, foliis ovato-lanceolatis, caule erecto scabro simplicissimo. *Hort. upf.* 18

Commelina foliis ovato-lanceolatis, caule erectissimo scabro, petalis duobus majoribus. *Virid. cliff.* 16. *Hort. cliff.* 495. *Gron. virg.* 11. *Roy. lugdb.* 38.

Commelina erecta, ampliore subcæruleo flore. *Dill.*
elth. 94. p. 77. t. 88.

Habitat in Virginia, ♀

* * *Tripetala Zanoniae Pl.*

5. COMMELINA corollis æqualibus, foliis ovato-lanceolatis subciliatis. *Hort. upf.* 18.

Commelina foliis ovato-lanceolatis, petalis tribus majoribus æqualibus. *Hort. cliff.* 21. *Roy. lugdb.* 38.

Commelina radice anacampserotidis. *Dill. elth.* 94. *t.*
79. f. 90.

Habitat in Mexico. ♀

6. COMMELINA corollis æqualibus, pedunculis incrassatis, foliis linearis lanceolatis. †

Zanonia graminea perfoliata. *Plum. gen.* 38.
Habitat in America Galliae æquinoctialis.

7. COMMELINA corollis æqualibus, pedunculis capillaris, foliis linearis lanceolatis, involucro nullo. *Fl.*
zeyl. 51.

Ephe-

Ephemerum phalangoides maderaspatense minimum, foliis perangustis, persiliatum. *Pluk. alm.* 135. t. 27. f. 4.
Habitat in India.

- axillaris.* 8. *COMMELINA* corollis æqualibus, floribus sessilibus, foliis linearibus.
Ephemerum phalangoides maderaspatanum minimum, secundum caulem quasi ex utriculis floridum. *Pluk. alm.* 135. t. 174. f. 3.
Ephemerum malabaricum. flore tripetalō in foliorum alis sessili. *Raj. suppl.* 567.
Nir-pulli. *Rheed. mal.* 10. p. 28. t. 13.
Habitat in India.
- cristata.* 9. *COMMELINA* corollis æqualibus, involucris spicatum imbricatis, *Fl. zeyl.* 32.
Ephemerum zeylanicum procumbens inflatum. *Herm. parad.* 148. *Raj. hist.* 566.
Habitat in Zeylona.

X YRIS.

- indica.* 1. *XYRIS.*
Xyris foliis gladiatis. *Gron. virg.* 11. *Fl. zeyl.* 35.
Gladio lacustri accedens malabarica, e capitulo botryoidico florifera. *Pluk. alm.* 170. t. 416. f. 4.
Katjiletti-pullu. *Rheed. mal.* 9. p. 139. t. 7.
Habitat in Indiis.

SCHOENUS.

- Mariicus.* 1. *SCHOENUS* culmo tereti, foliis margine dorsoque aculeatis. *Fl. svec.* 35. *It. got.* 170. * *Dalib. paris.* 14. *Pseudo-cyperus palustris.* foliis & carina ferratis. *Scheuchz. gram.* 375.
Cyperus longus inodorus germanicus. *Baub. pin.* 14.
Habitat in Europæ paludibns. 2
- aculeatus.* 2. *SCHOENUS* culmo tereti ramoso, capitulis terminibus, involucro triphylio brevissimo rigido patente. *Gramen album,* capitulis aculeatis, italicum. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 108. *Scheuchz. gram.* 85. *Morif. hist.* 3. p. 195. f. 8. t. 5. f. 3.
Gramen spicatum, spicis in capitulum foliatum congestis. *Tournef. inst.* 517.
Gramen aculeatum. *Cam. epit.* 745.
Habitat in Italia, Narbona, Lusitania, Archipelagi insulis. 2
- macronotus.* 3. *SCHOENUS* culmo tereti nudo, spicis-fasciculatis divaricatis, involucro triphylio subulato, *Scir-*

*Scirpus culmo tereti, foliis tribus patulis flosculisque ag-
gestis terminato.* Sauv. monsp. 9.

Scirpus maritimus, capite glomerato. Tournef. inst. 46.
Scheuchz. gram. 367.

Gramen Cyperoides maritimum. Baub. pin. 6. theatr. 91.
Gramen juncum maritimum, capite squamoso foliaceo,

Moris. hist. 3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 6.

*Habitat in Galliae, Narbonæ, Tyrreni, Smyrnæ mari-
timis.* 2

*Folia et jam involuci apice pungunt. Spicae oblongae, sessiles,
apicibus distantes; Involucrum triphyllum, interdum
diphyllum.*

4. SCHOENUS culmo tereti nudo., capitulo ovato: in- *nigricans.*
volueri diphilli valvula altera subulata longa. Fl. suec.
36. it. gotl. 234. Dalib. paris. 113.

Scirpus flosculis spicatis. Act. Stockh. 1741. p. 182.

Juncus hævis minor, panicula glomerata nigricante. Moris
hist. 3. p. 233. f. 8. t. 10. f. 28.

Junco affinis capitulo glomerato nigricante. Scheuch.
gram. 349.

Habitat in Europæ paludibus æstate, exsiccatis. 2

5. SCHOENUS culmo tereti nudo, spica duplo, invo- *ferrugineus.*
luci vaivuli majore spicam æquante.

*Gramen Cyperoides minimum, caryophylli proliferi ca-
pitulo simplici squinato.* Moris. hist. 3. p. 245. f.
8. t. 12. f. 40.

Habitat in Gotlandia, Angliae paludibus. 2

* * Culmo triquetro.

6. SCHOENUS culmo triquetro, capitulo subrotundo, *coloratus.*
involutro longissimo plano variegato.

Schœnus florum capitulis involutro longissimo radiatis.
Hort. cliff. 495.

*Gramen Cyperoides spica compacta alba, foliis ad spicam,
partim albis partim viridibus.* Sloan. hist. 1. p. 119. t. 78. f. 1.

Habitat in Jamaica, Bahama.

7. SCHOENUS culmo subtriquetro nudo, spica disti- *comprellus.*
cha, involutro monophyllo.

*Cyperella montana spicata, radice repente, caule totun-
do triquetro, spica fusca compressa disticha, semine
cinereo.* Mich. gen. 53.

Gramen Cyperoides spica simplici compressa disticha.
Pluk. alm. 173. t. 34. f. 9. Scheuch. gram. 490. Raj.

hist. 1910. Moris. hist. 3. p. 245.

Habitat in Anglia, Helvetia, Italia.

8.

- glomeratus.* 8. SCHOENUS culmo triquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis planis, pedunculis lateralibus geminis. Schœnus culmo triquetro, pedunculis geminis lateralibus, floribus conglomeratis. *Gran. virg.* 131.
Habitat in Virginea.

- albus.* 9. SCHOENUS culmo subtriquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis setaceis. *Fl. svec.* 34. *Dalib. paris.* 14. Schœnus flosculis fasciculatis. *Hort. cliff.* 22. *Roy. lugd.* 48.
Cyperus palustris hirsutus minor, paniculis albis. Moris hist. 3. f. 8. t. 9. f. 39. *Fl. lapp.* 17.
Gramen Cyperoides palustre leucanthemum. Scheuchz.
Gram. 503.
Habitat in Europæ borealis paludibus siccatis. 2

CYPERUS.

* *Culmo tereti.*

- articulatus.* 1. CYPERUS culmo tereti nudo articulato.
Cyperus culmo nudo articuloso. Roy. lugd. 51.
Juncus Cyperoides creberime geniculatus medulla farctus aquaticus, radice rubra tuberosa odorata. Sloan.
jam. 36. hist. 1. p. 121. t. 81. f. 1.
Habitat in Jamaicæ rivulis 2.
- minimus.* 2. CYPERUS culmo tereti nudo, spicis sub apice.
Cyperus culmo tereti, spicas sub apice ferente. Hort.
cliff. 21. *Roy. lugd.* 49.
Gramen junceum perpusillum, capillaceis foliis, æthiopicum. Pluk. alm. 179. t. 300. f. 5.
Gramen Cyperoides minimum, spicis pluribus compatis ex oblongo-rotundis. Sloan. jam. 36. hist. 1. p.
120. t. 79. f. 3. Raj. hist. 3. p. 625.
Habitat in Jamaica, Africa.

- arundinacea.* 3. CYPERUS culmo tereti folioso articulato, racemis lateralibus, spicis alternis patentibus.
Cyperus racemis simplicibus lateralibus solitariis distichis, spicis alternis patentibus. Gran. virg. 131.
Gramen junceum elatius, caule articulato, virginianum, cyperi paniculis inter folia prope summitetem prodentibus. Pluk. alm. 179. t. 301. f. 1.
Gramen fluvatile geniculatum, panicula foliacea; locustis tenuibus oblongis, virginianum. Moris. hist. 3. p.
183. f. 8. t. 3.
Habitat in Virginia.

* *Cul*

* Culmo triquetro.

4. CYPERUS culmo triquetro folioso, umbella supra-*haspan.*
decomposita, spiculis umbellato-fessilibus. *Fl. zeyl.*
37. *
Gramen Cyperoides maderaspatanum, panicula magis
sparsa & speciosa. *Pluk. alm. 179. t. 192. f. 2.*
Habitat in India, Aethiopia. 2.
5. CYPERUS culmo triquetro folioso, umbella foliosa *longa.*
supradecomposita, pedunculis nudis spicis alternis. *Roy.*
Iugdb. 50. Mat. med. 29 Dalib. paris. 14.
Cyperus odoratus radice longa s. Cyperus officinarum.
Baub. pin. 14. Scheuch. gram. 378. Moris. hist. 3.
pag. 237. s. 8. t. 11. f. 13.
Habitat in Italiæ, Galliæ paludibus. 2.
6. CYPERUS culmo triquetro subnudo, umbella de-*rotundus.*
composita: spicis alternis linearibus. *Fl. zeyl. 36. Mat.*
med. 30.
Cyperus orientalis, radice olivarii, spicis longis e spa-
diceo purpurascensibus. *Scheuch. gram. 391.*
Habitat in India.
7. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella foliosa, *esculentum.*
radicum tuberibus ovatis: zonis imbricatis. *Roy. Iugdb.*
51.
Cyperus rotundus esculentus angustifolius. *Baub. pin.*
14. theatr. 222. Scheuch. gram. 382. Moris. hist. 3.
p. 236. s. 8. t. 11. f. 10.
Thrasii. *Baub. hist. 2. p. 504.*
Habitat Monspeñi, inque Italia, Oriente. 2.
8. CYPERUS culmo triquetro seminudo, umbella fo- *Iria.*
lioosa decomposita, spiculis alternis granis distinctis.
Gramen Cyperoides Indiæ orientalis elatius; panicula
sparsa pallescente. *Pluk. alm. 179. t. 191. f. 7.*
Iria s. Balari. *Rheed. mal. 12. p. 105. t. 56.*
Habitat in India. Osbeck.
Pedunculi in umbella plurimi, apice umbelluliferi; um-
bella ex tribus quatuorve radiis, qui alternatim spi-
culas gerunt ex granis triquetris, obtusissimis, vix ma-
nifesta palea vestitis, parum distantibus.
9. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella foliosa, *elegans.*
pedunculis nudis proliferis, spicis confertis. *Roy. lugdb.*
51.
Cyperus panicula maxime sparsa ferruginea compressa
elegan-

elegantissima. *Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 117. t. 75. f.*

1. Raj. suppl. 623.

Habitat in Jamaicæ paludosis maritimis.

terains.

10. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella decomposita simpliciter foliosa, pedicellis distiche spicatis.

Cyperus culmo triquetro nudo, umbella duplicata foliosa, pedunculis propriis distiche spicatis. *Roy. lugdb. 50. Gron. virg. 131.*

Cyperus longus odoratus, panicula sparsa, spicis strigofioribus viridibus. *Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 116. t. 74. f. 1.*

Habitat in America ad fluviorum ripas.

smpressus.

11. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunculis simplicibus, spicis alterno-digitatis lanceolatis distichis.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula foliosa, pedunculis simplicibus, spicis alternis subulatis distichis. *Roy. lugdb. 51. Gron. virg. 131.*

Cyperus rotundus gramineus fere inodorus, panicula sparsa compressa viridi. *Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 117. t. 76. f. 1. Raj. suppl. 623.*

Habitat in Americæ septentrionalis pratis arenosis.

flavescens.

12. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis lanceolatis.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula foliosa supradecomposita, spicis confertis distiche compressis. *Dalib. paris. 14.*

Cyperus minimus, panicula sparsa flavescente. *T. Schenck. gram. 385. Hall. helv. 246.*

Cyperus minor pulcher, panicula lata compressa subflavescente. *Moris. hist. 3. p. 239. f. 8. t. 11. f. 37.*

Gramen Cyperoides minus, panicula sparsa subflava. *Bauh. pin. 6. theatr. 88. t. 88.*

Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Galliæ paludosis.

fusca.

13. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella trisida, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis linearibus.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula diphylla supradecomposita, spicis strigofioribus confertis distiche compressis. *Dalib. paris. 15.*

Cyperus minimus, panicula sparsa nigricante. *T. Schenck. gram. 384.*

Cy-

Cyperus minor pulcher, panicula compressa nigricante.

Moris. hist. 3. p. 239. f. 8. t. 9. f. 38.

Gramen Cyperoides minus, panicula sparsa nigricante.

Bauh. pin. 6.

Habitat in Galliae, Germaniae, Helvetiae pratis humidis.

Differt a C. flavescente vix manifeste, spiculis angustioribus fuscis & foliis magis scabris.

14. *CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella simplici, strigosa, spiculis linearibus confertissimis horizontalibus.*

Cyperus rotundus, panicula sparsa, spicis strigosis ferrugineis. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 116. t. 74. f. 23.

Habitat in paludibus Jamaicæ, Virginiam.

Radix subrotunda. Umbelle radii simplices, erectissimæ, instructi spiculis linearibus, longiusculis, ferrugineis, confertissimis, numerosissimis, horizontaliter a pedunculo communi patentibus vel etiam deorsum flexis.

15. *CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella simplici Papyrus, foliosa, pedunculis simplicissimis distiche spicatis. Ruy. lugdb. 50.*

Cyperus omnium maximus Papyrus dictus. (Mont. gram. 14), loculis minimis. Mich. gen. 44. t. 19.

Cyperus enodis nudus, culmis e vaginis brevibus prodeuntibus, spicis tenuioribus. Scheuchz. gram. 387.

Cyperus niloticus vel syriacus maximus papyraceus. Moris. hist. 3. p. 239. f. 8. t. 11. f. 41.

Papyrus syriaca & siciliana. Bauh. pin. 12. theatr. 333.

Habitat in Calabria, Sicilia, Syria, Ægypto.

SCIRPUS.

* * *Spica unica.*

atticulatus.

1. *Scirpus culmo tereti nudiusculo semigeniculato, capitulo glomerato lateraliter.*

Tsieli. Rheed. mal. 12. p. 135. t. 71.

Habitat in Malabarice aquosis arenosis.

Culmus cavus, geniculatus cinctus, at non undique. Spica laterales in capitulum semiverticillatum collectæ.

palustris.

2. *SCIRPUS culmo tereti nudo, spica subovata imbricata. Fl. suec. 41. Dalib. paris. 16.*

Scirpus culmo nudo, spica terminali subovata. Roy. lugdb. 48.

Scirpus equiseti capitulo majore. T. Scheuchz. gram. 360.

Fl. lapp. 19.

Juncus palustris, capitulo equiseti, major. Bauh. pin. 12.

Habitat in Europæ fossis & inundatis.

3. *SCIR-*

- geniculatus.* 3. SCIRPUS culmo tereti nudo, spica subglobosa terminali.
Scirpus culmo nudo, spica terminali subrotunda. *Hort. cliff.* 21. * *Roy. lugdb.* 48.
Juncus aquaticus geniculatus, capitulis equiseto major & minor. *Sloan. jam.* 37. *hist.* 1. p. 122. t. 75. f. 2.
& t. 81. f. 3. *Raj. suppl.* 628.
Habitat in Jamaica.
- cespitosus.* 4. SCIRPUS culmo striato nudo, spica bivalvi terminali
longitudine calycis, radicibus squamula interstinctis.
Fl. suec. 42. *Dalib. paris.* 17.
Scirpus folio culmi unico. *Fl. lapp.* 20. *Roy. lugdb.* 49.
Scirpus montanus, capitulo breviore. *Schenck. gram.*
363. t. 7. f. 18.
Habitat in Europæ paludibus cespitosis sylvaticis. 2
- capitatus.* 5. SCIRPUS culmo tereti nudo setiformi, spica subglobosa.
Scirpus culmo setaceo nudo, spica subglobosa. *Gron. virg.* 12.
Habitat in Virginia.
- circularis.* 6. SCIRPUS culmo tereti nudo setiformi, spica ovata
bivalvi, seminibus nudis. *Fl. suec.* 42. *Dalib. paris.* 17.
Scirpus magnitudine acicula. *Fl. lapp.* 21. *Roy. lugdb.* 49.
Juncellus minimus, capitulis equiseti. *Pluk. alm.* 201.
t. 40. f. 7. *Moris. hist.* 3. p. 234. f. 8. t. 10. f. 37.
Habitat in Europa sub aquis purioribus.
- fluitans.* 7. SCIRPUS culmis teretibus nudis alternis, caule folioso flaccido.
Scirpus foliis linearibus planis alternatim fasciculatis, spica
terminali. *Guett. stamp.* 141.
Scirpus caule folioso flaccido, scapis alternis capitatis.
Roy. lugdb. 49. *Sauv. monsp.* 9.
Scirpus equiseti capitulo minori. *T. Schenck. gram.* 365
t. 7. f. 20.
Juncellus, capitulis equiseti, minor fluitans. *Baub. pin.*
12. *prodri. 23. theatr.* 187.
Gramen junceum clavatum minimum. *Raj. hist.* 1310.
Moris. hist. 3. p. 230. f. 8. t. 10. f. 31. *Pluk. alm.*
180. t. 35. f. 1.
Habitat in Angliae, Galliae undis.
- * * Culmo tereti polystaethio.
- lacustris.* 8. SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus, pe-
dunculatis terminalibus. *Fl. suec.* 40. *Dalib. paris.* 16.
Scir-

- Scirpus spicis copiosis. Roy. lugdb. 48.*
Juncus maximus L. scirpus major. Baub. pin. 12. theatr. 178.
Habitat in Europæ aquis puris stagnantibus & fluvialibus.
9. *SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis subglobosis glomeratis pedunculatis, involucro diphyllo inaequali mucronato.*
Scirpus panicula solum foliata, spicis globosis pedunculatis lateralibus. Sauv. monsp. 8.
Juncus acutus maritimus, capitulis rotundis. Baub pin. 11. theatr. 17.
Scirpoides maritimum, capitulis sparsis glomeratis. Scheuch. gram. 371.
Holoschoenus Dalech. hist. 987.
Habitat in Europa australi
10. *SCIRPUS culmo tereti nudo, capitulo laterali conglobato, bractea reflexa.*
Scirpus capitulo singulare, radice tomentosa Barr. rar. 1249. t. 255. f. 3.
Scirpoides acutum maritimum, capitulo glomerato solitario. Scheuch. gram. 373. Mich. gen. 52.
Habitat in Galloprovincia & Romæ. 2
11. *SCIRPUS culmo nudo setaceo, spicis lateralibus sub-solitariis sessilibus. it. scan. 227. **
Scirpus culmo nudo setaceo, spicis pedunculatis. Roy. lugab. 49.
Scirpus omnium minimus, capitulo breviore. T. Scheuch. gram. 358.
Juncellus omnium minimus. Moris. hist. 3. p. 232. si 8. t. 10. f. 23.
Habitat in Europæ litoribus maritimis.
12. *SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis sessilibus in medio culmo glomeratis. Dalib. paris. 16. †*
Scirpus supinus minimus, capitulis congregatis, foliis rotundo-teretibus. Tournef. inst. 528.
Habitat Parisis.
13. *SCIRPUS culmo nudo capillari, spicis pedunculatis sessilibusque lateralibus.*
Scirpus culmo teretiusculo seminudo, spicis capitatis sessilibus, involucro diphyllo setaceo. Fl. zeyl. 39.
Cyperus culmo tereti spicas infra apicem ferente. Hort. cliff. 21.

Gramen junceum perpusillum, capillaceis foliis, æthiopicum. *Pluk. alm.* 179. t. 300. f. 5.

Gramen pusillum, junci capitulis minimis, ad basin foliolis binis acutis. *Burm. zeyl.* 108. t. 47. f. 2.

Habitat in Virginia, Æthiopia, Zeylona.

* * * *Culmo triquetre, panicula nuda.*

mucronatus. 14. SCIRPUS culmo triquetro nudo acuminato, panicula conglomerata nuda.

Scirpo-Cyperus maritimus. *Mich. gen.* 47. ord. c. 2. 3.

Juncus acutus maritimus, caule triangulo. *Banh. pin.* 11. prodr. 22. *Morif. hist.* 3. p. 232. f. 8. t. 10. f. 20.

Juncus acutus maritimus, caule triquetro rigido & molli. *Pluk. alm.* 200. t. 40. f. 1. 3.

Habitat in Angliae, Italiæ, Helvetiæ, Virginie stagnis maritimis.

dichotomus. 15. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella decomposita, spicis dichotomiae sessilibus. *Fl. zeyl.* 40. *

Gramen Cyperoides maderaspatanum, juncelli gesneri capitulis sparsis. *Pluk. alm.* 179. t. 119. f. 3.

Habitat in India.

echinatus. 16. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella simplici, spicis ovatis. *Fl. zeyl.* 38. *

Cyperus floribus capitatis erectis pedunculatis. *Gron. virg.* 12.

Gramen Cyperoides americanum, spicis grandioribus oblongo-rotundis, sparganii in modum echinatis, ad sumum caulem pediculis longis innitentibus. *Pluk. alm.* 179. t. 91. f. 4.

Habitat in India utraque.

retrofractus. 17. SCIRPUS culmo triquetro, umbella simplici: spicarum flosculis retrofractis.

Cyperi genus indianum, panicula speciosa, spiculis propendebus atris. *Pluk. phyt.* 415. f. 4.

Habitat in Virginia. 2

ferrugineus. 18. SCIRPUS culmo triquetro subnudo, pedunculis nudis numerosis, spicis ovatis solitariis.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula diphylla, pedunculis quibusdam subdivisis, spicis ovatis solitariis. *Roy. lugdb.* 50.

Gramen Cyperoides majus spicis ex oblongo-rotundis compactis ferrugineis. *Sloan. jam.* 36. *hist.* 1. p. 36. t. 77. f. 2.

Habitat in Jamaicæ paludibus maritimis.

19.

19. SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella subnuda, *spadicent.*
spicis oblongis sessilibus terminalibusque.

Scirpus culmo triquetro nudo, panicula laxa, spicis alter-
nis subsessilibus, pedunculis longis terminalibus, *Gron.*
virg. 132.

Gramen Cyperoides majus aquaticum, paniculis pluri-
mis junceis sparsis, spicis ex oblongo-rotundis spadi-
ceis. *Sloan. jam.* 36. *hist.* 1. p. 118. t. 76. f. 2.

Habitat in Jamaicæ flaviis.

* * * * *Culmo triquetro panicula foliacea.*

20. SCIRPUS culmo triquetro, panicula conglobata fo- *maritimus.*
liacea, spicularum squamis trifidis: intermedia subulata.
Fl. suec. 39. *Dalib. parif.* 15.

Cyperus culmo triquetro, panicula foliacea, pedunculis
impliflimis, spicis confertis. *Roy. lugdb.* 50

Cyperus panicula subsessili, capitulis subovatis. *Gnott.*
stamp. 2. p. 414.

Cyperus rotundus inodorus germanicus. *Bauh. pin.* 14.
theatr. 215.

β. Cyperus rotundus inodorus anglicus. *Bauh. pin.* 14.

γ. Cyperus panicula compacta e spicis teretibus crassiori-
bus composita. *Scheuch. hist.* 400.

δ. Gramen Cyperoides panicula ipsa majus. *Bauh. pin.* 6.

ε. Scirpo-Cyperus palustris, radice repente nodosa inodo-
ra, panicula sparsa, capitulis majoribus. *Mich. ges.* 48.

Habitat in Europæ litoribus maritimis. 2

Anatome partium fructificationis conjunctionem β. γ. δ. ε.
jussit.

21. SCIRPUS culmo triquetro folioso, panicula folia *lithospermus*
cea, seminibus offeis.

Kaden-pullu. *Rheed. mal.* 12. p. 89. t. 48.

Habitat in India.

Culmus nudus, triquierter, crassitie fili. Panicula sim-
plex; ramulis alternis. Folium sub panicula ejusdem
longitudinis. Spicae parvae, ovatae, subjecto Folio seta-
ceo vix spica longiore. Semina magna, nivea; subovata
nitida, nuda, prominentia, diversissima a Cypero na-
ximo americano, lithospermi semine. *Moris. hist.* 3.
p. 237. s. 8. t. 11. f. 16.

22. SCIRPUS culmo triquetro folioso, umbella foliacea, *sylvaticus.*
pedunculis nudis supra-decompositis, spicis confertis.

Fl. suec. 38. *Dalib. parif.* 15.

Cyperus culmo triquetro, panicula foliosa, poduncu-
lis

lis nudis supra-decompositis, spicis confertis. *Roy. lugdb.* 49.

Gramen cyperoides miliaceum. *Baub. pin.* 6.

Gramen arundinaceum, foliis acutissimis, panicula multiplici, cyperi facie. *Lœf. pruss.* 119. t. 33.

Habitat in Europæ sylvis. 2

glomeratus. 23. SCIRPUS culmo triquetro folioso, capitulo glomerato, involucro folioso.

Cyperus culmo triquetro folioso, capitulo glomerato triphylo, spicis teretibus. *Gron. virg.* 131?

Pee-mottenga. *Rheed. mal.* 2. p. 99. t. 53.

Habitat in Virginia, India.

Culmus subnudus, triquierter, semipedalis. Involucrum nutans foliis 3. f. 4, longitudine culmi. Spicule plurimæ, ovato-oblongæ, sessiles, in capitulum subrotundum congestæ.

michelianus. 24. SCIRPUS culmo triquetro, capitulo globoſo, involucro polyphylo longo.

Cyperus italicus omnium minimus. *Till. pis.* 51. t. 20. f. 5.

Habitat in Italia rarius.

ERIOPHORUM.

originatum. 1. ERIOPHORUM culmis vaginatis teretibus, spica paleacea. *Fl. suec.* 45. *Dalib. paris.* 18.

Eriophorum spica erecta, caule tereti. *Fl. lapp.* 23. *Roy. lugdb.* 51.

Gramen tomentosum alpinum & minus. *Baub. pin.* 5. *prodr.* 10. *Burs.* 1: 43.

Juncus alpinus capitulo lanuginoso f. Schœnolagurus.

Baub. pin. 12. *prodr.* 23. *theatr.* 188. *Scheuch. gram.* 302. t. 7. f. 1.

Habitat in Europæ frigidis sterilibus. 2

polystachyon. 2. ERIOPHORUM culmis teretibus, foliis planis spicatis pedunculatis. *Fl. suec.* 44. *Dalib. paris.* 18.

Eriophorum spicis pendulis. *Fl. lapp.* 28. *Hort. cliff.* 22. *Roy. lugdb.* 51.

Gramen pratense tomentosum, panicula sparsa. *Baub. pin.* 4.

Habitat in Europæ uliginosis, turfosis. 2

virginicum. 3. ERIOPHORUM culmis foliosis teretibus, foliis planis, spica erecta.

Eriophorum spica compacta erecta foliacea, caule compresso. *Gron. virg.* 132. *Gra-*

Gramen tomentosum virginianum, panicula magis compacta aureo colore perfusa. *Pluk. alm.* 179. t. 299. f. 4.

Gramen tomentosum, capitulo ampliore fusco & foliaceo. *Moris. hist.* 3. p. 224. f. 8. t. 9. f. 2.

Habitat in Virginia. ♀

4. ERIOPHORUM culmis nudis triquetris, spica pappo *alpinum*, breviore. *Fl. suec.* 46.

Eriophorum spica erecta, caule triquetro. *Fl. lapp.* 24.

Linagrostis juncea alpina, capitulo parvo: tomento raro. *Scheuch. gram.* 305. t. 7. f. 4.

Juncus alpinus bombycinus. *Baub. pin.* 12. *prodr.* 6.

Habitat in Europæ alpibus, locisque affinibus. ♀

NARDUS

1. NARDUS spica setacea recta. *Fl. suec.* 47. *Dalib. fructu.* *parif.* 18.

Nardus spica linearis. *Fl. lapp.* 40. *Hort. cliff.* 42.

Gramen sparteum juncifolium. *Baub. pin.* 5. *Scheuch.* *gram.* 90.

Gramen sparteum hollandicum, capillaceo folio, & minus. *Baub. pin.* 5. *prodr.* 11. *Moris. hist.* 3. p. 217 f. 8. t. 7. f. 8.

Habitat in Europæ asperis, sterilibus, duris. ♀

2. NARDUS spica recurva. † *gangitis.*

Nardus spuria narbonensis. *Baub. pin.* 13.

Nardus gangitis spuria narbonensis. *Lob. ic.* 84. *Moris. hist.* 3. p. 257. f. 8. t. 13. f. ult. *Raj. hist.* 1911.

Habitat in G. Narbonensi.

3. NARDUS spica incurva ciliata. *ciliatis.*

Habitat in India.

Folia graminea, plana. Culmus spicatum. Spica dimidiata s. altero latere tantum Flosculis alternis, erectis, 12 a 15: valvula exteriore ovato-oblonga, mutica, margine ciliata pilis scabris, numerosis. Calyx proprius nullus, sed ad alterum latus flosculorum seta, brevior ipsa gluma.

4. NARDUS spica cylindrica articulata. *articulata.*

Nardus spica subulata disticha. *Roy. lugdb.* 58.

Gramen loliaceum, spicis articulosis erectis. T. *Scheuch.* *gram.* 43.

Gramen loliaceum maritimum, spicis articulatis. *Moris. hist.* 3. p. 182. f. 8. t. 5. f. *Gra-*

Gramen myuros erectum minimum arundinaceum. *Bocc.*
msf. 70. t. 59.
Habitat in Italia, Hispania, G, Narbonensi.

DIGYNIA.

BOBARTIA.

indica.

1. BOBARTIA.

Bobartia spicis capitatis, involucro folioso. *Fl. zeyl.* 41.*
*Amaen. acad. 1. p. 388. **

Scirpus maderaspatanus, capitulo squamoso subrotundo.
Scheuch. gram. 369.

Habitat in India.

*Resert ita Schænum mucronatum, ut ejus figura pro hu-
 jus ubique venditari possit.*

CORNUCOPIÆ.

cucullatum, 1. CORNUCOPIÆ. *Hort. cliff.* 490. *Roy. lugdb.* 52.
*Juncus clavatus vaginatus polycephalus. Pet, gaz. t. 73.
 f. 5.*

Gramen orientale vernum in udis proveniens, capitulo
 inflexo. *Scheuch. gram. 117.*

Habitat Smyrnæ. D, Hasselquist.

SACCHARUM.

officinarem. 1. SACCHARUM floribus paniculatis. *Hort. cliff.* 26.
Mat. med. 33. Roy. lugdb. 52.

2. Arundo saccharifera. *Bauh. pin.* 18. *Sloan. jam.* 31.
hifst. 1. p. 108. t. 66.
Habitat in Indiæ utriusque locis inundatis.

spicatum

2. SACCHARUM floribus spicatis.

Gramen indicum alopecuroides holosericeum majus, spi-
 ca longa pappescente. *Pluk. alm.* 177. *t. 92. f. 5.*

Tjeria-kuren-pullu. *Rheed. mal.* 12, *p. 117. t. 62.*
Habitat in Indiæ petrofis.

PHALARIS

canariensis. 1. PHALARIS panicula subovata spiciformi, glumis ca-
 rinatis. *Hort. upf.* 19.

Phalaris radice annua, *Hort. cliff.* 23. *Roy. lugdb.* 63
Dalib. paris. 20.

Phalaris major, semine albo. *Bauh. pin.* 28. *Moris. hifst*
3. p. 186. f. 8. t. 3. f. 1.

B. Pha-

β . *Phalaris major*, semine nigro. *Banh. pin.* 28.

γ . *Phalaris radice perenni*. *Roy. lugdb.* 63.

Phalaris bulbosa, semine albo. *Raj. hist.* 1249. *Schenck.* gram. 53.

Habitat in Europa australi, Canariis.

2. PHALARIS panicula cylindrica spiciformi. phleoides.
Phalaris spica cylindrica *Fl. suec.* 49. *Dalib. parif.* 19.
Gramen typhoides asperum primum. *Bauh. pin.* 4. *Schenck.* gram. 61. *Hall. helv.* 232.
Habitat in Europæ versuris.

3. PHALARIS panicula oblonga ventricosa. arundinaceo.
Phalaris panicula oblonga. *Fl. suec.* 48. *Dalib. parif.* 19.
Arundo foliis planis, panicula spicata, spiculis confertis.
Hort. cliff. 26. *Roy. lugdb.* 66.
Gramen aquaticum paniculatum, phalaridis semine. T.
Schenck. gram. 126.
Gramen arundinaceum spicatum. *Bauh. pin.* 6. *theastr.* 94.
Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *Bauh. pin.* 6.
Gramen arundinaceum, acerosa gluma, jerserianum. *Raj.* angl. 3. p. 400.

β . *Gramen paniculatum*, folio variegato. *Bauh. pin.* 3. picta.
Habitat in Europæ subhumidis ad ripas lacuum.

4. PHALARIS panicula linearis secunda, calycibus bifloris erucæformis.
Dactylis spicis numerosis alternis culmo adpressis longitudine internodiorum, calycibus bifloris. *Roy. lugdb.* 57. *Gmel. sibir.* 1 p. 130. t. 29.

Gramen palustre, loculis erucæformibus. *Barr. rar.* 1158. t. 2.

Habitat in Sibiria, Russia, Europa australi.

5. PHALARIS panicula effusa, glumarum carinis ciliatis. cryzoides.

Oryza glumis carina hispidis. *Gron. virg.* 153.

Habitat in Virginiam paludibus nemorosis.

PANICUM.

* Spicata.

1. PANICUM spica tereti, involucris setaceis fasciculatis unifloris, flosculo quadruplo longioribus.

Gramen geniculatum brevifolium crispum, spica purpureo-sericea. *Pluk. alin.* 177. t. 119. f. 1.

Habitat in China.

Spica longa, ferruginea, Floculi sparsi, pedunculis brevi-
 D 4 *vis-*

vibus, cincti setis longis, erectis; Scapus infra spicam parum villosus; pedicelli omnes uniflori.

- glaucum.* 2. PANICUM spica tereti, involucellis bifloris fasciculato-pilosis. *Fl. zeyl.* 44.
Gramen alopecuroides maderaspatanum, spica quasi geniculata molli. *Pluk. alm.* 177. t. 190. f. 6.
β. Gramen paniceum s. *Panicum sylvestre*, simplici spica *Schœuch. gram.* 46.
γ. *Panicum spica simplici, aristis aggregatis flosculo subjectis.* *Gron. virg.* 134.
Panicum indicum altissimum, spicis simplicibus molibus in foliorum alis, pediculis longissimis insidentibus. *Tournef. inst.* 515.
Habitat in Indiis. ◎
Setæ in spica longitudine flosculorum. Foliorum vaginæ oris pilosa. Dum spicarecens prodiit Flosculi in series dispositi observantur.
- americanum* 3. PANICUM spica simplici æquali, pedunculis bifloris.
Roy. lugdb. 54.
Panicum indicum, spica obtusa cærulea. *Bauh. pin.* 7.
theatr. 522.
Panicum americanum. *Clus. hist.* 2, p. 215.
Habitat in America,
- italicum.* 4. PANICUM spica composita, spiculis glometatis setis immixtis, pedunculo hirsuto.
Panicum spica composita, aristis flosculo brevioribus. *Vir. cliff.* 7. *Hort. upf.* 19. *Roy. lugdb.* 54. *Gron. virg.* 134.
Panicum italicum s. panicula majore. *Bauh. pin.* 27.
theatr. 519.
Habitat in Indiis. ◎
- Crusgalli.* 5. PANICUM spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis.
Panicum spicis alternis remotis declinatis compositis. *Vir. cliff.* 7. *Roy. lugdb.* 55. *Dalib. paris.* 22.
Panicum spicis alternis remotis laxis. *Hort. cliff.* 27.
β. Gramen paniceum, spica divisa. *Bauh. pin.* 8.
γ. Gramen paniceum, spica divisa, aristis longis armata. *Bauh. pin.* 8.
Habitat in Europæ, Virginiam cultis. ◎
Variat aristis, in aliis longitudine glumarum, in aliis decies longioribus.

6. PANICUM spiculis alternis; rachi linearis membranaceae extrorsum imbricato-florifera. *Dactylis* spicis alternis numerosis patulis, calycibus unifloris. *Roy. lugdb.* 56.
Germen paniceum, spica simplici ad caulem intervallata binis granorum ordinibus uno versu constante, americanum. *Pluk. mant.* 94. t. 350. f. 2.
Grainen daetylon majus, panicula longa, spicis plurimis nudis crassis. *Sloan. jam.* 34. hist. 1. p. 112. t. 69. f. 2.
Habitat in Indiis.
7. PANICUM spica dimidiata-secunda, rachi linearis *dimidiatum*. membranacea extrorsum ilosculis aggregatis.
Germen bermudense frumentaceum, toliis brevibus obtusis, spica crassiuscula compressa antrorsum gemino versu granifera. *Pluk. phyt.* 244. f. 9.
Habitat in India.
Folia latissima vaginis latis. Spica ex scapi apice membranaceo, plano, cui ad alterum tantum latus Flores alternatim conferti divergentes.
8. PANICUM spicis aggregatis, basi interiore nodosis, *sanguinale* flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis.
Panicum spicis alternis oppositisque linearibus patentissimis muticis, flosculis alternatim binis: altero penduculato. *Roy. lugdb.* 55. *Gron. virg.* 154. *Dalib. paris.* 22.
Germen daetylon, folio latiore. *Baub. piu.* 8. *theatr.* 114. *Scheuch. gram.* 101.
Germen daetylon majus, panicula longa e spicis plurimis gracilioribus purpureis & viridibus mollibus constante. *Sloan. jam.* 3. hist. 1. p. 113. t. 70. f. 2, *
Habitat in America, Europa australi. ☺
9. PANICUM spicis subdigitatis approximatis erectis *filiforme*. filiformibus: rachi flexuosa, dentibus bifloris: altero sessili.
Habitat in America septentrionali. *Kalm.*
Folia lanceolata. Culmipedales filiformes, superne nudi, recti; spica filiformis, rara, flexuosa rachi, alternatim utrinque ad dentes Flosculi 2: altero sessili, altero pedicellato; Spicæ tenues, primum valde approximatæ quasi in unum, quamvis alterne.
10. PANICUM spica composita, spiculis linearibus *se-compositum*, cundis flosculis geminis remotis, calycibus aristatis. *Fl. zeyl.* 42. *
Habitat in Zeylona.

* *Paniculata.*

- dichotomum* 11. PANICUM paniculis simplicibus, culmo ramoso dichotomo. *Gron. virg.* 133. *
- Habitat in Virginia.*
Statura refert arbusculam inferne simplicem, superne fasciculatam.
- clandestinum.* 12. PANICUM racemis occultatis intra foliorum vaginas.
Gramen cyperoides polystachyon, spicis ad nodos ex foliorum alis prodeuntibus. *Sloan. jam.* 36. *hist.* 1. p. 120. t. 80.
Habitat in Jamaica, Pensylvania. Kalm.
Culmi dichotomi, ramosi; Folia ovato-lanceolata, vaginis punctatis, pilosis, intra quas Racemi fructificationum omnino occultantur, ut extus ne vestigium eorum appareat.
- capillare.* 13. PANICUM panicula capillari erecta, foliis pilosis.
Gron. virg. 13.
Panicum miliaceum viride, foliis latis brevibus, panicula capillacea. *Sloan. jam.* 35. *hist.* 1. p. 115. t. 72. f. 3.
Habitat in Virginia, Jamaica.
- patens.* 14. PANICUM panicula oblonga patente, calycibus bifloris, foliis linear-lanceolatis.
Tsiamia-pullu. Rheed. mal. 12. p. 75. t. 41.
Habitat in India; similis e Lusitania.
- daetylon.* 15. PANICUM spicis digitatis patentibus: basi interiore villosis, floribus solitariis, sarmentis repentibus.
Gramen daetylon, folio arundinaceo, majus aculeatum. *Bauh. pin.* 7.
Gramen daetylon, radice repente. s. officinarum. *Sched. gr.* 104.
Gramen legitimum. *Clus. hist.* 2. p. 217.
Habitat in Europa australi. 2
- miliaceum.* 16. PANICUM panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubescentibus. *Hort. cliff.* 27. *Hort. upf.* 20. *Mat med.* 34. *Roy. lugdb.* 55. *Dalib. paris.* 22.
Milium semine luteo & albo. *Bauh. pin.* 26. *theatr.* 502.
Habitat in India.
- latifolium.* 17. PANICUM panicula racemis lateralibus simplicibus, foliis ovato-lanceolatis collo pilosis.

Gramen virginianum, lato brevique folio, panicula ratiore. *Morif. hist.* 3. p. 196. f. 8. t. 5. f. 4.

Grameū miliaceum sylvaticum maximum, semine albo. *Sloan. jam.* 34. *hist.* 1. p. 114. t. 71. f. 3.

Habitat in America.

Folia latitudine Commelinæ, ad fauces amplexicanlis; extus collo circum fauces villoso, etiam basi foliorum margine pilosa. Panicula valde mediocris ex racemis lateralibus, non subdivisis, sed pedicellos proprios, nec subdivisos proserentes. Flores mutici, majusculi.

- 18 PANICUM paniculatum, foliorum vaginis longitu- brevifolium.
dūaliter ciliatis.

Panicum miliaceum, latiore folio, maderaspatanum. *Pluk.* alm. 176. t. 189. f. 4.

Habitat in India.

Gramen pedale vel bipedale. Folia ovata, amplexicaulia;
Panicula tenuissima, folio supremo & majore compresso.
Variat foliis angustis & lanceolatis.

19. PANICUM paniculatum ramosissimum, foliis ovato-
oblongis acuminatis. *Fl. zeyl.* 43.

Panicum panicula laxa sparsa, foliorum vaginis glabris.

Hort. cliff. 27.

Habitat in India.

Altitudine certat cum altissimis arboribus; Culmus vix
penna anserina latior.

20. PANICUM panicula virgata, glumis acuminatis lae-
vibus extima dehiscente.

PANICUM paniculatum, glumis acutis *Gron. virg.* 133.

Habitat in Virginia,

PHLEUM.

1. PHLEUM spica cylindrica longissima. *Fl. lapp.* 26. *Fl. pratense.*
ſuec. 50. *Hort. cliff.* 22. *Roy. lugdb.* 53. *Dalib. pa-*
ris. 20.

Gramen typhoides maximum, spica longissima. *Bauh.*
pin. 4. *Scheuch. gram.* 60.

Habitat in Europæ versuris & pratis. 2

2. PHILEUM spica ovato-cylindracea. *Fl. lapp.* 25. *Fl. alpinum,*
ſuec. 51. *Dalib. paris.* 20.

Gramen typhoides alpinum, spica brevi densa & velut
villosa. *Scheuch. gram.* 64.

Habitat in Alpibus 4

- arenarium.* 3. **PHLEUM** spica ovata ciliata, caule ramoso. *Hort. cliff.* 23. *it. scan.* 109. *Roy. lugdb.* 54.
Gramen typhinum maritimum innus. *R. Pluk. alm.* 177. *t. 33. f. 8.*

Habitat in Europæ locis arenosis. ☺

Spica vix absente e vagina folii exit.

- Schenoides.* 4. **PHLEUM** spicis ovatis obvolutis foliis brevisimis mucronatis amplexicaulibus.

Gramen maritimum typhinum, brevi & crassiori spica ad singula genicula prodeunte s. secundum. *Schench. gram.* 86.

Habitat in Italia, Smyrna, inque Hispania. *Læfling.*

Habitus Schoni aculeati foliis floralibus amplexicaulibus, brevibus mucronatis.

ALOPECURUS.

- pratinus.* 1. **ALOPECURUS** culmo spicato erecto. *Roy. lugdb.* 54. *Fl. suec.* 52. *Dalib. paris.* 21.

Gramen phalaroides majus s. italicum. *Baub. pin.* 4. *theatr.* 55.

Gramen alopecuro simile glabruin cum pilis-longiusculis in spica Onocordon. *Baub. hist.* 2. p. 475.

- β. Gramen typhoides spica angustiore. *Baub. pin.* 4.
Habitat in Europæ pratis. ✕

- geniculatus.* 2. **ALOPECURUS** culmo spicato infracto. *Fl. suec.* 53. *Dalib. paris.* 20.

Alopecurus culmo infracto, aristis gluma longioribus. *Roy. lugdb.* 54.

Alopecurus aristis gluma longioribus, *Fl. lapp.* 37.

Gramen aquaticum geniculatum spicatum. *Baub. pin.* 3. *Schench. gram.* 72.

- β. Alopecurus aristis gluma æqualibus. *Fl. lapp.* 38.
Habitat in Europæ utiginosis. ✕.

- bordiformis* 3. **ALOPECURUS** racemo simplici, flosculis aristis circumvallatis.

Habitat in India.

Habitus omnino Hordei murini. Culmus pedalis. Folia plano-canaliculata, nervosa, culmo sepius longiora.

Spica racemosa, longa. Flores numerosi; pedicelli Florum brevissimi, simplicissimi. Calyces obvallati setis aristiformibus, numerosis, floribus triplo longioribus, gluma bivalvi, altera minore. Corolla bivalvis glumis oblongis, acuminatis. Ptilillum flore longius. Stanina tria.

4. ALO-

4. ALOPECURUS panicula villosa oblonga folio in-*monspeliens.*
voluta. *Sauv. monsp.* 37. †
Gramen alopecurum minus, spica longiore. *Bauh. pin.*
4. *theatr.* 57. *Scheuch. gram.* 154.
Gramen alopecurum minus, spica virescens divulsa.
Barr. ic. 115. *j. I.*
Cauda vulpis *monspeliensium*, Alopecurus theophrasti.
Lob. ic. 45.
Habitat Monspeliæ.

MILIUM.

1. MILIUM foliis dispersis. *Flor. suec.* 55. *Dalib. paris.* effusum.
23.
Milium glumis diphyllis. *Hort. cliff.* 27.
Gramen sylvaticum, panicula miliacea sparsa. *Bauh. Pin.*
8. *theatr.* 141. *Scheuch. gram.* 133. *Moris. hist.* 3.
f. 8. t. 5. f. 10.
Habitat in Europa nemoribus umbrosis. ♀
2. MILIUM floribus confertis. *Roy. lugdb.* 57. *confertum.*
Gramen paniculatum alpinum latifolium, panicula mi-
liacea sparsa. *Scheuch. gram.* 134. *Hall. helv.* 220.
Habitat in Helvetiæ sylvis.

AGROSTIS.

* *Aristatae.*

1. AGROSTIS petalo exteriore exserente aristam re-*spica venti.*
etiam strictam longissimam. *Roy. lugdb.* 59. *Fl. suec.*
58.
Gramen segetum altissimum, panicula sparsa. C. B.
Scheuch. gram. 144.
Gramen capillatum. *Bauh. hist.* 3. p. 462.
Habitat in Europa inter segetes. ♂
2. AGROSTIS calycum squama exteriore aristata lon-*miliacea.*
giore; interiore acuminata mutica. *Roy. lugdb.* 59.
Habitat in Europa.
3. AGROSTIS panicula oblonga, petalo exteriore basi *ornatissima.*
villoso, arista torta calyce longiore. *Fl. suec.* 59. *
Agrostis culmo enodi, panicula contracta. *Fl. lapp.* 44.
Gramen avenaceum montanum, panicula angusta e di-
lutissimo fusco albicante & papposa. *Scheuch. gram.* 57
Habitat in Europa monticulis sylvoisis glareosis juniperi-
tis. ♀

tubra.

4. AGROSTIS paniculae parte florente patentissima, petalo exteriore glabro terminato arista tortili recurva.
Fl. suec. 60. *Dalib. paris.* 24.

Agrostis panicula inferiore verticillatim laxa; superiore contracta. *Fl. lapp.* 46.

Gramen serotinum arvense, panicula contracta pyramidali. *Scheuch. gram.* 148.

Habitat in Europæ arenosis subhumidis.

canina.

5. AGROSTIS calycibus coloratis, petalorum arista dorsali recurva. *Fl. suec.* 1138.

Gramen supinum caninum, paniculatum, folio varians.

Bauh. pin. 1. theatr. 12.

Gramen paniculatum supinum ad infima culmorum genicula foliorum capillarium geniculis fasciculatis donatum. *Scheuch. gramen.* 141.

Habitat in Europæ pascuis humidiusculis. 2

paradoxa.

6. AGROSTIS flosculis aristatis gemellis: altero sterili, terminalibus ternis. *Sauv. monsp.* 35. †

Gramen avenaceum paniculatum galloprovinciale, aquilegiæ semine. *T. Moris. hist.* 3. p. 214. n. 29.

Pluk. alm. 174. t. 32. f. 2.

Gramen paniculatum latifolium, loculis crassioribus, semine nigro aquilegiæ simili. *Tournef. inst.* 522.

Habitat in Galloprovincia, G. Narbonensi.

* * * *Muticæ.*

stolonifera.

7. AGROSTIS panicula ramulis divaricatis muticis, culmo repente, calycibus æqualibus.

Agrostis culmo repente foliis radicalibus breviore, folii suprema vagina ventricosa, flosculis muticis. *Roy. lugdb.* 59. *Fl. suec.* 62.

Agrostis culmo repente, vagina supremi folii ventrica-

sa. *Roy. lugdb.* 59. *Dalib. paris.* 23.

Gramen caninum supinum minus. *Scheuch. gram.* 128.

Habitat in Europa. 2

capillaris.

8. AGROSTIS panicula capillari patente, calycibus subulatis æqualibus hispidiisculis coloratis, flosculis muticis. *Roy. lugdb.* 59. *Dalib. paris.* 23.

Agrostis panicula tenuissima. *Fl. lapp.* 45.

Gramen montanum, panicula spadicea delicatiore. *Bauh. pin.* 3. *prodr.* 12. *Scheuch. gram.* 129.

Habitat in Europæ pratis.

Panicula vere capillaris, tenuissimisque pedicellis singula-

9. AGRO-

9. AGROSTIS panicula laxa, calycibus muticis sequa- *alta*.
libus. *Roy. lugdb.* 59.
Habitat in Europae nemoribus.

10. AGROSTIS panicula mutica filiformi. *minima.*
Nardus panicula spicata, floribus solitariis alternis.
Guett. stamp. 155. *Dalib. paris.* 155.
Gramen minimum paniculis elegantissimis. *Baub. pin.*
2. *Scheuch. gram.* 40. *Moris. hist.* 3. p. 200. f. 8. t. 2. f. 10.
Gramen minimum. *Baub. hist.* 2. p. 465. *Dalech. hist.*
425.
Habitat in Gallia.

11. AGROSTIS panicula contracta mutica, foliis invo- *virginica*.
luto-subulatis rigidis exstantibus. *Clayt. virg.* 507.
Habitat in Virginia.

12. AGROSTIS panicula contracta mutica, racemis la- *indica*.
teralibus erectis alternis.
Gramen pratense panicula & foliis angustissimis, spicis
brevibus muticis, loculis minimis. *Sloan. jam.* 35.
hist. 1. p. 115. t. 73. f. 1.

Habitat in India.

Culmus erectus. Folia plana, angusta. Panicula oblonga
e racemis lateralibus, alternis, rachi approximatis; glu-
mis brevissimis, acutis.

AIRA.

* Muticæ.

1. AIRA spica subovata secunda, flosculis obtusis muti- *spicata*.
cis, foliis planis.

Habitat in India.

Gramen procumbens, digitæ longitudine. Folia plana.
Spica secunda, conglomerata, ovato-oblonga. Glumæ
obtuse, muticae.

2. AIRA panicula spicata, floribus muticis pedunculo *cristata*.
longioribus, glumis acuminatis inæqualibus. *Roy.*
lugdb. 61. *Dalib. paris.* 27.

Gramen, spica cristata subhirsutum. *Baub. pin.* 2. *prodr.*
8. *Moris. hist.* 3. p. 194. f. 8. t. 4. f. 7. *Scheuch.*
gram. 166.

Habitat in Angliae, Galliae, Helvetiæ siccioribus.

3. AIRA foliis planis, panicula coarctata, floribus pedun- *cæsa*.
culatis muticis convoluto subulatis. *Fl. juc.* 71. *Dalib. paris.* 26.
l'oa

Poa spiculis subulatis, panicula rara contra &c. Fl. lapp.
29. *Roy. lugdb. 61.*

Gramen arundinaceum enode minus sylvaticum. Baub.
pin. 7. theatr. 97. Scheuch. gram. 209.

Gramen pratense ferotinum, panicula rara purpurascen-
te. Moris. hist. 3. p. 201. f. 8. t. 5 f. 22.

Habitat in Europæ pascuis aquosis. 2.

arundinacea. 4. *AIRA panicula oblonga secunda mutica imbricata, so-*
liis planis.

Gramen orientale paniculatum, portulacae semine.
Tournef. cor. 39.

Habitat in Oriente.

minuta. 5. *AIRA panicula laxa subfastigiata ramosissima; floscu-*
lis muticis. Lœfl.

Gramen paniculatum arvense minimum. Buxb. cent. 5
p. 35. t. 67?

Habitat in Hispania Lœfling. ♂

Differunt tantum a Buxbaumiano, quod longe minus, vix
pollicem transversum altum.

aquatica. 6. *AIRA foliis planis, panicula patente, floribus muticis*
lævibus calyce longioribus. Fl. suec. 66. Dalib. paris
26.

Aira culmo inferiore repente, flosculis muticis calyce
longioribus: altero pedunculato. Roy. lugdb. 60.

Gramen aquaticum miliaceum. Scheuch. gram. 218. Vailt
paris. 89. t. 17. f. 7.

Gramen caninum supinum paniculatum duice. Baub.
pin. 2.

Habitat in Europæ pascuis aquosis. 2.

* * 'Aristatae.'

spicata 7. *AIRA foliis planis, panicula spicata, flosculis medio a-*
*rístatis: arista reflexa laxiore. Fl. suec. 65. **

Aira panicula spicata, pedicellis flosculo brevioribus. Fl.
lapp. 47.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum humile, locu-
lis in spicam collectis varicoloribus aristatis. Scheuch.
gram. 221. prodr. 24. t. 6.

Habitat in Lapponiæ alpibus. 2.

cespitosa. 8. *AIRA foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis*
aristatisque: arista recta brevi. Fl. suec. 63.

Aira panicula patentissima, flosculis subaristatis sessilibus
basi villosis, foliis planis. Mor. act. Stockh. 1742.

p. 30. *Aira*

Aira panicula longissima tenui. Fl. lapp. 50.

*Gramen segetum, panicula arundinacea. Baub. pin. 3.
theatr. 35. Schœuch. gram. 244.*

Habitat in Europæ partis cultis & fertilibus. 2

9. AIRA foliis setaceis, culmis subnudis, panicula divari-*flexuosa*,
cata, peduncalis flexuosis. *Fl. suec. 64. Dalib. paris. 26.*

Aira panicula rara, calycibus albis. Fl. lapp. 48.

*Gramen alpinum nemorosum paniculatum, foliis angu-
stissimis, loculis splendentibus aristatis. Schœuch. gram.
218. t. 6. f. 1,*

Gramen nemorosum, paniculis albis, capillaceo folio.

*Baub. pin. 7. prodr. 14. Moris. hist. 3. p. 300. f.
8. t. 7. f. 9.*

Habitat in Europæ petris, rupibus. 2

10. AIRA foliis setaceis, panicula angustata, flosculis ba-*montana*,
si pilosis aristatis: arista tortili longiore. *Fl. suec. 68.*

Aira panicula rara, calycibus fuscis. Fl. lapp. 49.

*Gramen avenaceum paniculatum alpinum, foliis capil-
laceis brevibus, loculis purpuro-argenteis & aristatis.
Schœuch. gram. 216. t. 4. f. 4.*

Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis.

Baub. pin. 10.

Habitat in Europæ alpinis. 2

11. AIRA foliis subulatis, panicula densa, flosculis basi pi-*alpina*,
losis aristatis: arista brevi.

*Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis ar-
genteis vix aristatis, foliis angustioribus. Schœuch. gram.
222.*

Habitat in alpibus Lapponicis, Germania.

12. AIRA foliis setaceis: summo paniculam inferne ob-*canescen-*.
volvente. *Roy. Ingdb. 60. Fl. suec. 72. Dalib. pa-
ris. 25.*

*Aira foliis setaceis, aristis e basi glumarum calycem ex-
quantibus. Hort. cliff. 495.*

*Gramen foliis junceis, radice jubata. Baub. pin. 5. Schœ-
uch. gram. 243.*

Habitat in Scania & australioris Europæ arvis ○

*Arista in medio cincta denticulis, infra crassior fu-
sca, supra tenuior subclavata albida. Panicula an-
te florescentiam spicata.*

13. AIRA foliis setaceis: vaginis angulatis, floribus pani-*præcur-*
culato-spicatis, flosculis basi aristatis. *It. scan. 226. **

- Gramen minimum, spica brevi habitiore, nostrum. Scheuch. gram. 219.
- Gramen parvum præcox, panicula laxa canescens. Raj. angl. 3. p. 407. t. 22. f. 2. Pluk. alm. 177. t. 33. f. 9.
- Habitat in Europæ australioris campis arenosis inundatis.* ☺

- caryophyllea.* 14. AIRA foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus.
- Aira foliis subulatis, aristis a basi floscularum tortilibus, flosculo altero pedunculato. Roy, lugdb. 60. Dalib. paris. 26.
- Gramen phalaroides sparsa panicula minimum angustifolium. Barr. rar. 1218. t. 44. f. 1.
- Gramen paniculatum, loculis purpuro-argenteis, annuum. Raj. angl. 3. p. 407. Moris. hist. 3. p. 200. f. 8. t. 5. f. 11.
- Gramen paniculatum minimum molle Magn. monsp. 296. Scheuch. gram. 215.
- Caryophyllus arvensis glaber minimus. Bauh. prodr. 105.
- Habitat in Anglia, Germania, Gallia, glareosis.* ☺

MELICA.

- tilia.* 1. MELICA petalis exterioribus ciliatis. It. gotl. 291. Fl. suec. 56.
- Melica floribus horizontaliter patentibus. Roy. lugdb. 57.
- Gramen avenaceum montanum lanuginosum. Bauh. pin. 10.
- Gramen avenaceum, spica simplici, loculis densissimis candicantibus & lanuginosis. Scheuch. gram. 174.
- Habitat in Europæ collibus sterilibus saxofis.* ✎
- canaria.* 2. MELICA petalis imberbibus, panicula nutante simplici.
- Melica petalis imberbibus. Fl. suec. 57. Dalib. paris. 23.
- Melica floribus sub culmo pendulis. Fl. lapp. 36. Roy. lugdb. 57
- Gramen montanum avenaceum, loculis, rubris. Bauh. pin. 10. prodr. 20.
- Gramen montanum avenaceum spicatum Bauh. pin. 10.
- Gramen avenaceum, loculis rarioribus. Bauh. pin. 10
- Habitat in Europæ frigidioris rupibus.*
- atrigyna.* 3. MELICA petalis imberbibus, panicula ramosissima. Hort. upf. 20.

Me-

Melica flosculis glabris; summo urceolari. *Gmel. sib.*
1. p. 98. t. 20.

Gramen avenaccum, loculis rarioribus muticis, virginianum majus. *Moris hist.* 3. p. 216. f. 8. t. 7. f. 51.
Habitat in Siberia, Canada. ♀

POA.

1. POA panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. *Fl. aquatica*, *suec.* 73. *Dalib. paris.* 29.
PAO panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus muticis compressis. *Act. Stockb.* 1741. p. 185.
Poa panicula contracta, spicis ovatis teretiusculis. *Hort. cliff.* 494. *Roy. lugdb.* 61.
Gramen palustre paniculatum altissimum. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 38. *Schenck. gram.* 191.
Grainen aquaticum paniculatum latifolium. *Moris hist.* 3. p. 201. f. 8. t. 6. f. 25.
Habitat in Europa ad ripas piscinarum, fluviorum. 2
2. POA panicula diffusa ramosissima, spiculis sexfloris *alpina*, cordatis. *Fl. suec.* 79. *Dalib. paris.* 28.
Gramen alpinum paniculatum majus, panicula speciosa variegata. *Schenck. gram.* 186. *Hall. he.v.* 214.
β. *Gramen alpinum latifolium, panicula laxa foliacea, foliis in panicula paucioribus & magis crispis.* *Schenck. gram.* 212.
Habitat in alpibus Lapponicis, Helveticis. ♀
An hæc α. β. sequentis tantum varietas.
3. POA panicula diffusa, spiculis quinquefloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. *Fl. suec.* 78. *Dalib. paris.* 28.
Gramen pratense paniculatum medium. *Bauh. pin.* 2. *Schenck. gram.* 180.
Habitat in Europæ pascuis.
4. POA panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti. *Fl. suec.* 77. *Dalib. paris.* 28.
Poa spiculis ovato-oblongis, foliis subulatis. *Fl. lapp.* 52.
Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio. *Bauh. pin.* 2. *proar.* 5. *Schenck. gram.* 178.
Habitat in Europa ad agrorum versuras. ♀
5. POA panicula diffusa, spiculis trifloris glabris, culino *pratenis*, erecto tereti. *Fl. suec.* 76. *Dalib. paris.* 27.

Poa spiculis ovatis compressis muticis. *Fl. lapp.* 51. *Hort. cliff.* 27. *Rov. lugdb.* 61.

Germen praeiuse paniculatum majus (latiore folio. Barr. pin. 2.) *Schench. gram.* 177.

Habitat in Europae pratis fertilissimis.

Limits pro speciebus 2. 3. 4. 5. rite discernendis vero dum perspicue evicti sunt.

annua.

6. *POA panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso.* *Fl. suec.* 75. *Dalib. parif.* 28.

Germen pratense paniculatum minus. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 31.

β. *Germen pratense paniculatum minus rubrum.* *Tournef. inst.* 522.

Habitat in Europa ad vias. ◎

flava.

7. *POA panicula diffusa, spiculis ovato-oblongis nitidis*

Gron. virg. 13.

Germen pratense majus virginianum. *Per mis.* 239.

Habitat in Virginia.

pilosa.

8. *POA panicula patente stricta; ramificationibus prima riis pilosis.*

Germen, paniculis elegantissimis, majus, loculis purpuro-spadiceis minoribus. *Schench. gram.* 193.

Habitat in Italia.

amabilis.

9. *POA panicula patente, spiculis octifloris linearibus.* *Fl. zeyl.* 46. *

Germen paniculatum ex oris malabaricis, panicula de-

licatiore. *Pluk. alm.* 176. t. 300. f. 3.

Habitat in India.

Eragrostis.

10. *POA panicula patente, pedicellis flexuosis, spiculis ferratis decemfloris.*

Germen, paniculis elegantissimis, minimum. *Schench. gram.* 192.

Germen Phalaroides, sparsa brizæ panicula, minus.

Barr. ic. t. 44. f. 2.

Habitat in Italia supra muros. D. Beck.

capillaris.

11. *POA panicula laxa patentissima capillata, foliis pilo-*

fis, culmo ramosissimo.

Poa panicula laxa erecta stricta, spiculis erectis oblon-

gis. *Gron. virg.* 136.

Germen paniculatum virginianum, loculis minimis.

Morif. hist. 3. p. 202. f. 8. t. 6. f. 33.

Ha-

Habitat in Virginia, Canada. D. Kalm.

*Panicula capillacea, strictissima, parentissima, ramosissima.
Spiculae ex flosculis 4, 5, 6, minim.e. Folia ad basin pilis
longis raris. Culmus ramosus.*

12. POA panicula ramis simplicissimis, floribus sessilibus, *malabarica*.
seminibus distantibus, culmo repente.

*Tsiama-pullu. Rheed. mal. 12. p. 83. t. 45.
Habitat in Indiæ arenosis.*

13. POA panicula ramis simplicissimis, floribus sessilibus *chinensis*.
seminibus imbricatis, culmo erecto.

Habitat in India. Osbeck.

*Rami paniculae simplicissimi, ut in antecedente, magis con-
ferti, Flores minores; Flosculi 4 nec septem.*

14. POA panicula oblonga subverticillata, flosculis sex-tenella.
floris.

Habitat in India.

*Gramen bipedale, Foliis longis. Panicula angustata, ra-
mulis confertissimis, subramosis & fere verticillata ap-
parent; Flores tam parvi, ut nudis oculis vix flosculi
numerentur.*

15. POA panicula coarctata secunda, culmo obliquo com- *compressa*.
presso. Fl. saec. 74. It. gotl. 178. Dalib. paris. 28.

*Poa spiculis ovatis compressis muticis, panicula secunda
coarctata. Aet. stockb. 1741. p. 184.*

*Gramen murorum, radice repente. Baub. pin. 2. prodr.
2.*

*Gramen paniculatum, radice repente, culmo compresso,
loculis distichis pulchellis. Scheuchz. gram. 198.*

*Habitat in Europæ & Americæ septentrionalis siccis.
muris, teldis. 24*

*Americana flosculis scapiis ternis, Europæa vero senis,
habitus tamen idem & structura.*

16. POA panicula attenuata, spiculis sub-bifloris mucrona- *nemoralis*.
tis scabris, culmo incurvo.

*Gramen sylvaticum, panicula tenui e raris loculis com-
posita. Dill. spec. 57.*

*Gramen paniculatum angustifolium alpinum, loculis
rarioribus & angustioribus non aristatis. Scheuch. gram.
164. t. 2.*

*Gramen loliaceum alpinum, paniculis ex rarioribus &
exiguis loculis compositum. Mont. gram. 39.*

β. Gramen cirrhosa & villosa spongia ad singula genicu-
la

*la donatum, paniculatum minimum alpinum. Boce.
muf. 2. p. 70. t. 59.*

Habitat in Europa ad radices montium umbrosas

Bulbosus. 17. *POA panicula secunda patentiuscula, spiculis quadri-*
floris.

*Poa culmorum basi tuberosa. Guet. stamp. 1 p. 163.
Dalib. paris. 29.*

α. *Gramen xerampelinum, miliacea pretenui ramosaque
1partia panicula ē. Xerampelino congener arvense ex-
stivum, Gramen minutissimo semine Lob. illustr.
14. Scheuch. gram. 185.*

β. *Gramen arvense, panicula crispa. Bauh. pin. 3 Barr.
ic. 703.*

*Gramen arvense angustifolium, panicula densa foliacea:
foliolis in panicula angustissimis. Scheuch. gram. 211.*

γ. *Gramen vernum, radice ascalonica. Vail. paris. 91. t.
17. f. 8.*

Habitat in Gallia.

*In α. culni semper inclinati, in γ. Gluma inaequales;
alię late plane, alię contractę longiores. Lœfl.*

BRIZA.

minor. 1. *BRIZA spiculis triangulis, calyce flosculis (7) longiore.
Hort. cliff. 23. Roy. lugdb. 63.*

*Gramen tremulum minus, panicula parva. Bauh. pin.
2. prodr. 4.*

Habitat in Helvetia, Italia.

media. 2. *BRIZA spiculis ovatis, calyce flosculis (7) breveire.
Hort. cliff. 23. Fl. suec. 80. Roy. lugdb. 63.*

*Gramen tremulum majus. Bauh. pin. 2. Scheuch. gram.
204.*

Habitat in Europę partis siccoribus.

maxima. 3. *BRIZA spiculis cordatis, flosculis septendecim. Hort.
cliff. 23. Hort. upf. 20. Roy. lugab. 63.*

*Gramen tremulum maximum Bauh. pin. 2. Scheuch.
204.*

Habitat in Italia, Lusitania.

Eragrostis. 4. *BRIZA spiculis lanceolatis, flosculis viginti.
Briza panicula spicata, spiculis lanceolatis. Guett. stamp.
1. p. 163.*

*Uniola calycibus diphyllis, spiculis ovato-lanceolatis.
Gren. virg. 136.*

Gramen paniculis elegatissimis. *Baub. pin. 2. Schenck.*
gram. 194. Moris. hist. 3. p. 204. f. 8. t. 6. f. 52.
 Gramen Eranthemum s. Eragrostis. *Barr. rar. t. 43.*
Habitat in Europa australi ad agrorum versuras.

UNIOLA.

1. UNIOLA paniculata. *paniculata.*
Uniola calycidus polyphyllis. Gron. virg. 136
Uniola. Hort. cliff. 23. Roy. lugdb. 67
Grameu myloicophotum oxyphyllon carolinianum.
Pizz. alm. 173. t. 32. f. 6. Catesb. cor 1. p. 32.
t. 32.
Habitat in Carolina.
2. UNIOLA subspicata, foliis involutis rigidis. *spicata.*
Gramen parvum maritimum spicatum, foliis angustis ri-
gidis. Clayt. 507.
Habitat in America borealis maritimis.
Culmus spithameus, Folii: alternis rigidis involuto-mu-
cronatis. Panicula minima, coarctata ut vix signum pe-
dicellorum, secunda; calyx & gluma carinatae flosculis
quatuor.

DACTYLIS.

1. DACTYLIS spicis sparsis secundis scabris numerosis. *cynosureides.*
Gramen maritimum, spica crassa daetyleoide terminali, o-
dore rancido, culmo albo. Gron. virg. 135.
2. Daetylis spicis alternis secundis incisis erectis approxi-
matis, calycibus unifloris subulatis. Gron. virg. 134.
Habitat in Virginia, Canada, Lusitania. 2
Culmus bipedalis, arundinaceus. Folia in culmo sex, lata,
culmo longiora, levissima margine scabra, incurva, pa-
gina interiore glaucoire. Spica sex s. plurime, se-
condae. divergentes, paleaceae; flosculis imbricatis latere
postico scabris. Calycibus unifloris carina scabris, mu-
cronatis, flosculo longioribus, sessilibus, secundis. Pistil-
lis villosis, longioribus.
2. DACTYLIS panicula secunda glomerata. *glomeratus.*
Cynosurus panicula secunda glomerata. Fl. succ. 85.
Poa flosculis confertis uno versu dispositis. Hort. cliff.
28. Roy. lugdb. 62.
Gramen spicatum, folio aspero. Baub. pin. 3. prodr.
9. Schenck. gram. 299.
Habitat in Europa cultis ruderatis.

CYNOSURUS.

- cristatus.* 1. CYNOSURUS bracteis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 493.
Fl. suec. 81. *Roy. lugdb.* 64.
 Gramen pratense cristatum, l. spica cristata lævi. *Baeh.*
pin. 2. *prodr.* 8. *Scheuch. gram.* 79.
Habitat in Europa pratis.
- echinatus.* 2. CYNOSURUS bracteis pinnato-palaceis aristatis.
Roy. lugdb. 64.
 Gramen alopecuroides, spica aspera. *Baeh. pin.* 4. *Scheuch. gram.* 80.
 Gramen alopecurum, spica aspera. *Barr. rar.* t. 123.
Habitat in Europa australiori.
- Lima.* 3. CYNOSURUS spica secunda, calycis gluma interiore spiculis subjecta. *Læfi.*
Habitat in Hispania. ☽
 Gramen vix spithameum. Foliorum vaginæ tumidiunculae, folio ipso parvo. Spica secunda, arcte imbricata, oblonga, ex floribus secundis, sessilibus, duplice serie, compresso carinatis: calycina valvula exteriore compressa, majore; flores singuli constant flosculis 5.
- durus.* 4. CYNOSURUS spiculis alternis secundis sessilibus rigidis pedicellatis.
 Gramen arvense, polypodii panicula crassiore. *Barr. rar.* 1213. t. 50.
Habitat in Europa australi.
- cæruleus.* 5. CYNOSURUS bracteis integris. *Hort. cliff.* 495.
Fl. suec. 82. *Roy. leid.* 64.
 Gramen glumis variis. *Baeh. pin.* 10. *prodr.* 21. *Scheuch. gram.* 83.
Habitat in Europæ paschis uliginosis. ✕
- ægyptius.* 6. CYNOSURUS spicis quaternis obtusis dimidiatis, calycibus mucronatis.
 Cynosurus spicis quaternis terminalibus horizontalibus.
Roy. lugdb. 64.
 Gramen ischænum malabaricum speciosius, longioribus mucronatis foliis. *Pluk. alm.* 175. t. 300. f. 8.
 Gramen Daëtylon ægyptiacum. *Baeh. pin.* 7. *theatr.* 110. *Roy. lugdb.* 109. *Morif. hist.* 3. p. 184. f. 8.
t. 3. f. 7. *Scheuch. gram.* 109.
Habitat in Africa, Asia, America.
- indicus.* 7. CYNOSURUS spicis digitatis linearibus, floribus ovato-lancicolatis.
Cyno-

Cynosurus spicis aggregatis terminalibus deorsum aristatis. Roy. lugdb. 65.

Grauen Dactyloides spicis deorsum aristatis. Burm. zeyl. 106. t. 47. f. 1.

Grauen dactylon americanum minus. Schenck. gram. 107.

Habitat in Indiis.

8. CYNOSURUS panicula subspicata, flosculis simpli-paniceus. cibus biaristatis.

Panicum floribus conglomerato-spicatis laevibus aristis ditidio brevioribus. Fl. succ. 54.

Panicum spica composita, aristis spica longioribus. Virid. cliff. 7. Roy. lugdb. 55.

Panicum spiculis spicatis scabritie adhaerentibus. Hor. cl. 27.

Grauen paniceum, spica aspera. Bauh. pin. 8. Schenck. gram. 47.

Habitat in Europa agris cultis. ◎

9. CYNOSURUS paniculae spiculis sterilibus pendulis aureo-ternatis, floribus aristatis.

Grauen barcinonense, panicula densa aurea. Tournef. inst. 523.

Grauen panicula pendula aurea. Bauh. pin. 3. theatr. 33. Schenck. gram. 149.

Grauen sciurum s. alopecurum minus, heteromalla panicula. Barr. rar. 1180. t. 4.

Habitat in Europa australi.

Spiculae ternatae, steriles; Calyx bivalvi, linearis, acuminate, involvente Glumas solitarias, alternas, ovatas, obtusas, concavas, absque valvula minore, statim in minibus aut pistillis; nequeunt commode dici flores, sed potius pro involucris haberri; Flores bini ad basin spicularum, Calyx linearis, longitudine flosculorum, bifloro; Flosculo inferiori sessili: Gluma exteriore ovata, infra apicem aristae longarecta; interiore angustissima. Flosculus alter, pedunculo longitudine flosculi prioris, minor, simillimus; tertii flosculi solum rudimentum appetet.

FESTUCA.

* *Panicula secunda.*

1. FESTUCA panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. Fl. succ. 95.

Poa foliis setaceis compressis: caulinus latiore, panicula con.

contracta secunda, corollis acuminato-aristatis. *Act. stockb.* 1741. p. 164.

Poa foliis setaceis, panicula ramosa, floribus petiolatis antrosum spectantibus, glumis subulatis. *Roy. lugdab.* 62.
Poa spiculis ovato-angustis aristato-acuminatis. *Fl. lapp.*

55.

Gramen foliis junceis brevibus, majus, radice nigra. *Bauh. pin.* 5. *prodr.* 34. *Scheuch. gram.* 279.

Habitat in Europæ collibus aprieis aridis vulgatissimum. 2.

3. *Festuca spiculis viviparis.* *Fl. suec.* 94.

Gramen paniculatum sparteum alpinum, panicula angusto-spadiceo viridi, proliferum. *Scheuch. gram.* 213. t. 1.

Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Scotiæ. 2.

luriscula. 2. *FESTUCA* panicula nutante inferne ramosa, spicis adscendentibus hispidis, foliis setaceis. *Roy. lugdab.* 68.

Gramen pratense, panicula duriore laxa unam partem spectante. *Raj. hist.* 1286. *Scheuch. gram.* 285.

Gramen tenue duriusculum & pene junceum. *Bauh. hist.* 2. p. 463.

Habitat in Europæ pratis siccis.

rubra

3. *FESTUCA* panicula secunda scabra, spiculis sexforis aristatis: floculo ultimo inutico, culmo semitertio. *Fl. suec.* 93.

Gramen alpinum pratense, panicula duriore laxa spadicea: loculis majoribus. *Scheuch. gram.* 287.

Habitat in Europæ sterilibus siccis.

Magnitudine, colore maturitatis rubro, culmo teretis ed altero latere planiusculo, distinguuntur a F. ovina.

amethystina. 4. *FESTUCA* panicula spicata, spiculis uno versu inclinatis submuticis. *Roy. lugdab.* 68.

Gramen montanum, foliis capillaribus longioribus, panicula heteromalla spadicea & velut amethystina. *Scheuch. gram.* 276.

Gramen paniculatum elatius, spicis longis muticis squamolis. *Raj. hist.* 1286. *angl.* 3. p. 414.

Habitat in Italia, Gallia, Anglia.

myuros.

5. *FESTUCA* panicula spicata nutante, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris. *Roy. leid.* 68.

Gramen festucum myureum, minori spica heteromalla. *Barr. ic. t. 99. f. 1.*

Gra-

Gramen murorum, spica longissima. *Raj. angl.* 3. p. 415. *hist.* 286. *Morif. hist.* 5. p. 215. t. 7 f. 43.

Habitat in Anglia, Italia.

6. FESTUCA panicula subnudante secunda, pedunculis *incusata*.
inerasistris, aristis calycinis longitudine floscularum.

Gramen festuceum myurum ciacum, spica heteromalla,
gracili. *Barr. ic.* t. 99. f. 2. *Scheuch. gram.* 293?

Habitat in Hispania.

Singulare quod pedunculi membranacei floribus fere crassiores. Calycinæ aristæ non breviores aristis floscularum.

7. FESTUCA panicula secunda: spiculis erectis: calycis *bromoides*.
altera valvula integra; altera acuminata.

Festuca spicis erectis ad unum latus, palea altera caly-
cina minima, altera acuminata. *Roy. lugdb.* 68.

Gramen paniculatum bromoides minus, paniculis ari-
statis unam partem spectantibus. *Kaj. angl.* 3. p. 415.
hist. 1287. *Pluk. alm.* 174. t. 33. f. 10. *Scheuch.*
gram. 297.

Habitat in Anglia, Gallia.

* *Panicula æquali.*

8. FESTUCA panicula erecta, spiculis subovatis muti- decumben-
cis, calyce flosculis majore, caule decumbente. *Fl.*
92. *It. scan.* 226.

Gramen montanum avenaceum, loculis muticis tu-
mentibus, piloïum. *Scheuch. gram.* 170.

Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non
aristatis. *Raj. angl.* 3. p. 408. *hist.* 1288. *Pluk. alm.*
174. t. 34. f. 1. *Mont. pruár.* 53. t. 2. f. 1.

Habitat in Europæ pascuis siccis sterilius.

9. FESTUCA panicula secunda erecta, spiculis subarista- elatico-
tis exterioribus teretibus. *Fl. suec.* 91.

Festuca panicula spicata, spiculis uno versu inclinatis
submuticis. *Roy. lugdb.* 68.

Gramen pratense majus, loculis tumidis. *Buxb. cent.*
5. p. 41. t. 16.

Habitat in Europæ pratis fertilius.

10. FESTUCA panicula ramosa erecta. spiculis subsec- fluitans.
filibus teretibus muticis. *Fl. suec.* 90.

Poa spiculis oblongis erectis. *Mort. cliff.* 28. *Roy. lugdb.* 62.
Gramen aquaticum fluitans, multiplice spica. *Baub. pin.*

2. *theatr.* 41. *Scheuch. gram.* 199.

Habitat in Europæ fossis & paluosis.

- crispiata.* 11. FESTUCA panicula spicata lobata, spiculis ovatis latis sexfloris hirsutis. *L. & f.*
Habitat in Lusitaniæ collibus sterilibus.
Culni e radice plurimi, vix digitæ longitudine. Panicula subspicata, fere ovata, diversa ab Aira crispiata florculis pluribus iisque hirsutis, culmo breviore, facie autem accedit.

BROMUS.

- secalinus.* 1. BROMUS panicula patente, spiculis ovatis: aristis rectis. *Fl. succ. 84.*
Festuca culmo paniculato, spicis compresso-ovatis. Fl. lapp. 28. Roy. lugdb. 67.
B. Festuca graminea, glumis hirsutis. Bauh. pin. 9. theatr. 143. Scheuch. gram. 250.
Gramen avenaceum segerale majus, gluma turgidiore. Moris. hist. 3. f. 8. t. 7. f. 16.
Habitat in Europæ agris secalinis arenosis. ◎
- squarrosum.* 2. BROMUS panicula patula. spicis ovatis: aristis divaricatis.
Festuca graminea, glumis vacuis. Scheuch. gram. 251. t. 5. f. 11.
Gramen avenaceum, loculis amplioribus candidantibus glabris & aristatis. Tournef. inst. 525.
Gramen phalaroides acerosum, nutante spica. Barr. ic. 24. f. 1.
Habitat in Gallia, Helvetia, Sibiria.
- purgans.* 3. BROMUS panicula nutante crispa, foliis utrinque nudis: vaginis pilosis, glumis villosis.
Gramen bromoides catharticum. Few. peruv. 705. t. 1?
Habitat in Canada. Kalm. 2
Culmus sesquipedalis, firmus. Folia latitudine arundinis, carinata, viridia, suprafere nuda, subtus omnino glabra. Vaginae foliorum retrorsum pilosae. Panicula crispa, flexuosa, nutans. Spiculae florculis 8 ad 14 oblongae. Glumæ pilis brevissimis undique extus villosæ. Arista sub apice glumæ exterioris. Differt nostra a Fewillæi radicibus fibrosis nec squamosis; spiculis angustioribus.
- ciliatus.* 4. BROMUS panicula nutante, foliis utrinque vaginisque subpilosis, glumis ciliatis.
Habitat in Canada ex semine. D. Kalm.
Culmi tenues. Folia utrinque & vaginæ vix manifeste pubescentes. Panicula valde nutans, non crispis pedunculis.

culis. Spiculis oblongae, compressae, petalorum marginibus (non dorso) valde pilosis, qua nota facile distinguitur. Flosculi 8, sub apice aristati: calyces nudi. Glume corollae lanceolatae.

5. BROMUS panicula patula, spiculis oblongis distichis, *sterilis.*
glumis subulato-aristatis.

Festuca avenacea sterilis elatior. Baub. pin. 9. Moris. hist. 3. p. 212. f. 8. t. 7. f. 11.

Gramen avenaceum, panicula sparsa, locustis majoribus & aristatis. T. Scheuch. gram. 258.

Habitat in Europæ australioris agris, sylvis.

6. BROMUS panicula nutante, spiculis ovato-oblongis, *arvensis.*
Fl. suec. 85.

Bromus culmo paniculato, spicis compressis. Fl. lapp. 27. Hort. cliff. 25.

Festuca graminea, juba affusa. Baub. pin. 192.

Festuca avenacea sterilis elatior circa Uppsaliam. Rædb. elys. 1. p. 87. f. 7. opt.

Gramen avenaceum villosum, locustis amplioribus viridantibus margine argenteo cinctis aristatis. T. Scheuch. gram. 253

Ægilops major, caule & foliis arundinaceis, locustis glabrioribus & angustioribus e fusco verampelinis. Dill. app. 60.

Habitat in Europa ad versuras agrorum. ☺

7. BROMUS panicula nutante, spiculis linearibus. *Fl. tefforum.*
suec. 86.

Gramen avenaceum, locustis villosis angustis candicanibus & aristatis. Tournefort. inst. 526.

Gramen avenaceum, locustis villosis angustis candicanibus & aristatis. T. Scheuch. gram. 254.

Habitat in Europæ collibus siccis & tectis terrestribus ☀

8. BROMUS panicula erecta coarctata. *Fl. suec. 87. bordeaceum.*
Festuca avenacea sterilis humilior. Baub. pin. 10.

Gramen avenaceum pratense, panicula squamata & villosa. Moris. hist. 3. p. 213. f. 8. t. 7. f. 18. ?

Habitat in Europæ collibus aridissimis sabulosis. ☀

9. BROMUS panicula nutante, spiculis quadrifloris aristis *giganteis.*
brevioribus.

Gramen sylvaticum glabrum, panicula r. curva, Vaill. parif. 93. t. 19. f. 3.

- β *Bromus paniculæ ramis conjugato-binatis. Fl. suec. 88.*
Festu-

Festuca foliis digitis latitudine longissimis, panicula laxa.
Roy. lugdb. 69.

Gramen bromoides aquaticum latifolium, panicula spar-
sa tenuissima aristata. Schenck. gram. 264.

Habitat in Europe sylvis siccis. 2

pinnatus. 10. *BROMUS culmo indiviso, spiculis alternis subsessi-*
libus teretibus. Fl. suec. 89. it. goetl. 180.

Festuca culmo alternatum spicato, spicis teretibus. Fl.
lapb. 29. Roy. lugdb. 67.

Gramen, spica brizæ, majus. Baub. pin. 9. prodr. 19.
theatr. 133.

Habitat in Europa sylvis montosis asperis. 2

rissoatus. 11. *BROMUS spiculis distiche imbricatis sessilibus de-*
*pressis. Plant. carolsch. 1. **

Festuca culmo spicato, spiculis multitoris. Gmel. sibir.
1. p. 115. t. 23.

Gramen triticum, spica latiore compacta, cristatum.
Buxb. cent. 1. p. 32. t. 50. f. 3.

Habitat in Sibiria, Tataria. 2

STIPA.

pennata. 1. *STIPA aristis lanatis.*

Festuca aristis paniculae circiter longitudine plumosiss.
Roy. lugdb. 68.

Gramen spicatum, aristis pennatis. Tournef. inst. 518.
Schenck. gram. 153.

Gramen sparteum pennatum. Baub. pin. 5. theatr. 70.
Spartum austriacum. Clus. hist. 2. p. 221.

Habitat in Austria, Gallia.

junccea. 2. *STIPA aristis nudis, calycibus semine longioribus.*

Festuca aristis circiter longitudine paniculae nudis. Roy.
lugdb. 68.

Festuca junceo folio. Baub. pin. 9. Theatr. 145. Sche-
nck. gram. 151.

Festuca longissimis aristis. Baub. pin. 10. theatr. 153.
Habitat in Helvetia, Gallia.

arenacea. 3. *STIPA aristis nudis, calycibus semen æquantibus.*

Andropogon folio superiore spathaceo, pedunculis late-
ralibus oppositis unifloris, aristis flexuosis. Gron. virg.
133.

Habitat in Virginia.

Culni tennes. Folium sumnum ventricosum longitudine
pan-

paniculae. Panicula pedunculis conjugatis, unifloris. Calycis gluma uniflora, pallida, bivalvis, aequalis. Corollae arista terminalis, contorta basi articulata, ruda, longitudine peduncularum. Gramen hoc Avena sativam innescit.

AVENA.

1. AVENA paniculata, calycibus unifloris, seminibus hit-sibirica.
iutis, aristis calyce triplo longioribus.

Festuca glumis villosis, aristis calyce triplo longioribus.

Gmel. sibir. I. p. 113. t. 22.

Habitat in Sibiria.

2. AVENA calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito *elatior.*
mutico, masculo aristato. *Fl. suec.* 98.

Avena calycibus bifloris, panicula laxe spicata: pedunculis prioribus faicculatis. *Guett. stamp.* I. p. 182.

Gramen avenaceum, panicula acerosa, femine paposo.
Dill. app. 48.

Gramen avenaceum elatius, juba longa splendente. *Raj. meth.* 179. *angl.* 3. p. 406. *Morif. hist.* 3. p. 214.
f. 8. t. 7. f. 37. *Scheuch. gram.* 239. *Hall. helv.* 225.

β. Avena panicula nutante, calycibus bifloris: altero flosculo aristato. *Roy. lugdb.* 66.

Gramen nudosum, avenacea panicula, radice tuberibus prædita. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 3. *theatr.* 18. *Scheuch. gram.* 237.

Habitat in Europæ maritimis & apricis.

3. AVENA panicula attenuata, calycibus bifloris semini-pensylvanica
bus villosis, aristis calyce duplo longioribus.

Habitat in Pensylvania. *Kalm.*

4. AVENA panicula contracta, flosculis binis apice bi-læsingiana,
aristatis, dorso arista reflexa. *Læfl.*

Habitat in Hispania.

Gramen ixi digiti longitudine; culmi plures ex radice.

Folia planiscula: summum ventricosum latius. Panicula coarctata, crassa. Calyx flosculis longior. Aristæ terminales, setaceæ, longitudine corollarum: dorsalis duplo longior, torta.

5. AVENA calycibus dispermis, seminibus lævibus. *Hort. sativa.*
cliff. 25. *Hort. upf.* 20. *Mat. med.* 38. *Roy. lugdb.*

65.

Avena nigra. *Bauh. pin.* 23.

β. Avena alba. *Bauh. pin.* 23

Habitus - - - ⊖

6. AVE.

- fatua.* 6. AVENA panicula patente, calycibus trifloris, flosculis basi pilosis. *Fl. suec.* 97.
Avena seminibus hirsutis. Fl. lapp. 30. *Roy. lugdb.* 65.
Festuca utriculis lanagine flavescentibus. Bauh. pin. 10.
Gramen avenaceum, loculis lanagine flavescentibus.
Scheuch. gram. 239.
Habitat in Europæ agris inter segetes. ◎
- flavescens.* 7. AVENA panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis. *Roy. lugdb.* 66.
Grainen avenaceum pratense elatius, panicula flavescente, loculis parvis. Raj. angl. 3. p. 407. *bist.* 1284.
Scheuch. gram. 223.
Grainen avenaceum, spica sparsa flavescente, loculis parvis. Moris. bist. 3. p. 215. f. 8. t. 7. f. 42.
Habitat in Germania, Anglia, Gallia.
- fragilis.* 8. AVENA spicata, flosculis subquaternis calyce longioribus.
Gramen loliaceum lanuginosum spica fragili articulata.
glamis pilosis aristatum. Scheuch. gram. 32.
Gramen loliaceum spurium hirsutum, aristis geniculatis.
Barr. ic. 905. f. 1. 2. 3.
Habitat in Lusitania, Hispania. Læfl.
- pratensis.* 9. AVENA calycibus quinquefloris, panicula spicata.
Avena panicula spicata, spiculis cylindricis culmo compressis. Guett. stamp. 1. p. 182.
Avena spicis erectis, calyce spiculis breviore. Fl. lapp. 31. *Fl. suec.* 96.
Avena calycibus trifloris, panicula nutante, foliis planis. Gmel. sibir. 1. p. 129.
Gramen avenaceum montanum, spica simplici, aristis recurvis Raj. angl. 3. p. 252. t. 21. f. 1. *Scheuch. gram.* 226.
Grainen avenaceum glabrum s. potius hirsutum, panicula purpuro-argentea splendente. Raj. angl. 3. p. 406. t. 21. f. 2.
Habitat in Europæ pascuis siccis apricis.
- spicata.* 10. AVENA spicata, calycibus spiculis sexfloris longioribus; petalo exteriore apice aristato furcatoque.
Habitat in Pennsylvania.
Gramen angustum; Folia linearia. Spica composita ex spiculis 3. f. 4, remotis, erectis: Spiculæ subpedunculatae: singulis Calyx diphyllos, subulatus, aequalis, spicula longior; Flosculi 6, sessiles, erecti: Petalo exteri-

teriore apice bifido in apices duos setaceos, e quorum divisura arista articulata, longitudine spiculae. Facies Festucae decumbentis.

LAGURUS.

1. LAGURUS spica ovata. Hort. cliff. 25. *ovata.*
 Gramen alopecuroides spica rotundiore. Bauh. pin. 4.
theatr. 56.
 Gramen spicatum tomentosum longissimis aristis donatum. T. Scheuch. gram. 58
Habitat in Italia, Gallia, Sicilia, Lusitania. ◎

ARUNDO.

- ARUNDO arbor. Bauh. pin. 18. Hort. cliff. 25. Fl. Bamb-
zeyl. 47. Roy. lugdb. 67.
 Tabaxir & Mombu arbor. Bauh hist. 1. p. 222.
 Ily. Rheed. mal 1. p. 25. t. 16.
Habitat in India utraque. 5

ARUNDO calycibus trifloris, panicula diffusa. Roy. Donnu.
lugdb. 66.

Arundo sativa. Virid. cliff. 7. Hort. cliff. 26.

Arundo sativa, quæ Donax dioscoridis. Bauh. pin. 17.
theatr. 271.

3 Arundo indica laconica versicolor. Moris. hist. 3. p.
219. f. 8. t. 8. f. 9. Hort. cliff. 26.

Habitat in Hispania, Galloprovincia.

3 ARUNDO calycibus quinquefloris, panicula laxa. *phragmites.*
Roy. lugdb. 66. Gron. virg. 137.

Arundo panicula laxa, flosculis quinis. Fl. suec. 99.

Arundo panicula laxa, calycibus subbifloris. Sauv.
monsp. 38.

Arundo vulgaris s. phragmites dioscoridis. Bauh. pin.
17. Scheuch. gram. 161.

Habitat in Europæ lacubus fluviis. 2

4. ARUNDO calycibus unifloris, panicula erecta, foliis epigejoi.
subtus glabris.

Arundo panicula coarctata erecta integra, foliis inferne
glabris. Fl. suec. 101.

Gramen arundinaceum paniculatum montanum, panicula spadiceo viridi, semine papposo. Scheuch. gram.
124.

Habitat in Europæ collibus aridis. 2

- Calamagrostis.* 5. ARUNDO calycibus unifloris, culmo ramoso. *Fl. lapp.* 42. *Fl. suec.* 100. *Roy. lugdb.* 66.
Gamen arundinaceum, panicula molli spadicea, majus. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 94. *Schenck. gram.* 122 t.
 3. f. 5.
Habitat in Europee paludibus graminosis. 2.
- venaria.* 6. ARUNDO calycibus unifloris, foliis involutis mucronato-pungentibus.
Arundo foliorum lateribus convolutis acumine pungente. *Fl. lapp.* 43. *Fl. suec.* 102.
Gamen iparteum spicatum, foliis mucronatis longioribus. *Bauh. pin.* 5.
Grainen spicatum secalinum maritimum maximum, spica longiore. *T. Schenck. gram.* 138.
Habitat in Europa ad maris litora arenosa. 2.

ARISTIDA.

- Adscensionis.* 1. ARISTIDA.
Gamen avenaceum, panicula minus sparsa, cuius singula grana tres aristas longissimas habent. *Sloan. jam.* 35. *bijt.* 1. p. 16. t. 2. f. 56.
Gamen avenaceum maderaspatanum, panicula sparsa aristis longioribus ornata. *Plur. alm.* 174. t. 191. f. 3?
Habitat in Insula Adscensionis una ex quatuor istius pauperrimae Flora plantis, quarum 1. Sherardia fruticosus
 2. *Euphorbia origanoides*, 3. *Portulaca*. *Osbeck.* 2.
Habitus Festucæ ovina, sed paulo major. Radix cespitem constituens. Culmi inferne ramosi. Folia e basi latiore sensim angustata, plano-canaliculata, subulata: Panicula oblonga, distincta glumis corollue univalvibus, siliformibus, longitudinaliter convolutis, triplici aristâ terminatis.

APLUDA.

- Mantica.* 1. APLUDA.
Schoenanthus avenaceus procumbens maderaspatanus, bupleuri folio. *P. Schenck. gram.* 119?
Habitat in Iudia.
Culni longissimi, bipedales & ultra, debiles, glabri.
 geniculis tumidis. Folia longa, plana, lanceolata, petiolata s. versus vaginam attenuata in petiolum. Panicula angusta, parva, e lateribus exiens, e vaginis minorum foliorum uti *Lagurus*. Flores in nostra omnino mutici, qua a Schenckzeriana differunt.

LOLIUM.

1. LOLIUM spica mutica.

*Lolium spicis muticis, radice perenni. Hort. cliff. 24- perenne.
Fl. suec. 104. Roy. lugdb. 69.*

Lolium spicis compresolis, radice perenni. Fl. lapp. 32.

*Gramen loliaeum, angustiore folio & spica. Bauh. pin.
9: theatr. 127. Scheuch. gram. 25.*

Habitat in Europa ad agrorum versuras solo fertili: ◎

2. LOLİUM spica aristata.

*Lolium spicis aristatis, radice annua. Hort. cliff. 23. Fl. temulentum.
suec. 103. Roy. lugdb. 69.*

*Gramen loliaeum, spica longiore, s. *Lolium dioscoridis.*
Bauh. pin. 9. theatr. 121. Scheuch. gram. 31.*

*Habitat in Europæ agris inter *Hordeum*, *Linum*: ♀*

ELYMUS.

1. ELYMUS foliis mucronato-pungentibus. *It. scian* 336; *arenarius*:
Gen. nov. 1094.

Secale spiculis geminatis. Fl. suec. 106.

Triticum foliis acuminatis pungentibus. Roy. lugdb.. 71.

*Gramen canarium maritimum, spica triticea, nostras. Raj.
hist. 1256. Schenck. gram. 6.*

Habitat ad Europæ litora marina in arena mobili. ♀

2. ELYMUS spica flaccido pendula spiculis binatis. *Hort. Sibiricus.*
upf. 22. Gen. nov. 1094.*

Triticum radice perenni, spiculis binis longissime aristati, *Gmel. sibir. 1: p. 123. t. 28.*

Habitat in Sibiria. ♀

3. ELYMUS spica flaccido-pendula, spiculis inferioribus *canadensis*:
ternatis; superioribus binatis. *Gen. nov. 1094.*

*Gramen secalinum majus altissimum virginianum Mo-
ris. hist. 3. p. 180. f. 8. t. 10. f. 2. Raj. suppl. 599.*

Habitat in Canada. Kaln. ♀.

*Convenit in plurimis cum E. Sibirico, a quo tamen dif-
fert 1. Spiculis villosis, nec nudis 2. involucris in ar-
istam excurrentibus longioribus ipsa spicula, dentis aristis;
at in sibirica involucrum minus subulatum, sed fere
lanceolatum in aristam desinens, quae longe brevior
sua spicula. 3. Spicae inferne ternae, quam Sibirica
semper duas obtineat. 4. Spiculae, dum florent, debi-
scunt a capitulo, in sibirica vero spiculae approxima-
tate sunt scapo: Variat haec spicis inequivis pendula-
lis:*

F ♀

lis. Aristæ corollinae cum maturescit fructus patentis reflexæ sunt contra ac in Sibirica.

virginicus. 4. ELYMUS spica erecta, spicula involucro longiore.
Hort. upf. 22.

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, involucris flosculos crassitic & longitudine superantibus. *Gron.* *virg.* 13.

Habitat in Virginia. 2

caput medusæ. 5, ELYMUS spiculis unifloris involucris setaceis patentissimis.

Elymus involucris reflexo-patentibus. *Gen. nov.* 1094,
Avena lusitanica spicata, caput medusæ referens. *Meris.*
bijt. 3. p. 210. *Raj. suppl.* 611.

Gramen hordeaceum, spica aristis longissimis circumval-
lata. *Schenck. gram.* 20.?

Habitat in Lusitanæ, Hispaniæ maritimis.

SECALE.

cereale. 1. SECALE glumarum ciliis sebris. *Hort. upf.* 22.
hybernum. Secale hybernum vel majus. *Baub. pin.* 22. *theatr.* 425.
vernus. β. Secale vernum f. minus. *Baub. pin.* 23.

Habitat - - - - ○

villosum. 2. SECALE glumarum ciliis villosis, squamis calycinis
cuneiformibus.

Gramen spicatum secalinum, glumis villosis in aristas
longissimas desinentibus *Tournef. inst.* 518.

Gramen secalinum maximum. *Park. theatr.* 1144.

β. Gramen creticum spicatum secalinum, glumis ciliaribus
Tournef. cor. 39. *Euxb. cent.* 5. p. 21. t. 41.

Habitat in Europa australi, & in oriente.

orientale. 3: SECALE glumis hirsutis, squamis calycinis subulatis.
Gramen orientale secalinum, spica brevi & lata. *Tournef. cor.* 39.

Habitat ad Archipelagum.

tretium. 4. SECALE glumis extrorsum ciliatis.

Gramen creticum spicatum secalinum altissimum, tube-
rosa radice. *Tournef. cor.* 39. *Schenck. gram.* 22.

Habitat in Creta.

HORDEUM.

valgare. 1. HORDEUM flosculis omnibus hermaphroditis aristatis;
ordinibus duobus erectioribus.

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, seminibus
corticatis. *Hort. upf.* 22. *Mat. med.* 35. Hor-

- Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis. *Hort. cliff.*
 24. *Roy. lugab.* 69.
 Hordeum polystichon vernum. *Baub. pin.* 22. *theatr.* 439.
 ♂. Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, seminibus *cælesti*,
 decorticatis. *Hort. upf.* 23.
Habitat - - - - ⊖
2. HORDEUM flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, *bexasticen*,
 seminibus sexfariam æqualiter positis. *Hort. upf.* 23.
Habitat - - - - ⊖
3. HORDEUM flosculis lateralibus masculis muticis, *se- distichon*,
 minibus angularibus imbricatis. *Hort. upf.* 23
 Hordeum distichon. *Baub. pin.* 22.
 ♂. Hordeum flosculis lateralibus masculis muticis, semini- *dist. nudum*
 bus angularibus imbricatis decorticatis
Habitat - - - - ⊖
4. HORDEUM flosculis lateralibus masculis muticis, *se- recrinita*,
 minibus angularibus patentibus corticatis. *Hort. upf.*
 23. n. 5.
Zeocriton f. *oryza germanica*. *Baub. pin.* 22.
Habitat - - - - ⊖
5. HORDEUM flosculis lateralibus masculis aristatis, *marinum*.
Hort. cliff. 24. *Fl. suec.* 107. *Roy. lugdb.* 69.
Gramen hordeaceum minus & vulgare. *Baub. pin.* 8.
theatr. 134. *Scheuch. gram.* 14.
 ♂. *Gramen spicatum secalinum minus*. *Scheuch. gram.*
 17. *Vaill. paris*, 83. t. 17. f. 6.
Habitat in Europa locis ruderatis. ⊖
6. HORDEUM aristis involucrisque setaceis longissimis. *javaratum*.
Habitat in Canada. *Kalm.*
Habitus hordei murrini, sed *involucra* & *aristæ setaceæ*
quadruplo longiores; quam tota spica, unde *singularis fa-*
cies graminis.

TRITICA.

* *Annua*.

1. TRITICUM glumis ventricosis glabris imbricatis *estivum*,
 aristatis. *Hort. upf.* 21.
Triticum radice annua, spica glabra aristata *Hort. cliff.*
 24. *Roy. lugdb.* 170.
Triticum æstivum *Baub. pin.* 21.
Habitat - - - - ⊖

- hybernum.* 2. TRITICUM gluinis ventricosis lœvibus imbricatis submuticis. *Hort. upf.* 21. *Mat. med.* 36.
Triticum radice annua. spica mutica. *Hort. cliff.* 24.
Roy. lugdb. 70.
Triticum hybernum, aristis carens. *Baub. pin.* 21.
Habitat - - - ◎
- turgidum.* 3. TRITICUM glumis ventricosis villosis imbricatis obtusis. *Hort. upf.* 21.
Triticum radice annua, glumis villosis. *Hort. cliff.* 24.
Roy. lugdb. 70.
Triticum spica villosa quadrata breviore & turgidiore.
Moris. hist. 3. p. 176. f. 8. t. 1. f. 14.
Habitat - - - ◎
- Spelta.* 4. TRITICUM calycibus truncotis quadrifloris, flosculis aristatis hermaphroditis: intermedio neutro, *Hort. upf.* 21.
Hordeum flosculis lateralibus masculis muticis involucro destitutis. *Sauv. monsp.* 39.
Zea dicoccos vel Spelta major. *Baub. pin.* 22. *theatr.* 412. t. 414.
Habitat - - - ◎
- monococcum* 5. TRITICUM involucris unifloris, floribus aristatis, spica disticha. *Sauv. monsp.* 39. †
Hordeum distichum spica nitida f. Briza nuncupatum. *Tournef. inst.* 543.
Zea Briza dicta f. monococcus germanica. *Baub. pin.* 21.
Briza monococcus dodonæi. *Lob. ic.* 31.
Habitat - - -
- * *Perennia.*
- repens.* 6. TRITICUM calycibus subulatis trifloris acuminatis.
Triticum radice repente, foliis viridibus. *Fl. lapp.* 33.
Fl. suec. 105. *Hort. cliff.* 24. *Mat. med.* 37. *Roy. lugdb.* 70.
Gramen caninum arvense f. Gramen dioscoridis. *Baub. pin.* 1. *Scheuch. gram.* 5.
Habitat in Europæ cultis. ♀
- caninum.* 7. TRITICUM calycibus subulatis quadrifloris acuminatis.
Gramen caninum non repens ciatius, spica aristata. *Moris hist.* 3. p. 177. f. 8, t. 1. f. 2. *Buxb. cent.* 4. p. 29.
t. 50. *Gra-*

Gramen loliaceum radice repente s. Gramen officinale, longioribus aristis donatum. T. Vail. parif. 81. t. 17. f. 2.

Graminis spica triticea repentis vulgaris varietas cum spica aristata. Scheuch. gram. 9.

Habitat in Europæ sepius 2

TRIGYNIA.

ERIOCAULON.

1. ERIOCAULON culmo quinquangulari, calyce univari- *quinquangu-*
lare. pentaphyllo. Fl. zeyl. 48. *
- Scabiosa graminea nudicaulis, capitulis argenteis s. Sta-
tice minima inadraspatana. Pluk. alm. 366. t. 221. f. 7.
Habitat in India. 2
2. ERIOCAULON culmo sexangulari, foliis ensiformi- *sexangula-*
bus. Fl. zeyl. 49.
Gramen junceum indiæ orientalis minus, capitulo ro-
tundo ex paleaceis spiculis in cacumine caulis glome-
rato. Pluk. mani. 48.
Habitat in India. 2
3. ERIOCAULON culmo sexangulari, foliis setaceis. *setaceum.*
Fl. zeyl. 50.
Randalia malabarica, capillaceo folio. Petiv. topic. 344
T'fieu-kotijelleti-pullu. Rheed. mal. 12. p. 129. t. 63.
Habitat in India.
4. ERIOCAULON culmo decangulari, foliis ensifor- *decangula-*
mibus.
Eriocaulon noveboracense, capitulo albo globoso s.
Globularia americana statices haud absimilis, caulinis
lana atro-nitente refertis. Pluk. amalh. t. 409. f. 5
Randalia americana procerior. Pet. gaz. t. 6. f. 2.
Globulariæ affinis aquatica, caule tenui aphylio grami-
neo, capitulis albicanibus parvis globosis, foliis pau-
cis humistratis gramineis. Gron. virg. 13.
Habitat in America septentrionalis paludibus.

MONTIA.

1. MONTIA. Fl. lapp. 30. Fl. suec. 108. Roy. lugdh. fontana:
199.
Montia aquatica minor. Mich. gen. 18. t. 13. f. 2.
Cameraria arvensis minor. Dill. giss. 46

Alfinoides annua verna. *Vall. parv. t. 3. f. 4.*

Alfine palustris, portulacæ aquatice similis. *Raj. n. p. 1035 Pet. herb. t. 10. f. 12.*

Portulaca arvensis. *Baeh. pin. 288.*

Habitat in Europa ad scaturigines. ◎

PROSERPINACA.

palustris. 1. PROSERPINACA. *Act. nps. 1741. p. 81.*

Trixis. *Mitch. E. N. C. 1748. n. 23.*

Habitat in Virginiae paludibus.

Radix repens. Caules pedales, terciusculi. Folia alterna, lanceolata, serrata, in petiolos desinentia: demersa s. ima in lacinias lineares pinnatifida. Flores axillares, solitarii. Fructus figura Poligoni.

HOLOSTEUM.

ordatum. 1. HOLOSTEUM foliis subcordatis. *Gen. nov. 1095.*
Alfine foliis subcordatis, stipulis utrinque quaternis
Hort. nps. 24.

Alfine americana, nummulariæ folio. *Herm. parad. II.*
t. 11.

Habitat in Jamaica, Surinama.

succulentum 2. HOLOSTEUM foliis ellipticis carnosis. *Gen. nov.*
1095.

Alfine foliis ellipticis succulentis. *Cold. novemb. 9.*
Habitat in Noveboraco.

hirsutum. 3. HOLOSTEUM foliis orbiculatis hirsutis. *Gen. nov.*
1095.

Alfine foliis orbiculatis hirsutis, floribus sessilibus. *Roy.*
miss.

Habitat in Malabarla.

umbellatum. 4. HOLOSTEUM floribus umbellatis.

Spergula foliis oppositis, pedunculis umbellatis. *Guett.*
stamp. 298. Dalib. paris. 134.

Holosteum caryophyllæum arvense. *Tabern. v. 233.*

Lychnis graminea hirsuta umbellifera. *Moris. hist. 2.*
p. 546. f. 5. t. 22. f. 46.

Caryophyllum arvensis umbellatus, folio glabro. *Baeh.*
pin. 210.

Caryophyllum arvensis *Baeh. hist. 3. p. 361.*
Habitat in Germaniæ, Galliæ arvis. ◎

MOLLUGO.

1. MOLLUGO foliis oppositis lanceolatis, ramis alter-^{oppositifolia.}
nis, pedunculis lateralibus confertis unifloris. *Fl. zeyl.*
52. *
- Habitat in Zeylona.*
2. MOLLUGO foliis quaternis obovatis, panicula *tetraphylia*,
dichotoma. *Hort. cliff.* 28. *Roy. lugdb.* 215. *Sanz.*
monsp. 164.
Anthyllis marina alsinefolia. *Baub. pin.* 282.
Anthyllis alsinefolia polygonoides major, *Barr. rar.* 103.
f. 534.
Habitat in Italæ, Narbonæ vineis. ◎
Huic petala 4, ovata, calyce breviora.
3. MOLLUGO foliis quinis obovatis æqualibus, flori-*pentaphylia*,
bus paniculatis. *Fl. zeyl.* 51.
Al sine ramosa procumbens quadrifolia, ad radicem po-
lyphylla. Burm. zeyl. 13. t. 8. f. 12.
Habitat in Zeylona.
4. MOLLUGO foliis verticillatis cuneiformibus acutis, *verticillata*,
caule subdiviso decumbente, pedunculis unifloris. *Hort*
spf. 24.
Mollugo foliis sæpius septenis lanceolatis. Gron. virg. 14
Al sine Spergula mariana, latiori folio, floribus ad nodos
pediculis curtis circa caulem insidentibus, calycibus
eleganter punctatis. Pluk. mant. 9. t. 332. f. 5.
5. Mollugo foliis septenis linearibus. *Hort. cliff.* 28.
Al sine procumbens, gallii facie, africana. Herm. lugdo-
19. t. 21. Ehret. pict. t. 6. f. 3.
Habitat in Africa, Virginia. ◎

MINUARTIA.

MINUARTIA Lœft.

*hispanite.**Habitat in Hispania.* ◎

Piantula *rigida*, *dura*, *tenax*, *sæpius simplex*. Folia op-
posita, setacea. Flores cymosi in capitulum quadratum,
arcte dichotomum, fastigiatum, caule *sæpius majus*, ses-
siles. Bractæ setaceæ, flore longiores, apice recto. Se-
mina quinque ad octo, subrotunda, reniformia. Color
plantaæ subfuscus. Lœft.

GUEREZIA.

1. GUEREZIA floribus capitatis. Lœft.

F §

hispanice.

Ha-

Habitat in Hispania. ◎

Antecedente minor, s: agilior. Capitulum florum obsoletius tetragonum, faciliter a caule discedens. Bracteæ scutaceæ, erectæ, apice extrosum bimaculæ, vestibus adhaerentes. Semen 1, compressum, subrotundum. Color plantæ albidus. Lœfl. Habitus antecedentis & stratura floris eadem; at Semina solitaria & plura constituant genera diversissima.

- canadenis.* 2. GUEREZIA floribus solitariis, caule dichotomo. Mollugo foliis oppositis, stipulis quaternis, caule dichotomo. Gron. virg. 14.

Habitat in Canada, Virginia. ◎

Radix fibrosa. Caulis strictus; dichotomus, spithameus teres, filiformis, erellus, Herba lini cathartici. Folia opposita, lanceolato-ovata, integerrima, adsparsa utrinque punctis fuscis. Stipulae geminæ utrinque, acutæ, membranacea. Flores solitarii, subpedunculati, parvi, virides, ex succulta dichotomia. Calyx quinquepartitus foliolis obtusiusculis, subfornicatis. Petala nulla. Stamina 3, Antheris flavis. Germen subrotundum. Styli tres Spontanea planta altior caule capillari; culta crassior & foliis minime punctatis.

LECHEA.

- minor.* 1. LECHEA foliis linear-lanceolatis, floribus paniculatis. Gen. nov. 1074. *
Capraria foliis integerimis, Gron. virg. 75.
Scoparia foliis tenuissimis in pluriimos & tenuissimos ramulos divisa & subdivisa. Raj. suppl. 132.
Habitat in Canadæ sylvis glareosis. ♀
- major* 2. LECHEA foliis ovati-lanceolatis, floribus lateralibus vagis. Gen. nov. 1074. f. 4. *
Habitat in Canadæ aridis.

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

LEUCADENDRON.

1. LEUCADENDRON foliis setaceis, flosculis disjunctis, racemosis.
Protea foliis setaceis, floribus racemosis. *Hort. cliff.* 496.
Habitat in Aethiopia. 5
2. LEUCADENDRON foliis subularis, ramis determinatis, floribus terminalibus.
Protea foliis linearibus simplicissimis, ramis determinatis, floribus terminalibus. *Roy. lugdb.* 186.
Habitat ad Caput b. spei. 5
Folia conferta. Rami ad determinata spatia conferti, exterum nulli, Calyces subrotundi, pubescentes.
3. LEUCADENDRON foliis subulatis, ramis sparvis, cancellatum.
floribus lateralibus.
Lepidocarpodendron foliis angustissimis gramineis, fructu cancellato, semine coronato. *Boerb. lugdb.* 2. p. 193. t. 193.
Habitat ad Caput b. spei. 5
4. LEUCADENDRON foliis lanceolatis, floribus oblongis, calycum squamis summis hirsutis, Lepidocarpodendron.
Protea foliis lanceolatis integerrimis glabris, calycinis superne villosis. *Roy. lugdb.* 186.
Lepidocarpodendron foliis angustis longioribus salignis, calycis squamis elegantissime ex flavo fusco albo nigro variegatis, florum plumis atropurpureis. *Boerb. lugdb.* 2. p. 188. t. 188.
Protea foliis lanceolatis integerrimis glabris, calycem succingentibus hirsutis. *Roy. prodr.* 188.
Lepidocarpodendron folio saligno viridi: nervo & margine flavo, cono longo superiore parte maxime clauso
Boerb. lugdb. 2. p. 189. t. 189.
Habitat ad Cap. b. spei. 5
5. LEUCADENDRON foliis lanceolatis, floribus oblongis, calycum squamis glabris. repens.

Pro-

Protea caule multiflora, calycibus oblongis, foliis lanceolatis integerrimis. Roy. lugdb. 185.

Lepidocarpodendron foliis angustis brevioribus salignis, calycis tiquamis elegantissime ex roseo aureo albo atrorubro variegatis, florum plumis albis. Boerb. lugdb. 2. p. 187.

β. *Leucadendron foliis longissimis obtuse trigonis, longitudine florem superantibus.* Wach. ultraj. 204.

Protea caule uniflora, calyce oblongo, foliis linearibus longissimis. Roy. lugdb. 185.

Lepidocarpodendron foliis longissimis angustissimis, fructum elegantissime ex rubro flavo & albo variegatum succingentibus, radice repente. Boerb. lugdb. 2. p. 190. t. 190.

Habitat ad Caput. b. spei. 5

abolutus.

6. *LEUCADENDRON* foliis lanceolatis, floribus subrotundis, caule suffrumentoso unifloro.

Leucadendron acaulon. Wach. ultraj. 204.

Protea caule uniflora, foliis lanceolatis. Roy. lugdb. 186.

Lepidocarpodendron acaulon, foliis paucis latis, nervo & marginibus rubris ornatis, fructu parvo. Boerb. lugdb. 2. p. 191. t. 191.

Habitat ad Caput b. spei. 3

Scalyronee-phalium.

7. *LEUCADENDRON* foliis lanceolatis, floribus subrotundis, caule fruticoso ramoso.

Lepidocarpodendron acaulon, ramis numerosis e terra excrescens, calyce floris immaturo extus ex rubro & flavo variegato, intus flavo. Boerb. lugdb. 2. p. 192. t. 192.

Habitat ad Caput b. spei, in ericetis mont. Tigridis. 3.

Cinaroides.

8. *LEUCADENDRON* foliis integris, floribus depressis, corollarum limbis cylindricis.

Leucadendron foliis subrotundis patentissimis petiolatis, foliolis calycinis carinatis. Wach. ultraj. 204.

Lepidocarpodendron folio subrotundo rigido, in pedunculo longo crasso, flore maximo purpureo. Bærb. lugdb. 2. p. 184. t. 184.

Cinaroides frutex, folio subrotundo rigido, e monte tabulari. Petiv. mus. 374.

β. *Protea foliis lanceolatis integerrimis, flore patente glabro, stylis longissimis.* Roy. lugdb. 186.

Habitat ad Caput b. ipei in humidis mont. Tabularis. 3.

Variat foliis cordatis, ovatis, lanceolatis.

9.

9. LEUCADENDRON foliis calloso-tricuspidatis in-
volventibus flores laterales. *cuneifolium.*
Leucadendron foliis cuneiformibus apice tridentato-cal-
losis, summis ultra fiorem protensis. *Wach. ultraj.* 203.
Protea foliis lanceolatis obtusis flores involventibus: a-
pice tridentato-callous. *Roy. lugdb.* 184.
Hypophyllocarpodendron foliis inferioribus apice trifido
rubro; superioribus penitus rubris glabris. *Borb. lugdb.*
2. p. 206. t. 206.
Habitat ad Cap. b. spei locis uliginosis. 5
10. LEUCADENDRON foliis calloso-tricuspidatis, ca-
lycibus turbinatis nudis. *Hypophyllo-*
carpodendr.
Leucadeudros africana f. Scolymocephalus folio angusti-
ori: apicibus tridentatis. *Pluk. alm.* 212.
Protea foliis lanceolato-linearibus apice tridentato-cal-
losis, capitulis aphyllis. *Roy. lugdb.* 184.
Protea foliis lanceolato-linearibus: apice tridentato-cal-
losis. *Hort. cliff.* 29.
Conocarpodendron folio rigidio angusto: apice tridenta-
to rubro, flore aurantio. *Borb. lugdb.* 2. p. 198. t.
198.
Habitat ad Cap. b. spei in campis sabulosis. 5
11. LEUCADENDRON foliis calloso-quinquedentatis. *Conocarpod.*
Leucadendron foliis obverse ovatis oblongis: in margine cal-
loso-timbriatis: ad apicem crenatis. *Wach. ultraj.* 203.
Leucadendron africana arbor argentea, summo folio cre-
nato. *Pluk. alm.* 212. t. 200. f. 2.
Protea foliis oblongo-ovatis apice quinquedentato-cal-
losis. *Roy. lugdb.* 184.
Conocarpodendron folio crasso nervo lanuginoso supra
crenato ibique limbo rubro, flore aureo, cono facile
deciduo. *Borb. lugdb.* 2. p. 196. t. 196.
Scolymocephalus africanus latifolius lanuginosus, foliis
in summitate crenatis. *Herm. afr.* 20. *Raj. dendr.* 9.
Habitat in Aethiopia. 5
12. LEUCADENDROS foliis setaceis semitrifidis. *cyanoides.*
Protea foliis linearibus ramosis. *Roy. lugdb.* 186.
Cyanus ethiopicus, rigidis capillaceis tenuissimis foliis
trifidis. *Pluk. mant.* 61. t. 315. f. 6.
Habitat ad Cap. b. spei. 5
13. LEUCADENDROS foliis setaceis multifidis. *Serraria.*
Abrotanoides arboreum monomatapense, floribus in ra-
morum cymis. *Pluk. mant.* 3. t. 329. f. 1.
Ser-

Serraria foliis tenuissime divisis, floribus rubris apetalis.

Burm. afr. 264. t. 99. f. 1.

B. *Serraria* foliis tenuissime divisis, capitulis tomentosis.

Burm. afr. 265. t. 99. f. 2.

γ. *Anethifolius frutex africanus*, flore sericeo. *Seb. thes.* 2.

t. 43. f. 6.

Habitat in Æthiopia. ♂

PROTEA.

argentea.

i. *PROTEA* foliis lanceolatis obliquis acutis sparsis, floralibus verticillatis.

Protea foliis lanceolatis integerrimis hirsutis nitidis.

Hort. cliff. 29.

Leucadendros africana arbor tota argentea sericea, foliis integris. *Pluk. alm.* 212. t. 200 f. 1.

Argyrodendros africana, foliis sericeis & argenteis. *Comm. hort.* 2. p. 51. *Raj. dendr.* 9.

Conocarpodendron foliis argenteis sericeis latissimis. *Boerh. lugdb.* 2. p. 195. t. 195.

Frutex æthiopicus conifer, foliis cneori lanuginosis salici æmulis. *Breyn. prodr.* 2. p. 49.

Arbor ferens folia argentea. *Zanyn. hist.* 24.

β. *Protea* foliis linear-lanceolatis integerimis acutis. *Hort. cliff.* 29.

Ptotea foliis linear-lanceolatis integerrimis: superioribus hirsutis nitidis. *Roy. lugdb.* 184.

Globularia africana fruticens, thymeleæ folio lanuginoso. *Tournef. inst.* 467.

Frutex æthiopicus conifer, foliis cneori salici æmulis. *Breyn. cent.* 21. t. 9.

γ. *Protea* foliis linear-lanceolatis glabris, capitulis squammosis: corona foliacea succinætis. *Roy. lugdb.* 185.

Conocarpodendron folio rigido crasso angusto, cono laeticis parvo *Boerh. lugdb.* 2. p. 197. t. 197.

δ. *Protea* foliis linear-lanceolatis glabris, capitulis ad basin squammosis. *Roy. lugdb.* 185.

Conocarpodendron folio angusto rigido brevi, cono parvo aureo: corona foliacca succinætæ. *Boerh. lugdb.* 2. p. 200.

ε. *Protea* foliis linear-lanceolatis glabris, caule inferne radicato. *Roy. lugdb.* 185.

Conocarpodendron folio tenuissimo angustissimo falligno, cono calyculato. *Boerh. lugdb.* 2. p. 203. t. 203.

ζ. *Protea* foliis lanceolatis acuminatis flexuosis, capitulis corona foliacea succinætis. *Roy. lugdb.* 185.

Ceno-

Conocarpodendron folio tenui angusto saligno, cono calyculato corona foliacea succinēto. *Boérh.* *Ingdb.* 2. p. 204. t. 204.

Habitat aa Cap. b. spei. ♂

Planta naturalis, in patria. argentea excellit fronde, inter arbores nitidissima omnium; at culta & captiva extra patriam exuit decus; variat dein etiam domi mille modis vere *Protea*.

2. PROTEA foliis ovatis obtusis imbricatis, capitulis glo- fusa-
bosis.

Conocarpodendron folio subrotundo brevissimo, capituli immaturi globosi parte inferiore fulva, media aurea, suprema viridi. *Boérh.* *Ingdb.* 2. p. 202. t. 202.

β. *Protea* foliis oblongo-ovatis lana obvolutis. *Roy.* *Ingdb.* 187.

γ. *Chrysanthemum* fruticosum, polygoni foliis, africanum, caulis scabris, flore minore. *Pluk. mant.* 47. t. 343. f. 9.

Habitat in *Aethiopia*. ♂

CEPHALANTHUS.

1. CEPHALANTHUS foliis oppositis. *Fl. zeyl.* 52. orientalis.
Platanocephalos citri foliis bijugis, capite majore. *Vail.* aet. 1722. p. 259.

Katu-Tiaca. *Rheed. mal.* 3. p. 29. t. 33.

Habitat in India & Africa. ♂

Capitula habet binas monopermas; *stipulas* quibus folia uniuntur, diversas gerit a sequenti. *B. jussieui*.

2. CEPHALANTHUS foliis oppositis ternisque. *Grov. occidentalis* virg. 15.

Cephalanthus foliis ternis. *Hort. cliff.* 73. *Roy.* *Ingdb.* 187.

Scabiosa dendroides americana, ternis foliis caulem ambientibus, floribus ochroleucis. *Pluk. atm.* 336. t. 77. t. 4.

Habitat in America septentrionali. ♂

Capsule nulla. *Semina* solitaria, longa pyramidata; basi attenuata, angustata, lanuginosa; unilocularia. *Receptaculum* commune globosum, villosum.

GLOBULARIA.

GLOBULARIA caule fruticoso, foliis lanceolatis tri- *Alypum*. dentatis integrisque. *Roy.* *Ingdb.* 190.

Aly-

Alypum monspeliensium, f. *Frutex terribilis*. *Bauh. hist.*
1. p. 598. *Niss. act. 1712.* p. 336. t. 18.

Thymelæa foliis acutis, *capitulo succiso*. *Bauh. pin*
473.

Habitat Monspelii & in regno Valentino. ♀

biflagellaris. 2. *GLOBULARIA* caule fruticoso, foliis radicalibus cuneiformibus retusis, caulinis lanceolatis.

Scabiosa biflagellaris f. *Globularia frutescens*, rigidis foliis ad radicem rotundioribus cordatis. *Pluk. alm.* 336. t. 58 f. 5. *Moris. hist.* 3. p. 51.

Habitat in Bishagarie sylvis. ♀

glabra. 3. *GLOBULARIA* caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis; caulinis lanceolatis. *Fl. suec.* 109. it. et. 65. * *Dalib. paris.* 43.

Globularia caule folioso, foliis ovatis integerrimis. *Hort. cliff.* 490. *Roy. lugdb.* 190. *Hall. helv.* 667.

Aphyllanthes anguillare. *Cam. hort.* 18. t. 7.

Bellis cærulea, caule folioso. *Bauh. pin.* 262.

β. *Bellis cærulea apula*. *Tabern. hist.* 2. p. 709.

γ. *Bellis cærulea monspeliaca*. *Tabern. hist.* 2. p. 709.

Habitat in Europæ apricis duris. ♀

spinosa. 4. *GLOBULARIA* foliis radicalibus crenato aculeatis, caulinis integerrimis mucronatis.

Globularia spinosa. *Tournef. inst.* 476

Bellis cærulea spinosa. *Bauh. pin.* 262.

Bellis spinosa, flore globoſo. *Bauh. prodr.* 121

Habitat in Granadæ montibus. ♀

cordifolia. 5. *GLOBULARIA* caule subnudo, foliis cuneiformibus tricuspidatis: intermedio minimo.

Globularia foliis radicalibus cuneiformibus retusis dentatis: denticulo intermedio minimo. *Hort. cliff.* 491. *Roy. Ingdb.* 190.

Scabiosa, bellidis folio, humili, caulenudo, radice repente, folio cordato. *Moris. hist.* 3. p. 50. f. 6. t. 15. f. ult.

Bellis cærulea montana frutescens. *Bauh. pin.* 262.

β. *Globularia alpina minima*, origani folio. *Tournef. inst.* 467.

Scabiosa, bellidis folio, pyrenaica minima. *Moris. hist.* 3. p. 51.

Habitat in Pannonia, Austria, Helvetia, Pyrenæis. ♀

6. GLOBULARIA caule nudo, foliis integerrimis lan- *nudicaulis*.
ceolatis.
Globularia pyrenaica, folio oblongo, caule nudo. *Tour-*
nef. inst. 467.
Scabiosa, bellidis folio, humiliis, caule nudo, radice non
repente. *Moris. hist. 3. p. 50. f. 6. t. 15. f. 4.*
Bellis caerulea, caule nudo. *Bauh. pin. 262. Raj. hist.*
381.
Habitat in Pyrenæis & Austriæ montibus. 2
Interdum unicum foliolum in scapo.
7. GLOBULARIA caule subnudo, capitulis alternis ses- *orientalis*.
filibus, foliis lanceolato-ovatis integris.
Globularia orientalis, floribus per caulem sparsis. *Tour-*
nef. cor. 35.
Habitat in Natolia. Bibrling. 2
Radix perennis. Folia obverse ovata, in petiolos desinen-
tia, acuta, integra, nuda, plurima. Caulis pedalis, her-
baceus, simplicissimus, Foliis minimis, lanceolatis, alter-
nis, remotis. Capitula in summitate caulis, 7 ad 10,
alterna, sessilia.

DIPSACUS.

1. DIPSACUS foliis sessilibus serratis. *fullonum.*
Dipsacus foliis connato-persoliatis, *Hort. apf. 25. ari-*
stis fructus rectis. Sauv. monsp. 156.
Dipsacus capitulis florum conicis. *Hort. cliff. 29. Gron.*
virg. 15. Roy. lugdb. 188. Dalib. paris. 44.
Dipsacus sylvestris aut Virga Pastoris major. *Bauh. pin.*
385.
Dipsacus sylvestris. *Dod. pempt. 735.*
β. Dipsacus sativus. *Bauh. pin. 385. aristis fructus hainatis.*
Sauv. monsp. 156.
Habitat in Gallia, Anglia, Italia. 3
2. DIPSACUS foliis connatis sinuatis *laciniatus.*
Dipsacus folio laciniato. *Bauh. pin. 385. Moris. hist.*
3. p. 158. f. 7, t. 36. f. 4.
Habitat in Alsacia, Azow. 8
3. DIPSACUS foliis petiolatis appendiculatis. *Hort. apf. pilosus.*
25. Roy. lugdb. 188. Dalib. paris. 44.
Dipsacus capitulis florum suoglobosis. *Hort. cliff. 30.*
Roy. lugdb. 188.
Dipsacus sylvestris, capitulo minore s. Virga Pastoris
minor. *Bauh. pin. 385.*

G

Dip-

Dipsacus tertius. *Dod. pempt.* 735.
Habitat in Anglia, Gallia. ♂

SCABIOSA.

* *Corollulis quadrifidis.*

- alpina.* 1. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, floribus cernuis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis serratis. *Hort. cliff.* 30. *Hort. upf.* 26. *Roy. lugdb.* 188.
Scabiosa alpina, foliis centaurii majoris. *Baub. pin.* 270.
Scabiosa alpina centauroides. *Besl. cyst. ast.* 122.
Habitat in alpibus Helveticis, Italicis. ♀
- transsylvania-*
nica. 2. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus calyce brevieribus, foliis radicalibus lyratis, caulinis pinnatifidis. *Roy. lugdb.* 189. *Hort. upf.* 26. *
Scabiosa altissima annua, foliis agriponiæ nonnihil similibus. *Herm. lugdb.* 539. *Moris. hist.* 3. p. 46. f. 6.
t. 13. f. 13
Habitat in Transylvania. ☺
- leucantha.* 3. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, squamis calycinis ovatis obtusis, foliis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 30. *Roy. lugdb.* 188. *Sauv. meth.* 241.
Scabiosa flore globoſo niveo *Baub. pin.* 207.
Scabiosa fruticans angustifolia alba. *Baub. pin.* 270.
- spuria.* β. Scabiosa corollulis quadrifidis æqualibus, squamis calycinis ovatis, foliis lanceolatis serratis.
Scabiosa africana frutescens, foliis rigidis splendentibus & serratis, flore albicante. *Comm. hort.* 2. p. 185.
t. 93.
Habitat in collibus Narbonæ, B. in Africæ. ♀
Diffr. B. ab antecedente tantum foliis indivisis.
- Succisa. 4. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.* 30. *Fl. suec.* 112. *Mat. med.* 41. *Roy. lugdb.* 188. *Dalib. paris.* 45.
Succisa glabra. *Baub. pin.* 269.
Succisa f. Morsus diaboli. *Cam. epit.* 397.
β. *Succisa hirsuta.* *Baub. pin.* 269.
Habitat in Europæ pascuis humidiusculis. ♀
- Syriaca. 5. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, calycibus aristatis, caule dichotomo, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 30. *Roy. lugdb.* 188.

Sca-

Scabiosa fruticans latifolia alba. Bauh. pin. 269. *Moris.*
bist. 3. p. 46. f. 6. t. 14. f. 14,

β. *Scabiosa perfoliæ folio, flore amethystino.* Vaill. act. 1722.
p. 238.

Habitat in Syria. ◎

6. SCABIOSA corollis quadrifidis, foliis omnibus lanceo-integrifolia,
olatis serratis. Sauv. monsp. 156.

Scabiosa annua integrifolia s. foliis bellidis. Magn. monsp.
231. *

Habitat monspelii. ◎

Canalis non hispidus; Rami patuli; Calycis squamae lan-
ceolatae, corollis breviores; Corolla rubra. Sauv.

7. SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus, caule tatarica,
hispidi, foliis lanceolatis pinnatifidis: lobis imbricatis.

Scabiosa florculis quadrifidis, foliis pinnatifidis: lacinias
lateralibus erectiunculis. act. upf. 1744. p. 11. t. 1. *

Scabiosa altissima segetum. Triumf. Raj. suppl. 236?

Habitat in Tataria. ♂

8. SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus, caule arvensis,
hispidi. Hort. cliff. 31. Fl. suec. 110. Mat. med. 40.

Roy. lugdb. 188. Dalib. paris. 44.

Scabiosa major hirsuta. Bauh. pin. 269.

Scabiosa arvensis. Tabern. bist. 442,

Scabiosa major communior hirsuta, folio non laciniato.
Bauh. bist. 3. p. 2.

Habitat in Europa solo glareoso, juxta segetes inque pra-
tis. ♀

9. SCABIOSA corollulis trifidis, foliis caulinis tripinna-triandra,
tis filiformibus. Sauv. monsp. 268. †

Scabiosa capitulo globoso, foliis in tenuissimas lacinias
divisis. Bauh. pin. 271. Magn. monsp. 231.

Habitat Monspelii.

* * *Corollulis quinquefidis.*

10. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis radicalibus columbaria,
ovatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. Hort. cliff. 31.

*Fl. suec. 111. It. gotl. 216. 228. * Roy. lugdb. 139.*
Dalib. paris. 45. Sauv. monsp. 242.

Scabiosa, capitulo globoſo, major. Bauh. pin. 270.

Scabiosa minor. Cam. epit. 711.

β. *Scabiosa, capitulo globoſo, minor.* Bauh. pin. 270.

Habitat in Europæ montosis, siccioribus.

stellata.

11. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis dissectis,
receptaculis florum subrotundis. *Hort. cliff.* 31. *
Hort. apf. 26. *Roy. lugdb.* 189.
Scabiosa stellata, folio laciniato, major. *Bauh. pin.* 271.
Scabiosa major hispanica. *Clus. hist.* 2. p. 1.
β. Scabiosa stellata, folio laciniato, minor. *Bauh. pin.* 271.
*Habitat in Hispania, præsertim in agro Granatensi ad
versuras.* ◎

stropurpurea

12. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis dissectis,
receptaculis florum subulatis. *Hort. cliff.* 31. *Hort.*
apf. 26.
Scabiosa peregrina rubra, capite oblongo. *Bauh. pin.* 270.
Scabiosa VI. Indica. *Clus. hist.* 2. p. 3.
Habitat in India? ◎

argentea.

13. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis pinnatis:
laciniis lanceolatis, pedunculis nudis lævibus longissi-
mis. *Roy. lugdb.* 190.
Scabiosa orientalis argentea, foliis inferioribus incisis.
Tournef. cor. 34.
Asterocephalus perennis argenteus laciniatus, caule te-
nui eburneo. *Vaill. act.* 1722. p. 181.
Habitat in Oriente. ✕

africana.

14. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis incisis, cau-
le fruticoso. *Hort. cliff.* 31. *Roy. lugdb.* 189.
Scabiosa africana frutescens. *Herm. parad.* 219. t. 219.
β. Scabiosa africana frutescens maxima, foliis rugosis &
crenatis, minor. *Herm. parad.* 220.
γ. Scabiosa africana frutescens maxima, foliis tenuissime
incisis. *Boerb. lugdb.* 1. p. 128.
δ. Scabiosa minor æthiopica frutescens, foliis lanuginosis
Breyn. ic 33. t. 26.
Habitat in Africa.

cretica.

15. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis lanceola-
tis sub-integerrimis. *Hort. cliff.* 31. *Roy. lugdb.* 169.
Scabiosa stellata, folio non dissecto. *Bauh. pin.* 271.
Morif. hist. 3. f. 6. t. 15. f. 31.
β. Scabiosa cretica frutescens, auriculæ ursi folio. *Tour-
nef. cor.* 34.
Asterocephalus frutescens, leucoji folio longiore angu-
sto. *Vail. act.* 1722. p. 247.
Habitat in Creta & adjacentibus. ✕

Pterocephala

16. SCABIOSA corollulis quinquefidis, caule procum-
bente

bente fruticosa, foliis laciniatis hirsutis, pappo plumoso.

Pterocephalus perennis humilis laciniatus & incanus.

Vaill. act. 1722. p. 184.

Habitat in Græcia?

Caulis vix e terra prominens Scapis brevissimis, unifloris.

17. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, foliis *ochroleucis*, bipinnatis linearibus.

Scabiosa corollulis quadrifidis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis superne incisis. Sauv. monsp. 241.

Scabiosa multifido folio, flore flavescente. Baub. pin. 270. Moris. hist. 3. p. 48. f. 6. t. 13. f. 23.

Scabiosa VII. Clus. hist. 2. p. 3.

Habitat in Germaniæ pratis siccis. 2

18. SCABIOSA corollulis quinquefidis, caule herbaceo, *papposa*, calycibus foliosis florem superantibus, calyce plumoso. *Roy. lugdb. 189.*

Scabiosa cretica, capitulo pappos mentiente. Tournef. inst. 34. Boerh. lugdb. 1. p. 130.

Habitat in Creta.

KNAUTIA.

1. KNAUTIA. *Hort. cliff. 32. Hort. upf. 27. Roy. orientalis. lugdb. 190.*

Lychni Scabiosa, flore rubro, annua. Boerh. lugdb. 1. p. 131.

Scabiosa orientalis, caryophylli flore. Vaill. act. 1722. p. 241.

Habitat in Oriente. ①

Conferatur Scabiosa cærulea virginiana, flosculis tetrapetalis caryophyllorum more patulis & laciniatis, Pluk. alm. 335.

HEDYOTIS.

1. HEDYOTIS foliis lanceolatis petiolatis, corymbis terminalibus involucratis. *Fl. zeyl. 63. * Aman. acad. 1. p. 392.*

Valerianella foliis nervosis acutis, flosculis in caulum summo quasi involucratis. Burm. zeyl. 227. t. 107.

Habitat in Zeylona. ②

2. HEDYOTIS foliis lanceolato-ovatis, floribus verticillatis. *Fl. zeyl. 64. * Mat. med. 47. Aman. acad. 1. p. 391.*

Valerianella palustris, foliis nervosis oblongis, flosculis ad caulum nodos inter foliorum sinus collectis. *Burm.* zeyl. 227. t. 108. f. 1.

Muriguti. *Rheea*. mal. 10. p. 63. t. 32.
Habitat in Zeylona. 2

herbacea.

3. *HEDYOTIS* foliis linear-lanceolatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis geminis. *Fl. zeyl.* 65 *
Habitat in Zeylona.

SPERMACOCE.

tenuior.

1. *SPERMACOCE* glabra, staminibus inclusis.
Spermacoce verticillata tenuioribus. *Dill. elth.* 370. t. 227. f. 359.
Spermacoce. *Roy. lugdb.* 258.
Anonymos americana, foliis parietariæ scabris, floribus albis ad foliorum ortum vix conspicuis. *Pluk. alm.* 33. t. 136. f. 4.
Habitat in Carolina. ⊖

verticillata.

2. *SPERMACOCE* glabra, staminibus exstantibus.
Spermacoce verticillata globosis. *Dill. elth.* 369. t. 276. f. 358. *Hort. cliff.* 33.
Scabiosa jamaicensis hyslopifolia. *Pluk. alm.* 326. t. 58. f. 6?
Pulegium fruticosum erectum, verticillis densissimis.
Sloan. jam. 64. hist. 1. p. 170?
Habitat in Jamaica. Africa.

hispida.

3. *SPERMACOCE* hispida, foliis oppositis obovatis. *Fl. zeyl.* 62. *
Galeopsis zeylanica, folio oblongo, flore albo. *Burm.* zeyl. 163. t. 20. f. 3.
Habitat in Zeylona, 2

SHERARDIA.

arvensis.

1. *SHERARDIA* foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus.
Sherardia. *Dill. gen.* 96. *Hort. cliff.* 33. *Fl. suec.* 113.
Roy. lugdb. 257. *Hall. belv.* 456. *Dalib. paris.* 46.
Rubeola arvensis repens caerulea. *Bauh. pin.* 334. prod. 145.
Rubia parva, flore caeruleo se spargens. *Bauh. hist.* 2. p. 719.
Habitat in arvis Scaniæ, Germaniæ, Angliæ. ⊖

2. *SHE-*

2. SHERARDIA foliis floralibus binis oppositis binis floribus.
Asperula verticillata luteola. Baub. pin. 334.
Asperula verticillata muralis minima. Colum. ecphr.
 302. t. 300.
Habitat in Italia. ◎
3. SHERARDIA foliis quaternis æqualibus, caule fruticoso.
Habitat in insula Adscensionis. Osbeck. 5
Frutex torosus, inæqualis, scaber, Ramis obtuse tetragonis. Folia quaterna, angusto-lanceolata, integerrima, glabra, marginibus revoluta, articulis ramorum paulo longiora, interstincta Stipulis brevissimis, subulatis. Flores oppositi, sessiles, axillares. Calyx tetraphyllus, germini innatus, persistens foliolis lanceolatis. Corolla infundibuliformis, quadrifida, alba, longitudine germinis. Antheræ quatuor, oblongæ. Pericarpium dicoccum. Clinopodium africanum procumbens psyllii foliis. Pluk. mont. 51. t. 344. f. 3. denta kirsutæ & dentibus foliorum, nostram refert.

ASPERULA.

1. ASPERULA foliis oboconis lanceolatis, torum fasci-odorata, culis pedunculatis. Fl. suec. 114. Mat. med. 45. Dalib. paris. 46.
Asperula foliis pluribus, floribus pedunculo elevatis. Hort. cliff. 33. Roy. lugdb. 255.
Asperula 1. Rubeola montana odorata, Baub. pin. 334.
Habitat in Sveciæ, Germaniæ umbrofis. ✘
2. ASPERULA foliis senis, floribus sessilibus aggregatis arvensis, terminalibus. Hort. upf. 27.
Asperula foliis pluribus, floribus sessilibus. Hort. cliff. 33. Roy. lugdb. 255. Dalib. paris. 47.
Asperula cærulea arvensis Baub. pin. 334.
Asperula cærulea. Dod. pent. 355.
Habitat in Gallia, Flandria, Germania, Anglia. ◎
3. ASPERULA foliis quaternis ovato-lanceolatis, floribus fasciculatis terminalibus. taurina.
Asperula foliis quaternis ovato-lanceolatis, ramis alternis. Hort. cliff. 33. Virid. cliff. 9. Roy. lugdb. 255. Hell. helv. 457. Savv. monsp. 164.
Rubia quadrifolia & latifolia lœvis. Baub. pin. 334. Moris. hist. 3. f. 9. 3. 21. f. 1.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Italie, ✘

antioria.

4. *ASPERULA* foliis linearibus: inferioribus senis, intermediis quaternis, caule flaccido, floribus plerisque trifidis.

Asperula foliis quaternis linearibus, floribus saepius trifidis. *Fl. suec.* 115. *Sauv. monsp.* 163.

Rubeola quadrifolia, caule ramoso flaccido, floribus trifidis. *Hall. rupp.* 8.

Gallium album tripetalum. *Moris. praelud.* 267. *Dalib. paris.* 49.

Gallium album 3. *Tabern. hist.* 433. t. 733. f. 1. *bona.*
Habitat in Sueciae, Tyringiae, Galliae, Sibiriae collibus aridis saxosis. 2

gyreanaica.

5. *ASPERULA* foliis quaternis lanceolato-linearibus caule erecto, floribus saepius trifidis.

Rubia cynanchica saxatilis. *Bauh. pin.* 333. *prod.* 146. *Eur. XI.* 9.

Habitat in Pyrenaeis versus Hispaniam & prope Valentiam Gallorum. 2

Caules erecti, spithamei, quadrangulares. Folia omnia in caule quaterna, linearia, carinata, acuta, leria; inferiora etiam quaterna, sed breviora lanceolata obtusiora, folia summa & floralia opposita, latiora, acuta, lanceolata. Flores tubulosi, rubri, saepius trifidi. 2

cynanchica.

6. *ASPERULA* foliis inferioribus senis, intermediis quaternis subulatis triquetris, floribus quadrifidis.

Asperula foliis linearibus quaternis, summis oppositis. *Roy. lugdb.* 255. *Sauv. monsp.* 163.

Rubeola foliis quaternis, seminibus glabris, floribus umbellatis. *Hall. helv.* 458.

Rubia cynanchica. *Bauh. pin.* 333. *Bauh. hist.* 3. p. 723. *Gallium montanum* latifolium cruciatum. *Cel. ecphr.* 1. p. 296. t. 297. f. 1.

Gallium album minus. *Tabern. hist.* 433. t. 433. f. 2.

Habitat in Europae pratis aridis. 2

DIODIA.

virginiana.

1. *DIODIA*. *Hort. cliff.* 493. * *Gron. virg.* 71.
Habitat in Virginie aquosis.

KNOXIA.

zeylanica.

1. *KNOXIA*. *Fl. zeyl.* 400.

Dentellaria zeylanica, flore minimo, antirrhini folio. *Raj. suppl.* 246.

Habitat in Zeylona supra truncos arborum putridarum. 1. HOU-

HOUSTONIA.

1. HOUSTONIA foliis radicalibus ovatis, caule com- *ca nta*.
posito, floribus solitariis. *Gren. virg.* 15.
Houstonia. Hort. cliff. 35.
Rubia parva virginiana, foliis ad genicula binis, flore
cæruleo fistuloso. *Pluk. alm.* 324. *mant.* 164.
Paronychia facie planta tetrapetaloides virginiana, flore
cæruleo. *Moris. hist.* 3. p. 614. f. 15. t. 4. f. 1.
- β. Chamejasme inodora, alines facie, dispermos tetrapeta-
loides, quadrato caule, virginiana. *Pluk. alm.* 97.
mant. 45. t. 97. f. 9. *Raj. suppl.* 502.
Habitat in Virginia.
2. HOUSTONIA foliis ovato-lanceolatis, corymbris purpureis
terminalibus. *Gron. virg.* 15
Rubia mariana, alines majoris folio ad caulem binato,
flore purpuro-tubente. *Pluk. mant.* 164. *Raj. suppl.*
262.
Habitat in Virginia.

GALIUM.

** Fructu glabro.*

1. GALIUM foliis quaternis lanceolato-ovatis æqualibus *rubioides*,
subtus scabris, caule erecto fructibus glabris.
Habitat in Europa australi. D. Bæck.
*Facies Galii borealis, sed folia duplo latiora, nervis
subtus scabra, Caulis firmus eretus. Panicula bre-
vis, congiomerata. Semina levia.*
2. GALIUM foliis quaternis obovatis inæqualibus, cau- *palustre*,
libus diffusi. *Fl. suec.* 119.
Gallum caulis diffusis, foliis quaternis verticillatis. Fl.
lapp. 52.
Gallium palustre album. Baub. pin. 335.
Habitat in Europe rivulis limosis. L.
3. GALIUM foliis quaternis linearibus obtusis, ramis *bermudense*,
rimosissimis.
Aparine foliis quaternis obtutis levibus. Gron. virg. 16.
Rubia tetraphylla glabra, latiore folio, bermudensis,
feminibus binis atropurpureis. *Pluk. alm.* 324. t. 248.
Raj. suppl. 261.
Habitat in Virginia.
4. GALIUM foliis quaternis linearibus, caule procum- *tripidum*,
bente scabro, corollis trifidis.

Habitat in Canada. Kalm.

Caulis procumbens, ramosissimus, Ramis ternis quaternis, divaricatis. Folia linearia, obtusa, latiuscula, glabra, subtus parum scabra. Pedunculi septemterni, tenuissimi, foliorum longitudine, uniflori; Flores minimi, albi, tripartiti. Stamina tria; Fructus didymus, globosus, levis.

tritectorium. 5. GALIUM foliis linearibus: caulinis senis; ramorum quaternis, caule flaccido, pedunculis subbifloris, fructibus glabris.

Habitat in America septentrionali. Kalm.

uliginosum. 6. GALIUM foliis senis lanceolatis retrosum ferrato-acaleatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus.

Aparine foliis linear-lanceolatis acuminatis rigidis, corollis fructu majoribus, Roy. lugdb. 255. Fl. svec. 121.

Aparine minor palustris parisensis, flore albo. Tournef. inst. 114. Vail. paris. 14. Fl. lapp. 58.

Habitat in Europæ pascuis aquosis sterilibus. 7.

*spurcum. 7. GALIUM foliis senis lanceolatis carinatis scabris retrosum aculeatis, geniculis simplicibus, fructibus glabris. Hort. upf. 28. **

Aparine semine laeviore. Raj. bist. 484.

Aparine foliis crebrioribus & semine laeviore. Moris. bist. 3. p. 332.

Habitat in Europæ cultis. 8.

saxatile. 8. GALIUM foliis senis obovatis obtusis, caule ramosissimo procumbente.

Galium caule ramosissimo, foliis quinis obverse ovatis. Hort. cliff. 34. Roy. lugdb. 257.

Gallium saxatile supinum, molliore folio. Juss. act. 1714. p. 492. t. 15.

Habitat in Hispaniæ maritimis lapidosis.

minutum. 9. GALIUM foliis octonis lanceolatis mucronatis ferrato-aculeatis glabris incurvis.

*Galium foliis senis cuneiformi-lanceolatis mucronatis glabris. Hort. upf. 28. **

Gallium saxatile minimum supinum & pumilum, flore luteo. Tournef. inst. 1152.

Habitat in imperio Ruthenico. 10.

pubescens. 10. GALIUM foliis octonis hispidis linearibus acuminatis subimbricatis, pedunculis dichotomis.

Rubeola

Rubeola saxatilis. Bauh. pin. 334. prodr. 145.

Habitat in montibus Galloprovinciæ.

Caules numerosi, digitales, angulati; Folia verticillata foliolis 8. f. 6, lanceolato-linearibus vel linearibus, acutis, uti caulis undique pilis patentibus hispida. Rami rariores, alterni; Foliorum verticilli: sèpe ita censerti, ut folia imbricatim digesta conspiciantur. Panicula rarior, fere terminalis ex pedunculis bis dichotomis.

11. *GALIUM* foliis octonis linearibus sulcatis, ramis verum, floriferis brevibus. Hort. cliff. 34. Fl. svec. 116, Mat. med. 46. Roy. lugdb. 256.

Galium caule erecto, foliis plurimis verticillatis linearibus, Fl. lapp. 61.

Gallium luteum. Bauh. pin. 335.

Habitat in Europa frequens. ♀

12. *GALIUM* foliis octonis ovatis linearibus subserratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus.

Galium foliis pluribus acutis, caule flaccido, ramis patentissimis. Hort. cliff. 34. Roy. lugdb. 257. Fl. svec. 117.

Mollugo montana latifolia ramosa. Bauh. pin. 334.

Rubia sylvestris laevis. Bauh. pin. 333.

Mollugo belgarum. Loh. ic. 802.

Habitat in Europa mediterranea. ♀

13. *GALIUM* foliis verticillatis linearibus, pedunculis dichotomis summo caule floriferis. Roy. lugdb. 256. Hort. upf. 27. Sauv. monsp. 161.

Gallium saxatile, glauco folio. Bocc. mus. 2. p. 172. t. 116.

Rubia montana angustifolia. Bauh. pin. 333. prodr. 145,

Habitat in Tataria, Helvetia, Austria, Monspelii. ♀

14. *GALIUM* foliis verticillatis linearis-setaceis, pedunculis folio longioribus. Hort. cliff. 34. Roy. lugdb. 256.

Gallium nigropurpureum montanum tenuifolium. Col. ecphr. 1. p. 298. Bauh. pin. 335.

Habitat in Italia.

15. *GALIUM* foliis verticillatis linearibus, pedunculis brevissimis. Hort. cliff. 34. Roy. lugdb. 256.

Gallium rubrum. Bauh. pin. 335. Moris. hist. 3. p. 332.

Gallium

Gallium rubro flore. *Clus. hist. 2. p. 175.*
Habitat in Italia.

* *Fruētu hispido.*

- terrestris.* 16. GALIUM foliis quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule erecto, seminibus hispidis. *Fl. lapp. 60. Fl. svec. 118. Hort. cliff. 64. Roy. lugdb. 257 Hall. helv. 450.*
Rubia pratensis lœvis, acuto folio. Baub. pin. 333. prair. 145.
Habitat in Europæ borealis pratis. ♀
- sebifera.* 17. GALIUM foliis quaternis ovatis aculeato-ciliatis, seminibus hispidis.
Rubia semine dupli hispido, latis & hirsutis foliis. Bocconi. Moris. hist. 3. p. 329. f. 9. t. 21. f. 5.
Habitat in Europa australi. ♀
- rotundifolia.* 18. GALIUM foliis quaternis ovatis lœvibus obtusis, panicula dichotoma, seminibus hispidis.
Rubia quadrifolia s. rotundifolia lœvis. Baub. pin. 334. prodr. 145.
Rubia quadrifolia, semine dupli hispido. Baub. hist. 3. p. 718. Moris. hist. 3. f. 9. t. 21. f. 4.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Styriae. ♀
- Aparina.* 19. GALIUM foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructu hispido.
Aparine foliis lanceolatis acuminatis scaberrimis, corollis fructu minoribus. Roy. lugdb. 455. Fl. svec. 120.
Aparine foliis lanceolatis. Hort. cliff. 34.
Aparine vulgaris. Baub. pin. 334.
Habitat in Europæ cultis & ruderatis. ⊙
- parisiense.* 20. GALIUM foliis verticillatis linearibus, pedunculis bifidis, fructibus hispidis.
Aparine foliis linear-lanceolatis acuminatis flaccidis, corollis fructu minoribus. Roy. lugdb. 255.
Aparine minima. Raj. angl. 3. p. 225. t. 9. f. 1.
Gallium parisiense tenuisolum, flore atropurpureo. Tournef. inst. 664.
Habitat in Anglia, Gallia. ♀

CRUCIANELLA.

- angustifolia.* 1. CRUCIANELLA erecta, foliis senis linearibus. *Hort. upi. 27. * Sauv. monsp. 164.*

Cru-

Crucianella foliis linearibus. *Hort. cliff.* 32.

Rubia angustifolia spicata. *Baub. pin.* 334 *prod*, 145.

Habitat Monspelii. ♂

2. CRUCIANELLA procumbens, foliis quaternis lanceolatis, floribus spicatis. *Hort. upf.* 27. * *Sauv. monsp.*

164

Crucianella foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 33.

Rubia latifolia spicata. *Baub. pin.* 334.

Habitat, in Creta & Monspelii. ♂

3. CRUCIANELLA procumbens, foliis quaternis, floribus maritima, ridis subverticillatis.

Crucianella erecta, foliis quaternis, corolla ad solem con-

nivente. *Sauv. monsp.* 164.

Rubia maritima. *Baub. pin.* 334. *Dod. pempt.* 357.

Rubia f. *Aparine* spicata cretensis. *Clus. bist.* 2. p. 176

Habitat in Creta & Monspelii. D. *Sauvages*.

4. CRUCIANELLA repens, foliis senis, spicis longis. *monspeliaca*,

Sauv. monsp. 225.

Rubia spicata repens. *Magn. monsp.* 225.

Habitat Monspelii.

RUBIA.

1. RUBIA foliis senis. *Hort. cliff.* 35. *Hort. upf.* 28. *tinctorum*,

Mat. med. 44. *Roy. lugdb.* 254.

Rubia perennis, foliis tæpius quinque.

Rubia tylvestris aspera. *Baub. pin.* 33.

- β. RUBIA tinctorum sativa. *Baub. pin.* 33.

Habitat Monspelii & ad Danubium. ♀

2. RUBIA foliis quaternis. *Roy. lugdb.* 254.

Rubia quadrifolia asperima lucida peregrina. *Herm. lugdb.* *peregrina*.

523.

Habitat - - - - 2

SIPHONANTHUS.

1. SIPHONANTHUS salicis folio, flore flavescente. *indica*.

Amm. ruth. 1736. p. 214. t. 15.

Habitat in India. 5

Folia alterna, lanceolata; Pedunculi saepe e regione op-

positi folii, umbellati.

CATESBÆA.

1. CATESBÆA

spinosa.

Frutex

*Frutex spinosus, buxi foliis plurimis simul nascentibus,
flore tetrapetaloidē pendulo sordide flavo tubo longissimo,
fructu ovali croceo semina parva continente.*

Catesb. carol. 2. p. 100. t. 100.

Habitat in Providentia. 5

IXORA.

coccinea. 1. *IXORA foliis ovalibus semiamplexicaulibus. Fl. zeyl.
22.*

*Jasminum flore tetrapetalo, Ixora linnæi, Schetti horti
malab. Burm. zeyl. 125. t. 57.*

*Jasminum indicum, lauri folio, inodorum umbellatum,
floribus coccineis. Pluk. alm. 196. t. 59. f. 9.
Schetti. Rheed. mal. 2. p. 17. t. 13.*

Habitat in India. 5

viba. 2. *IXORA foliis ovato-lanceolatis.*

*Jasminum indicum, lauri folio, inodorum umbellatum,
floribus albicantibus & Schetti album. Pluk. alm. 196.
t. 109. f. 2.*

Bemschetti. Rheed. mal. 2. p. 19. t. 14.

Habitat in India. 6

SCURRULA.

parasitica. 1. *SCURRULA.*

*Viscum vitici innascentis. Camell. luz. 3. n. 36. Pet.
gaz. t. 63. f. 8.*

Habitat in China. 5

*Arbor. Folia opposita, petiolata, ovata, integerrima, al-
tero latere paulo latiora, glabra. Flores axillares, 3
ad 6, propriis pedicellis. Germina inferne attenuata.*

PAVETTA.

Indica. 1. *PAVETTA. Fl. zeyl. 56. * Amœn. acad. 1. p. 388.*

*Arbor malabariensium, fructu lentisci. Baub. pin 399.
Pavate. Raj. hist. 1581.*

Pavetta f. Malleomorthe. Rheed. mal. 5. p. 19. t. 10.

Habitat in India. 5

*Corymbi trichotomi, fastigiati, pedunculo filiformi longo
insidentes. Stigma oblongum, bifidum.*

AVICENNIA.

officinalis. 1. *AVICENNIA. Fl. zeyl 57. Mat. med. 42.*

Anacardium. Baub. pin. 511.

Dopata

Ocpara. *Rheed. mal.* 4. p. 95. t. 45.
Habitat in India. ♂

MITCHELLA.

1. MITCHELLA. *Gen. nov.* 1083.

Chamædaphne, Mitch. gen. 27. *reperiens*

Lonicera foliis subovatis, germine bifloro, corollis interne hirsutis, stylo bifido, Gron. virg. 22.

Syringa baccifera, myrti subrotundis foliis, floribus albis gemellis. Pluk. amalb. 198. t. 444. f. 2. *Catesb. corol.* 1. p. 20. t. 20.

Baccifera mariana, clematis daphnoides minori folio. Pet. gaz. 1. t. 1. f. 13.

Habitat in Carolina, Terra Mariana, Virginia. ♂

CALLICARPA.

1. CALLICARPA. *Aet. upf.* 1741. p. 80.

americana,

Sphondylococcus. Mitch. E. N. C. 8. p. 218.

Anonymos baccifera verticillata, folio molli & incano, ex America. Pluk. alm. 33. t. 136. f. 3.

Frutex baccifer verticillatus, foliis scabris latis dentatis & conjugatis. Catesb. carol. 2. p. 47. t. 47.

Frutex foliis amplis subrotundis acuminatis ex adverso binis, viminibus lentis insirmis quasi leni canitie testis. Gron. virg. 138.

Habitat in Virginia, Carolina. ♂

POLYPRENUM.

1. POLYPRENUM. *Aet. upf.* 1741. p. 78.

procumbens,

Linum carolinianum. Pet. gaz. 9. t. 5. f. 6.

Habitat in Carolina, Virginia. ⊙

PENÆA.

1. PENÆA foliis ovatis planis.

Tithymali myrsinitis specie arbuscula æthiopica, subrotundis foliis e stœchadis arabicæ squamato capitulo duro lacrymam fundentis. Pluk. mant. 183. t. 44.

Habitat in Æthiopia. ♂

Folia obtusifolia; Corolla obtusa, Calyx intermedio flori nullus; Stylus magis subulatus quam in reliquis.

2. PENÆA foliis cordatis acuminatis. *Mat. med.* 48. *micronota.*

Penæa foliis ovatis acuminatis. Roy. lugdb. 399.

Penæa. Hort. cliff. 37.

Erica

Erica africana, unedonis flore ample, foliis cordiformibus in acumen desinentibus. *Raj. dendr.* 97.

Tithymali myrsinitis specie arbuscula æthiopica, flore parvo e lata basi in acutissimum mucronem subito desinente, capitulis origati. *Plak. mant.* 183.

Habitat in Æthiopia. ♂

quamosa. 3. *PENÆA* foliis rhombæo-cuneiformibus carnosis.

Habitat in Æthiopia

*Hæc reliquias minor; Corolla (ut in præcedente) acuta.
Folia parte dimidia superiore patula.*

BLÆRIA.

ericoides. 1. *BLÆRIA* *Hort. cliff.* 49.

Erica carneæ, promontorii bonæ spei, foliis & floribus villosis. *Pet. gaz.* t. 2. f. 10.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♂

BUDDLEJA.

americana. 1. *BUDDLEJA*. *Amm. herb.* 577. *Hort. cliff.* 35.

Ophioxylon americanum, foliis oblongis mucronatis leviter serratis bardauæ instar subtus lanuginosiss. *Plak. alm.* 270. t. 210. f. 1.

Verbasci folio minore arbor, floribus spicatis luteis, seminibus singulis oblongis in singulis vaseulis siccis.

Sloan. jam. 139. *hist.* 2. p. 29. f. 1. *Raj. dendr.* 97.

Habitat in Caribæis ad ripas & torrentes.

EXACUM.

affile. 1. *EXACUM* floribus sessilibus. *Fl. zeyl.* 25. *

Exacum. Amœn. acad. 1. p. 391. *

Planta annua, facie centaurii æthiopici. Plak. pbyt. 275. f. 3.

Habitat in Asia & Africa.

pedunculat. 2. *EXACUM* floribus pedunculatis.

Centaurium minus hypericoides, flore luteo, lini capitulis. *Plak. mant.* 43. t. 343. f. 3

Habitat in India. ☺

PLANTAGO.

* *Scapo nudo.*

major. 1. *PLANTAGO* foliis ovatis glabris, nudo scapo tereti, spica flosculis imbricatis.

Plantago foliis ovatis glabris. *Hort. cliff.* 43. *Fl. suec.*

122. *Mat. med.* 49. *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 470.

Dalib. paris. 50.

Plantago scapo spicato, foliis ovatis. Fl. lapp. 62.

Plantago latifolia sinuata. Bauh. pin. 189.

Plantago major. Cam. epit. 261.

β . *Plantago latifolia glabra minor. Bauh. pin* 189.

γ . *Plantago latifolia rosea, floribus quasi in spica dispositis. Bauh. pin.* 189. *Hort. upf.* 29.

δ . *Plantago latifolia rosea, flore expanso. Bauh. pin.* 189.

ϵ . *Plantago latifolia, spica multiplici sparsa. Bauh. pin.* 189.

Habitat in Europa ad vias. 2

2. PLANTAGO foliis ovatis glabris, scapo angulato; *asiatica* spica flosculis distinctis.

Habitat in China, Sibiria.

Planta ita refert P. majorem, ut quivis facile eandem diceret. At aiffert Spica longiore, floribus remotis & distantibus, Foliis sepius basi subdentatis, Scapo angulo-

lato.

3. PLANTAGO foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, *media*, spica cylindrica, scapo tereti. *Hort. cliff.* 36. *Fl. suec.*

123, *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 472. *Dalib. paris.* 50.

Plantago latifolia incana. Bauh. pin. 189.

Plantago major incana. Clus. hist. 2. p. 109.

ζ *Plantago latifolia hirsuta minor. Bauh. pin.* 189.

Plantago latifolia incana, spicis variis. Bauh. pin. 189.
Morif. hist. 3. s. 8. t. 15. f. 9.

Habitat in Europæ pascuis sterilibus apricis argillosis. 2

4. PLANTAGO foliis lanceolato-ovatis pubescentibus *virginica*, subdenticulatis, spicis laxis pubescentibus, scapo angulato. *Gron. virg.* 16.

Plantago media incana virginiana, serratis foliis, annua.

Morif. hist. 3. p. 259. s. 8. t. 15. f. 8.

Plantago virginiana, pilosellæ foliis angustis, radice turbinata. Pluk. alm. 298.

Plantago myosotis s. trinervia hirtula carolina. Raj. hist. 2. p. 1889.

Habitat in Virginia.

5. PLANTAGO foliis lanceolatis, spica subovata nuda, *lanceolata*, scapo angulato, *Vir. cliff.* 9. *Hort. cliff.* 36. *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 471. *Dalib. paris.* 50.

Plantago angustifolia major. Bauh. pin. 189.

Plantago minor. Dod. pempt. 102

- β.* *Plantago trinervia*, folio angustissimo. *Baeh. pin.* 189.
prodr. 98.
- δ.* *Plantago angustifolia major*, caulum summitate foliosa.
Baeh. pin. 189.
Habitat in Europæ campis sterilibus. 2
- longipus.* 6. *PLANTAGO* foliis lanceolatis, spica ovata hirsuta,
 scapo angulato.
Plantago angustifolia, paniculis lagopi. *Baeh. pin.* 189.
prodr. 98. *Morit. hist.* 3. f. 8. t. 16. f. 13.
Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Lusitania.
Bractæ s. squamae in spicas sunt densissimo tomentosa-hirsuta; *Basis foliorum pilosa.*
- albicans.* 7. *PLANTAGO* foliis linear-lanceolatis hirsutis, spica
 cylindrica erecta, scapo tereti foliis longiore.
Plantago foliis lanceolato-linearibus, scapo longitudine
 foliorum, spica oblonga. *Hort. cliff.* 37. *Roy. lugdb.*
 401.
Plantago foliis lanceolato-linearibus, scapo foliis duplo
 longiore, spica oblonga. *Sauv. monsp.* 26.
Holosteum hirsutum albicans majus. *Baeh. pin.* 190.
Holosteum salmanticense majus. *Clus. hist.* 2. p. 110.
β. *Holosteum hirsutum albicans minus.* *Baeh. pin.* 190.
Habitat in Hispaniæ & Narbonæ aridis.
- alpina.* 8. *PLANTAGO* foliis linearibus planis hirsutis, spica ob-
 longa erecta.
Plantago foliis linearibus, spica oblonga. *Hall. helv.*
 471.
Holosteum hirsutum nigricans. *Baeh. pin.* 190.
Habitat in Helvetiæ alpibus.
- cretica.* 9. *PLANTAGO* foliis linearibus, scapo brevissimo lana-
 to nutante, spica subrotunda, scapo tereti. *Hort. cliff.*
 36. *Roy. lugdb.* 401.
Holosteum s. *Leontopodium creticum.* *Baeh. pin.* 190.
Leontopodium creticum. *Clus. hist.* 2. p. 11.
Habitat in Creta.
- maritima.* 10. *PLANTAGO* foliis semicylindraceis integerrimis:
 basi lanatis, scapo tereti. *Fl. suec.* 127.
Plantago scapo spicato, foliis linearibus subtrus conver-
 xis. *Fl. lapp.* 63. *Lob. obs.* 163.
Coronopus maritimus major. *Baeh. pin.* 190.
Habitat in littoribus marinis Europæ borealis.
Basis foliorum pilosa est, unde affinitas summa specierum
 6. 7.

6. 7. 8. 9. 11. sed que vis naturæ efficeret tam varia?
an locus; an copula.

11. PLANTAGO foliis subulatis triquetris rigidis, scapo subulata,
tereti. *Roy. lugdb.* 402.

Plantago foliis triangulari-prismaticis. *Guett. stamp.* 2.
p. 428.

Holosteum, strictissimo folio, minus. *Baub. pin.* 191.

Serpentina omnium minima. *Lob. ic.* 439.

β. Holosteum massiliense. *Baub. pin.* 190.

Habitat in maritimis Mediterranei arenosis.

12. PLANTAGO foliis linearibus dentatis, scapo tereti. *Coronopus.*
Plantago foliis linearibus pinnato-dentatis. *Hort. cliff.*

37. Fl. suec. 126. *Roy. lugdb.* 401. *Dalib. paris.* 50.

Coronopus sylvestris hirsutior. *Baub. pin.* 190. *

Herba stella. f. *Cornu Cervinum.* *Dod. pempt.* 109.

β. Coronopus hortensis. *Baub. pin.* 190.

Habitat in Europæ glareosis.

13. PLANTAGO foliis linearibus subdentatis, scape te- *løfslingii.*
reti, spica ovata: bracteis carinatis membranaceis. *Læfl.*

Habitat in Hispanie collibus agrorumque marginibus. ◎

Differt a P. Coronopo quod sit minor & praecocior;

spica ovata, ejus vero longa. Floribus rarius imuricatis:

bracteis glabris navicularibus; ejus vero subulatis

angustissimis pubescentibus. Staminibus brevioribus.

Calycis foliolis acutioribus; colore corollæ magis fusco.

Foliis linearibus, nec lanceolatis, parce dentatis. Sea-

pus pilosus est. Læfl.

14. PLANTAGO scapo unifloro. *Fl. lapp.* 64. *Fl. suec.* *uniflora.*
128. Dalib. paris. 50.

Plantago floribus feminis sessilibus ad exortum scapi u-

niflori maris. *Juss. act.* 1742. *p. 131. t. 7.* *Guett.*

stamp. 2. *p. 26.*

Gramen junceum, capitulis quatuor longissimis filamen-

tis donatis. *Pluk. alm.* 180. *t. 35. f. 2.* *Moris. hist.*

3. f. 8. t. 9. f. 30.

Habitat ad Europæ littora lacuum.

β Caule ramoso.

15. PLANTAGO caule ramoso, foliis integerrimis, spi- *Psyllium.*
cis foliosis. *Hort. upf.* 29. *

Plantago caule ramoso. *Vir. cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 401.

Plantago annua, foliis integerrimis, caule ramoso ero-

cto. *Hort. cliff.* 37. *Dalib. paris.* 51.

Psyllium majus erectum. Baub. pin. 191.
Habitat in Europæ australis sepiibus. ◎

- Cynopt.* 16. *PLANTAGO* caule ramoso, foliis dentatis, spicis aphyllis. *Hort. ups. 28. Mat. med. 50.*
Psyllium dioscoridis vel indicum, foliis crenatis. Baub. pin. 191.
Habitat in India. ◎

SCOPARIA.

- dulcis.* 1. *SCOPARIA. Gen. nov. 1098.*
Capraria foliis ternis, corollis quadripartitis. Hort. cliff. 320. Roy. lugdb. 301.
*Sanoloides. Boerb. lugdb. 2. p. 265. **
Veronica americana erecta frutescens & ramosa. Herm. parad. 241. t. 241.
Veronica fruticosa erecta dulcis, hexangulari caule. Sloan. hist. 1. p. 195. t. 108. f. 2.
Phyteuoides americanum, flore albo tetrapetalo. Pluk. alm. 296. t. 215. f. 1.
Habitat in Jamaica, Curassao. ◎

CENTUNCULUS.

- minimus.* 1. *CENTUNCULUS. Dill. giss. 161. gen. III. E.N.*
C. s. app. 92. t. 10. f. 31.
Centunculus foliis alternis ovatis. Fl. suec. 129. Dalib. paris. 52.
Anagallidiastrum exiguum, foliis lanceolatis alternis. Mitch. gen. 14. t. 18.
Anagallis paludosa minima. Vaill. paris. 12. t. 4. f. 2.
Alpine palustris minima, flosculis albis. Mentz. pug. t. 4. f. 5.
Habitat in Italiæ, Galliæ, Germaniæ, Scaniæ arenosis. ◎

SANGUISORBA.

- officinalis.* 1. *SANGUISORBA spicis ovatis. Hort. cliff. 39. Fl. suec. 130. Mat. med. 51. Roy. lugdb. 240. Dalib. paris. 51.*
Pimpinella sangvisorba major. Baub. pin. 160.
Pimpinella sylvestris s. sangvisorba major. Dod. pent. 105.
 $\beta.$ *PIMPINELLA major rigida præalta auriculata subnuda. Bocc. muf. 2. p. 19. t. 7.*
Habitat in Europæ pratis siccoribus. ✕

2. SANGUISORBA spicis longissimis. *Hort. cliff.* 39. *canadensis.*
Roy. lugdb. 240.
Pimpinella sanguisorba canadensis major, spica longiore alba. *Morif. hist.* 3. p. 264. f. 18. t. 8. f. 12.
Pimpinella maxima canadensis longius spicata. *Corn. canad.* 175. t. 174. *Barr. rar.* 18. f. 739.
Habitat in Canada. 2

CISSUS.

1. CISSUS. *Fl. zeyl.* 60. * *Amoen. acad.* 1. p. 390. * *vitiginea.*
Arbuscula baccifera circumPLICATILIS, vitigineo folio
subtus lanato, fructu racemofo fervido odore. *Pluk.*
mant. 27. t. 337. f. 2.
Schunambu-valli. *Rheed. mal.* 7. p. . t. 11.
Habitat in India. 5

EPIMEDIUM.

1. EPIMEDIUM. *Hort. cliff.* 37. *Hort. upf.* 29. *Roy. alpinum.* .
lugdb. 402. *Dod. pempt.* 599. *Lob. hist.* 176.
Habitat in Alpium Euganeorum, Ligurinorum, Pon-
tebarum umbrosis. 2

CORNUS.

1. CORNUS arborea, involucro maximo: foliolis ob-florida.
verse cordatis. *Hort. cliff.* 38. *Hort. upf.* 29. *Roy.*
lugdb. 249. *Gron. virg.* 17.
Cornus mas virginiana, flosculis in corymbo digestis a
perianthio tetrapetalo albo radiatim cinctis. *Pluk. alm.*
120. *Catesb. car.* 27. t. 27.
Habitat in Virginia. 5
2. CORNUS arborea, umbellis involucrum æquantibus. *mas.*
Hort. cliff. 38. *Hort. upf.* 29. *Roy. lugdb.* 249. *Dalib.*
paris. 52.
Cornus sylvestris mas. *Baub. pin.* 447.
Cornus mas pumilio. *Clus. hist.* 1. p. 13.
β. Cornus hortensis mas. *Baub. pin.* 447.
Habitat in sepiibus Austriæ. 5
3. CORNUS arborea, cymis nudis. *it. W-goth.* 32. *sanguinea.*
Cornus umbellis involucro multoties longioribus. *Hort.*
cliff. 38. *Roy. lugdb.* 249. *Hall. helv.* 463. *Dalib.*
paris. 52.
Cornus feminina. *Baub. pin.* 447.

Virga sanguinea. *Dod. pempt.* 782.

Habitat in Europa, Asia, America borealis dumetis. 5.

suecica. 4. *CORNUS* herbacea, ramis binis. *Fl. lapp.* 65. t. 5. f. 5.
3. *Fl. suec.* 132. *Roy. lugdb.* 249.

Cornus pumila herbacea, *Chamæpericlymenum dicta.*
Dill. elth. 108. t. 91.

Periclymenum humile. *Bauh. pin.* 302. *norvegicum.*
Bauh. pin. 302. *Buxb. act.* 3. p. 268,

Habitat in Suecia, Norvegia, Russia. 2

canadenſis. 5. *CORNUS* herbacea, ramis nullis. *Amœn. acad.* 1. p.
157.

Pyrola, alſines flore, brasiliiana. *Bauh. prodr.* 100. *pin.*
191. *Burf. X.* 106.

Habitat in Canada. 2

TOME X.

tomentosa. 1. **TOME X.**

Tomex tomentosa. *Fl. zeyl.* 59. * *Amœn. acad.* 1. p.
389.

Arbor malabarica illa dicta. *Burm. zeyl.* 26.

Habitat in India. 5.

PTELEA.

trifoliata. 1. **PTELEA** foliis ternatis.

Ptelea. *Hort. cliff.* 36.

Frutex virginianus trifolius, *ulmi samaris*. *Pluk. alm.*
59. *Dill. elth* 147. f. 122. f. 148.

Habitat in Virginia. 5.

vulgaris. 2. **PTELEA** foliis simplicibus.

Dodonæa. *Hort. cliff.* 144. *Fl. zeyl.* 141. *Roy. lugdb.*
206.

Carpinus vulgata, *salicis folio imegro oblongo*. *Burm.*
zeyl. 55. t. 23.

Arbuscula vulgata, *æleagni foliis læte virentibus*, *ame-*
ricana tricoccos. *Pluk. phyt.* 141. f. 1.

Habitat in India. 5.

Hanc arborem idem genus, *cum Ptelea agnoscere obser-*
vavit Ill. B. Jussiaeus.

LUDVIGIA

alternifolia. 1. **LUDVIGIA** foliis alternis lanceolatis.

Ludwigia capsulis cubicis apice perforatis. *Hort. upf.* 30.

Ludwigia capsulis subrotundis. *Hort. cliff.* 491. *Roy. lugdb.*
252.

Lud-

Ludwigia. Gron. virg. 17.

Lysemachia non papposa, flore luteo majore, siliqua caryophylloide minore, ex virginia. Pluk. alm. 235. t. 203. f. 2.

Habitat in Virginia. ◎

2. LUDVIGIA foliis oppositis lanceolatis, capsulis pedunculatis, perennis.

*Ludwigia caule diffuso, foliis lanceolatis, capsulis pedunculatis folio dimidio brevioribus Fl. zeyl. 66. **

Carambu. Rheed. mal. 2. p. t. 49.

Habitat in India. ✕

OLDENLANDIA.

1. OLDENLANDIA pedunculis simplicissimis, fructu- uniflora. bus hispidis.

Oldenlandia calycibus fructuum maximis coloratis. Gron. virg. 138.

Alsinia aquatica major repens, foliis acuminatis, virginiana. Pluk. alm. 20. t. 74. f. 5. mala.

Habitat in Virginia.

Caules ramoso-subdivisi, repentes. Folia opposita, lanceolate-ovata, subpetiolata, integerrima. Flores axillares, pauci, pedunculis propriis. Germina hispida.

2. OLDENLANDIA pedunculis bifloris petiolo longi- biflora. oribus, foliis lanceolatis. Fl. zeyl. 68. *

Habitat in India. ◎

3. OLDENLANDIA umbellis nudis lateralibus alter- umbellata. nis, foliis linearibus. Fl. zeyl. 67. *

Lysemachia ad finis, saturae folio, maderaspatensis, cap- sulis in summitate fere umbellatis. Pluk. alm. 236. t. 119. f. 4.

Habitat in India. ✕

4. OLDENLANDIA pedunculis multifloris, foliis line- corymbosa. ari-lanceolatis. †

Oldenlandia humilis hyssopifolia. Plum. gen. 42. Erbet. pipl. t. 4. f. 1.

Habitat in America meridionali. ◎

AMMANNIA.

AMMANNIA foliis semiamplexicaulibus, caule tetra- latifoliat. gono, Hort. cliff. 344. Hort. upf. 30.

Ammannia palustris, caule quadrangulari, foliis angustis.

Amm. herb. 344. Apa-

Aparines folio anomala, vasculo seminali rotundo, semine minutissimo. *Sloan. hist. 1. p. 44. t. 7. f. 4.*
Habitat in Caribæis, locis humidis. ☽

- ramosior.* 2. AMANNIA soliis subpetiolatis, caule ramoso.
Ludwigia aquatica erecta, caule rubente, foliis ad genicula binis longis angustis hyssopi instar, flore tetrapetalо albo. *Clayt. 774.*
Habitat in Virginia. *D. Gronovius.* ☽
Planta pedalis, inferne Ramis oppositis, teretibus, simplicibus. Calyces ex alis foliorum solitarii (nec ut in precedenti terni), ad apices ramorum magis conferti & ferme spicati.
- baccifera.* 3. AMANNIA foliis subpetiolatis, capsulis calyce majoribus coloratis.
Anonymos, linariæ folio, orientalis, gallii lutei flore, herba capsularis verticilata. *Pluk. alm. 33. t. 136. f. 2. at non ramosa.*
Habitat in China. *Osbeck.* ☽
Planta tenera, dñgiti longitudine, erecta, absque ramis, caule rufescente, tereti. Folia opposita, lanceolata, subpetiolata, integerrima. Flores verticillati, ad axillas foliorum plurimi, propriis pedunculis insidentes, minimi. Capsula globosa, rubra, calyce major.

ISNARDIA.

- palustris.* 1. ISNARDIA. *Dalib. paris. 53.*
Dantia palustria. *Petit. gen. 49. t. 49.*
Dantia foliis subovatis pediculatis, floribus in foliorum alis sessilibus. *Guett. stamp. 2. p. 115.*
Ocymophyllum. *Buxb. act. 4. p. 277. t. 27.*
Glaux major palustris, flore herbaceo. *Moris. præl. 268. Raj. hist. 1102. suppl. 635. Bocc. mus. 105. t. 84. f. 2.*
Alfina palustris rotundifolia repens, foliis portulacæ pinguis. *Lind. alsat. 114. t. 2.*
Habitat in Galliæ, Alsatia, Russiæ, Virginiam fluviiis, ☽

TRAPA.

- natans.* 1. TRAPA
Trapa petiolis foliorum natantium ventricosis, *Hort. cliff. 483. Fl. suec. 134. Mat. med. 52. Dalib. paris. 52.*
Tribulus aquaticus. *Baub. pin. 194.*

Panover-Tsieraua. *Rheed. mal.* 11. p. 65. t. 33.
Habitat in Europæ australis, Asiæque stagnis limosis. ◎

DORSTENIA.

DORSTENIA scapis radicatis. *Hort. cliff.* 32. *Mat. Contrajervia.*
med. 53.

Dorstenia dentariæ radice, sphondylii folio, placenta ovali. *Houst. act. n.* 421. f. 1.

Dorstenia sphondylii folio, dentariæ radice. *Plum. gen.* 29.

Drakena radix. *Clus. exot.* 83.

Cyperus longus odoratus peruanus. *Baub. pin.* 14.

Tuzpatlis. *Hern. mex.* 147.

β. Dorstenia dentariæ radice, folio minus laciniate, placenta quadrangulari & undulata. *Houst. act. n.* 421. f. 2.

Habitat in nova Hispania, Mexico, Peru, Vera Cruce,
insula Vicentii. ♀

2. DORSTENIA pedunculis caulinis. *Hort. cliff.* 32. *canescens.*
Parietaria racemosa, foliis ad oras villosis. *Plum. spec.*

10.

Habitat in America meridionali. ♀

ELÆAGNUS.

1. ELÆAGNUS foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 250. *angustifolia.*
Hort. upf. 31.

Elæagnus. *Cam. epit.* 106. *Hort. cliff.* 38.

Olea sylvestris, folio molli incano. *Baub. pin.* 473.

Habitat in Bohemia, Hispania, Syria, Cappadocia. ♂

2. ELÆAGNUS foliis ovatis. *Roy. lugdb.* 250. *Fl. zeyl.* *latifolia.*
 58.

Eleachnus foliis rotundis maculatis. *Burm. zeyl.* 92.

t. 39. f. 2.

Habitat in Zeylona. ♂

BRABEJUM.

1. BRABEJUM. *Hort. cliff.* 36. *Roy. lugdb.* 400. *stellatifolium.*
Amygdalus æthiopica, fructu holofericeo. *Breyn. cent.*
I. t. I.

Arbor æthiopica hexaphylla, foliis circa caulem ad intervalla senis. *Pluk. alm* 47. t. 265, f. 3.

Habitat in Æthiopia. ♂

RIVINA.

1. RIVINA. *Hort. cliff.* 35. *Roy. lugdb.* 207. *a. Rivina humilis.*
 H 5

- canescens.* *a.* *Rivina humilis* racemosa, baccis puniceis. *Plum. gen.* 48.
Solanoides americana, circæ foliis canescensibus. *Tournef. act.* 1706.
Solanum barbadense racemosum minus tinctorium. *Pluk. alm.* 353. *t.* 112. *f.* 2.
Amarantus baccifer, circæ foliis. *Comm. hort.* 1. *p.* 127. *t.* 66.
- scandens.* *B.* *Rivina scandens* racemosa, amplis solani foliis, baccis violaceis. *Plum. gen.* 48.
- glabra.* *C.* *Solanoides americana*, circæ foliis glabris. *Tournef. act.* 1706.
Habitat in Caribæis, Jamaica, Barbados. 5

SALVADORA.

- persica.* 1. **SALVADORA.** *Garc. act. angl.* 1749. *n.* 491. *Gen. nov.* 1097.
Habitat ad Sinum Persicum. 5
Frutex foliis oppositis, Racemo terminali.

CAMPHOROSMA.

- monspeliacæ.* 1. **CAMPHOROSMA** foliis hirsutis linearibus. *Amæn. acad.* 1. *p.* 392. *Mat. med.* 43.
Camphorolima. Sauv. monsp. 45.
Selago caule procumbente, foliis sparsis. Hort. cliff. 321.
Roy. Ingdb. 300.
Camphorata hirsuta. Baub. pin. 486. *Tournef. act.* 1705.
p. 313. *Buxb. cent.* 1. *p.* 18. *t.* 28. *f.* 1.
Camphorata monspeliensium. Baub. hist. 3. *p.* 379. *Lob. adv.* 174.
Habitat in Hispaniac, Narbonæ, Tatariae arenosis.
2. **CAMPHOROSMA** foliis subulatis rigidis glabris. *Amæn. acad.* 1. *p.* 393.
Camphorara altera. Tabern. hist. 57.
Camphoratae congener. Baub. pin. 486. (*varia*)
Anthylis altera italorum. Lob. ic. 404. *Dalech. hist.* 1150.
Habitat in Italia, Tataria. 2

- glabra.* 3. **CAMPHOROSMA** foliis semitriquetris glabris inermibus. *Amæn. acad.* 1. *p.* 393.
Camphorata foliis confertissimis inermibus lœvibus. Hall. helv. 193.
Camphorata glabra. Baub. pin. 286. *Dalech. hist.* 1179.
Habitat in Helvetia. 2

AL.

ALCHEMILLA.

1. ALCHEMILLA foliis lobatis. *Fl. suec.* 135. *Mat. vulgaris.*
med. 54.
Alchemilla foliis palmatis. *Hort. cliff.* 38. *Roy. lugdb.* 231.
Alchemilla foliis simplicibus. *Fl. lapp.* 66.
- β. Alchemilla vulgaris. *Bauh. pin.* 319.
Alchemilla minor. *Tournef. inst.* 502.
Habitat in Europæ pascuis. ✎
2. ALCHEMILLA foliis digitatis serratis. *Fl. lapp.* 61. *alpina.*
Fl. suec. 136. *Hort. cliff.* 39. *Roy. lugdb.* 232.
Alchemilla peregrinis incana argentea, s. sericea satinum
provocans. *Morif. hist.* 2. p. 195. f. 2. t. 20. f. 3.
Tormentilla alpina, foliis sericeo. *Bauh. pin.* 326.
- β. Alchemilla alpina pubescens minor. *Tournef. inst.* 508. *hybrida.*
Pluk. phyt. 240. f. 1.
Habitat in Alpibus Europa. ✎
3. ALCHEMILLA foliis quinatis multifidis glabris. *pentaphyllea*
Alchemilla alpina quinquefolia. *Bauh. pin.* 320. pro-
gr. 138.
Alchemilla alpina pentaphyllea minima, lobis umbriatis.
Bocc. mus. 1. p. 18. t. 1.
Habitat in monte Canisio, Furca, Gotthardo. ✎

DIGYNIA.

APHANES.

1. APHANES *Hort. cliff.* 39. *Fl. suec.* 137. *Roy. lugdb.* *arvensis,*
231. *Gron. virg.* 17. *Dalib. paris.* 53
Chærophyllo nonnihil similis. *Bauh. pin.* 182
Alchemilla minima montana. *Col. ecphr.* 145. t. 146.
Habitat in Europæ arvis. ☽

BUFONIA.

1. BUFONIA. *Sauv. monsp.* 141. *Amœn. acad.* 1. p. 386. *tenuifolia,*
Alsinoides. *Raj. angl.* 3. p. 346.
Herniaria angustissimo gramineo folio, erecta. *Magn.*
hort. 97. t. 97.
Alfine polygonoides tenuifolia, flosculos ad longitudi-
nem caulis velut in spicam dispositis. *Pluk. alm.* 22.
t. 75. f. 3.
Habitat in Anglia, Gallia, Hispania. ✎
Stamina 4 numeravit in flore Lœft.

HAM-

HAMAMELIS.

- virginiana.* 1. HAMAMELIS, Gron. virg. 139. Cold. noveb. 18.
Catejb. car. 3. p. 2. t. 2.
Trilopus. Mitch. gen. 22.
Pistacia virginiana nigra, coryli foliis. Pluk. alm. 298.
Habitat in Virginia.

CUSCUTA.

- europæa.* 1. CUSCUTA floribus sessilibus.
Cuscuta nuda repens filiformis. Fl. suec. 138. Mat. med. 55. Dalib. paris. 53.
Cuscuta nuda repens fumiformis. Sauv. monsp. 11.
Cuscuta major. Bauh. pin. 219.
Cuscuta. Cam. epit. 984.
epithymum β. *Cuscuta nuda repens filiformis.* Sauv. monsp. 11.
Epithymum f. *Cuscuta minor.* Bauh. pin. 219.
Habitat in Plantis Europæ parasitica.
- americana.* 2. CUSCUTA floribus pedunculatis.
Cuscuta caule aphylo volubili repente. Gron. virg. 18.
Cuscuta inter majorem & minorem media, filamentis longis & floribus late super arbores & campos se extendens, Sloan. jam. 85. hist. 1. p. 201. t. 128. f. 4.
Habitat in Virginia.

HYPECOUM.

- procumbens.* 1. HYPECOUM siliquis arcuatis compressis articulatis.
Hort. upf. 31.
Hypocoum. Bauh. pin. 172. Dod. pempt. 449. Hort. cliff. 38. Roy. lugdb. 402.
Habitat inter Archipelagi, Narbonæ & Salmanticenses segetes. ◎
- pendulum.* 2. HYPECOUM siliquis cernuis teretibus cylindricis.
Hort. upf. 31. Sauv. monsp. 263.
Hypocoum siliquis pendentibus non articulatis bivalvis incurvis. Moris. hist. 2. p. 280.
Cumiuum sylvestre siliquatum ponæ. Dalech. hist. 698.
Habitat in Galloprovincia ◎
- erectum.* 3. HYPECOUM siliquis erectis teretibus torulosis. Hort. upf. 32.
Hypocoum tenuifolium, siliquis erectis teretibus. Amm. ruth. 58. t. 9.
Habitat in Dauria.

TRI.

TETRAGYNIA.

ILEX.

* *Flores quadrifidi.*

1. ILEX foliis ovatis acutis spinosis. *Hort. cliff.* 40. *Hort. Aquifolium upf.* 32. *Roy. lugdb.* 400. *Gron. virg.* 12. *Dalib. parif.* 54.

Ilex aculeata baccifera. Bauh. pin. 425.

Habitat in Europa australiori, Japonia, virginia. ♂

2. ILEX foliis ovato-lanceolatis ferratis. *Hort. cliff.* 40. *Cassine Mat. med.* 56. *Roy. lugdb.* 400.

Aquifolium carolinense, foliis dentatis, baccis rubris Catesb. car. 1. p. 31. t. 31.

- β. *Cassine vera floridanorum arbuscula baccifera, alterni ferme facie, foliis alternatim sitis, tetrapyrene. Pluk. mant.* 40. *Catesb. car.* 2. p. 57. t. 57.

Habitat in Carolina. ♂

3. ILEX foliis lato-lanceolatis obtusis integerrimis. *asiatica.*
Habitat in India Asia. ♂

β *Flores trifidi.*

4. ILEX foliis cuneiformibus tricuspidatis. *cuneifolia.*

Ilex aculeata, folio tricuspidi. Plum. hist. mss.

Habitat in America meridionali. ♂

5. ILEX foliis pinnatis. *Dodonæa.*

Dodonæa aquifolii folio tricuspidato. Plum. gen. 20.

- β. *Dodonæa aquifolii folio anguloso & aculeato. Plum. gen.* 20.

- γ. *Dodonæa aquifolii folio anguloso non aculeato. Plum. gen.* 20,

Habitat in America meridionali. ♂.

Folia pinnata: foliolis 21, sessilibus, rigidis, ovatis, acuminatis, in medio utrinque denticulo angulatis. Flores racemosi ut in Rhoë.

COLDENIA.

1. COLDENIA. *Fl. zeyl.* 69. *procumbens.*

Teucri facie bisnagarica terracoccos rostrata. Pluk. alm. 363. t. 64. f. 6. *Raj. suppl.* 283. *Moris. hist.* 3. p. 423.

Habitat in India. ☺

Fructificationem ulterius examinent alii in viventi planta, ego siccum tantum vidi.

PO-

POTAMOGETON.

- natans.* 1. POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *Hort. cliff.* 40. *Fl. suec.* 139. *Roy. lugdb.* 212. *Hall. helv.* 199. *Dalib. paris.* 54.
Potamogeton foliis ovato-oblongis natantibus. *Fl. lapp.* 68.
Potamogeton rotundifolium. *Baub. pin.* 193.
3. *Potamogeton* foliis lanceolato-oblongis, petiolis longis. *Gron. virg.* 139.
Habitat in Europæ lacubus & fluviis. 2
- persiliatum.* 2. POTAMOGETON foliis cordatis amplexicaulibus. *Fl. lapp.* 69. *Fl. suec.* 140. *Roy. lugdb.* 212. *Hall. helv.* 199. *Dalib. paris.* 54.
Potamogeton rotundifolium alternum. *Læs. pruss.* 205. t. 65.
Habitat in Europæ lacubus fluviisque argillofisis. 2
- densum.* 3. POTAMOGETON foliis ovatis acuminatis oppositis confertis, caulis dichotomis, *Guett. stamp.* 1. p. 102. †
Potamogeton minus, foliis densis mucronatis non serratis. *Magn. monsp.* 303.
Habitat in Gallia.
- lucens.* 4. POTAMOGETON foliis lanceolatis planis in petiolaris desinentibus. *Hort. cliff.* 40. *Fl. suec.* 141. *Roy. lugdb.* 212. *Dalib. paris.* 54.
Potamogeton foliis angustis splendentibus. *Baub. pin.* 193.
Fontinalis lucens major. *Baub. hist.* 3. p. 769.
Habitat in Europæ lacubus, stagnis, fluviis argillofisis. 2
- cispum.* 5. POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis undulatis serratis. *Roy. lugdb.* 212. *Fl. suec.* 142. *Dalib. paris.* 55.
Potamogeton foliis crassis f. *Lactuca ranarum* sarmensis planis. *Baub. pin.* 193.
Habitat in Europæ fossis & rivulis.
- serratum.* 6. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis subundulatis.
Potamogeton foliis lanceolatis obscure undulatis, caulis longe ramosis. *Guett. stamp.* 1. p. 102. *Dalib. paris.* 55.
Potamogeton longo serrato folio. *Baub. pin.* 193.
Habitat in Europæ rivulis.

7. POTAMOGETON foliis linearibus obtusis, caule *compreßum*, *compresso*. *Hort. cliff.* 40. *Fl. suec.* 143. *Roy. lugd.* 213. *Dalib. paris.* 55.
Potamogeton caule piano, foliis gramineis. undulatis, spica exigua. *Hall. helv.* 201.
Potamogeton caule compresſo, folio graminis canini. *Raj. hist.* 189.
Habitat in Europæ fossis paludosis.
8. POTAMOGETON foliis setaceis parallelis approxi- *pettinatum*. matis distichis. *Fl. suec.* 145. *Dalib. paris.* 55.
Potamogeton foliis linearibus acutis longissimis alternis confertis. *Roy. lugd.* 213.
Potamogeton gramineum ramosum. *Bauk. pin.* 193. *prodr.* 101.
Habitat in Europæ fossis & paludibus.
9. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis acu- *setaceum*. minatis. *Roy. lugd.* 213. *Dalib. paris.* 55.
Potamogeton ramosum angustifolium. *Bauk. in* 193.
Habitat in Europæ fossis paludosis.
10. POTAMOGETON foliis linear-lanceolatis alter- *graminerm.* nis sessilibus stipula latioribus. *F. suec.* 144.
Potamogeton gramineum latiusculum foliis & ramificationibus dense stipatis. *Raj. angl.* 3. p. 149. t. 4. f. 3. *Fl. lapp.* 70.
Habitat in Europæ fossis & paludibus. ◎
11. POTAMOGETON foliis linearibus alternis distin- *marinum*. etis inferne vaginantibus. *Fl. suec.* 146.
Potamogeton pusillum fluitans. *Bocc. sic.* 42. t. 20. f. 5. *it. goth.* 221.
Habitat in Europa ad maris littora. ◎
12. POTAMOGETON foliis linearibus oppositis al- *puffillum*. ternisque distinctis: basi patentibus, caule tereti. *Fl. suec.* 147. *Dalib. paris.* 56.
Potamogeton foliis linearibus alternis remotis. *Roy. lugd.* 213.
Potamogeto pusillum, gramineo folio breviore. *Vaill.* *paris.* t. 32. f. 4.
Habitat in Europæ paludibus. ◎

RUPPIA.

1. RUPPIA. *Hort. cliff.* 436. *It. wgoth.* 186. *Gnott. maritima*, *stamp.* 2. p. 416.

Bueca

Buccaferrea maritima, foliis acutissimis. *Micb. gen. 72.*
t. 35.

Potamogeton maritimum, gramineis longioribus foliis,
fructu fere umbellato. *Raj. angl. 3. p. 134. t. 6. f. 1*

Fucus folliculaceus, *fœniculi* folio longiore. *Baub. pin*
365.

Habitat in Europæ maritimis. ◎

SAGINA.

procumbens. 1. *SAGINA* ramis procumbentibus. *Fl. lapp. 157. Fl.*
suec. 148. Roy. lugdb. 452.

Sagina scapis & ramis unifloris. *Guett. stamp. 2. p. 277*
Altine pusilla graminea, flore tetrapetaloo. *Segn. veron*
421. t. 5. f. 3.

β. *Altine saxifraga* graminifolia, flosculis tetrapetalis her-
bidis & mucosis. *Pluk. alm. 23. t. 74. f. 2.*

γ. *Saxifraga* graminea pusilla foliis brevioribus crassioribus
& succulentis. *Raj. angl. 3. p. 345.*

Habitat in Europæ pascuis sterilibus uliginosis aridis.

erecta.

2. *SAGINA* caule erecto, unifloro.

Sagina scapis unifloris. *Guett. stamp. 2. p. 276. Dalib.*
paris. 56.

Altine foliis caryophyllæis. *Raj. angl. 3. p. 344. t. 15.*
f. 4.

Altine verna glabra. *Vaill. paris. 6. t. 3. f. 2.*

Habitat in Gallia, Anglia, Germania sterilibus gla-
reosis.

virginica. 3. *SAGINA* caule erecto, floribus oppositis.

Saginæ affinis planta minima, floribus albis *Clayt. mff*
649.

Habitat in Virginia inter muscos ad margines fontium.
D. Gronovius.

Caulis digitalis, filiformis, erectus; Folia opposita, subu-
lata, remota, minima. Flos terminalis & oppositi non
nulli propriis pedunculis. Perianthium 4partitum,
erectum. Petala 4, oblonga. Stamina 4, longitudine
calycis. Germen conicum, longitudine calycis. Stylus
nullus. Stigma obtusum. Capsula pyramidalis, rostra-
ta, unilocularis. Semina numerosa. An proprii gene-
ris?

TILLÆA.

aquat.ca. 1. *TILLÆA* erecta dichotoma, foliis acutis.

Cras-

Crassula caule dichotomo, floribus lineatibus, floribus quadrifidis. Fl. svec. 259. Dalib. paris. 98.

Crassula floribus quadrifidis. Hort. cliff. 497.

Sedum minimum annum, flore roseo tetrapetalo. Vaill. paris. 181. t. 10. f. 2.

Habitat in Europæ inundatis. ◎

1. TILLÆA erecta, floribus lateralibus, foliis obtusis. *rubra.*

Tillæa erecta. Hort. upf. 24. * Sauv. monsp. 129.

Sedum annum minimum stellatum rubrum. Magn. monsp. 238. t. 237.

Habitat Monspelii inter muscos. ◎

3. TILLÆA procumbens. Hort. upf. 24. Sauv. monsp. *muscosa.* 129.

Tillæa. Dalib. paris. 43.

Tillæa muscosa annua perfoliata. Mich. gen. 22. t. 20.

Crassula foliis sessilibus connatis, floribus aggregatis in foliorum alis. Guett. stamp. 1. p. 97.

Polygonum muscosum minimum. Bocc. sic. 56. t. 29.

Sempervivum omnium minimum repens muscosum, polygoni facie. Bocc. mus. 2. p. 36. t. 22.

Habitat in Italiae, Siciliae, Galliae muscosis.

Flores hujus siccios trifidi, antecedentium quadrifidi; Phil. Bot. 178.

Classis V.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

HELIOTROPIUM.

indicum.

1. HELIOTRPIUM foliis cordato-ovatis acutis scabriusculis, spicis solitariis, fructibus bifidis. *Fl. cyl.* 70. *Heliotropium foliis ovatis acutis, spicis solitariis. Hort. cliff.* 45. *Roy. lugdb.* 405.

Heliotropium americanum cæruleum. Dod. mem. 83. *Pluk. phyt.* 245. *f. 4.*

2. *Heliotropium americanum cæruleum, foliis hormini angustioribus. Herm. lugdb.* 307. *Sloan. jam.* 98.

Habitat in India utraque. ◎

europeum.

2. HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis tomentosis rágofis, spicis conjugatis. *Hort. upf.* 33. *Sauv. monsp.* 305.

Heliotropium foliis ovatis integerrimis, spicis conjugatis. Hort. cliff. 45. *Roy. lugdb.* 404.

Heliotropium majus dioscoridis. Baub. pin. 253.

Habitat in Europa australi. ◎

supinum.

3. HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis tomentosis plicatis, spicis solitariis,

Heliotropium inimus supinum. Baub. pin. 253.

Heliotropium supinum. Clus. hist. 2. *p. 47.*

Habitat Salinanticæ juxta agros, Monspelii in littore. ◎

curassavicum

4. HELIOTROPIUM foliis lanceolato-linearibus glabris aveniis, spicis conjugatis, *Hort. cliff.* 45. *Hort. upf.* 33. *Roy. lugdb.* 405. *Dalib. paris.* 57.

Heliotropium indicum procumbens glaucophyllum, floribus albis. Pluk. alm. 182. *t. 36. f. 3.*

Heliotropium maritimum minus, folio glauco, flore albo. Sloan. hist. 1. *p. 213. t. 132. f. 3.*

Heliotropium curassavicum, foliis lini umbilicati. Moris hist. 3. *p. 452. f. 11. t. 31. f. 12.*

Heliotropium americanum procumbens, facie lini umbilicati. Herm. par. 183. *t. 183.*

Habitat in Americae calidioris maritimis. ◎

5. HELIOTROPIUM foliis linearibus glabris aveniis, *orientale*, floribus sparsis lateralibus.

Habitat in Asia. ◎

Planta parva, procumbens, repens. Folia linearia, alterna. Flores subsessiles, alterni, solitarii, inter folia sparsi.

MYOSOTIS.

1. MYOSOTIS seminibus nudis: foliorum apicibus callosis. *Vir. cliff.* 149. *Fl. suec.* 149. *Roy. lugdb.* 404. *Hort. cliff.* 45. *scorpioides*.

- α. Myosotis foliis hirsutis. *Hort. cliff.* 46. *arvensis*.
Myosotis hirsuta arvensis major. *Dill. giss.* 55. *Fl. lapp.*

74. Echium scorpioides arvense. *Bauh. pin.* 254.

- β. Myosotis foliis glabris. *Hort. cliff.* 46. *Dalib. paris.* palustris.
58.

Myosotis glabra pratensis. *Dill. giss.* 67. *Fl. lapp.* 75.

Echium scorpioides palustre. *Bauh. pin.* 254.

Habitat in Europa & campus aridis & aquosis scaturiginosis. ◎

2. MYOSOTIS seminibus aculeatis glochidibus, foliis *virginiana*, ovato-oblongis, ramis divaricatis.

Myosotis seminibus hispidis, foliis lanceolato-ovatis.
Gron. virg. 19.

Cynoglossum virginianum, flore & fructu minimo. *Pluk. alm.* 126.

Habitat in Virginia. ◎

Semina interiori latere nuda, angulata, erecta, basi affixa, ut in sequenti, fructus nutans.

3. MYOSOTIS seminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis pilosis. *Fl. suec.* 150. *Dalib. paris.* 57. *Lappula*,

Lithospermum seminibus echinatis. *Hort. cliff.* 46. *Roy. lugdb.* 405.

Cynoglossum foliis lanceolatis, floribus in foliorum aliis subsessilibus. *Guett. stamp.* 1. p. 92.

Cynoglossum minus. *Bauh. pin.* 257.

Habitat in Europa argillosis, nudis, ruderatis. ◎

4. MYOSOTIS seminibus nudis, foliis hispidis, racemis *apula*, foliosis.

Lithospermum seminibus levibus, corollis vix calycem superantibus, foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 405. *Sauv. monsp.* 62.

Echium luteum minimum. *Bauh. pin.* 255.

Echioides lutea minima apula campestris. Col. ecphr. 1.
p. 184. t. 185.
Habitat in Italia, Hispania, Narbona. ◎

LITHOSPERMUM.

- officinale.* 1. LITHOSPERMUM seminibus levibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis. Hort. cliff. 46. Fl. suec. 151. Mat. med. 57. Roy. lugdb. 405. Dalib. paris. 58.
Lithospermum majus erectum. Bauh. pin. 153.
Habitat in Europæ ruderatis. ♀
- arvense.* 2. LITHOSPERMUM seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus. Hort. cliff. 46. Fl. suec. 152. Roy. lugdb. 405. Hall. helv. 518. Dalib. paris. 59.
Lithospermum arvense, radice rubra. Bauh. pin. 258. Fl. lapp. 73.
Habitat in Europæ agris & arvis. ◎
- virginianum* 3. LITHOSPERMUM foliis subovalibus nervosis, corollis acuminatis.
Lithospermum corollarum laciiniis acuminatis hirsutis. Gron. virg. 140.
Lithospermum latifolium virginianum, flore albido longiore. Moris. hist. 3 p. 447. f. 11. t. 28. f. 3.
Habitat in Virginia.
Puncta adspersa foliis sunt excavata, horum latiora seta egrediente notata.
- purpureo-eruleum.* 4. LITHOSPERMUM seminibus levibus, corollis calycem multoties superantibus. Hort. cliff. 46. Roy. lugdb. 405.
Lithospermum flore magno, caule ex apice radices agente. Hall. helv. 517.
Lithospermum minus repens latifolium. Bauh. pin. 258.
Lithospermum repens majus. Clus. hist. 2. p. 163.
Habitat in Ungariæ, Angliæ, Galliæ nemoribus. ♀
- tinctorium.* 5. LITHOSPERMUM villosum, caulis procumbentibus simplicissimis. Mat. med. 58.
Lithospermum procumbens, seminibus rugosis, foliis hispidis, radice rubra. Sauv. monsp. 63.
Anchusa puniceis floribus. Bauh. pin. 255.
Anchusa monspeliana. Bauh. hist. 3. p. 584.
Habitat in Oriente, Monspelii. ♀

6. LITHOSPERMUM fruticosum, staminibus corollis *fruticosum*.
lam. exquantibus.
Lithospermum fruticosum, corollis calyce majoribus,
foliis linearibus hispidis. *Sauv. monsp.* 50. 63.
Anchusa angustifolia. *Baeh. pin.* 255.
β. Anchusa arborea. *Alp. exot.* 67. t. 68.
Buglossum samium frutescens, foliis rosmarini obscure
virentibus lucidis & hirsutis. *Tournef. cor.* 6.
Habitat in Gallia, Samo & Europa australi. 3

ANCHUSA.

1. ANCHUSA foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundum officinalis.
dis. *Hort. cliff.* 46. *Fl. svec.* 152. *Mat. med.* 59. *Roy.*
lugdb. 406. *Dalib. paris.* 59.
Buglossum angustifolium majus. *Baeh. pin.* 256.
Habitat ad Europæ ruderata, vias, agros. 2
2. ANCHUSA racemis subnudis conjugatis. *Roy. lugdb. angustifolia.*
408.
Borago sylvestris perennis, flore rufo kermesino. *Zan.*
bist. 49. t. 20.
Buglossum angustifolium minus. *Baeh. pin.* 256. *Mon-*
ris. bist. 3. p. 438. f. 11. t. 26. f. 4.
Echii facie Buglossum minimum, flore rubente. *Lob. ic.*
576.
Habitat in Italia, Germania. 2
3. ANCHUSA strigosa, foliis linearibus dentatis, pedi- undulata.
cellis bractea minoribus, calycibus fructiferis inflatis.
Læff.
Buglossum lusitanicum, echii folio undulato. *Tournef.*
inst. 134.
Habitat in Hispaniae, Lusitaniae pratis.
4. ANCHUSA ramis floribusque alternis axillaribus, *orientalis.*
bracteis ovatis.
Anchusa foliis aveniis, floribus solitariis ex alis ramo-
rum, uti rami e caule. *Hort. cliff.* 47. *Roy. lugdb.*
494.
Buglossum orientale, flore luteo. *Tournef. cor.* 6. *Buxb.*
cent. 3. p. 17. t. 29. *Dill. elth.* 60. t. 52. f. 60.
Habitat in Oriente. 2
5. ANCHUSA floribus sparsis, caule glabro. *virginiana,*
Anchusa lutea minor, quam alii Paccoon vocant. *Gron.*
virg. 19.

Anchusa minor lutea virginiana, Puccoon indigenis dicta,
qua se pingunt americani. *Pluk. alm.* 30.

Lithospermum virginianum, flore luteo dupli ampliori.

Moris. hist. 3. p. 447. f. 11. t. 28. f. 4.

Habitat in Virginia. ♀

sempervirens 6. ANCHUSA pedunculis diphyllis capitatis.

Anchusa scapis diphyllis. *Hort. cliff.* 47. *Roy. lugdb.* 407.

Buglossum latifolium sempervirens. *Baub. pin.* 256.

Moris. hist. 3. p. 437. f. 11. t. 26. f. 2.

Habitat in Anglia, Hispania. ♀

CYNOGLOSSUM.

officinale. 1. CYNOGLOSSUM staminibus corolla brevioribus,
foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus.

Cynoglossum foliis lanceolato-ovatis, corollis calycem
æquantibus. *Roy. lugdb.* 406. *Fl. suec.* 154. *Mat. med.* 154.

Cynoglossum foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 47.

Cynoglossum majus vulgare. *Baub. pin.* 257.

Habitat in Europæ ruderatis. ⊖

virginianum 2. CYNOGLOSSUM foliis amplexicaulibus ovatis.

Cynoglossum foliis amplexicaulibus. *Gron. virg.* 19.
Habitat in Virginia. ⊖

cheirifolium 3. CYNOGLOSSUM corollis calyce duplo longioribus,
foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 406. *Sauv. monsp.* 64.

Cynoglossum creticum, argenteo angusto folio. *Baub.*
pin. 257. *Hort. cliff.* 47.

Cynoglossum creticum 1. *Clus. hist.* 2. p. 162.

Habitat in Creta, Hispania. ⊖

Corollæ albi venis sanguineis.

apeuinum. 4. CYNOGLOSSUM staminibus corollam æquantibus.

Hort. upf. 33. *Sauv. monsp.* 64.

Cynoglossa montana maxima frigidarum regionum. *Col.*
ecphr. 1. p. 168. t. 170.

Habitat in alpibus Apenninis, Campoclarenibus, um-
bras. ⊖

linifolium. 5. CYNOGLOSSUM foliis linear-lanceolatis glabris.

Hort. cliff. 47. *Hort. upf.* 33. *Roy. lugdb.* 406.

Cynoglossum minus album, iiii foliis glaucis, semine
umbilicato. *Moris. hist.* 3. p. 449. f. 11. t. 30. f. 11.

β Om-

3. *Omphaloides lusitanica elatior, cynoglossi folio.* *Tournef.*
inst. 140.

Habitat in Lusitania. ②

4. *CYNOGLOSSUM repens, foliis radicalibus cordatis.* *Omphaloide-*
tis. *Hort. cliff. 47.* *Roy. lugdb. 406.*

Borago minor verna repens, folia laxa. *Moris. hist. 3.*
p. 437. f. 11. t. 26. f. 3.

Sympyrum minus, boraginis facie. *Bauh. pin. 209.*
Habitat in Lusitanæ nemorosis. ④

PULMONARIA.

* *Prrianthium longitudine tubi corollæ.*

1. *PULMONARIA* foliis radicalibus lanceolatis. *Hort. angustifolia.*
cliff. 44. *Roy. lugdb. 404.* *Dalib. paris. 60.*

Pulmonaria foliis radicalibus ovato-lanceolatis inferius
decurrentibus. *Böhm. lips. 14.*

Pulmonaria s. pannonica. *Clus. hist. 2. p. 170.*

Habitat in Pannonia, Helvetia, Suecia.

Sequenti nimis affinis, solum foliis angustis distin-
gvenda.

2. *PULMONARIA* foliis radicalibus ovato-cordatis *officinalis,*
scabris. *Hort. cliff. 44.* *Fl. suec. 156.* *Mat. med. 62.*

Roy. lugdb. 403. *Hall. helv. 510.* *Dalib. paris. 60.*

Sympyrum maculosum s. Pulmonaria latifolia. *Bauh.*
pin. 259.

3. *Pulmonaria vulgaris latifolia, flore albo.* *Tournef. inst.*
136.

4. *Pulmonaria non maculosa folio.* *Clus. hist. 2. p. 163.*
Bauh. pin. 259.

Habitat in Europæ nemoribus. ④

* *Calyces tubo corollæ dimidio breviore.*

3. *PULMONARIA* calycibus abbreviatis, foliis lanceo-virginien-
latis obtusiusculis.

Pulmonaria calyce tubo corollæ breviore, perianthiis
quinquepartitis. *Gron. virg. 20.*

Sympyrum s. Pulmonaria non maculata, foliis glabris
acuminatis, flore patulo cæruleo. *Pluk. alm. 359. t.*
227. f. 6. *Moris. hist. 3. p. 444.*

Habitat in Virginia. ④

4. *PULMONARIA* calycibus abbreviatis, foliis radica-fibiria-
libus subcordatis

Habitat in Sibiria. ④

Radix perennis. Folia glabra, glauca: radicalia cordata; carlina ovata. Corymbi ramosi, nutantes Media inter antecedentem & sequentem.

- maritima.* 5. **PULMONARIA** calycibus abbreviatis, foliis ovatis, caule ramoso procumbente.
Cerinthe foliis ovatis petiolatis. *Hort. cliff.* 48. *Roy. lugdb.* 408.
Cerinthe maritima procumbens. *Dill. eth.* 75. t. 65. f. 75.
Cynoglossum procumbens glaucophyllum maritimum. *Pluk. alm.* 126. t. 172. f. 3.
Cynoglossum perenne maritimum procumbens. *Morif. hist.* 3. p. 450. f. 11. t. 28. f. 12.
Habitat in Angliae litoribus siliceis. 2 ♂

SYMPHYTUM.

- officinale* 1. **SYMPHYTUM** foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Hort. cliff.* 47. *Fl. suec.* 155. *Mat. med.* 61. *Roy. lugdb.* 407.
Symphytum Consolida major. *Bauh. pin.* 259.
Habitat in Europæ umbrosis subhumidis. 2
- interosum.* 2. **SYMPHYTUM** foliis summis oppositis.
Symphytum majus, tuberosa radice. *Bauh. pin.* 259.
Symphytum radice tuberosa. *Cam. epit.* 701.
Habitat in Germania australi. 2.
- orientale* 3. **SYMPHYTUM** foliis ovatis subpetiolatis.
Symphytum orientale, folio subretundo alpero, flore cæruleo. *Tournef. cor.* 7.
Symphytum constantinopolitanum, boraginis folio & facie, flore albo. *Tournef. cor.* 7. *Bauh. cent.* 5. p. 36. t. 68.
Habitat juxta Constantinopoli rivulos primo vere. 2

CERINTHE.

- major.* 1. **CERINTHE** foliis amplexicaulibus, fructibus geminis, corollis obtusiusculis patulis.
Cerinthe foliis cordatis sessilibus. *Hort. cliff.* 48. *Hort. upf.* 35. *Roy. lugdb.* 408.
Cerinthe foliis caulem amplexantibus, dentibus floris revolutis brevissimis. *Hell. helv.* 515.
Cerinthe flore rubro purpurascente. *Bauh. pin.* 258.
β. Cerinthe, flavo fiore, asperior. *Bauh. pin.* 258.
Habitat in Europa australi. ♂

2. **CE-**

1. CERINTHE foliis amplexicaulibus emarginatis, fructibus maculatis.
Cerinthe f. *Cynoglossum montanum majus*. *Baub. pin.*
258.?
Habitat in montanis Europæ australis. D. Monti.
Differet a C. minore, cui flore convenit, quod major &
folia maculata emarginata.
3. CERINTHE foliis amplexicaulibus integris, fructibus minoribus
geminis, corollis acutis clausis.
Cerinthe foliis caulem amplexantibus, floribus profunde
quiuefidiis. *Hall. helv.* 516.
Cerinthe minor. *Baub. pin.* 258.
Cerinthe minor f. quarta. *Clus. hist.* 2. p. 168.
Habitat in Austriæ, Styriæ agris. ◎
Præcedenti maxime affinis, at Corolla non quinquefida.
præcedentis vero tantum margine quinqueloba.
4. CERINTHE foliis lanceolato-linearibus hispidis, se-
minibus quaternis distinctis. *Hort. cliff.* 48. *Roy. lugd.* 403.
Anchusa lutea minor. *Baub. pin.* 255.
Anchusa echoioides lutea, cerinthæ flore, montana. *Col.*
ecphr. 1. p. 182. t. 183.
5. Anchusa lutea major. *Baub. pin.* 255.
Anchusa tertia. *Cam. epit.* 736.
Anchusa lutea. *Dalech. hist.* 1102.
*Habitat in Austriæ, Pannoniæ, Helvetiæ, Galliæ, Ita-
lie rupibus. 4*

BORAGO.

1. BORAGO foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Hort. upf.* 34. *Mat. med.* 63. *officinalis.*
Borago calycibus patentibus. *Hort. cliff.* 44. *Roy. lugd.* 403. *Dalib. paris.* 61.
Buglossum latifolium, Borago. *Baub. pin.* 256.
*Habitat hodie in Normannia ad Colbeck & alibi in Eu-
ropa; venit olim ex Aleppo. ◎*
2. BORAGO foliis ramificationum oppositis, calycinis foliis sagittatis.
Borago calycinis foliis sagittatis erectis *Hort. cliff.* 45.
fl. zeyl. 11. *Roy. lugd.* 403.
Cynoglōssoides folio caulem amplexante. *Isnard. act.*
1718. p. 325. f. 10.
Anchusæ degeneris facie, indicæ orientalis herba, quadri-
capsularis. *Pluk. alm.* 30. t. 76. f. 3.
Habitat in India Orientali. ◎

3. BO-

- africana.* 3. *BORAGO* calycinis foliolis ovatis acutis erectis. *Hort. cliff.* 45. *Roy. lugdb.* 403.
Cynoglossoides africana verrucosa & hispida. *Izard.* act. 1718. p. 325. t. 11.
Cynoglossum, boraginis folio & facie, æthiopicum. *Pink. alm.* 34.
Habitat in Æthiopia. ⊖
Affinis est admodum antecedenti.
- orientalis.* 4. *BORAGO* calycibus tubo corollæ brevioribus, foliis cordatis. *Hort. cliff.* 45. *Roy. lugdb.* 403.
Borago constantinopolitana, floræ reflexo cæruleo, calyce velicario. *Tournef. cor.* 6. *itin.* 523. *t. 523. Buxb. cent.* 5. *pag.* 16. *t. 30.*
Habitat circum Constantinopolin. ♀

ASPERUGO.

- procumbens.* 1. *ASPERUGO.* *Fl. lapp.* 76. *Fl. suec.* 159. *Hort. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 404. *Hall. helv.* 522. *Dalib. pars.* 61.
Buglossum sylvestre, caulis procumbentibus. *Bauh. pin.* 257. *Morif. hist.* 3. *p.* 439. *f. 11. t. 26. f. 13.*
Habitat in Europæ ruderatis pinguis. ⊖

LYCOPSIS.

- vesicularia.* 1. *LYCOPSIS* foliis integerrimis, calycibus fructescensibus inflatis pendulis. *Hort. cliff.* 44. *Hort. upf.* 35. *Roy. lugdb.* 403.
Echioides flore pullo. *Riv. mon.* 11.
Buglossum procumbens annum, pullo minimo flore. *Morif. hist.* 3. *p.* 439. *f. 11. t. 26. f. 11.*
Habitat in Europæ australi. ⊖
- variegata.* 2. *LYCOPSIS* foliis repandis dentatis callosis, caule decumbente, corollis cernuis. *Hort. upf.* 24.
Lycopsis foliis repando-dentatis. *Hort. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 404.
Buglossum creticum verrucosum. *Stiff. bot.* 57. *t. 57.*
Buglossum annum humile, bullatis foliis, flore cæruleo eleganter variegato. *Morif. hist.* 3. *p.* 439. *f. 11. t. 26. f. 10.*
Habitat in Creta. ⊖
- egyptiaca.* 3. *LYCOPSIS* foliis calloso-verrucosis, caule diffuso, corollis regularibus.
Habitat in Ægypto. ⊖

- 4 LYCOPSIS foliis lanceolatis hispidis, calycibus flore- *arvensis*.
scentibus erectis, *Fl. lapp.* 77. *Fl. suec.* 157. *Hort.*
cliff. 44. *Roy. lugdab.* 404. *Gron. virg.* 20. *Dalib. paris.* 61.
Buglossum minus sylvestre. *Bauh. pin.* 257.
Habitat in Europæ agris. ◎
- 5 LYCOPSIS foliis ovatis integerrimis scabris, calyci- *orientalis*.
bus erectis.
Buglossum orientale angustifolium, flore parvo cæruleo.
Tournet. cor. 6.
Habitat in Oriente. ◎
- 6 LYCOPSIS foliis linear-lanceolatis confertis tomen- *virginica*.
tolis mollibus, caule erecto. *Gron. virg.* 140.
Habitat in Virginia ad vias. ♀

ECHIUM.

- 1 ECHIUM caule fruticoso. *Hort. cliff.* 43. *Roy. lugdab.* *fruticosum.*
407.
Echium africanum fruticans, foliis pilosis. *Comm. hort.*
2. pag. 107. t. 54.
Habitat in Æthiopia. ♂
- 2 ECHIUM corollis vix calycem excedentibus mar- *italicum*.
gine villosis. *Hort. upf.* 35.
Echium majus & asperius, flore albo. *Cam. epit.* 738.
- β. Lycopsis. *Bauh. pin.* 255.
Habitat in Anglia, Italia.
- 3 ECHIUM caule simplici erecto, foliis caulinis lance- *vulgare*.
olatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. *Hort. cliff.*
43. *Fl. suec.* 158. *Roy. lugdab.* 407. *Dalib. paris.* 61.
Echium vulgare. *Bauh. pin.* 254. *Clus. hist.* 2. p. 143.
Habitat in Europa ad vias & agros. ♂
- 4 ECHIUM calycibus fructescientibus distantibus, caule *creticum*.
procumbente. *Hort. upf.* 35.
Echium caule simplici, foliis caulinis linearibus, floribus
spicatis ex alis. *Hort. cliff.* 43.
Echium creticum angustifolium rubrum. *Bauh. pin.* 254.
Echium creticum latifolium rubrum. *Bauh. pin.* 254.
Echium creticum 1. 2. *Clus. hist.* 2. p. 165.
Habitat in Creta. ◎
Stamina non longiora labio breviore corolla.
- 5 ECHIUM caule ramoso, foliis caulinis ovatis, floribus *orientale*.
solitariis lateralibus. *Hort. cliff.* 43. *Roy. lugdab.* 407.
Echi-

Echium orientale, verbasci folio, flore maximo campa-
nulato *Tournef. cor. 6. itin. 3. pag. 94.*
Habitat in Oriente.

Iusitanicum. 6. **ECHIUM** corollis stamine longioribus.

Echium caule simplici, foliis caulinis lanceolatis sericeis,
floribus spicatis lateralibus. Roy. lugdb. 407.

Echium, amplissimo folio, Iusitanicum. Tournef. inst.
135.?

Habitat in Europa australi. 2

TOURNEFORTIA.

Serrata.

7. **TOURNEFORTIA** foliis ovatis serratis, petiolis spi-
nescentibus, spicis terminatis recurvis.

Pittonia arborescens chamædrifolia major. Plum. gen. 5.

B. Pittonia arborescens chamædrifolia minor Plum. gen. 5
Habitat in America calidioce. 5

Hirsutissima. 2. **TOURNEFORTIA** foliis ovatis petiolatis, caule hir-
suto, spicis ramosissimis terminalibus.

Pittonia hirsutissima & ramosissima, baccis albis. Plum.
gen. 5.

Habitat in America calidioce. 5

Volubilis.

3. **TOURNEFORTIA** foliis ovatis acuminatis, petio-
lis reflexis, caule volubili.

Tournefortia foliis ovatis acuminatis. Hort. cliff. 48.
Pittonia scandens, baccis niveis: nigris maculis notatis.

Plum. gen. 5.

Bryonia nigra fruticosa, racemi ramulis varie implicatis
Sloan. hist. 1. p. 234. t. 143. f. 2.

Virga aurea americana frutescens glabra, foliis subtus
cæsis. Pluk. alm. 389. t. 255. f. 6. Raj. suppl. 348.

Habitat in Jamaica, Mexico, arbores scandens. 5

fœtidissima. 4. **TOURNEFORTIA** foliis ovato-lanceolatis, spicis
ramosissimis pendulis.

Tournefortia foliis ovato-lanceolatis. Hort. cliff. 48.
Roy. lugdb. 408.

Pittonia racemosa, nicotianæ foliis fœtidissimis. Plum.
gen. 5.

Heliotropium maximum jamaicense, limonii mali folio
supra scabro subtus lanugine ferruginea molli. Pluk. alm.

182. Moris. hist. 3. p. 452.

Habitat in Mexico, Jamaica. 5

5. TOUR-

- 5 TOURNEFORTIA foliis lanceolatis sessilibus, spiculis simplicibus recurvis lateralibus.
Pittonia humilis, anchusæ folio. *Plum. gen.* 5.
Habitat in America calida. ♂
- 6 TOURNEFORTIA foliis ovatis integerrimis nudis, glabra.
spicis cynotis.
Heliotropii flore frutex, folio maximo oblongo acuminato glabro. *Sloan. jam.* 173. *hist.* 2. p. 109. t. 212
f. 2. Raj. dendr. 76.
Habitat in Jamaica. ♂
7. TOURNEFORTIA foliis lanceolatis, floribus corymbosis, caue herbaceo.
Messerschmidia. *Hort. upf.* 36.
Arguzia montana, *Amm. rutib.* 38.
Habitat in Dauriæ apricis glareosis aridis. 2
Planta dubii etjamnum generis, interim hac relata

DIAPENSIA.

1. DIAPENSIA floribus pedunculatis. *lapponica.*
Diapensia. *Fl. lapp.* 88. t. 1. f. 1. * *Fl. suec.* 172
Habitat in alpibus Lapponicis. 2
2. DIAPENSIA floribus subsessilibus. *helvetica.*
Androsace caulescens, foliis alternis, pedunculis unifloris. *Amoen. acad.* 1. p. 164.
Aretia caulibus teretibus foliis imbricatis, floribus sessilibus. *Hall. helv.* 486. t. 8. f. 4.
Habitat in alpibus Helveticis Gemmi & Pyndnerberg. 2
Habitus antecedentis, fructum non vidi.

ARETIA.

1. ARETIA villosa, scapis unifloris. *Hall. helv.* 486. f. 4. *alpina.*
Habitat in Vallesiæ monte Loch dicto. 2
Fructus anatome nobis deest in hac planta.

ANDROSACE.

1. ANDROSACE perianthiis maximis. *Hort. upf.* 36. *maxima,*
Androsace calycibus fructuum maximis. *Hort. cliff.* 50.
Roy. lugdb. 414.
Androsace foliis lanceolato-ovatis dentatis, calycibus corolla longioribus. *Wachend. ultr.* 28.
Androsace altera. *Cam. epit.* 639. *Clus. hist.* 2. p. 134.
Al sine affinis Androsace dicta major. *Banb. pin.* 251.
Habitat inter Austriæ segetes. ☽

2. AN-

- septentrionalis.* 2. ANDROSACE foliis lanceolatis dentatis glabris, perianthiis angulatis corolla brevioribus. *Fl. suec.* 160. Androsace calyce fructus parvo. *Fl. lapp.* 78. Androsace montana, fiore minore. *Baeh. act.* 2. p. 369. t. 23. f. 2. Alsine verna, androsaces capitulis. *Baeh. pin.* 251. *prod.* 118. Alsine minor, androsaces alterius facie. *Baeh. pin.* 251. *prod.* 118. Alsine adtinis Androsace dicta minor. *Baeh. pin.* 251. • *Habitat in alpibus Lapponiae, Russiae apicis glareosis.* ◎
- villosa.* 3. ANDROSACE foliis pilosis, perianthiis hirsutis. Aretia villosa, floribus umbellatis. *Hall. helv.* 486. Sedum alpinum hirsutum, laetulo flore, *Baeh. pin.* 284. Sedum minus X, alpinum IV. *Clus. hist.* 2. p. 62. *Habitat in alpibus Rheticis, Pyrenaeis.*
- halleri.* 4. ANDROSACE foliis ciliatis. Aietia foliis ciliatis linearibus, floribus umbellatis. *Hall. helv.* 486. t. 7. *Habitat in alpibus Helvetiae.*
- laetea.* 5. ANDROSACE foliis linearibus glabris, umbella involucris multoties longiore. Androsace alpina perennis angustifolia glabra, flore singulari. *Tournef. inst.* 123. Sedum alpinum, gramineo folio, laetulo flore. *Baeh. pin.* 284. *Raj. hist.* 1042. Sedum minus XI. *Clus. hist.* 2. p. 61. *Habitat in Austriæ alpibus.* 2
- carnea.* 6. ANDROSACE foliis subulatis glabris, umbella involucris breviore. Androsace alpina perennis angustifolia glabra & multiflora. *Tournef. inst.* 123. Sedum alpinum, angustissimo folio, flore carneo. *Baeh. pin.* 284. Sedum alpinum ejusdem. *Column. ephr.* 2. p. 64. t. 65. f. 2. Sanicula alpina, angustissimo folio. *Pluk. alm.* 331. t. 108. f. 5. *Habitat in alpibus Pyrenaeis, Helveticis.* 2

PRIMULA.

- veris.* 1. PRIMULA foliis dentatis rugosis. *Hort. cliff.* 51. *Fl. suec.* 161. *Roy. lugd.* 415. *Dalib. paris.* 62. *limbo corollarum concavo.* *mat. med.* 64. Pri-
- officinalis.*

Primula veris odorata, flore luteo simplici. *Baub.* *hist.*

3. p. 495.

Verbasculum pratense odoratum. *Baub.* *pin.* 241.

β. *Primula*. - - - - *limbo corollarum plano*. *elatior.*
Verbasculum pratense vel sylvaticum inodorum. *Baub.*
pin. 241.

Primula veris, pallido flore, elatior. *Clus.* *hist.* 1. p.
321.

γ. *Primula* - - - - *scapo nullo*. *acaulis.*

Primula veris, pallido flore, humilis. *Clus.* *hist.* 1. p. 302.

Verbasculum sylvestre majus, singulari flore. *Baub.* *pin.*
241.

Habitat in Europæ pratis. 2

2. **PRIMULA** foliis crenatis glabris, florum limbo piano. *farinosa.*
Hort. cliff. 50. *Fl. suec.* 162.

Primula foliis crenatis glabris. *Vir. cliff.* 12. *Roy. lugdb.*
415.

Primula foliis erectis fastigiatis. *Fl. lapp.* 79.

Primula veris rubro flore. *Clus.* *pan.* 340.

Verbasculum umbellatum alpinum minus. *Baub.* *pin.*
242.

Habitat in Alpinis frigidisque Europæ pratis uliginosis. 2

3. **PRIMULA** foliis serratis glabris. *Vir. cliff.* 12. *Hort. Anticula.*
aps. 36. *Roy. lugdb.* 415.

Primula foliis serratis carnosis glabris. *Hort. cliff.* 50.

Sanicula alpina lutea. *Baub.* *pin.* 242.

β. *Sanicula alpina purpurea*. *Baub.* p. 242.

γ. *Sanicula alpina*, foliis rotundis. *Baub.* *pin.* 242.

δ. *Sanicula alpina*, flore variegato. *Baub.* *pin.* 242.

ε. *Sanicula alpina angustifolia*. *Baub.* *pin.* 243.

ζ. *Sanicula alpina*, foliis quasi fariua adspersis. *Baub.* *pin.*

243.

Habitat in alpibus Helveticis, Styriacis. 2

4. **PRIMULA** foliis cureiformibus dentatis minimis co-minima,
rolla longe minoribus.

Sanicula alpina minima carnea. *Baub.* *pin.* 243.

Anticula ursi VIII. minima. *Clus.* *hist.* 1. p. 305.

*Habitat in Sneberg, Tauro, Judenberg inque altissimo
monte proprie salinas Austriae superioris, qua tenditur in
Styram.* 2

5. **PRIMULA** foliis linearibus integerrimis; floribus vitaliana.
sessilibus.

Pr-

- Primula flore subsessili, foliis linearibus. *Amer. acad.* 1
p. 160.
Vitaliana. *Sesl. epist.* 69. t. 10. f. 1. *
Sedum alpinum exiguis foliis. *Baub. pin.* 284.
Sedum alpinum & gregorii ragiensis 1. *Column. ecphr.*
2. p. 63. t. 65. f. 1. *Raj. hist.* 1044.
Habitat in alpibus Pyrenæis & Italicis. 2
Calyces longitudine tubi corollæ, ultra medium quinque-
fidi, corollæ limbus quinquefidus, lobis orato oblongis
- Integerrolia*. 6. PRIMULA foliis integerrimis glabris oblongis, caly-
cibus tubulosis obtusis.
Primula foliis glabris carnosis integerrimis. *Hall. helv*
485.
Sanicula alpina rubescens, folio non ferrato. *Baub. pin.*
243.
Auricula ursi IV. *Clas. hist.* 1. p. 303. t. 304.
Habitat in alpibus Helveticis, Styriacis, Pyrenæicis. 2
- cortusoides*. 7. PRIMULA foliis petiolatis cordatis sublobatis crenatis.
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin*.
Herba foliis sequentis, floribus antecedentis.

CORTUSA.

- matthioli*. 1. CORTUSA calycibus corolla brevioribus.
Cortusa foliis cordatis petiolatis. *Hort. cliff.* 50. *Roy. lugdb.*
414.
Cortusa matthioli. *Clas. hist.* 1. p. 307.
Sanicula montana latifolia lacinata. *Baub. pin.* 243.
Habitat in alpibus Austræ, Sibiriæ.
- Gmelini*. 2. CORTUSA calycibus corollam excedentibus. *Amer*
acad. 2. p. 340. *
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin*. 2

SOLDANELLA.

- alpina*. 1. SOLDANELLA. *Hort. cliff.* 49. *Roy. lugdb.* 414.
Hall. helv. 483.
Soldanella alpina rotundifolia. *Baub. pin.* 295. *Moris.*
hist. 2. p. 285. f. 3. t. 15. f. 8.
Soldanella alpina. *Cam. epit.* 254.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Austræ, Pyrenæorum. 2

DODECATHEON.

- Meadia*. 1. DODECATHEON.
Meadia. *Catesb. car.* 3. p. 1. t. 1. Auri-

Auricula ursi virginiana floribus boraginis instar rostratis, cyclaminum more reflexis. *Plak. alm.* 62. t. 79. f. 6.

Habitat in Virginia. ♀

CYCLAMEN.

1. CYCLAMEN corolla retroflexa.

Cyclamen foliis cordatis, corolla reflexa. *Hort. upf.* 47. *europaeum.*
Mat. med. 65.

Cyclamen. *Hort. cliff.* 49. *Roy. lugd.* 414.

Cyclamina omnia 1 --- 13. *Baub. pin.* 308.

Cyclaminus. *Cam. epit.* 357.

Habitat in Austrâ, Tatarâ, Europâ australis nemorosis. ♀

Varietates sic conjungunt plantas folio anguloſo & rotundo, ut vix ac ne vix limites dentur.

2. CYCLAMEN corollæ limbo nutante. *Fl. zeyl.* 401. *indicum.*

Habitat in Zeylona. ♀

MENYANTHES.

1. MENYANTHES foliis cordatis integerrimis, corolis ciliatis. *Nymphoides*

Menyanthes foliis orbiculatis, corollis margine laceris.

Hort. cliff. 53. *Roy. lugd.* 430. *Dalib. paris.* 62.

Nymphaea lutea minor, flore fimbriato. *Baub. pin.* 194.

Habitat in Belgii, Dantœci fossis majoribus. ♀

Umbella simplex, sessilis e latere petioli, ut in sequenti.

2. MENYANTHES foliis cordatis subcrenatis, corolis interne pilosis. *Fl. zeyl.* 72. *indica.*

Nedel-âmbel. *Rheed. mal.* 11. p. 55. t. 28.

Habitat in Malabariâ, Zeylonâ fossis.

3. MENYANTHES foliis ternatis. *Fl. lapp* 80. *Fl. suec.* *trifoliata,* 163. *Hort. cliff.* 52. *Mat. med.* 66. *Roy. lugd.* 430.

Hall. helv. 487. *Dalib. paris.* 62.

Tifolium palustre. *Baub. pin.* 527.

Habitat in Europe paludibus. ♀

HOTTONIA.

- 1 HOTTONIA Boerb. lugd. 1. 207. *Hort. cliff.* 51. *Fl. suec.* *palustris,* 164. *Roy. lugd.* 41. *Hall. helv.* 487. *Dalib. paris.* 63.

Millefolium aquaticum f. *Viola aquatica*, caule nudo.

Baub. pin. 141.

Millefolium aquaticum equisetifolium, caule nudo. Buxb.

pin. 141.

Habitat in jessis & paludibus Europæ borealioris. 2

HYDROPHYLLUM.

virginianum 1. HYDROPHYLLUM Hert. cliff. 44. Roy. lugdb. 413. Gron. virg. 21.

Denariæ facie planta monopetalos, fructu rotundo monopyreno. Morf. hist. 3. p. 599. f. 15. t. 1. f. 1.

Habitat in Virginia. 2

Hydrophyllum verum canadense in aquis natum diversissima planta foliis binis petiolatis palmatis, basi excavatis; lobis acutis lobulo merique laterali terratis, viridibus, facie aceris; Fructificatio hujus mihi ignota est.

LYSIMACHIA.

* *Pedunculis multifloris,*

vulgaris. 1. LYSIMACHIA paniculata, racemis terminalibus.

Lysimachia foliis lanceolatis, racemo composito terminali. Virid. cliff. 415. Fl. suec. 166. Roy. lugdb. 416.

Lysimachia foliis lanceolatis, corymbo terminali. Fl. lapp. 81. Hort. cliff. 50.

Lysimachia lutea major. Buxb. pin. 245.

Habitat in Europa ad ripas & paludes. 2

Ephemeronum. 2 LYSIMACHIA racemis simplicibus terminalibus, petalis obtusis, flaminibus corolla brevioribus.

Lysimachia racemo simplici terminali, foliis lanceolato-linearibus. Vir. cliff. 13. Hort. cliff. 3. Roy. lugdb. 415.

Lysimachia spicata purpurea minor. Buxb. cent. 1. p. 22. t. 33.

Lysimachia orientalis minor, foliis glaucis. Till. pis. 106. t. 40. f. 2.

Habitat in Media. ⊖

Conf. Ephemeronum matthioli. Buxb. pin. 244. Buxb. hist. 2. p. 905. Dod. pentap. 203.

Convenit cum L. atropurpurea habitu, structura, glauco colore. Differt Petalis obtusis, putulis, staminibus corolla brevioribus, floribus pedicillo injidentibus; cunctilia Petala gerit acuminate, calyce paula longiora, convenientia saturate rubra; stamina corolla longiora, antheris fuscis; Flores in spicam sessiles; interim maxime affines sunt.

3. LYSIMACHIA spicis terminalibus patulis lanceola- *atropurpurea*
tis, staminibus corolla longioribus.
Lysimachia foliis lanceolato-linearibus caulem & ramos
spica ovata terminante. *Hort. cliff.*, 51.
Lysimachia foliis lanceolato-linearibus, spicis terminali-
bus. *Roy. lugdb.* 415. *Flor. upf.* 37. *
Lysimachia orientalis angustifolia. *Comm. rar.* 93. t. 33.
Habitat in Oriente. ◎
4. LYSIMACHIA racemis lateralibus pedunculatis. *thyrsiflora*.
Lysimachia racemis simplicibus lateralibus. *Virid. cliff.*
13. *Fl. suec.* 167. *Roy. lugdb.* 416.
Lysimachia ex alis foliorum thyrsifera. *Fl. lapp.* 82.
Hort. cliff. 52.
Lysimachia bifolia, flore globo luteo. *Bauh. pin.* 242.
Lysimachia lutea. *Clus. hist.* 2. p. 53. f. 12.
Habitat in Europa, in paludibus. 2
- * *Pedunculis unifloris.*
5. LYSIMACHIA foliis quaternis subsessilibus, peduncu- *quadrifolin.*
lis quaternis unifloris.
Lysimachia foliis ovato-acutis quaternis. *Gron. virg.* 20.
Anagallis marina lutea, foliis latis stellatis. *Pet. gaz.* 5.
t. 2. f. 5.
Anagallis lutea foliis & floribus ex eodem exortu qua-
tuor ex æqualibus furculorum intervallis cruciatim
positis. *Plnk. mant.* 12.
Habitat in Virginia.
6. LYSIMACHIA foliis subquaternis, pedunculis verti- *punctata*.
cillatis unifloris.
Lysimachia foliis lanceolatis, floribus solitariis. *Hort.*
cliff. 52. *Roy. lugdb.* 416. *Gron. virg.* 20.
Lysimachia lutea minor, foliis nigris punctis notatis. *Bauh.*
pin. 245.
Lysimachia lutea 11. *Clus. hist.* 2. p. 52. f. 2.
Blattariae affinis planta minor, flore luteo, foliis nigris
punctis notatis. *Moris. hist.* 2. p. 491. f. 5. t. 10. f. 15.
Habitat in Hollandia inter arundines.
7. LYSIMACHIA petiolis ciliatis, floribus cernuis. *ciliata*.
Lysimachia foliis ovato-lanceolatis subcordatis, petiolis
marginé utrinque lanatis, flore solitario. *Wach. ultr.*
390.
Lysimachia canadensis, jalappa foliis. *Sarac. canad.*
Walsh. hort. 32. t. 12.

Habitat in Virginia, Canada.

Caulis erectus. Folia opposita, oblongo-ovata, integerima, acuta, glabra: nervis lateralibus; petioli canaliculati, ciliati. Pedunculi solitarii, uniflori, nudi.

Linum stellatum. 8. LYSIMACHIA calycibus corollam superantibus, caule erecto ramosissimo. *Roy. lugdb.* 416. *Hort. upf.* 37. *Sauv. monsp.* 130.

Linum ininjuminum stellatum. *Bauh. pin.* 214. *prodr.* 107. *Magn. monsp.* 163. *t.* 162.

Habitat in Gallia. ☺

nemorum. 9. LUSIMACHIA foliis ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 52. *Roy. lugdb.* 416.

Anagallis lutea nemorum. *Bauh. pin.* 252. *Morif. hist.* 2. *p.* 569. *f.* 5. *t.* 26. *f.* 5.

Anagallis. *Clus. hist.* 2. *p.* 182.

Habitat in Germaniæ, Galliæ, Angliæ nemoribus glareosis.

Nummularia-ria. 10. LYSIMACHIA foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. *Vir. cliff.* 13. *Hort. cliff.* 52. *Fl. suec.* 168. *Mat. med.* 67. *Roy. lugdb.* 416. *Hall. helv.* 481.

Nummularia major lutea. *Bauh. pin.* 309.

Anagallis mas. *Cam. epit.* 394.

Habitat in Europa juxta agros & scrobes. ✎

tenella. 11. LYSIMACHIA foliis ovatis acutiusculis, pedunculis folio longioribus, caule repente.

Lysimachia foliis subrotundis, floribus solitariis longe pedunculatis. *Gnott. stamp.* 2. *p.* 119.

Lysimachia foliis orbiculatis planis, floribus solitariis rubellis, caule repente. *Sauv. monsp.* 135.

Nummularia minor, purpurascente flore. *Bauh. pin.* 310. *prodr.* 139. *Morif. hist.* 2. *p.* 567. *f.* 5. *t.* 26. *f.* 2.

Habitat in Galliæ, Angliæ humidis.

ANAGALLIS.

arvensis. 1. ANAGALLIS foliis indivisis, caule procumbente. *Anagallis foliis indivisis.* *Roy. lugdb.* 416. *Fl. suec.* 169. *Anagallis foliis ovatis.* *Hort. cliff.* 52. *Anagallis phœnico flore.* *Bauh. pin.* 252. *Habitat in Europæ arvis.* ☺

monelli. 2. ANAGALLIS foliis indivisis, caule erecto. *Anagallis foliis lanceolatis.* *Hort. cliff.* 52. *Hort. upf.* 38.

Ana-

Anagallis cærulea, foliis binis ternisve ex adverso na-
scientibus. *Baub.* pin. 252.

Anagallis tenuifolia monelli. *Clus.* app. alt.

Habitat - - - - ⊖

3. ANAGALLIS foliis cordatis amplexicaulibus, cauli- *latifolia*.
bus compressis.

Anagallis hispanica latifolia, maximo flore. *Tournef.*
inst. 143.

Cruciata montana minor, flore cæruleo. *Barr.* ic. 584.

Habitat in Hispania. *Løsl.* ⊖

Caulis erecto-patens, brachiatus, ramosus, quadrangularis: angulis oppositis triplo latoe, angustioribus vero margine acuto utrinque septis. Folia subcordata, maxime sessilia & amplexicaulia, basi deorsum spectantia, obtusiuscula, nervosa, glabra, subtus paliæ punctata. Peduncuii axillares, solitarii, uniflori, nudæ, teretes, corolla cærulea, fundo purpurascente. Filamenta purpurea; Antheris oblongis flavis. Notabilis foliis magnis & latis, caule compresso, *A. arvensi* attamen valde affinis.

4. ANAGALLIS foliis sinuatis. *Roy. lugdb.* 416. † *capensis*.

Anagallis purpurea, bursæ palloris foliis minoribus. *Pet.*
mus. 245.

Habitat ad Caput b. spei.

THEOPHRASTA.

1. THEOPHRASTA. *Roy. lugdb.* 528.

americana.

Eresia foliis aquifolii longissimis. *Pluk.* gen. 8.

Habitat in America æquinoctiali. ♂

Caudex nudus, simplicissimus, apice frondosus ut in *Pal-*
mis. Folia lanceolata, longissima, dentata nervis undu-
latis; omnia ex apice caudicis undique diffusa. Fructi-
ficationes ramosæ, diffusæ, inter folia ad apicem carnis.

PATAGONULA.

1. PATAGONULA †

americana.

Patagonica foliis partim ferratis partim integris. *Dill.*
elth. 306. t. 226. f. 293.

Habitat in Patagonia Americes australis. ♂

SPIGELIA.

1. SPIGELIA.

Anthelmia.

Arapabaca quadrifolia, fructu testiculato. *Plum.* gen. 11.
Barr. equin. 15.

Ara-

Arapabaca brasiliensisibus dicta planta. Marcgr. braf. 46.
Habitat in Cajennia, Brasilia.

Caulis simplex, herbaceus. Folia terminalia, quatuor, lanceolata. Folia caulina alia duo opposita. Ramus ex ala singula folii caulinis solitarius, cauli simillimus, terminatus foliis quatuor cruciatim positis, ut in caule. Ramæ terminales solitarii in caule & ramis.

OPHIORRHIZA.

Mungos.

1. OPHIORRHIZA foliis lanceolato-ovatis.
Ophiorrhiza. Fl. zeyl. 402. Mat. med. 79. t. 1. Amœn. acad. 2. p. 118.
Habitat in India orientali. 2
Conf. Limonium mauritanicum, flore minimo, caule folioso. Pet. gaz. 66. t. 41, f. 12.

Mitreola.

2. OPHIORRHIZA foliis ovatis.
Mitreola. Hort. cliff. 492. Gron. virg. 28.
Mitra. Houbl. mss. t. bon. 1.
Habitat in America meridionali.

AZALEA.

in lica.

1. AZALEA floribus subsolitariis, calycibus pilosis.
Chamærhododendron exoticum, amplissimis floribus liliaceis. Breyz. prodr. 1. p. 23.
Cistus indicus, ledi alpini foliis, floribus amplis. Herm. lugdb. 152. t. 153. Raj. hist. 1895.
Tsutsusi. Kœmpf. amœn. 845. t. 846.
Habitat in India. 5

pontica.

2. AZALEA arborea. †
Chamærhododendros pontica maxima, mespili folio, flore luteo. Tournef. cor. 42. Buxb. cent. 5. p. 36. t. 69.
Habitat in Ponto, Trapezunte. 6

lutea.

3. AZALEA foliis ovatis, corollis pilosis, staminibus longissimis.
Azalea ramis infra flores nudis. Gron. virg. 21.
Azalea scapo nudo, floribus confertis terminalibus, staminibus declinatis. Hor. cliff. 69.
Azalea erecta, foliis ovatis integris alternis, flore luteo piloso præcoci. Cold. ebor. 25.
Cistus virginiana, periclymeni flore ampliori minus odorato. Pluk. mant. 49.
Habitat in Virginia. 5

PENTANDRIA MONOGYNIA. 151

4. AZALEA foliis margine scabris, corollis piloso-glu-^{rifosa}
tinosis.
Azalea ramis infra flores foliosis. *Gron. virg.* 21. *Cold.*
ebor. 24.
Ciltus virginiana, flore & odore periclymeni. *Pluk. aln.*
106 t. 161. f. 4. *Catesb. car.* 1. p. 57. t. 57.
Habitat in Virginia. ♂
5. AZALEA foliis adspersis punctis excavatis. ^{lapponica.}
Azalea ramis compositis suberectis. *Fl. suec.* 171.
Azalea maculata ferruginea subtus adspersa. *Fl. lapp.* 89.
t. 6. f. 1.
Habitat in Alpibus Lapponiæ. ♂
6. AZALEA ramis diffuso procumbentibus. *Fl. lapp.* 90. *procumbens.*
t. 6. f. 2. *Fl. suec.* 170. *Hill. helv.* 416.
Chamærhododendros spinæ ferruginea, thymi folio,
alpina. *Bocc. mus.* 2. p. 64. t. 53.
ChamæCiltus serpyllifolia, floribus catneis. *Baeh. pin.*
466.
Habitat in Alpibus Europeæ. ♂

PLUMBAGO.

1. PLUMBAGO foliis amplexicanibus. *Hort. cliff.* 53. *europaea.*
Mat. med. 75. *Roy. lugdb.* 417. *Sauv. monsp.* 63.
Lepidium Dentillaria dictum. *Baeh. pin.* 97.
Tripolium dioscoridis, *Col. ecphr.* 1. p. 160. t. 161.
Habitat in Europa australi. ♀
2. PLUMBAGO foliis petiolatis. *Hort. cliff.* 53. *Hort. zeylanica.*
ups. 43. *Fl. zeyl.* 73. *Roy. lugdb.* 417.
Dentiliaria lychnoides sylvatica scandens, flore albo.
Sloan. hist. 1. p. 211. t. 133. f. 1.
Lychnis indica spicata, ocymastræ foliis, fructibus lappa-
ceis oblongis, radice urente. *Comm. hort.* 2. p. 169.
t. 5.
Habitat in India utraque. ♀

PHLOX.

1. PHLOX foliis lanceolatis margine scabris, corymbis paniculatis,
compositis,
Lysimachia virginiana umbellata maxima, lysimachia
luteæ floribus amplioribus, *Pluk. mant.* 121.?
Habitat in America septentrionali. *Collinson.* ♀
Planta magna, alta. Caulis levis, obtusus. Folia lato-
lanceolata: margine Aculeis minutissimis sparsis exa-

sperata. Corymbi conserti in umbellam Floribus numerosissimis.

- maculata*. 2. PHLOX foliis cordato-lanceolatis levibus.
Lychnoides marilandica, foliis binis oppositis basi & auriculis caulem utrinque amplexantibus. *Raj. suppl.* 489.?
Habitat in Virginia. Kalm. 2
Plantæ caulis teretiusculus, subscaber, rubro viridique undique tenuissime maculatus, erectus. Folia levia, e basi amplexicauli cordata, elongata in lanceolatum sensim acutius. Flores in Racemum compositum digesti.
- pilosa*. 3. PHLOX foliis lanceolatis villosis, caule erecto, corymbo terminali.
Lychnoides marilandica, calycibus lanuginosis, foliis augustis acutis. *Raj. suppl.* 490.
Lychnidea umbellifera, blattariæ accedens virginiana, major repens pseudomelanthii foliis pilosis, flore pentapetaloidè fistuloso. *Pluk. alm.* 133. t. 98. f. 1.
Habitat in Virginia. 2
- glaberrima*. 4. PHLOX foliis linear-lanceolatis glabris, caule erecto, corymbo terminali. *Hort. cliff.* 63. *Rov. lugdb.* 433. *Gron. virg.* 21.
Lychnidea folio melampyri. *Dill. elth.* 203. t. 166. f. 202.
Habitat in Virginia. 2
- divaricata*. 5. PHLOX foliis lato-lanceolatis: inferioribus alternis, caule ramoso.
Lychnidea virginiana, alsines aquaticæ foliis, floribus in ramulis divaricatis. *Pluk. mant.* 121?
Habitat in Virginia.
Plantæ Caules erectiusculi. Folia lanceolata s. ovato-lanceolata, oleracea & molliuscula, glabra aut parum pilosa: superiora opposita, inferiora alterna. Rami alterni, basi divaricati. Corollæ cæruleæ.
- ovata*. 6. PHLOX foliis ovatis, floribus solitariis.
• Lychnidea fistulosa marilandica, clinopodii vulgaris folio, flore ample singulari. *Pluk. mant.* 122. t. 348. f. 4.
Habitat in Virginia. 2
- subulata*. 7. PHLOX foliis subulatis hirsutis, floribus oppositis.
Lych-

Lychnidea, *blattariæ accedens virginiana*, *minor repens*,
hi: satis camphoratæ foliis. *Pluk. alm.* 233. *t. 98. f. 2.*
Habitat in Virginia.
Corollæ lobi emarginati & tubus calyce duplo longior est.

8. PHLOX foliis linearibus villosis, pedunculis ternis. *sibirica.*

Annen. acad. 2. *p. 342.*

Habitat in Asia borealis. 2

*Lobi Corollæ rotundatæ integræ & calyces longitudine
 tubi corollæ.*

9. PHLOX foliis setaceis glabris, floribus solitariis. *setacea.*

Lychnidea, *blattariæ accedens virginiana*, *camphoratæ
 congeneris*, *glabris foliis*. *Pluk. alm.* 233. *t. 98. f. 3.*

Habitat in Virginia.

CONVOLVULUS.

* *Caule volubili.*

1. CONVOLVULUS foliis sagittatis utrinque acutis, *arvensis.*
 pedunculis unifloris. *Fl. suec.* 173. *Dalib. paris.* 65.

Convolvulus foliis sagittatis utrinque acutis. Hort. cliff.
 66. *Roy. lugdb.* 427.

Convolvulus minor arvensis. Baub. pin. 294.

Habitat in Europæ agris. 2

2. CONVOLVULUS foliis sagittatis postice truncatis, *sepium.*
 pedunculis unifloris. *Roy. lugdb.* 427. *Fl. suec.* 174.

Dalib. paris. 65.

Convolvulus foliis sagittatis postice truncatis. Hort. cliff.
 66.

Convolvulus major albus. Baub. pin. 294.

Habitat in Europæ sepibus. 2

3. CONVOLVULUS foliis sagittatis postice truncatis, *Scammonis.*
 pedunculis bifloris. *Roy. lugdb.* 427. *Mat. med.* 82.

Convolvulus syriacus f. Scammoniaca syriaca. Moris.
 bift. 2. p. 12. f. 1. t. 3. f. 5.

Scammonia syriaca. Baub. pin. 294.

Habitat in Syria, Mylia, Cappadocia. 2

4. CONVOLVULUS foliis cordatis integris panduriformibusque, *panduratus.*
 calycibus lævibus.

Convolvulus foliis inferioribus cordatis, superioribus tri-
*lobis, calycibus pedunculis petiolisque glabris, caule
 rubescente. Gron. virg.* 141.

Habitat in Virginie arenosis.

- convolvulus.* 5. CONVOLVULUS foliis cordatis integris trilobis-que villosis, calycibus laevibus, capsulis hirsutis, pedunculis subbifloris.
Convolvulus, folio hederaceo, arvensis, flore dilute purpureo. *Dill. elth.* 100. *t.* 84. *f.* 98.
Habitat in Carolina. ✕
Pedunculi uniflori aut biflori.
- hederaceus.* 6. CONVOLVULUS calycibus tuberculatis pilosis.
Virid. cliff. 18. *Hort. upf.* 38. *Gron. virg.* 141.
Roy. lugdb. 428.
Convolvulus aunuus, foliis cordatis rarius trilobis, calyce tuberculato piloso. *Hort. cliff.* 67.
Convolvulus purpureus, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 295.
β. Convolvulus cæruleus minor, folio subrotundo. *Dill. elth.* 97. *t.* 82. *f.* 94.
γ. Convolvulus flore purpureo, calyce punctato. *Dill. elth.* 99. *t.* 83. *f.* 96.
δ. Convolvulus flore minore lacteo fundo atrorubente. *Dill. elth.* 98. *t.* 83. *f.* 95.
ε. Convolvulus folio cordato glabro, flore vilolaceo. *Dill. elth.* 100. *t.* 84. *f.* 97.
ζ. Convolvulus cæruleus, hederaceo anguloso folio. *Bauh. pin.* 295. *Dill. elth.* 96. *t.* 80. *f.* 91.
η. Convolvulus cæruleus, hederaceo folio magis anguloso. *Dill. elth.* 96. *t.* 80. *f.* 92.
Convolvulus cæruleus major, folio hederaceo. *Dill. elth.* 97. *t.* 81. *f.* 93.
Habitat in Asia, Africa, America. ☉
Pedunculi in aliis uniflori, in aliis triflori s. multiflori, limites autem inter singulas α---η vix occurunt.
- Batatas.* 7. CONVOLVULUS foliis cordatis angulato-nervosis, caule repente tuberrifero.
Convolvulus foliis cordatis angulatis, radice tuberosa.
Hort. cliff. 67. *Roy. lugdb.* 427.
Convolvulus radice tuberosa cicutenta &c. *Catesb. car.* p. 60. *t.* 60.
Convolvulus indicus orientalis Inhame f. Batatas. *Morris. bist.* 2. p. 11. *f.* 1. *t.* 3. *f.* 4.
Convolvulus indicus vulgo Patates dictus. *Raj. bist.* 728.
Batatas. *Bauh. pin.* 91.
Kappa kelengu. *Rheed. mal.* 7. p. 95. *t.* 50.
Habitat in India utraque. ✕
Conf. Convolvulus indicus vulgo Patates dictum. *Fewer.* 3. p. 16. *t.* 11. foliis palmatis.

8. CONVOLVULUS foliis cordatis, pedunculis unifloris bellatis.

Convolvulus americanus, vulgari folio, capsulis triquetris numerosis. *Pluk. alm.* 114. t. 107. f. 1.

Convolvulus luteus polyanthos. *Plum. amer.* 88. t. 102.

Convolvulus polyanthos, folio subrotundo, flore luteo. *Sloan. jam.* 55.

Habitat in Martinica, Domingo, Jamaica. ♀

9. CONVOLVULUS foliis cordatis glabris, caule perenni villoso.

Convolvulus foliis cordatis acuminatis, caule arboreo scandente. *Roy. lugdb.* 429.

Kattu-kelengu. *Rheed. mal.* 11. p. 105. t. 5. *Raj. Suppl.* 376.

Habitat in Malabaricæ arenosis. ♂

10. CONVOLVULUS foliis cordatis pubescentibus, canariensis.

caule perenni villoso. pedunculis multifloris.

Convolvulus foliis cordatis, caule fruticoso villoso. *Vir. cliff.* 18. *Hort. cliff.* 67. *Roy. lugdb.* 428.

Convolvulus canariensis sempervirens, foliis mollibus & incanis. *Comm. hort.* 2. p. 101. t. 51.

Convolvulus canariensis, foliis longioribus mollibus incanis. *Pluk. alm.* 114. t. 325. f. 1.

Habitat in Canarlensibus insulis. ♂

11. CONVOLVULUS foliis cordatis, caule aculeato. *aculeatus*.

Hort. cliff. 496.

Convolvulus americanus, subrotundis foliis, viticulis spinosis. *Pluk. alm.* 115. t. 276. f. 3.

Convolvulus maximus, caule spinulis obtusis obsito. *Sloan. jam.* 55. *hist.* 1. p. 151. t. 96. f. 1? *Raj. suppl.* 371?

Smilax aspera indiæ occidentalis. *Bauh. pin.* 296.

Habitat in America calidiore. ♂

12. CONVOLVULUS foliis cordatis angulatis, caule *Turpethum*.

membranaceo quadrangulari, pedunculis multifloris.

Fl. zeyl. 74. *Mat. med.* 84.

Convolvulus zeylanicus alatus maximus, foliis ibisci nonnihil similibus angulosis. *Herm. lugdo.* 117. t. 178.

179.

Turpethum repens, foliis althææ vel indicum. *Bauh.* *pin.* 149.

Habitat in Zeylona. ♀

- tomentosus.* 13. CONVOLVULUS foliis trilobis tomentosis, caule lanuginoso.
Convolvulus folio lanato in tres lacinias diviso, flore oblongo purpureo. *Slyan. jam. 55. hift. 1. p. 154. t. 98. f. 2. Raj. suppl. 381.*
Convolvulus jamaicensis trilobis, foliis tomentosa lanagine densiori ac veluti instar utrinque obductis. *Plak. alm. 115. t. 167. f. 4.*
Habitat in Jamaica.
- althæoides.* 14. CONVOLVULUS foliis palmatis cordatis sericeis: lobis repandis, pedunculis bifloris.
Convolvulus foliis cordato-digitatis sericeis: foliolis linearibus: intermediis duplo longioribus. *Vir. cliff. 18. Roy. lugdb. 429. Sauv. monsp. 202.*
Convolvulus foliis ovatis divisis basi truncatis: laciniis intermediis duplo longioribus. *Hort. cliff. 67.*
Convolvulus argenteus, folio althææ. *Bauh. pin. 295.*
Convolvulus, betonicæ althææque foliis, repens argenteus. *Barr. rar. 5. t. 312.*
 15. *Convolvulus argenteus* elegantissimus, foliis tenuiter incisis. *Tournef. inst. 85.*
Habitat in Europa meridionali.
- paniculatus.* 15. CONVOLVULUS foliis palmatis: lobis septem ovatis acutis integerrimis, pedunculis paniculatis.
Pal-modecca. Rheed. mal. 11. p. 101. t. 49. Raj. suppl. 374.
Habitat in Malabariæ arenosis.
- Medium.* 16. CONVOLVULUS foliis hastato-acuminatis: auriculis dentatis, pedunculis subunifloris, calycibus sagittatis.
Tala-neli. Rheed. mal. 11. p. 113. t. 55.
Habitat in India.
*Folia lanceolata, apice integra, glabra, acuta, basi dilata-
ta in 2. auriculas recurvas extrorsum subdentatas. Pe-
dunculi uniflori, rarius biflori; Stipulis lanceolatis,
oppositis, duabus, acuminatis. Calycis foliola sagittata,
hinc Campanulae Medii instar postice appendiculata re-
trospetantia.*
- * * * *Cause prostrato.*
- secular.* 17. CONVOLVULUS foliis cordato-ovatis, pedunculis unifloris: bracteis lanceolatis, flore sessili.
Convolvulus foliis ovatis acutis, floribus dupli bractea succinctis. *Koy. lugdb. 428.*

Con-

Convolvulus foliis ovatis acutis. Hort. cliff. 67.
Convolvulus siccus minor, flore parvo auriculato. Bocc.
 fcc. 89. t. 48. Morif. bist. 2. f. 1. t. 7. f. 5.
Habitat in Sicilia. ♂
Carlis vix vel admodum parum, sapientem minime volubilis.

18. CONVOLVULUS foliis subrotundis, caule repente. *nummularius.*
Convolvulus minor repens, nummulariæ folio, flore cæ-
ruleo. Sloan. jam. 58. bist. 1. p. 157. t. 99. f. 2.
Raj. suppl. 382.
Habitat in Jamaicæ & Barbados pratis.

19. CONVOLVULUS foliis subovatis obtusis petiola- *alpinoides.*
 tis pilosis, caule diffuso, pedunculis trifloris. Fl. zeyl. 76.
Convolvulus foliis ovatis obtusis, caule filiformi. Hort.
 cliff. 68.

Convolvuli mirimi species bisnagarica hirsuta, alpines
folio. Pluk. alm. 116. t. 9. f. 1.

Anagallis hirsuta minor, foliis alternis, floribus solitariis.
Burm. zeyl. 11. t. 6. f. 1.

Vistnu-clandi. Rheed. mal. 11. p. 131. t. 64.

Habitat in Maiabaria, Zeylona, Bisnagaria, Bahama.

Varietas habitu lini: caulis, panicula, foliis lanceola-
tis sericeis, bujus forte sola varietas.

20. CONVOLVULUS foliis linearis-cuneiformibus tri- *tridentatus,*
 cuspidatis: bai dilatata dentatis, pedunculis unifloris.

Convolvulus minor procumbens, acetosellæ foliis tri-
cuspidatis ad iunum quaternis: summo apice tricuspi-
datis. Pluk. mant. 117. t. 167. f. 5.

Sendera-Clandi. Rheed. mal. 11. p. 133. t. 65.

β. *Convolvulus indicus barbatus minor:* foliorum apicibus
 lunulatis. Pluk. alm. 117. t. 276. f. 6.

Habitat in India.

21. CONVOLVULUS foliis lanceolatis obtusis sericeis, *Cneorum.*
 pedunculis multidoris. Hort. cliff. 68. Roy. lugd.
 429. Sauv. monsp. 56.

Convolvulus major rectus creticus argenteus. Morif.
 bist. 2. p. 11. f. 1. t. 3. f. 1.

Cneorum album, folio oleæ argenteo molli. Bauh. pin.
 463.

β. *Convolvulus serpens maritimus spicæfolius.* Triumf.
 obs. 91. t. 91. f. 2.

Convolvulus saxatilis cretus villosus perennis. Barr. rar.
 4. t. 470. Bocc. mus. 2. p. 79. t. 70

litteris. *Hort. cliff.* 60. *Hort. upf.* 39. *Fl. zeyl.* 77.
Roy. lugdb. 430.

Quainoclit f. *Jasminum americanum*. *Clus. posth.* 9.
Convolvulus pennatus *exoticus rarer*. *Cul. aquat.* 73. t.
 72.

Jasminum millefolii folio. *Bauh. pin.* 398.
Habitat in India. ⊙

Nyctelea. 2. *IPOMOEÀ* foliis pinnatifidis sinuatis acutis.
Habitat in Virginia. *D. Gronovius.*

carolina. 3. *IPOMOEÀ* foliis digitatis: foliolis petiolatis, pedunculis unifloris.
Convolvulus minor pentaphyllos, flore purpureo minore. *Catesb. car.* 2. p. 9. t. 91.
Habitat in Carolina.

coccinea. 4. *IPOMOEÀ* foliis cordatis acuminatis: basi angulatis, pedunculis multifloris. *Hort. upf.* 39.

Ipomoeà foliis cordatis acuminatis vix dentatis. *Hort. cliff.* 66. *Roy. lugdb.* 429.

Ipomoeà foliis cordatis integerrimis, limbo floris quinque fido. *Sauv. meth.* 114.

Quamoclit americana, folio hederæ, flore coccineo. *Comm. rar.* 21. t. 21.

Convolvulus coccineus, folio angulofo. *Plum. amer.* 89. t. 103. *Kaj. suppl.* 380.

Habitat in Domingo. ⊙

tuberosa. 5. *IPOMOEÀ* foliis palmatis: lobis septenis lanceolatis integerrimis. *Hort. upf.* 39.

Convolvulus major heptaphyllus, flore sulphureo odorato. *Sloan. jam.* 55. *bif.* 1. p. 152. t. 96. f. 2.

Convolvulus americanus, manduccæ multifido folio, heptaphyllus, flore albo fundo purpureo, radice tuberosa, cortice albo. *Pluk. alm.* 116. t. 276. f. 5.

Habitat in Jamaica. ♀

campanulata 6. *IPOMOEÀ* foliis cordatis, pedunculis multifloris, perianthio exteriore orbiculari, corollis campanulatis lobatis.

Adamboe Rheed. mal. 11. p. 115. t. 56.

Habitat in India.

Corolla crassior; quam in reliquis; sub Perianthio quinquepartito, aliud perianthium minus orbiculatum integrimum.

7. IPOMOEÀ foliis cordatis acutis integerimis villostis, *alba*.
floribus ternis, corollis indivisis. †
Monda-valli. *Rheed. mal.* II. p. 103. t. 50.
Habitat in Malabariae arenosis, arbores scandens.
8. IPOMOEÀ foliis cordatis integerimis, floribus confer- *violacea*.
tis, corollis indivisis. *Sanv. inon* sp. 114. †
Quamoclit soliis amplissimis cordiformibus. *Plum. spec. 3.*
Habitat in America meridionali.
9. IPOMOEÀ foliis cordatis acutis integerimis, floribus *solanifolia*.
solitariis. *Roy. Ingdb.* 430.
Quamoclit solani folio, flore roseo. *Plum. spec. 3.*
Habitat in America.
10. IPOMOEÀ foliis cordatis integerimis glabris lacu- *lacunosa*.
nolis, pedunculis bifloris.
Convolvulus stellatus, periplocæ rotundioris folio. *Dill.*
elth. 103. t. 87. f. 103.
Habitat in Carolina.
11. IPOMOEÀ foliis sagittatis postice truncatis, pedun- *glaucifolia*.
culis bifloris.
Convolvulus foliis cordato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 67.
Convolvulus stellatus arvensis, folio glauco. *Dill. elth.*
103. t. 87. f. 101.
Habitat in Mexicæ arvis.
12. IPOMOEÀ foliis trilobis cordatis, pedunculis trifloris. *trileba*.
Convolvulus pentaphyllos minor, flore purpureo? *Slo-*
an. jam. 55. hist. I. p. 153. t. 97. f. 1. Raj. suppl.
381.
Habitat in America. ⊙
Caulis volubilis, angulatus. Folia cordata, profunde tri-
loba: intermedio ovato; lateralibus semicordatis, in-
tegerrima, glabra. Pedunculi triflori. Corolla cylin-
dricae, violacea. Stiginata duo, globosa. Capsula pilo-
sa.
- * * *Floribus aggregatis.*
13. IPOMOEÀ foliis trilobis, floribus aggregatis. *Fl. hepaticefolia*
zeyl. 79.
Convolvulus indicus villosus, hederæ folio tripartito,
flore cæruleo. *Herm. Ingdb.* 182.
Convolvulus zeylanicus hirsutus, foliis hepaticæ. *Herm.*
prodr. 327.
Habitat in Zeylona.

tamnifolia. 14. IPOMOEÀ foliis cordatis acuminatis pilosis, floribus aggregatis.

Volubilis carolinensis, tamni folio subhirsuto. *Dill. elth.* 428. *t.* 318. *f.* 414.

Habitat in Carolina.

Pes tigridis. 15. IPOMOEÀ foliis palmatis, floribus aggregatis. *Fl. zeyl.* 79.

Convolvulus zeylanicus villosus pentaphyllos & heptaphyllos minor, Pes tigrinus. *Herm. lugdb.* 184. *t.* 187.

Aet. bonon. 11. *p.* 2. *p.* 362. *t.* 23. *f.* 2.

Volubilis zeylanica, tes tigrinus dicta. *Dill. elth.* 429. *t.* 318. *f.* 411.

Pulli-schovadi. *Rheed. mal.* 11. *p.* 121. *t.* 59.

Habitat in India.

ægyptia. 16. IPOMOEÀ foliis digitatis supra glabris, caule piloso, pedunculis multifloris. *Hort. upf.* 39.

Convolvulus foliis digitatis pilosus, caule piloso. *Roy. lugdb.* 429.

Convolvulus americanus pentaphyllus & heptaphyllus major. *Herm. lugdb.* 183. *t.* 185. *Raj. bist.* 1881.

Convolvulus ægypticus. *Vest. alp.* 73.

Herba non nominata. *Maregr. bras.* 54.

Habitat in America calidiore. ◎

quinquefolia 17. IPOMOEÀ foliis digitatis glabris: foliolis sessilis, caule lævi.

Convolvulus foliis digitatis glabris, caule lævi. *Roy. lugdb.* 429.

Convolvulus quinquefolius glaber americanus. *Pluk. alm.* 116. *t.* 167. *f.* 6.

Habitat in America.

POLEMONIUM.

cæruleum. 1. POLEMONIUM calycibus corollæ tubo longioribus.

Polemonium, *Fl. lapp.* 86. *Fl. suec.* 175. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 432. *Hall. helv.* 490.

Valeriána cærulea. *Baub. pin.* 164.

α. Polemonium calycibus lanatis. *Hort. upf.* 40.

γ. Polemonium foliis pinnatis, radicibus reptatricibus. *Gron. virg.* 22.

Habitat in Europæ, Asiam, Americæ septentrionalibus. ♀

2. POLEMONIUM calycibus tubo corollæ brevioribus: *rubrum*.
Quamoclit pinnatim cereum, floribus in thyrsum digestis. *Dill. elth.* 321. t. 241. f. 312.
Habitat in Carolinæ citerioris arenosis. B. Jussiae.
3. POLEMONIUM foliis inferioribus hastatis, superioribus lanceolatis *dubium*: *Græn. virg.* 142.
Habitat in Virginia.
Facies aliena a Polemoniis, genus mihi dubium.

CAMPANULA.

$\alpha.$. Foliis lævioribus angustioribus.

1. CAMPANULA caule unifloro. *Fl. lapp.* 85: t. 9. *uniflora*.
f. 5. 6. *Fl. suec.* 177:
Habitat in alpibus Lapponicis. ⊖

2. CAMPANULA caulinis unifloris, foliis caulinis pallidis
ovatis erentatis, calycibus cernuis.
Campanula alpina latifolia, flore pullo. Bauh. pin. 93.
prodr. 33. Burs. IV. 21.

- $\beta.$ Campanula foliis subrotundis. *Bauh. pin.* 94 *prodr. 34.*
t. 35:

Habitat in Austria.

Radix filiformis, repens. Caules spithamei; erecti siccus
xuosi, filiformes, raro ramo uno alterove, coque floriferi.
Folia radicalia & caulina ovata, obtusa, subcrenata
crenatis distantibus, nuda, petiolata. Pedunculus
terminalis. Flos cernuus; magnitudine C. rotundifo-
liae, calyce levi. β : floribus pluribus in summitate
caulis variat.

3. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, cau- *rotundifolia*.
linis linearibus. *Fl. lapp.* 83. *Fl. suec.* 176. *Hort. ups.*
65. *Roy. lugdb.* 247. *Dalib. paris.* 66.

- Campanula minor rotundifolia vulgaris. Bauh. pin.* 93.
 β *Campanula minor rotundifolia alpina. Bauh. pin.* 93.
prodr. 34. t. 34.

- $\gamma.$ *Campanula alpina linifolia cærulea. Bauh. pin.* 93. *Fl.*
lapp. 84. *it. gotl.* 229.

Habitat in Europæ pasturis. ♀

4. CAMPANULA foliis strictis: radicalibus lanceolato-patula,
ovalibus, panicula patula.
Campanula esculenta facie, ramis & floribus patulis.
Dill. eltb. 68. t. 58. f. 68.

Habitat in Angliæ, Sueciæ arvis. ♂

- Rapunculus*. 5. **CAMPANULA** foliis undulatis : radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. *Hort. upf.* 40.
Campanula foliis radicalibus lanceolato-ovalibus, caule ramosissimo patulo. *Hort. cliff.* 65. *Dalib. paris.* 68.
Rapunculus esculentus. *Baub. pin.* 92.
Rapunculum. *Dod. pempt.* 165.
Habitat in Helvetia, Anglia, Gallia. ♂
Folia lanceolata. Racemus terminalis: rami similes, breviores, erecti. Pedunculi terni sæpius, intermedio longiore. Caulis angulatus, scaber.
- decurrens*. 6. **CAMPANULA** foliis caulinis lanceolatis ferratis decurrentibus. *Fl. suec.* 178.
Campanula minor rotundifolia, flore in summis caulis. *Baub. pin.* 93.
Habitat in Finlandia.
- perficifolia*. 7. **CAMPANULA** foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis. *Fl. suec.* 179. *Dalib. paris.* 67.
Campanula foliis linear-i-lanceolatis crenatis, caule longissimo simplicissimo, floribus rariss. *Vir. cliff.* 17. *Hort. cliff.* 65. *Roy. lugdb.* 246.
Rapunculus perficifolius, magno flore. *Baub. pin.* 93.
Q. Rapunculus nemorosus angustifolius, magno flore, major. *Baub. pin.* 93.
Habitat in Europæ septentrionalis asperis. ✘
- pyramidalis*. 8. **CAMPANULA** foliis ovatis glabris subserratis, caule erecto paniculato: ramulis brevibus.
Campanula foliis ovatis glabris obsolete serratis, ramis brevissimis cauli approximatis. *Vir. cliff.* 17. *Roy. lugdb.* 246.
Campanula foliis ovatis margine cartilagineo crenatis, caule ramosissimo angustato. *Hort. cliff.* 64.
Rapunculus hortensis latiore folio: s. *Pyramidalis*. *Baub. pin.* 93.
Habitat - - - ♂
- americana*. 9. **CAMPANULA** caule ramoso, foliis lingiformibus crenulatis margine cartilagineo. *Roy. lugdb.* 246.
Campanula minor americana, foliis rigidis, flore cæruleo patulo. *Herm. lugdb.* 107.
Trachelium americanum minus, flore cæruleo patulo. *Dodart. mem.* 4. p. III. t. III.
Habitat in America.

10. CAMPANULA foliis lanceolatis: caulinis acute ser- *lilifolia*.
ratis, floribus paniculatis nutantibus. *Hort. upf.* 41.
Campanula urticæ foliis glabra, floribus minoribus pen-
dulis. *Amm. rutb.* 11. n. 17.
Habitat in Tataria, Sibiria. ♂
11. CAMPANULA foliis rhomboidibus serratis, spica *rhomboidalis*
secunda.
Campanula foliis rhomboidibus serratis, spica unilaterali
subnuda. *Hall. helv.* 491.
Campanula drabæ minoris foliis. *Baub. pin.* 94. pro-
dr. 36.
Rapunculus teucrii folio. *Barr. ic.* 78. 567.
Rapunculus alpinus, (teucrii folio) *rhomboidalis*. *Bocc.*
muf. 75. t. 61.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Italiæ.
12. CAMPANULA foliis longis laciniatis sublyratis. *laciniata*.
Campanula græca saxatilis, jacobææ foliis. *Tournes. itin.*
1. p. 260. t. 260.
Habitat in Græciæ rupibus.
- β. Foliis scabris latioribus.
13. CAMPANULA foliis ovato-lanceolatis, caule sim- *latifolia*.
plicissimo tereti, floribus solitariis pedunculatis, fructi-
bus cernuis. *vir. cliff.* 17. *Hort. cliff.* 65. *Fl. suec.*
180. *Roy. lugdb.* 245.
Campanula maxima, foliis latissimis. *Baub. pin.* 94.
Habitat in Angliæ, Sueciæ montosis, sepibus ♀
Caulis simplicissimus, teres. Folia lanceolato-ovata, serra-
ta. Flores ex alis superioribus, solitarii, pedunculati.
Calyces glabri. Fructus cernui.
14. CAMPANULA foliis cordato-lanceolatis, caule ra- *rapunculoi-*
moſo, floribus secundis sparsis. *Vir. cliff.* 17. *Roy. des.*
lugdb. 246. *Dalib. paris.* 66.
Campanula foliis ovatis crenatis, floribus per caulem
uno versu sparsis. *Hort. cliff.* 64.
Campanula hortensis, rapunculi radice. *Baub. pin.* 94.
Morif. bist. 2. p. 460. f. 5. t. 3. f. 32.
Habitat in Helvetia, Gallia.
15. CAMPANULA foliis ovato-lanceolatis subtus sca- *bononiensis*.
bris sessilibus, caule paniculato. †
Campanula s. *Cervicaria bononensis*, flore parvo. *Baub.*
bist. 2. p. 804. *Morif. bist.* 2. p. 461. f. 5. t. 4.
f. 38.

Campanula foliis lanceolatis leviter serratis alternis, floris thyrsi spicato & ad basim ramoso. Segn. ver. I.p.
176.

Habitat in Baldi Lessivensium jugis, Bononiæ.

graminifolia 16. CAMPANULA foliis linearis-subulatis, capitulo terminali. †

Campanula alpina, *tragopogi* folio. Baub. pin. 94.

Trachelium, *tragopogi* folio, montanum. Col. phyt. 2.
p. 25. Baub. hist. 2. p. 802.

Trachelium minus *gramineum cæruleo-violaceum*.
Barr. ic. 332.

Habitat in Italæ montibus, Aprutii Salmone vicinis.

spicata.

17. CAMPANULA hispida, spica laxa: floribus alternis, foliis linearibus.

Campanula foliis anchusæ, floribus oblongis. Baub.
pin. 94.

Campanula hirsutæ folio angusto leviter ferrato, floribus parvis spicatis. Pluk. alm. 76. t. 153. f. 3.

Habitat in Valleia.

Radix crassitie digitæ. Folia radicalia linearis-lanceolata, caulinæ similia sed breviora. Caulis pedalis, ramis alternis, terminatis spica longissima ex Floribus sessiliis, alternis, remotis, plurimis. Corollæ subcylindricæ. Planta caule, foliis, calycibus pilis albis hispida.

Trachelium 18. CAMPANULA caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. Vir. cliff. 16.
Fl. suec. 181. Roy. lugdb. 245. Dalib. paris. 66.

Campanula foliis radicalibus cordatis, calycibus ciliatis.
Hort. cliff. 64.

Campanula vulgatior, foliis urticæ, vel, major & asperior. Baub. pin. 94.

Habitat in Europa: sepiibus. 2

Folia ovata, subcordata, petiolata, dentata. Pedunculi trifidi, triflori

glomerata. 19. CAMPANULA caule angulato simplici, floribus sessilibus, capitulo terminali. Vir. cliff. 16. Fl. suec.
188. it. gotl. 196. it. scan. 306. Roy. lugdb. 245.
Dalib. paris. 67.

Campanula foliis lanceolato-ovatis crenatis, ramis capitulo florali terminatis. Hort. cliff. 64.

Campanula pratensis, flore conglomerato. Baub. pin. 94.

Trachelium alpinum, floribus conglomeratis, foliis asatinæ rigidis & hirsutis. Herm. par. 235. s. 235.

Ha-

Habitat in Angliae, Galliae, Sueciae pratis aridis. ♀
Folia ovato-oblonga, sessilia, obtusiflora. Flores 3, sessiles in alis faliorum; capitulum terminale.

20. CAMPANULA hispida, floribus sessilibus, *capitulo Cervicaria terminali, foliis lanceolato-linearibus undulatis.* it. *eland.* 115. *Fl. suec.* 183.

Trachelium altissimum, foliis asperis angustis, floribus parvis. Baub. *hist.* 2. p. 801. t. 801. f. 801.

Habitat in Helvetia, Svecia, Germania asperis sylvaticis.

21. CAMPANULA hispida, racemo ovato-oblongo *terminali, caule simplicissimo, foliis lanceolato-linearibus.* *thyrsoides.*

Campanula foliis echii. Baub. *pin.* 94.

Alopecurus alpinus quibusdam. Echium montanum da-lechampii. Baub. *hist.* 2. p. 809.

Cervicaria major tenuifolia. Thal. *hart.* 32. t. 3. *

Habitat in alpibus Harcyniae aliisque. ♀

22. CAMPANULA capsulis quinquelocularibus testis *Medium, caiycis sinubus reflexis.* Vir. *cliff.* 16. Roy. *lugd.* 245.

Campanula calycibus a tergo lamellis quinque notatis. Hort. *cliff.* 64.

Campanula hortensis, folio & flore oblongo. Baub. *pin.* 94.

Viola mariana. Dod. *pempt.* 163.

23. Campanula foliis anchusæ, floribus oblongis. Baub. *pin.* 94. Hall. *helv.* 493.

24. Campanula foliis echii, floribus villosis. Baub. *pin.* 94. *prodr.* 36. t. 36.

Habitat in Germania, Italiæ nemoribus. ♂

25. CAMPANULA capsulis trilocularibus testis *caly-sibirica, caiycis sinubus reflexis.*

- Campanula hirsuta oxyimi folio caulem ambiente, flore pendulo. Bocc. *sic.* 83. t. 45. Moris. *hist.* 2. p. 459. f. 5. t. 3. f. 26.

Habitat in Sibiria. D. Gmelin: ♂ Mesianæ.

Plantæ Caulis pedalis, angulatus, parum hispidus. Panicula raior, laxa. Folia linearia, semiamplexicaulia: caulina scabra. Flores oblongi, parvi. Calyces hispida. Varietas latit caule subdiviso, foliis latioribus.

26. CAMPANULA foliis obovatis crenatis, floribus *al-saxatilis, ternis nutantibus, capsulis quinquecarinatis.* †

Campanula cretica saxatilis, bellidis folio, magno flore.
Tournef. inst. 111. Barr. rar. 79. t. 813.
Trachelium saxatile, bellidis folio, cæruleum creticum.
Bocc. mus. 2. p. 76. t. 64.
Habitat in Cretæ scopulis saxosis.

* *Caule subdiviso.*

- canariensis.* 25. *CAMPANULA* foliis hastatis dentatis oppositis petiolatis, capsulis quinquelocularibus.
Campanula foliis hastatis dentatis, caule determinate folioso. *Hort. cliff. 65. t. 8. Roy. lugd^b. 247.*
Campanula canariensis regia f. Medium radice tuberosa, foliis sinuatis cæsis atriplicis æmulis ternis circum caulem ambientibus, flore ample pendulo: colore flamineo rutilante. *Pluk. alm. 76. t. 276. f. 1.*
Habitat in insulis Canariis. ♀

- fruticosa.* 26. *CAMPANULA* caule fruticoso, foliis linearis-subulatis, pedunculis longissimis, capsulis columnaribus quinquelocularibus.
Campanula africana, ericæ folio, flore cæruleo patulo. *Herm. afr. 5.*
Habitat ad Caput b. Spei. ♂

- Speculum.* ♀ 27. *CAMPANULA* caule ramosissimo diffuso, foliis oblongis subcrenatis, calycibus solitariis corolla longioribus, capsulis prismaticis. *Hort. upf. 41.*

- Campanula* caule ramoso, foliis ovato-oblongis crenatis. *Hort. cliff. 65.*
Campanula calycibus corollam superantibus, capsulis columnaribus. *Vir. cliff. 17. Roy. lugd^b. 247. Dalib. paris. 68.*
Onobrychis arvensis f. *Campanula arvensis erecta.* *Baub. pin. 215.*
Habitat inter segetes Europæ australis. ☽

- hybrida.* 28. *CAMPANULA* caule basi subramoso stricto, foliis oblongis crenatis, calycibus aggregatis corolla longioribus, capsulis prismaticis.

- Campanula arvensis minima* erecta. *Moris. hist. 2. p. 457. f. 5. t. 2. f. 22.*

- Speculum veneris minus.* *Raj. hist. 743.*

- Habitat in Anglia, Gallia, inter segetes.*

- Differt a Speculo ♀ f. matre:* Caule basi tantum ramoso, erecto, superne vix ramoso, stricto; Floribus sessilibus 3 f. 4 simul, Corollis sepius in rudimento latenterbus nec explicatis. Quin hæc ex C. Spec. ♀ olim orta sit, dubium vix videtur.

29. CAMPANULA caule subdiviso ramosissimo, foliis linearibus acuminatis. *Hort. cliff.* 66. *Roy. lugdb.* 247. *Pentagonia.*
Campanula pentagonia, flore amplissimo, thracica. Tournef. inst. 112.
Speculum veneris, flore amplissimo, thracicum. Raj. hist. 742,
Habitat in Thracia. ◎
30. CAMPANULA caule dichotomo, foliis sessilibus uncinatis dentatis. *Hort. cliff.* 65. *Roy. lugdb.* 247. *Erinus.*
Rapunculus minor, foliis incisis. Bauh. pin. 92.
Erini s. Rapunculi minimum genus. Columna. phytob. 122. t. 28.
Alsinæ oblongo folio serrato, flore cæruleo. Bauh. hist. 3. p. 367.
Habitat in Italia, Galloprovincia, Monspelii. ◎
- 31 CAMPANULA caule simplici, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus, floribus sessilibus aggregatis. *perfoliata.*
Hort. upf. 40.
Campanula caule simplicissimo, foliis amplexicaulibus.
Hort. cliff. 65. *Roy. lugdb.* 247. *Gron. virg.* 22.
Campanula pentagonia perfoliata. Morif. hist. 2. p. 457.
s. 5. t. 2. f. 23. Barr. rar. 83. t. 1133.
Habitat in Virginia. ◎
32. CAMPANULA foliis lanceolatis dentatis hispidis, pedunculis longissimis, capsulis strigosis. *capensis.*
Campanula africana annua hirsuta, latis serratisque foliis,
flore magno violaceo. Comm. hort. 69. t. 35.
Habitat ad Caput b. Spei. ◎
33. CAMPANULA foliis cordatis quinquelobis petiolatis glabris, caule laxo. *Dalib. paris.* 68. *hederacea.*
Campanula cymbalariae vel hederæ folio. Bauh. pin. 93.
prodr. 34. *Morif. hist.* 2. p. 450. *s. 5. t. 4. f. 18. Pluk. phyt.* 23. f. 1.
Habitat in Anglia, Gallia, Hispania locis umbriosis humidiusculis.
34. CAMPANULA caulibus diffusis, foliis subovatis integrerrimis.
Campanula saxatilis, foliis inferioribus bellidis, cæteris nummulariæ. Tournef. cor. 3. *itin.* 1. p. 243. t. 243.
Habitat in Oriente. 2

ROELLA.

ciliata.

1. ROELLA foliis ciliatis: mucrone recto.

Roellia. Hort. cliff. 492. t. 35.

Campanula africana frutescens aculeosa, flore violaceo.

Comm. hort. 2. p. 77. t. 30.

Campanula africana humilis pilosa, flore exalbido languide purpureo. Seb. thes. 1. p. 25. t. 16. f. 5.

Aculeosa mauritanica, ericæ foliis hirsutis rigidis infesto mucrone pungentibus. Pluk. alm. 8. t. 252. f. 4.

Habitat in Mauritania, Æthiopia. 2

reticulata.

2. ROELLA foliis ciliatis: mucrone reflexo.

Roella foliis imbricatis. Roy. lugdb. 248.

Campanula capitis bonæ spei, foliis reticulatis spinosis.

Pet. mus. 21. f. 157.

Habitat ad Caput d. Spei. 2

PHYTEUMA.

pauciflora. 1. PHYTEUMA capitulo subfolioso, foliis omnibus lanceolatis.

Rapunculus foliis obtusis, spica pauciflora. Hall. helv. 497.

Rapunculus alpinus parvus comosus. Bauh. hist. 2. p. 811.

Habitat in alpibus Helveticis Styriacis.

bensisphaeri. 2. PHYTEUMA capitulo subrotundo, foliis linearibus integerrimis.

Phyteuma foliis linearibus, floribus capitatis. Roy. lugdb. 248.

Rapunculus umbellatus, folio gramineo. Bauh. pin. 92.

Rapunculus sylvestris cæruleus umbellatus. Thal. harc. 94. t. 8.

Rapuntium alterum angustifolium alpinum. Column. ecphr. 2. p. 23. t. 26.

Habita in alpibus Helvetiæ, Italiæ, Pyrenæis. 2

orbicularis. 3. PHYTEUMA capitulo subrotundo, foliis serratis: radicalibus cordatis.

Phyteuma foliis oblongis, spica orbiculari. Guett. stamp. 1. p. 34. Dalib. paris. 69.

Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari. Bauh. pin. 92. Moris. hist. 2. p. 463. f. 5. t. 5. f. 47.

Rapuntium montanum rarius corniculatum. Column. ecphr. 1. p. 222. t. 224.

Habitat in alpibus Italiæ, Helvetiæ, Veronæ, Sussexiæ.

4. **PHYTEUMA** spica oblonga, capsulis bilocularibus, *spicata*.
foliis radicalibus cordatis.

Phyteuma spica oblonga nuda, foliis caulinis lanceolatis ferratis. *Amæn. Acad.* 1. p. 149.

Phyteuma foliis cordato-lanceolatis, spica oblonga. *Guet. stamp.* 1. p. 34. *Dalib. paris.* 69.

Rapunculus spicatus. *Baub. pin.* 92. *cæruleus.* *prodr.* 32. t. 32.

Rapunculus corniculatus spicatus s. Alopecuroides, flore albo & cærulo. *Morif. hist.* 2. p. 463. f. 5. t. 5. f. 46.

Habitat in Alpestribus Helvetiæ, Baldi, Angliæ, Galliæ.

5. **PHYTEUMA** fasciculo terminali sessili, foliis dentato-comosæ, tis: radicalibus cordatis.

Rapunculus alpinus corniculatus. *Baub. pin.* 113. *prodr.* 33. t. 33.

Trachelium petræum minus. *Pon. bald.* 326. t. 326.

Campanula sphærocephalus perennans, foliorum ad oras insigniter denticulata. *Pluk. atm.* 77. t. 152. f. 6.

Habitat in Baldi & Tyrolensibus montibus. ♂

6. **PHYTEUMA** floribus sparsis, foliis pinnatis. *Roy. pinnata.* *lugdb.* 248.

Rapunculus creticus s. Pyramidalis altera. *Baub. pin.* 93.

Rapunculus creticus, Petromarula. *Baub. hist.* 2. p. 811. t. 812.

Habitat in Creta.

TRACHELIUM.

1. **TRACHELIUM.** *Hort. upf.* 41. *carnigerum.*

Trachelium tolus ovatis ferratis, corymbis compositis, *Vir. cliff.* 17. *Roy. lugdb.* 248.

Trachelium foliis ovatis ferratis, caule umbellæ terminato. *Hort. cliff.* 66.

Cervaria valerianoides cærulea. *Baub. pin.* 95.

Habitat in Italiz umbrosis. ♂

SAMOLUS.

1. **SAMOLUS** *Hort. cliff.* 51. *Hort. upf.* 42. *Fl. suec.* *valerandi.*

165. Roy. lugdb. 249. *Gron. virg.* 23. *Dalib. paris.* 69.

Anagallis aquatica, rotundo folio non crenato. *Baub. pin.* 252.

Afli-

- Alfina aquatica*, foliis rotundis beccabungæ. *Moris. hist.*
 2. p. 323. f. 3. t. 24. f. 28.
africanus. *B. Samolus africanus*, folio rotundiore. *Walth. hort.* 162.
 t. 23.
Habitat in maritimis Europa; Asia & Americæ borealis. ♂
Dissert africana planta, Caule magis ramoso & firmiore;
sed vix sufficient nota pro distincta specie.

RONDELETIA.

- americana.* 1. **RONDELETIA** foliis sessilibus.
Rondeletia arborescens, tini facie. *Plum. gen.* 15.
Habitat in America. ♂
Arbusculæ Folia opposita, sessilia, lanceolata. Pedunculi
communes solitarii, longissimi, nudi, apice formantes
cotybum dichotomum; in cuius singula dichotomie
Flos sessilis, cum involucro diphylo.
2. **RONDELETIA** foliis petiolatis. *Fl. zeyl.* 80.
Cupi. Rheed. mal. 2. p. 37. t. 23. *Raj. hist.* 1494.
Habitat in Malabar, Zeylona. ♂

BELLONIA.

- aspera.* 1. **BELLONIA**
Bellonia frutescens, folio melissæ aspero. *Plum. gen.* 19.
Habitat in America. ♂
Arbusculæ Folia opposita, ovata, serrata, subtus aspera;
petiolis brevissimis. Flores in corymbum.

CINCHONA

- efficinalis.* 1. **CINCHONA.** *Mat. med.* 71.
Quinquina. Cond. act. paris. 1738. *Godofr. mat.* 2. p. 180.
Habitat in Loxa Peruviae. ♂

COFFEA.

- arabica.* 1. **COFFEA** *Hort. cliff.* 59. *Hort. upf.* 41. *Mat. med.*
 70. *Roy lugdb.* 239.
Jasminum arabicum, lauri folio, cuius semen apud nos
 coffe dicitur. *Juss. act.* 1713. p. 388. t. 7.
Evonymo similis ægyptiaca, fructu baccis lauri simili.
Bauh. pin. 498.
Bon. Alp. ægypt. 36. t. 36.
Habitat in Arabia felici. ♂

LO-

LONICERA.

* *Periclymena caule volubili.*

1. LONICERA floribus verticillatis terminalibus sessilibus, *Caprifolium*.
 foliis summis connato-perfoliatis. *Hort. cliff.* 45. *Hort. upf.* 42. *Virid. cliff.* 14. *Roy. lugdb.* 237. *Sauv. monsp.* 139.
Periclymenum perfoliatum. *Baub. pin.* 302.
Caprifolium *Italicum*. *Dod. pempt.* 411. *Hortul. angl.*
 t. 5. f. 1. 2. 3.
Habitat in Europa australi. ♂
2. LONICERA spicis nudis verticillatis terminalibus, fo- *sempervi-*
 liis summis connato-perfoliatis. *reens.*
Lonicera floribus capitatis terminalibus, foliis summis
 connatis, inferioribus perfoliatis, *Hort. cliff.* 58. *Roy.*
lugdb. 237.
Periclymenum perfoliatum *virginianum* *semperfurens* &
 florens. *Herm. lugdb.* 484. t. 483.
Periclymenum *virginianum*. *Riv. mon.* 116.
Habitat in Virginia, Mexico. ♂
3. LONICERA capitulis ovatis imbricatis terminalibus, *Periclyme-*
 foliis omnibus distinctis. *Hort. cliff.* 58. *Hort. upf.* num.
 42. * *Fl. suec.* 191. *Roy. lugdb.* 237. *Dalib. paris.*
 69. *Sauv. monsp.* 139. *it. scan.* 305.
Periclymenum non perfoliatum *germanicum*. *Baub.*
pin. 302.
- β. *Caprifolium* non perfoliatum. *Hort. angl.* t. 6. ♂ 8.
 f. 1. 2.
Caprifolium *germanicum*, flore rubello, serotinum. *Tour-*
nef. inst. 226.
Habitat in Europa media. ♂
Caulis ♂ folia pubescens, ♂ in β. glabra.
- * *Chamæcerosa pedunculis bifloris,*
4. LONICERA pedunculis bifloris, baccis distinctis, fo- *nigra*.
 liis ferratis. *Roy. lugdb.* 238. *Sauv. monsp.* 140.
Chamæcerasus alpinus, fructu nigro gemino. *Baub. pin.*
 451.
Periclymenum rectum, folio ferrato. *Baub. hist.* 2 p. 107.
Periclymenum rectum 2. *Clus. hist.* 1. p. 58.
Habitat in Delphinatu, Gallia, Helvetia.
5. LONICERA pedunculis bifloris, baccis distinctis, fo- *tatarica*.
 liis cordatis obtuus. *Hort. upf.* 42.

Chamæcerasus fructu gemino rubro, foliis glabris cordatis. Amm. ruth. 184.

Habitat in Tataria. 5

- Xylosteum.* 6. **LONICERA** pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus. *Roy. lugdb. 238. Fl. suec. 192. Dalib. paris. 69. Sauv. monsp. 140.*
Lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis obtusis integris. Hort. cliff. 58.
Chamæcerasus dumetorum, fructu gemino rubro. Baub. pin. 451.
Xylosteum. Dod. pempt. 412.
Habitat in Europæ frigidioris sepiibus. 5
- pyrenæen.* 7. **LONICERA** pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis oblongis glabris.
Lonicera pedunculis bifloris, baccis distinctis, floribus infundibuliformibus, ramis divaricatis. Roy. lugdb. 238.
Xylosteum pyrenaicum. Tournef. inst. 609. Magn. hort. 209. t. 209. Raj. dendr. 29.
Habitat in Pyrenæis.
Diffr. a precedente Corollis regularibus, Ramis divaricatis, Folis glabris:
- alpigena.* 8. **LONICERA** pedunculis bifloris, baccis coadunatis didymis.
Lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis acutis integris. Hort. cliff. 58. Sauv. monsp. 140.
Lonicera baccis bifloris concretis, floribus bilabiatis. Roy. lugdb. 238.
Chamæcerasus alpina, fructu rubro gemino. duobus punctis notato. Baub. pin. 451.
Periclymenum rectum quartum. Clus. hist. 1. p. 59.
Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Allobrogicis. 5
- cærulea.* 9. **LONICERA** pedunculis bifloris; baccis coadunato-globosis, ilylis indivisis.
Lonicera pedunculis bifloris bilabiatis, bacca singulari globosa integerrima. Roy. lugdb. 239
Chamæcerasus montana, fructu singulari cæruleo. Baub. pin. 451.
Periclymenum rectum, fructu cæruleo. Clus. pon. 85.
Baub. hist. 2. p. 108. Raj. hist. 1492.
Habitat in Helvetia. 5

* *Caule erecto pedunculis multifloris.*

10. LONICERA spicis terminalibus, foliis ovato-oblongis acuminatis distinctis sessilibus. *Gron. virg.* 142.

Pericymeni virginiani flore coccinea planta marilandica, spica erecta foliis conjugatis. *Raj. deaddr.* 32.

Catesb. carol. 2. p. 78. t. 78.

Habitat in Virginia, Marilandia, Carolina. 5

11. LONICERA capitulis lateralibus pedunculatis, foliis *Symporicarpos* petiolatis.

Lonicera pedunculis axillaribus capitatis, foliis petiolatis.

Hort. cliff. 58. *Roy. Ingdb.* 237. *Gron. virg.* 23.

Symporicarpos foliis alatis. *Dill. elth.* 371: t. 278. f. 360.

Vitis idaea caroliniana, foliis subrotundis hirsutis. *Hort. angl.* 85. t. 20.

Habitat in Virginia, Carolina. 5

12. LONICERA pedunculis multifloris, involucris pen-*parasitica*. raphyllis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 83.

Periclymenum surrectum, persicæ foliis, maderapatanum. *Pluk. alm.* 287. t. 212. f. 5.

Itticanni. *Rheed. mal.* 7. p. - t. 27.

Habitat in India orientali. 5

13. LONICERA racemis lateralibus simplicibus, floribus *alba*, pendulis, foliis integerrimis.

Lonicera racemis lateralibus simplicibus laxis, floribus oppositis pendulis, geniculis compressis. *Hort. cliff.* 496.

Periclymenum racemosum, flore flavescente, fructu niveo. *Dill. elth.* 306. t. 228. f. 295.

Jasminum folio myrtino acuminato, aliorum adminiculolo se sustentans, flore albicante racemoso. *Sloan. jam.* 169. *hist.* 2. p. 97. t. 188. f. 3. *Raj. deaddr.* 64.

Habitat in Jamaicæ, Barbados locis confragosis. 5

14. LONICERA racemis terminalibus, foliis serratis. *Diervilla*. Diervilla. *Hort. cliff.* 63. t. 7.

Diervilla acadensis fruticosa, flore luteo. *Tournef. act.* 1706. t. 7. f. 1.

Habitat in Acadia, Noveboraco. 5

15. LONICERA corymbis terminalibus, foliis ovatis *a-corymbosa*. cutis.

Periclymanum foliis acutis, floribus profunde dissectis.

Fewill. peruv. 2. p. - t. 45:

Habitat in Peru. 5

TRIOSTEUM.

- perfoliatum.* 1. TRIOSTEUM floribus verticillatis sessilibus.
Triosteospermum, latiore folio, flore rutilo. *Dill. elth.*
 394. t. 293. f. 378.
Habitat in America septentrionali. ♀
- angustifol.* 2. TRIOSTEUM floribus oppositis pedunculatis.
Lonicera humilis hirsuta, caule obsolete rubente quadato, foliis lanceolatis adversis, flore luteo ad alas unico. *Gron. virg.* 143.
Periclymenum herbaceum rectum virginianum. *Pluk. alm.* 287. t. 104. f. 2.
Habitat in Virginia. ♀

MORINDA.

- umbellata.* 1. MORINDA erecta, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis confertis. *Fl. zeyl.* 81. *
Habitat in India. ♂
- citrifolia.* 2. MORINDA arborea, pedunculis solitariis. *Fl. zeyl.* 82.
Coda-pilava. *Rheed. mal.* 1. p. 97. t. 52. *Raj. hist.* 1442.
Habitat in India. ♂
- Royoc.* 3. MORINDA procumbens. *Hort. cliff.* 73. *Roy. lugdb.* 187.
Morinda americana humifusa laurifolia. *Vaill. act.* 1722. p. 275.
Royoc humifusum, fructu cupressino. *Plum. spec.* II.
Periclymenum americanum e cuius radice fit atramentum. *Pluk. alm.* 287, t. 212. f. 4.
Habitat in America calidiore. ♂

CONOCARPUS.

- erecta.* 1. CONOCARPOS erecta, foliis oblongis.
Conocarpus. *Hort. cliff.* 485.
Alnus maritima myrtifolia coriariorum. *Pluk. alm.* 18. t. 240. f. 3.
Alni fructu laurifolia arbor maritima. *Sloan. jam.* 135. *hist.* 2. p. 18. t. 161. f. 2. *Raj. dendr.* II.
Rudbeckia laurifolia maritima. *Amm. herb.* 581.
Habitat in Jainaicæ, Bermudensium, Brasiliæ maritimus. ♂

2. CONOCARPUS procumbens foliis subrotundis. *procumbens.*
Rudbeckia tūpina. foliis subrotundis. *Amm. herb.* 581.
Habitat in Cuba.

MUSSÆNDA.

1. MUSSÆNDA *Herm.* zeyl. 36. *Fl. zeyl.* 84. *fl. frondosa.*
Muslænda zeylanica, flore rubro, folio ex florum thyrsi
 piodeunte albo. *Burm. zeyl.* 165. t. 76.
Belilla. *Rheed. mal.* 2. p. 27. t. 18. *Raj. hist.* 1493.
dendr. 126.
Habitat in India. ♂

MIRABILIS.

1. MIRABILIS. *Hort. cliff.* 53. *Hort. upf.* 43. *Fl. zeyl.* *Jalapa*
 85. *Mat. med.* 76.
Nyctagine. *Rox. lugdb.* 417. *Cold. noveb.* 29.
Jalapæ species omnes. *Tournef. inst.* 130.
Solanum mexiocanum, flore parvo. *Baub. pin.* 168.
prodr. 91.
 β. *Solanum mexiocanum,* flore magno. *Baup. pin.* 168.
Admirabilis peruviana. *Clas. hist.* 2. p. 87.
Habitat in India utraque. ♀

CORIS.

1. CORIS. *Hort. cliff.* 68. *Hort. upf.* 46. *Mat. med.* 80. *monspeliensis*
Rox. lugdb. 304. *Sauv. monsp.* 46.
Coris cærulea maritima. *Baup. pin.* 280.
Symphytum petreum. *Cam. epit.* 699.
Habitat in Europæ australis arenosis maritimis.

VERBASCUM.

- VERBASCUM foliis decurrentibus utrinque tomen- *Thapsus.*
 tofis. *Vir. cliff.* 13. *Fl. svec.* 186. *Mat. med.* 90.
Rox. lugdb. 421. *Dalib. paris.* 71.
Verbascum caule simplici superne floribus sessilibus cla-
vato, foliis utrinque lanigeris. *Hort. cliff.* 55
Verbaicum mas latifolium luteum. *Baup. pin.* 239.
Verbascum latius. *Dod. pentpt.* 143.
Habitat in Europæ glareosis sterilibus. ♂

- VERBASCUM foliis cuneiformi-oblongis. *Hort. Lyobnitis.*
upf. 45.
Verbascum foliis ovato-acutis subtus villosis crenatis, spi-
cis laxis lateralibus & terminalibus. *Hort. cliff.* 54.
Rox. lugdb. 421. *Dalib. paris.* 71.

M

Ver-

Verbascum pulverulentum, flore luteo parvo. *Baub. hist.* 3. p. 812. *Raj. hist.* 1094.

Verbascum mas, angustioribus follis, floribus pallidis. *Baub. pin.* 239.

β. Verbascum lychnitis, flore albo parvo. *Baub. pin.* 240. *Verbascum candidum feminum*. *Fisch. hist.* 847.

γ. Phlomis mas siter. *Lob. ic.* 562

Habitat in Europæ ruderatis cultis. ♂

nigrum.

3. *VERBASCUM* foliis cordato-oblongis petiolatis. *Mot. mea.* 91.

Verbascum foliis ovatis crenatis subtus tomentosis, caule angulato. *Vir. cliff.* 13. *Fl. suec.* 187. *Roy. lugdb.* 421. *Dalib. paris.* 91.

Verbascum foliis ovatis subtus incanis crenatis, spica laxa rarius ramosa. *Hort. cliff.* 54.

Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurascente. *Baub. pin.* 240.

Habitat in Europa ad pagos, vias. ♀

Blattaria.

4. *VERBASCUM* foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis solitariis. *Hort. upf.* 46.

Verbascum annum, foliis oblongis sinuatis obtusis. *Hort. cliff.* 15. *Guet. stamp.* 2. p. 309.

Verbascum foliis glabris ferrato-dentatis, radicalibus sinuatis. *Roy. lugdb.* 421. *Dalib. paris.* 72. *Sauv. monsp.* 276.

Blattaria lutea, folio longo laciniate. *Baub. pin.* 240.

Habitat in Europa australioris locis argillaceis. ⊖

Arturus.

5. *VERBASCUM* foliis lyrato-pinnatis.

Verbascum humile creticum laciniatum. *Baub. pin.* 240.

Verbascum brassicæ folio. *Column. ecpr.* 2. p. 81. t. 82. *Habitat in Creta.*

frinatum.

6. *VERBASCUM* foliis radicalibus oblongis sinuatis undatis tomentosis, caulinis cordatis amplexicaulibus nudisculis.

Verbascum foliis pinnato-sinuatis hirsutis: subtus tomentosis. *Roy. lugdb.* 421. *Sauv. monsp.* 276.

Verbascum nigrum, foliis papaveris corniculati. *Baub. pin.* 240. *Camer. hist.* 403. t. 403.

β. Verbascum græcum fruticosum, folio sinuato candidissimo. *Tourn. cor.* 8. *itin.* 1. p. 335. t. 335.

Habitat Monspelii, Florentiae.

obaniceum.

7. *VERBASCUM* foliis ovatis nudis crenatis radicalibus, caule subnudo racemoſo.

Ver-

Verbascum foliis ovatis crenatis nudis scabris, caule ramoso. *Hort. cliff.* 55.

Blattaria purpurea. *Baub. pin.* 241?

Habitat in Europa australi, Bohemia, Lusitania inferiore. 4

8. VERBASCUM foliis incisis nudis, caule folioso, calycibus lanatis, pedunculis bifloris. *Osbeckii.*

Habitat in Hispania. Osbeck.

9. VERBASCUM foliis lanatis radicalibus, scapo nudo. *myconi,* *Cortusa* foliis ovatis sessilibus. *Hort. cliff.* 50. *Roy. lugdb.* 417.

Sanicula alpina, foliis boraginis, villosa. *Baub. pin.* 242. *Auricula urti myconi.* *Dalech. hist.* 837. *Baub. hist.* 3. p. 869.

Habitat in Pyrenæorum nemorosis.

DATURA.

1. DATURA pericarpiis spinosis erectis ovatis. *Hort. Stramonium cliff.* 55. *Hort. apf.* 43. *Fl. suec.* 185. *Gron. virg.* 23. *Roy. lugdb.* 422. *Dalib. paris.* 70.

Solanum foetidum, pomo spinoso oblongo, flore albo. *Baub. pin.* 168.

Solanum sativum, pomo spinoso oblongo, flore albo. *Baub. pin.* 168.

Tatula. Gam. epit. 176.

Habitat in America, nunc vulgaris per Europam. ☺

2. DATURA pericarpiis spinosis nutantibus globosis. *Mete.* *Hort. cliff.* 55. *Hort. apf.* 44. *Fl. zeyl.* 86. *Mat. med.* 85. *Roy. lugdb.* 422.

Solanum pomo spinoso rotundo, longo flore. *Baub. pin.* 168.

Huminatu. Rheed. mal. 2. p. 47. t. 28.

Habitat in Asia, Africa. ☺

3. DATURA pericarpiis inermibus nutantibus, caule arboreo.

Stramonoides arboreum, oblongo & integro folio, fructu laevi. *Fewil. peruv.* 2. p. t. 46.

Habitat in Peru. 5

HYOSCYAMUS.

1. HYOSCYAMUS foliis amplexicaulibus. *Hort. cliff.* *niger,* 56. *Fl. suec.* 184. *Mat. med.* 86. *Roy. lugdb.* 422.

Dalib. paris. 70. *Hall. helv.* 512.

Hyoscyamus vulgaris & niger. Baub. pin. 169.
Habitat in Europæ ruderatis pinguibus. ♂

albus.

2. **HYOSCYAMUS** foliis petiolatis, floribus sessilibus.
Hort. cliff. 56. Roy. lugdb. 422. Sauv. monsp. 275.

Hyoscyamus albus major. Baub. pin. 169.

3. **Hyoscyamus albus minor. Baub. pin. 169.**

Hyoscyamus albus vulgaris. Clus. hist. 2. p. 118
Habitat in Europa australi. ⊖

luteus.

3. **HYOSCYAMUS** foliis petiolatis, floribus pedunculatis.
Hort. cliff. 56. Roy. lugdb. 422.

Hyoscyamus creticus luteus major Baub. pin. 169
prodri. 92.

3. **Hyoscyamus creticus luteus minor. Baub. pin. 169.**

Hyoscyamus aureus. Alp. exot. 99. t. 98.
Habitat in Creta. ⊖

pusillus.

4. **HYOSCYAMUS** foliis lanceolatis subdentatis, calycibus spinosis.
Hort. upf. 44.

Hyoscyamus foliis lanceolatis. Hort. cliff. 56. Roy. lugdb.
422.

Hyoscyamus pusillus aureus americanus, antirrhini foliis
glabris. Plak. alm. 188. t. 37. f. 5.

Habitat in Persia. ⊖

physalodes.

5. **HYOSCYAMUS** foliis ovatis integerrimis, calycibus inflatis subglobosis.
*Hort. upf. 44. **

Habitat in Sibiria. 2

NICOTIANA.

Tabacum.

1. **NICOTIANA** foliis lanceolatis.
Hort. cliff. 56. Hort. upf. 45. Mat. med. 87. Roy. lugdb. 423.

Nicotiana major latifolia. Baub. pin. 169.

Blennochoes. Reneal. spec. 37. t. 38.

Habitat in America, nota Europæis ab 1560. ⊖

rufica.

2. **NICOTIANA** foliis ovatis.
Hort. cliff. 56. Hort. upf.
45. Roy. lugdb. 423.

Nicotiana minor. Baub. pin. 170.

Pachyphylla. Reneal. spec. 40.

Habitat in America, nunc in Europa. ⊖

paniculata.

3. **NICOTIANA** foliis cordatis, floribus paniculatis: tubis clavatis.

Nicotiana minor, folio cordiforme tubo floris prælongo. Fewill. peruv. 1. p. 717. t. 10.

Habitat in Peru. ◎

*Differet a secunda Caule teneriore, altiore, paniculato.
Corollis angustioribus: limbo brevissimo, obtusissimo,
tubo longo clavato; calycibus capsulisque acutis.*

4. NICOTIANA foliis cordatis, corollis racemosis glutinosa.
subringentibus, calycibus inæqualibus.

Habitat in Peru. D. B. Jussieu. ◎

Folia magis cordata, glutinosa. Flores in racemos paucos, ligatos. Corollæ ferme speciei primæ, sed magis inæquales & fere ringentes fauce biantes. Stamina ad latus superius inflexa. Calycis una iacinia reliquis duplo major.

MANDRAGORA.

1. MANDRAGORA Hort. cliff. 51. Roy. lugdb. 423. officinaria,
Mat. med. 83.

Mandragora fructu rotundo. Bauh. pin. 169.

Mandragoras. Dod. pempt. 457.

Habitat in Hispaniæ, Italiæ, Cretæ, Cycladum apricis.

ATROPA.

1. ATROPA caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Bella donna.*
Atropa. Hort. cliff. 57. Hort. upf. 45. Roy. lugdb. 423.
Solanum melanocerasus. Bauh. pin. 166.
Solanum lethale. Clus. hist. 2. p. 86.
Habitat in Austriae. Angliae montibus sylvosis. 4

2. ATROPA foliis sinuato-angulatis, calycibus clausis a-physalodes.
cutangulis.

Alkekengi amplio flore violaceo. Few. peruv. 724. t. 16.

Habitat in Peru. D. B. Jussieu. ◎

*Radix fibrosa, annua. Caulis bipeialis, patulus, erectus,
ramis angulatis. Folia alterna, glabra, oblonga, per
petiolum decurrentia, obtuse sinuata (Daturæ). Pedun-
culi ad latus petiolorum solitarii, nudi, uniflori. Ca-
lyx evatus, basi excisus, angulis quinque compressis, pro-
funde 5 paritus: foliolis sagittato-ovatis. Corolla cam-
panulata, parum quinqueloba, obtusa. Limbo erecto, sub-
plicato, carulescente. Stamina 5, sabulata, basi dilata-
ta, subvillosa, cirolla longe breviora, superne diver-
gentia. Antheræ erectæ. Germen intra basin stami-
num. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma*

capitatum. Fructus cernuus, tectus calyce majore, quinquangulari angulis compressis arcte clausis, basi mucronatis. Bacca exsucca, 3. 4. s. 5. locularis; semina subrotunda, compressa. Media inter Atropam & Physalidem; a Physalide differt figura corollæ, staminibus distantibus, calyce quinquepartito, capsula loculamentis pluribus.

frutescens. 3. ATROPA caule fruticoso.

Bella-donna frutescens rotundifolia hispanica, Tournef. inst. 77. Barr. ic. 1173.

Habitat in Hispania. ♂

Habitus & omnia Physalidis somnifera, ut limites generum in solo calyce consistant.

PHYSALIS.

* perennæ.

somnifera. 1. PHYSALIS caule fruticoso, ramis rectis, floribus confertis.

Physalis caule fruticoso tereti, foliis ovatis integerrimis, floribus confertis. Hort. cliff. 62. Roy. lugdb. 426.

Solanum somniferum verticillatum. Baub. pin. 166.

Solanum somniferum. Clus. hist. 2. p. 85.

Habitat in Mexico, Creta, Hispania. ♂

Fructus Physalidis; Flos Atropæ; Herba præcedentis, cui ita similis, ut vix genere separari queat.

flexuosa.

2. PHYSALIS caule fruticoso, ramis flexuosis, floribus confertis.

Baccifera indica, floribus ad foliorum exortus, fructu sultato decapyreno. Raj hist. 1652.

Pevetti. Rheed. mal. 4. p. 113. t. 55.

Habitat in India. ♂

Habitus & statura P. somnifera; Flores itidem sparsi ad axillas foliorum; Calyces etiam insuscuntur & involvunt baccam; Manifeste vero differt floribus minoribus, ramis bifariam valde flexuosis, hinc folia quasi distiche disposita, flexuræ angulis exterioribus inserta.

virginiana

3. PHYSALIS caule fruticoso, foliis ovatis tomentosis.

Vir. cliff. 16. Roy. lugdb. 426.

Physalis caule perenni, foliis ovatis solitariis, ramis annuinis simplicissimis, Hort. cliff. 62. *

Solanum vesicarium curassavicum, solano antiquorum simile, foliis origani subincanis. Maris. hist. 3. p. 527.

Plak. alm. 352. t. 111. f. 5.

Habitat in Carallao. ♂

4. PHYSALIS foliis cordatis integerrimis obtusis scabris, *viscosa*,
corollis glabris.

Physalis radice perenni, foliis cordatis obtusis. Hort. cliff.

496. *Roy. lugdb. 426 Gron. virg. 24.*

Alkekengi bonariense repens, bacca turbinata viscosa.

Dill. elth. 11. t. 10. f. 10.

Habitat in Virginia, Bonaria. ♀

5. PHYSALIS foliis geminis.

Alkekengi.

*Physalis caule simplici annuo, foliis integerrimis gemi-
natis, floribus solitariis. Hort. cliff. 62. Hort. upf. 49.*

Mat. med. 93. Dalib. paris. 73.

*Physalis radice perenni, foliis lanceolato-cordatis. Vir.
cliff. 16. Roy. lugdb. 426.*

Solanum vesicarium. Baub. pin. 166. Dod. pempt. 454.

Habitat in Italia. ♀

* *Annuæ.*

6. PHYSALIS ramosissima, ramis angulatis glabris.

angulata.

*Physalis annua ramosissima, ramis angulosis glabris, fo-
liis dentato-serratis. Hort. cliff. 62. Hort. upf. 50.*

Fl. zeyl. 97. Roy. lugdb. 427.

*Halicacabum s. Solanum indicum. Comm. hort. 1. p.
70. t. 17.*

Solanum vesicarium indicum. Baub. pin. 166.

*Alkekengi indicum glabrum, chenopodii folio. Dill.
elth. 13. t. 12. f. 12.*

β. Alkekengi indicum glabrum, capsicæ folio. *Dill. elth.
12. t. 11. f. 11.*

Habitat in India utraque. ⊙

7. PHYSALIS ramosissima, foliis villoso-viscosis, pe- *pubescens*,
dunculis nutantibus.

*Physalis annua ramosissima, ramis teretibus pubescenti-
bus: geniculis nodosis. Hort. cliff. 62.*

*Alkekengi virginianum, fructu luteo. Fewill. peruv. 3.
p. 5. t. 1.*

*Solanum vesicarium virginianum procumbens annum,
folio lanuginoso. Moris. hist. 3. p. 527. f. 13. t. 3.
f. 24.*

Habitat in India utraque. ⊙

*Fructus villoso-viscosus, nec glaber; maculae corollæ fu-
scæ, nec pallidæ. Pedunculi nutantes, nec cernui.*

8. PHYSALIS ramosissima, pedunculis fructiferis folio *minima*,
longioribus. *Hort. cliff. 62. Roy. lugdb. 427.*

*Solanum vesicarium indicum minimum. Herm. lugdb.
569. t. 571.*
Pee-inota-inodien. *Kheed. mal. 10. t. 140. f. 71.*
Habitat in Indiæ aridis sordidis. ♂

pruinosa. 9. *PHYSALIS ramosissima*, divaricationibus farinaceous germinantibus.

Habitat in America. ♂

Facies antecedentium 5. 6. 7. 8. sed antheræ flavæ, nec cœruleæ; rami teretes: supra plani villosi; Folia villosa-viscosa; Ale ramificationum viridi quasi pruina germinant.

SOLANUM.

* *inermia.*

*verbascifoli- 1. SOLANUM caule inermi fruticoso, foliis ovatis to-
ur.* mentosis integerrimis, umbellis compositis.

Solanum arborescens, verbasci folio. Plum. spec. 4.

Solanum maxime tomentosum, spinis carens, virginianum. Pluk. alm. 351. t. 316. f. 1.

Habitat in America. ♂

*guineense. 2. SOLANUM caule inermi fruticoso, foliis ovatis in-
tegerrimis, pedunculis lateralibus filiformibus.*

*Solanum caule inermi perenni, foliis ovatis integris,
floribus ad basin ramulorum confertis. Roy. lugdb.
424.*

*Solanum africanum lignosum, folio atroviridi angusto
oblongo obtuso. Boerb. lugdb. 2. p. 68.*

Habitat in Guinea. ♂

*Pseudocap- 3. SOLANUM caule inermi fruticoso, foliis lanceola-
ficum. tis repandis, umbellis sessilibus.*

*Solanum caule inermi fruticoso, foliis ovato-lanceola-
tis integris, floribus solitariis. Hort. cliff. 61. Hort.
ups. 48. Roy. lugdb. 424.*

Solanum fruticosum bacciferum. Baub. pin. 61.

Pseudocapsicum. Dod. pent. 718.

Habitat in Madera. ♂

*diphyllum. 4. SOLANUM caule inermi fruticoso, foliis geminis
altero minore, floribus cymosis.*

*Solanum caule inermi perenni, foliis ovato-lanceolatis
geminis: altero minimo. Vir. cliff. 15. Hort. cliff.
61. Roy. lugdb. 424.*

*Solanum americanum strychnodendro accedens, fru-
ctu-*

Et tu medio quasi fisso. *Pluk. alm.* 349. t. III. f. 4.
mala.

Habitat in America? ♂

5. SOLANUM caule inermi frutescente flexuoso, foliis *Dulcamara*.
superioribus hastatis, racemis cymosis. *Hort. cliff.* 60.
Fl. suec. 189: *Mat. med.* 95. *Roy. lugdb.* 424. *Dalib.*
paris. 73.

Solanum scandens f. *Dulcamara*. *Bauh. pin.* 167.

- β. *Solanum dulcamarum* africanum, foliis crassis hirsutis.
Dill. elth. 365. t. 273. f. 352.

Habitat in Europa *sepibus humentibus.* ♂

6. SOLANUM caule inermi frutescente flexuoso, foliis *quercifolium*
oblongis lateribus sinuatis, racemis cymosis.

Solanum foliis quernis. *Few. peruv.* 722. t. 15.

Habitat in Peru. *D. Jussieu.* ♂

Habitus S. Dulcamarae; Rami angulati. Folia ovato-
oblonga, in petiolum decurrentia, venosa, glabra, late-
ribus pinnato-sinuata. Pedunculi ramosi. Corollæ vio-
laceæ, obtusiores quam *Dulcamarae*: maculis duabus pal-
lidis ad basin singuli lobi. Antheræ flavæ, stylo breviores.

7. SOLANUM caule frutescente subinermi, foliis cu- *bonariense*.
nciforinibus sinuato-repandis.

Solanum bonariense arborescens, papas floribus. *Dill.*
elth. 364. t. 272. f. 351.

Habitat in agro Bonariensi. ♂

Folia & Flores maximi; Aculei aliquot in tenella planta,
non vero in adulta.

8. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinnatis in- *tuberosum*.
tegerrimis. *Vir. cliff.* 15. *Hort. cliff.* 60. *Hort. ups.*
48. *Roy. lugdb.* 423. *Dalib. paris.* 73.

Solanum tuberosum esculentum. *Bauh. pin.* 167. *prodr.*
89. t. 89.

Habitat in Peru. ⊖ -- ♀

9. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinnatis in- *Lycopersicum*
cisis, racemis simplicibus. *Vir. cliff.* 15. *Hort. cliff.*
60. *Roy. lugdb.* 423.

Solanum pomiferum, fructu rotundo striato molli
Bauh. pin. 167.

Poma amoris. *Cam. epit.* 821.

- β. *Solanum racemosum* cerasorum forma. *Bauh. pin.* 167.
prodr. 90.

Habitat in America calidiore. ⊖. β ♀

peruvianum. 10. **SOLANUM** caule incruci herbaceo, foliis pinnatis incisis, racemis bipartitis reflexis, baccis subpilosis. *Lycopericon* pimpinellæ folio. *Few. peruv.* 3. p. 37. t. 25.

Habitat in Peru. D. Jussien. 2

montanum. 11. **SOLANUM** caule incruci herbaceo, foliis subcordatis repandis.

Solanum tuberosum minus, atriplicis folio, vulgo Pa-pa montana. *Few. peruv.* 3. p. t. 46.

Habitat in Peru. 2

nigrum. 12. **SOLANUM** caule incruci herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, umbellis nutantibus.

vulgare. Solanum caule inermi herbaceo, foliis ovatis angulatis.

Vir. cliff. 15. *Hort. cliff.* 60. *Hort. ups.* 48. *Fl. suec* 188. *Mat. med.* 94. *Gron. virg.* 24. *Roy. lugdb.* 433. *Dalib. paris.* 72.

Solanum officinarum. *Baub. pin.* 166.

patulum. β — *ramis teretibus glabris*, *foliis integerrimis glabris*.

Solanum procerius patulum vulgaris fructu. *Dill. elth* 367. t. 275. f. 355.

villosum. γ — *ramis teretibus villoso*, *foliis angulatis subvilloso* *Solanum annum hirsutius*, *baccis luteis*. *Dill. elth.* 366. t. 274. f. 353,

guineense. δ — *ramis angulatis dentatis*, *foliis integerrimis glabris* *Solanum guineense*, *fructu magno instar cerasi*. *Dill. elth.* 366. t. 274. f. 354.

virginicum ϵ — *ramis angulatis dentatis*, *foliis repandis glabris*. *Solanum nigrum vulgari simile*, *caulibus exasperatis*. *Dill. elth.* 368, t. 275. f. 256.

judaicum. ζ — *ramis aculeis incurvis*, *foliis repandis nudis*.

Habitat in Orbis totius cultis. ○

Tot varietates β , γ , δ , ϵ , ζ . videntur esse hybridæ pro-les.

S. *Spinosa*.

Melongena. 13. **SOLANUM** caule inermi herbaceo, foliis ovatis tomentosis integris, calycibus spinosis.

Solanum calycibus aculeatis, *foliis ovatis integerrimis tomentosis*. *Hort. cliff.* 61. *Hort. ups.* 49. *Fl. zeyl.* 93. *Roy. lugdb.* 426.

Solanum pomiferum, *fructu oblongo*. *Baub. pin.* 167. *Mala insana*. *Dod. pempt.* 458.

Habitat in Asia, Africa, America. ○

14. SOLANUM caule aculeato herbaceo, foliis cordatis *Campechiensis*, sinuatis, calycibus aculeatis. *Vir. cliff.* 16. *Hort. cliff.* *ie.* 61.
Solanum campechiense, calycibus echinatis. *Dill. elth.* 361. *f.* 268. *f.* 347.
Habitat in America ad finum Campechiense.
15. SOLANUM caule aculeato herbaceo, foliis cordatis *mammosum*, quinquelobis; utrinque villosis aculeatis. *Vir. cliff.* 15.
Hort. cliff. 61. *Hort. upf.* 49. *Roy. lugdb.* 425.
Solanum barbadense spinosum annum, fructu aureo rotundiore pyri parvi inversi formia & magnitudine. *Pluk.* *alm.* 350. *t.* 225. *f.* 1.
Habitat in Virginia, Barbados. ☽
16. SOLANUM caule aculeato herbaceo, foliis pinnatis *virginianum* fidis; lacinias sinuatis obtusis, calycibus aculeatis. *Roy. lugdb.* 425. *
Solanum americanum laciñiatum spinosissimum. *Dill. elth.* 360. *t.* 368. *f.* 267.
Solanum annum virginianum nigricans spinosissimum, flore cæruleo. *Pluk. alm.* 351. *t.* 62. *f.* 3.
Habitat in America. ☽
17. SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis angulis *indicum*, tomentosis integerrimis; aculeis utrinque rectis, calycibus inermibus. *Fl. zeyl.* 94. *
Solanum caule aculeato fruticoso, foliis ovatis sinuatis integerrimis, spinis utrinque erectis. *Hort. cliff.* 61.
Roy. lugdb. 424.
Solanum indicum spinosum, flore boraginis. *Robert. ie.* 28. *Dill. elth.* 362. *t.* 270. *f.* 349.
Solanum americanum perenne subincanum, fructu pyriformi longiore, spinis plurimis armatum. *Pluk. alm.* 350. *t.* 225. *f.* 6.
Habitat in India utraque ♀
18. SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis hastato-*angulatis*; aculeis utrinque rectis, racemis laxis.
Solanum caule aculeato fruticoso, foliis ovatis lateribus laciñiatis aculeis utrinque rectis. *Hort. cliff.* 61. *
Vir. cliff. 15. *Roy. lugdb.* 424.
Solanum carolinense spinosum, boraginis floribus spicatis. *Dill. elth.* 362. *t.* 269. *f.* 348.
Habitat in Carolina. ♀
19. SOLANUM caule aculeis recurvis, foliis sinuatis *sudanum* sub-

subtus tomentosis utrinque aculeatis, pedunculis aculeatis. *Fl. zeyl.* 95. * *Hort. upl.* 49.

Solanum caule aculeato fruticoso, foliis oblongis pinnato-laciati, spinis supinis erectis, pronis recurvis. Hort. cliff. 61. *Vir. cliff.* 15. *Roy. lugdb.* 424.

Solanum pomiferum frutescens africanum spinosum nigricans, boraginis flore, foliis profunde laciati. Herm. lugdb. 573. t. 575. *Morif. hist.* 3. p. 521. f. 13. t. 1. f. 15. *Pluk. alm.* 251. t. 226. f. 5.

Habitat in Africa. 5

incanum. 20. *SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis repandis, calycibus aculeatis. Roy. lugdb.* 425.

Solanum spinosum incanum, foliis sinuatis, flore boraginis, fructu lateo ovuli gallinacei magnitudine & forma. Boerb. 2. p. 68.

Habitat - - -

tomentosum. 21. *SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis cordatis villosis margine repandis, calycibus inermibus. Hort. cliff.* 61. *Roy. lugdb.* 425.

Solanum pomiferum frutescens, flore boraginis, folio tomentoso incano, solo caule spinoso. Boerb. lugdb. 2. p. 69.

Habitat in America septentrionali.

bahamense. 22. *SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis lanceolatis anguloso-dentatis. Hort. cliff.* 61. *Roy. lugdb.* 424.

Solanum bahamense spinosum, petalis angustis reflexis. Dill. elth. 263. t. 271. f. 250.

Solanum spiniferum frutescens, spinis igneis, americanum. Pluk. alm. 350. t. 225. f. 5.

Habitat in Americæ insula Providentia. 5

trilobatum. 23. *SOLANUM caule aculeato fruticoso, foliis subtrilobis glabris obtusis inermibus.*

Habitat in India.

Caulis subfrutescens. Folia parva, glabra, obtusa, subtriloba, raro etiam ad basin lobata. Aculei reflexi in caule, petiolis, pedunculis. Pedunculi uniflori; Calyces minimi, inermes. Stylus ascendens. Figura proxime accedit ad. Pluk. tab. 316. f. 5.

CAPSICUM.

annuum. 1. *CAPSICUM caule herbaceo. Roy. lugdb.* 426.

Cap-

Capiscum annuum. *Hort. cliff.* 59. *Hort. upr.* 47. *Fl. zeyl.* 92. *Mat. med.* 96.

Piper indicum vulgatissimum. *Bauh. pin.* 132.

Vallia-capo-molago. *Rheed. mal.* 2. p. t. 35.

Habitat in America meridionali. ⊙

2. CAPSICUM caule fruticoso. *Roy. lugdb.* 426. *frutescens.*
Capiscum frutescens. *Hort. cliff.* 59.
Capo-molago. *Rheed. mal.* 2. p. 109. t. 56.
Habitat in India. ♀

STRYCHNOS.

1. STRYCHNOS foliis ovatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* *Nux vomica* 91. *Mat. med.* 77.
Strychnos foliis quinquenerviis. *Wach. ultr.* 32.
Nux Vomica officinarum. *Bauh. pin.* 511. *Raj. hist.* 1814.
Colubrini ligni tertium genus in malabar. *Bauh. pin.* 301.
Caniram. *Rheed. mal.* 1. p. 67. t. 37. *Raj. hist.* 1661.
Habitat in India. ♀
2. STRYCHNOS foliis ovatis acutis, cirrhis simplicibus. *colubrina.*
Mat. med. 78, *Amer. acad.* 2. p. 119.
Strychnos foliis trinerviis ovatis binatis. *Wach. ultr.* 32.
Cleintasis indica spinosa, foliis luteis. *Bauh. pin.* 301.
Fructus orbicularis major fuscus striatus. *Bauh. pin.* 405.
Modira-caniram. *Rheed. mal.* 7. p. 10. t. 5. *Raj. hist.* 1661.
Habitat in India. ♀

CHIRONIA.

1. CHIRONIA herbacea, calycinis foliolis membrana-*trinervia.*
ceo-carinatis. *Fl. zeyl.* 90. *
Chironia foliis lanceolatis trinerviis. *Hort. cliff.* 54.
Lysimachia folio sinuato acuminate trinervio, flore cæ-
ruleo ample, calyce carinato alato. *Burm. zeyl.* 145.
t. 67.
Habitat in Zeylona. ⊙
2. CHIRONIA herbacea, foliis linearibus. *Hort. cliff.* *linoides.*
54. Roy. lugdb. 433.
Rapuntio affinis, lini facie, capitis b. spei. *Breyn. cent.*
175. t. 90.
Habitat in Capitis b. Spei herbidis. ♀

- samparvata* 3. CHIRONIA herbacea, foliis sublinearibus, calycibus longitudine corollæ.
Habitat in Canada. Kalm.
Caulis pedalis, teres: Ramis longis. Folia lanceolato-linearia, levia. Flores terminales, solitarii rotati, purpurei, pedunculo longo insidentes; calycis folioli longitudine corollæ, subulata. Antheræ spirales.
- angustifolia*. 4. CHIRONIA herbacea, caule acutangulo, foliis ovatis amplexicaulibus.
Habitat in Virginia. Kalm.
Facies Centaurii minoris. Caulis pedalis, tetragonus: articulis membranaceis. Folia ovata, hyperici, opposita, sessilia & semiamplexicaulia. Flores congesti, ut in Hyperico; Antherae spirales, Stylus bifidus.
- dodecandra*. 5. CHIRONIA floribus duodecemfidis.
Gentiana floribus duodecim-petalis, foliis distinctis. Gron. virg. 27.
Habitat in Virginia
- baccifera*. 6. CHIRONIA frutescens baccifera.
Centaurium minus arborescens pulpiferum. Comm. rar. 9. t. 9.
Centaurium minus africanum arborescens angustifolium. Old. afr. 26.
Habitat in Æthiopia. ♂
- frutescens*. 7. CHIRONIA frutescens capsulifera.
Centaurium minus africanum arborescens latifolium, flore ruberrimo. Comm. rar. 8. t. 8. Old. afr. 26.
Habitat in Æthiopia. ♂

CORDIA.

- Myxa*. 1. CORDIA foliis subovatis serrato-dentatis. *Hort. cliff. 63. Mat. med. 171.*
Sebestena sylvestris & domestica. Benth. pin. 446. Alp. egypt. 30.
Sebestena domestica f. Myxa. Comm. hort. 1. p. 139. t. 79.
Vidi-maram. Rheed. mal. 4. p. 77. t. 37.
Habitat in Ægypto, Malabar. ♂
- Sebestena*. 2. CORDIA foliis oblongo ovatis repandis scabris.
Sebestena scabra, flore miniato criso. Dill. elth. 341. t. 255. f. 331.

Caryophyllum spurium inodorus, folio subrotundato scabro,
flore racemoso hexapetaloidae coccineo. *Sloan.* *jam.*
136. *bif.* *2.* *p.* *20.* *t.* *164.* *Raj.* *suppl.* *86.* *Catesb.*
car. *2.* *p.* *91.* *t.* *91.*

Habitat in America calidiore. ♂

3. CORDIA foliis ovatis integerrimis. *glabra.*
Cordia nucis iuglandis folio. *Plam.* *gen.* *13?*
Habitat in America meridionali. ♂
Folia exaequo ovata, levia, in neutra pagina scabra. Co-
rollæ tubis longitudine tantum calycis.

BRUNSFELSIÆ.

1. BRUNSFELSIÆ. *americana*
Brunsfelsia flore albo, fructu crocco molli. *Plam.* *gen.* *12.*
Habitat in America meridionali.
Folia oblonga, obtusa, integerrima, petiolata; Flores in
apice ramorum plures.

CESTRUM.

1. CESTRUM floribus pedunculatis. *Hort. cliff.* *490.* *nocturnum.*
Jasminoides foliis pishaminis, flore virescente noctu odo-
ratissimo. *Dill. elib.* *183.* *t.* *153.* *f.* *185.*
Jasminum laurinum foliis, flore pallido luteo, fructu atro-
cæruleo polyptreno venenato. *Sloan.* *jam.* *169.* *bif.*
2. *p.* *96.* *t.* *204.* *f.* *2.* *Raj.* *dendr.* *63.*
Syringa laurifolia jamaicensis, floribus ex flavo palle-
scentibus. *Pluk. alm.* *35.* *t.* *64.* *f.* *3.*
Parqui. *Fewill. peruv.* *2.* *p.* *32.* *t.* *32.* *f.* *1.*
Habitat in Jamaica, Chilli. ♂

2. CESTRUM floribus sessilibus. *Hort. cliff.* *491.* *diurnum.*
Jasminoides laureola folio, flore candido interdiu odora-
to. *Dill. elib.* *186.* *t.* *154.* *f.* *186.*
Laureola sempervirens americana, latioribus foliis, floribus
albis odoratis. *Pluk. alm.* *209.* *t.* *95.* *f.* *1.* *Raj.*
dendr. *53.*
Hedionda jasmini flora. *Fewill. peruv.* *2.* *p.* *25.* *t.* *20.*
f. *3.*
Habitat in Chilli, Havana. ♂

LYCIUM.

1. LYCIUM foliis linearibus. *Hort. cliff.* *57.* *Hort. upf.* *afghanum*
47.
Jas.

Jasminoides africanum, *jasmini aculeati* foliis & facie.
Niss. act. 1711. p. 420. t. 12.

Rhamnus alter, foliis falsis, flore purpureo. *Bauh. pin. 477.*

β. Jasminoides aculeatum humile, *halimi minoris* folio, flore minore, per in Naturitatem flavescente. *Mich. gen. 224. t. 105. f. 2.*

Habitat in Africa & in Regno Valentino. ♂

barbarum. 2. *LYCIUM* foliis lanceolatis crassiusculis, calycibus bifidis.

Rhamnus peregrinus, *rosmarini* folio, candidior. *Pink alm. 317. mant. 160. t. 322. f. 2. mala.*

Jasminoides aculeatum, *polygoni* folio, floribus parvis albidis. *Schaw. afric. 349. f. 349?*

Habitat in Asia, Africa? ♂

Calycis ore bilobo, aut interdum trilobo, a reliquis speciebus diversum.

europaeum. 3. *LYCIUM* foliis cuneiformibus. *Vir. cliff. 14. Roy lugdb. 436.*

Jasminoides aculeatum, *salicis* folio, flore parvo ex albo purpurascente. *Mich. gen. 224. t. 105. f. 1.*

Rhamnus spinis oblongis, *flore candicante.* *Bauh. pin 477.*

Habitat in Narbona, Hispania, Lusitania, Italia. ♂

CHRYSOPHYLLUM.

Cainito.

1. *CHRYSOPHYLLUM.*

Chrysophyllum foliis ovatis superne glabris, parallele striatis, subtus tomentoso-nitidis. *Hort. cliff. 491.*

Anona foliis subtus ferrugineis, fructu rotundo majore laevi purpureo, semine nigro partim rugoso partim glabro. *Sloan. jam. 206. hist. 2. p. 170. t. 229. Raj. dendr. 78.*

Cainito. Laet. amer. 390.

Cainito folio subtus aureo, fructu maliformi. *Plum. gen. 10.*

β. Cainito folio subtus aureo, fructu oliviformi. *Plum. gen. 10.*

Habitat in America calidiore. ♂

Folia alterna, petiolata, ovata, integerrima. Pedunculi laterales, uniflori, numerosi, brevissimi.

SIDEROXYLON.

inerme.

1. *SIDEROXYLON inerme.* *Hort. cliff. 69.*

Si-

Sideroxylon primum L. *dein Coriæ indorum nomine*
data arbor. *Dill. elth.* 357. *t. 265. f. 344.*
Padus foliis oblongis, fructu solitario. *Burm. afric.* 238.
t. 84. f. 2.

Habitat in Aethiopia. ♂

2. *SIDEROXYLON spinosum.* *Hort. cliff.* 69. *spinosum.*
Ebenus jamaicensis arbuscula, buxi foliis, spinosa. *Plak*
alm. 132. *t. 89. f. 1.*

Carou-mœlli. *Rheed. mal.* 5. *p. 77. t. 39.* *Raj. hist.*
1634.

Habitat in Malabarica. ♂

RHAMNUS.

* *Spinosi.*

1. *RHAMNUS spicis terminalibus, floribus quadrifidis catharticus.*
dioicis. *Hort. cliff.* 70. *Fl. suec.* 193. *Mat. med.* 72.
Roy. lugdb. 224.

Rhamnus catharticus. *Baub. pin.* 478.

Cervispina. *Cord. hist.* 175.

Habitat in Europæ australioris sepibus. ♂

* * *inermes.*

2. *RHAMNUS inermis, floribus dioicis, foliis duplito-*alpinus.**
to-crenatis.

Frangula ora folii ferrata. *Hall. helv.* 164.

Frangula rugosiore & ampliore folio. *Tournef. inst.* 612.

Frangula altera polycarpos. *Baub. prodr.* 160.

Alnus nigra baccifera, rugosiore folio. *f. major.* *Baub.*
hist. 1. *p. 562.*

Alnus nigra polycarpos. *Baub. pin.* 428.

Habitat in alpibus Helveticis. ♂

3. *RHAMNUS inermis, floribus monogynis hermaphro-*Frangula.**
ditis, foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 70. *Fl. suec.* 224.
Mat. med. 73. *Roy. lugdb.* 224.

Rhamnus inermis, foliis annuis. *Fl. lapp.* 60.

Alnus nigra baccifera. *Baub. pin.* 428.

Frangula. *Dod. pempt.* 784.

3. *Alnus inermis, foliis ovatis integerrimis glabris.* *Roy. laevifolius.*
lugdb. 224.

Habitat in Europæ borealis nemorosis humidiusculis. ♂

4. *RHAMNUS inermis, floribus dioicis, fligmate tripli-*Alaternus.**
ci. *Vir. cliff.* 19. *Hort. ups.* 47. *Sauv. monsp.* 95.

- Rhamnus inermis, floribus polygamis, stigmate triplici, foliis ferratis. *Hort. cliff.* 70. *Roy. lugdb.* 225.
Phylica elatior. *Bauh. pin.* 477.
Phylica humilior. *Bauh. pin.* 477.
Alaternus. 1. 2. *Clus. hist.* 1. p. 50.
Habitat in Europa australi. ♂

* * * *Aculeati.*

- Paliurus.* 5. RHAMNUS aculeis geminatis: inferiore reflexo, floribus trigynis. *Hort. cliff.* 69. *Hort. upf.* 47. *Roy. lugdb.* 224. *Sauv. monsp.* 306.
Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso. *Bauh. pin.* 477.
Paliurus. *Dod. pempt.* 576.
Habitat in Europa australi. ♂
- Lotus.* 6. RHAMNUS aculeis geminatis: altero recurvo, foliis ovato-oblongis.
Zizyphus sylvestris. *Tournef. inst.* 627. *Shaw. afr.* 631. f. 631.
Habitat in Regno Tunetano. ♂
Frutex ramulis teretibus. Aculei duo ad exortum foliorum: altero horizontali, altero recurvo ut in *Paliuro*, sed Folia omnia zizyphi, figura, nervis, glabritie, magnitudine, at margo obsolete & rarius crenatus.
- Napeca.* 7. RHAMNUS aculeis subgeminatis recurvis, pedunculis corymbosis, floribus semidigynis, foliis ferratis utrinque laevibus. *Fl. zeyl.* 87.*
Habitat in Zeylona. ♂
- Jujuba.* 8. RHAMNUS aculeis solitariis recurvis, pedunculis aggregatis, floribus semidigynis, foliis retusis subtus tomentosis. *Fl. zeyl.* 89. *
Jujuba indica spinosa, folio & fructu rotundo. *Plnk. alm.* 199. *Raj. dendr.* 44.
Habitat in India, ♂
- OENOPOLIA.* 9. RHAMNUS aculeis solitariis recurvis, pedunculis aggregatis subsessilibus, foliis semicordatis subtus tomentosis. *Fl. zeyl.* 88.
Jujuba aculeata, nervolis foliis infra sericeis flavis. *Burm. zeyl.* 131. t. 61.
Habitat in Zeylona ♂
- Zizyphus.* 10. RHAMNUS aculeis geminatis rectis, floribus digynis, foliis ovato-oblongis. *Hort. cliff.* 69. *Mat. med.* 74. *Roy. lugdb.* 224. *Sauv. monsp.* 59. Ju-

- Jujuba sylvestris.* Baub. pin. 446.
Zizyphus. Dod. pempt. 807.
β. *Jujubæ majores oblongæ.* Baub. pin. 446.
Habitat in Europa australi. ♂

11. RHAMNUS aculeis geminatis rectis, foliis ovatis. *Spina Christi*
Hort. cliff. 63. * *Roy. lugdb. 224.*
Jujube f. *Zizyphus africana*, mucronatis foliis, spina
 gemella. *Pluk. alm. 199.* t. 197. f. 3.
Habitat in Æthiopia, Palæstina. ♂
Arbuscula e semiibus missis sub nomine Spinæ Christi.
Hierosolyma a D. Hasselquist.

PHYLICA.

1. PHYLICA foliis linearibus verticillatis. *ericoides.*
Phylica foliis ovato-linearibus. *Hort. cliff. 70.* *Roy.*
lugdb. 199.
Alaternoides africana, ericæ foliis, floribus albicantibus
 & muscosis. *Comm. hort. 2. p. 1. t. 1.*
Habitat in Æthiopia. ♂
2. PHYLICA foliis linearis-subulatis: summis hirsutis. *Roy. plurusa,*
lugdb. 199.
Ricinus arboreseens africanus, tomentosis capitulis. *Seb.*
ibid. 1. p. 38. t. 23. f. 4. 5.
Chamælea africana tricoccos & tetracoccos taxifolia, vil-
 losa cæfarie coronata. *Pluk. mant. 45.* t. 342. f. 3.
Chamælea foliis angustis subtus incanis, floribus capita-
 tis muscosis. *Burm. afr. 117.* t. 43. f. 2
Habitat in Æthiopia. ♂
3. PHYLICA foliis ovatis sparsis. *buxifolia.*
Chamælea folio subrotundo subtus incano, floribus in
 capitulum collectis. *Burm. afr. 119.* t. 44. f. 1.
Chamælea africana, foliis subrotundis. *Herman. afr. 6.*
Habitat in Æthiopia. ♂

CEANOOTHUS.

1. CEANOOTHUS foliis trinerviis. *americanus.*
Ceanothus corymbis folio longioribus. *Hort. upf. 51.*
Ceanothus. *Act. upf. 1741.* p. 77,
Celastrus inermis, foliis ovatis ferratis trinerviis, racemis
 ex summis alis longissimis. *Hort. cliff. 73.* *Gros.*
virg. 25. *Roy. lugdb. 435.*
Evonymus novi belgii, cornifeminæ foliis. *Comm. hort.*
1. p. 167. t. 86. *Raj. dendr. 69.*

Evonymus, *jujubinis foliis*, *carolinensis*, *fructu parvo*
fere umbellato. *Pluk. alm.* 139. *t. 28. f. 6.*

Habitat in Virginia, Carolina. ♀. ♂

africensis. 2. **CEANOTHUS** *foliis ovatis enerviis.*

Ceanothus racemis folio brevioribus, *Fl. zeyl.* 98. *

Habitat in Zeylonia. ♂

africanus 3. **CANOTHUS** *foliis lanceolatis enerviis*, *stipulis sub-*
rotundis.

Celastrus inermis, *foliis lanceolatis obtuse ferratis pe-*
tiolatis appendiculatis. *Hort. cliff.* 73. *Roy. Ingdb.* 435.
Alaternoides africana, *lauri ferratae folio*. *Comm. præl.*
61. t. 11.

Ricinoides africana arboreascens, *folio phillyreae longi-*
foliæ ferratae. *Seb. thes.* 1. *p. 35. t. 22. f. 6.*

Habitat in Æthiopia: ♂

MYRSINE.

africana. 1. **MYRSINE**. *Hort. cliff.* 72. *

Vitis idæa æthiopica, *myrti tarentinæ folio*, *flore atro-*
purpureo. *Comm. hort.* 1. *p. 123. t. 64.*

Buxus africana rotundifolia ferrata *Pluk. alm.* 74. *t. 80.*
f. 5.

Frutex æthiopicus baccifera, *foliis myrtilli*. *Breyn. cent.*
9. t. 5.

Habitat in Æthiopia. ♂

CELASTRUS.

bullatus. 1. **CELASTRUS** *inermis*, *foliis ovatis integerrimis.*

Evonymoides virginiana, *foliis non ferratis*, *fructu coc-*
cineo eleganter bullato. *Isnard. act.* 1716. *p. 369.*

Evonymus virginianus rotundifolius, *capulis coccineis*
eleganter bullatis. *Pluk. alm.* 139. *t. 28. f. 5.*

Habitat in Virginia. ♂

canadensis. 2. **CELASTRUS** *inermis*, *caule volubili.*

Evonymoides canadensis *canadensis*, *foliis ferratis*. *Isn.*
act. 1716. p. 369.

Frutex viminibus lentis infirmis, *foliis profunde ferratis*,
Gron. virg. 55.

Habitat in Canada. ♂

myrtifolius. 3. **CELASTRUS** *inermis*, *foliis ovatis ferrulatis flori-*
bis racemosis, *caule erecto*. *Hort. cliff.* 72.

Myr-

Myrtifolia arbor, foliis latis subrotundis, flore albo rācemoso. *Sloan. jam.* 162. *hist.* 2. *p.* 79. *t.* 193. *f.* 1.
Raj. dendr. 36.

Habitat in Virginia, Jamaica. ♂

4. CELASTRUS spinis foliosis, ramis angulatis, foliis *buxifolius*, obtusis. *Hort. cliff.* 73. *Roy. lugdb.* 43+.

Lycium portoricense, buxi foliis angustioribus. *Pluk. alm.* 234. *t.* 202. *f.* 3.

Habitat in Aethiopia. ♂

Rami & ramuli angulati. Folia obovata, obtusa, acute serrata. Cymæ pedunculatae, ex alis.

5. CELASTRUS spinis nudis, ramis teretibus, foliis a-*pyracanthus* cutis. *Hort. cliff.* 72.

Lycium æthiopicum, pyracanthæ folio. *Comm. hort.* 1. *p.* 163. *t.* 84. *Raj. dendr.* 72.

Evonymo affinis æthiopica, lycii foliis & aculeis, fructu evonymi. *Pluk. alm.* 139. *t.* 280. *f.* 5.

Habitat in Aethiopia. ♂

Rami & ramuli teretiusculi. Folia ovali-lanceolata, untrinque acuta, in petiolos desinentia, superne serraturis acuminatis ut fere spinosis, persistentia; Cymæ pendunculatae, laterales.

EVONYMUS.

1. EVONYMUS floribus plerisque quadrifidis.

Euonymus foliis oblongo-ovatis. *Hort. cliff.* 38. *Fl. suec.* 133. *Roy. lugd.* 436. *Hall. helv.* 523. *europeus.*

Euonymus vulgaris, granis rubentibus. *Baub. pin.* 428. *tenuisolius.*

Euonymus 2. *Clus. hist.* 1. *p.* 57.

- β. *Euonymus latifolius*. *Baub. pin.* 428.

Euonymus 1. f. *latifolia*. *Clus. hist.* 2. *p.* 56.

Habitat in Europæ sepibus et in Pannonia. ♂

Ex flore primario convenit cum congeneribus. *Phil. Bot.* 178.

2. EVONYMUS floribus omnibus quinquefidis.

Euonymus foliis lato-lanceolatis ferratis. *Hort. upf.* 30. *americanus.*

Euonymus foliis lanceolatis. *Gron. virg.* 17.

Euonymus virginianus, pyracanthæ foliis, capsula verrucarum instat exasperata. *Pluk. alm.* 139. *t.* 115. *f.* 5.

Celastrus foliis oppositis ovatis integerimis, floribus sub-solitariis. *Hort. cliff.* 32.

Rhus virginianum, folio myrti. *Comm. hort.* 1. *p.* 157. *t.* 81. *Raj. dendr.* 57.

Habitat in Virginia. ♂

DI-

DIOSMA.

- oppositifolia.* 1. DIOSMA foliis subulatis acutis oppositis. *Hort. cliff.* 71. *Roy. lugdb.* 434.
Spiræa africana, foliis cruciatim positis. *Comm. rar.* 1. t. 1.
Hypericum africanum vulgare. *Seb. thes.* 2. p. 41. t. 40. f. 5.
Habitat ad Caput b. Spei. 5
- hirsuta.* 2. DIOSMA foliis linearibus hirsutis. *Hort. cliff.* 71. *Roy. lugdb.* 434.
Spiræa africana odorata, foliis pilosis. *Comm. rar.* 3. t. 3.
Habitat ad Caput b. Spei. 5
- rubra.* 3. DIOSMA foliis linearibus acutis glabris subtus bifariam punctatis.
Diosma foliis setaceis acutis. *Hort. cliff.* 72.
Spiræa africana odorata, floribus sanguineis. *Comm. rar.* 2. t. 2.
Erica æthiopica, rosmarinii sylvestris folio eleganter punctato, flore tetrapetalo purpureo. *Pluk. mant.* 68. t. 347. f. 4.
Habitat in Æthiopia. 5
- ericoides.* 4. DIOSMA foliis lineari-lanceolatis subtus convexis bifariam imbricatis.
Spiræa africana, ericæ bacciferæ foliis. *Raj. dendr.* 91.
Ericæformis, coridis folio, æthiopica, floribus pentapetalis in apicibus. *Pluk. amalth.* 236. t. 279. f. 5.
Habitat in Æthiopia. 5
- ciliata.* 5. DIOSMA foliis lanceolatis ciliatis.
Spirææ forte genus africanum, serpilli hirsutis foliis, fruticosum, floribus albis umbellatis. *Pluk. amalth.* 197. t. 411. f. 3.
Habitat in Æthiopia. 5
- lanceolata.* 6. DIOSMA foliis lanceolatis glabris.
Spiræa africana, fatigæ foliis brevioribus. *Raj. dendr.* 91.
Habitat in Æthiopia. 5
- uniflora.* 7. DIOSMA foliis ovato-oblongis, floribus solitariis terminalibus.
Citrus humilis æthiopicus, inferioribus foliis rosmarinii sylvestris punctatis, cæteris autem serpilli subrotundis, flore carneo. *Pluk. mant.* 49. t. 342. f. 5.
Habi-

Habitat in Aethiopia. ♂

Folia rigidiora, & longe majora, quam in precedentibus. Flos ejam sextuplo major: marginē ut & subitus punctatus.

BRUNIA.

1. BRUNIA foliis quadrifariam imbricatis. *Hort. cliff. nodiflora.*

70.

Cupresso-Pinulus capitis b. spei. Breyn. cent. 22. t. 10.

Erica capitata f. nodiflora cupressiformis africana. Pluk. mant. 69. t. 346. f. 4.

Scabiosæ affinis Arbuscula africana ericoides sphærocephalos. Raj. hist. 1444.

Habitat in Aethiopia. ♂

2. BRUNIA foliis linearibus patulis. *Hort. cliff. 71. lanuginosa.*

Tamariscus monomapatensis, ericæ tenuissimo folio, pilularia, rainulis lanagine aranearum instar implexis.

Pluk. alm. 361. t. 318. f. 4.

Habitat in Aethiopia. ♂

3. BRUNIA foliis ovatis acuminatis ciliatis.

ciliatis.

Habitat in Aethiopia.

4. BRUNIA foliis linear-lanceolatis confertis.

abrotanoides

Brunia foliis creberrimis lanceolatis, floribus congregatis. Burm. afric. 266. t. 100. f. 1.

Levisanus africanus, ericæ folio, capitulo majore. Raj. dendr. 130.

Habitat in Aethiopia. ♂

5. BRUNIA foliis obovatis tomentosis.

Levisanus.

Brunia foliis oblongis incanis, florum capitulo ramulam terminante. Burm. afric. 267. t. 100. f. 2.

Levisanus capensis, serpylli folio. Pet. gaz. 9. t. 5. f. 7.

Erica capitata f. nodiflora, corios foliolis rectis, aethiopica. Pluk. mant. 69. t. 346. f. 7.

Habitat in Aethiopia. ♂

6. BRUNIA floribus solitariis. *Hort. cliff. 71.*

uniflora.

Ericæformis aethiopica, cupressi foliis compressiusculis.

Pluk. alm. 136. t. 279. f. 2.

Habitat in Aethiopia. ♂

ITEA.

1. ITEA. *Gron. virg. 143.*

virginica.

Diconangia. Mitch. gen. 5.

Habitat in Virginia. ♂

N 4

GA.

GALAX.

ephylla. 1. GALAX.Viticella. *Mitch. gen.* 24.Anonymos f. Belvedere. *Gron. virg.* 25.*Habitat in* Virginia. ♀

MANGIFERA.

indica. 1. MANGIFERA.Mangifera arbor. *Bon. jav.* 95. *Fl. zeyl.* 471.Manga indica, fructu magno reniformi. *Raj. hist.* 1550.Pericæ similis, putamine villoso. *Baeh. pin.* 440.Mao f. Mai i. Manghos. *Rheed. mal.* 4. p. 1. t. 1. 2.*Habitat in* India. ♂*Racemus compositus, brachiatus; an flores omnes hermaprodit?*

CUPANIA.

americana. 1. CUPANIA.Cupania castaneæ folio, fructu sericeo & ramoso. *Plum. gen.* 45.*Habitat in* America calidiorc. ♂Folia alterna, obovata, oblonga, obtusa, dentato-ferrata.
nervis transversalibus crassis. Flores racemosi.

RIBES.

* *Ribesia inermia.**rubrum.*

1. RIBES inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis.

Ribes inerme, scorpius planiusculis, racemis pendulis.

Hort. cliff. 82. *Fl. suec.* 197. *Hort. upf.* 59. *Mat. med.**99. Vir. cliff.* 21. *Roy. lugd.* 270. *Dalib. paris.* 75.Ribes vulgare acidum. *Baeh. hist.* 2. p. 97. *Fl. iapp.* 68.Grossularia, multiplici acino, l. non spinosa hortensis
rubra. *Baeh. pin.* 455.β. Grossularia hortensis, fructu margaritis simili. *Baeh. pin.*
455.*Habitat in* Sueciæ borealibus. ♂*alpinum.*

2. RIBES inerme, racemis erectis: bracteis flore longioribus.

Ribes inerme, floribus planiusculis, racemis erectis.

Hort. cliff. 82. *Fl. suec.* 198.Ribes alpinum dulce. *Baeh. hist.* 2. p. 98. *Fl. iapp.* 97.Grossularia vulgaris fructu dulci. *Baeh. pin.* 455.

β. Ri-

3. *Ribes montana*, oxyacanthæ sapore. *Baup. prodr.* 160.
Amœn. acad. 1. p. 170.
Habitat in Suecia, Helvetia, Angliae sepibus siccis. ♂
3. RIBES inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. *nigrum.*
Ribes inerme, floribus oblongis. *Hort. cliff.* 269. *Hort.*
upf. 51. *Fl. suec.* 196. *Mat. med.* 100. *Roy. lugdb.*
269. Dalib. paris. 74.
Ribes vulgaris, fructu nigro. *Radb. vall.* 32. *Fl. lapp.* 99.
Grossularia non spinosa, fructu niero. *Baup. pin.* 455.
3. *Ribes nigrum pensylvanicum*, floribus oblongis.
Dill. elth. 324. t. 246. f. 315.
Habitat in Suecia, Helvetia, Pensylvania. ♂
- * *Grossularia aculeata.*
4. RIBES ramis subaculatis reclinatis, pedunculi bractea *reclinatum.*
triphylla.
Ribes ramis subaculeatis reclinatis. *Hort. cliff.* 82. *Hort.*
upf. 51. *Roy. lugab.* 270.
Grossularia spinosa lativa altera, foliis latioribus. *Baup.*
pin. 453.
Habitat in Germania, Helvetia. ♂
5. RIBES ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilosis, baccis *Grossularia.*
hirsutis.
Ribes ramis aculeatis, racemis erectis, baccis hirsutis.
Hort. cliff. 82.
Ribes ramis aculeatis erectis, fructu hispido. *Vir. cliff.*
21. Roy. lugdb. 269.
Grossularia fructu maximo hispido margaritarum fere
colore. *Raj. hist.* 1484.
Habitat in Europa. ♂
6. RIBES ramis undique aculeatis. *Hort. upf.* 51. *oxyacanthæ.*
Grossularia oxyacanthæ foliis amplioribus, e sinu hudsfo-
nis. *Plub. amalch.* 212. *Dill. elth.* 166. t. 139. f. 116.
Habitat in Canada. ♂
7. RIBES racemis aculeatis, baccis glabris, petioli bractea *Uva crista*
monophylla.
Ribes ramis aculeatis erectis, fructu glabro. *Hort. cliff.*
82. Fl. suec. 195. *Roy. lugdb.* 273. *Hall. helv.* 346.
Dalib. paris. 74.
Grossularia simplici acino vel spinosa sylvestris. *Baup.*
pin. 455.
Habitat in Europa boreali. ♂

- cynosbati.* 8. RIBES aculeis subaxillaribus, baccis aculeatis racemosis.
Habitat in Canada. Kalm. ♂
Facies praeecedentium. Folia parum fissa. Aculeus instar
spine subalata. Baccæ magnitudine nucis coryli, undi-
que armatae aculeis robustis.

GRONO VIA.

- scandens.* 1. GRONO VIA. *Hort. cliff.* 74.
Gronovia scandens lappacea, pampinea fronde. Houst.
Mart. cent. 1. p. 40. t. 40. Amm. herb. 346.
Habitat in Vera Cruce.

HEDERA.

- Helix.* 1. HEDERA foliis ovatis lobatisque. *Fl. lapp.* 91. *Fl.*
suec. 190. *Hort. cliff.* 74. *Mat. med.* 98. *Roy. lugdb.*
223. Hall. helv. 164.
Hedera arborea. Baub. pin. 305.
β. Hedera poetica. Baub. pin. 305.
γ. Hedera major sterilis. Baub. pin. 305.
Habitat in Europæ arboribus putrescentibus, inque sepi-
bus. ♂
- quinquefolia* 2. HEDERA foliis quinatis ovatis ferratis. *Hort. cliff.*
74. Roy. lugdb. 223. *Gron. virg.* 24.
Vitis hederacea indica. Stapel. theatr. 364.
Edera quinquefolia canadensis. Corn. canad. 99. t. 100.
Helix. Mitch. gen. 30.
Habitat in Canada. ♂
Capsula utrinque turbinata, bilocularis, polysperma. Flo-
res masculi a femineis distincti D. Mitcholl.

VITIS.

- vinifera.* 1. VITIS foliis lobatis sinuatis nudis.
Vitis foliis palmato-angulatis. Hort. cliff. 74. *Hort.*
upf. 50. *Mat. med.* 97. *Gron. virg.* 144. *Roy. lugdb.*
222.
Vitis vinifera. Baub. pin. 229.
- apyrena.* β. Vitis corinthiaca s. apyrena. *Baub. hist.* 2. p. 72.
Habitat in Orbis quatuor partibus temperatis. ♂
- indica.* 2. VITIS foliis cordatis dentatis subtus villosis, cirrhis ra-
cemiferis. Fl. zeyl. 99. *
Vitis sylvestris indica, acinis rotundis. Raj. dendr. 67.
Habitat in India. ♂

3. VITIS foliis cordatis subtrilobis dentatis subtus tomentos. *Labrusca*.
Vitis sylvestris virginiana. *Bauh. pin.* 299.
Vitis vinifera sylvestris americana, foliis averia parte densa lanagine tectis. *Pluk. phyt.* 249. f. 1.
Vitis fructu minore rubro acerbo, folio subrotundo minus laciniato, subtus alba lanagine tecto. *Sloan. hist.*
 2. p. 104. t. 210. f. 4.
Habitat in America septentrionali. ♂
4. VITIS foliis cordatis dentato-serratis utrinque nudis. *vulpina*.
Vitis vulpina dicta virginiana nigra. *Pluk. alm.* 392.
Vitis aceris folio. *Raj. dendr.* 68.
Habitat in Virginia. ♂
5. VITIS foliis ternatis: foliolis subrotundis serratis. *trifolia*,
Vitis pearne doorica, foliis ternis subrotundis serratis.
Raj. dendr. 68.
Habitat in India. ♂
6. VITIS foliis quinatis: foliolis multifidis. *Hort. cliff. laciniosa*.
 74. *Roy. Ingdb.* 223.
Vitis laciniatis foliis. *Corn. canad.* 182. t. 183.
Vitis apii folio. *Bauh. hist.* 2. p. 73.
Habitat - - - ♂
7. VITIS foliis supradecompositis: foliolis lateralibus pin- *arborescens*.
 natis.
Vitis caroliniana, foliis apii, uva corymbosa purpurascen-
 te. *Aet. bonon.* 2. part. 2. p. 365. t. 24.
Frutex scandens, petroselini foliis, virginianus claviculis
 donatus. *Pluk. mant.* 85. t. 412.
Habitat in Carolina, Virginica. ♂

LAGOECIA.

1. LAGOECIA. *Hart cliff.* 73. *Hort. upf.* 52. *Cuminides*.
Cuminum sylvestre, capitulis globosis. *Bauh. pin.* 186.
Cuminum sylvestre. *Cam. epit.* 518.
Habitat in Creta, Lemno, Lysia, Galatia. ☽

SAUVAGESIA.

1. SAUVAGESIA. *ereda*.
Habitat in Doiningo.
Habitus Hyperici art Corchori. Caulis erectus. Folia
 alterna, ovato-lanceolata, obtuse serrata. Stipulae acute,
 ciliatae.

CLA-

CLAYTONIA.

- virginica.* 1. CLAYTONIA foliis linearibus.
 Claytonia. *Gron. virg.* 25.
 Ornithogalo affinis virginiana, flore purpureo pentapetaloides. *Pluk. alm.* 272. t. 102. f. 3. *Rudb. clys.* 2. p. 139. f. 6.
Habitat in Virginia. 2
- fibirica.* 2. CLAYTONIA foliis ovatis. *Hort. upf.* 52. *
 Limnia. *Aet. stockb.* 1746. p. 130. t. 5. *
Habitat in Sibiria 2

ACHYRANTHES.

- aspera.* 1. ACHYRANTHES caule erecto, calycibus reflexis spicæ adpresso. *Fl. zeyl.* 105.
Achyrautes caule erecto. *Hort. cliff.* 42. *Roy. lugd.* 418.
- fcula.* 2. Amaranthus fucus spicatus. *Bocc. sic.* 16. t. 9. *Pluk. phyt.* 260. f. 2.
- indica.* 3. Amaranthus spicatus zeylanicus, foliis obtusis amarantho fculo bocconi similis. *Burm. zeyl.* 16. t. 5. f. 3.
Amaranthus spicatus, dictamni cretici folio, maderaspatensis. *Pluk. alm.* 26. t. 60. f. 4.
Habitat in Sicilia, Zeylona, Jamaica. 5
Planta indica 3 *foliis obtusioribus differt a fcula.*
- lappacea.* 2. ACHYRANTHES caule erecto, spica interrupta, floribus externe lanatis.
Achyranthes floribus externe lanatis interrupte spicatis.
Fl. zeyl. 103.
Blitum scandens, fructu lappaceo. *Burm. zeyl.* 47. t. 18. f. 1.
Centaurea ciliare minus, circæ foliis firmioribus, spicatis floribus. *Pluk. alm.* 93. t. 82. f. 2.
Wellia-Godiveli. *Rheed. mal.* 10. p. t. 59.
Habitat in India.
- lanata.* 3. ACHYRANTHES caule erecto, spicis ovatis lateribus, calycibus lanatis.
Chenopodium incanum racemosum, folio majore minori opposito. *Burm. zeyl.* 60. t. 26. f. 1.
Amaranthus indicus verticillatus albus, foliis lanugine incanus. *Pluk. alm.* 27. t. 75. f. 8.
Scherubala. *Rheed. mal.* 10. p. 57. t. 29.
Habitat in India.

4. ACHYRANTHES caule repente, capitulis lateralibus *repens*, sessilibus.
Achyrantha repens, foliis bliti pallidi. *Dill. elsh.* 8. t. 7.
f. 7.
Habitat in Turcomannia. ◎
5. ACHYRANTHES foliis oppositis linearibus, panicula *corymbosa* dichotoma. *Fl. zeyl.* 100.
Paronychia foliis ad genicula confertis acutis, floribus umbellatis. *Burm. zeyl.* 184. t. 65. f. 2.
Amaranthus folio tenuissimo incano mollugini æmulante. *Bocc. mus.* 44. t. 39.
Eichryso affinis herba indica polygonoides ramosior, foliis caulinum nodos ambientibus. *Pluk. alm.* 134. t. 8.
f. 6.
Habitat in Zeylona.

CELOSIA.

1. CELOSIA foliis lanceolatis, pedunculis angulatis, *argentea*.
spica ovato-oblonga.
Celosia foliis linear-lanceolatis. *Hort. cliff.* 43. * *Roy. lugdb.* 419.
Amaranthus spica albescente habitiore. *Mart. cent.* 7. t. 7.
Habitat in America. ◎
2. CELOSIA foliis oblongo-ovatis, pedunculis teretibus *cristata*, substriatis, spica oblonga.
Celosia foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.* 43. *Hort. apf.* 52. *Roy. lugdb.* 419.
Amaranthus panicula incurva. *Bauh. pin.* 121.
 $\beta.$ *Amaranthus cristatus.* *Cam. epit.* 792.
Habitat in India? ◎
3. CELOSIA foliis lanceolatis tomentosis obtusis, spicis *lanata*, confertis, staminibus lanatis. *Fl. zeyl.* 102. *
Habitat in Zeylona.
4. CELOSIA foliis cuneiformibus acutiusculis, spicis globo-*nodiflora*, basi lateralibus. *Fl. zeyl.* 101. *
Amaranthoides indicum nodiflorum, capitulis ex albo virescentibus. *Burm. zeyl.* 16. t. 5. f. 2.
Amaranthoides indicum globosum, ad caulum nodos floridum, foliis solitariis summo apice barbatis. *Pluk. alm.* 27. t. 133. f. 2.
Habitat in Zeylona.

- paniculata.* 5. **CELOSIA** foliis lanceolato-ovatis, panicula diffusa filiformi. *Gron. virg.* 144.
Amaranthus panicula flavicante gracili holosericea. *Slo-an. jam.* 49. *hist.* 1. p. 142. t. 90.
Amaranthus nodosus, pallescentibus foliis bliti parvis, americanus, multiplicitate speciosa spica laxa, s. panicula sparsa candicante. *Pluk. alm.* 26. t. 261. f. 1.
Habitat in America septentrionali

ILLECEBRUM.

- verticillatum.* 1. **ILLECEBRUM** floribus verticillatis nudis, caulis procumbentibus.
Illecebrum caulis procumbentibus. *Roy. lugdb.* 214.
Dalib. paris. 76. 126.
Illecebrum. *Hort. cliff.* 492.
Paronychia serpillifolia palustris. *Vaill. paris.* 157. t. 15. f. 1.
Polygala repens nivea. *Baub. pin.* 215.
Habitat in Europæ pastuis nudis.
- suffruticosum.* 2. **ILLECEBRUM** floribus lateralibus solitariis, caulis suffruticosis.
Illecebrum caule erecto. *Roy. lugdb.* 214.
Polygonum herniariae foliis. *Lob. adv.* 404? *Dalech. hist.* 1124?
Paronychia hispanica fruticosa, myrtifolio. *Tournes. inst.* 508.
Habitat in Hispania.
- cymosum.* 3. **ILLECEBRUM** spicis cymosis secundis, caule diffuso.
Polygoni hispanici genus *Clusii*. *Dalech. hist.* 1125?
Habitat Monspelii. *D. Sauvages.* ◎
Planta *fucie Sedi* aut *Polygoni*; *caulis filiformis, brachiatu-*
s. Folia opposita, linearia, crassiuscula. Flores dige-
stis in spicas secundas, Spicae in cymas tam. laterales
quam terminales. Calyces margine membranaceo ut
in Statice, terminati setis quinque.
- Paronychia.* 4. **ILLECEBRUM** floribus bracteis nitidis obvallatis,
caulis procumbentibus.
Herniaria squamis nitidis flores superantibus. *Hort. cliff.* 41. *Hort. uts.* 54. *Roy. lugdb.* 215. *Saxo. monsp.* 129.
Paronychia hispanica. *Clus. hist.* 2. p. 183.
Polygonum minus candicans, *Baub. pin.* 281.
Habitat in Hispania & Narbona. ✕

5. **ILLECEBRUM** floribus bracteis nitidis occultatis, *capitulum.*
capitulis terminalibus, caule erecto.
Hernaria erecta, squamis nitidis flores occultantibus.
Sauv. monsp. 129.
Paronychia narbonensis erecta. *Tournef. inst.* 508.
Polygonum minus candicans, capitulis surrectis. *Magn. monsp.* 209.
Polygonum montanum niveum minimum. *Lob. ic.* 420.
Habitat in G. Narbonensis, Hispania.

GLAUX.

1. **GLAUX.** *Hort. cliff.* 43. *Fl. suec.* 199. *Roy. lugdb. maritima,*
417.
Glaux foliis elliptico-oblongis. *Fl. lapp.* 72.
Glaux maritima. *Baub. pin.* 215.
Altine bifolia, fructu coriandri, radice geniculata. *Lösel pruss.* 13. t. 3.
Habitat in Europæ maritimis, salmis. 2

THESIUM.

1. **THESIUM** panicula foliata, foliis linearibus. *Linophyllum.*
Thesium. *Hort. cliff.* 41. *Hall. helv.* 183. *Dalib. parif.* 75.
Thesium floribus sparsis. *Sauv. monsp.* 48.
Linaria montana, flosculis albicantibus. *Baub. pin.* 213.
Sesamoides procumbens montanum, linariæ folio, floribus albicantibus. *Murif. hist.* 3. p. 601. f. 15. t. 1. f. 3.
Anonymos lini folio. *Clus. hist.* 1. p. 324.
β. *Onobrychis IV lutea*. *Baub. pin.* 215. *Dalech. hist.* 491.
Habitat in Europæ siccis montosis. ◎
2. **THESIUM** floribus sessilibus lateralibus, foliis linearibus. *alpinum.*
Alchimilla alpina, linariæ foliis, calyce florum albo in foliorum alis. *Till. pis.* 6.
Alchimilla linariæ folio, floribus & vasculis in foliorum alis sessilibus. *Shaw. spec.* 14.
Habitat in Italiæ alpibus.
3. **THESIUM** floribus capitatis, foliis triquetris. *capitatum.*
Thesium floribus capitatis. *Roy. lugdb.* 214.
Thymelæa foliis linearibus alternis, floribus ex uno petiolo copiosis. *Burm. afric.* 133. t. 48. f. 3.
Thymelæa africana, lini angusto folio, floribus albis villosis. *Raj. dendr.* 55.
Habitat in Æthiopia. 5
4. **THE-**

- umbellatum*. 4. **THESIUM** floribus umbelliatis, foliis oblongis.
Centaurium luteum *ascyroides virginianum*. *Pluk. mant.*
 43. t. 342. f. 1.
Habitat in Virginie, Pensylvaniæ pascuis siccis. Kalm. 2
Radix perennis. Folia alterna, ovali-lanceolata, integrerima.
Rami alterni, in summitate cernit. Umbellula terminales: involucro tetraphyllo, parvo: Flosculi 5

RAUVOLEFIA.

- tetraphylla*. 1. **RAUVOLFIA**. *Hort. cliff.* 75. t. 9.
Rauvolfia tetraphylla angustifolia. Plum. gen. 19.
 β. *Rauvolfia tetraphylla latifolia. Plum. gen. 19.*
Habitat in America calidore. 5

CERBERA.

- Ahouaj.* 1. **CERBERA** foliis ovatis.
Thevetia. Hort. cliff. 75. *Roy. lugdb.* 413.
Ahouaj. Thev. antaræt. 66. *Tournes. inst.* 658. *Raj. hist.* 1676.
Ahouaj major. Pis. bras. 49.
Arbor americana, foliis pomi, fructu triangulo. Bauh. pin. 434.
Habitat in Brasilia. 5

- Manghas.* 2. **CERBERA** foliis lanceolatis: nervis transversalibus
Fl. zeyl. 106. *
Manghas lactescens, foliis nerii crassis venosis, jasmini flore, fructu persici simili venenato. Burm. zeyl.
150. t. 70. f. 1.
Manghas fructu venenato. Bauh. pin. 440. *Raj. hist.* 1552
Odollam. Rheed. mal. 1. p. 71. t. 39.
Habitat in Indiis ad aquas. 5
Arbor lactescens. Folia alterna, sparsa ad apices ramosum, lato-lanceolata, petiolata, glabra, integrerrima, pedalia. Racemi terminales, ramosi, inæquales. Perianthium pentaphyllum foliolis lanceolatis, patentibus, coloratis, deciduis. Corolla alba, infundibuliformis: Tubo calyce longiore, interne angulato. Limbo quinquepartito, lobis ovatis, tubo brevioribus. Stam. Filamenta 5, brevissima, tubi superiori parti inserta. Anthæ ovatae, tetragonæ, tectæ lanugine tubi. Pist. Germen bifidum. Stylus filiformis, tubo scere brevior. Germen ovatum, fissum. Pericarpium Drupa ovata, magnitudine ovi anseris, viride punctis albis minutissimis, uno latere compressum suturaque obsoleta; Semina

mina 2, veluti duas castaneas magnas includens, venenatus, vomitorius. Osbeck.

3. CERBERA foliis linearibus longissimis confertis. *Thevetia*.
 Ahouaj nerii folio, flore luteo. *Plum. spec.* 20.
 Nerio affinis angustifolia lactescens, flore luteo. *Pluk.*
 aln. 253. t. 207. f. 2.
Habitat in America calidiore. ♂

VINCA.

1. VINCA caulis procumbentibus, foliis lanceolato-minor-ovatis.
Vinca foliis ovatis. *Hort. cliff.* 77. *Hort. upf.* 53. *Mat. med.* 101. *Roy. Ingdb.* 412. *Dalib. paris.* 75.
Clematis Daphnoides minor. *Baub. pin.* 301.
Clematis Daphnoides. *Dod. pempt.* 405.
Habitat in Germania, Anglia, Gallia. ♂
2. VINCA caulis erectis, foliis ovatis. *major*.
Clematis Daphnoides major. *Baub. pin.* 302. *Dod. pempt.* 406.
Habitat in Gallia Narbonensi, Hispania. ♂
Hec species vix sufficienter a priori distincta, licet major erectior, quod a loco vel parentibus ortum suspicamur; qui itaque conjugere velit vix errat

NERIUM.

1. NERIUM foliis lineari-lanceolatis ternis. *Hort. cliff.* *Oleander*, 76. *Hort. upf.* 53. *Fl. zeyl.* 108. *Roy. Ingdb.* 412
Nerium floribus rubescens. *Baub. pin.* 464.
Rhododendrum. *Dod. pempt.* 851.
Habitat in Creta, Palæstina, Syria, India. ♂
2. NERIUM foliis lanceolato-ovatis, ramis divaricatis. *divaricatum*
Fl. zeyl. 109. *
Apocynum zeylanicum indicum frutescens, nerii flore candidissimo. *Herm. par.* 40.
Habitat in India. ♀
3. *Nerium* foliis ovatis acuminatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 107. *antidysentericum*.
Mat. med. 102.
Codaga pala. *Rheed. mal.* 1. *p.* 85. *t.* 47.
Habitat in India. ♂

PLUMERIA.

- PLUMERIA foliis ovato-oblongis. *Hort. cliff.* 76. *rubra*.
Roy. Ingdb. 412.

Plumeria flore roseo odoratissimo. *Tournef. inst.* 659.

Catesb. car. 2. p. 92. t. 92.

Nerium arboreum, folio maximo obtusiore, flore incarnato. *Sloan. jam.* 154, *hist.* 2. p. 61. t. 185. f. 1.
Et t. 186. f. 1.

Jasminum indicum. *Mer. surin.* 8. t. 8.

Clematis arborea americana, laurinis amplissimis foliis,
flore laccæ colore odoratissimo. *Pluk. mant.* 50.
alm. 109. t. 207. f. 2.

Habitat in Jamaica, Surinamo. †

alba.

2. *PLUMERIA* foliis lanceolatis revolutis, pedunculis
superne tuberosis.

Plumeria flore niveo, foliis longis angustis & acuminatis. *Tournoj. inst.* 659.

Apocynum americanum frutescens, longissimo folio,
flore albo odoratissimo. *Comm. hort.* 2. p. 47. t. 24.

Nerium arboreum altissimum, folio angusto, flore albo.
Sloan. jam. 154. *hist.* 2. p. 62. *Raj. dendr.* 114.

Herm. parad. 49.

Habitat in Jamaica.

obtusa.

3. *PLUMERIA* foliis lanceolatis petiolatis obtusis.

Plumieria flore niveo, foliis brevioribus obtusis. T. *Catesb. car.* 2. p. 93. t. 93.

Habitat in America calidiore. †

CAMERARIA.

latifolia.

1. *CAMERARIA* foliis subrotundis utrinque acutis. *Hart. cliff.* 76. *Roy. lugdb.* 412.

Cameraria lato myrti folio. *Plum. gen.* 18.

Habitat in America calidiore.

angustifolia.

2. *CAMERARIA* foliis linearibus. †

Cameraria angusto linearie folio. *Plum. gen.* 18.

Habitat in America calidiore.

TABERNÆMONTANA.

citrifolia.

1. *TABERNÆMONTANA* foliis oppositis lanceolatis.

Tabernæmontana foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 76. *Roy. lugdb.* 413.

Tabernæmontana citri foliis undulatis. *Plum. gen.* 18.
Pala. Rhed. mal. 1. p. 81. t. 46.

Habitat in utraque India. †

laurifolia.

2. *TABERNÆMONTANA* foliis oppositis ovatis. †

Tabernæmontana laurifolia, flore albo, fructu rotundi-
ore. *Amm. herb.* 212.

Ne-

Nerium arboreum, folio latiore obtuso, flore luteo minore. *Sloan. jam.* 154. *bifl. 2. p. 62. t. 186. f. 2.*
Habitat in Jamaica ad ripas fluviorum. 6.

3. TABERNÆMONTANA soliis alternis.

alternifolia

Curutu-pala. Rheed. mal. 4. p. 1. 43.
Habitat in Malabarica. 5.

CEROPEGIA.

1. CEROPEGIA umbellis pendulis, floribus erectis.

Niota-niodem-valli. Rheed. mal. 9. p. 27. t. 16.
Habitat in Malabarica. 4.

*Candela-
brum.*

2. CEROPEGIA pedunculis bisectoris. *Fl. zeyl. 46. **

Habitat in Zeylona. 2.

biflora.

DIGYNIA.

PERIPLOCA.

1. PERIPLOCA floribus interne hirsutis.

*Periploca foliis lanceolato-ovatis. Hort. cliff. 78. Roy.
lagdb. 410.*

græca

Periploca folio oblongo. Baub. pin. 303.

*Apocynum 2 angustifolium. Clus. bifl. 1. p. 125.
Habitat in Syria. 2.*

2. PERIPLOCA spicis imbricatis.

*Periploca foliis ovatis acatis glabris, spicis imbricatis.
*Fl. zeyl. 113. ***

indica.

*Apocynum caule volabili perenni, foliis ovato-lanceo-
latis. Roy. Ingdb. 412.*

*Periploca foliis angustis acutis glabris. Burm. zeyl. 187.
*t. 83. f. 1.**

Apocyni genus scandens ex india orientali. Pluk. mant.

17. t. 359. f. 2.

Habitat in Zeylona. 5.

3. PERIPLOCA caule hirsuto.

*Cyranthum canle volubili ramoso, foliis subovatis cum
*acumine. Hort. cliff. 79.**

africana.

*Apocynum scandens africanum, vincæ pervincæ foliis,
*subincanum. Comm. rar. 18. t. 18.**

*Apocynum scandens africanum, convolvuli minoris fo-
*lio. & caule hirsuto. Pluk. alm. 37. t. 137. f. 4.**

*Apocynum indicum minus, nummulatiz foliis. Morit.
*bifl. 3. p. 611. f. 15. t. 3. f. 62.**

O 2

B. Cy-

3. *Cynanchum foliis planis sinuatis, flore pallide viridi, fructu crasso glabro viridi. Burm. afric. 34. t. 14. f. 2.*
Habitat in Africa. 2

tenifolia. 4. PERIPLOCA foliis lineari-lanceolatis.

Cynanchum radice grandulosa, foliis angustis sinuatis, floribus urceolatis miniatis. Burm. afric. 36. t. 15

3. *Cynanchum linearibus foliis acutis, floribus urceolatis rubris. Burm. afric. 37. t. 16. f. 1.*

Habitat in Cap. b. Spei dunis.

CYNANCHUM.

volutum. 1. CYNANCHUM caule volubili herbaceo, foliis cordato-oblongis glabris. Hort. cliff. 79. Hort. aps. 54. Roy. lugdb. 409.

Scammoniae monspeliacæ affinis, foliis acutioribus. Bauh. pin. 294.

Apocynum 3 latifolium. Clas. hist. 1. p. 125.

Habitat in Sicilia, Hispania, Astracan. 2

suberosum. 2. CYNANCHUM caule volubili inferne suberofo fisso, foliis cordatis acuminatis. Hort. cliff. 79. Roy. lugdb. 409. Gron. virg. 27.

Periploca carolinensis, flore minore stellato. Dill. elth. 300. t. 229. f. 296.

Habitat in America calidiore.

*hirtum. 3. CYNANCHUM caule volubili fruticoso inferne suberofo fisso, foliis ovato-cordatis. Hort. cliff. 79. * Roy. lugdb. 410.*

Periploca scandens, folio citrei, fructu maximo. Plum. spec. 2.

Apocynum scandens virginianum rugosum, pullis amplis floribus, capsulis alatis. Moris. hist. 3. p. 611. f. 15. t. 3. f. 61.

Apocynum scandens fruticosum, fungoso cortice, surinamense. Herm. par. 53.

Habitat in America, 5

monspeliacum. 4. CYNANCHUM caule volubili herbaceo, foliis reniformi-cordatis acutis. Hort. cliff. 79. Roy. lugdb. 409. Sauv. monsp. 133.

Scammonia monspeliacæ, foliis rotundioribus. Bauh. pin. 294.

Apocynum IV latifolium: Scammonia valentina. Clas. hist. 1. p. 126.

Habitat in Hispania & Narbonæ maritimis. 2

5. CY-

5. CYNANCHUM caule erecto divaricato, foliis cor-^{erectum.}
datis glabris. *Hort. cliff.* 79. *Roy. lugdb.* 409. *Sauv.*
monsp. 133.

Apocynum folio subrotundo. *Baup. pin.* 302.

Apocynum 1. latifolium. *Clef. hist.* 1. p. 124.

Habitat in Syria. 2

APOCYNUM.

1. APOCYNUM caule rectiusculo herbaceo, foliis o-^{fol. androfæ-}
vatis utrinque glabris, cymis terminalibus. ^{mi.}

Apocynum caule erecto annuo, foliis ovatis. *Roy.*
lugdb. 411.

Apocynum foliis ovatis. *Hort. cliff.* 80.

Apocynum canadense, foliis androfæmi majoris. *Bocc.*
sic. 35. t. 16. f. 3. *Moris. hist.* 3. p. 609. f. 15. t. 3.
f. 16.

Habitat in Virginia, Canada. 2

2. APOCYNUM caule rectiusculo herbaceo, foliis ob-^{cannabinum.}
longis, cymis lateralibus.

Apocynum foliis ovatis acutis subtus tomentosis. *Gron.*
virg. 28.

Apocynum canadense ramosum, flore viridi albicante,
filiqua tenuissima. *Moris. hist.* 3. p. 609. f. 15. t. 3.
f. 14.

Apocynum virginianum, flore herbaceo, filiqua longis-
sima. *Moris. prael.* 232.

Apocynum canadense maximum, flore minimo herbaceo.
Pluk. alm. 35. t. 13. f. 1.

Apocynum erectum virginianum ramosum, caule subru-
bente, esulae rarae foliis, filiquis tenuissimis. *Pluk. alm.*
35. t. 260. f. 3.

Habitat in Canada, Virginia. 2

Corollæ virides, nec pictæ sunt.

3. APOCYNUM caule rectiusculo herbaceo, foliis ova-^{venetum.}
to-lanceolatis. *Roy. lugdb.* 411. *Sauv. monsp.* 133.

Apocynum foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 80.

Tithymalus maritimus, purpurascens floribus. *Baup.*
pin. 291.

Ecula rara et lio venetorum insula. Lab. hist. 201.

Habitat in Adriatici maris insulis. 2

4. APOCYNUM caule erecto frutescente, foliis lanceo-^{frutescens,}
lato-ovalibus, corollis acutis: fauce villosis. *Fl. zeyl.*

114.

Apocynum caule erecto arboreo, foliis ovatis acutis. Roy. lugdb. 412.

Apocynum floribus fasciculatis. Fl. zeyl. 23. t. 12. f. 1.
Habitat in Zeylona. 5

reticulatum. 5. APOCYNUM caule volubili perenni, foliis ovatis venosis. Roy. lugdb. 412.
Habitat in India.

ASCLEPIAS.

* *foliis oppositis planis.*

undulata. 1. ASCLEPIAS foliis sessilibus oblongis lanceolatis undulatis, petalis ciliatis.

Apocynum africanum, lapathi folio, Comm. rar. 16. t. 16.

Habitat in Africa. 24

gigantea. 2. ASCLEPIAS foliis amplexicaulibus oblongo-ovalibus. Fl. zeyl. 112.

Apocynum erectum majus latifolium indicum, Plak. alm. 35. t. 175. f. 3.

Beid el ossar. Alp. egypt. 85. t. 86.

Ericu. Rheed. mal. 2. p. 53. t. 31. Seb. thes. 1. p. 41 t. 26. f. 1.

Habitat in India, Egypto. 24

Nectaria promunt non cornicula subulata, sed laminas solidas conniventes.

syriaca. 3. ASCLEPIAS foliis ovalibus subtus tomentosis, caule simplicissimo, umbellis nutantibus.

Asclepias caule erecto simplici herbaceo, foliis ovalibus subtus tomentosis, umbellis nutantibus. Vir. cliff. 20. Hort. upf. 53, Gron. virg. 27. Roy. lugdb. 410.

Asclepias caule erecto simplici annuo, foliis ovato-oblongis subtus incanis, umbella nutante. Hort. cliff. 78.

Apocynum majus syriacum rectum. Corn. canad. 90.

Apocynum syriacum. Clus. hist. 2. p. 87.

Habitat in Virginia. 24

americana. 4. ASCLEPIAS foliis ovatis subtus pilosiusculis, caule simplici, umbellis nectariisque erectis,

Apocynum floribus amoenè purpureis, corniculis surrexis. Dill. eltb. 31. t. 27 f. 30.

Habitat in America septentrionali. 24

purpurascens 5. ASCLEPIAS foliis ovatis subtus villosis, caule simplici, umbellis erectis, nectariis resupinatis.

Asclepias floribus obsolete purpureis, corniculis resupinatis. Dill. elth. 32. t. 28. f. 31.

Apocynum erectum noveboracense, foliis minus incanis, Horc ex obsoleto dilute purpurascente. Herm. par. 33.

Habitat in Carolina. ♀

6. **ASCLEPIAS** foliis ovatis rugosis nudis, caule simplici, umbellis subsessilibus: pedicellis tomentolis. *variegata.*

Apocynum americanum erectum, tuberosa radice, non incanum, foliis rigidioribus latis subrotundis, floribus albis intus purpureis, summo caule corymbum magnum efformantibus. Pluk. atm. 34. t. 77. f. 1.

Apocynum vetus americanum, wisank. Dill. elth. 32. *Habitat in America boreali.* ♀

7. **ASCLEPIAS** foliis lanceolatis glabris, caule simplici, *ninea.* umbellis erectis lateralibus solitariis.

Asclepias caule erecto simplici annuo, foliis lanceolato-ovatis glabris, pedunculis alternis, umbellis erectis. Gron. virg. 27.

Apocynum persicariae mitis folio, corniculis lacteis. Dill. elth. 33. t. 29. f. 32.

Apocynum americanum, foliis amygdali longioribus. Plum. spec. 2

Habitat in Virginia & America calidore. ♂

8. **ASCLEPIAS** foliis lanceolatis, caule superne diviso, *inernata.* umbellis terminalibus congettis.

Asclepias caule erecto ramofo annuo, foliis lanceolatis, umbellis terminalibus erectis pluribus. Vir. cliff. 20. Hort. cliff. 78. Roy. lugdb. 411. Gron. virg. 27.

Apocynum minus rectum canadense. Corn. canad. 9 t. 93. Barr. rar. 8. t. 72. Raj. hist. 1089.

Habitat in Canada, Virginia. ♀

Caulis ubi dividitur folia e regione tria producit.

9. **ASCLEPIAS** foliis lanceolatis petiolatis glabris, caule simplici, umbellis erectis solitariis. *curassavica.*

Apocynum caule erecto simplici annuo, foliis lanceolatis, umbellis alternis erectis. Hort. cliff. 78. Roy lugdb. 411.

Apocynum radice fibrosa, petalis coccineis, corniculis croceis. Dill. elth. 34. t. 30. f. 33.

Apocynum curassavicum s. americanum, fibrosa radice, floribus aurantiis, chamænerii foliis latioribus. Herm. par. 36. t. 36.

Habitat in Curassao. ♀. ♂

- decumbens.* 10. ASCLEPIAS foliis villosis, caule decumbente.
Asclepias caule decumbente hirsuto, foliis ovatis obtusis villosis subsessilibus. *Gron. virg.* 27.
Apocynum carolinianum aurantiacum pilosum. *Pet. sicc.* 90.
Habitat in Virginia. ♀
- multiflora.* 11. ASCLEPIAS foliis ovatis, caule erecto, umbellis proliferis brevissimis.
Asclepias caule erecto simplici herbaceo, foliis ovatis acuminatis, corymbis compositis longitudine petiolorum. *Fl. zeyl.* 111. *
Habitat in Zeylona. ♀
- Vincetoxicum.* 12. ASCLEPIAS foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis.
Asclepias caule erecto simplicissimo herbaceo, foliis cordato-lanceolatis, racemis conglomeratis alternis. *Fl. suec.* 200. *Mat. med.* 103. *Dalib. paris.* 76.
Asclepias caule erecto annuo, foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis. *Hort. cliff.* 78.
Asclepias albo flore. *Bauh. pin.* 303.
Vincetoxicum. *Dod. pempt.* 407.
Habitat in Europa glareosis. ♀
- nigra.* 13. ASCLEPIAS foliis ovatis basi barbatis, caule superne subvolubili.
Asclepias caule subvolubili herbaceo, foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis patentissimis. *Roy. lugdb.* 410. *Hort. upf.* 53. *Sauv. monsp.* 133.
Asclepias nigro flore. *Bauh. pin.* 303.
Vincetoxicum flore nigro. *Cam. epit.* 560.
Habitat Monspelii in collibus. ♀
- * * *foliis latere revolutis.*
- fruticosa.* 14. ASCLEPIAS foliis revolutis lanceolatis, caule fruticoso.
Asclepias caule erecto fruticoso, foliis lanceolatis, umbellis nutantibus, conceptaculis inflatis pilosis. *Hort. cliff.* 78. *Hort. upf.* 54. *Vir. cliff.* 20. *Roy. lugdb.* 410.
Apocynum erectum africanum, villoso fructu, salicis folio. *Herm. parad.* 23. t. 24.
Apocynum erectum elatius, salicis angusto folio, folliculis pilosis. *Pluk. alm.* 36. t. 138. f. 2.
Habitat in Aethiopia. ♂

15. ASCLEPIAS foliis revolutis linear-i-lanceolatis op- *sibirica*,
positis ternatisque, caule decumbente.

Asclepias montana humilis, radice longius proserpente,
iijii foliis. *Amm. ruth.* 10.

Habitat in Siberia. 2

16. ASCLEPIAS foliis revolutis linearibus verticillatis, *verticillata*,
caule erecto.

Asclepias foliis verticillatis linear-i-setaceis. *Gron. virg.*
26.

Apocynum Marianum erectum, linear-i angustissimis
foliis, umbellatum. *Pluk. mant.* 17.

Apocynum Marianum, foliis angustissimis stellatis. *Pet.*
muf. 609.

Habitat in Virginia.

* * * *foliis alternis.*

17. ASCLEPIAS foliis alternis ovatis, umbellis ex eo- *rubra*,
dem pedunculo communi pluribus.

Apocynum caule erecto simplici annuo, foliis ovatis a-
cuminatis alternis, pluribus in pedunculo umbellis.
Gron. virg. 27.

Habitat in Virginia.

18. ASCLEPIAS foliis alternis lanceolatis, caule divari- *tuberosa*,
cato piloso.

Asclepias caule erecto divaricato villoso, foliis lanceo-
latis, umbellis simplicibus subterminalibus, *Hort. cliff.*
78. *Roy. lugdb.* 411.

Apocynum novæ anglie hirsutum, tuberosa radice, flori-
bus aurantiis. *Herm. lugdb.* 646. t. 647. *Dill. eltb.*
35. t. 30. f. 34.

Habitat in America boreali. 2

STAPELIA.

1. STAPELIA denticulis ramorum patentibus. *Vir. cliff. variegata*,
20. *Roy. lugdb.* 409.

Stapelia denticulis ramorum extrorsum prominulis. *Hort.*
cliff. 77. *Hort. upsi.* 53.

Apocynum humile aizoides, filiqueis erectis, africanum,
Herm. lugdb. 52. t. 53. *Stiff. bot.* 32.

Habitat ad Cap. b. Spei. 5

2. STAPELIA denticulis ramorum erectis. *Hort. cliff. hirsuta*,
77. *Roy. lugdb.* 409.

Asclepias africana aizoides, flore pulchre fimbriato.
Comm. rar. 39. t. 19.
Habitat ad Cap. b. Spei. 5

HERNIARIA.

- glabra.* 1. HERNIARIA glabra. *Baub. hist. 3. p. 378.*
Hernaria calycibus bractea nudis. Hort. cliff. 41. Fl. suec. 207. Mat. med. 104. Roy. lugdb. 215. Hall. helv. 182. Dalib. paris. 76.
Polygonum minus C. Millagrania major. Baub. pin. 281.
Habitat in Europæ apricis, glareosis, fccis. ◎
- hirsuta.* 2. HERNIARIA hirsuta. *Baub. hist. 3. p. 379.*
Habitat in Angliæ, Hispaniæ, Italîæ agris.
- tentaculata.* 3. HERNIARIA? quæ Polygonum lenticulatum.
Polygonum minus tenuifolium. Baub. pin. 281.
Polygonum minus lenticulatum. Baub. prodr. 131.
Habitat in Hispaniæ montibus Escorial, Monspeli.
Flores non vidi; ut excitem Botanicos ad hujus generis forte distinctissimi examen, his plantam adjeci; Habitat proximus henniariae, sed mollissimus.

CHENOPODIUM.

* *foliis angulosis.*

- Bonus Hen- ricus* 1. CHENOPODIUM foliis triangulari-sagittatis integer-rimis. *Hort. cliff. 84. Fl. suec. 208. Mat. med. 106. Roy. lugdb. 278. Hall. helv. 174. Dalib. paris. 79.*
Lapathum unctuosum. Baub pin. 115
Bonus Heuricus. Baub. hist. 2. p. 965.
Habitat in Europæ ruderatis. 2
- urbicum* 2. CHENOPODIUM foliis triangularibus subdentatis, racemis confertis strietissimis cauli approximatis longissimis. *Fl. suec. 209.*
Chenopodium latifolium minus ramosum, petiolis longissimis ex foliorum alis confertim nascentibus. Buxb. hall. 69. t. 1.
Habitat in Europæ borealis plateis. ◎
- ruberum.* 3. CHENOPODIUM foliis cordato-triangularibus obtusifuscis dentatis, racemis erectis compositis subnudis caule brevioribus. *Fl. suec. 210. Mat. med. 107. Dalib. paris. 78.*
Chenopodium erectum, foliis subtriangularibus antice sinuato-dentatis, racemis erectis foliosis lateralibus Hort. cliff. 85. Roy. lugdb. 219. 3-

Atriplex sylvestris latifolia. *Baeh. pin.* 119

Pes anserinus. *Dalech. hist.* 542. *t.* 542

Habitat in Europæ cultis, ruderatis. ◎

4. CHENOPODIUM foliis ovatis acutis dentatis, race- *mura-*
mis ramosis nudis. *Fl. suec.* 211. *Dalib. paris.* 211.

Chenopodium erectum ramosissimum, foliis triangulari-
bus dentatis, racenis ramulis caulem superantibus. *Hort*
cliff. 85. *Lech. scan.* 16.

Habitat in Europæ muris aggeribusque. ◎

5. CHENOPODIUM foliis rhomboideo - triangulari- *album,*
bus erosis postice integris; summis oblongis, racemis
erectis. *Fl. suec.* 212. *Dalib. paris.* 80.

Chenopodium foliis inferioribus ovatis acutis antrosum
dentatis; summis lanceolatis. *Vir. cliff.* 22. *Hort*
cliff. 85. *Gron. virg.* 145. *Roy. lugdb.* 219. *Hall*
helv. 175

Habitat in agris Europa. ◎

6. CHENOPODIUM foliis rhomboideis dentato-sinu- *viride.*
tis, racenis ramosis subnudis. *Fl. suec.* 213. *Dalib.*
paris. 78.

Chenopodium sylvestre, opuli folio, *Vaill. paris.* 36.
7. f. 1.

Chenopodium folio oblongo integro. *Dill. app.* 62
Habitat in Europæ cultis oleraceis.

7. CHENOPODIUM foliis cordatis angulato-acumina- *hybrion.*
tis, racenis ramosis nudis. *Fl. suec.* 214. *Dalib. pa-*
rif. 79.

Chenopodium foliis triangulari-sagittatis; infra medium
sinuato-dentatis, racemis longissimis. *Hort. cliff.* 84.
Roy. lugdb. 219.

Chenopodium stramonii folio. *Vaill. paris.* 36. t. 7. f. 2

Atriplex sylvestris latifolia, acutiore folio. *Baeh. pin*

119.

Habitat in Europæ cultis. ◎

CHENOPODIUM foliis oblongis sinuatis, racenis *Botrys.*
nudis multistidis. *Hort. cliff.* 84. *Hort. upf.* 55. *Hort*
med. 109. *Roy. lugdb.* 219. *Sauv. monsp.* 273.

Botrys ambrosioides vulgaris *Baeh. pin.* 138

Botrys, *Dod. pempt.* 34.

Habitat in Europæ australis arenosis. ◎

9. CHENOPODIUM foliis lanceolatis dentatis, race- *ambrosioides.*
nis

mis foliatis simplicibus. *Hort. cliff.* 84. *Hort. upf.* 56. *Roy. lugdb.* 219.

Botrys ambrosioides mexicana. *Bauh. pin.* 138. 516.
Botrys odorata suaveolens americana mexicanave. *Morif. hist.* 2. p. 605. f. 5. t. 35. f. 8.

Habitat in Mexico, Lusitania. ⊙

multifidum. 10. *CHENOPODIUM* foliis multifidis; segmentis linearibus, floribus axillaribus sessilibus.

Chenopodium sempervirens, foliis tenuiter laciniatis. *Dill. elth.* 78. t. 66. f. 77.

Habitat in Bonaria. ♂

anthelminti- 11. *CHENOPODIUM* foliis ovato-oblongis dentatis, racemis aphyllis.

Chenopodium, lycopi folio, perenne. *Dill. elth.* 77. t. 66. f. 76.

Habitat in Pensylvania, Bonaria. ♀

glaucum. 12. *CHENOPODIUM* foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis *Fl. suec.* 215. *Dalib. paris.* 77.

Chenopodium foliis ovato oblongis repande sinuatis, florum racemis glomeratis ex ala solitariis. *Vir. cliff.* 22. *Hort. cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219.

Chenopodium angustifolium laciniatum minus. *Tournef. inst.* 506.

Habitat ad Europæ simeta. ⊙

* * *foliis integris.*

Vulvaria. 13. *CHENOPODIUM* foliis integerrimis rhomboeovatis, floribus conglomeratis. *Fl. suec.* 216. *Mat. med.* 108. *Dalib. paris.* 77.

Chenopodium foliis triangulari-ovatis. *Hort. cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 218.

Atriplex foetida. *Bauh. pin.* 119.

Vulvaria. *Dalech. hist.* 543.

Habitat in Europæ cultis oleraceis, ⊙

polyspermum 14. *CHENOPODIUM* foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis.

Chenopodium foliis ovatis integerrimis, caule decumbente. *Vir. cliff.* 21. *Fl. suec.* 217. *Roy. lugdb.* 218. *Dalib. paris.* 77.

Blitum foliis ovatis. *Hort. cliff.* 28.

Blitum polyspermum. *Bauh. pin.* 118.

Polysporon cassiani, basili, anguillare. *Lob. hist.* 128

Habitat in Europæ cultis. ⊙

15. CHENOPODIUM foliis linear-i-lanceolatis planis *Scoparia*,
integerrimis. *Hort. cliff.* 86. *Hort. upf.* 55. *Roy. lugdb.* 220.
Linaria scoparia. *Baub. pin.* 212.
Osyris. Dod. pempt. 151.
Habitat in Græcia, Japonia. ☽
16. CHENOPODIUM foliis subulatis semicylindricis. *maritimum*,
Chenopodium foliis subulatis; superne planis, subtus
convexis. *Hart. cliff.* 86. *Fl. suec.* 218. *Roy. lugdb.*
220.
Kali minus album, semine splendente. *Baub. pin.* 289.
Moris. hist. 2. p. 610. f. 5. t. 33. f. 3.
Habitat in Europæ maritimis.
17. CHENOPODIUM foliis linearibus teretibus carno-*fruticosum*,
fis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 86. *Roy. lugdb.* 220.
Graett. stamp. 2. p. 425. Sauv. monsp. 7.
Chenopodium, sedi folio minimo, frutescens perenne.
Boerb. lugdb. 2. p. 91.
Sedum minus arborescens. *Munt. hist. t.* 469.
Habitat in Galliæ, Hispaniæ maritimis. ♂
18. CHENOPODIUM foliis filiformibus acutiusculis, *altissimum*,
caule erecto. *Hort. upf.* 55.
Chenopodium altissimum, foliis succulentis. *Buxb. cent.*
1. p. 21. t. 31. f. 2.
Kali gramineo folio. *Baub. pin.* 289. *prodr.* 133. *Burs.*
XVI: 20.
- β. *Chenopodium foliis filiformibus inermibus mucronatis*,
caule ramosissimo. *Hort. upf.* 56.
Habitat ad Astracanum, ad salinas saxonicas inque Italia.
19. CHENOPODIUM foliis linearibus obtusis: subtus *salsum*,
convexus, caule ramoso: ramis deflexis. *Hort. upf.* 55.
Chenopodium maritimum, foliis sedi teretibus. *Buxb.*
cent. 1. p. 21. t. 31. f. 1.
Habitat ad Astracanum. ☽
20. CHENOPODIUM foliis teretibus obtusis tomento-*hirsutum*,
fis alternis, caule herbaceo. *Sauv. monsp.* 7.
Kali minus villosum. *Baub. pin.* 289. *prodr.* 133.
Kali parvum hirsutum. *Baub. hist.* 702.
Habitat Monspelij in maritimis.
21. CHENOPODIUM foliis lanceolatis carnosis, co-*gristatum*,
rymbis dichotomis spinosis.
Habitat in Sibiria. ☽

Cau-

Caulis spithameus, inaequalis, ramoso-patulus. Folia carnosa, lanceolata, obtusa. Cocymbi axillares, dichotomi, folio longiores, terminati spinis inermibus. Flores sessiles in divaricationibus.

virginicum. 22. CHENOPODIUM foliis linearibus obtusis subcanaiculatis, pedunculis axillaribus; dichotomis muticis.
Habitat in Virginia? ◎

BETA.

- vulgaris.* 1. BETA. *Hort. cliff.* 83. *Hort. upf.* 56. *Mat. med.*
113. *Roy. lug. lib.* 220.
personis. Beta sylvestris maritima. *Baeh. pin.* 118.
rubra. β. Beta rubra vulgaris. *Baeh. pin.* 118.
γ. Beta ruhra major. *Baeh. pin.* 118.
δ. Beta rubra, radice rapæ. *Baeh. pin.* 118.
ε. Beta lutea majot. *Baeh. pin.* 118.
ζ. Beta pallide virens major. *Baeh. pin.* 118.
Cicla. η. Beta alba vel palescens, quæ Cicla officinaram. *Baeh. pin.* 118.
δ. Beta communis viridis. *Baeh. pin.* 118.
Habitat in Angliae & Belgii litoribus maris. δ

SALSOLA.

- kali.* 1. SALSOLA herbacea, foliis subulatis mucronatis, caryophyllis ovatis axillaribus.
Salsola foliis pungentibus. *Hort. cliff.* 86. *Fl. suec.* 206. *Roy. lugdib.* 220. *Gron. virg.* 28.
Kali spinosum cochleatum. *Baeh. pin.* 289.
Kali spinoso affinis. *Baeh. pin.* 289. *Moris. hist.* 2.f.
5. t. 33. f. 11.
Habitat in Europæ litoribus maris. ◎
- racemosa.* 2. SALSOLA herbacea, foliis subulatis mucronatis, caryophyllis explanatis.
Salsola foliis conico-subulatis mucronatis, calycibus corolliformibus obtusis coloratis crenatis. *Hort. upf.* 56.
Kali humile, alis purpureis florem rosaceum mentientibus.
Buxb. cent. 1. p. 9. t. 14. f. 2.
Habitat ad Asie septentrionalis salinas. ◎
- prostrata.* 3. SALSOLA frutescens, foliis linearibus pilosis ineribus. *Amon. acad.* 2. p. 346. *
Habitat in Asia boreali, Virginia. ♀

4. SALSOLA frutescens, foliis ovatis acutis carnosis. *vermiculata*.
Kali fruticosum, ericæ folio. *Buxb. cent.* 1. p. 8. t. 14. f. 1?
Kali vermiculatum hispanicum incanum fruticans. *Barr.*
rar. 504. t. 205.
Kali fruticosum hispanicum, tamarisci folio. *Tournef.*
inst. 247.
Habitat in Hispania. ♂
5. SALSOSA herbacea, foliis inermibus. *Gnott. stamp. Soda*
426. Sauv. monsp. 7.
Kali majus, cochleato feminine. *Baub. pin.* 287.
Kali. Dod. pent. 81
Soda, Kali magnum, sedi medii folio. *Lob. ic.* 394.
Habitat in Europæ australis saltis. ⊖

ANABASIS.

1. ANABASIS aphylla: articulis emarginatis. *Amœr. a. aphylla*
*cad. 2. p. 347.**
Kali bacciferum, salicorniae facie. *Buxb. cent.* 1. p. 11.
t. 18.
Habitat ad maris Caspii litora. ♂
2. ANABASIS foliis subclavatis. *Amœn. acad.* 2. p. 347. *foliæ*
Kali bacciferum, foliis clavatis. *Buxb. cent.* 1. p. 12
t. 12. f. 1.
Habitat ad maris Caspii litora. ⊖

CRESSA.

1. CRESSA *Amœn. acad.* 1. p. 395. *Sauv. monsp.* 92. *cretica*
Anthyllis. Alp. exot. 157. *t. 156. Raj. bist.* 215. *Magn.*
char. 212.
Quinoclit minima humifusa palustris, hennariæ folio.
Tournef. cor. 4.
Lysimachia spicatae purpureæ affinis, flosculis in cæcum
mine caulis, pluribus quasi in nodos junctis. *Pluk*
alm. 236. t. 43. f. 6.
Polygonum creticum, thymi folio. *Baub. pin.* 281?
Habitat in Cretæ litoribus saltis.

TRIANTHEMA.

1. TRIANTHEMA. *Sauv. meth.* 127. *Portulaca*
Portulaca curassavica procumbens, capparidis folio, flo- *Portulaca*
re muscoso, capsula bifurca. *Herm. par.* 213. *t. 213* *stria*
Raj. suppl. 506.
Portulaca attinæ, folio subrotundo, flore pentapetalō di-
lute

lute purpureo. Sloan. jam. 89: hist. 1. p. 205. Raj. suppl. 506.

Kali curassavicum procumbens, foliis subrotundis. Pluk. alin. 202. t. 95. f. 4.
Habitat in Jamaica, Curassao.

GOMPHRENA.

* *floribus terminalibus, caule erecto.*

globoſa.

1. GOMPHRENA caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, capitulis solitariis, pedunculis diphyllis. *Hort. cliff. 86. Hort. upsi. 57. Fl. zeyl. 115. Vir. cliff. 22. Roy. lugdb. 418.*

*Amarantho affinis indiae orientalis, floribus conglomera-
tatis, ocy mastri folio. Breyw. cent. 109. t. 51. Comm.
hort. 1. p. 85. t. 45:*

Habitat in India. ⊖

perennis.

2. GOMPHRENA foliis lanceolatis, capitulis diphyllis, flosculis perianthio proprio distinctis.

*Amaranthoides perenne, floribus stramineis radiatis. Dill.
elth. 24. t. 20. f. 22.*

Habitat in Bonaria. ✎

serrata

3. GOMPHRENA caule erecto brachiatum, capitulis fo-
litariis terminalibus sessilibus, calycibus serratis.

Habitat in America.

interrupta.

4. GOMPHRENA caule erecto, spica interrupta. *Roy.
lugdb. 419.*

Habitat in America.

* * *floribus lateralibus, caule diffuso.*

flava.

5. GOMPHRENA pedunculis oppositis bifidis tricapiti-
tatis, capitulo intermedio sessili.

*Gomphreua pedunculis ad alas geminatis tricapitatis.
Hort. cliff. 87.*

Habitat in Vera Cruce.

vermicularis

6. GOMPHRENA foliis carnosis obtusis, capitulis co-
longis terminalibus,

*Caraxeron humile, cepeæ foliis, capitulis albis. Vaill. act.
1722. p. 264.*

*Amaranthoides humile curassavicum, cepeæ foliis lu-
cidis, capitulis albis. Herm. parad. 15. t. 15. f. 4. 5
Pluk. alm. 27. t. 75. f. 9.*

*Amarantho affinis aizoides s. Amaranthoides minor a-
meri*

mericana procumbens, sedi teretifolii foliis & facie,
flore oblongo niveo. *Breyne. prod. 2.*

Trifolii spica Crithmum maritimum non spinosum bra-
siliense. Raj. hist. 1331.

Habitat in Brasilia, Curaçao.

7. GOMPHRENA caule repente, foliis lanceolatis sub-*sessilis.*
sessilibus, capitulis oblongis sessilibus axillaribus. Fl.
*zeyl. 116. **

Amaranthus humilis, foliis oppositis, flosculis ex alis
glomeratis. Burm. zeyl. 17. t. 4. f. 2.

Coluppa. Rheed. mal. 10. p. 27. t. 9.

Habitat in India.

8. GOMPHRENA caule repente, capitulis rotundis ses-*Ficoidea,*
silis, foliis lanceolato-ovatis.

Gomphrena caule diffuso repente, capitulis sessilibus. Roy.
lugdb. 418.

Amaranthoides marina repens, polygoni folio, capitulis
argenteis. Plum. spec. 20.

Habitat in America meridionali.

9. GOMPHRENA foliis lanceolato-subulatis, caule di-*polygonoides.*
chotomo vilioso, capitulis axillaribus pedunculatis.

Aniaranthoides humile curassavicum, foliis polygoni.
Herm. prodr. 17. t. 17. f. 1. Sloan. jam. 48. hist.

1. p. 141. t. 86. f. 2. Raj. suppl. 126.

Habitat in America meridionali.

BOSEA.

1. BOSEA, *Hort. cliff. 84. Roy. lugdb. 223.*

Tilia forte arbor racemosa, folio longiore subtus albicans
nervis purpureis insignito, flore pentapetalo pur-
pureo. Sloan. jam. 135. hist. 2. p. 19. t. 158. f. 3.
Raj. dendr. 88.

Frutex peregrinus horto bosiano yervamora dictus.

Walth. hort. 24. t. 10.

Habitat in Canariis insulis. 5

ULMUS.

1. ULMUS foliis duplicato-serratis, basi inæqualibus. *campestris.*

Ulmus fructumembranaceo. Hort. cliff. 83. Fl. suec:
219. Mat. med. 105. Roy. lugdb. 223. Dalib. paris. 82.

Ulmus campestris & theophrasti Benth. pin. 246.

Ulmus. Dod. pempt. 837.

Habitat in Europa ad pagos. 5

P.

2. UL-

- americana.* 2. ULMUS foliis æqualiter serratis: basi inæqualibus.
Ulmus fructu membranaceo, foliis simplicissime serratis. *Gron. virg.* 145. *
Habitat in Virginia. 5
- pumila.* 3. ULMUS foliis æqualiter serratis: basi æqualibus.
Ulmus humilis. *Amm. ruth.* 260.
Ulmus pumila, foliis parvis glabra, cortice fungoso.
Pluk. alm. 293.
Habitat in Sibiria. 5

NAMA.

- Zaylanica.* 1. NAMA. *Amœn. acad.* 1. p. 395. *Fl. zeyl.* 117. *
Al sine veronicæ affinis, gratioæ foliis, maderaspatana.
Pluk. alm. 22. t. 130. f. 2.
Habitat in India. ◎

HEUCHERA.

- americana.* 1. HEUCHERA. *Hort. cliff.* 82. *Gron. virg.* 29. *Roy. lugdb.* 437.
Cortusa americana, flore squalide purpureo. *Herm. parv.* 131. t. 131.
Sanicula f. Cortusa americana spicata, floribus squalide purpureis. *Pluk. alm.* 332. t. 58. f. 3.
Habitat in Virginia. 2

SWERTIA.

- perennis.* 1. SWERTIA corollis quinquefidis, foliis radicalibus ovalibus.
Swertia. *Hort. cliff.* 53. *Roy. lugdb.* 433.
Gentiana palustris latifolia. *Bauh. pin.* 188.
Gentiana XII, punctato flore. *Clus. hist.* 1. p. 316.
Habitat in Helvetia, Bavaria. 2
- diformis.* 2. SWERTIA corollis quinquefidis: terminali sexfida,
pedunculis longissimis, foliis linearibus.
Gentiana foliis linearibus acuminate, pedunculis longissimis nudis unifloris oppositis. *Gron. virg.* 30.
Habitat in Virginia.
- rotata.* 3. SWERTIA corollis quinquefidis, foliis lanceolato-linearibus.
Habitat in Sibiria. D. Gmelin. ◎
Planta spithamea. Folia lanceolato-linearia; Rami alterni, pedunculis unifloris; Corollæ planæ.

4. SWER-

4. SWERTIA corollis quadrifidis quadricornibus. *A. corniculata*,
men. acad. 2. p. 344. *
Habitat in Siberia, Gmelin; Canada, Kalm. ◎
5. SWERTIA corollis quadrifidis ecornibus. *Amœn. dichotoma*,
acad. 2. p. 345. *
Habitat in Siberia D. Gmelin. ◎

GENTIANA.

* *Corollis quinquefidis subcampaniformibus.*

1. GENTIANA corollis quinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis. *Hall. helv.* 479.
Gentiana floribus lateralibus confertis pedunculatis, corollis rotatis. *Hort. cliff.* 80. *Fl. succ.* 201. *Mat. med.* 110. *Roy. lugdb.* 432. *Sauv. monsp.* 136.
Gentiana major lutea. *Baeh. pin.* 187. *Fl. lapp.* 96.
Gentiana. *Cam. epit.* 415.
Asterias. *Reneal. spec.* 64. t. 63.
Habitat in alpibus Norvegicis, Helveticis, Apenninis, Pyrenæis, Tridentinis. 2
2. GENTIANA corollis quinquefidis campaniformibus *purpurea*, verticillatis, calycibus subspathaceis.
Gentiana corollis campaniformibus verticillatis, foliis imis petiolatis ellipticis. *Hall. helv.* 479.
Gentiana major purpurea. *Baeh. pin.* 187.
Gentiana major alia. *Cam. epit.* 416.
Coilantha. *Reneal. spec.* 65.
Habitat in alpibus Helveticis. 2
Planta, quam sub nomine Gentianæ majoris luteæ, floribus punctatis carentibus campanulæ forma C. B. 187 meminit, hujus species erat, lecta a Bursero.
3. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis *punctata*, Estatus, calycibus quinquedentatis.
Gentiana major, flore punctato. *Baeh. pin.* 187.
Habitat in Helvetia, Siberia. 2
Hujus varietatem legit Cl. Gmelinus in Siberia foliis linear-lanceolatis, Floribus terminalibus ternis, pedunculis propriis, corollis flavis punctis sparsis purpurascentibus.
4. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis *oppositis sessiliibus, foliis amplexicaulibus*.
Gentiana foliis ovato-lanceolatis, floribus campanulatis in alis sessiliibus. *Hall. helv.* 478.

- Gentiana floribus lateralibus solitariis sessilibus, corollis erectis. *Hort. cliff.* So. *Roy. lugdb.* 432.
 Gentiana asclepiadis folio. *Baub. pin.* 187.
Dasystephania. Reneal. spec. 67. t. 68.
Habitat in alpibus Helveticæ, Pannonicæ, Mauritanicæ. 2

- Bineuminens-
tbe.* 5. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus.
 Gentiana floribus terminalibus ratis, corollis erectis plicatis, foliis linearibus. *Hort. cliff.* So. *Fl. suec.* 202. *Roy. lugdb.* 432. *Dalib. paris.* 81.
 Gentiana angustifolia autumnalis major. *Baub. pin.* 188.
 Gentiana palustris angustifolia. *Baub. pin.* 188.
 Cyana. *Reneal. spec.* 69. t. 68.
Habitat in Europæ paucis humidiusculis. 2

- Saponaria.* 6. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis ventricosis verticillatis, foliis trinerviis.
 Gentiana floribus ventricosis campanulatis erectis quinquefidis, foliis ovato-lanceolatis. *Gron. virg.* 29.
 Gentiana virginiana, saponariæ folio, flore cæruleo longiore. *Moris. hist.* 3. p. 484. f. 12. t. 5. f. 4. *Catesb.* car. 1. p. 70. t. 70.
Habitat in Virginia. 2

- villoſa.* 7. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis ventricosis, foliis villosis.
 Gentiana floribus ventricosis campanulatis erectis quinquefidis, foliis oblongis acuminatis leviter villosis. *Gron. virg.* 145.
Habitat in Virginia. 2

- cau-*
lis. 8. GENTIANA corolla quinquefida campanulata caulem excedente.
 Gentiana corolla campanulata caulem longitudine excedente. *Hort. cliff.* 81. *Roy. lugdb.* 432. *Hall. helv.* 477. *Sauv. monsp.* 136.
 Gentiana alpina latifolia, magno flore. *Baub. pin.* 187. *prodr.* 97.
 9. Gentiana alpina angustifolia, magno flore. *Baub. pin.* 187.

Thylacitis. Reneal. spec. 70. t. 68.

Habitat in alpibus Helveticis, Austriacis, Pyrenæicis. 2

* * *Corollis quinquefidis infundibuliformibus.*

- virga.* 9. GENTIANA corolla quinquefida infundibuliformi-
 caulem excedente, foliis radicalibus confertis majoribus. Gen-

Gentiana flore unico tabuloso, foliis ad terram congestis acutis. *Hall. helv.* 475.

Gentiana alpina verna major. *Bauh. pin.* 188.

Gentianella verna minor. *Clus. hist.* 315.

Ericoila. *Reneal. spec.* 75. t. 68.

Habitat in alpibus Helvetiæ. ♀

10. GENTIANA corolla quinquefida infundibuliformi, *bavarica*, foliis obtusis.

Gentiana foliis ovatis, caule unifloro. *Hall. helv.* 476.

Gentiana caule unifloro, flore hypocrateriformi quinquefido: laciniis subrotundis crenatis. *Hort. cliff.* 81.

Gentianella elegantissima bavarica. *Cam. hort.* 65. t. 15. f. 2.

Habitat in alpibus Helvetiæ, Bavaria.

11. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformi-*nivalis*, bus, ramis unifloris alternis.

Gentiana corollis infundibuliformibus quinquedentatis, ramis alternis unifloris. *Fl. suec.* 204.

Gentiana corolla infundibuliformi: denticulo laciniis interposito. *Fl. lapp.* 95. *

Gentiana humillima, caule ramoso, tubo floris longissimo. *Hall. helv.* 475. t. 7. f. 5.

Gentiana alpina æstiva, centaureæ minoris folio. *Bauh. pin.* 188.

Habitat in Lapponiæ, Helvetiæ summis alpibus. ⊙

12. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformi-*aquatica*, bus terminalibus sessilibus, foliis in margine membranaceis.

Gentiana foliis margine membranaceis basi coadunatis.

Amoen. acad. 2. p. 343.

Gentiana humilis aquatica verna. *Amn. ruth.* 4. t. 1.

Habitat in Sibiria. D. Amman. ⊙

13. GENTIANA corollis quinquefidis hypocrateriforme-*utriculosa*, mibus, calycibus inflatis plicatis.

Gentiana utriculis ventricosis. *Bauh. pin.* 188.

Gentianella cærula cordata. *Column. ephyr.* 220. t. 221.

Gentianella annua, azureo flore. *Barr. rar.* 18. t. 48.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Italiæ. ⊙

14. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformi-*Centaureum*, bus, caule dichotomo.

Gentiana foliis linear-lanceolatis, caule dichotomo, co-

rollis infundibuliformibus quinquefidis. *Hort. cliff.*
81. *Fl. suec.* 205. *Mat. med.* 112. *Italiis simplicibus.*

Vir. cliff. 21. *Roy. lugdb.* 7. *Dalib. paris.* 81.

Centaurium minus. *Baub. pin.* 278.

Erithræa. Renealm. spec. 77. t. 76.

B. *Centaurium minus pumilum ramosissimum.* *It. et. 157.*

Rosen. scan. 10.

Centaurium minus palustre ramosissimum, flore purpureo. *Vaill. paris.* 32. t. 6. f. 1.

y. *Centaurium palustre minimum, flore inaperto.* *Vaill. pa-*
paris. 32. t. 6. f. 2.

Habitat in Europæ apricis, præsertim maritimis. ◎

spicata.

15. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus, floribus alternis sessilibus.

Gentiana corollis infundibuliformibus quinquefidis laxe spicatis, foliis lanceolatis. *Sauv. monsp.* 132.

Centaurium minus spicatum album. *Baub. pin.* 278.
prodr. 130. t. 130. *Baub. hist.* 3. p. 353.

Centaurium minus album. *Tabern. ic.* 780.

Habitat in montibus Euganeis & Monspelii. ◎

quinquefolia

16. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule acutangulo, foliis ovatis amplexicaulis.

Habitat in Pensylvania. *Kalm.*

Planta magnitudine & statura sequentis. Caulis indi-
visis, tetragonus angulis membranaceis. Folia ovata,
sessilia, amplexicaulia, trinervia, acuta. Pedunculi
oppositi, apice ferentes Flores quinque, subpedicellato-
res. Calyces brevissimi, angusti, Corollæ infundibu-
liformes, subcærulae: limbo parvo, fauce pervia.

Amarella.

17. GENTIANA corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis.

Gentiana corollis hypocrateriformibus fauce barbatis.

Hort. cliff. 81. *Fl. juec.* 203. *a.* *Roy. lugdb.* 432.

Dalib. paris. 81. *Mat. med.* 111.

Gentiana floribus confertis faucibus membranula laci-
niata clavis, foliis ovato-acuminatis. *Guett. stamp.*
303.

Gentiana pratensis, flore lanuginoso. *Baub. pin.* 188.

Gentiana autumnalis ramosa. *Baub. pin.* 188.

Oriantha. Reneal. spec. 71.

Habitat in Europæ pratis. ◎

* * * *Corollis non quinquefidis.*

18. GENTIANA corollis quadrifidis fance barbatis. *campestris.*
Gentiana corolla hypocrateriformi tubo villis clauso,
 calycis foliis alternis majoribus. *Fl. lapp.* 94. *Fl. suec.*
 203. *B.*
Gentiana purpurea minima. *Column. ecpbr.* 1. p. 223.
 t. 221. *Borr.* ic. 97. f. 2.
Gentianella alpina verua minor. *Baub.* pin. 183.
Erythralia. *Renealm. spec.* 72.
Habitat in Europæ pratis siccis. ◎
Præcedenti nimis affinis & fere varietas aut hybrida.
19. GENTIANA corollis quadrifidis margine ciliatis. *ciliata.*
Gentiana corollis hypocrateriformibus laciniis margine
 barbatis. *Hort. cliff.* 81.
Gentiana angustifolia autumnalis minor, floribus ad
 latera pilosis. *Baub.* pin. 188.
Gentianella cærulea oris pilosis. *Barb.* pin. 108.
Gentianella cærulea simbriata angustifolia autumnalis.
Column. ecpbr. 1. p. 222. t. 221. f. 1.
Habitat in Helvetiæ, Italiæ, Canadae montibus.
20. GENTIANA corollis quadrifidis imberbibus verticillatis.
ciliatis sessilibus.
Gentiana floribus confertis terminalibus, corollis qua-
 drifidis imberbibus interjecto denticulo. *Hort. cliff.*
 81. *Roy. lugdb* 432. *Dalib. paris.* 80.
Gentiana cruciata. *Baub.* pin. 188.
Gentiana minor. *Cam. epit.* 417.
Tretorrhiza. *Renealm. spec.* 74. t. 73.
Habitat in Pannoniæ, Apenninorum, Helvetiæ mon-
 fis apricis. ✕
21. GENTIANA corollis quadrisidis, floribus acauli-
 bus, foliis ovatis. *sessilis.*
Gentianoides flore luteo. *Fewill. peruv.* 3. p. 20. t. 14.
Habitat in Chilli.
22. GENTIANA corollis quadrifidis imberbibus, caule filiformis.
 dichotomo filiformi.
Geniana corollis infundibuliformibus quadrisidis, pe-
 dunculis ternis, foliis linearibus. *Sauv. monsp.* 132.
Gentiana caule dichotomo, foliis linearis lanceolatis, no-
 ribus infundibuliformibus quadrisidis longissime pedun-
 culatis. *Guett. stamp.* 1. p. 305. *Dalib. paris.* 82.

*Centaurium palustre luteum minimum. Raj. hist. 1092.
Vaill. paris. 32. t. 6. f. 3.
Habitat in Gallia. ♂*

- persoliatu.* 23. **GENTIANA** corollis octofidis, foliis persoliatis.
*Gentiana caule dichotomo foliis connatis, corollis
octofidis. Hort. cliff. 81. ♂ 496. Roy. lugdb. 433.
Dalib. paris. 82. Sauv. monsp. 136.*
*Centaureum luteum persoliatum. Baub. pin. 278. Mo-
ris. hist. 2. p. 565. f. 5. t. 26. f. 1. 2.*
*Centaureum parvum, flore luteo. Clus. hist. 2. p. 180.
Chlora. Renati. spet. 80. t. 76.*
Habitat in Gallia, Anglia, Hispania. ♂

PHYL LIS.

- nobla.* 1. **PHYL LIS** stipulis dentatis. *Roy. lugdb. 92.
Phyllis. Hort. cliff. 87. Hort. upf. 57.
Valerianella canariensis frutescens Simpla nobla dicta.
Dill. elth. 405. t. 299. f. 386.*
*Bupleuroides quæ Arbor umbellifera. Walth. hort. 11.
t. 6.*
Habitat in Canariis. ♂
- indica.* 2. **PHYL LIS** stipulis integerrimis. *Roy. lugdb. 92. ♀*
Habitat in India. ♂
Flores hujus mihi ignoti sunt.

ERYNGIUM.

- fœtidum.* 1. **ERYNGIUM** foliis gladiatis ferrato-spinosis: florali-
bus multispidis.
*Eryngium foliis gladiatis utrinque laxe ferratis: denticu-
lis subulatis. Hort. cliff. 88. Gron. virg. 30. Roy.
lugdb. 529.*
*Eryngium, foliis angustis serratis, fœtidum. Stoen. jam.
127. hist. 1. p. 264. t. 156. f. 3. 4.*
*Eryngium americanum, yuccæ folia, spinis ad oras mol-
liusculis. Pluk. alm. 13. t. 175. f. 4. Raj. suppl.
239. Moris. hist. 3. p. 167.*
Scorpii spina. Hern. mex. 222.
Habitat in Virginia, Jamaica, Mexico, Canada. ♀
- equoricum.* 2. **ERYNGIUM** foliis gladiatis ferrato-spinosis: florali-
bus indivisis.
*Eryngium foliis gladiatis utrinque laxe ferratis: summis
tantum dentatis subulatis. Gron. virg. 146.*

♂ Eryn-

3. *Eryngium lacustre virginianum*, floribus ex albido cæruleis, caule & foliis ranunculi flaminnei minoris. *Pluk.*
aliz. 137.

Habitat in Virginia. *

3. **ERYNGIUM** foliis radicalibus ovalibus planis cre- *planum.*
natis, capitulis pedunculatis. *Hort. cliff.* 87. *Hort. upf.*
37. Roy. lugdb. 92. *Dalib. paris.* 83.

Eryngium latifolium planum. *Baub. pin.* 87.

Eryngium pannonicum latifolium. *Clus. hist.* 2. p. 138.

Habitat in Russia, Polonia, Austria, Helvetia. *

4. **ERYNGIUM** foliis radicalibus oblongis incisis, cau- *pusillum.*
le dichotomo. capitulis sessilibus. *Hort. cliff.* 87. *Roy.*
lugdb. 93.

Eryngium planum minus. *Baub. pin.* 386.

Eryngium pusillum planum moutoni. *Clus. hist.* 2. p. 158.

Habitat in Hispania.

5. **ERYNGIUM** foliis radicalibus subrotundis plicatis spi- *maritimum.*
nosis, capitulis pedunculatis. *Hort. cliff.* 87. *Fl. suec.*
220. Roy. lugdb. 93.

Eryngium maritimum. *Baub. pin.* 386.

Eryngium mariuum. *Clus. hist.* 2. p. 169. *Cam. epit.*

448.

Habitat ad Europæ littora arenosa maritima

6. **ERYNGIUM** foliis radicalibus cordatis oblongis, ca- *alpinum.*
ulinis pinnatifidis, capitulo subcylindrico.

Eryngium alpinum cæruleum, capitulis dipsaci. *Baub.*
pin. 386.

Eryngium cæruleum genevensc. *Lob. ic.* 2. p. 23.

Habitat in alpibus Helvetiæ, Italiæ. *

7. **ERYNGIUM** foliis radicalibus pinnatis tripartitis *Hort. campestre.*
cliff. 87. *Mat. med.* 114. *Roy. lugdb.* 93.

Eryngium vulgare. *Baub. pin.* 386.

Eryngium campestre vulgare. *Clus. hist.* 2. p. 157

Habitat in Germaniæ, Galliæ, Hispaniæ, Italiæ incal-
tis. *

8. **ERYNGIUM** foliis radicalibus digitato-multifidis. *amethysti-*
Eryngium montanum amethystinum. *Baub. pin.* 386. *num.*
Morif. hist. 3. p. 165. f. 7. t. 35. f. 2

Eryngium totum cæruleum. *Beßl. eyfl.* 0. 11. t. 8. f. 4.

Habitat in Styriæ montibus. *

Habet multa affinia cum præcedenti

HYDROCOTYLE.

vulgaris.

1. HYDROCOTYLE foliis peltatis, umbellis quinquefloris.

Hydrocotyle foliis peltatis orbiculatis undique emarginatis. *Hort. cliff.* 88. *Fl. suec.* 221. *Roy. lugdb.* 93. *Hall. helv.* 425. *Dalib. paris.* 83.

Ranunculus aquaticus, cotyledonis folio. *Baub. pin.* 180. *Cotyledon aquatica*. *Lob. ic.* 387.

Habitat in Europæ inundatis.

umbellata.

2. HYDROCOTYLE foliis peltatis, umbellis multifloris.

Hydrocotyle repens, florc alba, cotyledonis folio. *Gron. virg.* 30.

Hydrocotyle maxima, folio umbilicato, floribus in umbellam nascentibus. *Plum. spec.* 7.?

Erva de capitona. *Marcgr. bras.* 27.

Acaricoba. *Pif. bras.* 90.

Habitat in America.

Planta simillima praecedenti, hinc cum ea mixta; differt scapo foliis duplo longiore, flosculis non 5, sed pluribus quam viginti in umbellam simplicem digestis.

americana.

3. HYDROCOTYLE foliis reniformibus sublobatis crenatis.

Habitat in America septentrionali. *Kalm.*

Plantæ facies prima & magnitudo. Folia antice sinn vix hi intè ad contrum usque dissecta, margine in 9 lobos obsoletos divisa, quorum singuli tribus crenis minoribus notata. Umbella quinqueflora.

asiatica.

4. HYDROCOTYLE foliis reniformibus æqualiter crenatis. *Hort. cliff.* 88. *Fl. zeyl.* 118. *Roy. lugdb.* 94.

Valerianella zeylanica palustris repens, hederæ terrestris folio. *Herm. par.* 238. t. 238.

Ranunculo affinis umbelliferis accedens, chelidonii minoris folio, zeylanica minor. *Pluk. alm.* 314. t. 106. f. 2.

Codagam. *Rheed. mal.* 10. p. 91. t. 46.

Habitat in India.

Differt a precedente marginis denticulis, i. crenis æqualibus, consistentia foliorum duplo crassiore & fere incana; petiolis pluribus aa genicula caulis, cum in precedente folia solitaria.

ebenensis.

5. HYDROCOTYLE foliis linearibus, umbellis multifloris.

Habitat in China.

Magnitudo praecedentium; Caulis repens. Folia linearia, levia, obtusa, plana, sèpius bina ad articulos. Scapi longitudine folii. Umbella multiflora.

SANICULA.

1. SANICULA foliis radicalibus simplicibus, flosculis o- *europæan.*
inuibus sessilibus. *Fl. suec.* 222. *Mat. med.* 115.
Sanicula flosculis omnibus sessilibus. *Gron. virg.* 147.
Sanicula. *Hort. cliff.* 88. *Roy. lugdb.* 93.
Sanicula officinarum. *Baub. pin.* 319.
Diapensia. *Cam. epit.* 763.
Habitat in Europæ sylvis montosis. 2
2. SANICULA foliis radicalibus compositis, foliolis o- *canadensis.*
vatis. *Gron. virg.* 146.
Sanicula canadensis, amplissimo laciniato folio. *Tour-*
nef. inst. 326.
Habitat in Virginia. 2
Structura ita praecedentis, ut vix differentia, sed plan-
ta decuplo sape omnibus partibus major.
3. SANICULA flosculis masculis pedunculatis, herma- *marilandica.*
phroditis sessilibus. *Gron. virg.* 31.
Sanicula foliis septilobatis inæqualibus, flosculis masculi-
lis pedunculatis. *Hort. upf.* 57.
Sanicula marilandica, caule & ramulis dichotomis, e-
chinis minimis in eodem communi pediculo ternis.
Raj. suppl. 260.
Habitat in Marilandia, Virginia. 2

ASTRANTIA.

1. ASTRANTIA foliis quinquelobis: lobis trifidis. *Hall. major.*
helv. 439.
Astrantia. *Hort. cliff.* 88.
Helleborus niger, saniculæ folio. *Baub. pin.* 186.
Veratrum nigrum. *Dod. pempt.* 387.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Hetruriæ, Pyrenæis. 2
2. ASTRANTIA foliis digitatis serratis. *minor*
Astrantia foliis digitatis septenis integris dentatis. *Hall.*
helv. 440.
Helleborus, saniculæ folio, minor. *Baub. pin.* 186.
prodr. 97. *Raj. hisp.* 475.
Habitat in alpibus Helvetiæ. 2

BUPLEURUM.

* *Herbacea.*

- rotundifoli.* 1. BUPLEURUM involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis. *Hort. upf.* 64.
Bupleurum foliis ovatis perfoliatis. *Hort. cliff.* 104. *Roy. lugd.* 109. *Hall. helv.* 437.
Perfoliata vulgatissima arvensis. *Baub. pin.* 277.
Perfoliata. *Dod. pompt.* 104.
B. Perfoliata minor, ramis inflexis. *Baub. pin.* 277. *prodr.* 130.
Perfoliata flore multiplici. *Baub. pin.* 277.
Perfoliata crispa s. muscosa. *Cam. hort. t.* 37.
Habitat inter Europæ australis segetes. ◎
- stellatus.* 2. BUPLEURUM involucellis coadunatis, universalis triphylio.
Bupleurum alpinum, angustis nervosis foliis, calyce universalis leviter inciso. *Hall. helv.* 438. *t.* 10.
Perfoliata alpina angustifolia media. *Baub. pin.* 277. *prodr.* 129. *Burs. VI:* 5.
Habitat in alpibus Helveticis.
Folia radicalia linearia; summa ovata, lanceolata, sessilia; involucri *universalis* foliola ovata, *aqualia:* partialis 5, coalita ultra medium.
- petraum.* 3. BUPLEURUM involucellis coadunatis, universalis pentaphyllo
Bupleurum foliis angustis & nervosis, umbella universalis quinquefolia, peculiari sexfida stellata. *Hall. helv.* 438.
Perfoliata alpina, gramineo folio. *Baub. pin.* 277.
Sedum petraeum, bupleuri folio. *Pon. bald.* 247.
Habitat in alpibus Helvetiæ, Baldi. 2
Folia linearia, sessilia. Involucri *universalis* foliola 5, *aqualia, latiora;* partialium 5, coalita ad medium.
- angulosum.* 4. BUPLEURUM involucellis pentaphyllis orbiculatis, universalis triphylio ovato, foliis amplexicaulis cordato-lanceolatis.
Perfoliata alpina angustifolia major, folio angulofo. *Baub. pin.* 277. *prodr.* 129. *Burs. VI:* 4.
B. *Perfoliata alpina angustifolia minor.* *Baub. pin.* 277. *prodr.* 129. *Burs. VI:* 6.
Habitat in Pyrenæis. B. in Vallesiæ alpibus. 2
Planta affinis maxime 2, uti patuit ex Bürseri collectio-
ne, licet involucri partialis foliola in hac distincta. In
varietate B. folia angustissima striata, in a. vero lan-
ceolata nec nervoso-striata.

5. BUPLEURUM involucellis pentaphyllis ovatis: univ. *longifolium*.
 versali subpentaphyllo, foliis amplexicaulibus.
 Bupleurum foliis imis petiolatis, superioribus ovatis per-
 foliatis. *Hall. helv.* 437.
Perfoliata montana latifolia. Baub. pin. 277.
Perfoliata montana. Cam. hort. 120. t. 38.
Habitat Göttingæ, inque monte Jura Helvetiæ.
Folia ovata, profunde amplexicaulia: radicalia petiolata;
Involucr. univers. 3. vel quinquephyllum; partiale
quinquephyllum, longitudine flosculorum.
6. BUPLEURUM involucellis pentaphyllis acutis, *falcatum*.
 universali diphylllo, foliis lanceolatis obtusis peti-
 olatis.
 Bupleurum foliis radicalibus pedunculatis: summo subro-
 tundo, caulinis linearibus sessilibus. *Graett. stamp.* 59.
 Bupleurum foliis petiolatis falcato-ellipticis acutis. *Hall.*
helv. 439.
 Bupleurum folio subrotundo s. *vulgatissimum. Baub.*
pin. 278.
 Bupleurum. *Riv. pent.* 44.
Isophyllum. Cord. hist. 69.
Habitat in Misniæ, Vallesiæ sepibus. 2
Folia ovali-oblonga petiolis foliaceis; Involucrum uni-
versale diphylum, inaequale; partiale quinquephyllum,
microonatum.
7. BUPLEURUM involucellis pentaphyllis acutis: univ. *odontites*.
 universali triphyllo, flosculo centrali altiore, ramis di-
 varicatis.
 Bupleurum foliis gramineis, calyce peculiari quinquefi-
 do aristato rigido. *Hall. helv.* 438.
Perfoliata minor angustifolia, bupleuri folio. Baub. pin.
277.
Perfoliata minima, bupleuri folio. Column. ecphr. 1.p.
84. t. 247.
Habitat in alpibus Vallesiæ. ♂
Folia linear-lanceolata. Caulis ramosissimus, divarica-
tus; involucr. univers. subpentaphyllum foliolis la-
tioribus rigidis acutis; partiale pentaphyllum simi-
le; flosculi 9, intermedii petiolatus duplo altior.
8. BUPLEURUM involucellis pentaphyllis lanceolatis *rannuncio-*
longioribus: universali triphyllo, foliis caulinis lanceo-
latis.
Bupleurum foliis amplexicaulibus: inferioribus linearibus,
sum-

summo cordato-oblongo. *Hort. cliff.* 104. *Hall. belv.* 437. *Roy. lugdb.* 110.

Perfoliata alpina angustifolia miniina. *Baub. pin.* 277. *prodr.* 130. *Burs. XVI:* 8.

Perfoliatum gramineum helveticum alpinum pumilum facie ranunculi. *Lob. illustr.* 137. *Park. theatr.* 335. t. 338.

Habitat in Helvetia, & Pyrenæis.

rigidum. 9. **BUPLEURUM** caule dichotomo subnudo, involucris minimis acutis.

Bupleurum foliis lanceolatis rigidis: radicalibus obtusis, caulinis acutis. *Roy. lugdb.* 110. *Sauv. monsp.* 76.

Bupleurum folio rigido. *Baub. pin.* 278.

Bupleurum alterum latifolium. *Dod. pent. pi.* 633.

Habitat Monspelii. ♀

tenuissimum. 10. **BUPLEURUM** umbellis simplicibus alternis pentaphyllis subtrifloris.

Bupleurum foliis linearibus acutis sessilibus. *Hort. cliff.* 104. *Roy. lugdb.* 110.

Bupleurum tertium minimum. *Column. ecpbr.* 1. p. 85. t. 247. *Moris. bist.* 3. p. 300. f. 9. t. 14. f. 4.

Bupleurum angustissimo folio. *Baub. pin.* 278.

Habitat in Germania, Anglia, Gallia, Italia. ☺

* * *Frutescentia.*

villosum. 11. **BUPLEURUM** frutescens, foliis amplexicaulibus dentatis subtus villosis.

Perfoliata foliis oblongis sinuosis subtus incanis. *Burm. afr.* 196. t. 71. f. 2.

Habitat in Æthiopia. ♂

fruticosum. 12. **BUPLEURUM** frutescens, foliis obovatis integerimis.

Bupleurum, foliis obverse ovatis in petiolum attenuatis, *Hort. cliff.* 104. *Roy. lugdb.* 109. *Sauv. monsp.* 60.

Seseli æthiopicum, salicis folio. *Baub. pin.* 161.

Seseli æthiopicum frutex. *Dod. pent.* 312.

Habitat in Gallæ australis saxosis maritimis. ♂

diforme. 13. **BUPLEURUM** frutescens, foliis vernalibus decompositis planis incisis, æstivalibus filiformibus angulatis trifidis.

Bupleurum foliis radicalibus pinnato incisis, caulinis fasciculatis tetragonis. *Roy. lugdb.* 110.

Bu-

Bupleurum frutescens, foliis ex uno puncto plurimis
junceis tetragonis. *Burm. afr.* 195. t. 71. f. 1?

Habitat in Aethiopia (mea aliunde) ♂

Flores nondum apud nos protulit. De genere i-
taque hebito. Folia hyemalia Petroselini, aestivalia
Spartii.

ECHINOPHORA

1. ECHINOPHORA foliolis subulato-spinosis integer-*spinoso-*
rimis.

Echinophora foliis decompositis. *Wach. ultr.* 200.

Caucalis caule lignoso, foliolis subulato-spinosis inte-
gerrimis. *Roy. lugdb.* 96. *Sauv. monsp.* 258.

Crithmum maritimum spinosum. *Baub. pin.* 288.

Crithmum spinosum. *Dod. pempt.* 705.

Habitat ad litora maris praesertim mediterranei. ♀

2. ECHINOPHORA foliolis incisis inermibus. *tenuisolia*

Echinophora foliis supradecompositis. *Wach. ultr.* 200.

Caucalis caule lignoso, foliis incisis. *Roy. lugdb.* 96.

Pastinacha sylvestris angustifolia, fructu echinato. *Baub.*
pin. 151.

Pastinaca echinophora apula. *Column. ecphr.* 1. p. 98.
t. 101.

Habitat in Apulia maritimis apricis, salcis. ♀

TORDYLIUM.

1. TORDYLIUM involucris umbelia longioribus. *Hort. syriacum.*
cliff. 90. *Hort. upf.* 58. *Roy. lugdb.* 95. *Sauv. meth.*
230.

Tordylium syriacum humilius, semine granulato ma-
jore. *Moris. hist.* 3. p. 317. f. 9. t. 16. j. 7.

Gingidium foliis pastinaceæ latifoliæ. *Baub. pin.* 151.

Habitat in Syria. ♂

2. TORDYLIUM involucris partialibus longitudine pe-*officinale.*
talorum, foliolis ovatis laciniatis. *Hort. cliff.* 90. *Hort.*
upf. 58. *Roy. lugdb.* 95. *Mat. med.* 145. *Sauv. monsp.*
230.

Seseli creticum minus. *Baub. pin.* 161.

Seseli creticum. *Dod. pempt.* 314.

Habitat in Narbona, Italia, Sicilia. ♂

3. TORDYLIUM umbellulis remotis, foliis pinnatis: *epilium.*
pinnis subrotundis laciniatis. *Hort. cliff.* 90. *Roy.*
lugdb. 94.

Tor-

*Tordylium apulum minimum. Column. eephr. I. p.
122. t. 124.*

*Seseli creticum minimum. Baub. pin. 161.
Habitat in Italiæ, Apuliæ incultis.*

*Umbellulae singulæ flosculi marginales tres majores sra-
diati.*

*maximum. 4. TORDYLIUM umbella conferta radiata, foliolis lan-
ceolatis inciso-serratis. Hort. cliff. 90. Roy. lugdb.
94. Sauv. monsp. 230. 259.*

Tordylium. Riv. pent. I.

*Caucalis maxima, sphondylii aculeato semine. Baub.
pin. 152.*

Seseli creticum majus. Baub. pin. 161.

Habitat in Italiæ ruderatis sepibus.

*latifolium. 5. TORDYLIUM umbella conferta nudiuscula, foliis
pinnatis: foliolis lanceolatis inciso-serratis.*

*Caucalis umbella universali trifida; partialibus pentasper-
mis, foliis pinnatis serratis. Hort. cliff. 91. Roy. lugdb.
95. Dalib. paris. 84. Sauv. monsp. 236.*

Caucalis arvensis echinata latifolia. Baub. pin. 152.

Lappula canaria latifolia. Baub. pin. 3. p. 81.

Habitat in Gallia, Italia. ☉

*Anthriscus. 6. TORDYLIUM umbella, conferta, foliolis ovato-lan-
ceolatis pinnatifidis. Hort. cliff. 90. Fl. suec. 224.
Roy. lugdb. 94.*

*Caucalis umbella conferta, foliolis ovato-lanceolatis
pinnatifidis. Guett. stamp. I. p. 81.*

*Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus. Baub. pin.
152. prodr. 80.*

*Caucalis minor, flore rubente. Moris hist. 3. p. 308.
f. 9. t. 14. f. 8.*

Habitat in Europæ septentrionalis arvis ruderatis. ♂

*nodosum. 7. TORDYLIUM umbellis simplicibus sessilibus, semi-
nibus exterioribus hispidis.*

*Caucalis umbellis sessilibus simplicibus. Hort. apf. 58.
Hort. cliff. 91. Roy. lugdb. 95. Dalib. paris. 85.*

*Caucalis nodosa, echinato semine. Baub. pin. 153.
prodr. 80. Baub. hist. 3. p. 83.*

Habitat in Gallia, Italia ad vias. ☉

CAUCALIS.

*grandiflora. 1. CAUCALIS involucris singulis pentaphyllis: folio-
le*

Io unico duplo majore. *Hort. cliff.* 91. *Roy. Ingdb.*
95. *Sauv. monsp.* 258.

Caucalis involucro universalis pinnatifido, partialibus in-
divisis, umbella multiifida. *Fl. succ.* 225. *Dalib. pa-*
rif. 84.

Caucalis arvensis echinata, magno flore. *Bauh. pin.* 152.
Echinophora flore magno. *Rit. pent.* 25.

Echinophora pycnocarpos. *Column. cephr.* 1. *p. 91.* l.

94.

Habitat in Europa australiori inter segetes.

2. CAUCALIS involucro universalis longitudine umbel- *daucoisae,*
læ lanceolato.

Caucalis dauci sylvestris folio, echinato magno fructu.
Magn. monsp. 292.

Habitat Monpelii D. Sauvages:

Folia supradecomposita *Dauci vulgaris.* Involucrum u-
niversale pentaphyllum: foliis lanceolatis, longitu-
dine totius umbelle, acuminatis. Involucra partialia la-
to-lanceolata, lateribus membranacea, acuta: Flo-
sculi copiosi albi: hermaphroditi 3 in radio; flosculis di-
sci, s. masculis parvis, euanous; radii flosculis pe-
talis maximis bipartitis albis. In precedente involu-
crum umbella dimidio brevius & radii petala rotun-
diora.

3. CAUCALIS involucro universalis monophyllo, par- *mauritanicae;*
partialibus triphyllis. *Mœhr. E. N. C.* 1742. *vol. 6. p.*
401.

Caucalis mauritanica vulgari similis, sed semine majo-
re. *Walth. hort.* 127.

Habitat in Mauritania.

4. CAUCALIS umbella trifida, umbellulis trispermis, *platycarpos;*
involucris triphyllis. *Hort. cliff.* 91. *Hort. upf.* 58.
Roy. Ingdb. 95. *Sauv. monsp.* 258.

Caucalis monpelica echinata, magno fructu: *Bauh.*
pin. 153.

Echinophora altera asperior platycarpos. *Col. cephr.* 1:
p. 95. t. 94.

Habitat in Italia, Monpelii: ◎

5. CAUCALIS umbellis patentibus, foliolis partialibus *orientalis.*
supradecompositis laciniatis: lacinulis linearibus: *Roy.*
Ingdb. 95.

Caucalis orientalis altissima, folio ferulæ. *Tournes cor.* 23.
Habitat in Oriente. ♂

- leptophylla.* 6. **CAUCALIS** seminum aculeis triglochidibus uncinatis: pilis verticillatis hispidis. *Guett. stamp.* 80. *Dalib. paris.* 85.
Caucalis arvensis echinata, parvo flore & fructu. *Baub. pin.* 152.
Echinophora tertia *leptophyllum* purpurea. *Column. ecphr.* 1. p. 96. t. 97.
Habitat in Gallia, Italia.

ARTEDIA.

- squamata.* 1. **ARTEDIA** seminibus squamatis. *Hort. cliff.* 89. *Hort. upf.* 58. *Roy. lugdb.* 90.
Thapsia orientalis, anethi folio, semine eleganter crenato. *Tournef. cor.* 22. *itin.* 3. p. 298. *
Gingidium fœniculi folio. *Baub. pin.* 151.
Gingidium rauwolfii. *Cam. hort.* 67. t. 16.
Habitat in Libano. ☽

- muricata.* 1. **ARTEDIA** seminibus aculeatis. *Hort. cliff.* 89. *Roy. lugdb.* 96. *Berg. viadr.* 81.
Cauculis major daucoides tingitana. *Moris. hist.* 3. p. 308. f. 9. t. 14. f. 4.
Echinophora tingitana. *Riv. pent.* 27.
Habitat in Mauritania.

DAUCUS.

- Carota* 1. **DAUCUS** seminibus hispidis. *Hort. cliff.* 89. *Hort. upf.* 59. *Fl. suec.* 223. *Mat. med.* 142. *Roy. lugdb.* 97. *Gron. virg.* 31 *Dalib. paris.* 85.
Daucus vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 198.
Pastinaca tenuifolia sylvestris dioscoridis. *Baub. pin.* 151.
 β. *Pastinaca tenuifolia sativa* radice lutea, *Baub. pin.* 151.
 γ. *Daucus sativus* radice atrorubente. *Tournef. inst.* 307.
Habitat in Europæ campis exaridis. ♂
- Vitisnaga* 2. **DAUCUS** seminibus nudis. *Hort. cliff.* 89. *Roy. lugdb.* 97. *Sauv. monsp.* 257.
Gingidium umbella oblonga. *Baub. pin.* 151.
Gingidium alterum. *Dod. pempt.* 792.
Habitat in Europa australi.
- Gingidium.* 3. **DAUCUS** radiis involueri planis: laciinis recurvis.
Roy. lugdb. 97.
Gingidiuum folio charophylli. *Baub. pin.* 151.
Gingidium Matth. comm. 372. t. 373.

Pastinaca tenuifolia marina, foliis obscure virentibus & quasi lucidis. *Magn. monsp.* 199.
Pastinaca folio cœnanthes. *Bocc. sicc.* 74.
Habitat Monspelii.

AMMI.

1. AMMI foliis inferioribus pinnatis lanceolatis serratis, *magis*: superioribus multifidis linearibus. *Hort. upf.* 59.
Ammi lacinis foliorum caulis lanceolatis. *Hort. cliff.* 89. *Roy. lugdb.* 96, *Sauv. monsp.* 232:
Ammi majus. *Baub. pin.* 159.
Ammi vulgare. *Dod. pempt.* 415:
Habitat in Europa australi. ♂
2. AMMI foliotum omnium lacinulis lanceolatis. *Guett: glaucifolium* *stamp.* 2. *p. 433.* * †
Ammi petræum glaucifolium perenne. *Moris. hist.* 3. *p.* 295.
Daucus petræus glaucifolius: *Baub. hist.* 3. *p. 55.*
Habitat in Gallia. 2

BUNIUM.

1. BUNIUM. *Hort. cliff.* 91, *Roy. lugdb.* 107: *Bulbocastanum*
Bunium bulbo globoso. *Sauv. monsp.* 256. *num.*
Bulbocastanum majus, folio apii. *Baub. pin.* 162.
Nucula terrestris. *Lob. hist.* 429.
Habitat in Germania, Anglia Gallia.

CONIUM.

1. CONIUM seminibus striatis. *Hort. upf.* 92. *Fl: suec. maculatum*.
226. Roy. lugdb. 107.
Cicuta major. *Baub. pin.* 160.
Cicutaria major vulgaris. *Clus. hist.* 2. *p. 200.*
Habitat in Europæ cultis, agris, ruderatis. ♂
2. CONIUM seminibus aculeatis. *Hort. cliff.* 92. * *Roy. africanum*:
lugdb. 107.
Caucalis africana, folio minore rutæ. *Boerb. lugdb.* 1.
p. 63. t. 63.
Habitat in Africa.
3. CONIUM seminibus radiato spinosis. *Roy. lugdb* 107. *Royenit*
Habitat - - - - -

SELINUM.

- sylvestre.* 1. SELINUM radice fusiformi multiplici. *Hort. cliff.* 93.
Hort. upf. 59. *Roy. lugdb.* 106.
Apium sylvestre, lacteo succo turgens. Bauh. pin. 153
Tysselinum plinii. Lob. hist. 409. *Moris. hist.* 3. p.
 319. f. 9. t. 17. f. 2.
Habitat in Harcynia, Gallia. 2
- palustre.* 2. SELINUM sublaetescens, radice unica. *Hall. helv.* 443.
Selinum foliolis & lacinulis oblongo-linearibus. Guett.
stamp. 2. p. 70.
Tysselinum palustre laetescens. Fl. lapp. 110. *Fl suec.*
 227. *Hort. cliff.* 92. *Roy. lugdb.* 116.
Seseli palustre laetescens. Bauh. pin. 162. *prodr.* 85.
Habitat in Europæ septentrionalis paludibus. 2

ATHAMANTA.

- Libanotis.* 1. ATHAMANTA foliis bipinnatis planis, umbella hemisphærica, seminibus hirsutis. *Fl. suec.* 226.
Libanotis pinnulis circa costam decussatis. Hall. helv.
 451.
Libanotis minor, apii folio. Bauh. pin. 157.
Daucus montanus, apii folio. Bauh. pin. 150. *prodr.* 77.
Daucus montanus, pimpinellæ saxifragæ hircinæ folio.
Pluk. alm. 129. t. 173. f. 1.
Habitat in Sueciæ, Germaniæ pratis siccis apricis. 2
- sibirica.* 2. ATHAMANTA foliis pinnatis inciso-angulatis.
Selinum foliis simpliciter pinnatis inciso-angulatis. Hort.
upf. 60. *
Habitat in Sibiria. 2
- Oreoselinum* 3. ATHAMANTA foliolis divaricatis.
Selinum foliolis ovato-acutis acute ferratis & incisis.
Hort. cliff. 92. *Roy. lugdb.* 106.
Selinum foliolis lacinulisque oblongo-linearibus. Guett.
stamp. 1. p. 70.
Selinum pinnis ad angulos obtusos pinnatis: pinnulis incisis non ferratis. Hall. helv. 444.
Apium montanum, folio ampliore. Bauh. pin. 153.
Oreoselinum. Clus. hist. 2. p. 195. *Riv. pent.* 8.
Habitat in Germaniæ, Galliæ, Angliæ collibus apricis 2
- sicula.* 4. ATHAMANTA foliis inferioribus nitidis, umbellis primordialibus subsessilibus, seminibus pilosis. *Hort*
upf. 60.

Atha-

Athamanta foliolis multifidis planis, seminibus villosis.

Hort. cliff. 93. Roy. lugdb. 97.

Daucus secundus sicutus, sophiæ folio. Zan. hist. 80.

Habitat in Sibiria. 2

5. ATHAMANTA foliolis linearibus planis hirsutis, petiolaribus bipartitis, seminibus oblongis hirsutis. *Mat. med.*

^{143.}

Athamanta foliis capillaribus, seminibus hirsutis. Hort.

93. Roy. lugdb. 97.

Daucus foliis fœniculi tenuissimis. Bauh. pin. 150.

Daucus creticus. Cam. epit. 536.

Habitat in Helvetia.

6. ATHAMANTA foliis multipartitis: lacinias linearibus teretiusculis acuminatis. *annua.* *Roy. lugdb. 98.*

Myrrhis annua, semine striato villoso, incana. Morif. umb. 67.

Myrrhis tenuifolia annua cretica, semine lanugine alba pubescente. Morif. hist. 3. p. 302.

Habitat in Creta. ①

7. ATHAMANT A seminibus membranaceo-striatis, foliis supradecompositis laevibus multifidis. *chinense.*

Habitat - - - Chinensem dixit Barthram, qui semina misit ex Virginia.

Caulis angulatus, laevis, erectus, parum flexuosus. Folia Chærophylli, laevia. Umbella minus expansa, alba. Semina singula 5 alis longitudinalibus parvis; involucrum duplex.

8. ATHAMANTHA foliolis capillaribns, seminibus glabris striatis. *Hort. cliff. 93. Hort. upf. 60. Mat. med.*

^{144.} *Roy. lugdb. 97. Sauv. monsp. 256.*

Meum foliis anethi. Bauh. pin. 148.

Meum. Dod. pempt. 305.

Habitat in Alpibus Italiæ, Hispaniæ, Helvetiæ. 2

PEUCEDANUM.

1. PEUCEDANUM foliis quinques tripartitis filiformibus linearibus.

Peucedanum foliis quinques tripartitis lineari-subulatis integrerimis. Hort. cliff. 93. Hort. upf. 60. Mat. med. 126. Roy. lugdb. 98. Sauv. monsp. 182. 257.

Peucedanum. Bauh. hist. 3. p. 36. Raj. hist. 416.

a. *Peucedanum germanicum. Bauh. pin. 149.*

B. Peucedanum majus italicum. *Baeh. pin.* 149.

Habitat in Europa australioris pratis pinguisibus; 2

alpestr.

2. PEUCEDANUM foliolis linearibus ramosis. *Hort. cliff.* 94. *Roy. lugdb.* 98.

Ferula, foliis libanotidis brevioribus, alpestris, umbellis amplissimis. *Bærh. lugdb.* 1. p. 65.

Habitat - - -

Silvus.

3. PEUCEDANUM foliolis pinnatifidis: laciniis oppositis. *Hort. cliff.* 94. *Roy. lugdb.* 98. *Sauv. monsp.* 257.

Seseli pratense. *Baeh. pin.* 162.

Siler alterum pratense. *Dod. pent.* 310.

Habitat in Helvetia, Narbona.

nodosum.

4. PEUCEDANUM foliolis alternatim multifidis. *Hort. cliff.* 94. *Roy. lugdb.* 98.

Silaum (quod Ligusticum creticum, folio foeniculi, caule nodoso. *Tournef. cor.* 23.) *Bærh. lugdb.* 1. p. 51.

Habitat in Creta.

CRITHMUM.

maritimum. 1. CRITHMUM foliolis lanceolatis carnosis. *Hort. cliff.* Hort. upf. 61. *Roy. lugdb.* 98. *Sauv. monsp.* 258.

Crithmum f. Foeniculum maritimum minus. *Baeh. pin.* 283.

Foeniculum marinum f. Empetrum f. Calcifraga. *Lob.* 1c. 392.

Habitat ad oceani Europaei litora 2

rectum 2. CRITHMUM foliolis lateralibus bis trifidis. *Hort. cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 58.

Apium pyrenaicum, thaphix facie. *Tournef. inst.* 305.

Habitat in pyrenæis.

CACHRYS.

Libanotis. 1. CACHRYS foliis pinnatis: foliolis acutis multifidis. *Hort. cliff.* 94. *Roy. lugdb.* 99. *Sauv. monsp.* 105.

Cachrys semine fungoso sulcato plano minore, foliis peucedani angustis. *Morif. hist.* 3. p. 267. f. 9. t. 1. f. 3. 6.

Libanotis ferulæ folio, semine anguloso. *Baeh. pin.* 158.

Habitat in Sicilia, Monspelii. 2

FERULA.

communis. 1. FERULA foliolis linearibus longissimis simplicibus *Hort.*

Hort. cliff. 95. Hort. upf. 61. Roy. lugdb. 99. Sauv. monsp. 257.

Ferula femina plinii. Baub. pin. 148.

Ferula. Doā. pempt. 321.

Habitat in Europa australi. 2

2. FERULA foliolis multipartitis: laciñis linearibus pla-

nis. *Hort. cliff. 95. Roy. lugdb. 99.*

Ferula folio glauco, semine lato oblongo. Baub. bift.

3. p. 45,

Habitat in Sicilia, Italia. 2

3. FERULA foliolis laciniatis: lacinulis tridentatis inæ-

qualibus. *Hort. cliff. 95. Hort. upf. 61. Roy. lugdb.*

99.

Ferula tingitana, folio latissimo lucido. Herm. par. 165.

t. 165.

Habitat in Hispania, Barbaria. 2

4. FERULA foliis pinnatifidis: pinnis linearibus planis *Ferulago.*

trifidis. Hort. cliff. 95. Roy. lugdb. 99.

Ferula latiore folio. Morif. bift. 3. p. 329. f. 9. t. 15. f. 1.

Ferulago latiore folio. Baub. pin. 148.

Habitat in Sicilia.

5. FERULA foliorum pinnis basi nucis, foliolis setaceis. *orientalis.*

Hort. cliff. 95. Roy. lugdb. 100.

Ferula orientalis, folio & facie cachryos. Tournef. cor.

22. itin. 3. p. 239. f. 239.

Habitat in Oriente.

6. FERULA foliorum pinnis utrinque basi auctis: folio-

lis setaceis. Hort. cliff. 95. Roy. lugdb. 100.

Lasserpitium orientale, folio mei, flore luteo. Tournef.

cor. 23.

Habitat in Oriente.

7. FERULA foliolis appendiculatis, umbellis subsessilibus. *nodiflora.*

Ferula foliorum alis utrinque auctis: foliolis linearibus in-

tegerrimis, umbellis terminatricibus subsessilibus. Roy.

lugdb. 100. Hort. upf. 61.

Libanotis ferulæ folio & semine. Baub. pin. 158.

Panax asclepium, ferulæ facie. Lob. ic. 783.

Habitat in Europa australi, Istria. 2

8. FERULA lucida canadensis *Gron. virg. 147. Hort. canadensis.*

upf. 61.

Habitat in Virginia. 2

- Afia foetida*. 9. **FERULA** foliolis alternatim sinuatis obtusis. *Mat. med.* 118.
Afia foetida disguneensis umbellifera ligustico affinis.
Kämpf. amoen. 535. t. 536.
Habitat in Persia. 2

LASERPITIUM.

- latifolium*. 1. **LASERPITIUM** foliolis cordatis inciso-serratis.
Hort. cliff. 96. Fl. suec. 220. Mat. med. 123. Roy. lugdb. 101. Hall. helv. 440.
Libanotis latifolia altera f. vulgatior. Bauh. pin. 157.
Libanotis latifolia major. Bauh. pin. 159.
Seseli ethiopicum herba. Dod. pempt. 312.
Habitat in Europa nemoribus siccis. 2
- trilobum*. 2. **LASERPITIUM** foliolis trilobis incisis.
Libanotis latifolia, aquilegiae folio. Bauh. pin. 157.
prodr. 82.
Angelica foliolis tripartitis; lobis superne incisis obtusis.
Roy. lugdb. 104.
Habitat in Gorgano monte. 2
- gallicum*. 3. **LASERPITIUM** foliolis cuneiformibus furcatis.
Laterpitium foliolis ramulosis sessilibus. Roy. lugab. 101.
Laserpitium foliolis quinquelobis. Hort. cliff. 96.
Laserpitium gallicum. Bauh. pin. 150.
Laserpitium e regione masiliæ allatum. Bauh. hist. 3.
p. 137.
Habitat in Europa australi.
- angustifolii-*
um. 4. **LASERPITIUM** foliolis lanceolatis integerrimis ses-
silibus. Hort. cliff. 96. Roy. lugdb. 102.
*Laserpitium angustifolium majus, segmentis longiori-
 bus & indivisiis. Moris. hist. 3.p. 321. f. 9. t. 19. f. 9.*
*Laserpitium foliis longioribus dilute virentibus conju-
 gatim positis. Pluk. alm. 207. t. 198. f. 4.*
Habitat in Europa australi. 2
- prutenicum*. 5. **LASERPITIUM** foliolis lanceolatis integerrimis: ex-
 timis coalitis. *Hort. cliff. 96. Bauh. hisp. 208.*
Laterpitium foliis radicalibus patentissimis. Roy. lugdb.
103.
Laservitium daucoides prutenicum, viscofo semine.
Breyne. cent. 167. t. 84.
Habitat in Borussia, Liplia. 2

6. LASERPITIUM foliolis lanceolatis integerrimis petiolatis. *Hort. cliff.* 96. *Mat. med.* 124.
Liguticum quod Sefeli officinarum. *Baub. pin.* 162.
Siler montanum. *Moris. hist.* 3. p. 276. f. 9. t. 13. f. 1.
Habitat in Austria, Helvetia, Gallia. ♀
7. LASERPITIUM foliolis oblique cordatis, petiolis hirsutis. *Chironium.*
Panax Heracleum. *Moris. hist.* 3. p. 315. f. 9. t. 17. f. 1.
Panax pastinaca folio. *Baub. pin.* 156.
Panaces peregrinum. *Dod. pempt.* 309.
Habitat Monspelii. ♀
Folia integra, cordata, iubo superiore breviore, crenata, obtusa. Petoli valde hirsuti. Involucrum parvum, tam universale, quam partiale; hinc diversa a Pastinaca Cestina.

HERACLEUM

1. HERACLEUM folioliis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 103. *Sphondylium*
Fl. suec. 231. *Rov. lugdb.* 113.
Sphondylium vulgare hirsutum. *Baub. pin.* 157.
- β. *Sphondylium hirsutum, foliis angustioribus.* *Baub. pin.*
157. predr. 83.
Habitat in Europa nemorosis. ♂
2. HERACLEUM foliis pinnatis: foliolis quinis: intermediis sessilibus, corollulis uniformibus. *Hort. upf.*
*65. **
Habitat in Siberia. ♂
Flores huic viridi-lutei. at prioris alvi.
3. HERACLEUM foliis pinnatis; foliolis quinis: intermediis sessilibus, floribus radiatis. *Hort. upf.* 65. *
Heracleum foliolis palmatis ferratis. *Hort. cliff.* 103.
Rov. lugdb. 112.
Panax Sphondylii folio s. Heracleum. *Baub. pin.* 157.
Habitat in Apenninis, Siberia. ♂
4. HERACLEUM foliis pinnatis utrinque scabris, fibrosis radiatis.
Sphondylium alpinum parvum. *Baub. pin.* 157.
Habitat in Alpibus Austriae.
Planta pedalis. Folia pinnata: foliolis 5, ovato-oblongis, sessilibus, ferratis, utrinque scabris, parum incisis, petiolis inferne membranaceis. Umbella alba, radiata. Differt a 3 parvitate, foliis non sicutus tomentosis, nec extimus coadunatis; foliolis demum magis integris.
5. HE-

- alpinum.* 5. **HEKACLEUM** foliis simplicibus, floribus radiatis.
Sphondylium alpinum glabrum. *Baub. pin.* 157. *prodr.*
83. t. 83.
Sphondylium montanum glabrum, albo flore. *Barr. ie.*
55.
Habitat in Helvetiæ Alpibus.

LIGUSTICUM.

- Levisticum.* 1. **LIGUSTICUM** foliis multiplicibus: foliolis superne incisis. *Hort. cliff.* 97. *Hort. upf.* 62. *Mat. med.* 119. *Roy. Ingdb.* 104. *Sauv. monsp.* 261
Ligusticum vulgare. *Baub. pin.* 157.
Levisticum vulgare. *Morij. hist. 2. p. 275. f. 9. t. 3.*
f. 1.
Habitat in Apenninis Liguriæ. 2

- scoticum.* 2. **LIGUSTICUM** foliis bitemnatis.
Ligusticum foliis duplicato-ternatis. *Hort. cliff.* 97. *Fl. suec.* 232. *Roy. Ingdb.* 104. *Gron. virg.* 31.
Ligusticum humilius scoticum. *Plak. alm.* 217. *t. 96.*
f. 2.
Apium maritimum. *Fl. lapp.* 107.
Seseli maritimum scoticum. *Herm. par.* 227. *t. 227.*
Habitat ad litora Maris in Anglia, Suecia.

- peleponnesia-*
cum. 3. **LIGUSTICUM** foliis multiplicato-pinnatis: foliolis pinnatim incisis. *Hort. cliff.* 97. *Roy. Ingdb.* 104.
Sauv. monsp. 259.
Cicutaria latifolia foetida. *Baub. pin.* 161.
Seseli peleponnesiæ. *Cam. epit.* 514.
Habitat in Peleponesiacis & Rheticis montibus nemorosis. 3

- austriacum.* 4. **LIGUSTICUM** foliis bipinnatis: foliolis confluentibus incisis integerrimis.
Seseli montanum, cicutæ folio, glabrum, *Baub. pin.* 161.
Seseli 1. montanum pannonicum. *Clus. hist. 2 p. 193.*
Habitat in Austriae alpinis.

ANGELICA.

- Archangeli-
 ca.* 1. **ANGELICA** foliorum impari lobato. *Fl. lapp.* 101.
Fl. suec. 233. *Mat. med.* 120. *Hort. cliff.* 97. *Roy. Ingdb.* 103.
Angelica sativa. *Baub. pin.* 155.
Angelica major. *Dod. pempt.* 318.

B. Ar-

2. *Archangelica Clus. hist. 2. p. 295.*
Habitat in Alpibus Lapponiae, ad riuulos. ♂
2. *ANGELICA foliis æqualibus ovato-lanceolatis fer-sylvestris.*
ratis. Hort. cliff. 97. Fl. suec. 234. Mat. med. 121.
Gron. virg. 31. Hall. helv. 444. Roy. lugdb. 103.
Angelica sylvestris major. Baub. pin. 155.
Angelica sylvestris Dod. pempt. 318. Fi lapp. 102.
Habitat in Europæ frigidioris subhumidis sylvaticis. ♀
3. *ANGELICA extimo foliorum pari coadunato: folio atropurpurea-*
terminali petiolato. Roy. lugdb. 103.
Angelica canadensis atropurpurea. Corn. canad. 198. t.
199.
Habitat in Canada.
4. *ANGELICA foliolis æqualibus ovatis inciso-serratis. lucida.*
Hort. cliff. 97. Hort. upf. 62. Roy. lugdb. 103.
Angelica lucida canadensis. Corn. canad. 196. t. 197.
Morif. hist. 3. p. 251. f. 9. t. 3. f. 8.
Habitat in Canada. ♂

SIUM.

1. *SIUM foliis pinnatis, umbella terminali. Hort. cliff. latifolium.*
98. Fl. suec. 235. Roy. lugdb. 104, Hall. helv. 435.
Sium latifolium. Baub. pin. 154.
Sium. Riv. pent. 78.
Habitat in Europæ rivulis ♂ ad ripas paludosas. ♀
2. *SIUM foliis pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus. Hort. nodiflorum.*
cliff. 98. Roy. lugab. 105. Sauv. monsp. 231.
Sium aquaticum procumbens, ad alas floridum. Morif.
hist. 3. p. 283. f. 9. t. 5. f. 3.
Habitat in Europa ad ripas fluviorum.
3. *SIUM foliis pinnatis, floralibus ternatis. Hort. cliff. 98. Sifarium.*
Hort. upf. 62. Roy. lugdb. 104.
Sifarium germanorum. Baub. pin. 155.
Sifarium. Dod. pempt. 681.
Habitat in China. ? ♀
4. *SIUM foliis ferratis pinnatis rameis ternatis. vide Mat. Ninj.*
med. 117. †
Sifarium montanum corænœ, radice non tuberosa.
Kempf. amen. 817. t. 818.
Habitat in China. ♀
5. *SIUM foliis pinnatis, foliolis lanceolatis subintegerrimis. rigidiss.*
Pim-

Pimpinella foliolis lanceolatis glabris acuminatis sæpius integerrimis, rarius serratura notatis. *Gron. virg.* 32.
Oenanthe maxima virginiana, pœoniæ feminæ foliis. *Morij. hist.* 3. p. 288. f. 11. t. 7. f. 1.
Habitat in Virginia. 2

- Falearia.* 6. SIUM foliolis linearibus decurrentibus connat's. *Hort. cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 105. *Sauv. monsp.* 232.
Eryngium arvense, foliis serratis. *Baub. pin.* 386.
Amini perenne repens, *Morij. hist.* 3. p. 294, f. 9. t. 8. f. 1.
Habitat in Flandria, Helvetia, Bohemia, Alsatia, Gallia. 2
- græcum.* 7. SIUM foliis bipinnatis. *Hort. cliff.* 98. * *Roy. lugdb.* 105.
Ligusticum græcum, folio apii, *Tournef. cor.* 23.
Habitat in Græcia,
- siculum.* 8. SIUM foliis radicalibus ternatis, caulinis bipinnatis.
Roy. lugdb. 105.
Myrrhis foliis pastinacæ latae virentibus. *Tournef. cor.* 22.
Daucus, pastinacæ folio. *sicus, Zan. hist.* 78. t. 30.
Habitat in Sicilia.

SISON,

- Amomum.* 1. SISON foliis pinnatis, umbellis erectis. *Roy. lugdb.* 105. *Sauv. monsp.* 232.
Sison foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 98.
Sison quod Amomum officinis nostris. *Baub. pin.* 154.
Petroselinum macedonicum fuchsii. *Dod. pent.* 697.
Habitat in Angliae humectis latoſis.
- segetum.* 2. SISON foliis pinnatis, umbellis cernuis. *Roy. lugdb.* 105. *Hort. upf.* 63.
Sium terrestre, umbellis rarioribus. *Morij. hist.* 3. p. 283. f. 6. t. 5. f. 6.
Habitat in Angliae agris inter segetes. 3
- canadense.* 3. SISON foliis ternatis. *Hort. cliff.* 99. *Gron. virg.* 147.
Roy. lugdb. 106.
Myrrhis canadensis trilobata. *Morij. hist.* 3. p. 301. f. 9. t. 11. f. 4.
Habitat in Ameriaca septentrionali. 2
- Armi.* 4. SISON foliolis caulinis subcapillaribus. *Hort. upf.* 63.
Mat. med. 140.

Am-

Aimmi lacinulī foliorum caulis capillaribus. Hort. cliff.

S9. Roy. lugdb. 96.

Aimmi parvum, foliis fœniculi. Baub. pin. 159.

Aimmi. Cam. epit. 522.

Habitat in Apulia, Ægypto. ⊖

5. *SISON repens, umbellis bifidis. It. scan. 397. * inundatum.*

Sium foliis submersis capillaribus, emersis pinnatis. Roy.

lugdb. 105. Sauv. meth. 232

Sium minimum, foliis innis ferulaceis. Moris. hist. 3. p. 223. s. 9. t. 9. f. 5.

Sium minimum umbellatum, folio varians. Pluk. phyt.

61. f. 3.

Habitat in Europæ inundatis.

6. *SISON foliolis verticillatis capillaribus. verticilla-*

Carum foliolis setaceis verticillatis, radice napiformi. tum.

Sauv. monsp. 168.

Bunium bulbis oblongis. Sauv. monsp. 256.

Oenanthe foliis pinnatis: foliolis lineariter laciniatis. Da-

lib. paris. 90.

Daucus pratensis, millefolii palustris folio. Baub. pin.

150.

Daucus pratensis. Dalech. hist. 718.

Carvi foliis tenuissimis, asphodeli radice. Tournef. inst.

90.

Habitat in Gallia, Pyrenæis. ✎

Involucrum huic univ ersale ♂ partiale.

BUBON.

1. *BUBON foliolis rhombeo-ovatis crenatis, umbellis macedonii-*

numerofissimis. Hort. cliff. 95. Hort. upf. 62. Mat. cum.

med. 133. Roy. lugdb. 100.

Apium macedonicum. Baub. pin. 154.

Petroselinum macedonicum. Lob. ic. 708.

Habitat in Macedonia. ♂

2. *BUBON foliolis rhombis ferratis glabris, umbellis Galbanum.*

paucis. Hort. cliff. 96. Mat. med. 132. Roy. lugdb.

100.

Anisum africanum fruticescens, folio anisi, galbanifer-

rum. Pluk. alm. 31. t. 12. f. 2.

Ferula africana galbanifera, folio & facie ligustici.

Herm. par. 163. t. 163,

Habitat in Æthiopia. ♂

- gummiferae.* 3. BUBON foliolis glabris: inferioribus rhoibeis serratis; superioribus pinnatifidis tridentatis. *Roy. lugdb.* 100.
Ferula africana galbanifera, folio myrrhidis. Comm. hort.
 2. *p. 115. t. 58.*
Habitat in Æthiopia. ♀
- rigidis.* 4. BUBON foliolis linearibus *Hort. cliff. 95. Roy lugdb.*
 100.
Ferula durior s. rigidis & brevissimis foliis. Bocc muj.
 2. *p. 84. t. 76. Barr. rar. 61. t. 77.*
Habitat in Sicilia. ♀

CUMINUM.

- Cuminum.* 1. CUMINUM. *Mat. med. 139.*
Cuminum semine longiore. Baub. pin. 146.
Cuminum sativum. Cam. epit. 518.
Habitat in Ægypto, Æthiopia. ☽

OENANTHE.

- fistulosa.* 1. OENANTHE stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis.
Oenanthe foliis caulinis fistulosis teretibus. Hort. cliff.
 99. *Fl. suec. 236. Roy. lugdb. 108. Hall. helv. 432.*
Oenanthe aquatica. Baub. pin. 162. It. scan. 243.
Oenanthe. Riv. pent. 66.
Habitat in Europæ fossis, paludibus. ♀
- crocata.* 2. OENANTHE foliis omnibus multifidis obtusis subæqualibus. *Hort. cliff. 99. Fl. suec. 237. Roy. lugdb. 107.*
Oenanthe chærophylli foliis. Baub. pin. 162.
Oenanthe cicutæ facie, succo viroso crocante. Lob.
adv. 326. Aet. angl. 1747: n. 480. p. 235. t. 3.
Habitat in Europæ paludibus. ♀
- prolifera.* 3. OENANTHE umbellularum pedunculis marginalibus longioribus ramosis masculis. *Hort. upf. 63.*
Oenanthe flosculis disci sessilibus radii pedunculo ramoso elevatis. Vir. cliff. 24. Roy. lugdb. 108.
Oenanthe flosculis radiantibus umbellarum proliferis.
Hort. cliff. 99.
Oenanthe prolifera apula. Baub. pin. 163. Moris. hist.
 3. *p. 289. f. 9. t. 7. f. 5.*
Habitat in Sicilia, Apulia. ♀

* OENANTHE fructibus globosis. *Hort. cliff.* 99. *globiflora.*
Roy. lugdb. 108.

Oenanthe lusitanica, semine crassiore globoso. *Tournef.*
infl. 313.

Habitat in Lusitania.

5. OENANTHE foliolis radicalibus ovatis incisis, cau- *pimpinelloides.*
 limis integris linearibus longissimis simplicioribus. *des.*
Hort. cliff. 99. *Roy. lugdb.* 108. *Sauv. monsp.* 259.

Oenanthe apii folio. *Baub. pin.* 162.

Oenanthe paltinacæ sylvestris folio, semine atriplicis.
Baub. pin. 162.

Oenanthe aquatica pimpinellæ saxifragæ divisura. *Pluk.*
alm. 268. t. 49. f. 4.

Habitat Monspelii & in Europa australi.

PHELLANDRIUM.

1. PHELLANDRIUM foliorum ramificationibus di- *aquaticum.*
 varicatis.

Phellandrium. *Hort. cliff.* 100. *Fl. suec.* 238. *Roy.*
lugdb. 108. *Dod. pent.* 591

Cicutaria palustris tenuifolia. *Baub. pin.* 161.

Habitat in Europæ fossis. ♂

2. PHELLANDRIUM caule subnudo, foliis pinnatis. *Mutellina.*
 Meum alpinum, umbella purpurascente. *Baub. pin.* 148.

Mutellina. *Baub. hist.* 3. p. 66. *Cam. epit.* 8.

Habitat in Helvetia. ♀

CICUTA.

1. CICUTA umbellis folio oppositis, petiolis marginatis *prosa.*
 obtusis.

Cicuta. *Hort. cliff.* 100. *Mat. med.* 129. *Fl. suec.* 239.
Roy. lugdb. 109.

Cicuta aquatica. *Fl. lapp.* 103.

Sium erucæ folio. *Baub. pin.* 154.

Habitat in paludibus Europæ sterilibus. ♀

2. CICUTA ramis bulbiferis.

Ammi foliorum lacinulis capillaribus, caule angulato. *bulbifera.*
Grot. virg. 31.

Umbellifera aquatica, foliis in minutissima & plane capil-
 laria segmenta divisis. *Raj suppl.* 260.

Habitat in Virginia, Canada.

- mænata.* 3. CICUTA foliorum ferraturis mucronatis, petiolis inmembranaceis apice bilobis.
Ægopodium foliolis lanceolatis acuminatis ferratis. *Gren.* *virg.* 32.
Angelica caribæarum clatior, olusatri folio, flore albo, feminibus luteis striatis, cumini odore & sapore. *Plak.* *alm.* 31. *t.* 76. *f.* 1.
Angelica virginiana, foliis acutioribus, semine striato minore, cumini sapore & odore. *Morif.* *hist.* 3. *p.* 281.
Habitat in Virginie aquatis.

ÆTHUSA:

- Cynapium.* 1. ÆTHUSA. *Hort. cliff.* 100. *Fl. succ.* 240. *Roy.* *lugdb.* 109. *Hail. helv.* 433.
Cicuta minor, petroselino similis. *Bauh. pin.* 160.
Cicutaria satua. *Lob. ii.* 280.
Habitat inter Europæ olera. ☽

CORIANDRUM.

- sativum.* 1. CORIANDRUM fructibus globosis. *Hort. cliff.* 100.
Hort. upf. 63. *Mat. med.* 135. *Roy. lugdb.* 109. *Sauv.* *monsp.* 260.
Coriandrum majus. *Bauh. pin.* 158.
Coriandrum. *Cam. epit.* 523.
Habitat in Italiæ agris. ☽
- testiculatum.* 2. CORIANDRUM fructibus didymis. *Hort. cliff.* 100.
Roy. lugdb. 109. *Sauv.* *monsp.* 260.
Coriandrum minus testiculatum. *Bauh. pin.* 158. *Plin.* *alm.* 120. *t.* 169. *f.* 2.
Coriandrum minus odorum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 91.
Habitat in Europæ australis agris. ☽

SCANDIX.

- odorata.* 1. SCANDIX seminibus sulcatis angulatis. *Hort. cliff.* 101. *Hort. upf.* 64. *Roy. lugdb.* 111. *umbellarum* disco masculo.
Myrrhis major, *Cicutaria odorata*. *Bauh. pin.* 160.
Myrrhis. *Dod. pempt.* 701.
Habitat in alpibus Alvarniæ. ♀
- Pecten.* ♀ 2. SCANDIX seminibus levibus rostro longissimo.
Hort. cliff. 101. *Hort. upf.* 64. *Roy. lugdb.* 111.
Scandix, semine rostrato, vulgaris. *Bauh. pin.* 152.

Pesten veneris. *Cam. epir.* 302.

Habitat inter Germaniam & Europam australioris segetes. ◎

3. SCANDIX seminibus nitidis ovato-subulatis. *Hort. Cerefolium.*
cliff. 110. Fl. suec. 242. Mat. med. 137. Gron. virg.
32. Roy. lugd. 111.

Chærophillum seminibus lœvibus, umbellis ad nodos sessilibus. *Baehm. lips. 492.*

Chærophillum sativum. *Baub. pin. 152.*

Chærefolium. *Dod. pempr. 700.*

Habitat in apris & arvis Europæ australioris. ◎

SCANDIX seminibus ovatis hispidis, corollis unifloris, formibus, caule lœvi.

Scandix seminibus hispidis. *Hort. cliff. tot. Fl. suec.*
241. Roy. lugd. 111.

Myrrhis sylvestris, seminibus asperis. *Baub. pin. 160.*

Myrrhis sylvestris equicolorum. *Column. ephr. I. p.*
110. t. 112.

Habitat in Europæ aggeribus terrenis. ◎

5. SCANDIX seminibus subulatis hispidis, floribus radiatis, caulibus lœvibus

Scandix seminibus rostratis patulis pedunculo brevioribus. *Savv. monsp. 260.*

Scandix cretica minor. *Baub. pin. 152.*

Scandix semine rostrato, italica. *Baub. pradr. 78.*

Anisomorathrum. *Col. ephr. I. p. 89. t. 90.*

Habitat in G. Narbonensi; Italia, Creta. ◎

6. SCANDIX seminibus subcylindricis hispidis, caule nodosa hispido, geniculis tamidis.

Chærophillum articulatum tumidis, umbella universali trifida. *Hort. cliff. 102. Roy. lugd. 112.*

Cerefolium annuum nodosum, semine aspero majore.
Morif. hyst. 3. p. 303. f. 9. t. 10. f. 4.

Myrrhis nodosa annua, semine aspero. *Morif. blæf. 288.*

Habitat in Sicilia. ◎

7. SCANDIX seminibus pedunculo villoso brevioribus. *grandiflora.*
Roy. lugd. 111.

Scandix orientalis, flore maximo. *Tournef. cor. 23*

Habitat in Oriente.

8. SCANDIX seminibus nitidis ovato-subulatis, foliis prochumbens decompositis. *Gron. virg. 147.*

*Cerefolium virginianum procumbens, fumariæ foliis.
Moris. hist. 3. p. 303. f. 11. t. 11. f. ult.
Habitat in Virginia.*

CHÆROPHYLLUM.

* *Floribus omnibus hermaphroditis.*

sylvestre. 1. CHÆROPHYLLUM flosculis omnibus fertilibus,
caule æquali.

Chærophillum feminibus lævibus nitidis, petiolis ra-
meis æqualibus. *Hort. cliff. 101. Fl. succ. 243. Roy.
lugdb. 112. Mat. med. 143.*

Chærophillum sylvestre perenne, cicutæ folio. *Tournet.
inst. 114. Fl. lapp. 104.*

Myrrhis sylvestris, feminibus lævibus. *Baub. pin. 160.
Cicutaria vulgaris. Dod. pent. 701.*

Habitat in Europæ pomariis & cultis. 2

bulbosum. 2. CHÆROPHYLLUM caule lævi: geniculis tumi-
dis.

Chærophillum foliis supradecompositis: caulinis arti-
culis lævibus superne incrassatis. *Hort. upf. 64.*

Chærophillum radice turbinata carnosa. *Hort. cliff.
102. Roy. lugdb. 112.*

Cicutaria bulbosa. *Baub. pin. 161.*

Myrrhis fastens. *Riv. pent. 49,*

Habitat in Alsatia, Hungaria, Helvetia. 3

* *Floribus disci masculis.*

renulum. 3. CHÆROPHYLLUM caule scabro: geniculis tumi-
dis.

Chærophillum caule maculato: geniculis tumidis.

*Hort. cliff. 102. Fl. succ. 244. Roy. lugdb. 112. Gort.
gelr. 59.*

Chærophillum sylvestre. *Baub. pin. 152.*

Myrrhis annua vulgaris, caule fusco. *Moris. hist. 3. p.
302. f. 9. t. 10. f. 7.*

Habitat ad Europæ arvos, vias & sepes. 3

kirfutum. 4. CHÆROPHYLLUM caule æquali, foliolis incisis
acutis.

Chærophillum foliolis dissectis, petiolis ramiserris um-
versalibus utrinque membrana auctis. *Hort. cliff. 103.
Roy. lugdb. 111. Sauv. monsp. 262.*

Cerefolium latifolium hirsutum album & rubrum. *Moris.
hist. 3. p. 304. f. 9. t. 10. f. 6.*

Cicutaria palustris latifolia alba. Baub. pin. 161.
Cicutaria palustris latifolia rubra. Baub. pin. 161.
Myrrhis perennis alba minor, foliis hirsutis, feminis aureo.

M. Hall. jen. 282. t. 5.

Myrrhis broccenbergensis. Baub. pin. 160.
Seseli montanum, cicutæ folio, subhirsutum! Baub. pin.
 161. prodr. 85.

Habitat in Alpibus Helvetiæ. 2

5. CHÆROPHYLLUM caule æquali, foliolis ferratis *aromaticum:*
 integris.

Chærophyllo foliolis lanceolato-ovatis ferratis inte-
gris. Hort. cliff. 102. Roy. lugdb. 112.

Cerefolium, rugoso angelicæ folio, aromaticum. Bocc.
 mus. 2. p. 29. t. 19.

Angelica sylvestris hirsuta inodora. Baub. pin. 156.
 prodr. 82.

Habitat in Lusatia, Misnia. 2

6. CHÆROPHYLLUM fruticosum.

nrborescens.

Cicuta arbor virginiana. Pluk. maut. 49.

Cicutaria arbor virginiana. Raj. suppl. 257.

Habitat. in Virginia. 3

Caulis frutescens. Folia chærophylli, ampla, supradecimpu-
sita, pinnis patentissimis, lœvia, inciso-serrata. Umbel-
læ tenuis alba involucro partiali, folculi ovales fertiles.

SESELI.

1. SESELI caule declinato; umbellis ante florescentiam *Pimpinelloi-*
 nutantibus. *des.*

Habitat in Europa australiore. 2

Radix peregrina, Folia pinnata, pinnis multisidatis segmen-
tis alternis: bæ etiam alternatum seet e, segmentis li-
nearibus, planis, extorsam versis. Caulis pedalis, ter-
res, ante florescentiam decumbens, sub florescentia ser-
ne erectus solito uno altero: petiolo membranaceo,
spatuliformi, oblongo; quo pedunculus simplex. Um-
*bellæ ante florescentiam nutantes ut in *Pimpinella**
saxifraga: involuero universalis nullo; partiali linearis
angusto, longitudine fere umbellulæ. Semina ovalia
striis 3. elevatis.

2. SESELI petiolis ramiferis membranaceis oblongis inte- *montanum.*
 gris, foliis caulinis angustissimis. Hort. cliff. 102. Roy.
 lugdb. 112. Dalib. paris. 92. Sauv. monsp. 256.

Meun latifolium adulterinum. Baub. pin. 148.

Saxifraga montana minor italica, foliis in breviores partes divisis. *Moris. hist.* 3. p. 272. s. 9. t. 2. f. 1.
Habitat in Gallia, Italiae collibus. 2

- Ilaicum.* 3. *SESELI* petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris: foliolis singularibus binatisque. *Guett. stamp.* 64. *Fœniculum sylvestre*, glauco folio. *Tournef. inst.* 311. *Daucus*, glauco folio, similis fœniculo tortuoso. *Baub. hist.* 3. p. 16.
Saxifraga montana minor glauca & rigidior. *Moris. hist.* 3. p. 273.
Habitat in Gallia. 2
Involucorum foliola sèpini coadunata sunt.
- Elatia..* 4. *SESELI* petiolis rameis membranaceis oblongis integris, foliolis binatis ternatisque. *Guett. stamp.* 1. p. 64. *Dalib. paris.* 92.
Fœniculum sylvestre elatius, ferulæ folio longiore. *Tournef. inst.* 311. *Vaill. paris.* 54. *Sauv. monsp.* 256. *Apium montanum*, folio tenuiore. *Baub. pin.* 153.
Habitat in Gallia. 2
- annuum.* 5. *SESELI* petiolis rameis membranaceis ventricosis ex marginatis. *Hort. cliff.* 103. *Roy. Ingdb.* 112. *Sauv. monsp.* 256.
Fœniculum sylvestre annum, tragoselini odore, umbella alba. *Vaill. paris.* 54. t. 9. f. 4.
Libanotis tenuifolia germanica. *Baub. pin.* 158. *Burs.*
Habitat in Pannonia, Gallia. ①
- Ammonides.* 6. *SESELI* petiolis membra destitutis. *Roy. Ingdb.* 112.
Fœniculum lusitanicum minimum acre. *Tournef. inst.* 312.
Ammoides. *Baub. pin.* 159.
Habitat in Lusitania. ②
- corticofolia.* 7. *SESELI* caule alto rigido, foliolis linearibus fasciculatis. *Oenanthe triata rigida.* *Hort. cliff.* 99. *Sauv. monsp.* 257.
Seseli massiliense, fœniculi folio. *Baub. pin.* 161.
Fœniculum tortuosum. *Baub. hist.* 3. p. 16.
Habitat in Europa australi. 2
Caulis rigans, quasi lignosus, foliis multoties altior. *Foliola partialia non duo tantum opposita, sed sèpini quatuor interioribus minoribus*, unde fasciculata.
- Corticofolia.* 8. *SESELI* foliis bipinnatis sublinearibus, petiolis basi membranaceis, scđinibus ovalibus.

Carvi-

Carvifolia. *Baub. pin.* 158. *Baub. hist.* 3. p. 171. *Vaill.*
paris. t. 5. f. 2.

Angelica tenuifolia. *Riv. pent.* 18.

Habitat in Helvetia, Germania, Auglia. 2

9. SESELI foliis duplicato-pinnatis; foliolis incisis acutis, involucris setaceis umbellula longioribus. *pyrenaeum.*

Carvi alpinum. *Baub. pin.* 158. *prodr.* 84. *Burs.* VIII: 36.

Habitat in Pyrenæis.

Caulis pedalis, teres, striatus. *Folia radicalia duplicato-pinnata*, laxa, parum divaricata: *Foliolis pinnatis*, longitudinaliter incisis, acuminatis, cuneiformibus; *folium in caule sæpe unicum*, ex cuius ala exit ramus; *pétioles radicales simplices*; *caulinus lato-membranaceus*. *Umbella universalis nuda*, oblonga, *pedunculis circiter octo*; *partialis conserta*, *brevissima*, *unifloris*: *involucro polyphylo*, *setaceo*, *longiore umbellalis*.

10. SESELI caule filiformi divaricato, foliis duplicato-*saxifragum.*
ternatis linearibus, *umbellis subsexfidis*.

Pimpinella saxifraga tenuifolia. *Baub. pin.* 160. *prodr.*
 84. *Burs.* VIII: 5.

Habitat ad Lacum Genevensem.

Planta pedalis. *Caulis filiformis*, *ramosus & subramosus*, *divaricatus*, *teres*, *tenuis*. *Folia parva*, *duplicato-ternata*, *linearia*, *raro lobata*. *Umbellæ nudæ*, *pedunculis sex sæpius*; *umbellulæ involucratae flosculis sex ad octo*.

THAPSIA.

1. THAPSIA foliolis dentatis basi coadunatis. *Hort. cliff.* *villosa*
 105. *Roy. lugdb.* 113.

Thapsia lacrifolia villosa. *Baub. pin.* 148.

Thapsia. 1. *Clus. hist.* 2. p. 192.

Habitat in Hispania, Lusitania. 2

2. THAPSIA foliolis multifidis basi angustatis. *Hort. portuana*
 cliff. 105. *Roy. lugdb.* 113.

Thapsia carotæ effigie. *Baub. hist.* 3. p. 187. *Moris*
hist. 2. p. 319. f. 9. t. 18. f. 7.

Habitat in Hispania. 2

3. THAPSIA foliolis multifidis sciaceis. *Hort. cliff.* 106. *Aegleum*.
Roy. lugdb. 113.

Thapsia tenuifolia, petiolis radiatis. *Moris. hist.* 3. p. 319 f. 9. t. 18. f. 9.

Panax Asclepium, semine folioso. *Baeh. pin.* 158.

Panax Asclepium apulum. *Column. ecphr.* 1. p. 87. t. 86.
Habitat in Apulia.

trifoliata.

4. *THAPSIA* foliis ternatis ovatis.

Sium folio infimo cordato, caulinis ternatis; omnibus crenatis. *Gran. virg.* 31.

Habitat in Virginia.

Semina singula gaudent alis 5, longitudinalibus, membranaceis, & involucra nulla sunt uti in precedente, cum qua genere coniungo, quamvis facit diversa.

PASTINACA.

sativa.

1. *PASTINACA* foliis simpliciter pinnatis. *Hort. cliff.* 105. *Hort. upf.* 66. *Mat. med.* 130. *Roy. lugdb.* 114. *Gort. gelr.* 63.

Pastinaca sylvestris latifolia. *Baeh. pin.* 155.

2. *Pastinaca sativa latifolia*. *Baeh. pin.* 155.

Habitat in Europæ australioris ruderatis & pascois.

Omphax.

3. *PASTINACA* foliis decompositis pinnatis. *Hort. cliff.* 105. *Mat. med.* 131. *Roy. lugdb.* 114.

Panax Coccinum. *Baeh. pin.* 156.

Panax Heracleum. *Moris. hist.* 3. p. 315. f. 9. t. 17. f. 2.

Habitat in Italia, Sicilia,

SMYRNIUM,

perfoliatum: 1. *SMYRNIUM* foliis caulinis simplicibus amplexicaulis. *Hort. cliff.* 104. *Hort. upf.* 66. *Roy. lugdb.* 114.

Smyrnium peregrinum f. rotundo f. oblongo folio. *Baeh. pin.* 158. *prod.* 82.

Smyrnium amani montis. *Dod. pentpt.* 698.

Habitat in Italia, Creta. ♂

Olfatrum.

2. *SMYRNIUM* foliis caulinis ternatis petiolatis serratis. *Hort. cliff.* 105. *Roy. lugdb.* 114. *Savv. monsp.* 262.

Hippocelinum theophraiti f. *Smyrnium dioscoridi*. *Baeh. pin.* 154.

Hippocelinum. *Dod. pentpt.* 698.

Habitat in Scotia, Wallia, Gallia. ♂

austrum.

3. *SMYRNIUM* foliis pinnatis, posticis ternatis, florilis omnibus fertilibus.

Ego

Ægopodium foliis caulinis summis novenis. *Hort. cliff.* 107. *Roy. lugdb.* 115.

Angelica acadiensis, flore luteo. *Dod. aet.* 55. *Raj. hist.* 1368.

Angelica humilior & minor, flore luteo. *Morif. hist.* 3. p. 281.

3. *Smyrnium* foliis caulinis decompositis acuminatis. *Gron. virg.* 148.

Smyrnium aureum, lobis ternis quinque, marianum. *Pluk. mant.* 173.

Habitat in America boreali.

4. **SMYRNIUM** foliis caulinis duplicato ternatis integrerimis, *foliis* *caulinis*.

Smyrnium foliis caulinis ternatis petiolatis: foliolis oblongo-ovatis integerrimis. *Gron. virg.* 148.

Habitat in Virginia.

ANETHUM.

1. **ANETHUM** fructibus compressis. *Hort. cliff.* 106. *graveolens.* *Hort. upf.* 66. *Mat. med.* 146. *Roy. lugdb.* 116.

Anethum hortense. *Bauh. pin.* 147.

Habitat inter Lusitanæ & Hispaniæ segetes. ☽

2. **ANETHUM** fructibus ovatis. *Hort. cliff.* 106. *Hort. berenicum.* *upf.* 66. *Mat. med.* 147. *Roy. lugdb.* 116.

Fœniculum dulce. *Bauh. pin.* 147.

Fœniculum vulgare germanicum. *Bauh. pin.* 147.

Fœniculum sylvestre. *Bauh. pin.* 147.

Habitat in Narbonæ, Aremoriæ, Maderæ rupibus cretaceis. ♂

CARUM.

1. **CARUM**. *Dod. pempt.* 299. *Fl. lapp.* 105. *Fl. suec.* *Carvi.* 245. *Mat. med.* 138. *Hort. cliff.* 106. *Roy. lugdb.* 116. *Hall. helv.* 428.

Carum pratense, *Carvi officinarum*. *Bauh. pin.* 153.

Habitat in Europæ borealis pratis. ♂

PIMPINELLA.

1. **PIMPINELLA** foliis pinnatibus: foliolis radicalibus *saxifraga*. subrotundis; summis linearibus.

Pimpinella foliolis subrotundis. *Fl. suec.* 246. *Mat. med.* 125.

Pimpinella. *Hort. cliff.* 106. *Roy. lugdb.* 115.

- Pimpinella saxifraga minor.* Baub. pin. 160.
β. *Pimpinella saxifraga major altera.* Baub. pin. 159.
major. *γ.* *Pimpinella saxifraga major, umbella candida.* Baub. pin. 159.
δ. *Pimpinella saxifraga major, umbella rubente.* Baub. pin. 159.
glauca. *Et habitat in Europæ pastuis fiscis.* *♀*
Has inter ♂ — ♂ limites non reperi; β enim sata in folio latieri praduxit γ.
- 2.* **PIMPINELLA** foliis supradecompositis, caule angulato ramosissimo
Tragofelinum foliis tenuissime divisis: pinnulis ultimis tripartitis. Hall. helv. 430. *
- Seseli petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris foliolis binatis ternatisque. Guett. stamp. 1. p. 34.
Habitat in Helvetia, Gallia.
Differt a Daucō montano multifido brevique folio C.
B. involucro partiali nullo, ceterum sat similis.
- peregrin.* *3* **PIMPINELLA** foliis radicalibus pinnatis crenatis, summis cuneiformibus incisis.
Anisum foliis radicalibus pinnatis. Hort. cliff. 107
Hort. upf. 67. Roy. lugdb. 115. Sauv. meth. 231.
Apium peregrinum, foliis subrotundis Baub. pin. 153
Daucus tertius dioicoridis. Column. ecphr. 1. p. 108
t. 109.
Habitat in Italiæ pastuis sterilibus. *♀*
- Auriculus* *4.* **PIMPINELLA** foliis radicalibus trifidis incisis.
Anisum foliis radicalibus simplicibus. Hort. cliff. 107
Hort. upf. 67. Mat. med. 141. Roy. lugdb. 116.
Anisum herbarii. Baub. pin. 159.
Anisum vulgare. Clus. hist. 2. p. 202.
Habitat in Ægypto. *♀*
- APIUM.**
- Petroselinum* *1.* **APIUM** foliolis caulinis linearibus. Hort. cliff. 108
Hort. upf. 67. Mat. med. 127. Roy. lugdb. 116.
Apium hortense Petroselinum vulgo. Baub. pin. 153
Apium hortense. Dod. penipt. 694.
β *Apium vel Petroselinum crispum.* Baub. pin. 153
Habitat in Sardinia juxta securigines ♂
- gracilem.* *2.* **APIUM** foliolis caulinis cuneiformibus. Hort. cliff. 107. Fl. suec. 148. Mat. med. 128. Roy. lugdb. 115
Apium palustre f. *Apium officinarum.* Baub. pin. 154
β. Api-

6. Apium dulce, Celleri italorum. *Tournef. inst.* 305.
Habitat in Europa humectis, præsertim maritimis. ♂

ÆGOPODIUM.

1. ÆGOPODIUM foliis caulinis summis ternatis. *Hort. Podagraria.*
cliff. 107. Fl. suec. 247. Roy. lugdb. 115.
Angelica tylvestris minor. f. erratica. Baub. pin. 155.
Herba gerardi. Dod. pempt. 320.
Habitat in Europa ad sepes inque pomariis. ♀.

TRIGYNIA.

RHUS.

1. RHUS foliis pinnatis obtusifuscule ferratis ovalibus sub-
Coriaria.
tus villosis. Mat. med. 150.
Rhus foliis pinnatis ferratis. Hort. cliff. 110. Hort. upf.
68. Roy. lugdb. 243. Sauv. monsp. 227.
Rhus folio ulmi. Baub. pin. 414.
Rhus coriaria Dod. pempt. 779.
Habitat in Europa australi. ♂
2. RHUS foliis pinnatis ovatis acuminatis ferratis, sub-
lanceolatis.
tus tomentosis.
Habitat in Java. Osbeck.
3. RHUS foliis pinnatis ferratis lanceolatis utrinque nu-
glabra.
dis.
Rhus foliis pinnatis ferratis. Gron. virg. 148. Coid.
noveb. 63.
Rhus virginicum, panicula sparsa, ramis patulis glabris
Dill. elth. 323. t. 243. f. 314.
Rhus angustifolium. Baub. pin. 414.
Sumach angustifolium. Baub. prodr. 158. Burf. XXII.
77.
Habitat in America septentrionali.
4. RHUS foliis pinnatis integerrimis, petiolo integra. *Mat. med.* 151.
Rhus foliis pinnatis integerrimis. Hort. cliff. 110. Hort.
upf. 68. Gron. virg. 148. Roy. lugdb. 244. Coid
noveb. 64.
Toxicodendron foliis alatis, fructu rhomboide Dill
elth. 390. t. 292. f. 377.
Arbor americana, alatis foliis, succo laetico venenata
Plak. alm. 45. t. 145. f. 1.

Arbor Poyson-wood-Tree. Act. angl. n. 367. p. 145.
Sitz. Sitz.-diss. K. empf. amon. 791. t. 792.
Habitat in America septentrionali, Iaponia. ♂

Cepalium. 5. RHUS foliis pinnatis integerrimis, petiolo membranaceo articulato. *Roy. lugdb. 24. Mat. med. 152.*
Rhus elatior, foliis impari pinnatis, petiolis membranaceis articulatis. Gron. virg. 149.

Rhus obsoniorum sinuolis americana, gummi candidum fundens non ferrata, foliorum rachi medio alata. Plak. alm. 318. t. 56. f. 1.
Habitat in America septentrionali. ♂

radicans. 6. RHUS foliis ternatis: foliolis petiolatis ovatis nudis integrimis, caule radicante. *Hort. cliff. 110. Gron virg. 33. Roy. lugdb. 244.*
Hedera trifolia canadensis. Corn. canad. 96. t. 97. Barr. ic. 228.

β. Toxicodendron amplexicaule, foliis minoribus glabris. *Dill. elib. 390.*

γ. Toxicodendron rectum, foliis minoribus glabris. *Dill elib. 389. t. 291. f. 375.*
Habitat in Virginia, Canada. ♂

Toxicodendr. 7. RHUS foliis ternatis: foliolis petiolatis angulatis pubescentibus.

Rhus foliis ternatis: foliolis petiolatis ovatis acutis pubescentibus: nunc integris, nunc sinuatis. Gron. virg. 149.

Toxicodendron triphyllum, folio sinuato pubescente. Tournef. inst. 611.

Arbor trifolia venenata virginiana, folio hirsuto. Raj. hist. 1799.

Habitat in Virginia, Canada. ♂

wimontosum. 8. RHUS foliis ternatis: foliolis subpetiolatis rhomboidibus angulatis subitus tomentosis.

Rhus foliis ternatis: foliolis ovatis utrinque acutis dentatis: lateralibus petiolatis. Hort. cliff. 171.

Rhus foliis ternatis: foliolis petiolatis ovatis acutis dentatis. Vir. cliff. 25. Roy. lugdb. 244.

Rhus africanum trifoliatum majus, foliis obtusis & incisis hirsutis pubescentibus. Plak. alm. 319. t. 219 f. 7.

Vitex trifolia minor indica ferrata. Comm. hort. 1. p. 179. t. 92.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♂

- 9 RHUS foliis ternatis: foliolis ovatis acuminatis serra-*Cobbe.*
tis, pedunculis tomentosis.
Rhois trifoliatae frutex salwaeensis, floribus juliformi-
bus. *Pet. mus.* 678. *Raj. dendr.* 58.
Kobbæ. Fl. zeyl. 441.
Habitat in Zeylona.
10. RHUS foliis ternatis: foliolis petiolatis linear-lanceo-*angustifolia-*
latis integerrimis subtus tomentosis. *Hort. cliff.* III. *"*.
Roy. lugdb. 244.
Rhus africanum trifoliatum majus, foliis subtos argen-
teis acutis & margine incisis. *Pluk. alm.* 319. t. 219.
f. 6.
Rhus fructicosum, foliis trifidis linearibus acuminatis.
Burm. afric. 251. t. 91. f. 1.
Habitat in Æthiopia. b
11. RHUS foliis ternatis: foliolis sessilibus cuneiformi-*Incidem.*
bus levibus. *Vir. cliff.* 25. *Hort. cliff.* III. *Hort.*
upf. 68. *Roy. lugdb.* 243.
Rhus africanum trifoliatum minus glabrum, splendente
folio subrotundo integro. *Pluk. alm.* 319. t. 219. f. 9.
Rhus arboreum trifoliatum latifolium, *Burm. afr.* 252.
t. 91. f. 2.
Vitex trifolia minor iudica rotundifolia. *Comm. hort.* 2.
p. 181. f. 93.
Habitat ad Cap. b. Spei. b
12. RHUS foliis simplicibus obovatis. *Cotinus.*
Cotinus foliis obverse ovatis. *Hort. cliff.* III. *Roy*
lugdb. 243.
Cotinus coriaria. *Dod. pent.* 780.
Cocconilea f. Coccigria. *Bauh. pin.* 415.
*Habitat in Lombardia Italiae & ad radices Apenni-
norum.* b

VIBURNUM.

1. VIBURNUM foliis integerrimis ovatis: ramificatio-*Tinus.*
nibus iubus villoso-glandulosis.
Viburnum foliis ovatis integerrimis. *Hort. upf.* 69. *Sauv.*
monsp. 136.
Tinus. *Hort. cliff.* 109.
Tinus 1. 2. 3. *Clus. hist.* 1. p. 49.
Laurus Tinus f. sylvestris: trium generum. *Bauh. hist.*
3. p. 418.
Laurus sylvestris. corni seminæ foliis subhirsutis. *Bauh.*
pin. 261. *β. Lau-*

- G.* *Laurus sylvestris*, foliis venosis. *Baup. pin.* 463.
γ *Laurus sylvestris*, folio minore. *Baup. pin.* 461.
Habitat in Lusitania, Hispania, Italia. ♂
- nudum.* 2. *VIBURNUM* foliis integerimis lanceolato-ovatis.
Tinus foliis ovatis in petiolos terminatis integerimis
Gron. virg. 33.
Habitat in Virginia. ♂
Cyme in hac nuda, in praecedenti involucrata.
- prunifolium.* 3. *VIBURNUM* foliis subrotundis crenato ferratis gha-
bris. *Gron. virg.* 33.
Viburnum canadense glabrum. *Vaill. act.* 1722. p. 200.
Mespilus prunifolia *virginiana* non spinosa, fructu ni-
gricante. *Pluk. alm.* 249. t. 46. f. 2.
Habitat in Virginia, Canada. ♂
- dentatum.* 4. *VIBURNUM* foliis ovatis dentato-ferratis ovatis.
Habitat in Virginia. ♂
- Lantana.* 5. *VIBURNUM* foliis cordatis ferratis venosis subtus
tomentosis. *Vir. cliff.* 25. *Hort. upf.* 68. *Roy. lugdb.*
242. *Sauv. monsp.* 136.
Viburnum. *Hort. cliff.* 107.
Viburnum vulgo. *Baup. pin.* 249.
Lantana. *Dod. pempt.* 701.
Habitat in Europæ australioris sepibus argillosis. ♂
- acerifolium.* 6. *VIBURNUM* foliis lobatis, petiolis lævibus.
Opulus. *Gron. virg.* 149.
Habitat in Virginia. ♂
- Opulus* 7. *VIBURNUM* foliis lobatis, petiolis glandulosis.
Opulus. *Hort. cliff.* 109. *Fl. suec.* 249. *Roy. lugdb.*
243.
Sambucus aquatica, flore simplici. *Baup. pin.* 456.
Sambucus palustris. *Dod. pempt.* 846.
- cotulum.* 8. *Sambucus aquatica*, flore globoso pleno. *Baup. pin.* 455.
Habitat in Europæ pratis humidiusculis. ♂
- Lentago.* 8. *VIEURNUM* foliis ferrulatis ovatis acuminatis gha-
bris, petiolis glandulosis.
Habitat in Canada. *Kalm.* ♂
Folia crassa Tini, glabra, denticulis minimis ferrulata.
petiolis longitudinaliter glandulosis.

CASSINE.

- Peraqua.* 1. *CASSINE* foliis oblongis ferratis.

Cas

Cassine. *Hort. cliff.* 72. *Mat. med.* 153. *Roy. Lugd^b* 242.

Phillyrea capensis, folio celastrri. *Dill. elth.* 315. t. 236 f. 305.

Cerasus Sebestenæ domesticæ foliis aliquatenus accedens Pluk. alm. 94. t. 97. f. 8.

Frutex æthiopicus, alaterni foliis. *Seb. thes.* 1. p. 46. t. 29. f. 5.

Habitat in Æthiopia, Carolina. 5

1. CASSINE foliis subovatis integerrimis.

Maurocenia. Hort. cliff. 108.

Frangula sempervirens, folio rigido subrotundo. *Dill. elth.* 146. t. 121. f. 147.

Cerasus capensis, fructu rubro, folio fere obtuso. *Pet gaz.* t. 57. f. 4.

Cerasus africana, foliis plerumque in summo sinuatis. fructu rubro. *Pluk. alm.* 49. t. 158. f. 2.

Habitat in Æthiopia. 5

Maurocenia.

SAMBUCUS.

1. SAMBUCUS cymis tripartitis, stipulis foliaceis.

Sambucus caule herbaceo simplici. Vir. cliff. 25. *Fl. suec.* 251. *Mat. med.* 149. *Hort. cliff.* 110. *Roy. lugd^b.* 245.

Sambucus humilis f. *Ebulus. Bauh. pin.* 456.

Ebulus. Fuchs. hist. 65.

β. *Sambucus humilis* f. *Ebulus folio iacintato. Bauh. pin.*

456.

Habitat. in Europa. 2

2. SAMBUCUS cymis quinquepartitis, foliis sub-bipinnatis.

Habitat in Canada D. Kalm. 2

Media inter S. Ebulum & nigrum, habitus S. nigrae, at folia pinnata; foliolis inferioribus ternatis, omnibus magis ovatis; fruticat, sed plerumque perit supra terram hyeme. Cymæ structura uti in nigra. Stipulæ filiformes, truncatæ, ut in S. nigra; nec in foliola expansa, ut in Ebulo.

3. SAMBUCUS cymis quinqueparitis, caule arboreo. *nigra.*

Sambucus caule arboreo ramoso, floribus umbellatis.

Roy. lugd^b. 243. Fl. suec. 250. Mat. med. 148.

Sambucus caule perenni ramoso. Hort. cliff. 109.

Sambucus fructu in umbella nigra. Bauh. pin. 456.

Sam-

- Sambucus, *Dod. pempt.* 845.
β. Sambucus fructu in umbella viridi. *Baub. pin.* 456.
laciniata. *γ.* Sambucus laciniato folio. *Baub. pin.* 456. *Dod. pempt.*
845.
Habitat in Germania. b
racemosa. 4. SAMBUCUS racemis compositis ovatis, caule arboreo
 Sambucus caule arboreo ramoso, floribus racemosis. *Roy.*
lugdb. 243. *Sauv. monsp.* 222.
 Sambucus racemosa rubra. *Baub. pin.* 456.
 Sambucus racemosa, acinis rubris. *Baub. hist. 1; p.* 549.
Habitat in Europæ australis montosis. b

ZANTHOXYLUM.

- Clava beren-* 1. ZANTHOXYLUM foliis pinnatis.
lis. Zanthoxylum. *Hort. cliff.* 487.
 Zanthoxylon spinosum, lentici longioribus foliis, evo-
 nimi fructu capsulari. *Catesb. car.* 1. p. 26. t. 26.
Habitat in Jamaica, Carolina, Virginia b
trifoliatum. 2. ZANTHOXYLUM foliis ternatis.
Habitat in China. Osbeck.
 Fruite Aculo recurvo, sub basi & apice singuli petioli.
 Folia ternata, solitaria, ad flores ternas foliolis o-
 vatis obtusis. Pedunculi umbellulam gerunt simplicem,
 hemisphaericum. Stylus trifidus est, ut nequeat Arali-
 is sociari.

STAPHYLEA.

- pinnata* 1. STAPHYLEA foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 112. *Hort.*
upi. 69. *Roy. lugdb.* 436.
 Staphyloendron. *Dolech. hist.* 102.
 Pistacia sylvestris. *Baub. pin.* 401.
Habitat in Europæ australioris succulentis.
- trifoliata.* 2. STAPHYLEA foliis ternatis: *Hort. cliff.* 112. *Roy.*
lugdb. 437. *Cold. noveb.* 62.
 Saphyloendron triphyllum, vaseulo tripartito. *Gron.*
vrg. 34.
 Staphyloendron virginianum trifoliatum. *Herm. lugdb.*
230.
 Pistacia virginica sylvestris trifolia. *Moris. blaes.* 295.
Habitat in Virginia. b

TAMARIX.

- gallica* 1. TAMARIX floribus pentandris. *Hort. cliff.* 111. *Roy.*
lugdb. 436. *Sauv. monsp.* 45. *Ta-*

Tamarix pedunculis nudis, floribus pentandris. *Hort. upf.* 69. *Mart. med.* 154.

Tamarix altera, folio tenuiore, s. gallica. *Baub. pin.* 485.

Tamariscus narbonensis. *Lob. ic.* 218.

Habitat in Gallia, Hispania, Italia. ♂

2. TAMARIX floribus decandris. *Hort. cliff.* 111. *Roy. germanica.*
lugdb. 436.

Tamarix fruticosa, folio crassiore, s. germanica. *Baub.*
pin. 485.

Tamariscus germanica. *Lob. ic.* 218.

Habitat in Germaniae locis inundatis. ♂

TURNERA

1. TURNERA foliis serratis, petiolis floriferis. *Vir. cliff.* *ulmifolia.*
20 *Hort. cliff.* 112. t. 10. *Roy. lugdb.* 434.

Turnera frutescens ulmifolia. *Plum. gen.* 15. *Mart.*
cent. 49. t. 49.

Cistus urticæ folio, flore luteo, vasculis trigonis: *Sloan.*
jam. 86. *hist.* 1. p. 202. t. 127. f. 4. 5. *Raj. dendr.*
492.

Helianthemoides. *Baub. lugdb.* 2. p. 260.

5. Turnera frutescens, folio longiore & mucronato. *Mart.*
cent. 49. t. 49.

Habitat in Jamaica, & in America calidore. ♂

TELEPHIUM

1. TELEPHIUM. *Hort. upf.* 70. *imperati.*

Telephium foliis oblongo-ovatis, racemis secundis terminalibus. *Vir. cliff.* 20. *Hort. cliff.* 73. *Roy. lugdb.* 434.

Telephium repens, folio non deciduo. *Baub. pin.* 287.

Telephium legitimum. *Clus. hist.* 2. p. 67.

Cistus folio majoranæ. *Baub. pin.* 465.

Habitat in Gallo-provincia. ♀

CORRIGIOLA

1. CORRIGIOLA. *Hort. upf.* 70. *litoralis.*

Corrigiola caule fasciculis flororum terminato. *Hort. cliff.*
112. *Roy. lugdb.* 420. *Hall. betv.* 391.

Polygonum litoreum minus, florculis spadiceo albican-tibus. *Baub. pin.* 281. *prodr.* 131. *Moris. hist.* 2.
p. 593. f. 5. t. 29. f. 1.

Habitat in Gallæ, Germaniæ litoribus arenosis. ☽

PHARNACEUM.

Cerviana. 1. PHARNACEUM glabrum, pedicellis folia exquantibus. *Phil. bot.* 258. *

Cerviana. Minuart. monogr. 1

Alpine pumila, gallii facie, foliis glaucis. *Amm. ruth.* 84.

Spergula purpurea minima. *Buxb. cent.* 3. p. 33. t. 62. f. 2.

Habitat Rostockii, in Russia, Hispania ☺

inconspicuum. 2. PHARNACEUM pedunculis communibus longissimis. *Hort. cliff.* 492. * *Roy. lugdb.* 221.

Habitat in Africa.

Figura forte habetur in Pluk. phyt. 304. f. 4

ALSINE.

media. 1. ALSINE petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Fl. lapp.* 186. *Fl. suec.* 369. *Hort. cliff.* 173. *Gron. virg.* 161. *Roy. lugdb.* 449.

Alpine media. *Bauh. pin.* 250.

Alpine minor. *Dod. pempt.* 29.

Habitat in Europa et in it. ☺

segetalis. 2. ALSINE petalis integris, foliis subulatis.

Spergula foliis filiformibus unum latus spectantibus stipulis membranaceis vaginantibus, pedunculis um bellatis. *Guett. stamp.* 299. *Dalib. paris.* 133.

Alpine segetalis, gramineis foliis unum latus spectantibus *Vail. paris.* 8. t. 3. f. 3.

Habitat Parisiis. ☺

BASELLA.

rubra. 1. BASELLA foliis planis.

Basella. *Rheed. mal.* 7. p. 45. t. 24. *Fl. zeyl.* 119.

Cuscuta foliis subcordatis. *Hort. cliff.* 39.

Habitat in India. ♂

alba. 2. BASELLA foliis undatis.

Basella flore albo & caulis viridibus *Tbran. carol.* II.

Habitat in Syria? ☺

SAROTHRA.

Gentianoides. 1. SAROTHRA. *Gen. nov.* 1075.

Geniana caule ramisque ramosissimis, foliis subulatis minimis. *Gron. virg.* 29.

Centaurium minus spicatum, angustissimo folio, s. scoparium marilandicum novum. *Pluk. mant.* 43. t. 342. f. 4.

Habitat in Virginiae, Pensylvaniæ apriæ glareofis.

TE.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA.

1. PARNASSIA. *Fl. lapp.* 108. *Fl. suec.* 252. *Hort. palustris.*
cliff. 113. *Roy. lugdb.* 420. *Hall. belv.* 316. *Dalib.*
parif. 96.
Graimen parnassi albo simplici flore. *Baub. pin.* 309.
Hepatica alba. *Cord. bifl.* 53.
Pyrola rotundifolia palustris, flore unico ampliore. *Mo-*
rif. bifl. 3. *p. 505. f. 12. t. 10. f. 3.*
Habitat in Europæ uliginosis. 2

PENTAGYNIA.

ARALIA.

1. ARALIA arborescens, caule foliolisque aculeata. *Vir. spinosa,*
cliff. 26. *Gron. virg.* 34.
Aralia caule aculeato. *Hort. cliff.* 113. *Roy. lugdb.* 92.
Angelica arborescens spinosa f. *Arbor indica fraxini fo-*
lio, cortice spinoso. *Comm. hort.* 1. *p. 89. t. 47.*
Christophoriana arbor aculeata virginienfis. *Pluk. alm.*
98. t. 20.
Habitat in Virginia. 5
2. ARALIA caule petiolisque aculeatis, foliolis *inerimi-chinenfis.*
bus villosis.
Habitat in China. *Osbeck.*
Caulis simplex, aculeis spinosissimus, nudus, in summi-
tate tantum foliosus. *Petioli compositi, tripartiti, acu-*
leati, villosi. *Folia partialia pinnata & insuper folio-*
la 2 ad ramifications petioli. *Foliola f. pinnæ ovatae,*
serratae, subitus præsertim villosæ, duplo maiores, quam
in præcedente. *Panicula ramosa umbellulis numero-*
sis. *Differt itaque a præcedenti, quod nulli aculei in*
foliolis per discum secundum venas adspersi; quod fo-
lia non glabra sed duplo majora. *Habitus etiam diver-*
sus.
3. ARALIA caule folioso herbaceo lœvi. *Hort. upf.* 70. *racemosa.*
Cold. noveb. 67.
Aralia racemis umbelliferis lateralibus. *Vir. cliff.* 26.
Aralia ex alis florifera. *Hort. cliff.* 113. *Roy. lugdb.*
92.

- Panaces carpimontanae racemosa canadensis. *Corn. canad.*
 74. t. 75. *Barr. ic.* 705.
 Christophoriana canadensis racemosa & ramosa. *Moris.*
 hist. 1. p. 9. f. 1. t. 2. f. 9.
Habitat in Canada. 2
- nudicaulis.* 4. ARALIA caule nudo. *Hort. cliff.* 113. *Gron. virg.*
 34. *Roy. lugdb.* 94.
 Aralia caule nudo, radice repente. *Cold. noveb.* 66.
 Christophoriana virginiana, zarzæ radicibus surculosis &
 fungosis. *Pluk. alm.* 98. t. 238. f. 5.
Habitat in Virginia, simillima (forte eadem) in Iava. 2

BARRERIA.

- capensis.* 1. BARRERIA.
 Erica capitata s. nodiflora, corios foliis rectis, æthiopicæ. *Pluk. mant.* 69. t. 346. f. 7.
Habitat in Æthiopia. 3
 Frutex; Ramæ per spatia determinatae conferti, erecti,
 ruforescentes, adspersi pilis albis. Folia alterna, approxi-
 mata, ovato-lanceolata, integerrima, pilis albis velut-
 ciliata; Capitula florum terminalia; Simillima est ha-
 bitu *Diosma* ciliatae.

STATICE.

- Armeria.* 1. STATICE caule nudo simplici capitato. *Hort. cliff.*
 115. *Fl. suec.* 253. *Gron. virg.* 150. *Roy. lugdb.* 194.
 Limonium aphyllon gramineum globosum. *Moris.*
 hist. 3. p. 601. f. 15. t. 1. f. 29.
 Caryophyllus montanus major, flore globose. *Bauh.*
 pin. 211.
 2. Caryophyllus montanus minor. *Bauh. pin.* 211.
Habitat in Europæ & Americæ septentrionalis cam-
pis. 2
- Limonium.* 2. STATICE caule nudo paniculato tereti, foliis lævi-
 bus.
 Statice caule nudo ramoso. *Hort. cliff.* 115. *Fl.*
 suec. 254. *Gron. virg.* 150. *Roy. lugdb.* 192.
 Limonium maritimum majus. *Bauh. pin.* 192.
 3. Limonium maritimum minus, oleæ folio. *Bauh. pin.*
 192.
 4. Statice foliis obverse-ovatis glabris, caule nudo ramo-
 so. *Sauv. monsp.* 15.
 Limonium parvum, bellidis minoris folio. *Bauh. pin.*
 192. 5. Limon-

- ♂ *Limonium maritimum minimum*. *Baub. pin.* 192.
prodr. 99. Bocc. sic. 25. t. 19.
Habitat in Europæ & Virginiam maritimis. ♀
3. *STATICE caule nudo paniculato foliis spathulatis re- cordata*
tulis. Sauv. monsp. 15. †
Limonium maritimum minus, foliis cordatis. Baub. pin.
192. prodr. 99.
Limonium minimum cordatum s. folio retuso. Barr.
ic. 805.
Habitat ad maris Mediterranei litora. ♀
4. *STATICE caule nudo paniculato tereti, foliis tuber- echioides.*
culatis.
Statice foliis obverse-ovatis verrucosis, caule ramoso
nudo. Sauv. monsp. 15,
Limonium minus annuum bullatis foliis: Magn. monsp.
157. t. 156.
Habitat Monspelii. ○
5. *STATICE caule subnudo paniculato prostrato, ramis resinata,*
sterilibus retroflexis nudis, foliis cuneiformibus.
Statice foliis obverse-ovatis, ramis nudis humifusis,
intricatis Sauv. monsp. 15.
Limonium minus, virgulis retiformiter se invicem im-
plicatis Pluk. alm. 221. t. 42. f. 4.
Limonium reticulatum. Raj. hist. 396. Bocc. sic. 82.
t. 44.
Habitat in Melita.
6. *STATICE caule subnudo dichotomo ancipiti, foliis speciosa.*
lanceolatis mucronatis, floribus aggregatis.
Limonium foliis lanceolatis mucronatis radicalibus,
caule ancipiti dichotomo, stipulis simplicibus. Hort.
ups. 71. Gmel. sibir. 2. p. 221. t. 91. f. 1.
Limonium floribus elegantissimis. Raj. hist. 397.
Limonium elatius, plantaginis foliis procumbentibus in
aculeum terminatis, floribus albis in capitula conge-
gestis. Amin. ruth. 129.
Habitat in Tataria. ♂
7. *STATICE caule subnudo dichotomo, foliis lanceo-*
tatarica
latis mucronatis, floribus alternis distantibus. Gmel.
sibir. 2. p. 223. t. 92.
Limonium orientale, plantaginis folio, floribus umbel-
latis. Tournef. cor. 25. Boerb. lugdb. 1. p. 76. t. 76.
Limonium elatius, plantaginis foliis procumbentibus in
acu-

aculeum terminatis, floribus albis spicatis. *Amm. ruth.*

^{130.}

Habitat in Tataria. ♂

Eckinus. 8. STATICE caule nudo paniculato, foliis subulatis mucronatis.

Limonium foliis caulinis subulatis pungentibus. *Roy. lugdb.* 192.

Limonium orientale frutescens, caryophylli folio in aculeum rigidissimum abeunte. *Tournef. cor.* 25.

Limonium cespitosum, foliis aculeatis. *Buxb. cent.* 2. p. 18. t. 10.

β. *Limonium græcum*, juniperi folio. *Tournef. cor.* 25.

Echinus f. *Tragacantha altera*. *Alp. exot.* 57. t. 56.

Habitat in Græcia & Mediæ deseris.

flexuosa. 9. STATICE caule nudo ramoso flexuoso, corymbis terminalibus, foliis nervosis. *Gmel.*

Statice foliis ovalibus muticis nervosis, caule nudo alternatim ramoso flexuoso, corymbis terminantibus.

Gmel. sibir. 2. p. 217. t. 89. f. 1.

Habitat in Sibiria.

infruticosa. 10. STATICE caule fruticoso: superne nudo ramoso, capitulis sessilibus, foliis lanceolatis vaginantibus.

Statice foliis lanceolato-linearibus caulinis basi vaginantibus, capitulis alternis sessilibus. *Gmel. sibir.* 2. p. 216. t. 88. f. 2. 3.

Habitat in Sibiria. D. Gmelin. 5

monopetala. 11. STATICE caule fruticoso folioso, floribus solitariis, foliis lanceolatis vaginantibus.

Statice foliis caulinis lanceolato-linearibus. *Hort. cliff.* 116. *Roy. lugdb.* 192.

Limonium lignosum. Bocc. sic. 34. 35. t. 16. 17.

Habitat in Sicilia.

aurea. 12. STATICE caule fruticoso folioso ramoso, foliis subulatis.

Statice caulinis fruticosis teretiusculis, foliis subulatis caulinis, floribus ex corymboso fasciculatis. *Gmel. sibir.* 2. p. 218.

Limonium maritimum humile, ephedræ facie, calycibus florum aureis. Amm. ruth. 132. t. 18. f. 2.

Habitat in Dauriæ campis montosis.

sinuata. 13. STATICE foliis radicalibus alternatim pinnato-sinuatis:

atis: caulinis ternis triquetris subulatis decurrentibus.

Hort. upf. 71.

Statice foliis caulinis decurrentibus. *Hort. cliff.* 116.

Limonium peregrinum, foliis asplenii. *Baeh. pin.* 192.

Limonii species. *Rauw. itin.* 313. t. 314.

Limonium rauvolfianum. *Clus. cur.* 33. t. 33.

β. *Limonium africanum*, caule elato, foliis integris hirsutis, petalo pallide flavo, calyce amoenè purpureo. *Mart. cent.* 48. t. 48.

Habitat in Sicilia, Palæstina, Africa. ♂

LINUM.

* *Folitis alternis.*

1. *LINUM calycibus capsulisque mucronatis, petalis cre-~~natae~~ natis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario.*

Linum ramis foliisque alternis linear-lanceolatis, radice annua. *Hort. cliff.* 114. *Roy. lugdb.* 433.

Linum foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus acuminatis angulatis, capsulis mucrouatis. *Hort. upf.* 71. *Mart. med.* 156.

Linum arvense. *Baeh. pin.* 214. *Raj. hist.* 1073.

β. *Linum sativum*. *Baeh. pin.* 214.

γ. *Linum sativum humilius*, flore majore. *Boerb. lugdb.* 1. p. 284.

ζ. *Linum sativum latifolium africanum*, fructu majore. *Tournes. inst.* 339.

Habitat hodie inter segetes Europæ australis. ☽

2. *LINUM calycibus capsulisque obtusis, foliis alternis ~~perenne~~ lanceolatis integerrimis.*

Linum foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus apice obtusis, capsulis muticis. *Hort. upf.* 72.

Linum perenne, ramis foliisque alternis linear-lanceolatis. *Hort. cliff.* 114. *Roy. lugdb.* 434. *Sauv. monsp.* 53.

Linum perenne majus cærulcum, capitulo majore. *Morif. hist.* 2. p. 573.

Linum sylvestre cærulcum perenne erctius, flore & capitulo majore. *Raj. angl.* 3. p. 362.

Habitat in Sibiria et Cantabrigiæ ♀

3. *LINUM calycibus hirsutis acuminatis sessilibus alternis, ~~hirsum~~ caule corymboso.*

Linum sylvestre latifolium hirsutum cærulcum. *Baeh. pin.* 339. *Morif. hist.* 2. p. 573. f. 5. t. 26. f. 5.

Raj. hist. 1073.

*Linum sylvestre latifolium. Clus. hist. I. p. 317.
Habitat in Austræ, Tatariæ editis graminosis.*

*verbenense. 4. LINUM calycibus acuminatis, foliis lanceolatis sparsis striatis scabris acuminatis, caule tereti basi ramoso.
Linum sylvestre cæruleum, folio acuto. Bauh. pin. 214.
proar. 107. Raj. hist. 1073.*

*Linum sylvestre angustifolium, cæruleo ampio flore.
Magn. monsp. 161. Sauv. miscp. 54.
Habitat in Galloprovincia, Monspelii, unde Burserus
attulit C. Bauhino. 2*

*tenuifolium. 5. LINUM calycibus acuminatis, foliis sparsis linearis-
taceis retrorsum scabris.*

*Linum perenne, foliis angustioribus, calyce aristato. Hall.
helv. 371.*

*Linum sylvestre angustifolium, flore magno. Bauh.
pin. 214.*

Linum sylvestre V. angustifolium. Clus. hist. I. p. 318.

*β. Linum sylvestre angustifolium, flore magno intense cæ-
ruleo. Tournef. inst. 340.*

*γ. Linum sylvestre angustifolium, flore magno violaceo.
Tournef. inst. 340.*

*δ. Linum sylvestre angustifolium, flore magno lineis pur-
pureis distincto. Tournef. inst. 340.*

*ε. Linum sylvestre angustifolium, flore magno cæruleo &
velut cinereo. Tournef. inst. 340.*

*Lini sylvestris V. angustifolii aliud genus. Clus. hist. I.
p. 318.*

*ζ. Linum sylvestre angustifolium, floribus dilute purpura-
scentibus vel carneis. Bauh. pin. 214.*

*Linum sylvestre VI. angustifolium. Clus. hist. I. p.
318.*

*Linum oxyphyllum multicaule Bocc. mus. 2. p. 169.
t. 125.*

η. Linaria, capillaceo folio, altera. Bauh. pin. 213.

*γ. Linum angustifolium album, ramusculis per terram
sparsis. Tournef. inst. 340.*

Habitat in Galliæ, Helvetiæ aridis herbosis. 2

*austriacum. 6. LINUM calycibus rotundatis obtusis, foliis linearibus
acutis.*

*Linum sylvestre angustifolium, foliis rarioribus. Bauh.
pin. 214.*

*Linum sylvestre II. Taverne. sc. 822.
Habitat in Austria inferiore.*

7. LINUM calycibus acutis alternis, capsulis muticis, pa- *virginianum*
nicula filiformi, foliis alternis lanceolatis. radicalibus
ovatis.
Linum ramis foliisque alternis lanceolatis sessilibus ner-
vo longitudinali instructis. *Gron. virg.* 35.
Habitat in Virginia. Pensylvania.
Caulis filiformis, pedalis, paniculatus. Folia radicalia o-
valia, integerima, lœvia; caulina alterna, lanceolata.
Flores alterni; pedunculis brevissimis. Calyces acuti.
Capsulæ globosæ, muticæ; Corollæ luteæ.
8. LINUM calycibus acutis, foliis linear-i-lanceolatis al- *trigynum*.
ternis, paniculæ pedunculis bifloris.
Linum foliis linear-i-lanceolatis, pedunculis bifidis, flo-
ribus luteis. *Sauv. monsp.* 53.
Linum sylvestre minus, flore luteo. Baub. pin. 214.
Habitat in Monspelii. D. Sauvages.
Planta spithamea. Caules ad basin sèpe ramos duos op-
positos exserunt. Corolla flava, rotata, tubo supra ba-
sin coherentem longitudine calycis. Pistilla in hoc sèpi-
us 3 observavit Ill. Sauvages.
9. LINUM calycibus subserrato-scabris lanceolatis sub- *flavum*.
sessilibus, panicula ramis dichotomis.
Linum sylvestre latifolium luteum. Baub. pin. 214.
Linum latifolium luteum. Baub. hist. 3. p. 454.
Linnm sylvestre 111. latifolium. Clus. hist. 1. p. 317.
Habitat in Austria.
10. LINUM calycibus foliisque lanceolatis strictis mu- *strictum*.
cronatis: margine scabris.
Linum foliis asperis umbellatum luteum. *Magn. monsp.*
164. *Raj. hist.* 1076. *Sauv. monsp.* 53.
Lithospermum, linariæ folio, monspeliensium. Baub.
pin. 259.
Passerina lobelii. Baub. hist. 3. p. 454.
Habitat in Monspelii, Hùpaniæ, Siciliæ squalidis. ⊙
11. LINUM foliis linearibus acutis scabris, caulis suf- *suffruticosum*.
fruticosis.
Linum angustifolium fruticosum valentimum, foliis ri-
gidis & aculeatis. Tournef. inst. 340.
Habitat in Regno Valentino.
12. LINUM foliis cuneiformibus, caulis arborescen- *arboreum*.
tibus.

*Linum arboreum. Alp. exot. 19. t. 13.
Habitat in Creta. ♂*

- campanula-
tum.* 13. LINUM foliorum basi utrinque puncto glanduloso.
*Linum foliis imis spathulatis, floribus luteis. Sauv. monsp.
76.*
*Linum sylvestre luteum, foliis subrotundis. Baub. pin.
212. Tournef. inst. 340. Magn. char. 261.*
*Campanula lutea linifolia montis lupi, flore volubilis.
Lob. ic. 414.*
*Campanula linifolia lutea. Baub. hist. 2. p. 817.
Habitat in Galloprovinciæ montibus, Monspelii in mor-
te lupi. ♀*
*Facies a Lino diversa, stamina unita basi reddunt plan-
tam dubiam, quam accuratius examinent, qui vivam
adire queunt.*
- maritimum.* 14. LINUM calycibus ovatis acutis muticis, foliis lance-
olatis: inferioribus oppositis.
*Linum caule simplici, ramis folisque inferioribus oppo-
sitibus linear-lanceolatis: Hort. cliff. 314. * Roy. lugdb.
434. Sauv. monsp. 147.*
*Linum foliis ovatis, floribus racemosis. Guett. stamp. 2.
p. 499.*
Linum maritimum luteum. Baub. pin. 214.
*Linum luteum narbonense. Baub. hist. 3. p. 454. Raj.
hist. 1074.*
*Linum sylvestre. Dod. pent. 534.
Habitat in Austria ad Thermas baderenses, Monspelij.*
- * * *Foliis oppositis.*
- africanum.* 15. LINUM foliis oppositis linear-lanceolatis, floribus
terminalibus pedunculatis. *Roy. lugdb. 434.*
*Linum africanum luteum, foliis conjugatis. Boerb. lugdb.
1. p. 284.
Habitat in Africa.*
- vodiflorum.* 16. LINUM foliis oppositis lanceolatis, floribus alternis
sessilibus, caule simplici. *Hort. cliff. 114.*
*Linum luteum ad singula genicula floridum. Baub. pin.
214. Moris. hist. 3. p. 574. f. 3. t. 26. f. 11. Raj.
hist. 1026.*
*Linum luteum sylvestre latifolium. Column. ephr. 2.
p. 79. t. 80.
Habitat in Italiæ pratis argillossis.*

17. LINUM foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomum, *catharticum*.
choromo, corollis acutis. *Hort. cliff.* 372. *Fl. suec.*
255. *Mat. med.* 157. *Roy. lugdb.* 434.
Linum pratense, flosculis exiguis. *Baub. pin.* 214.
Spergula bifolia, lini capitulis. *Loes. præf.* 261. t. 86.
Habitat in Europæ septentrionalis pascuis succulentis. ⊖
18. LINUM foliis oppositis, caule dichotomo, floribus *Radiole*,
tetrandris tetragynis. *Hort. cliff.* 114. *Fl. suec.* 256.
Roy. lugdb. 434.
Chamælinum vulgare. *Vaill. paris.* 33. t. 4. f. 6.
Linocarpum, serpilli folio, multicaule & multisporum.
Mich. gez. 23. t. 21.
Radiola vulgaris serpillifolia. *Raj. angl.* 3. p. 161. t. 15.
f. 3.
Polygonum minimum f. *Millegrana minima*. *Baub. pin.*
282.
Habitat in Europæ sabulo inundato. ⊖
19. LINUM foliis quaternis.
Linum africanum, rubigine foliis quaternis stellatis. *Raj.* ^{quadrifoliis} *suppl.* 525.
Habitat in Aethiopia.
20. LINUM foliis verticillatis. ^{verticillata}
Linum sylvestre, flore cæsio, foliis verticillatis. *Bocc. tun.*
mus. 2. p. 49. t. 42. *Raj. suppl.* 524. *Barr. rar.* 685.
t. 1226.
Habitat in Italia. ⊖
Calyces & folia superiora villosa.

ALDROVANDA.

1. ALDROVANDA. *Mont. aff. bonon.* 2. p. 3. p. 404. *vigilans*,
t. 12.
Lenticula palustris indica, foliis subrotundis binis capitulo-
lamentis ad unum barbatis. *Pluk. alm.* 211. t. 41. f. 6.
Habitat in Italiæ & Indiæ paludosis. D. Moati.

DROSERA.

1. DROSERA scapis radicatis, foliis orbiculatis. *Fl. lapp.* *rotundifolia*,
109. *Fl. suec.* 257. *Mat. med.* 158. *Fl. zeyl.* 120.
Gron. virg. 35. *Roy. lugdb.* 120.
Ros solis folio rotundo. *Baub. pin.* 357.
Salsifiora f. *Ros solis*. *Thal. herc.* t. 9, f. 1.
Habitat in Europæ, Asiæ, Americæ paludibus.

- longifolia.* 2. DROSERA scapis radicatis, foliis oblongis. *Fl. lapp.*
110. Fl. suec. 258. *Roy. lugdb.* 417.
 Ros solis folio oblongo. *Baub. pin* 357.
 Salsifiora f. Sponsa solis f. Ros solis f. Rorella. *Tahl.*
herc. 116. t. 9. f. 2.
Habitat in Europa ubique cum precedente; an itaque
satis diversa species?
- lusitanica.* 3. DROSERA scapis radicatis, foliis subulatis subtus
 convexis.
 Ros solis lusitanicus, foliis asphodeli minoris. *Morif.*
bist. 3. p. 620. f. 15. t. 4. f. 4. *Pluk. alm.* 323. t. 117.
f. 2. Raj. suppl. 551.
Habitat in Lusitania.
- capensis.* 4. DROSERA scapis radicatis, foliis lanceolatis.
 Drosera foliis ad radicem longissimis, floribus spicatis.
Burm. afr. 209. t. 75, f. 1.
 Ros solis africanus, foliis prælongis, caule nudo altissi-
 mo. *Raj. suppl.* 515.
 Ros solis africanus, folio lato & longo. *Herm. afric* 19.
Habitat in Æthiopia.
- indica.* 5. DROSERA caule ramoso folioso, foliis linearibus. *Fl.*
zeyl. 121.
 Ros solis ramosus, caule folioso. *Burm. zeyl* 207. t.
94. f. 1.
 Araca-puda. *Rheed. mal.* 10. p. - - t. 20.
Habitat in India.

CRASSULA.

- coccinea.* 1. CRASSULA foliis planis cartilagineo-ciliatis basi
 connato-vaginatis. *Vir. cliff.* 26. *Hort. cliff.* 116.
Roy. lugdb. 454.
 Cotyledon africana frutescens, flore umbellato cocci-
 neo. *Comm. rar.* 24. t. 24.
Habitat in Æthiopia. ♂
- perfoliata.* 2. CRASSULA foliis lanceolato-subulatis sessilibus con-
 natis canaliculatis: subtus convexis. *Hort. cliff.* 116.
Roy. lugdb. 455,
 Crassula altissima perfoliata. *Dill. elth.* 114. t. 96. f. 113.
 Aloë africana caulescens perfoliata glauca & non spi-
 nofa. *Comm. præl.* 74. t. 23.
Habitat in Æthiopia. ♂

3. CRASSULA foliis subulatis obfolete tetragonis. *Hort. tetragona.*
*cliff. 116. * Roy. lugdb. 455.*
Habitat in Æthiopia. ♂
4. CRASSULA foliis oppositis obtuse ovatis integerrimis; hinc angustioribus. *Hort. cliff. 496. Roy. lugdb.*
455.
Crassula anacampserotis folio. Dill. elth. 115. t. 97. f.
I¹⁴.
Habitat in Æthiopia. ♂
5. CRASSULA foliis oppositis oblongis planiusculis diciliata.
stinetis ciliatis. Hort. cliff. 496. Roy. lugdb. 455.
Crassula caulescens, foliis sempervivi cruciatis. Dill.
elth. 116. t. 98. f. 116.
Habitat in Æthiopia. ♀
6. CRASSULA foliis oppositis patentibus scabris. *scabra.*
Crassula mesenibryanthemi facie, foliis longioribus a-
speris. Dill. elth. 117. t. 99. f. 117.
Cotyledon africana frutescens, foliis asperis angustis a-
cuminatis, flore virescente. Mart. cent. 24. t. 24.
Habitat in Africa?
7. CRASSULA foliis serrato-dentatis planis alternis, *alternifolia.*
caule simplicissimo, floribus pendulis. Hort. cliff.
*497. * Roy. lugdb. 455.*
Cotyledon, flore luteo, media. Herm. lugdb. 191.
Habitat - - - - -
8. CRASSULA foliis subulatis radicatis, caule nudo, *nudicaulis.*
Hort. cliff. 116. Roy. lugdb. 455.
Crassula cesposa longifolia. Dill. elth. 116. t. 98. f.
115.
Habitat in Æthiopia. ♀
9. CRASSULA caule flaccido prolifero determinate-fo- *orbicularis.*
lio, foliis patentissimis imbricatis. Hort. cliff. 496.
Roy. lugdb. 455.
Crassula orbicularis repens, foliis sempervivi. Dill. elth.
119. t. 120. f. 118.
Habitat in Æthiopia. ♀
10. CRASSULA caule flaccido repente, foliis oppositis, *pelinidea.*
Crassula, portulacæ facie, repens. Dill. elth. 119. t.
100. f. 119.
Habitat in Æthiopia.

SURIANA.

- maritima.* 1. SURIANA. *Hort. cliff.* 492.
Suriana foliis portulacæ angustis. *Plum. gen.* 37.
Thymelææ facie frutex maritimus tetraspermos, flore te-
 trapetalo. *Sloan. jam.* 138. *hist.* 2. *p.* 29. *t.* 162. *f.* 4.
Raj. dendr. 96.
Arbor americana, *salicis* folio, *frondosa* bermudensis.
Plnk. alm. 44. *t.* 241. *f.* 5.
Habitat ad littora maris in Bermudis, Jamaica. 5

SIBBALDIA.

- procumbens.* 1. SIBBALDIA foliolis tridentatis. *Fl. lapp.* 111. *Fl.*
suec. 260. *Hall. helv.* 342. *Roy. lugd.* 276.
Fragariæ affinis sericea incana. *Baub. pin.* 327. *prodri.*
 139.
Fragariæ sylvestri affinis planta, flore luteo. *Sibb. scot.*
 2. *p.* 25. *t.* 6. *f.* 1.
Pentaphyloides fruticosum minimum procumbens, flo-
 re luteo. *Plnk. alm.* 284. *t.* 212. *f.* 3.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Scothiæ. 2
- erecta. 2. SIBBALDIA foliolis linearibus multifidis.
Pentaphylloides foliis tenuissime laciniatis, flosculis car-
 neis. *Amm. ruth.* 112. *t.* 15.
Habitat in Sibira D. Gmelin.

POLYGYNIA.

MYOSURUS

- minimus.* 1. MYOSURUS.
Myosurus foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 117. *Fl. suec.*
 261. *Roy. lugdb.* 492.
Holosteus affinis *Cauda muris*. *Baub. pin.* 190.
Cauda muris. *Dod. pempt* 112.
Habitat in Europæ collibus apicis aridis. ②

Classis VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

BROMELIA.

1. BROMELIA foliis ciliato-spinosis mucronatis, spica *Ananas*,
coriifolia. Bromelia foliis spinosis, fructibus connatis caulem cingentibus. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upf.* 73. *Roy. lugdb.* 24. *Carduus brasiliensis*, foliis aloës. *Baeh. pin.* 384. *Ananas acostæ*. *Comm. hort.* I. p. 109. t. 57. *Tappa-Tsiakka*. *Rheed. mal.* II. p. I. t. I.
- β . Ananas aculeatus, fructu pyramidato: carne aurea. *Tourneef. inst.* 653.
2. Ananas aculeatus, fructu conico carne aurea. *Pluk. spec.* 20.
- δ . Ananas lucide vires, folio vix serrato. *Dill. elth.* 25. t. 21. f. 22. Ananas non aculeatus Pitta dictus. *Plum. spec.* 20. *Habitat in nova Hispania, Surinamo.* 2
2. BROMELIA foliis ciliato-spinosis mucronatis, racemeo *Pinguin*, terminali. Bromelia foliis aculeatis, racemo laxo terminali. *Hort. cliff.* 129. *Roy. lugdb.* 25. *Ananas americana sylvestris altera minor*. *Pluk. mant.* 29. t. 258. f. 4. *Pinguin*. *Dill. elth.* 320. t. 240. f. 311. *Habitat in Jamaica, Barbados.* 2
3. BROMELIA foliis ciliato-spinosis mucronatis, panicula diffusa. Bromelia foliis spinosis oblique recurvis, fructibus dispersis racemosis. *Hort. upf.* 73. Karatas foliis altissimis angustissimis & aculeatis. *Plum. gen.* 10? *Habitat in America meridionali.* 2
4. BROMELIA foliis ferrato-spinosis oblongis, spicis alternatis.

Bromelia ramosa & racemosa, foliis arundinaceis serratis. *Plum. gen.* 26.

Habitat in America meridionali. 2

nudicaulis. 3. **BROMELIA** foliis radicalibus dentato-spinosis, caulinis integerimis.

Bromelia pyramidata, aculeis nigris. *Plum. gen.* 46.

Habitat in America meridionali. 2

TILLANDSIA.

utriculata. 1. **TILLANDSIA** cutimo paniculato.

Tillandsia foliis basi conniventibus in utriculum. *Hort. cliff.* 129.

Viscum caryophylloides maximum, flore tripetalo pallide luteo, semine filamentoso. *Sloan. jam.* 76. *hist.* 1. p. 188. *Raj. suppl.* 405.

Visci modo arboribus indicis adnascens. *Bauh. pin.* 423. *Caraguata multiplici spica*, flore albo. *Plum. gen.* 10. *Habitat in America meridionalis arboribus.*

serrata. 2. **TILLANDSIA** foliis superne dentato-spinosis.

Caraguata clavata & spicata, foliis serratis. *Plum. gen.* 10. *Habitat in America meridionali.*

lingulata. 3. **TILLANDSIA** foliis linearis lingulatis integerrimis: basi ventricosis.

Caraguata latifolia & clavata. *Plum. gen.* 10.

Viscum caryophylloides maximum, capitulis in summitate conglomeratis. *Sloan. jam.* 77. *hist.* 1. p. 189. t. 120. *Raj. suppl.* 405.

Habitat in America meridionalis arboribus vetustis.

tenuifolia. 4. **TILLANDSIA** foliis linearis subulatis integerrimis imbricatis, spica simplici laxa. *Roy. Ingdb.* 25.

Caraguata tenuifolia, paucioribus spicis. *Plum. gen.* 10. *Habitat in America meridionalis arboribus.*

RENEALMIA.

paniculata. 1. **RENEALMIA** foliis radicalibus brevissimis, caule subnudo, ramis subdivisis adscendentibus.

Renealmia ramosissima, foliis variegatis & circinatis. *Plum. gen.* 27.

Habitat in America meridionali.

polystachia. 2. **RENEALMIA** scapo spicis imbricatis lateralibus.

Viscum caryophylloides angustifolium, floribus caryoleis.

Catesb. car. 2. p. 89. t. 89. 2

Rene-

Renealmia spica multiplici, flore albo. *Plum. gen. 37.*
β. Renealmia, spica multiplici, alia angustifolia. *Plum. gen.*

37.

Habitat in America calidiore.

3. RENEALMIA foliis linearibus reclinatis, scapo simplici imbricato, spica simplici. *monostachia.*

Renealmia non ramosa iquaniata, & floribus niveis.

Plum. gen. 37.

Habitat in America meridionali.

4. RENEALMIA foliis subulatis scabris, pedunculis u- recurvata, nifloris. *Roy. lugdb. 25.*

Viscum caryophylloides minus, foliis pruinæ instar candicantibus, flore tripetalō purpureo, semine filamentoso. *Sloan. jam. 77. hist. 1. p. 190. t. 120. f. 1.*
Raj. suppl. 406.

β. *Viscum caryophylloides minus, foliorum imis viridibus apicibus subrubicundis, flore tripetalō purpureo, semine filamentoso.* *Sloan. jam. 77. hist. 1. p. 190. t. 122.*

Habitat in Jamaicæ arboribus.

5. RENEALMIA filiformis intorta. *Hort. cliff. 129. usneoides.*
Gron. virg. 36. Barr. equin. 99. Roy. lugdb. 25.

Viscum caryophylloides tenuissimum e ramis arborum musci in modum dependens, foliis pruinæ instar candicantibus, flore tripetalō, semine filamentoso. *Sloan. jam. 77. hist. 1. p. 191. t. 122. f. 2. 3.*
Raj. suppl. 406.

Cuscuta, ramis arborum innascens, caroliniana, filamentis lanugine tectis. *Pluk. alm. 126. t. 26. f. 5.*

Camanbaya. *Marcgr. bras. 46. Pet. gaz. t. 62. f. 12.*
Habitat in Virginie, Jamaicæ, Brasiliæ arboribus.

BURMANNIA.

1. BURMANNIA spica gemina. *Burm. zeyl. 50. t. 20. disticha.*
f. 1. Fl. zeyl 128.

Burmannia spica duplici. *Hort. cliff. 128. Roy. lugdb.*
125.

Habitat in Zeylonæ paludosis

2. BURMANNIA flore gemmino. *biflora.*

Burmannia flore duplici. *Hort. cliff. 128.*

Burmannia scapo bifloro. *Gron. virg. 36.*

Habitat in Virginie paludosis.

TRADESCANTIA

- virginiana*, 1. TRADESCANTIA. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upf.* 73.
Gron. virg. 36. *Roy. lugdb.* 37.
Ephemerum phalangoides tripetalum non repens virginianum gramineum. *Moris. hist.* 3. p. 606. f. 15.
t. 2. f. 4.
Allium s. Moly virginianum. *Baub. pin.* 506.
Habitat in Virginia. 2

PONTEDERIA

- ovata*. 1. PONTEDERIA foliis ovatis, floribus capitatis.
Narukila. Rheed. mal. 11. p. 67. t. 34. *Raj. suppl.* 573.
Habitat in Malabariæ aquosis. 2
- cordata*. 2. PONTEDERIA foliis cordatis, floribus spicatis.
Pontederia floribus spicatis. *Hort. cliff.* 133. *Gron. virg.*
37. Roy. lugdb. 37. *Cold. noveb.* 69.
Gladiolus lacustris virginianus cæruleus, sagittæ folio.
Pet. gaz. 1. t. 1. f. 12.
Sagittæ similis planta palustris virginiana, spica florum cærulea, *Moris. hist.* 3. p. 618. f. 15. t. 4. f. ~
Plantagini aquaticæ quodammodo accedens, floribus cæruleis hyacinthi spicatis. *Pluk. mant.* 152. t. 349. f. ult.
Habitat in Virginiam aquosis. 2
- haastata*. 3. PONTEDERIA foliis haastatis, floribus umbellatis.
Pontederia floribus umbellatis. *Fl. zeyl.* 129.
Sagittæ quodammodo similis planta maderaspatana, floribus medio caule quasi ex utriculo prodeuntibus. *Pluk. alm.* 326. t. 220. f. 8. *Moris. hist.* 3. p. 618. f. 15.
t. 4. f. 7.
Carimgola. Rheed. mal. 1 p. 91. t. 44.
Habitat in India. 2

GALANTHUS.

- nivalis*. 1. GALANTHUS. *Hort. cliff.* 134. *Hort. upf.* 73.
Roy. lugdb. 35.
Leucojum bulbosum trifolium minus. *Baub. pin.* 56.
Erangelia. Reneal. spec. 97. t. 96.
Habitat ad radices Alpium Veronæ, Tridenti, Vienæ. 2

LEUCOJUM.

LEUCOJUM spatha uniflora stylo clavato. *vernæ.*

Leucojum. *Hort. cliff.* 15. *Hort. upf.* 74. *Roy. lugdb.* 35.

Leucojum bulbosum vulgare. *Baub. pin.* 55.

Oliganthemum. *Reveal. spec.* 99. t. 100.

Habitat in Germania, Helvetia, Italia umbrosis præsis, ad riveulos.

2. LEUCOJUM spathæ multiflora, stylo filiformi. *Læft. autumnale.*

Leucojum bulbosum autumnale. *Baub. pin.* 56.

Leucojum bulbosum autumnale tenuifolium. *Cuf. biß.*

1. p. 170.

Leucojum bulbosum majus s. multinorum. *Baub. pin.*

55.

Habitat in Luitania. ♀

NARCISSUS.

1. NARCISSUS spatha uniflora neclarii limbo rotato *poëticæ.*
brevissimo. *Hort. upf.* 74.

Narcissus foliis ensiformibus, floris neclario rotato bre-
vissimo. *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35. *Sauv.*
monsp. 17.

Narcissus albus. circulo purpureo. *Baub. pin.* 48.

Narcissus medio purpureus. *Dod. pempt.* 223.

β. Narcissus medio purpureus multiplex. *Baub. pin.* 54.
Habitat in Gallia Narbonensi, Italia. ♀

2. NARCISSUS spatha uniflora, neclarii limbo campa- *Pseudo Nar-*
nulato erecto petalo æquale. *cissus.*

Narcissus foliis ensiformibus, florum neclario longitu-
dine petalorum. *Hort. cliff.* 134. *Hort. upf.* 74. *Roy.*
lugdb. 35. *Sauv. monsp.* 17.

Narcissus sylvestris pallidus, calyce luteo. *Baub. pin.*

52.

Narcissus luteus sylvestris. *Dod. pempt.* 227. f. 12.

Habitat in Anglia, Hispania, Italia nemoribus. ♀

3. NARCISSUS spatha uniflora, neclario turbinato ma- *Bulbocodium*
ximo, genitalibus declinatis.

Narcissus foliis subulatis, neclario maximo patulo, ge-
nititalibus declinatis. *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35.

Narcissus montanus alter, flore fimbriato. *Baub. pin.*

53.

Narcissus montanus juncifolius, calyce aureo. *Baub.*
pin. 53.

Pseudo-Narcissus juncifolius 2, flavo flore. *Clus. hist.*
1. p. 166.

Habitat inter Ulyssiponem & Hispalim. 2

Scrotinus. 4. NARCISSUS spatha uniflora, nectario brevissimo sex-partito. *Lest.*

Narcissus albus autumnalis minimus. *Baub. pin.* 51.
Rudb. elys. 2. p. 64. f. 8.

Narcissus Scrotinus. *Clus. hist.* 1. p. 162.

Narcissus autumnalis minor. *Clus. hist.* 251. t. 252.

Habitat in Hispania. 2

Zonquilla. 5. NARCISSUS spatha multiflora, nectario campanulato brevi, foliis subulatis. *Hort. upf.* 75.

Narcissus foliis subulatis, florum nectario brevissimo
Hort. cliff. 134. *Roy. lugdb.* 35. *Sauv. monsp.* 19.

Narcissus juncifolius luteus minor, *Baub. pin.* 51.

Narcissus juncifolius, oblongo calyce, luteus major.
Baub. pin. 51.

Narcissus juncifolius minor & 2. *Clus. hist.* 1. p. 60.

Habitat inter Hispalim & Gades inter Guadalopam &
Toletum in uliginosis. 2

Tazetta. 6. NARCISSUS spatha multiflora, nectario campanulato, foliis planis. *Hort. upf.* 74.

Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario campanulato erecto petalis longe breviore. *Hort. cliff.* 134.
Roy. lugdb. 35,

Narcissus medio-luteus, copioso flore: odore gravi.
Baub. pin. 50.

Narcissus luteus polyanthos lusitanicus. *Baub. pin.* 50.

Narcissus flore pleno, 1. 2. *Clus. hist.* 1. p. 50.

Habitat in Galliae Narbonensis, Lusitaniae, Hispaniae maritimis. 2

PANCRATIUM.

zeylanicum. 1. PANCRATIUM spatha uniflora, petalis reflexis. *Fl. zeyl.* 126.

Narcissus zeylanicus, flore albo hexagono odorato.
Herm. lugdb. 691. t. 093. *Comm. hort.* 1. p. 75. t. 38.

Catulli-pola. *Rheed. mal.* 11. p. - t. 40.

Habitat in India. 2

mexicanum. 2. PANCRATIUM spatha biflora. *Hort. cliff.* 133.
Roy. lugdb. 34.

Pau-

Pancratium mexicanum, flore gemello candido. *Dill.*
elth. 299. *t.* 222. *f.* 289.

Habitat in Mexico. ♀

3. *PANCRATIUM spatha multiflora*, foliis lanceolatis. *caribicum*
Hort. cliff. 133.

Narcissus americanus, flore multiplici albo hexagono
 odorato. *Comm. hort.* 2. *p.* 173. *t.* 87.

Narcissus totus albus latifolius polyanthos major odoratus. *Sloan. jam.* 115. *hist.* 1. *p.* 244. *Mart. cent.* 27.
t. 27.

Habitat in Jamaica, Caribæis. ♀

4. *PANCRATIUM spatha multiflora*, petalis planis, foliis lingulatis. *maritimum*

Narcissus maritimus. *Baub. pin.* 34.

Lilio-Narcissus albus maritimus minor. *Moris. hist.* 2.
p. 365. *f.* 4. *t.* 10. *f.* 28. *

Hemerocallis valentina. *Clus. hist.* 1. *p.* 167.

Habitat in Hispaniæ maritimis circa Valentiam & in
fra Monspelium. ♀

5. *PANCRATIUM spatha multiflora*, foliis linearibus, *Carolina*
staminibus nectarii longitudine. *illyricum.*

Lilio-Narcissus polyanthos, flore albo. *Catesb. car.* 3.
p. 5. *t.* 5.

Habitat in Jamaica, Carolina. ♀

6. *PANCRATIUM spatha multiflora*, foliis ensiformi-*illyricum*,
bus, staminibus nectario longioribus. *Roy. Ingdb.* 34.

Narcissus illyricus Iiliaceus. *Baub. pin.* 55. *Seb. thes.*
I. p. 17. *t.* 8. *f.* 1.

Lilionarcissus hemeroeallidis facie. *Best. eyst. vern.* 3.
t. 16. *f.* 1.

Habitat in Illyria? ♀

7. *PANCRATIUM spatha multiflora*, foliis ovatis ner-*amboinenſis*
vosis.

Narcissus amboinenſis, folio latifimo subrotundo.
Comm. hort. 1. *p.* 7; *t.* 39.

Habitat in Ambonia. ♀

CRINUM.

1. *CRINUM* foliis ovato-lanceolatis acuminatis sessilibus *latifolium*.
planis.

Sjovanna-pola-tali. *Rheed. mal.* 11. *p.* 77. *t.* 39.
Habitat in Afriæ arenosis. ♀

Folia. 3. s. 4. digitos transversos lata, a basi sensim attenuata Antheræ filiformes, lineares, incumbentes, longitudine dimidii filamenti s. corolla.

- spatium.* 2. CRINUM foliis carinatis. *Fl. zeyl.* 127.
Lilium zeylanicum bulbiferum & umbelliferum. *Herm lugdb.* 682. t. 683.
Tanghekolli. Rheed. mal. II. p. 75. t. 38.
Habitat in Malabar, Zeylona. 2

- americanum* 3. CRINUM corollarum apicibus introrsum unguiculatis.
Crinum. Hort. cliff. 127. *Hort. upps.* 76. *Roy. lugdb.* 37.
LilioAsphodelus americanus sempervirens maximus polyanthus albūs. Comm. rar. 14. t. 14. *Dill. elth.* 194. t. 160. f. 195.
B. LilioAsphodelus americanus sempervirens minor albus. Comm. rar. 15. t. 15.
Habitat in America. 2

- africanum.* 4. CRINUM foliis sub lanceolatis pianis, corollis obtusis.
Polianthes floribus umbellatis. Vir. cliff. 29. *Hort. cliff.* 126. *Roy. lugdb.* 27.
Hyacinthus africanus tuberosus, flore cæruleo umbellato. Breyn. prodr. I. p. 39. icon. 23. t. 10. *Comm. hort.* I. p. 133. t. 67. *Seb. thes.* I. p. 29. t. 19. f. 4.
Hyacintho affinis, tuberosa radice, africana, umbella cærulea inodora. Pluk. alm. 187. t. 195. f. 1.
Habitat in Æthiopia.

AMARYLLIS.

- Inter.* 1. AMARYLLIS spatha uniflora, corolla æquali, staminibus declinatis. *Hort. cliff.* 135. *Roy. lugdb.* 36.
Narcissus autumnalis major. Clus. hist. I. p. 164.
Colchicum luteum t. majus. Baub. pin. 69.
Habitat in Hispania, Italia, Thracia. 2
- Itamasca.* 2. AMARYLLIS spatha uniflora, corolla æquali, pistillo declinato. *Hort. cliff.* 135. *Gron. virg.* 36. *Roy. lugdb.* 36.
LilioNarcissus virginianus. Catesb. car. 3. p. 12. t. 12.
LilioNarcissus liliiflorus carolinianus, flore albo singulare cum rubidine diluto. Pluk. alm. 220. t. 43. f. 3.
LilioNarcissus indicus pumilus monanthos albus. Moris. hist. 2. p. 266. f. 4. t. 24. f. 4.
Habitat in Virginia. 2

3. AMA-

3. AMARYLLIS spatha uniflora, corolla inæquali, genitibus declinatis. *Hort. cliff.* 135. *Hort. upf.* 75.
Aet. Stockb. 1742. p. 93. t. 6. *Roy. lugdb.* 36.
 LilioNarcissus jacobæus, flore sanguineo nutante. *Dill. elth.* 195. t. 162. f. 196.
Narcissus jacobæus major. *Rudb. elys.* 2. p. 89. f. 10.
Habitat in America meridionali. 2
4. AMARYLLIS spatha multiflora, corollis campanula-*Bella donna.*
 tis æqualibus, genitalibus declinatis. *Hort. cliff.* 135.
Roy. lugdb. 36.
 LilioNarcissus polyanthos, flore incarnato: fundo ex luteo albescente. *Sloan. jam.* 115. *hist.* 1. p. 244. *Seb. thes.* 1. p. 25. t. 17. f. 1.
Lilium rubrum. *Merian. Surin.* 22. t. 22.
Habitat in Caribæis, Barbados, Surinama. 2
5. AMARYLLIS spatha multiflora, corollis revolutis, *farniensis.*
 genitalibus strictis. *Hort. upf.* 75.
 Amaryllis spatha multiflora, corollis æqualibus patentissimis revolutis, genitalibus longissimis. *Hort. cliff.* 131.
Roy. lugdb. 36.
Narcissus japonicus, rutilo flore. *Corn. canad.* 157. t. 158. *Rudb. elys.* 2. p. 23. f. 14.
Lilium farniense. *Dugl. monogr.* t. 1. 2.
Habitat in Japonia, nunc in Sainiæ insula Anglia. 2
6. AMARYLLIS spatha multiflora, corollis campanula-*zeylanica.*
 latis æqualibus, scapo tereti ancipiti. *Roy. lugdb.* 36.
 LilioNarcissus zeylanicus latifolius, flore niveo externe linea purpurea striato. *Comm. hort.* 1. p. 73. t. 73.
 6. LilioNarcissus africanus, scillæ foliis, flore niveo linea purpurea striato. *Ehret. pict.* 5. f. 2.?
Habitat in Zeylona. 2
7. AMARYLLIS spatha multiflora, corollis campanula-*longifolia.*
 latis æqualibus, scapo compresso longitudine umbellæ.
Roy. lugdb. 36.
Lilium africanum humile, longissimis foliis, polyanthos saturato colore purpurascens. *Herm. parad.* 195. t. 195.
Habitat in Æthiopia. 2
8. AMARYLLIS spatha multiflora, corollis inæqualibus, *orientalis.*
 foliis lingviformibus. *Büttr. cunon.* 215.
 Amaryllis spatha multiflora, foliis ovato-oblongis obtusis. *Roy. lugdb.* 37.

LilioNarcissus indicus maximus sphæricus, floribus plurimis rubris liliaceis. *Moris. hist.* 2. p. 568. f. 4. t. 10. f. 35.

Narcissus indicus orientalis. *Swert. flor.* 31. f. 1.
Habitat in India. 2

guttata. 9. AMARYLLIS spatha multiflora, foliis ciliatis.

LilioNarcissus sphæricus æthiopicus, foliis guttatis & ciliis instar pilosis. *Pluk. alm.* 220.

Lilium africanum sphæricum, floribus obsolete puniceis minoribus, foliis guttatis ad margines ciliis instar pilosis, bulbo longo. *Herm. lugdb.* 375.

Habitat in Æthiopia.

BULBOCODIUM.

vernum. 1. BULBOCODIUM foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 41.

Bulbocodium. *Hort. cliff.* 133.

Colchicum vernum hispanicum. *Baub. pin.* 69. *Rudb. elys.* 2. p. 128. f. 2.

Colchicum vernum. *Clus. hist.* 2. app. 203.

Habitat in Hispania. 2

serotinum. 2. BULBOCODIUM foliis subulato-linearibus. *Roy. lugdb.* 41.

Bulbocodium alpinum juncifolium, flore unico: intus albo extus squalide rubente. *Raj. angl.* 3. p. 374. t. 17. f. 1.

Pseudo-Narcissus gramineo folio. *Baub. pin.* 51. *prodr.* 27. *Rudb. elys.* 2. p. 64. f. 9.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Angliæ. 2

APHYLLANTHES,

monspeliensis 1. APHYLLANTHES. *Hort. cliff.* 493. *Sauv. monsp.* 8.

Aphyllanthes monspeliensiun. *Lob. adv.* 190. *Baub. hist.* 3. p. 336.

Caryophyllum cæruleus monspeliensium. *Baub. pin.* 209. *Moris. hist.* 2. p. 562. f. 5. t. 25. f. 12.

Habitat Monspelii prope Castelneuf locis montosis saxosis sterilibus.

ALLIUM.

* *Foliis caulinis planis.*

Ampelopra-jum. 1. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspidatis, radice laterali.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, flotibus sphærice congestis, radice laterali solida. *Hall. all.* 5. *Por-*

Porrum radice laterali solida, foliis linearibus, caule erecto, umbella subglobosa. *Roy. lugdb.* 40.

Allium sphærico capite, folio latiore f. *Scorodoprasum alterum.* *Baub. pin.* 74. *Rudb. elys.* 2. p. 151. *

Habitat in Oriente, inque insula Holms Angliae.

3. ALLIUM caule planifolio umbellifero, staminibus *Porrum tricuspidatis*, radice tunicata. *Hort. upf.* 77. *Mat. med.* 165.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus sphærice congestis, radice tunicata cauli circumnata. *Hall. all.* 5.

Porrum radice ambiente tunicata oblonga solitaria. *Hort. cliff.* 136. *Roy. lugdb.* 40.

Porrum commune capitatum. *Baub. pin.* 72.

Porrum sativum latifolium. *Baub. pin.* 72.

Habitat - - - -

3. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella glo- *lineare.* bosa, staminibus tricuspidatis corolla longioribus.

Porrum caule tereti folioso, foliis linearibus planis, umbella globosa, staminibus corolla longioribus.

Gmel. sibir. 1. p. 56. t. 13. & 14. f. 1.

Habitat in Sibiria.

4. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella gio- *Victoriae.* bosa, staminibus lanceolatis corolla longioribus. *Mat. med.* 163.

Allium foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis.

Roy. lugdb. 39.

Allium radice oblonga reticulo obducta. *Hall. all.* 17.

Allium montanum latifolium maculatum. *Baub. pin.*

74.

Allium anguinum. *Cam. epit.* 329.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Italiae.

5. ALLIUM caule planifolio umbellifero, foliis inferio- *sabbiratum.* ribus hirsutis, staminibus subulatis.

Allium foliis radicalibus subhirsutis, caulinis glabris, floribus umbellatis. *Hall. all.* 15.

Allium foliis lanceolato-linearibus, florum umbella fastigiata. *Roy. lugdb.* 39.

Moly angustifolium umbellatum. *Baub. pin.* 75.

Moly dioscoridis. *Clus. hist.* 1. p. 192.

Habitat in Africa, Italia, Hispania.

6. ALLIUM caule planifolio umbellifero, ramulo bulbifero, staminibus simplicibus.

*Allium caule tereti, propagine ex ala Hort. cliff. 137.
Rev. tugdb. 39. Sauv. monsp. 18.*

Allium solis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis, ex ala bulbiferum. Hall. ali. 19.

Moly latifolium liliorum. Baub. pin. 75.

Moly indicum, flore purpureo. Swert. Fl. 61.

Habitat - - - - -

- obliquum.* 7. ALLIUM caule planifolio umbellifero, staminibus filiformibus flore triplo longioribus, foliis obliquis.

Allium radice tunicata, foliis planis linearibus caulinis, capitulo umbellato. Gmel. sibir. 1. p. 49. t. 9.

Habitat in Sibiria.

Caulis biseudalis, teres. Folia alterna, plano-canaliculata, obliqua. Vaginis teretibus. Umbella globosa; Spatha globosa, acuminata. Petala ovata, erecta, concava, flava carina viridi. Filamenta albida, corolla duplo longiora. Antheræ luteæ. Germen subglobosum.

- venerosum.* 8. ALLIUM caule subplanifolio umbellifero, staminibus subulatis longioribus; umbella globosa, foliis linearibus subconvexis.

Allium scapo nudo tereti farcto, foliis semicylindricis, staminibus corolla longioribus. Gmel. sibir. 1. p. 52. t. 9. f. 1.

Habitat in Sibiria. G. Demidoff

Caulis ferme bipedalis, teres. Folia alterna, planiscula, canaliculata, subtus convexa, margine obtusa. Umbella globosa. Petala ovata, purpurascens carina saturatiore. Filamenta purpurea, corolla parum longiora. Antheræ violaceæ. Germen subrotundum: maculis 3, viridibus & medio caule ex ala folio opposita. Ramus nudus, longitudine caulis.

- reflexum.* 9. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella fastigiata, staminibus corollam æquantibus, foliis laevibus. †

Allium foliis ensiformibus, radice bulbillis stipata, floribus amplis umbellatis. Sauv. monsp. 42.

Allium sylvestre f. Moly minus, roseo amplio flore. Magn. monsp. II. t. 10.

Habitat Monspelii in vicinis

- fativum.* 10. ALLIUM caule planifolio bulbifero, radice composita, staminibus tricuspidatis. Hort. upf. 76. Mat. med. 164.

Al-

Allium radiois bulbo multipartito, capitulo bulbifero, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 137. *Roy. Ind. 39.*

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, capite bulbifero, radicibus in unum bulbum congruentibus. *Hall. all.* 3.

Allium sativum. *Baeh. pin.* 73.

Allium. *Cam. epit.* 328.

Habitat in Sicilia.

11. *ALLIUM* caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis: vaginis ancipitibus, staminibus tricuspidatis. *Hort. upf.* 77. *Scorodoneum primum.*

Allium capitulo bulboso erecto, foliis planis subcrenatis, vaginis ancipitibus. *Fl. suec.* 266. *It. xl.* 60.

Allium staminibus alterne trifidis, capite bulbifero, foliis gramineis leviter ferratis. *Hall. all.* 3.

Allium montanum bicorne latifolium, flore dilute purpurealcente. *Baeh. pin.* 74. *Rub. elys.* 2. p. 155.*

β. *Allium staminibus alterne trifidis, capite bulbifero, scapo ante maturitatem contorto,* *Hall. all.* 2.

Allium sativum alterum s. Allioprasum caulis summo circuinvoluto. *Baeh. pin.* 73.

Allii genus Ophioscorodon dictum quibusdam. *Baeh. hist.* 2. p. 559.

Porrini radice laterali cordata solida, pedunculo revoluto, capite bulbifero. *Hort. cliff.* 136.

Habitat in Oelandia, Dania, Pannonia.

2. *ALLIUM* caule planifolio bulbifero, vaginis teretibus, spatha mutica, staminibus tricuspidatis. *It. can.* 227. *arenarium.*

Porrini planifolium, staminibus alterue trifidis, umbella bulbifera. *Rupp. hall.* 154. t. 2. f. 2.

Habitat in Thuringia; in Falschia Scaniæ.

13. *ALLIUM* caule planifolio bulbifero, staminibus subcarinatis.

Allium umbella bulbifera, vagina bicormi, foliis carinatis. *Hall. all.* 24. t. 1. f. 2.

Ampeloprasum proliferum. *Lob. ic.* 156. *

β. *Allium montanum bicorne angustifolium, flore dilute purpurealcente.* *Baeh. pin.* 74.

Allium s. Moly montanum 2. *Clus. hist.* 1. p. 195.

Habitat in Germania.

* *Foliis caulinis teretibus.*

4. *ALLIUM* caule teretifolio umbellifero, foliis semi-teretibus, staminibus tricuspidatis corolla longioribus. *sphaerocarpa* *lon.*

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, radice multiplici, floribus sphærice congestis. *Hall. all. 7.*
Porrum caule tereti folioso, foliis linearibus planis, umbella globosa, staminibus corolla longioribus. *Gmel. fib. 1. p. 56. t. 13. & 14. f. 1.*

Allium montanum, capite rotundo *Baub. pin. 75. Rudb. elys. 1. p. 157. f. 7.*

Allium f. *Moly* montanum, purpureo flore. *Clus. bist. 1. p. 195.*

Allii genus forte *Scorodoprasum* alterum. *Baub. bist. 2. p. 564.*

Scorodoprasum montanum juncifolium, capite-rotundo dilute janthino, floribus paucis. *Mich. gen. 25. t. 24. f. 2.*

Habitat in Italia, Sibiria, Helvetia.

descendens. 15. **ALLIUM** caule subteretifolio umbellifero, pedunculis exterioribus brevioribus, staminibus tricuspidatis. *Hort. upf. 78.*

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite svave rubente sphærico non bulbifero, radice laterali. *Hall. all. 8.*

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite sphærico non bulbifero atropurpureo. *Hall. all. 9. t. 1. f. 1.*

Allium f. *Moly* latifolium, capite sphærico, flore purpureo. *Rudb. elys. 2. p. 160. f. 20.*

Moly atropurpureum. *Rudb. elys. 2. p. 165. f. 13.*
Habitat in Helvetia.

moschatum. 16. **ALLIUM** caule teretifolio subnudo umbellifero, umbella fastigiata. petalis truncatis, staminibus tricuspidatis. *Læfl.*

Allium foliis teretibus caulinis, floribus umbellatis. *Hall. all. 14.*

Moly moschatum, capillaceo folio. *Baub. pin. 76. prodr. 28. t. 28. Rudb. elys. 2. p. 166. f. 14.* Sauv. monsp. 10.*
*Habitat in GalloProvinciæ, Narbonæ, Hispaniæ apri-
cis elevatis.*

flavum. 17. **ALLIUM** caule teretifolio umbellifero, umbella glo-
bosa, staminibus subulatis.

Allium umbella non bulbifera lutea, vagina bicorni, fo-
liis teretibus. *Hall. all. 21.*

Allium montanum bicorne, flore pallido odore. *Baub. pin. 75.*

Allium s. Moly montanum 4. *Clas. hist.* I. p. 216.
Habitat in Pannonia.

18. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, staminibus tri- *vineale*
 cuspidatis.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, ca-
 pite bulbifero, radice multiplici. *Hall. all.* 4.

Allium sylvestre campestre purpurascens. *Baub. pin.* 74.

Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens
 majus. *Baub. pin.* 74.

Porrum sylvestre vinearum. *Baub. pin.* 72.

Porrum sylvestre, gemino capite. *Baub. pin.* 72.

Habitat in Germania.

19. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, foliis scabris *oleracum*.
 semiteretibus subtus sulcatis.

Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis tereti-
 bus. *Hall. all.* 23. f. 4.

Cepa capitulo bulboſo prolifero, foliis semiteretibus no-
 vemangularibus scabris fistulosis. *Fl. suec.* 265. *

Porrum radice solida, caule erecto, capitulo bulbifero.
Roy. lugd. 40. Gort. gelr. 69.

Allium montanum bicorne, flore exalbido. *Baub. pin.*
 75.

Habitat in Suecia, Germania.

* *Foliis radicalibus, scapo nudo.*

20. ALLIUM scapo nudo ancipi, foliis linearibus pla- *nutans*.
 nis, staminibus tricuspidatis. *Hort. ups.* 80.

Porrum scapo nudo ancipi, antequam floruerit nutan-
 te, foliis ensiformibus: hinc paullo convexioribus.
Gmel. fibir. I. p. 55. t. 18.

Habitat in Sibiria.

21. ALLIUM scapo nudo ancipi, foliis linearibus sub- *senescens*.
 tus convexis laevibus, umbella subrotunda, stamini-
 bus subulatis. *Hort. ups.* 79.

Allium caule ancipi teretiusculo, foliis ensiformibus:
 hinc paullo convexioribus. *Gmel. fibir.* I. p. 53. t. II.
 f. 2.

Allium foliis linearibus, florum umbella subglobosa.
Roy. lugd. 39.

Allium radice bulbosa, foliis gramineis, umbella erecta
 non bulbifera, vaginis brevissimis. *Hall. helv.* 297.
all. 16. n. 2.

Allium montanum, foliis narcissi, majus. *Baub. pin.* 75.
Habi-

Habitat in Sibiria, Sicilia.

Petala erecta, a se invicem oblongatae & distantia, canaliculata, inflexa.

angulosum. 22. ALLIUM scapo nudo ancipi, foliis linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umbella fastigiata. *Hort. upf.* 79. *

Cepa scapo nudo subangulato farcto, foliis linearibus subtus angulosis, staminibus corolla brevioribus. *Gmel. sibir.* 1. p. 58. t. 14. f. 2.

Allium radice senescente liguosa transversa, umbella erecta. *Hall. all.* 16.

Allium petræum umbelliferum. *Baub. hist.* 2. p. 564. t. 564.

Allium montanum, foliis narcissi, minus. *Baub. pin.* 75. *Habitat in Sibiriae humidiis vallis.*

Folia interdum subtus vix angulata, at Scapus superne parum angulato-striatus; Petala interiora apice patentia, omnia lateribus conniventia.

Confer Allium sylvestre s. Moly minus, violaceo ampio flore. *Magn. monsp.*

ursinum. 23. ALLIUM scapo nudo semioylindrico, foliis lanceolatis petiolatis, umbella fastigiata.

Allium foliis lanceolatis, scapo nudo semicylindraceo, bulbo setis obvaliato. *Fl. suec.* 262. *It. gotl.* 169.

Allium foliis radicalibus petiolatis, floribus umbellatis. *Roy. lugdb.* 39. *Hall. all.* 18. *Gmel. sib.* 1. p. 49.

Allium foliis lanceolatis, umbella laxa. *Hort. cliff.* 27.

Allium sylvestre latifolium. *Baub. pin.* 74.

Allium ursinum. *Fuchs. hist.* 739. *Cam. epit.* 330.

Habitat in Europæ septentrionalioris nemorosis.

triquetrum. 24. ALLIUM scapo nudo triquetro.

Allium caule triangulo. *Fournes. inst.* 385. *Roy. lugdb.* 39.

Moly parvum. caule triangulo *Baub. pin.* 75.

Moly caule & foliis triangularibus. *Park. par.* 142. t. 143. f. 4.

Habitat in Hispania.

Cepa. 25. ALLIUM scapo nudo inferne ventricoso longiore foliis teretibus. *Hort. upf.* 77. *Mat. med.* 166.

Allium staminibus alterne trifidis, caule ad terram ventricoso. *Hall. all.* 10.

Cepa scapo nudo ventricoso foliis longiore, radice depressa. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 40.

Ce-

Cepa vulgaris. Baub. pin. 71.

Cepa. Cam. epit. 324.

Habitat - - - -

26. ALLIUM scapo nudo subcylindrico, foliis lanceo-^{Moly.}
latis sessilibus, umbella fastigiata. Hort. upf. 76.

Allium foliis radicalibus sessilibus lanceolatis, floribus
umbellatis. Roy. lugdb. 38. Hall. all. 20.

Allium foliis lanceolatis; umbella laxa. Hort. cliff. 27.

Moly latifolium luteum, odore allii. Baub. pin. 75.

Moly flavo flore. Swert. flor. I. t. 60. f. 2.

Moly montanum latifolium, flavo flore. Clus. app. alt.

Habitat in Hungaria, Baldo, Monspelii.

Petala patentia, tria exteriora magis patentia, interiora
ejecta.

27. ALLIUM scapo nudo folia adæquante, foliis terci-^{fistulosum.}
bus ventricosis. Hort. upf. 78.

Allium staminibus simplicibus, caule medio ventricoso.
Hall. all. 11

Cepa scapo longitudine foliorum, foliis ventricosis, ra-
dice oblonga. Hort. cliff. 136. Roy. lugdb. 40.

Cepa oblonga. Baub. pin. 71. Dod. pempt. 687.

Habitat in - - - -

28. ALLIUM scapo nudo adæquante folia teretia subu-^{Schœnopras-}
lato-filiformia. Hort. upf. 48. ^{sum.}

Allium staminibus simplicibus, foliis radicalibus tereti-
bus scapi longitudine. Hall. all. 12.

Cepa scapis foliisque subulatis teretibus fistulosis æquali-
bus, spathis globosis. Fl. suec. 264. It. xl. 54. 64.

Cepa scapo longitudine figuraque foliorum, foliis subu-
latis filiformibus, spathis globosis. Hort. cliff. 136.

Porrum sectivum jucifolium. Baub. pin. 72.

Schœnoprasum. Dod. pempt. 689.

β. Cepa scapis foliisque teretibus, capitulis pyramidatis.
Gmel. sibir. I. p. 59. t. 15. f. 1.

Cepa palustris altissima. Buxb. cent. 4. p. 27. t. 45.

Habitat in alpestribus Sibiriae, Oelandiæ locis rupestribus.

29. ALLIUM scapo nudo tereti inani. foliis subulatis si-^{tenuifimum.}
liformibus, capitulis laxis paucifloris. Gmel. sibir. I.
p. 61. t. 15. f. 2.3.

Habitat in Sibiria.

30. ALLIUM scapo nudo subnullo, foliis linearibus. ChamaMoly
Moly humile, folio gramineo. Baub. pin. 75.

Cham-

ChamæMoly, an Moly dioscoridis. *Column. ephr.* 325

t. 326.

Habitat in Italia.

LILIUM.

candidum.

1. LILIUM foliis sparsis, corollis campanulatis: intus glabris. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upf.* 80. *Mat. med.* 173. *Roy. lugdb.* 30.

Lilium album, flore erecto, vulgare. *Baub. pin.* 76.

Lilium candidum. *Dod. pempt.* 197.

2. *Lilium album, floribus dependentibus, s. peregrinum.* *Baub. pin.* 76.

Habitat in Palæstina, Syria. 2

bulbiferum. 2. LILIUM foliis sparsis, corollis campanulatis erectis intus scabris. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upf.* 80. *Roy. lugdb.* 31. *Gmel. fibir.* 1. p. 41.

Lilium purpureo-croceum majus. *Baub. pin.* 76.

- β. *Lilium purpureo-croceum, flore pleno.*

- γ. *Lilium purpureo-croceum minus.* *Baub. pin.* 77.

- δ. *Lilium phœnicium.* *Baub. pin.* 77.

- ε. *Lilium bulbiferum latifolium majus.* *Baub. pin.* 77.

- ζ. *Lilium bulbiferum angustifolium.* *Baub. pin.* 77.

- η. *Lilium bulbiferum minus.* *Baub. pin.* 77.

- θ. *Lilium bulbiferum incanum.* *Baub. pin.* 77.

Habitat in Italia, Austria, Sibiria. 2

pomponium. 3. LILIUM foliis sparsis subulatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upf.* 81. *Roy. lugdb.* 31.

Lilium iadice tunicata, foliis sparsis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Gmel. fibir.* 1. p. 42.

Lilium, floribus reflexis, angustifolium. *Baub. pin.* 78.

Lilium rubrum præcox. *Clas. hist.* 1. p. 133.

- ι. *Lilium miniatum angustifolium.* *Baub. pin.* 79.

- γ. *Lilium brevi & gramineo folio.* *Baub. pin.* 79.

Habitat in Pyrenæis, Sibiria. 2

Folia linearia, acuta, triquetra, canaliculata, sparsa.
Nectarii rima valde dentata.

chalcondyl-
eum.

4. LILIUM foliis sparsis lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upf.* 81. *Roy. lugdb.* 31.

Lilium byzantinum miniatum. *Baub. pin.* 78.

Lilium rubrum s. miniatum byzantinum. *Clas. hist.* 1. p. 131.

β Li-

- β. *Lilium byzantinum miniatum polyanthos.* Baub. pin. 78.
 γ. *Lilium purpuro-sangvineum, flore reflexo.* Baub. pin. 78.
Hemerocallis calcedonica. Lob. ic. 169.
Habitat in Persia. ♀
Racemos ante florescentiam vix incurvatus ut in 3. 5.
et Caulis usque ad apicem Foliis vestitus confertis.
5. **LILIUM** foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis *Martagon.*
 revolutis. Hort. cliff. 420. Hort. upf. 81. Gmel. fibir.
 I. p. 44. Roy. lugdb. 31.
Liliun, floribus reflexis, latifolium. Baub. pin. 77.
Lilium sylvestre. Dod. pempt. 201.
- β. *Lilium, floribus reflexis, alterum hirsutum.* Baub. pin. 78.
Habitat in Hungaria, Helvetia, Sibiria, Lipsiæ.
6. **LILIUM** foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis *canadense.*
 campanulatis.
Lilium angustifolium, flore flavo maculis nigris distin-
ceto. Tournef. inst. 371. Barr. rar. 778. t. 125.
Lilium Martagon canadense maculatum. Moris. hist. 2.
 p. 408. f. 4. t. 20. f. 9.
Lilium s. Martagon canadense, floribus magnis flavis
non reflexis. Catesb. car. 3. p. 11. t. 11.
Habitat in Cauada. ♀
7. **LILIUM** foliis verticillatis, flore erecto, corolla *cam-* *camschat-*
panulata. Amœn. acad. 2. p. 348. * *cense.*
Habitat in Canada, Camschatca.
 e *Camschatca planta petalis ovatis sessilibus, stigmati-*
bus tribus absq[ue] stylo; e Canada petalis lanceolatis
unguiculatis cum stylo; varietates tamen fuere.

FRITILLARIA.

1. **FRITILLARIA** racemo comoso inferne nudo, fo- *imperialis.*
 liis integerrimis. Hort. upf. 82.
Petilium foliis caulinis. Hort. cliff. 119. Roy. lugdb. 30.
Lilium s. Corona imperialis: genus. Baub. pin. 79.
Tusai. Clus. hist. 1. p. 127. 128.
Habitat in Persia? e Constantiopoli venit in Europam
circa 1570. ♀
2. **FRITILLARIA** racemo comoso inferne nudo, fo- *regia.*
 liis crenatis.
Corona regalis, lilii folio crenato. Dill. eltb. 110. t. 93.
 f. 109.
Habitat ad Cap. b. Spei.

FRI-

- persica.* 3. FRITILLARIA racemo nudiusculo, foliis obliquis.
Hort. upf. 82.
 Fritillaria racemo nudo terminali. *Hort. cliff.* 119.
 Fritillaria radice rotunda. *Roy. lugdb.* 30.
 Lilium persicum. *Bauh. pin.* 79.
 Lilium susianum. *Clus. hist.* 1. p. 130.
Habitat in Persia? e Susis venit in Europam 1573. 2
- pyrenaica.* 4. FRITILLARIA foliis infimis oppositis. *Hort. cliff.* 81.
 Fritillaria flore minore. *Bauh. pin.* 64.
 Fritillaria pyrenæa. *Clus. hist.* 2. p. 256. *posth.* 10.
Habitat in Pyrenæis. 2
- Meleagris.* 5. FRITILLARIA foliis omnibus alternis. *Hort. upf.* 81.
 Fritillaria e foliorum alis florens. *Hort. cliff.* 119.
 Fritillaria radice depressa. *Roy. lugdb.* 30.
 Fritillaria præcox purpurea variegata. *Bauh. pin.* 64.
 Meleagris. *Reneal. spec.* 147. t. 146.
6. Fritillaria alba variegata. *Bauh. pin.* 64.
 7. Fritillaria alba præcox. *Bauh. pin.* 64.
 8. Fritillaria serotina atropurpurea. *Bauh. pin.* 64.
Habitat in Gallia, Italia 2

UVULARIA.

- amplexicaulia* 1. UVULARIA foliis amplexicaulibus.
 Uvularia foliis cordato-oblongis. *Roy. lugdb.* 29.
 Smilax perfoliata ramosa, flore albo. *Barr. rar.* 58, t.
 720.
 Polygonatum latifolium ramosum. *Bauh. pin.* 302. *Bauh.*
hist. 3. p. 531. *Moris. hist.* 3. p. 537. f. 13. t. 4. f. 11.
Raj. hist. 665.
 Polygonatum latifolium 4 ramosum. *Clus. hist.* 1. p.
 276.
 Laurus alexandrina. *Cam. epit.* 936
Habitat in Bohemiæ, Silesiæ, Saxoniæ, Delphinatus mon-
tibus. 2
- perfoliata.* 2. UVULARIA foliis perfoliatis. *Amœn. Acad.* 2. p. 337
 Uvularia caule perfoliato. *Gron. virg.* 37. *Cold. no-*
veb. 74.
 Uvularia folio integeriunc. *Roy. lugdb.* 29.
 Uvularia. *Hort. cliff.* 121.
 Polygonum ramosum, flore luteo, majus. *Corn. canad.*
 35. *Moris. hist.* 3. p. 538. f. 13. t. 4. f. 12.
Poly-

Polygonatum latifolium persoliatum brasiliense. Bauh.
pin. 303. prodr. 139. Bur. XVII. 61.

Habitat in Virginia, Canada. plantæ Burseri ex Toupi-
nambault Brasiliæ apharinacopæ allatae, & C.B. com-
municatae videntur mihi omnes ex Canada suisse.

3. **UVULARIA** foliis sessilibus. sessilibus.
Uvularia foliis sessilibus, flore unico. Col. nove. 73.
Habitat in Canada. Kalm.
Habitus præcedentis; Caulis bifidus, uniflorus. Folia
lanceolato-ovata, alterna, at ubi Flos ex altero ramo
exit, folia bina adsunt. Pedunculus nudus.

GLORIOSA.

1. **GLORIOSA.** *Hort. cliff. 121. Fl. zeyl. 122. Roy. superba,*
lugdb. 29.
Methonica malabarorum. Herm. lugdb. 688. t. 689.
Plak. alm. 249. t. 116. f. 3.
Lilium zeylanicum superbum. Comm. hort. 1. p 69. t.
31.
Mendoui. Rheed. mal. 7. t. 107. f. 57.
Habitat in Malabararia. 2

ERYTHRONIUM.

1. **ERYTHRONIUM.** *Hort. cliff. 119. Gmel. sib. i. Dens canis*
p. 39. t. 7. Roy. lugdb. 30.
Dens canis latiore rotundioreque folio. Bauh. pin. 87.
Dens caninus. Dod. pent. 203.
 β . *Dens canis angustiore longioreque folio. Bauh. pin. 87.*
 γ . *Erythronium foliis ovato-oblongis glabris nigro macu-*
latis. Gron. virg. 151. flore flavo.
Habitat in Liguria, Allobrogibus, Augusta Taurinorum,
Sibiria, Virginia. 2

TULIPA.

1. **TULIPÆ** flore subinutante, foliis lanceolatis. sylvestris.
Tulipa minor lutea italica. Bauh. pin. 63.
Tulipa minor lutea gallica. Bauh. pin. 63. Sanv. monsp:
306.
Habitat Monspelii, inque Apenninis, Lundini. 2
Distinguitur a sequente: Caule altiore, Foliis angustiori-
bis, Floris colore luteo subtus virecente, petalis acu-
tioribus, Scapo versus florem inflexo & ante flore-
scentiam nutante. Sed præprioriis staminum filamen-
tis basi valde attenuatis, & supra basin hirsutis.

U

2. **TU.**

- gefueriana*. 2. TULIPA flore erecto, foliis ovato-lanceolatis.
Tulipa scapo triphylo, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. upf.* 82.
Tulipa. *Hort. cliff.* 118. *Roy. lugdb.* 31. *Fl. suec.* 262.
Tulipa (genus fere totum) *Bauh. pin.* 57.
Tulipa turcarum. *Cord. hist.* 213.
Habitat in Cappadocia, unde in Europam 1559. 2
- breyiana*. 3. TULIPA caule polyphylio, foliis linearibus.
Sisyrinchium, ex phoeniceo suaverubente flore, æthiopicum. *Breyn. cent.* t. 36. *Rudb. elys.* 2. p. 43. f. 11.
Habitat in Æthiopia. 2

ORNITHOGALUM.

- luteum*. 1. ORNITHOGALUM scapo angulo diphyllo, pedunculis umbellatis simplicibus. *Fl. suec.* 270.
Ornithogalum scapo diphyllo, pedunculis simplicibus terminalibus, filamentis omnibus subulatis. *Hort. cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 31.
Ornithogalum luteum. *Bauh. pin.* 71.
Pyrrochiton. *Reneal. spec.* 91. t. 90.
Habitat in Europæ cultis macellis. 2
- minimum*. 2. ORNITHOGALUM scapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis ramosis. *Fl. suec.* 271. *
Ornithogalum luteum minus. *Bauh. pin.* 71.
Hypoxis. *Reneal. spec.* 92.
Habitat in Europæ cultis oleraceis.
- hirsutum*. 3. ORNITHOGALUM scapo angulato, pedunculis umbellatis villosi.
Ornithogalum scapo bifloro. *Roy. lugdb.* 31.
Ornithogalum virginianum luteum. *Pet. gaz.* I t. 1. f. 3.
Ornithogalum luteum parvum virginianum, foliis gramineis hirsutis. *Pluk. alm.* 272. t. 350. f. 12.
Ornithogalum vernum luteum, foliis angustis hirsutis. *Gron. virg.* 37.
Habitat in Virginia, Canada.
Spec. 1. 2. 3. maxime affines sunt.
- bivalve*. 4. ORNITHOGALUM floribus umboellatis, spatha bivalvi. *Gron. virg.* 37. †
Habitat in Virginia.

- pyrenaicum*. 5. ORNITHOGALUM racemo longissimo, filamentis

tis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus aquilibus: fructiferis scapo approximatis.

Ornithogalum racemo longissimo, filamentis dilatato-linearibus, capsulis erectis. *It. scan.* 220.

Ornithogalum spica longissima, filamentis triangularibus. *Hall. helv.* 294.

Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virulentibus. *Baub. pin.* 70. *Rudb. clys.* 2. p. 134. f. 3.

Ornithogalum majus. *Clus. hist.* 1. p. 187.

Ornithogalum pyrenaicum. *Clus. cur.* 21.

Stachyoides. *Reneal. spec.* 93. t. 90.

Habitat in Alpibus Helvetici, Genevensibus, Pyrenaeis. 2

6. *ORNITHOGALUM racemo longissimo, foliis lanceolato-enfiformibus latifolium.*

Ornithogalum latifolium & maximum. *Baub. pin.* 70.

Ornithogalum vel Lilium alexandrinum, floribus albis innumerabilibus. *Swert. florit.* 58.

Habitat in Arabia, Ægypto.

Folia pedalia plus quam duos pollices lata. 2

7. *ORNITHOGALUM racemo conico, floribus numerosis adscendentibus pyramidale.*

inerosis adscendentibus. *Roy. lugdb.* 32.

Ornithogalum angustifolium spicatum maximum. *Baub. pin.* 70. *Rudb. clys.* 2. p. 134. f. 4.

Ornithogalum laetum maximum. *Bell. eyst. vern.* 5.t. 14. f. 2.

Habitat in collibus Lusitaniae. 2

* *Staminibus alternis emarginatis.*

8. *ORNITHOGALUM floribus corymbosis, pedunculis scapo humilioribus, filamentis emarginatis arabicum.*

lugdi. 32.

Ornithogalum umbellatum maximum. *Baub. pin.* 69.

Ornithogalum arabicum. *Clus. hist.* 11. p. 186. *Bell. eyst. vern.* 5. t. 12. f. 1.

Melanomphale. *Reneal. spec.* 89. t. 90.

Habitat juxta Alexandriam Ægypti. 2

9. *ORNITHOGALUM floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, filamentis emarginatis umbellatum.*

cliff. 124. *Hort. upf.* 84. *Roy. lugdb.* 32.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium.

Baub. pin. 70.

Eliocarmos. *Reneal. spec.* 88. t. 87.

Habitat in Germania, Gallia. 2

- suntans.* 10. ORNITHOGALUM floribus secundis pendulis, nectario stamineo campaniformi.
Ornithogalum floribus secundis pendulis, filamentis lati-
tis emarginatis. *Hort. cliff.* 124. *Hort. upf.* 84. *Roy.*
lugdb. 32.
Ornithogalum exoticum, magno flore minori innato.
Baub. pin. 70. *Rudb. elys.* 1. p. 137. f. 12.
Ornithogalum neapolitanum. *Clus. app.* 2. p. 9. t. 9.
Habitat in Italia Neapol. 2
- capense.* 11. ORNITHOGALUM foliis cordato-ovatis. *Roy.*
lugdb. 31.
Ornithogalum africanum, plantaginis roseæ folio, radi-
ce tuberosa. *Comm. bort.* 2. p. 175. t. 88.
Ornithogalo affinis radice tuberosa, cyclaminis folio, flo-
re pallide cæruleo. *Breyn. cent.* t. 41. *Rudb. elys.*
1. p. 138. f. 14.
Habitat ad Cap. b. Spei. 2
- canadense.* 12. ORNITHOGALUM petalis alternis patentibus: in-
terioribus erectis.
Ornithogalum luteo-virens indicum. *Corn. canad.* 160.
Rudb. elys. 2. p. 140. f. 7. *Raj. hist.* 1154.
β. Ornithogalum africanum, flore viridi: altero alteri inna-
to. *Herm. par.* 209. t. 209.
Habitat in Africa. 2

SCILLA.

- maritimum.* 1. SCILLA radice tunicata. *Hort. cliff.* 123. *Hort. upf.*
89. *Mat. med.* 162. *Roy. lugdb.* 32.
Scilla vulgaris, radice rubra. *Baub. pin.* 73.
Scilla hispanica. *Clus. hist.* 1. p. 171.
β. Scilla radice alba. *Baub. pin.* 73.
Habitat ad Hispaniæ, Siciliæ, Syriæ littoria arenosa. 2
- Lilia Hy-
cinthus.* 2. SCILLA radice squamata. *Hort. cliff.* *Roy. lugdb.* 32.
Hyacinthus stellaris, folio & radice liliæ. *Baub. pin.* 46.
Hyacinthus stellatus, liliæ folio. *Baub. pin.* 46.
Habitat in Biscaria, Aquitania, Hispania, Pyrenæis. 2
- italica.* 3. SCILLA radice solida, corymbo conferto hemisphæ-
rico.
Scilla radice solida, floribus corymbosis confertissimis.
Hort. cliff. 123. *Roy. lugdb.* 32.
Hyacinthus stellaris spicatus cinereus. *Baub. pin.* 46.
Hyacinthus stellaris italicus. *Besl. eyft. vern.* 42. f. 1.
Hya-

Hyacinthus stellatus cinerei coloris. *Clus. hist.* 1. p. 184.
Habitat. - - - - 2

4. *SCILLA* radice solida, corymbo conferto conico, *peruviana.*
Hyacinthus indicus bulbosus steliatus. *Baub. pin.* 47.
Rudb. elys. 1. p. 37. f. 1.
Hyacinthus stellatus peruanus. *Clus. hist.* 1. p. 182.
Habitat in Lusitania. 2
5. *SCILLA* radice solida, floribus lateralibus alternis sub-*amœna.*
nutantibus. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 33.
Hyacinthus stellaris cœruleus amœnus. *Baub. pin.* 46.
Rudb. elys. 2. p. 34. t. 7.
Hyacinthus stellaris bizantinus. *Besl. eyst. vern.* 43. f. 3.
Habitat forte Bizantii, unde venit in Europam 1590. 2
6. *SCILLA* radice solida, floribus erectiusculis pauciori-*bifolia.*
bus. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 33. *Sauv. monsp.* 18.
Hyacinthus stellaris bifolius germanicus. *Baub. pin.* 45.
Hyacinthus cœruleus mas minor. *Fuchs. hist.* 837.
Habitat in Gallia, Germania. 2
7. *SCILLA* radice solida, foliis filiformibus linearibus, *autumnalis.*
floribus corymbosis, pedunculis nudis adscendentibus
longitudine floris.
Scilla radice solida, foliis setaccis, floribus fastigiatis, pe-
dunculis arcuatis ex ala tuberculi mamillaris. *Guett.*
stamp. 131. *Dalib. paris.* 102.
Scilla radice solida, scapo multifloro, floribus capitatis.
Sauv. monsp. 19.
Hyacinthus stellaris autumnalis minor. *Baub. pin.* 47.
Hyacinthus autumnalis minor. *Clus. hist.* 1. p. 185.
Habitat in Hispania, Gallia, Verona solo glaroso. 2
8. *SCILLA* folio teretiusculo, laterc subspicato. *unifolia.*
Bulbus monophyllus, flore albo. *Baub. hist.* 2. p. 622.
Habitat in Lusitania.

ASPHODELUS

1. *ASPHODELUS* caule folioso, foliis triquetris fistulo-*luteus.*
fis. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upf.* 83. *Roy. lugdb.* 33.
Asphodelus luteus florc & radice. *Baub. pin.* 28.
Asphodelus semina. *Cam. epit.* 372.
Habitat in Sicilia. 3
2. *ASPHODELUS* caule nudo, foliis strictis subulatis *fistulosus.*
striatis subfistulosis. *Hort. cliff.* 83. *

Asphodelus caule nudo, foliis strictis. Roy. lugdbr. 34.
Asphodelus foliis fistulosis. Baub. pin. 29.
Asphodelus minor. Clas. hist. 1. p. 197.
Habitat in Gallo-Provincia, Hispania, Creta. 2

- ramosus.* 3. *ASPHODELUS caule nudo, foliis ensiformibus carinatis laevibus. Mat. med. 172.*
Asphodelus caule nudo, foliis laxis. Hort. cliff. 127.
Roy. lugdb. 24. Sauv. monsp. 20.
Asphodelus albus ramosus mas. Baub. pin. 28.
Asphodelus albus non ramosus. Baub. pin. 28.
Asphodelus. 1. 2. Clas. hist. 1. p. 197.
Habitat in Narbona, Lusitania, Hispania, Italia. 2

ANTHERICUM.

* *Phalangium foliis canaliculatis.*

- revolutum.* 1. *ANTHERICUM foliis planis, scapo ramoso, corollis revolutis.*
Asphodelus foliis compressis asperis, caule patulo. Tournet. inst. 343.
Habitat - - - - 2

- ramosum.* 2. *ANTHERICUM foliis planis, scapo ramoso, corollis planis.*
*Anthericum foliis planis, corollis planis deciduis. It. gotl. 178. * Fl. suec. 267.*
Anthericum caulibus ramosis, foliis planis. Guett. stamp. p. 129.
Phalangium, parvo flore, ramosum. Baub. pin. 29.
Phalangium majus. Cam. epit. 580.
Habitat in Europæ australioris rupibus calcareis. 2

- Lilago.* 3. *ANTHERICUM foliis planis, scapo simplicissimo.*
Hort. upf. 83. It. scan.
Anthericum caulibus non ramosis, foliis planis. Guett. stamp. 1. p. 128.
Phalangium, parvo flore, non ramosum. Baub. pin. 29. Moris. hist. 2. p. 333. s. 4. t. 1. f. 10.
Phalangium non ramosum. Lob. ic. 48.
Habitat in Helvetia, Germania, Gallia.

* *Bulbine foliis carnosis.*

- frutescens.* 4. *ANTHERICUM foliis carnosis teretibus, caule fruticoso.*
Anthericum caulescens, foliis pulposis teretibus subulatis supine convexo-planis. Wach. ultr. 305.

Bulbine caulescens. Hort. cliff. 122. Roy. lugdb. 122.
Phalangium capense caulescens, foliis cepitiis succosum.

Dill. elth. 310. t. 231. f. 298.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♂

5. ANOTHERICUM foliis carnosis subulatis planiusculis. *alooides.*
Hort. upf. 83.

Anthericum foliis pulpofisis lanceolato-subulatis supine
 excavatis. *Wach. ultr. 304.*

Bulbine acaulis. Hort. cliff. 123. Roy. lugdb. 33.

Phalangium capense sessile, foliis aloiformibus pulpofisis.
Dill. elth. 312. t. 232. f. 300.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♀

6. ANOTHERICUM follis carnosis subulatis semiteretibus. *Asphodeloides.*
strictis. Hort. upf. 83.

Anthericum acaule, foliis pulpofisis teretibus subulatis su-
 pine convexo planis. *Wach. ultr. 305.*

Habitat in Aethiopia. ♀

*Folia vix striata, sed stricta, margine aspera, dorso versus
 alterum latus gibbosiora.*

7. ANOTHERICUM foliis carnosis subulatis teretibus. *annuum.*
*Hort. upf. 83. **

Anthericum acaule, foliis setaceis caule angustioribus.
Wach. ultr. 305.

Habitat in Aethiopia. ♂

* *Narthecium foliis ensiformibus.*

8. ANOTHERICUM foliis ensiformibus, filamentis la- *officinale.*
 natis. *Fl. suec. 268. Gmel. fibir. 1. p. 73. t. 18. f. 2.*

Anthericum scapo folioso laxe spicato, filamentis villo-
 sis. *Fl. lapp. 136 Roy. lugdb. 45.*

Narthecium. *Mehr. E. N. C. 1742. p. 389. t. 5. f.*
 1. *Wach. ultr. 303. Gort. gelr. 69.*

Pseudo-Asphodelus palustris anglicus. *Baub. pin. 29.*
 Asphodelus luteus palustris. *Dod. pent. 208.*

Habitat in Europæ borealis uliginosis. ♀

9. ANOTHERICUM foliis ensiformibus, perianthiis tri- *calyculatum.*
 lobis, filamentis glabris. *Fl. suec. 269. It. gotl. 194.*
 221.

Anthericum filamentis levibus, perianthio trifido. *Hort.*
cliff. 140. Gron. virg. 39.

Anthericum scapo nudo capitato, filamentis glabris. *Fl.*
lapp. 139. t. 10. f. 3.

Phalangium alpinum palustre, iridis folio. T. Segu. ver.
2. p. 61. t. 14

Pseudo Asphodelus alpinus. Baub. pin. 29.

Habitat in alpibus Helvetiæ, Lapponiæ, Sibiriæ. 2

Genus nullum in tota classe Liliacea difficilius determinatur: 8 ossifragum & 9 calyculatum habitu toto ita uniuertuntur, ut dema fructificatione vix distinguantur, at Species 9 gerit Stamina glabra, Pericarpium subglobosum, Stigmata tria sine stylis & Perianthium trivalve. Species 8 annexitur speciebus 4. 5. 6. 7. Staminibus hirsutis, at differt Germine pyramidato, Seminibus paleaceis, Corolla persistente. Species 1. 2. 3. differant a speciebus 4. 5. 6. 7, Staminibus glabris, habitu Asphodeli, adeoque vel sub uno eoderisque genere tradenda, vel etiam sub quatuor distinctis: a. 1. 2. 3. b. 4. 5. 6. 7; c. 8; d. 9. proponenda; hoc dum fieret difficillime character specierum a obtineretur.

LEONTICE.

Chrysogonum 1. *LEONTICE* foliis pinnatis: petiolo communi simpli-ci. *Hort. cliff. 122.*

Leontopetalon foliis costæ simplici innascentibus. *Tournef. cor. 49.*

Leontopetalon affinis, foliis quernis. *Baub. pin. 324.*
Moris. hist. 2. p. 285. f. 3. t. 5. f. 3.

Chrysogonium dioscoridis. *Rauv. itin. 119. Raj. hist. 1326.*

Habitat inter Græciæ segetes. 2

Leontopetalon 2. *LEONTICE* foliis decompositis: petiolo communi trifido. *Hort. cliff. 122.*

Leontopetalon foliis costæ ramosæ innascentibus. *Tournef. cor. 49.*

Leontopetalon. Baub. pin. 324. Cam. epit. 565. Moris. hist. 2. p. 285. f. 3. t. 15. f. 6. Raj. hist. 1326.

Habitat in Apulia, Hetruria, Creta. 2

Thalictroides 3. *LEONTICE* folio caulinò triterñato (27), florali bitemnato (9).

Leontice foliis supradecompositis. *Gron. virg. 151. **
Cold. noveb. 75.

Habitat in Virginia. 2

Modus crescendi Epimedii. Caulis nudus, terminatus Foliis tribus, patentibus, petiolatis: Petiolus singulus trisidus, adnatis novem foliolis, quorum lateralia duo, sessilia, biloba; intermedium petiolatum, trilobum;
infra

*infra dictis uram primam caulis exerit e latere folium
Pettolis tribus: singulis simplicibus triphyllis, infra
quos Racemus simplex cum duobus lateralibus.*

4. LEONTICE foliis simplicibus tripartito - multifidis, *Leontopeta*,
corollis monopetalis calyculatis. ^{loides.} †

Leontopetaloides. Amin. act. 8. p. 211. t. 113.

Habitat in India.

*Habitus hujus generis, at flos videtur satis diversus, an
sufficienter pro distincto genere determinant autoptae.*

ASPARAGUS.

1. ASPARAGUS caule herbaceo erecto, foliis setaceis, *officinalis*,
stipulis paribus. *Fl. suec.* 272. *Mat. med.* 169. *Hort.*
cliff. 121. *Roy. lugdb.* 28.

2. Asparagus maritimus, crassiore folio. *Baub. pin.* 490. *maritimus.*

3. Asparagus sylvestris, tenuissimo folio. *Baub. pin.* 490.

4. Asparagus sativa. *Baub. pin.* 489. *altilis.*

Asparagus. *Cam. epit.* 259.

Habitat in Europæ arenosis. ♀

2. ASPARAGUS caule inermi, ramis declinatis, foliis *declinatus*,
setaceis. *Roy. lugdb.* 29.

Habitat in Africa.

3. ASPARAGUS aculeis solitariis, foliis ensiformibus *falcatus*,
falcatis. *Fl. zeyl.* 123. *

Asparagus foliis falcatis ex una puncto numerosis.

Burm. zeyl. 36. t. 13. f. 2.

Habitat in Zeylona. ♂

4. ASPARAGUS aculeis solitariis, ramis reflexis retro- *retrofractus*,
fractisque, foliis fasciculatis.

Asparagus frutescens, foliis fasciculatis setaceis terminali-
bus, ramis reflexis retroflexis. *Hort. cliff.* 121. *

Roy. lugdb. 28.

Asparagus africanus tenuifolius, viinalibus virgis, foliis laricis ad instar ex uno puncto numerosis stellati-
tim positis. *Pluk. amalh.* 40. t. 375. f. 3.

Habitat in Africa. ♂

5. ASPARAGUS aculeis solitariis, caule erecto, foliis *asiaticus*,
fasciculatis, ramis filiformibus.

Asparagus aculeis alternis, ramis solitariis filiformibus,
foliis setaceis fasciculatis lateralibus. *Hort. cliff.* 122.

* *Roy. lugdb.* 28.

Habitat in Asia.

- albus.* 6. ASPARAGUS aculeis solitariis, ramis flexuosis, foliis fasciculatis angulatis muticis deciduis.
Asparagus aculeis solitariis, ramulis flexuosis binis oppositis spinosis foliosis, foliis fasciculatis. *Roy. lugdb.* 29.
Asparagus aculeatus, spinis horridus. *Baub. pin.* 490.
Corduba tertia. Clus. hist. 2. p. 178.
Habitat in Lusitania, Hispania. b
- acutifolius.* 7. ASPARAGUS caule inermi fruticoso, foliis aciformibus perennantibus mucronatis ternis aequalibus.
Asparagus foliis aciformibus pungentibus, caule fruticoso inermi. *Sauv. monsp.* 45.
Asparagus foliis acutis. *Baub. pin.* 490.
Alparagus sylvestris. *Cam. epit.* 260.
Habitat in Lusitania, Hispania. b
- aphyllus.* 8. ASPAKAGUS aphyllus, spinis fasciculatis inaequalibus divergentibus. *Hort. cliff.* 122. *Roy. lugdb.* 2.
Asparagus aculeatus alter, tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum. *Baub. pin.* 490.
Corduba altera. Clus. hist. 2. p. 178.
β. Asparagus creticus fruticosus, crassioribus & breviores aculeis, magno fructu. *Tournef. itin.* 91. t. 15.
Habitat in Sicilia, Hispania, Lusitania. b
- capensis.* 9. ASPARAGUS spinis lateralibus terminalibusque, ramis aggregatis, foliis fasciculatis.
Asparagus foliis quinis setaceis, spinis terminalibus lateribusque, ramulis ternis quaternisque. *Hort. cliff.* 121.
Asparagus aculeatus, triplici spina, surrectus. *Pluk. alm.* 54. t. 15. f. 4.
Habitat ad Caput b. Spei. b
- farmentosus.* 10. ASPARAGUS foliis solitariis linearis lanceolatis, caule flexuoso, aculeis recurvis. *Fl. zeyl.* 124. *
Alparagus aculeatus zeylanicus maximus farmentosus.
Iherm. lugdb. 62. t. 650. 63.
Habitat in Zeylona. b

CONVALLARIA.

- * *Lil. conv. T. corollis campanulatis.*
- majolis.* 1. CONVALLARIA scapo nudo. *Fl. lapp.* 113. *Fl. succ.* 273. *Mat. med.* 167. *Hort. cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 26. *Gmel. fibir.* 1. p. 34.

Lilium convallium album. Baub. pin. 304.

Lilium Convallium alpinum. Baub. pin. 304.

Lilium convallium latifolium. Baub. pin. 304.

Habitat in Europa septentrionali. 2

* * *Polygonata T. corollis infundibuliformibus.*

2. CONVALLARIA foliis verticillatis. Fl. lapp. 114. *verticillata.*

Fl. suec. 215. Hort. cliff. 125. Roy. lugdb. 26.

Polygonatum angustifolium non ramosum. Baub. pin.
303

Polygonatum alterum. Dod. pempt. 345.

3. Polygonatum angustifolium ramosum. Baub. pin. 304.

Habitat in Europæ septentrionalis saltibus, præcipitiis. 2

3. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, *Polygonum*
caule ancipiti, pedunculis axillaribus unifloris. Mat. ^{tum.}
med. 168. Gmel. sibir. 1. p. 34. Phil. bot. 218.

Convallaria foliis alternis, floribus axillaribus. Fl. suec.
274. Hort. cliff. 124. Gron. virg. 37. Roy. lugdb. 26.

Convallaria foliis alternis, pedunculis pendulis unifloris.
Sauv. monsp. 42.

Polygonatum latifolium vulgare. Baub. pin. 305.

3. *Polygonatum floribus ex singularibus pedunculis.* Baub.
bijl. 3. p. 530.

Polygonatum latifolium, flore majore odoro. Baub. pin.
303.

Habitat in Europæ septentrionalis præcipitiis rupibus-
que. 2

4. CONVALLARIA foliis amplexicaulibus, caule tere- *multiflora.*
ti, pedunculis axillaribus multifloris. Phil. bot. 218.

Convallaria foliis alternis, pedunculis pendulis multiflo-
ris. Sauv. monsp. 42.

Polygonatum latifolium maximum. Baub. pin. 303.

Polygonatum latifolium 1. Clus. bijl. 1. p. 275.

Habitat in Europæ septentrionalis præcipitiis, rupibus. 2

* * *Smilaces T. corollis rotatis.*

5. CONVALLARIA foliis sessilibus, racemo terminali *racemoso.*
composito.

Convallaria racemo composito. Roy. lugdb. 26.

Convallaria foliis alternis, racemo terminali. Hort. cliff.
125. Gron. virg. 38.

Polygonatum racemosum. Corn. canad. 36. t. 37.

Polygonatum rainosum & racemosum spicatum. Moris.
bijl. 3. p. 537. f. 13. t. 4. f. 9.

Polygonatum racemosum americanum, ellebori albi foliis amplissimis. *Pluk. alm.* 301. t. 311. f. 2.
Habitat in Virginia, Canada. 2

stellata. 6. *CONVALLARIA* foliis amplexicaulibus plurimis, racemo terminali simplici.

Polygonatum virginianum erectum spicatum, flore stellato. *Morif. hist.* 3. p. 536. f. 13. t. 4. f. 7.

Polygonatum canadense spicatum fertile. *Corn. canad.* 33. t. 33.

Habitat in Canada. 2

trifolia. 7. *CONVALLARIA* foliis amplexicaulibus ternis, racemo terminali simplici.

Convallaria floribus racemosis, foliis ovatis oblongis caulinis. *Gmel. sibir.* 1. p. 36. t. 4.

Phalangium veratri foliis. *Amm. ruth.* 137.

Habitat in Sibiriæ sylvis. 2

bifolia. 8. *CONVALLARIA* foliis cordatis. *Fl. lapp.* 113. *Fl. suec.* 276. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 26. *Gmel. sibir.* 1. p. 35.

Lilium convallium minus. *Baub. pin.* 304.

Gramen parnassi. *Cam. epit.* 744.

Habitat in Europæ borealis pratis depresso asperis. 2

POLIANTHES.

tuberosa.

1. POLIANTHES.

Polianthes floribus alternis. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upf.* 76. *Fl. zeyl.* 225.

Hyacinthus indicus tuberosus, flore narcissi. *Baub. pin.* 47. *Rudb. elys.* 2. p. 39. f. 4.

B. Hyacinthus indicus tuberosus, flore hyacinthi orientalis. *Baub. pin.* 47. *Rudb. elys.* 2. p. 38. f. 2.

Hyacinthus indicus, tuberosa radice. *Clus. hist.* 1. p. 176.

Habitat in India. 2

HYACINTHUS.

non scriptus. 1. *HYACINTHUS* corollis campanulatis sexpartitis apice revolutis. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugd.* 27. *Sauv. monsp.* 17.

Hyacinthus, oblongo flore cœruleus major. *Baub. pin.* 43.

Habitat in Anglia, Gallia, Hispania, Italia. 2

Braetæ sunt sepius floribus longiores, & binæ. Petala apice revoluta. Stigma guttula madidum.

2. HYACINTHUS corollis campanulatis sexpartitis, cernuus.
racemo cernuo.

Hyacinthus hispanicus. Clas. hist. I. p. 177.

Hyacinthus, oblongo flore suaviter rubente, minor.
Baub. pin. 44.?

Habitat in Hispania. 2

Convenit cum H. non scripto habitu & facie, quamvis minor; differt vero Foliis magis linearibus, minus lanceolatis, erectioribus, Racemo magis nutante; Corollis incarnatis nec cæruleis, tereticribus, cum petalorum lateribus ad basin minus plano patentibus nec dorso linea elevata notatis, minusque revolutis (quamvis reflexa) quam in illo; Pistillam demum staminibus brevius est. Braetæ binæ, saturatiæ incarnatae.

3. HYACINTHUS corollarum exterioribus petalis di-serotinus.
stinetis, interioribus coadunatis.

Hyacinthus obsoleto flore. Baub. pin. 44.

Hyacinthus, obsoleti coloris, hispanicus serotinus. Clas.
hist. I. p. 177.

Habitat in Hispania, Mauritania. 2

4. HYACINTHUS corollis campanulatis semisexfidis amethystinus
basi cylindrici. Hort. upf. 85.

Hyacinthus, oblongo cæruleo flore, minor. Baub. pin.
44. Rüdb. elys. 2. p. 27. f. 8.

Hyacinthus minor hispanicus angustifolius. Baub. hist.
2 p. 587.

Habitat in Hispania? 2

5. HYACINTHUS corollis infundibuliformibus semi-orientalit.
sexfidis bali ventricosis. Hort. upf. 85. Hort. cliff.
125. Roy. lugdb. 27.

Hyacinthus orientalis, (spec. 1 — 15) & plenus (1 — 3)
Baub. pin. 44.

Hyacinthus orientalis major & minor. Dod. pempt. 216.

Habitat in Asia, Africa. 2

6. HYACINTHUS corollis ovatis. Hort. cliff. 126. Muscari
Hort. upf. 85. Roy. lugdb. 28.

Hyacinthus racemosus moschatus. Baub. pin. 43.

Muscari obsoletiore flore. Clas. hist. I. p. 178.

Habitat in Asia ultra Bosporum, inde in Europam un-
to 1554. 2

7. HYA-

- monstrofus.* 7. HYACINTHUS corollis subovatis. *Vir. cliff.* 28.
Roy. lug. db. 28.
E. *Hyacinthus floribus paniculatis monstrosis.* *Hort. cliff.* 126.
Hyacinthus panicula cærulea. *Baub. pin.* 42.
Hyacinthus fannesijs, *panicula comosa.* *Col. ecpbr.* 2.
p. 10. t. 12,
Habitat - - - primum inventa in agro Papiensi, &
juxta Buran Galliæ. ✎
An sequentis sola varietas?
- comosus.* 8. HYACINTHUS corollis angulato-cylindricis: summis sterilibus longius pedicellatis.
Hyacinthus corollis globofis: summis pedunculatis, foliis ensiformibus. *Sauv. monsp.* 17.
Hyacinthus comosus major purpureus. *Baub. pin.* 42.
Hyacinthus. *Cam. epit.* 798.
Habitat in Galliæ & Europæ australis agris. ✎
- botryoides.* 9. HYACINTHUS corollis globosis uniformibus, foliis canaliculato-cylindricis.
Hyacinthus corollis globotis. *Hort. cliff.* 126. *Hort. upf.* 85. *Roy. lug. db.* 28.
Hyacinthus corollis globosis, *foliis in cylindrum convolutis.* *Sauv. monsp.* 19.
Hyacinthus racemosus cæruleus minor juncifolius. *Baub. pin.* 43.
Hyacinthus botryoides vulgaris. *Lob. sc.* 107.
Habitat in Italia.
- racemosus.* 10. HYACINTHUS corollis ovatis: summis sessilibus, foliis ensiformibus. *Sauv. monsp.* 17.
Hyacinthus racemosus cæruleus minor latifolius. *Baub. pin.* 43,
Hyacinthus botryoides 1. *Clas. hist.* 1. *p. 181.*
Habitat in Europa australi. ✎
- Orebioides.* 11. HYACINTHUS corollis irregularibus sexpartitis.
Hyacinthus orchiooides africanus major bifolius maculatus, *flore sulphureo obsoleto majore.* *Breyn. prodr.* 3. *p. 24. t. III. f. 2.*
Habitat in Æthiopia. ✎
- lanatus.* 12. HYACINTHUS corollis lanatis, caule ramoso. *Roy. lug. db.* 27.
Habitat - - - -

ALETRIS.

1. ALETRIS. *Gen. nov.* 1076 *farinosa.*
Hyacinthus caule nudo, foliis lingviformibus acuminatis
dentatis. *Gron. virg.* 38.
Hyacinthus floridanus spicatus. *Pluk. amalb.* 119. *t.*
437. f. 3.
Habitat in America septentrionali. ♀

YUCCA.

1. YUCCA foliis integerrimis. *Vir. cliff.* 29. *gloriosa.*
Yucca foliis margine integerrimis. *Hort. cliff.* 130.
Hort. upf. 88. *Roy. lugdb.* 29.
Yucca foliis aloës. *Baub. pin.* 91.
Yucca indica, foliis aloës. *Barr. rar.* 70. *t.* 1194.
Cordyline foliis pungentibus integerrimis. *Roy. lugab.* 22.
Habitat in Canada, Peru. ♂
2. YUCCA foliis crenulatis strictis. *aloifolia.*
Yucca foliis crenulatis. *Vir. cliff.* 29.
Yucca foliorum margine crenulato. *Hort. cliff.* 130. *α.*
Yucca arborescens, foliis rigidioribus rectis ferratis. *Dill.*
elth. 435. *t.* 323. *f.* 416.
Aloë, yuccæ foliis, cauletcens. *Pluk. alm.* 19. *t.* 256. *f.* 4.
Aloë americana, yuccæ folio, arborescens. *Comm. præl.*
64. t. 14.
Habitat in Jamaica, Vera Cruce. ♂
3. YUCCA foliis crenatis nutantibus. *draconis.*
Yucca foliorum margine crenulato. *Hort. cliff.* 130. *β.*
Hort. vif. 88.
Yucca draconis folio serrato. *Dill. elth.* 437. *t.* 324.
f. 417. *Comm. præl.* 42. 67. *t.* 16.
Draconi arbori affinis americana. *Baub. pin.* 506.
Cordyline foliis pungentibus crenatis. *Roy. lugdb.* 22.
Habitat in America. ♂
4. YUCCA foliis ferrato-filamentosis. *filamentoſa.*
Yucca foliis lanceolatis acuminatis integerrimis margine
filamentosis. *Gron. virg.* 152.
Yucca foliis filamentosis. *Moris. hist.* 2. *p.* 419.
Yucca virginiana, foliis per marginem appriime filatis.
Pluk. alm. 396.
Habitat in Virginia. ♂

ALOE.

1. ALOE floribus pedunculatis crenuis corymbosis sub- *perfoliata.*
cylindricis. Aloë

- Aloë foliis caulinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upf.* 86. *Roy. lugdb.* 23.
- α. Aloë africana caulescens, foliis magis glaucis caulem amplectentibus & in mucronem obtusiorem desinentibus. *Comm. præl.* 68. t. 17. *rar.* 44. t. 44.
- β. Aloë africana caulescens, foliis minus glaucis; dorsi parte suprema spinosa. *Comm. præl.* 69. t. 18.
- γ. Aloë africana caulescens, foliis glaucis latioribus & undique spinosis. *Comm. præl.* 70. t. 19.
- δ. Aloë africana caulescens, foliis glaucis brevissimis, foliorum summitate interna & externa non nihil spinosa. *Cunn. præl.* 73. t. 22. *rar.* 45. t. 45.
- ε. Aloë africana caulescens, foliis glaucis: dorso integro spinoso. *Comm. præl.* 71. t. 20.
- ζ. Aloë africana caulescens, foliis glaucis brevioribus: foliorum parte interna & externa non nihil spinosa. *Comm. præl.* 71. t. 21.
- η. Aloë africana caulescens, foliis glaucis caulem amplectentibus. *Comm. hort.* 2. p. 27. t. 14.
- θ. Aloë africana caulescens, foliis spinosis maculis ab utraque parte albicantibus notatis. *Comm. hort.* 2. p. 9. t. 5.
- ι. Aloë africana caulescens perfoliata glauca & non spinosa. *Comm. præl.* 74. t. 23.
- κ. Aloë africana, foliis glaucis: margine & dorsi parte superiore spinosis, flore rubro. *Comm. præl.* 75. t. 24. *hort.* 2. p. 23. t. 12.
- λ. Aloë africana maculata spinosa major. *Dill. elth.* 17. t. 14. f. 15.
- μ. Aloë africana maculata spinosa minor. *Dill. elth.* 18. t. 14. f. 16.
- ν. Aloë africana in triformis spinosa. *Dill. elth.* 21. t. 17. f. 19.
- ξ. Aloë succotrina angustifolia spinosa, flore purpureo. *Comm. hort.* 1. p. 91. t. 48.
- Aloë americana, ananæ floribus suave rubentibus. *Pluk. alm.* 19. t. 240. f. 4.
- ο. Aloë foliis erectis subulatis radicatis undique inerme spinosis. *Hort. cliff.* 131. *Roy. lugdb.* 24.
- Aloë africana humilis, spinis inermibus & verrucosis obsita. *Comm. præl.* 77. t. 26. *rar.* 46. t. 46.
- Habitat in Æthiopia.* b
- Plantam o ad hanc speciem pertinere docnere flores, quamvis habitu videatur aliena.*
- * Aloë foliis spinosis confertis, dentatis vaginantibus planis
- humilis.
- vera.

- planis maculatis. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upf.* 86.
Mat. med. 160. *Roy. lugdb.* 22.
- Aloe vulgaris.* *Bauh. pis.* 386.^o
- Kadanaku* f. *Catevala.* *Rheed. mal.* 11. p. 7. t. 3.
- Habitat in Indiis.* 5
- Flores nobis non vidi, ideoque non determino; facies
tamen ita praecedentis est, ut eandem esse vix dubi-
tarem.*
2. ALOE floribus pedunculatis cernuis racemosis prisma- variegata,
ticis: ore patulo æquali.
- Aloe* foliis canaliculatis trifariam imbricatis radicatis
erectis: angulis cartilagineis ternis. *Hort. cliff.* 132.
Hort. upf. 87. *Roy. lugdb.* 24.
- Aloe africana humilis,* foliis ex albo viridi variegatis.
Comm. pr. el. 79. t. 28. *rar.* 27. t. 27. *Till. pis.* 7. t. 7.
Habitat in Æthiopia argillosis. 2
3. ALOE floribus pedunculatis, pedunculis ovato-cylindrica- disticha,
drinis carvis.
- Aloe* foliis linguiformibus patulis disticis. *Hort. cliff.*
 132. *Hort. upf.* 86. *Roy. lugdb.* 23.
- Aloe africana,* flore rubro, folio maculis albicantibus
ab utraque parte notato. *Comm. hort.* 2. p. 15. t. 8.
- β. *Aloe africana* flore rubro, folio triangulari & verrucis
albicantibus ab utraque parte notato. *Comm. hort.* 2.
 p. 17. t. 9.
- Aloe africana* sessilis, foliis carinatis verrucosis. *Dill.*
elth. 22. t. 18. f. 20.
- δ. *Aloe africana,* foliis planis conjugatis carinatis verru-
cosis, caule & flore corallii colore. *Mart. cent.* 11.
 t. 11.
- ε. *Aloe africana* arborescens montana non spinosa, folio plicatili.
 longissimo plicatili, flore rubro. *Comm. hort.* 2. p. 5.
 t. 3.
Habitat in Africæ rupibus. 5
4. ALOE floribus sessilibus horizontalibus infundibuli- hyacinthoi-
foriñibus æqualibus limbo revolutis. des.
- Aloe* foliis lanceolatis planis rectis radicatis. *Hort. cliff.*
 32. *Hort. upf.* 85. *Fl. zeyl.* 130. *Roy. lugdb.* 24.
- α. *Aloe zeylanica* puinila, foliis variegatis. *Comm. hort. zeylanica.*
 2. p. 41. t. 21. *Plak. alm.* 19. t. 256. f. 5.
- β. *Aloe guineensis,* radice geniculata, foliis e viridi & a- guineensis.
 tro undulatim variegatis. *Comm. hort.* 2. p. 39. t. 26.
pr. el. 84. t. 23.

Habitat & in Zeylona, β. in Guinea. 2

Plantæ β flores non vidi, dubiam emendent vel confirmant autoptæ.

spiralis.

5. ALOE floribus sessilibus ovatis crenatis: segmentis interioribus conniventibus.

Aloë foliis ovatis acuminatis caulinis quinquefariam imbricatis. *Hort. cliff.* 132. *Hort. apf.* 87. *Roy. lugdb.* 23.

Aloë africana erecta rotunda, folio parvo & in acumen acutissimum exeunte. *Dill. eltb.* 16. t. 13. f. 14. *Comm. præl.* 83. t. 32.

Habitat in Africæ campestribus. 5

retusa.

6. ALOE floribus sessilibus triquetris bilabiatis: labio inferiore revoluto.

Aloë foliis rhomboidalibus ventricosis quinquefariam positis radicatis triquetris piano exstantibus. *Hort. cliff.* 132. *Hort. apf.* 87. *Roy. lugdb.* 24.

Aloë africana, brevissimo crassissimoque folio, flore viridi.

Comm. hort. 2. p. 2. p. 11. t. 6. *Till. pis.* 6. t. 5.

Habitat in Africæ argillosis. 2

viscosa.

7. Aloë floribus sessilibus infundibuliformibus bilabiatis: lacinia quinque revolutis: summa erecta.

Aloë foliis canaliculatis trifariam imbricatis: caulinis apice reflexo-patulis. *Hort. cliff.* 132. *Hort. apf.* 87. *Roy. lugdb.* 23.

Aloë africana erecta triangularis & triangulari folio viscosa. *Comm. præl.* 82. t. 31. *Till. pis.* 6. t. 5.

Dill. eltb. 15. t. 13. f. 13.

Habitat in Æthiopiæ campestribus. 2

pumila.

8. ALOE floribus sessilibus bilabiatis: labio superiore erecto; inferiore patente.

*margariti-
fera.*

- α. Aloë foliis ovato-subulatis acuminatis tuberculis craticulagineis undique adspersis. *Hort. cliff.* 131. *Roy. lugdb.* 24.

Aloë africana, folio in summitate triangulari, margaritifera, flore subviridi. *Comm. hort.* 2. p. 19. t. 10.

- β. Aloë africana margaritifera minor. *Comm. hort.* 2. p. 21. t. 11. *Dill. eltb.* 19. t. 16. f. 17.

- γ. Aloë africana margaritifera minima. *Comm. præl.* 43. *Dill. eltb.* 20. t. 16. f. 18.

*arachnoi-
dea*

- δ. Aloë africana humilis arachnoidea. *Comm. præl.* 72. t. 27.

8. Aloë foliis ovato-lanceolatis carnosis apice triquetris: angulis inerme dentatis. *Hort. cliff.* 131. *Hort. upf.* 86. *Roy. lugdb.* 24.
 Aloë africana minima atroviridis, spinis herbaceis numerosis ornata. *Bocrb. lugdb.* 2. p. 131. t. 131.
Habitat in Aethiopiae tempestribus. 2
Flores in hoc genere specierum certissimi indices conjungunt Margaritferam & Arachnoideam.
9. ALOE floribus sessilibus reflexis imbricatis prismatis. *Uvaria,*
Aloë foliis linearibus radicalibus membranaceis. Hort.
cliff. 133. *Roy. lugdb.* 23.
 Aloë africana folio triangulare longissimo & angustissimo, floribus luteis foetidis. *Comm. hort.* 2, p. 29. t.
 15. *Seb. thes.* 1. p. 29. t. 19. f. 3:
Habitat ad Cap. b. Speci. 2

AGAVE.

1. AGAVE foliis dentato-spinosis, scapo ramoso. *Gen. americanæ*
nou. 1102.
 Agave foliis spinoso-dentatis mucronatisque. *Hort. upf.*
 81.
 Aloë foliis lanceolatis dentatis spina terminatis radicalibus. *Hort. cliff.* 130. *Roy. lugdb.* 22.
 Aloë folio in oblongum mucronem abeunte. *Bauh. pin.*
 286.
Habitat in America calidiore. 5
2. AGAVE foliis dentatis, staminibus corollam æquanti-viviparous.
 Aloë americana polygona. *Comm. rar.* 65. t. 65.
Habitat in America.
Confer. Aloe americana sobolifera. Herm. lugdb. 16. t. 17.
3. AGAVE foliis dentato-spinosis, scapo simplicissimo. *virginiae.*
Gen. nou. 1102.
 Aloë foliis lanceolatis spina cartilaginea terminatis, floribus alternis sessilibus. *Gron. virg.* 152.
Habitat in Virginia. 2
4. AGAVE foliis integerrimis. *Gen. nou.* 1102. *fætidæ.*
 Aloë foliis integerrimis patentiusculis aculeo-teretinatis, radice caulecente. *Hort. cliff.* 132.
 Aloë americana, viridi rigidissimo & foetido folio, Piet dieta indigenis. *Comm. hort.* 2. p. 35. t. 18.

Aloe americana, radice tuberosa, minor. *Plak. alin.* 19.

t. 258. f. 2.

Habitat in Curacao. ♂

HEMEROCALLIS.

- Lilio Aspho-* 1. *HEMEROCALLIS* scapo ramoso, corollis monopetalis. *Hort. upf.* 88.
delus. *Hemerocallis* radice tuberosa, corollis monopetalis. *Hort. cliff.* 128. *Roy. lugdb.* 26.
- flavus.* α. *Hemerocallis* radice tuberosa, corollis monopetalis luteis. *Gmel. sib.* 1. p. 37.
Lilio Asphodelius luteo flore. *Clus. hist.* 1. p. 137.
Lilium luteum, asphodeli radice. *Bauh. pin.* 80.
- fulvus.* β. *Lilium rubrum*, asphodeli radice. *Bauh. pin.* 80.
Lilio-asphodelus puniceus. *Clus. hist.* 1. p. 137.
Habitat a in Hungariae, Sibiriae campis uliginosis, at C.
Hybrida & constans, ex India Orientali. ♀
- Liliastrum.* 2. *HEMEROCALLIS* scapo simplici, corollis hexapetalis campanulatis. *Hort. cliff.* 128. *Roy. lugdb.* 27.
Hall. helv. 190.
Phalangium magno flore. *Bauh. pin.* 29.
Phalangium allobrogicum majus. *Clus. app. alt.*
Phalangium. *Dalech. hist.* 852.
Habitat in Alpibus Helveticis, Allobrogicis. ♀
Habitu convenienter Haec, Antherica 1. 2. 3, Asphodeli 2.
3, sed quis character connecteret?

ACORUSS

- Calamus.* 1. *ACORUS.* *Roy. lugdb.* 6. *Fl. suec.* 277. *Mat. med.* 16.
vulgaris. α. *Acorus verus* L. *Calamus aromaticus officinarum.* *Bauh.*
pin. 34. *Hort. cliff.* 137.
Typha aromatica, clava rugosa. *Moris. hist.* 3. p. 246
f. 8. t. 13. f. 4.
- verus.* β. *Acorus asiaticus*, radice tenuiore. *Herm. lugdb.* 9. *Fl.*
zeyl. 132.
Waembu. *Rheed. mal.* 11. p. 99. *t. 60.*
Habitat in Europae, β. in Indiæ fossis paludosis. ♀

ORONTIUM.

- equaticum.* 1. *ORONTIUM.* *Gen. nov.* 1086. *f. 3. **
Arum folio enervi ovato. *Gron. virg.* 113.
Arum fluitans, pene nudo. *Banist. virg.* 1926.
Habitat in Virginiae, Canadæ paludibus, scaturiginibus. ♀

HÆMANTHUS.

1. HÆMANTHUS foliis lingviformibus planis. *Roy. coccineus.*
lugdb. 42.
Hæmanthus foliis obtusis basi truncatis. *Hort. cliff. 127.*
Hæmanthus africanus. *Comm. hort. 2. p. 127. t. 64.*
Habitat ad Cap. b. Spei. 2
2. HÆMANTHUS foliis lanceolatis undulatis. *Hort. puniceus.*
cliff. 127. Hort. upf. 127. Roy. lugdb. 42.
Hæmanthus colchici foliis, perianthio herbaceo. *Dill.*
elth. 167. p. 140. t. 2.
Hyacintho affinis africana, bulbosa radice, caule ele-
gantissime maculato. *Seb. thes. 1. p. 20. t. 12. f. 1. 2. 3.*
Orchis f. Satyrium e Guinea. *Swert. flor. 1. p. 62. f. 3.*
Habitat in Africa. 2

CALAMUS.

1. CALAMUS. *Rotang.*
Arundo zeylanica spinosissima major, fructibus rotundis
scabris acidis. *Burm. zeyl. 36. Fl. zeyl. 468.*
Arundo nucifera Rotang dicta, fructu spadicei coloris
striis purpureis venuste tessulato. *Pluk. alm. 53.*
Arundo Rotang dicta. *Pif. mant. 188.*
Fructus cannæ de Benghalæ. *Baub. pin. 405.*
Habitat in Indiæ sylvis juxta fluenta. 5

JUNCUS.

* *Culmis nudis.*

1. JUNCUS culmo subnudo tereti mugronato, panicula *acutus.*
terminali, involucro diphyllo spinoso.
Juncus culmo pungente, panicula ex folii solitarii axil-
la. *Sauv. munsp. 9.*
Juncus panicula universali culmo breviore infime coar-
ctata, secundariis paululum laxis, capsulis triquetro-sub-
ovatis nitentibus. *Guett. stamp. 2. p. 412.*
Juncus acutus, capitulis forghi. *Baub. hist. 2. p. 520.*
Moris. hist. 3. p. 232. f. 8. t. 10. f. 15.
2. Juncus panicula universali culmo longiore, secundariis
laxis longe pedunculatis: media præcipue. *Guett.*
stamp. 2. p. 412.
Juncus acutus maritimus anglicus. *Raj. hist. 1303. Mo-*
rif. ibid. f. 14.
Habitat in Angliæ, Galliæ, Italiæ maritimis paludo-
sis. 2

- conglomerata.* 2. *JUNCUS* culmo nudo stricto, capitulo lateralij. *Roy.*
tus. *lugdb.* 44. *Fl. suec.* 270.
Juncus lævis, panicula non sparsa. *Baub. pin.* 12.
theatr. 183.
Juncus lævis, panicula conglomerata. *Scheuch. gram.* 343.
Juncus. *Cam. epit.* 780.
Habitat in Europæ borealis uliginosis. 2
- effusus.* 3. *JUNCUS* culmo nudo stricto: panicula lateralij. *Roy.*
lugdb. 44. *Fl. suec.* 279.
α. *Juncus* culmo nudo acuminate ad basin squamato, floribus sessilibus. *Fl. lapp.* 116. *Hall. helv.* 254.
Juncoides alpinum, floculis junci glomeratis atrofuscis.
Scheuch. hist. 323.
β. *Juncus* culmo nudo acuminate ad basin squamato, floribus pedunculatis. *Fl. lapp.* 117. *Gron. virg.* 38.
Juncus lævis, panicula sparsa, major. *Baub. pin.* 12.
theatr. 182. *Scheuch. gram.* 341.
Juncus lævis. *Dod. pent.* 606.
Habitat in Europæ uliginosis, α in alpibus. 2
- inflexus.* 4. *JUNCUS* culmo nudo: apice membranaceo incurvo,
panicula lateralij.
Juncus culmo nudo, paniculam arcuatim tegente.
Sauv. monsp. 9.
Juncus, acumin'e reflexo, major. *Baub. pin.* 12. *prodr.*
184. *Moris. hist.* 3. p. 233. f. 8. t. 10. f. 25. *Barr.*
ic. 204. *Hall. helv.* 252.
Juncus, acumin'e reflexo, alter. *Baub. pin.* 12. *prodr.*
22. *Scheuch. gram.* 345.
γ. *Juncus* panicula univeriali lateralij culmo longiore, secundariis sparsis. *Guett. stamp.* 412.
Juncus acutus, panicula sparsa. *Baub. pin.* 412.
Habitat in Europa australi. 2
- filiformis.* 5. *JUNCUS* culmo nudo filiformi nutante, panicula lateralij. *Roy. lugdb.* 44. *Gron. virg.* 152. *Fl. suec.* 280.
Juncus parvus, calamo supra paniculam longius producto. *Raj. angl.* 3. p. 432. *Fl. lapp.* 118.
Juncus lævis, panicula sparsa, minor. *Baub. pin.* 12.
theatr. 183. *Scheuch. gram.* 347. t. 7. f. 1.
Habitat in Europæ uliginoso-paludosis turfosis. 2
- infidus.* 6. *JUNCUS* culmo nudo, foliis floribusque tribus terminalibus. *Fl. lapp.* 119. *Fl. suec.* 281. *Roy. lugdb.* 43. *Hall. helv.* 253.

Juncus, acumine reflexo, minor & trifidus. *Baub. pin.*
12. *prodr. 22. t. 22. theatr. 186.*

Juncoides alpinum trifidum. *Scheuch. gram. 325.*

Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Pyrenæis. 2

7. JUNCUS culmo nudo, foliis setaceis, capitulis glo- *squarrosum.*
meratis aphyllis. *Fl. suec. 282.*

Juncus foliis setaceis, culmo nudo, capitulis glomera-
tis terminalibus. *Roy. lugdb. 44.*

Juncus montanus palustris. *Raj. hist. 1303. Fl. lapp.*
121.

Gramen junceum, foliis & spica junci. *Baub. pin. 5.*

Gramen junceum, semire acuminato. *Lœf. pruss. 15.*
t. 29.

Habitat in Europæ borealis sespitosis. 2

* *Culmis foliosis.*

8. JUNCUS foliis nodofo-articulatis. *Fl. suec. 285. articulatus.*

Juncus foliis articulosis, panicula inæquali, capitulis ses-
tilibus, capsulis subulatis triquetris. *Roy. lugdb. 43.*

Juncus foliis articulosis, floribus umbellatis. *Tournef.*
inst. 247. Fl. lapp. 120.

Gramen junceum, folio articulato, aquaticum. *Baub.*
pin. 5. prodr. 12. theatr. 76. Scheuch. gram. 331.

♂. Gramen Junceum, folio articulofo, cum utriculis.
Baub. prodr. 12. Scheuch. gram. 333.

♀. Juncus alpinus, folio articulofo. *Scheuch. gram. 333.*

Gramen junceum, folio articulofo, sylvaticum. *Baub.*
pin. 5. theatr. 75. Moris. hist. 3. p. 227. f. 8. t. 9. f.

1. Scheuch. grum. 334.

♂. Junci foliosi, foliis per siccitatem nodosis. *Mich. gen. 38.*
n. 1. -- 13.

Habitat in Europæ aquosis. 2

9. JUNCUS foliis linearibus canaliculatis, capsulis ob- *bulbosus.*
tusis. *Fl. suec. 284.*

Juncus foliis linearibus canaliculato-concavis, capsulis
triangularibus. *Gnott. stamp. 134.*

Juncus foliis angulatis, culmo subnudo, panicula ter-
minali prolifera, capsulis ovatis. *Roy. lugdb. 43.*

Gramen junceum minimum, capsulis triangularibus.
Raj. hist. 1307. angl. 3. p. 434. Moris. hist. 3. p.
227. f. 8. t. 9. f. 3.

Juncus bulbifer, foliis teretibus non articulosis. *Mich.*
gen. 39. n. 1. 2. 3.

♂ Juncoides calycibus paleaceis glomeratis, folio varians.
Scheuch. grum. 39. Gra-

Gramen juncceum aquaticum, paniculis cum foliis capitularibus simul ortis prolierum. *Pluk. alm.* 179. t. 32. f. 3. *Morif. hist.* 3. p. 227. f. 8. t. 9. f. 4.

γ. Juncus foliosus minimus campestris & nemorensis. *Gron. virg.* 15.

Gramen juncceum elatius, pericarpiis ovatis, americanum. *Pluk. alm.* 179. t. 92. f. 9.

Gramen juncceum virginianum, calyculis paleaceis, bicorne. *Morif. hist.* 3. p. 228. f. 8. t. 9. f. 15.

Habitat in Europæ paucis sterilibus subhumidis, at γ in Sibiria, Virginia.

bufonius. 10. JUNCUS culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. *Roy. lugdb.* 43. *Fl. suec.* 283. *Hall. helv.* 254.

Juncus palustris humilior, panicula laxissima. *Rupp. jen.* 130. *Fl. lapp.* 122.

Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, erectum. *Scheuch. gram.* 327.

Gramen nemorosum, calyculis paleaceis. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 100.

Holosteum. *Lob. ic.* 18.

β. Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, repens. *Scheuch. gram.* 329.

γ. Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, species altera procerior. *Scheuch. gram.* 328.

δ. Gramen bufonium erectum angustifolium majus. *Barr. ic.* 264.

ε. Gramen holosteum alpinum minimum. *Bauh. pin.* 7. *prodr.* 64. *theatr.* 101.

Gramen juncoïdes minimum anglo-britannicum. *Raj. angl.* 3. p. 434.

Habitat in Europæ inundatis. ◎

biglumis. 11. JUNCUS folio subulato, gluma biflora terminali. *Amen. acad.* 2. p. 266. t. 3. f. 3. *

Habitat in Alpibus Lapponicis. *D. Montin.* 2. *Planta faciem gerit Schœni ferruginei.*

triglumis. 12. JUNCUS foliis planis, gluma triflora terminali. *Fl. suec.* 286.

Juncus gluma triflora culmum terminante. *Fl. lapp.* 115. t. 10. f. 5.

Juncus exiguus montanus mucrone carens. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 22. *theatr.* 183. *Kudb. elys.* 1. p. 103. f. 8.

Habitat frequens in Alpibus Lapponicis, Tauro Rastadiensi. 2

13. JUN-

13. JUNCUS foliis planis pilosis, corymbo ramoso, *Fl. pilosus.*
suec. 287.

Juncus foliis planis, panicula diffusa, pedunculis proliferis: flosculis intermediis sessilibus. *Roy. lugdb.* 43.

Gramen nemorosum hirsutum latifolium majus. *Bauh.*
pin. 7. *Moris. hist.* 3. p. 225. f. 8. t. 9. f. 1. *

β. Gramen hirsutum angustifolium perenne, lini utriculis.
Barr. ic. 740.

γ. Juncus foliis planis, culmo paniculato, floribus sparsis.
Fl. lapp. 124.

Gramen hirsutum nemorosum angustifolium alpinum,
paniculis obscure rufescentibus. *Scheuch. gram.* 312.
t. 6.

δ. Gramen nemorosum hirsutum latifolium majus. *Scheuch.*
gram. 317.

Gramen hirsutum latifolium maximum, juncea panicula.
Moris. hist. 3. p. 225. f. 8. t. 9. f. 2.

ε. Gramen hirsutum angustifolium majus. *Bauh. pin.* 7.
prodr. 16. *theatr.* 105. *Moris. hist.* 3. p. 225. f. 8.
t. 9. f. 3. *Scheuch. gram.* 318.

ζ. Gramen hirsutum latifolium minus. *Bauh. theatr.* 102.

η. Juncoides montanum nemorosum, flore niveo. *Scheuch.*
gram. 320.

Gramen hirsutum angustifolium minus, paniculis albis.
Bauh. pin. 7. *theatr.* 106,

Habitat in Europæ sylvis, at varietates. θ. δ. ε. ζ. η.
in Europe australioribus, γ. in Alpibus. *

14. JUNCUS foliis planis subpilosis, spicis sessili pedunculatisque. *campestris.*
Fl. suec. 288.

Juncus foliis planis, panicula rara, spicis sessilibus pedunculatisque. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 42. *Gros.*
virg. 38.

Juncus villosus, capitulis psyllii. *Tournef. inst.* 246. *Fl.*
lapp. 126.

Juncoides villosum, capitulis psyllii. *Scheuch. gram.* 310.
Gramen hirsutum, capitulis psyllii. *Bauh. pin.* 7. *theatr.*
103.

β. Juncus foliis planis, culmo paniculato, spicis ovatis. *Fl.*
lapp. 127. *t.* 10. *f.* 2.

γ. Juncoides hirsutum, capitulo glomerato. *Scheuch. gram.*
312.

Gramen hirsutum, capitulo globoso. *Bauh. pin.* 7.
theatr. 104.

δ. Juncus montanum nemorosum villosum latifolium e-
latius

latius, capitulis floribus candidis & splendentibus.
Mich. gen. 42.

ϵ . *Juncoides latifolium alpinum glabrum*, panicula sublutea splendente. *Scheuch. gramen. 314.*

ζ . *Gramen hirsutum elatius*, panicula juncea compacta. *Raj. angl. 3. p. 416..*

η . *Juncoides bohemicum*, panicula minore nigricante, scapo super eandem erecto & longius producto. *Mich. gen. 42.*

Habitat in Europæ pastenis siccioribus. 2

spicatus. 15. *JUNCUS* foliis planis, spica racemosa nutante. *Fl. lapp. 125. t. 10. f. 4. Fl. suec. 289.*

Juncus aipinus latifolius, panicula racemosa nigricante pendula. *Till. pis. 91.*

Habitat in Lapponiæ Alpibus. 2

RICHARDIA.

seabra. 1. *RICHARDIA*. *Houst. mſ.*

Habitat in Vera Cruce. 2

Planta ex stellatis XLIV. Caulis altus, brachiatus, subarticulatus, obsolete tetragonus, hispidus : Pilis rigidiusculis, sparsis, reflexis. Folia e lanceolato-ovata, alternatim nervosa, integerrima, subpetiolata, sebra. Flores in capitula terminali a, passim etiam in verticillæ congesti ; capitula terminalia, radiata. Foliis 4. vel pluribus, scilicet alternis minoribus. Corollæ ut in Asperulis, tenuis, longæ, sed sexfidae & fructus ex 3 seminibus; sic differt a Spermacoce numero & ceteris.

PRINOS.

verticillatus 1. *PRINOS* foliis longitudinaliter serratis.

*Prinos. Gross. virg. 39. **

Habitat in Virginia. 5

glaber. 2. *PRINOS* foliis apice serratis.

Habitat in Canada. Kalm. 5

Arbor. Foliis alternis, petiolatis, oblongis, consistentibus, glabris, versus apicem serraturis utrinque sèpius binis acutis, facie ferme Myricæ. Pedunculi axillares, parvi, sèpius triflori. Flores non vidi.

BERBERIS.

vulgaris. 1. *BERBERIS* pedunculis racemosis. *Mat. med. 290.*
Ber.

- Berberis spinis triplicibus. *Hort. cliff.* 122. *Fl. succ.* 290.
Roy. lugdb. 438. *Hall. helv.* 424.
 Berberis dumetorum. *Bauh. pin.* 454.
 Berberis vulgaris f. *Crespinus*. *Cam. epit.* 86.
Habitat in Europæ sylvis. ♂

2. BERBERIS pedunculis unifloris:

- Berberis cretica*, buxi folio. *Tournes. cor.* 42.
Berberis alpina cretica. *Bauh. pin.* 454.
Lycium creticum. *Alp. exot.* 21. t. 20.
Lycium e Candia. *Pon. ital.* 137.
Habitat in Creta. ♂

LORANTHUS.

1. LORANTHUS.

- Loranthus racemosus*, flore coccineo, baccis nigris.
Vaill. act. 1722. p. 274.
Lonicera flore coccineo, baccis nigris. *Plum. gen.* 17.
Habitat in America calidiore. ♂

americanus,

FRANKENIA.

1. FRANKENIA foliis linearibus basi ciliatis.

lævis.

- Frankenia* foliis confertis. *Roy. lugdb.* 452.
Frankenia foliis aciformibus congestis *Sauv. monsp.* 46.
Franca floribus solitariis sessilibus, foliis prismaticis triangularibus. *Guett. stamp.* 2. p. 459.
Franca maritima supina saxatilis glauca ericoides semipervirens, flore purpureo. *Mich. gen.* 23. t. 22. f. 1.
Lychnis supina maritima, ericæ facie. *Raj. angl.* 3. p. 38.
Anthyllis repens italicæ, thyinæ foliis, rubente flore, polygonifacie. *Till. pis.* 46.
Cali f. *Vermiculari* marinæ non dissimilis planta. *Bauh. hist.* 3. p. 703.
Polygonum fruticosum supinum ericoides cinereum, thymi folio, hispanicum. *Barr. ic.* 714. *Bocc. mus.* 1. p. 7. t. 11.
Polygonum maritimum minus, foliis serpylli. *Bauh. pin.* 281.
Habitat in Europæ australis maritimis. ♀

2. FRANKENIA caulibus hirsutis, floribus fasciculatis *hirsuta* terminalibus.

- Franca maritima* supina multiflora candida, caulis hirsutis, foliis quasi vermiculatis. *Mich. gen.* 23. t. 22. f. 2.
Poly-

*Polygonum creticum, thymi folio. Baub. pin. 281.
prodr. 131.*

*Alpine cretica maritima supina, caule hirsuto, foliis quasi
vermiculatis. Tournef. cor. 45.*

Habitat in Apulia, Creta.

pulverulenta 3. **FRANKENIA** foliis obovatis retusis subtus pulveratis.
Frankenia foliis ovalibus. *Sauv. monsp.* 168.

*Franka maritima quadrifolia supina, chamæsyces folio
& facie. Mich. gen. 23.*

Anthyllis valentina. Clus. hist. 2. p. 186.

Anthyllis marina, chamæsyces similis. Baub. pin. 282.

*Habitat in Sussexia, Narbonæ, Italiam, Apuliæ littori-
bus. ⊖*

In ordine Naturali ad XL referatur.

PEPLIS.

Portula.

1. **PEPLIS.** *Fl. lapp. 128. Fl. jucc. 291. Hall. helv. 406.*

*Glaucoides palustre, portulacæ folio, flore purpureo.
Mich. gen. 21. t. 18.*

*Glaux palustris, flore striato clauso, foliis portulacæ. T.
Petit. gen. 43. t. 43.*

*Glaux aquatica, folio subrotundo. Loef. pruss. 106. t.
20.*

*Glaux altera, subrotundo folio. Vaill. paris. 80. t. 15.
f. 5.*

Alpine palustris minor serpillifolia. Baub. pin. 251.

Habitat in Europa inundatis. ⊖

DIGYNIA.

VELEZIA.

rigida.

1. **VELEZIA.** *Loef.*

*Silene foliis subulatis cauli appressis calycibus rigidis in-
termedio longioribus. Sauv. monsp. 145.*

*Lychnis sylvestris minima, exiguo flore. Baub. pin. 206,
prodr. 103.*

*Lychnis minima rigida cherleri. Baub. hist. 3. p. 352.
Raj. hist. 997.*

*Lychnis corniculata minor. Barr. rar. 665. t. 1018.
1017. Bacc. muj. 2. p. 50. t. 43.*

Habitat in Europa australi. ⊖

*Staminia tenuissima difficillime numerantur; in siccis spe-
cimini-*

ciminibus 5 vidi; at in vivis circiter 6 Lœfling. Si hujus ordo naturalis sit n. XL, numerus naturalis erit staminum sex, si vero XLII, erit quinque.

ORYZA.

1. ORYZA. Bauh. pin. 24. theatr. 479. Cam. epit. 192. *sativa.*
Dod. pempt. 509. Catesb. car. 1. p. 14. t. 14. Hort.
cliff. 137. Mat. med. 174. Roy. lugdb. 58.
Habitat forte in Æthiopia, colitur in Indiæ paludosis. ◎

ATRAPHAXIS.

1. ATRAPHAXIS ramis spinosis. *Hort. cliff.* 138. *spinosa.*
Roy. lugdb. 409.
Atriplex orientalis, frutex aculeatus, flore pulchro.
Tournef. cor. 38. *Buxb. cent.* 1. p. 19. t. 30. *Dill.*
elth. 47. t. 40 f. 47.
Habitat in Media ad urbem Hansen locis glareosis juxta
fluvios. ♀
2. ATRAPHAXIS inermis. *undulata.*
Atrapaxis inermis, foliis undulatis. *Hort. cliff.* 137.
Roy. lugdb. 409.
Arbuscula africana repens, folio ad latera criso, ad po-
lygona relata. *Dill. elth.* 36. t. 32. f. 36.
Habitat in Æthiopia? ♀

TRIGYNIA.

FLAGELLARIA.

1. FLAGELLARIA. Fl. zeyl. 133. Amœn. acad. 1. indices.
p. 398.
Panambu-valli. Rheed. mal. 7. p. 99. t. 53. Raj.
suppl. 573.
Habitat in Java, Malabaria, Zeylona. ♀
Frutex humanam altitudinem superans. Rami distichi.

RUMEX.

- * *Hermaphroditi: valvulis floris granulo notatis.*
1. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerri- *Patientia.*
inis: unica granularia, foliis cordatis. Mat. med. 178.
Lapathum hortense, folio oblongo. Bauh. pin. 114.
Lapathum sativum. Dod. pempt. 648.

Habitat in Italia. 2

Confer. Lapathum hortense latifolium. Baub. pin. 115.

sanguineus. 2. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerimis: unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 138. *Hort. upl.* 89. *Mat. med.* 528. *Roy. lugd.* 229.

Lapathum folio acuto rubente. Baub. pin. 115.

Lapathum rubens. Dod. pempt. 650. Cam. epit. 229.

Habitat in Virginia. 3

Valvula exterior floris grano magno globoſo rubro notata, rarius & altera grano minimo.

alpinus. 3. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerimis graniferis; foliis imis ellipticis. *Sauv. monsp.* 69:† *Rumex folio pedali cordato, radice repente. Lemonier. Sauv. monsp.* 111.

Lapathum androgynum obtusifolium, spica confertissima. Hall. helv. 170.

Lapathum hortense rotundifolium s. montanum. Baub. pin. 115.

Lapathum rotundifolium. Clas. hist. 2. p. 69.

Habitat in Helvetia, Monspelii. 2

verticillatus. 4. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerimis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis: vaginis cylindricis.

Lapathum aquaticum, foliis longis angustis acutis, floribus ad genicula verticillati congestis. Gron. virg. 39.

Habitat in Virginia. 2

Britannica. 5. RUMEX floribus hermaphroditis. valvulis integerimis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis: vaginis obsoleus. *Mat. med.* 17.

Rumex aquatica, calycis foliolis omnibus aequalibus, radice exterius nigra vel flava. Cold. noveb. 83.

Lapathum foliis longis latis vix acuminatis costis caulinibusque rubentibus, radice intus crocea. Gron. virg. 39.

Habitat in Virginia. 2

In precedenti stipula cylindrica membranacea fere ad dimidium vaginans internodium, in hac vero non item, sed ut in Europeis. Pedicelli in priori crassiores in hac capillares; prior magis spicata; haec magis paniculata. Plantam Gron. in Fl. virginica habui a Cl. Aubore, que non rubra erat caule aut costis.

6. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis trifido-setaceis: unica granifera. *Hort. apf.* 89.
Rumex floribus hermaphroditis, foliis oblongis, valvulis dentato-setaceis longissimis. *Wach. ultr.* 391.
Lapathum ægypticum, capsula seminis alba & crenata.
Dill. elth. 191. *t. 158. f. 191.*
Lapathum ægyptiacum annuum, parietariæ foliis, capsula seminis longius barbata. *Till. pis.* 43. *t. 37.f. 1.*
Habitat in Ægypto. ◎
7. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis: *perficioides.*
omnibus graniferis, foliis lanceolatis.
Habitat in Virginia. ◎
Planta spithamea, ramosissima. Folia lanceolata, petiolata, levia, undata, integræ: Floris valvulae dentibus utrinque tribus longis, omnes rectæ granis pallidis magnis.
8. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis *maritimus.*
graniferis, foliis linearibus. *Lech. scan.* 26. *It. scan.* 248.
Lapathum aquaticum, luteolæ folio. *Tournef. inst.* 504.
Lapathum aquaticum, angustissimo acuminato folio *Bocc. mus.* 2. *p.* 142. *t. 104.*
Habitat in Europæ litoribus maritimis.
9. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integris glabrae *crispus.*
niferis, foliis lanceolatis undulatis acutis,
Rumex floribus hermaphroditis: valvulis integerimis planis, foliis cordato-oblongis. *Fl. suec.* 292. *Hort. cliff.* 138. *Roy. lugdb.* 229.
Rumex foliis cordato-oblongis acuminatis integris. *Fl. lapp.* 129.
Lapathum folio acuto criso. *Baub. pin.* 115.
Lapathum acutum crispum. *Tabern. ic.* 436.
Habitat in Europæ succulentis. ♀
10. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis acutis,
graniferis, foliis cordato-oblongis. *Hort. cliff.* 138.
Mat. med. 176. *Fl. suec.* 293. *Roy. lugdb.* 229.
Lapathum acutum s. Oxylapathum. *Baub. hist.* 2. *p.* 983. *Lob. ic.* 284.
Lapathum acutum. *Raj. hist.* 175.
Habitat in Europæ succulentis. ♀
11. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis, *obtusifolius.*
foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis. †
La-

Lapathum involucro seminis dentato, foliis obtusis ora crispula. *Hall. helv.* 172.

Lapathum sylvestre, folio subrotundo, seminis involucris dentatis. *Morif. hist.* 2. p. 580.

Lapathum folio minus acuto. *Bauh. pin.* 111.

Lapathum vulgare, folio obtuso. I. B. *Raj. hist.* 175.

Lapathum. *Cam. epit.* 228.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Anglia. 2

* *Hermaphroditii: valvulis granulo destitutis s. nudis.*

pulcher. 12. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis lyratis. *Guett. stamp.* 1. p. 7.

Lapathum ramis procumbentibus, seminis involucro dentato, foliis inferioribus instar fidium. *Morif. hist.* 2. p. 580.

Lapathum pulchrum bononiense sinuatum. *Bauh. hist.* 2. p. 988. *Raj. hist.* 1. p. 174.

Habitat in Gallia, Italia, Veronæ.

bucephalo-
phorus. 13. RUMEX floribus hermaphroditis; valvulis dentatis nudis planis reflexis. *Hort. upf.* 90.

Rumex fructibus dentatis calyce reflexis, caput bovinum. referentibus. *Hort. cliff.* 139.

Acetosa, ocymi folio, neapolitana. *Bauh. pin.* 114.

Acetosa, ocymi folio, bucephalophorus. *Col. ecphr.* 1. p. 151. t. 150.

Habitat in Italia. ②

aquaticus. 14. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerimis nudis, foliis cordatis.

Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.

Lapathum palustre. *Tabern. ic.* 437.

Hippolapathum. *Dalech. hist.* 604. *Cam. epit.* 232.

Herba britannica. *Munt. brit.* t. 1.

Habitat in Europa ad ripas fluviorum & paludum. 2

Lunaria. 15. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis lœvibus, caule arboreo, foliis subcordatis. *Vir. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 139. *Roy. lugdb.* 320.

Acetosa arborecens, subrotundo folio. *Pluk. alm.* 8. t. 252. f. 3.

Lunaria magorum arabum. *Bauh. hist.* 2. p. 994?

Habitat in Canariis. 3

vesicularius. 16. RUMEX floribus hermaphroditis geminatis: valvularum alis maximum membranaceis reflexis, foliis indivisis. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upf.* 90. *Roy. lugdb.* 230.

Acc-

Acetosa americana. foliis longissimis pediculis donatis.
Baub. pin. 114. *prodr.* 54. *Moris. hist.* 2 p. 583. f.
 5. t. 28. f. 7.

Habitat in Africa. ◎

17. RUMEX floribus hermaphroditis distinctis. valvula reflexo-
 rum alis maximis membranaceis, foliis erosis. *Roy.*
lugdb. 230.

Acetosa ægyptia, roso seminis involacro. *Baub. afr.*
 5. f. 5.

Habitat in Ægypto. ◎

18. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis cordato-hastatis
 statis. *Vir. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 138. *Hort. upf.* 89.
Roy. lugdb. 230.

Acetosa rotundifolia horiensis. *Baub. pin.* 114. *Moris.*
hist. 2. p. 583. f. 5. t. 28. t. 9.

Lapathum androgynum acetosum, foliis sagittatis, ra-
 mis divergentibus. *Hall. herb.* 170.

Oxalis rotundifolia. *Dod. pemvt.* 649.

19. *Acetosa scutata repens*. *Baub. pin.* 114. *proar.* 55.
Habitat in Helvetia, Galloprovincia, inter acervos la-
pidum. ♀

20. RUMEX floribus hermaphroditis digynis. *Hort. cliff.* *digynus*
 138. *Fl. suec.* 294. *Roy. lugdb.* 230.

Rumex foliis orbiculatis emarginatis. *Fl. lapp.* 132.

Acetosa rotundifolia alpina. *Baub. pin.* 55. *prodr.* 114.

Acetosa repens vestmorlandica, coerulearæ foliis nonni-
 hil sinuatis. *Pluk. alm.* 8. t. 252. f. 2.

Acetosa britannica rotundifolia, fructu compreso. *Blair.*
obs. 67. t. 67.

Habitat in Alpibus Lapponicis, Helvetiis, Wallicis.

* * * *Floribus declinis.*

21. RUMEX floribus androgynis: calycibus feminis *spinoso-*
monophyllis: valvulis exterioribus reflexo-uncinatis.
Hort. upf. 89.

Rumex floribus androgynis, calycibus fructus uncinatis.
Hort. cliff. 139 *Roy. lugdb.* 230.

Beta cretica, semine aculeato. *Baub. pin.* 118. *prodr.* 57.

Beta cretica, semine spinoso. *Baub. hist.* 2. p. 962.

Habitat in Creta. ◎

22. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Acetosa.*
Vir. cliff. 32. *Hort. cliff.* 139. *Hort. upf.* 89. *Fl. suec.*
 295. *Fl. lapp.* 130. *Mat. med.* 529. *Roy. lugdb.* 231.

Y

Aceto-

- Acetosa pratensis.* Bauh. pin. 14.
B. *Acetosa pratensis*, flote albo. Tournef. inst. 502.
γ. *Oxalis crispa.* Bauh. hist. 2. p. 990. Tabern. ic. 440.
δ. *Acetosa montana maxima.* Bauh. pin. 114. Scheuch.
alp. 129.
ε. *Acetosa montana*, lato ari folio rotundo. Bocc. mus.
165. t. 125.
Habitat in Europæ pascais. ♂ in *Alpibus.* 2
- Acetosella.* 22. *RUMEX floribus dioicis*, foliis lanceolato-hastatis.
Vir. cliff. 32. *Hort. cliff.* 139. *Fl. lapp.* 131. *Fl. suec.*
296. *Roy. lugdb.* 231. *Gron. virg.* 153.
Acetosa arvensis lanceolata. Bauh. pin. 114.
Oxalis ovina. Tabern. ic. 440.
β. *Acetosa lanceolata angustifolia repens.* Bauh. pin. 114
prodr. 55.
γ. *Acetosa arvensis minima non lanceolata.* Bauh. pin.
114.
δ. *Acetosa minor erecta*, lobis multifidis. Bocc. mus. 164.
t. 126.
Habitat in Europæ pascais ♂ arvis arenosis. 2

SCHEUCHZERIA.

- palustris.* 1. *SCHEUCHZERIA.* *Fl. lapp.* 133. *t. 10.* *f. 1.* *Fl.*
suec. 297. *Roy. lugdb.* 45. *Hall. helv.* 258. *Gmel. fib.*
1. p. 73. *Berg. viadr.* 67.
Juncus floridus minor. Bauh. pin. 12. *prodr.* 43. *theatr.*
190. *Rudb. elys.* 1. *p. 110.* *f. 2.*
Juncoidi affinis palustris. Scheuch. *gram.* 336.
Gramen junceum aquaticum, semiue racemoso. *Læs.*
pruss. 114. *t. 28.*
Habitat in Lapponiæ, Helvetiæ, Borussiæ, Sueciæ palu-
dosis. 2

TRIGLOCHIN.

- calcare.* 1. *TRIGLOCHIN capsulis trilocularibus sublinearibus.*
Fl. suec. 298. *Aet. stockb.* 1742. *p. 147.* *t. 6.* *f. 1.*
2. 3.
Triglochin fructu tenui. *Fl. lapp.* 134. *Roy. lugdb.* 44.
Hall. helv. 258.
Gramen junceum spicatum s. *Triglochin.* Bauh. pin.
6. theatr. 80.
Calamagrostis IV. Dalech. hist. 1006.
β. *Juncago maritima perennis*, bulbosa radice. *Mich. gen.*
44.

Jun

Juncago maritima. *Barr. var.* 55. t. 271.
Habitat in Europæ inundatis aliginosis. ♂

1. **TRIGLOCHIN** capsulis sextocularibus ovatis. *Fl. marinum.*
suec. 299. *Act. Stockh.* 1742. p. 147. t. 6. f. 4. 5.
Triglochin fructu subrotundo. *Fl. lapp.* 135. *Roy. Ingab.*
 45. *Gort. gele.* 76.
Juncago palustris & maritima pesennis, *fructu breviore*
quinquem capsulari. *Mich. gen.* 44.
Gramen spicatum alternatum. *Baub.* pin. 6. *theat.* 82.
Habitat in Europæ maritimis. ♀

MELANTHIUM.

1. **MELANTHIUM** petalis unguiculatis. *virginicum.*
Melanthium foliis linearibus integerrimis longissimis, flo-
ribus paniculatis. *Gron. virg.* 59.
Habitat in Virginia. ♀
2. **MELANTHIUM** petalis sessilibus. *Aman.* *acad. 2. sibiricum.*
*p. 349. t. 11. **
Oriuithogalum spicis florum longissimis ramosis. *Gmel.*
sib. 1. p. 45. t. 8.
Habitat in Sibiria. ♀

MEDEOLA.

1. **MEDEOLA** foliis verticillatis, ramis aculeatis. *aculeata.*
Fruticulus foliis ruscii stellatis. *Dill. elth.* 148. t. 123.
f. 149.
Habitat in America calidiore. ♂
2. **MEDEOLA** foliis verticillatis, ramis incrinitibus. *virginiana.*
Niedeola foliis stellatis lanceolatis, fructu baccalo.
*Gron. virg. 39. **
Lilium s. Martagon pusillum, floribus minutissime her-
baceis. *Plak. alme.* 401. t. 328. f. 4.
Habitat in Virginia. ♂
3. **MEDEOLA** foliis alternis.
Asparagus foliis ovato-lanceolatis solitariis. *Hort. cliff. asparagiata.*
t. 22. Roy. Ingdb. 29.
Asparagus africanus scandens, myrti folio. *Till. pis.*
16. t. 12. f. 1. 2.
Habitat in Æthiopia. ♂

TRILLIUM.

1. **TRILLIUM** flore pedunculato cernuo. *cernuum.*
Y. ♀ *Paris*

Paris foliis ternis, flore pedunculato nutante. *Cola.*
noveb. 81.

Solanum triphyllum, flore hexapetalo carneo. *Catesb.*
carol. 1. p. 45.

Habitat in Carolina. ♀

creatum. 2. *TRILLIUM* flore pedunculato erecto.

Paris foliis ternis, flore pedunculato erecto. *Amaen. acad.*
1. p. 154. *

Solanum triphyllum brasiliense. *Bauh. pin.* 167. *prodr.*
91. *Burs.* IX: 12.

Solanum triphyllum canadense. *Corn. canad.* 166. t. 167

Solano congener triphyllum canadense. *Moris. hist.* 3
p. 532. f. 13. t. 3. f. 7.

Habitat in Virginia.

sessile. 3. *TRILLIUM* flore sessili erecto.

Paris foliis ternatis, flore sessili erecto. *Gron. virg.* 44.

Solanum virginianum triphyllum, flore tripetalō atropurpureo in foliorum fini, absque pediculo, sessili. *Pluk.*
alm. 352. t. III. f. 6.

Solanum triphyllum, flore hexapetalō: tribus petalis purpureis, cæteris viridibus reflexis. *Catesb. car.* 1. p.
50. t. 50.

Habitat in Virginia, Carolina. ♀

MENISPERMUM

canadense. 1. *MENISPERMUM* foliis peltatis subrotundis angulatis. *Hort. cliff.* 140. *Hort. upf.* 91. *Gron. virg.* 153.

Menispernum canadense scandens, umbilicato folio,
Tournef. adt. 1705. p. 311.

Hedera monophyllum virginiana, *convolvuli* foliis. *Pluk.*
alm. 181. t. 36. f. 2.

Habitat in Virginia, Canada. ♀

virginicum. 2. *MENISPERMUM* foliis cordatis peltatis lobatis.
Gron. virg. 40.

Menispernum folio hederaceo. *Dill. elth.* 223. t. 178.
f. 219.

Habitat in Virginiae & Carolinæ maritimis. ♀

carolinum. 3. *MENISPERMUM* foliis cordatis subtus villosis.
Habitat in Carolina.

cocculus. 4. *MENISPERMUM* foliis cordatis retusis mucronatis. *Mat. med.* 175.

*Arbor, aristolochiæ foliis, maderaspatana, fructu parvo
inedicæ ad instar convoluto.* *Pluk. alm.* 43. t. 13
f. 2.

Cocculus officinarum. *Baub. pin.* 511. *Pluk. mani*
52. t. 345. f. 2.

Natsialam. *Rheed. mal.* 7. p. 1. t. 1. an?

Habitat in India. 5

5. *MENISPERMUM* foliis orbiculatis subtus villosis. *orbiculatum.*

Cocculi orientalis frutex convolvulaceus, orbiculatis fo-
liis prona parte villosis. *Pluk. amalb.* 61. t. 384. f. 6.

Habitat in insula Crocodilorum Asiae.

6. *MENISPERMUM* foliis lanceolato-ovatis villosis. *hirsutum.*

Cocculi indici altera species minor scandens, vincæ per-
vincæ foliis villosis. *Pluk. amalb.* 61. t. 384. f. 7.

Habitat in India.

7. *MENISPERMUM* foliis linear-lanceolatis hirsutis. *myosotidea.*

Cocculi indici species minima, myosotidis hirsutis foliis
& facie. *Pluk. phyt.* 384. f. 3.

Habitat in India.

SAURURUS.

1. *SAURURUS* foliis cordatis petiolatis, spicis solitari-*cernuus.*
is recurvis. *Hort. upf.* 91.

Saururus foliis profunde cordatis ovato-lanceolatis, spi-
cis solitariis propendentibus folio brevioribus. *Roy.*
Iugdb. 8.

Saururus foliis profunde cordatis ovato-lanceolatis, spi-
cis solitariis folio longioribus. *Hort. cliff.* 139. *Gron.*
virg. 40.

Serpentaria repens, floribus stamineis spicatis, *bryoniæ*
nigræ folio ampliore pingvi, *virginensis.* *Pluk. alm.*
343. t. 117. f. 4.

Habitat in Marilandia, Virginia. 2

COLCHICUM.

1. *COLCHICUM* foliis planis lanceolatis *erectis.* *Hort. autumnale*
cliff. 140. *Hort. upf.* 90. *Roy. Iugdb.* 41. *Sauv.*
monsp. 18. *Baehn. lipf.* 29.

Colchicum commune. *Baub. pin.* 67.

Colchicum. *Fuch. hist.* 356. 357.

2. *Colchicum* flore pleno. *Baub. pin.* 67.

Habitat in Europæ australioris succulentis. 2

- montanum.* 2. COLCHICUM foliis linearibus patentissimis. *Löf.*
Colchicum montanum angustifolium. *Baub. pin.* 68.
Colchicum montanum. *Cle. Bisp.* 265. t. 267. *bist.*
 1. p. 200.
Habitat in Hispania, Helvetia. 2
Folia una cum floribus autumno erumpunt.
- variegatum.* 3. COLCHICUM foliis undulatis patenribus. *Hort. cliff*
 140. *Rov. lugdb.* 42.
Colchicum chionense, floribus fritillariæ instar tessula-
tis, foliis undulatis. *Morif. bist.* 2. p. 341. s. 4 t.
 3. s. 7.
Habitat in Chio insula. 2

HELONIAS.

- Bullata.* 1. HELONIAS. *Gen. nov.* 1077. s. 1. *
Ephemereum phalangoides virginianum, flosculis arbuteis
bullatis in spicam dispositis. *Plak. alm.* 135. t. 174
 s. 5. *Morif. bist.* 3. p. 606. s. 15. t. 2. f. 1.
Habitat in Pensylvaniæ paludosis. 2

TETRAGYNIA.

PETIVERIA.

- illaceum.* 1. PETIVERIA. *Hort. cliff.* 141. *Hort. upf.* 91. *Ad.*
Stockb. 1744. p. 287. t. 7.
Petiveria solani foliis, loculis spinosis. *Plum. gen.* 50.
Verbenæ aut Scorodonie affinis anomala, flore albido,
calyce aspero, alii odore. *Sloan. jam.* 64. *bist.* 1. p.
 172. *Raj. suppl.* 287.
Habitat in Jamaicæ nemorosis. 3

POLYGYNIA.

ALISMA.

- Plantago.* Δ. ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis.
Alisma fructu obtuso trigono. *Fl. lapp.* 138. *Fl. suec.*
 300. *Hort. cliff.* 141. *Rov. lugdb.* 46.
Plantago aquatica latifolia. *Baub. pin.* 190.
Plantago aquaticæ. *Cam. epit.* 264.
Habitat in Europæ aquosis & ad ripas fluviorum, lacu-
m. 4

z. ALI-

2. ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus globosis. *flava.*
Damasonium maximum, plantaginis folio, flore flave-
scente, fructu globoſo. Plm. spec. 7.
Habitat in America meridionali. 2
3. ALISMA foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis. *Damasoni-*
Alisma fructu sexcorni. Hort. cliff. 141. Roy. lugdb. 111.
46. Sauv. monsp. 14.
Plantago aquaticastellata. Baub. pix. 190.
Plantago aquatica minor altera. Lob. ic. 301.
Damalonium stellatum. Dalech. hist. 1058.
Habitat in Anglia, Gallia aquosis.
4. ALISMA foliis cordatis obtusis. *cordifolia.*
Damasonium ramosum, folio cordiformi. Vaill. act.
1719. p. 28.
Sagittaria virginiana, obtusiore lato folio, floribus mino-
ribus albis. Moris hist. 3. p. 618. f. 15. t. 4. f. 6.
Habitat in Virginia. 2
5. ALISMA foliis ovatis obtusis, pedunculis solitariis. *nataus.*
Damasonium repens, potamogetonis rotundifolii folio.
Vaill. act. 1719. p. 29. t. 4. f. 8.
Damasonium radiculas emittens ex geniculis. Vaill. pa-
ris. 46.
Ranunculus palustris foliis gramineis & subrotundis.
Petit. gen. 47.
Habitat in Gallia, Sueticæ fossis.
6. ALISMA foliis linear-lanceolatis, fructibus globoſo- *Ranunculo-*
squarroſis.
Alisma fructu globoſo undique echinato. Hort. cliff.
141. It. gal. 298. Fl. suec. 301. Roy. lugdb. 46. Gort
gebr. 77. Sauv. monsp. 14.
Damasonium angustissimo plantaginis folio. Vaill. act
1719. p. 35.
Plantago aquatica humilis angustifolia. Baub. hist. 3. p
738. Lob. ic. 300.
Ranunculus aquaticus, plantaginis folio angustissimo. T.
Pet. gaz. 41. t. 26. f. 12.
Habitat in Gotlandia, Belgii, Anglia, Gallia fossis.
1. ALISMA foliis subulatis. *Gron. virg. 153* *subulata.*
Habitat in Virginie.

Classis VII.

HEPTANDRIA
MONOGYNIA.

TRIENTALIS.

- europaea.* 1. TRIENTALIS foliis lanceolatis integerrimis.
Trientalis. Fl. lapp. 139. Fl. suec. 302. Roy. lugdb. 438.
Alsine alpina. Swenckf. filef. 117.
Pvrola alsines flore europaea. Baub. pin. 191. prodr. 101.
Pyrola, alsines flore minor brasiliiana. Baub. prodr. 101.
*t. (Sub *Hermadactyli* nomine) 99. Burf. X. 107.*
Habitat in Europæ borealis sylvis & juniperetis. 2.
- capensis.* 2. TRIFNTALIS foliis subrotundis crenatis. *Roy. lugdb.*
538. †
Habitat ad Cap. b. Spei.
Plantam hanc non vidi, ex auctoritate Clariss. D. Ro-
yeni adpojus.

ÆSCULUS.

- Hippo Casta-* 1. ÆSCULUS floribus heptandris. *Hort. upf. 92.*
num. *Æsculus. Hort. cliff. 142. Roy. lugdb. 463*
Castanea folio multifido. Clus. hist. I. p. 7.
Habitat in Asia septentrionaliore, unde in Europam:
1550. 5,
- Pavia.* 2. ÆSCULUS floribus octandris.
Pavia. Boerb. lugdb. 2. p. 260. t. 260. Hort. angl. 54.
t. 19. Hort. cliff. 143. Roy. lugdb. 463.
Saamouna pisonis f. filiquifera brasiliensis arbor, digi-
tatis foliis ferratis, floribus teucrii purpureis. Pluk.
alm. 326. t. 50. f. 4.
Habitat in Carolina, Brasilia. 5,

Classis VIII.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

TROPÆOLUM.

1. TROPÆOLUM foliis integris, petalis acuminiato *se-*
taceis. Hort. upf. 93. *mains.*
Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. Hort. cliff. 145.
Cardamindum minus & vulgare T. Fewill. peruv. 3.
p. 14. t. 8.
Nasturtium indicum majus. Bauh. pin. 306.
Nasturtium indicum. Lob. ic. 166. f. 2. 1.
Habitat in Peru, Lima. ⊙ 2.
2. TROPÆOLUM foliis subquinquelobis, petalis obtusis *minus.*
Hort. upf. 93.
Tropæolum foliis peltatis orbiculatis. Hort. cliff. 143.
Cardamindum ampliori folio & majori flore. T. Few.
peruv. 3. p. 14. t. 8.
Acriviola maxima odorata. Boerb. lugdb. 1. p. 244.
Viola inodora scandens, nasturii sapore, maxima odora-
ta. Herin. lugdb. 628. t. 629.
Habitat in Peru, unde in Europam venit 1684 cura Be-
werningii. ⊙ 2.
3. TROPÆOLUM foliis palmatis, petalis multifidis. *peregrinum.*
Cardamindum quinquefolii folio, vulgo Malla. Few.
peruv. 2. p. 756. t. 42.
Habitat in Peru, nondum miki visa in Europa. ⊙.

OSBECKIA.

1. OSBECKIA. *chinensis.*
Echinophora maderaspatana, sideritis non serratis nervo-
sis folis, fructu capsulari caucalidis æmulo. Pluk.
alm. 132. t. 173. f. 4.
Kadali maderaspatanum minus, capsulis pilosis. Raj.
suppl. app. 236.
Habitat in India; in honorem Petr. Osbeck, Sveci, qui
1751. plantas Chinæ & Javæ periculoſo itinere adiit, le-
git, examinavit, descripsit, communicavit.
Habitus Melastomæ. Caulis eretus brachiatus, acute tetra-
gonus.

gonus. Folia angusto-lanceolata, trinervia, opposita, scabra, subsessilia. Flores terminales aliquot, sessiles, eiusdem foliis 4 stare longioribus patentibus.

RHEXIA.

virginica.

1. RHEXIA calycibus glabris. *Gron. virg. 41.*
Alisanus vegetabilis carolinianus. Pluk. amalt. 8.
Lysimachia non papposa virginiana, tuberariae foliis hirsutis, flore tetrapetalo rubello. Pluk. alm. 235. t. 202. f. 8.

Habitat in Virginia.

Caulis tetragonus angulis membranaceis. Folia opposita, sublanceolata, internodis longiora, sessilia, trinervia, pilis vagi, hispidiuscula, subserrata ferraturis setaceis. Pedunculus terminalis, dichotomus. Flores solitarii ex dichotomia, subsessiles, petalis rubris; Aatheris fallatis, luteis.

marijuana.

2. RHEXIA foliis ciliatis.
Lysimachia non papposa, terræ marijanæ, leptoneuros, flore tetrapetalo rubello, folio & caule hirsutie ferruginea hispidis. Pluk. mant. 123. t. 428. f. 1.

Habitat in Mariolandia.

OENOTHERA.

bennise.

1. OENOTHERA foliis ovato-lanceolatis planis. *Vir. cliff. 33. Hort. upf. 94. Gron. virg. 254. Roy. lugdb. 251. Gort. getr. 73*
Oenothera foliis ovato-lanceolatis denticulatis, floribus lateralibus in summo caulis. Hort. cliff. 144.
*Lysimachia lutea corniculata. Baub. pin. 245: 516. **
Morif. hist. 2. p. 271. f. 3. t. 1. f. 7.
Habitat in Virginia unde 1614, nunc vulgaris Europeæ. §

villiflora.

2. OENOTHERA foliis lanceolatis undulatis. *Vir. cliff. 33. Gron. virg. 42. Roy. lugdb. 251.*
Oenothera foliis linear-lanceolatis dentatis, floribus ex medio caule. Hort. upf. 144.
Onagra bonatiensis villosa, flore mutabili. Dill. elth. 297. t. 219. f. 286.
Habitat in agro Bonatiensi. ○

serraticula.

3. OENOTHERA foliis lanceolatis, capsulis acutangulis.
Oenothera florum calyce monophyllo, hinc tantum aperito. Gron. virg. 42.

Ona-

Onagra angustifolia, caule rubro, flore minore. *Tournef.*
inf. 302.

Habitat in Virginia. ♀

*Calyx purpurascens, tetraphyllus, sed rumpitur altero
ſepiis & unico latere. Tubus filiformis, angustiſſi-
mus. Capsula angulis 4 acutis compressis. Folia rari-
us denticulata.*

GAURA.

1. GAURA. *Gen. nov.* 1111.

Hiemis.

Lysimachia lutea angustifolia virginiana, flore minore.

Pluk. alm. 235. t. 202. f. 7. mata.

Habitat in Virginia, Pennsylvania. ♂

EPILOBIUM.

* *Staminibus declinatis.*

1. EPILOBIUM foliis sparsis lanceolatis.

angustifolia.

*Epilobium floribus distortibus, pistillo declinato. Fl.
ſuec. 304.*

*Epilobium foliis lanceolatis integerrimis. Fl. lapp. 146.
Hort. cliff. 154. Roy. lugdb. 250.*

*Lysimachia Chamænerion dicta angustifolia. Bauh. pin.
245.*

2. *Lysimachia Chamænerion dicta latifolia. Bauh. pin.
245.*

2. *Lysimachia Chamænerion dicta alpina. Bauh. pin. 245.
prodr. 116.*

Habitat in Europa boreali. ♀

2. EPILOBIUM foliis alternis lanceolato-ovatis.

latifolia.

Habitat in Sibiria. ♀

*Differ a precedenti floribus duplo majoribus, foliis lan-
ceolato-ovatis, alternis nec sparsis, utrinque levissimo
tomento molliſſimis. Hæc & antecedens differunt
a ſequentibus in non paucis, his enim Flores in equa-
les petalis integris; Pistillum declinatum; Folia al-
ternata; Folia erumpentia revoluta contra ac in re-
liquis.*

* *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.*

3. EPILOBIUM foliis oppositis lanceolatis ferratis. *hirsutum.*

*Hort. cliff. 145. Fl. ſuec. 305 Gron. virg. 154.
Roy. lugdb. 251.*

Lysimachia siliquosa hirsuta, magno flore. Bauh. pin. 245.

Lysimachia purpurea. Fuchs. hist. 491.

3. Lysi-

β . *Lysimachia filiformis hirsuta*, parvo flore. *Baub. pin.*
245. *prodr.* 116.
Habitat in Europæ humidiæ sculis. 2

montanum. 4. *EPILOBIUM* foliis oppositis ovatis dentatis. *Fl. lapp.*
147. *Fl. suec.* 306. *Hort. cliff.* 145. *Roy. lugdb.* 251.
Lysimachia filiformis glabra major.
Pseudo-Lysimachium purpureum primum Dod. pempt.
85.

Habitat in Europæ montosis..

tetragonum. 5. *EPILOBIUM* foliis lanceolato-lineatibus denticulatis:
imis oppositis, caule tetragono. *Sauv. monsp.* 75.
Lysimachia filiformis glabra minor. *Baub. pin.* 303. *Raj. hist.* 861.
Lysimachia minor.. Tabern. ic. 854.
Habitat in Europa 2

palustre. 6. *EPILOBIUM* foliis oppositis lanceolatis integerimis,
petalis bifidis, caule erecto. *Fl. suec.* 307.
Epilobium foliis linearibus. *Fl. lapp.* 149. *Roy. lugdb.*
251.
Lysimachia filiformis glabra angustifolia. *Baub. pin.* 245.

β . *Epilobium* foliis lanceolatis, ramose florens. *Fl. lapp.* 148.
Habitat in Europæ humidiæ sculis.. Et in Alpibus. 2

alpinum.. 7. *EPILOBIUM* foliis oppositis ovato-lanceolatis integerrimis,
filiisque sessilibus, caule repente..
Epilobium foliis ovalibus: superioribus attenuatis. *Fl.*
juec. 308.
Epilobium foliis ovato-oblongis integerrimis. *Fl. lapp.*
150.
Epilobium, foliis ellipticis obtuse lanceolatis, totum læve.
Hall. helv. 400.
Chamænerion alpinum, alfines foliis. *Scheuch. alp.* 132.
332.
Habitat in Alpibus Helveticis, Lapponicis. 2
Repens est, primo vere florens. germinibus sessilibus.

GRISLEA..

seunda. 1. *GRISLEA.* *Hort. cliff.* 146.
Habitat in America calidiore. 5

ALLOPHYLUS.

zeylanicus. 1. *ALLOPHYLUS.* *Fl. zeyl.* 140.
Habitat in Zeylona. 5

MIMUSOPS.

1. MIMUSOPS foliis alternis remotis. *Fl. zeyl.* 138. *Elengi.*
Kauki indorum. *Pluk. alm.* 203. *Breyn. cent.* 20 t. 3.
Elengi. *Rheed. mal.* 1. p. 34. t. 20.
2. MIMUSOPS foliis consertis. *Fl. zeyl.* 137. *Kauki.*
Habitat in Zeylona. 5

JAMBOLIFERA.

1. JAMBOLIFERA. *Fl. zeyl.* 139. * *pedunculata.*
Jambolones. *Bauh. pin.* 466.
Habitat in India. 5

SANTALUM.

1. SANTALUM. *Mat. med.* 183. *album.*
Santalum verum. *Breyn. ic.* 94 t. 5. f. 1.
Santalum album. *Bauh. pin.* 392.
Habitat in India. 5

MEMECYLON.

1. MEMECYLON foliis ovatis. *Fl. zeyl.* 136. *capitellatum.*
Cornus sylvestris, foliis croceum colorem tingentibus,
flosculis ad foliorum alas globosis. *Burm. zeyl.* 76. t. 30.
Habitat in Zeylona. 5

LAWSONIA.

1. LAWSONIA ramis inermibus. *Fl. zeyl.* *inermis.*
Ligustrum ægyptiacum latifolium. *Bauh. pin.* 476.
Alhenna s. *Henna arabum.* *Walth. hort.* 3. t. 4.
Pontaletsce. *Rheed. mal.* 4. p. 117. t. 57.
Habitat in India, Ægypto. 5
2. LAWSONIA ramis spinosis. *Fl. zeyl.* 134. *spinoza.*
Rhamnus malabaricus. *Mail-anschi.* *Pluk. alm.* 38. t.
 220. f. 1.
Mail-anschi. *Rheed. mal.* 1. p. 73. t. 40..
Habitat in India. 5

VACCINIUM.

* *Foliis annotinis deciduis.*

1. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis ferratis o-*Myrtillus.*
 vatis deciduis, caule angulato. *Fl. lapp.* 143. *Fl. suec.*
 313. *Mat. med.* 184. *Hort. cliff.* 148. *Roy. lagdb.*
 239. *Hall. belv.* 419.
Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante.
Bauh. pin. 470. *Miv.*

Myrtillus germanica & *Vitis idaea*. Dalech. hist. 191.

^{192.}

Habitat in Europa borealis jylvis umbrosis. h

stamineum. 2. **VACCINIUM** pedunculis solitariis unifloris, antheris corolla longioribus, foliis oblongis integerimis. *Vaccinium stamineum* corolla longioribus. Gron. v. 43. *Vitis idaea americana*, longiori mucronato folio & crenato, floribus urceolatis racemosis. Pluk. atm. 331. t. 339; f. 3.

Habitat in America septentrionali. h

Frutex. Folia oblonga, integerima. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, filiformes, corolla longiores. Corollae quinquefidae, campanulato patentibus. Antheræ 10. Stylus flore longior.

uliginosum. 3. **VACCINIUM** pedunculis unifloris, foliis integerimis ovalibus basi ciliatis.

Vaccinium foliis ovalibus integerimis deciduis. Fl. suec. 312.

Vaccinium foliis annuis integerimis. Fl. lapp. 142. Hall. helv. 414.

Vitis idaea foliis subrotundis exalbidis. Baub. pin. 470.

Vitis idaea 11. Clas. hist. 1. p. 61. t. 62.

Habitat in Succie borealibus & alpinis, uliginosis.. h

album. 4. **VACCINIUM** pedunculis simplicibus, foliis integerimis ovatis subtus tomentosis.

Habitat in Pennsylvania. Kalm. h

Frutex. Folia ovata, subius tomentosa. Flores duo vel tres ad apices ramorum: pedunculis aggregatis, brevissimis, nudis.

mucronatum 5. **VACCINIUM** pedunculis simplicissimis unifloris, foliis ovatis mucronatis glabris integerimis.

Habitat in America septentrionali. Kalm. h

Frutex Ramis sericeis, glaucis. Folia elliptica, utrinque glabra, integerima, mucronata, petiolis cundiculatis insidentia. Pedunculi uniflori, foliis paulo breviores.

corymbosum. 6. **VACCINIUM** floribus corymbois ovatis, foliis oblongis acuminatis integerimis.

Habitat in America septentrionali. Kalm. h

Frutex. Folia oblonga, acuta, nervis subtus villatis. Corymbi ex gemmaceo involucro, sessiles. Corollæ cylindraceæ-ovatae, longiores, quam in reliquis. Stamina decem.

7. **VAC-**

7. VACCINIUM racemis filiformibus foliosis, foliis ob-
longis integerrimis.

Vaccinium foliis ovatis integris deciduis, racemis folio-
sis. Gron. virg. 155. *

Habitat in America septentrionali. 5

*Frutex. Folia oblonga, integerrima. Racemi infrafolia,
bracteis oblongis, parvis. Pedunculi partiales bracteis
longiores, infrausti bracteolis drabibus filiformibus. Co-
rolla ovato-campanulata. Stamina 10.*

8. VACCINIUM racemis nudis, caule fruticoso, foliis ligustrinum.
crenulatis oblongis.

Habitat in Pensylvania. Kalm. 5

*Flores in Racemis alternis, numerosis, destitutis bracte-
is, & foliolis, qua nota facile distinguitur.*

9. VACCINIUM floribus racemosis, foliis crenulatis o-
vatis acutis, caule arboreo. *Aegostaphy-
us.*

*Vitis idaea orientalis maxima, cerasi folio, flore varie-
gato. Tournef. cor. 42. it. 2. p. 223. t. 223.*

β. Vitis idaea cappadocica maxima, mespili folio, flore va-
riegato. *Tourref. cor. 42.*

Habitat in Cappadocia. 5

*Racemi foliis longiores, infra folia siti, foliolis ovatis
instructi.*

* *Foliis sempervirentibus.*

10. VACCINIUM racemis terminalibus nutantibus, *Vitis idaea.*
foliis obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis.

Vaccinium foliis obverse ovatis perennantibus. *Fl. lapp.*
145. *Fl. succ. 314. Mat. med. 185. Hort. cliff. 148.*

Roy. lugd. 239. Hall. helv. 414. Gort. gelr. 81.

Vitis idaea foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris
Baub. pin. 470.

Habitat in Europæ frigidioris sylvis macris. 5

11. VACCINIUM foliis integerrimis revolutis ovatis, *Oxyccos.*
caulibus repentibus filiformibus nudis.

Vaccinium ramis filiformibus repentibus, foliis ovatis
perennantibus. *Fl. lapp. 145.*

Vaccinium ramis filiformibus, foliis ovatis perennanti-
bus, pedunculis simplicibus stipula duplice. *Fl. succ.*
318. *Mat. med. 186.*

Vitis idaea palustris. Baub. pin. 471.

Vaccinia palustris. Dod. pent. 770. Lob. ic. 109.

Habitat in Europæ paludibus spagnoque repletis. 2

Ra-

Racemus brevissimus, pedunculis longissimis: bracteis 2 alternis; Corolla revoluta.

hispidulum. 12. VACCINIUM folijs integerimis revolutis ovatis, caulinibus repentibus filiformibus hispidis.

Vitis idaea palustris americana, oblongis splendentibus foliis, fructu grandiore rubro plurimis intus acinis referto. Pluk. alm. 392. t. 320. f. 6.

Vitis idaea palustris virginiana, fructu majore. Raj. hist 685.

Habitat in Virginiae paludosis.

Strucitura antecedens, sed majora omnia, & Caulis squamis setaceis imbricatus.

ERICA.

* *Antheris bicornibus.*

vulgaris. 1. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis inæqualibus campanulatis mediocribus foliis oppositis sagittatis. Erica foliis quadrifariam imbricatis triquetris glabris erectis, corollis inæqualibus calyce brevioribus. Flors. cliff. 146. Fl. suet. 309. Roy. lugdb. 442. Erica vulgaris glabra. Baub. pin. 485. Fl. iapp. 141. *Habitat in Europæ campestribus sterilibus frequens.* h. *Comparativa mediocris, longior, brevior corollæ respicit proportionem ad calysem.*

umbellata. 2. ERICA antheris bicornibus ex settis, corollis globosis umbellatis, foliis ternis acerofisis glabris. Læfl. epist. 2. n. 8.

Habitat in Lusitania. h.

Fruticulus habitu Ericæ vulgaris. Folia tereta, acerosa, brevia, glabra, subtus linea alba notata. Umbellulae nudæ absque involucro. Calyx compositus. Corolla pallide cærulea, angulata.

herbacea. 3. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis campanulatis mediocribus secundis, foliis ternis triquetris patulis.

Erica procumbens herbacea. Baub. pin. 486.

Erica coris folio 8. Clus. hist. I. p. 44.

Habitat in Europa australiori.

cineræ. 4. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis ovatis racemosis, foliis ternis glabris linearibus.

Erica foliis linearibus ternis, floribus globoso-oblongis laxè spicatis. Guett. stamp. 2. p. 110.

Exi-

Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore. *Baub. pin.* 486.

Erica coris folio 6. *Clas. hist.* 1. p. 47.

Habitat in Europa media.

5. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis campanu- *scoparia*,
latis longioribus, foliis ternis patentibus, ramis tomen-
tosis.

Erica erecta, foliis ternis, floribus ad alas sessilibus ver-
ticillatis. *Sauv. monsp.* 170.

Erica major *scoparia*, foliis deciduis. *Baub. pin.* 485.

Erica scoparia, floreulis herbaceis. *Lob. ic.* 2. p. 215.

Sauv. monsp. 46.

Habitat *Monspelii*, *in Hispania*, & *Europa australi.* 5

6. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis subova- *caffra*,
tis medioeribus solitariis, foliis ternis. caule arboreo.

Erica foliis linearib. subulatis ternis, corollis ovatis, ca-
lycibus acutis patulis. *Hort. cliff.* 148.

Habitat in Aethiopia. 5

7. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis ovatis *viridi-pur-*
longioribus, racemis corymbosis secundis, foliis térnis. *purea.*

Erica foliis lanceolatis oppositis imbricatis, floribus uno
versu racemosis. *Hort. cliff.* 148. *Sauv. monsp.* 170.

Erica major, floribus ex herbaceo-purpureis. *Baub. pin.*
485.

Erica corioides folio 3. *Clas. hist.* 1. p. 42.

Habitat in Lusitania. 5

8. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis subglo- *Tetralix.*
bos aggregatis calyce longioribus, foliis quaternis ci-
liatis patentibus.

Erica foliis subulatis ciliatis quaternis, corollis globoso-
ovatis terminalibus consertis. *Hort. cliff.* 148. *Fl. suec.*
310. *Roy. lugdb.* 442.

Erica ex rúbro nigricans *scoparia*. *Baub. pin.* 486.

Habitat in Europæ borealis paludibus cespitosis. 5

9. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis campanu- *arborea.*
latis longioribus, foliis quaternis patentissimis, caule
subarboreo tomentoso.

Erica erecta, foliis quaternis, floribus spicato-racemo-
sis. *Sauv. monsp.* 170. 46.

Erica foliis acerolis linearibus patentissimis, corollis or-
vatis, staminibus brevibus. *Hort. cliff.* 47. *Roy. lugdb.* 442.

Erica maxima alba. *Baub. pin.* 485

- pallido-purpurea.* 10. ERICA foliis in summitate quinis, caule procumbente. *Segu. ver. 280.*
Erica procumbens dilute purpurea. *Baub. pin. 486. Raj. hist. 1715.*
Erica foliis corios, flore purpureo dilatioris coloris. *Baub. hist. 1. p. 358.*
Erica coris folio VII. *Clus. hist. 1. p. 43.*
Habitat in Europa australi. ♂
Numerosum gregem Ericarum Æthiopicarum aliorumque infinita diligentia dudum conquistavit, descripsit, delineavit & absolvit Botanicus vere magnus Ill. Adrian Royenus, quas ut edat publicique juris faciat, omnes Botanici mecum serio efflagitant.
- * *Anteris simplicibus obtusis emarginatis.*
- ciliaris.* 11. ERICA antheris simplicibus inclusis, corollis ovatis irregularibus, floribus ternis racemosis, foliis ternis ciliatis. *Lœfl. epist. 2. n. 9.*
Erica hirsuta anglica. *Baub. pin. 602*
Erica XII. *Clus. hist. 1. p. 46.*
Habitat in Lusitania. ♂
Planta suffruticosa, bipedalis. Folia terna, patentia, sessilia, ovato-oblonga, acuta, margine reflexa, ciliata. Racemus terminalis, terno-vorticillatus. Corolla magna, ovata, ore contracto inæquali.
- triflora.* 12. ERICA antheris bifidis inclusis, corollis subglobosis subvillosis ternis, pedunculis triphyllis, foliis ternis.
Habitat in Æthiopia. ♂
- curviflora.* 13. ERICA antheris bifidis exsertis, corollis clavato-cylindricis curvis solitariis longis, foliis subternis.
Erica foliis linearibus quaternis oppositis villosis, corollis longissimis solitariis. *Hort. cliff. 148.*
Erica africana frutescens. *Seb. thes. 2. p. 20. t. 19. f. 5.*
Erica spicata, floribus oblongis ex carneo purpureis.
Pluk. mant. 67. t. 346. f. 9.
Habitat in Æthiopia. ♂
- bruniades.* 14. ERICA antheris bifidis exsertis stylo brevioribus, corollis globotis tectis calyce lanato, foliis ternis.
Eriocephalus bruniades ericæformis monomopatensis, capitulis globulorum instar interius cavis & densa lanugine tectis. *Pluk. mant. 69. t. 347. f. 9.*
Frutex africanus aromaticus. *Seb. thes. 2. p. 64. t. 63. f. 7.*
Habitat in Æthiopia. ♂
15. E-

15. ERICA antheris bifidis exsertis, corollis globosis *capitata.*
calycibus hispidis
Erica africana calyce lanuginoso ex viridi luteo capitulum referente, floribus concoloribus exiguis lanagine obfisis. Seb. thes. I. p. 30. t. 20. f. 1.
Habitat in Aethiopia. ♂
16. ERICA antheris bifidis simplicibus exsertis, corollis *carnosa.*
ovatis sublongioribus, foliis quaternis triangularibus patentibus.
Erica procumbens, ternis foliolis, carnea. Baub. pin. 486.
Erica coris folio IX. Clus. hist. I. p. 44.
Habitat in Pannonia, Helvetia.
17. ERICA antheris bifidis simplicibus exsertis, corollis *multiflora.*
campanulatis longioribus, foliis quinis linearibus patentibus.
Erica, foliis corios, multiflora. Baub. hist. I. p. 356.
Erica juniperifolia densè fruticans narbonensis. Lob. hist.
620. Sauv. monsp. 46.
Habitat Monspelii. ♂
18. ERICA antheris bifidis inclusis, corollis globosis gla- *pilulifera.*
bris quaternis, foliis quaternis setaceis patulis.
Habitat in Aethiopia. ♂
19. ERICA antheris bifidis exsertis, corollis clavatis, ca- *coccinea.*
lycibus duplicitibus.
Erica africana angustifolia glabra, floribus oblongis tubulofis dependentibus coccineis, cum longissimis filamentis concoloribus. Seb. thes. I. p. 32. t. 21. f. 4.
Habitat in Aethiopia. ♂
20. ERICA antheris bifidis exsertis, corollis globosis me- *corifolia.*
diocribus, pedunculis triphyllis, foliis quaternis.
Erica africana glabra fruticosa, coris folio, arbuti flore dilute purpureo. Seb. thes. I. p. 32. t. 21. f. 3.
Habitat in Aethiopia. ♂
21. ERICA antheris bifidis inclusis, corollis cylindricis *abietina.*
longioribus aggregatis, foliis verticillatis dentato-a-
culeatis.
Erica foliis subulatis glabris quinis pluribusve verticillatis, floribus longissimis terminalibus confertis. Hort. cliff. 148.
Erica africana, abietis folio longiore & tenuiore, floribus

bus oblongis saturate rubris. *Raj. dendr.* 96. *Seb. thes.*

1. p. 31. t. 21. f. 1.

Habitat in Aethiopia. ♂

gnaphaloides 22. ERICA antheris bifidis inclusis, corollis globosis ternis, calycibus duplicitibus obtusis.

Habitat in Aethiopia. ♂

Facies plantae Gnaphalii.

plukneti. 23. ERICA antheris bifidis exsertis, corollis subcylindricis indivisis longioribus, calycibus simplicibus, foliis linearibus verticillatis.

Chamæpithys æthiopica, foliis læte virentibus, flore oblongo phœnico plus quam eleganti s. plusquenetii.

Pluk. mant. 45. t. 344. f. 3.

Habitat in Aethiopia.

DAPHNE.

* *Floribus lateralibus.*

Mezereon. 1. DAPHNE floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis.

Daphne floribus sessilibus infra folia elliptico-lanceolata.

Fl. lapp. 140. *Fl. suec.* 311. *Mat. med.* 179. *Hort. cliff.* 147. *Roy. lagdb.* 201.

Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis Laureola femina. *Bauh. pin.* 462.

Daphnoides. *Cam. epit.* 937.

Habitat in Europæ borealis sylvis. ♂

Thymelæa. 2. DAPHNE floribus sessilibus axillaribus, foliis lanceolatis, caulis simplicissimis.

Daphne floribus tetrandris secundum caules simplicissimos. *Sauv. monsp.* 56.

Thymelæa foliis polygalæ glabris. *Bauh. pin.* 463.

Sanamunda viridis vel glabra. *Bauh. prodr.* 160.

Sanamunda glabra. *Bauh. hist.* 1. p. 592.

Habitat in Hispania & Monspeliæ in Horto Dei. ♂

Tartonraira 3. DAPHNE floribus sessilibus aggregatis axillaribus, foliis ovatis utrinque pubescentibus nervosis.

Thymelæa foliis candicantibus & serici instar mollibus. *Bauh. pin.* 463.

Tarton-Kaire galloprovinciæ monspeliensium. *Lob. ic.* 371.

Habitat in Galloprovincia. ♂

alpina. 4. DAPHNE floribus sessilibus aggregatis lateralibus, foliis lanceolatis obtusiusculis subtus tomentosis.

Thy-

Thymelæa floribus inter folia, folio utrinque hirsuto.

Hall. helv. 187. Sauv. monsp. 57.

Chamelæa alpina, folio inferne incano. Bauh. pin. 1462.

Chamelæa alpina incana. Lob. ic. 370.

5. *Chamelæa sabaudica, folio utrinque incano, flore albo.*

Raj. bist. 1588.

Thymelæa, incana, mezerei folio & facie, surculis ad modum fragilibus. Plak. alm. 366. t. 229. f. 3.

Habitat in Alpibus Helvetiæ, Genevæ, Italiam.

5. *DAPHNE racemis axillaribus, foliis lanceolatis glabris. Laureola.*

Daphne racemis lateralibus, foliis lanceolatis integris.

Hort. cliff. 147. Hort. upf. 94. Mat. med. 180.

Sauv. monsp. 57.

Laureola sempervirens, flore viridi, quibusdam Laureola mas. Bauh. pin. 462.

Laureola. Dod. pent. 365.

Habitat in Anglia, Helvetia, Gallia, Baldo. b

6. *DAPHNE pedunculis lateralibus bifloris, foliis lance-pontica. olate ovatis.*

Thymelæa pontica, citrei foliis. Tournef. itin. 3. p. 180. t. 180.

Habitat in I'onto. b

* *Floribus terminalibus.*

7. *DAPHNE capitulo terminali pedunculato, foliis op-indica. positis oblongo-ovatis glabris.*

Habitat in China. b

Frutex parvus. Folia opposita, oblongo-ovata, integer-rima, glabra. Pedunculus terminalis, brevissimus, apice gerens flores 6 ad 8 sessiles.

8. *DAPHNE floribus congestis terminalibus sessilibus, Cneorum. foliis lanceolatis nudis.*

Daphne humifusa, foliis oblongis flores sessiles terminales subcincinnibus. Sauv. monsp. 57.

Thymelæa affinis facie externa. Bauh. pin. 463.

Cneorum. Matth. bist. 46. Clus. bist. 89.

Habitat in Helvetia, Hungaria, Pyrenæis, Baldo, L. B. Munchhausen. b

9. *DAPHNE panicula terminali, foliis linear-lanceolatis Gridium. acuminatis.*

Daphne foliis lanceolatis basi angustioribus, raceino nudo terminali. Sauv. monsp. 56.

Daphne floribus racemosis, foliis linear-lanceolatis acuminatis integris. *Guett. stamp.* 2. p. 427.
Thymelæa foliis lini. *Bauh. pin.* 463.
Thymelæa. *Clus. hist.* 1. p. 87. *Cam. epit.* 974.
Habitat in Hispania, Italia, G. Narbonensi. h

- quamrofa.* 10. **DAPHNE** floribus terminalibus pedunculatis, foliis sparsis linearibus patentibus mucronatis.
Thymelæa capitata lanuginosa, foliis creberrimis minimis aculeatis. *Burm. afr.* 134. t. 49. f. 1.
Habitat in Æthiopia. h

DIRCA.

- painiflora.* 1. **DIRCA**. *Gen. nov.* 1078. *
Thymelæa floribus albis primo vere erumpentibus, foliis oblongis acuminatis, viminibus & cortice valde tenacibus. *Gron. virg.* 155.
Habitat in Virginie paludosis. h

GNIDIA.

- pinifolia.* 1. **GNIDIA** foliis sparsis linear-subulatis.
Rapunculus foliis nervosis linearibus, floribus argenteis non galeatis. *Burm. afr.* 112. t. 41. f. 3.
Habitat in Æthiopia. h
- tomentosa.* 2. **GNIDIA** foliis alternis ovato-lanceolatis.
Habitat in Æthiopia. h
Fores tomentosi, capitati, terminales.
- oppositifolia.* 3. **GNIDIA** foliis oppositis lanceolatis.
Habitat in Æthiopia. h
Frutex ramis rectis. Folia opposita, lanceolata, glabra, integerrima. Flores terminales, conserti, infundibuliformes, tubo villoso, petalis emarginatis.

BÆCKEA.

- frutescens.* 1. **BÆCKEA**.
Habitat in China. D. D. Abrah. BÆCK. S. R. M:is. Suec: medicus ordinarius, Amicus noster vere sincerus, e cuius horto sicco plurimas rariores stirpes obtinuimus, etiam hanc primus nobiscum communicavit.
Frutex habitu abrotani, ramis virgatis: Ramulis oppositis, brevibus, simplicibus. Folia opposita, linearia, acuta, glabra, integerrima. Flores axillares, solitarii, pendentes nudo longitudine floris, foliis longe breviore. Perianthium infundibuliforme; quinquedentatum. Petala

tala 5, subrotunda, patula, calyci inserta. Filamenta 8, quorum 6 paria, & 2 solitaria, brevissima, inflexa. Antherae subovatae, parvae. Germen subrotundum. Stylus filiformis, corolla brevior. Stigma capitatum. Chinensisibus Tjongina. Osbeck.

DIGYNIA.

GALENIA.

1. GALENIA. Hort. cliff. 150. Roy. lugdb. 209. *africana.*
Sherardia. Pont. epist. 14.
Kali lignosum, flore muscoso, rosmarini folio. Bocc.
mus. 150. t. 110.
Atriplex africana lignosa frutescens, rosmarini foliis. Till.
pij. 20. t. 25.
Habitat in Africa. 5

MOEHRINGIA.

1. MOEHRINGIA *muscosa.*
Alpine montana, capillaceo folio. Bauh. pin. 251. Sche-
uchz. alp. 503. t. 6. Pluk. alm. 23. t. 75. f. 1.
Alpine saxifraga angustifolia minima montana. Cold.
ecphr. 1. p. 292. t. 290.
2. Alpine tenuifolia muscosa. Bauh. pin. 251. Moris. bles.
10. hist. 2. p. 551. f. 5. t. 23. f. 12.
Habitat in Alpibus Helvetiae, Italiae, Austriæ.

TRIGYNIA.

POLYGONUM

* Atraphaxoides caule frutescente.

1. POLYGONUM caule fruticoso, calycinis foliolis du- *frutescens.*
obus reflexis. Hort. upf. 95.
Atraphaxis incrinis, foliis planis. Hort. cliff. 138. Roy.
lugd. 209.
Lapathum orientale, frutex humili, flore pulchro. Tour-
nef. cor. 38.
Lapathum dauricum montanum fruticans, ramis late
sparsis. Ann. ruth. 227.
Habitat in Sibiria, Dauria. 5

* Bi-

* *Bistorta spica unica.**Bistorta.*

2. **POLYGONUM** caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Mat. med.* 188. *Bistorta* foliis ovato-oblongis acuminatis. *Hort. cliff.* 150. *Hort. upf.* 150. *Roy. lugdb.* 217.

Bistorta major, radice magis intorta. *Baub. pin.* 192. *Bistorta*. *Cam. epit.* 683.

Habitat in montibus Helvetiæ, Austriæ, Galliæ. 2

- viviparum.* 3. **POLYGONUM** caule simplicissimo monostachyo, ofliis lanceolatis.

Bistorta foliis lanceolatis. *Fl. lapp.* 152. *Fl. suec.* 321. *Hort. cliff.* 150.

Bistorta montana minor, radice intorta inodora, flosculis in spicæ cacumine albis sterilibus, inferna spicæ parte tuberculis proliferis turbinatis puniceis secunda. *Amm. rathb.* 169.

Bistorta alpina media. *Baub. pin.* 192.

Bistorta alpina minor. *Baub. pin.* 192.

Habitat in Europæ subalpinis pascuis duris. 2

serretaria.

4. **POLYGONUM** foliis crenatis.

Polygonum folio oblongo crenato. *Shaw. afr.* 489.

Habitat in Mauritania.

* *Persicaria pistillo bifido.*

- virginianum* 5. **POLYGONUM** floribus pentandris digynis, corollis quadrifidis, foliis ovatis.

Persicaria floribus pentandris digynis, corolla quadrifida inæquali. *Wach. ultr.* 258.

Persicaria florum staminibus quinis, stylo duplo, corolla quadrifida inæquali. *Hort. cliff.* 42. *Gron. virg.* 43. *Roy. lugdb.* 216.

Persicaria frutescens maculosa virginiana, flore albo. *Morif. hist.* 2. p. 589. *Raj. hist.* 183.

Habitat in Virginia. 2

- Lapathifoli-* 6. **POLYGONUM** fioribus pentandris semidigynis, staminibus corollæ regulari æqualibus.

Persicaria floribus pentandris digynis, corolla regulari staminibus æquali. *Wach. ultr.* 257.

Persicaria florum staminibus quinis semidigynis, stylo bifido corollæ regulari æquantibus. *Hort. cliff.* 42.

Persicaria major, lapathi foliis, calyce floris purpureo. *Tournef. inst.* 510. *Raj. suppl.* 119.

Persicaria Hydropiper. *Lob. ic.* 315.

Habitat in Gallia.

7. PO-

7. **POLYGONUM** floribus pentandris semidigynis, staminibus longioribus. *amphibium.*
Perficaria florum staminibus quinis corollam superantibus, stylo bifido. *Hort. cliff. 41. Roy. lugdb. 216.*
Perficaria floribus pentandris digynis, corolla staminibus breviore. *Fl. suec. 318.*
Potamogeton *falcis* folio. *Baub. pin. 193.*
Habitat in Europa.
8. **POLYGONUM** floribus pentandris trigynis axillaris *maritimum.*
 bus, foliis lanceolatis, caule stipulis obtecto fruticoso.
Polygonum maritimum latifolium. Baub. pin. 280.
Polygonum marinum. Cam. epit. 691.
Habitat Monspelii, in Italia, Virginia. ♂
Stamina huic speciei quina adnumerat D. Sauvages, a me non numerata.
9. **POLYGONUM** floribus pentandris trigynis, foliis *ocreatum.*
 lanceolatis.
Perficaria spicis longis numerosis, vaginis integris, floribus pentandris trigynis. *Gmel.*
Habitat in Sibiria. D. Gmelin.
Stipulae sunt vaginæ integrae, ventricosæ, leves, ampliores multo quam caulis. Folia lanceolata, revoluta. Flores racemosi.
10. **POLYGONUM** floribus hexandris semidigynis, foliis *Hydropiper.*
 lanceolatis, stipulis submuticis.
Polygonum foliis lanceolatis, floribus hexandris semi-digynis. *Mat. med. 187.*
Perficaria floribus hexandris semidigynis. *Fl. suec. 320.*
Perficaria florum staminibus senis, stylo bifido. *Hort. cliff. 46. Roy. lugdb. 216.*
Perficaria urens s. Hydropiper. Baub. pin. 101.
Hydropiper. Dod. pempt. 607.
Habitat in Europæ subhumidis. ◎
11. **POLYGONUM** floribus hexandris digynis, spicis *Perficaria.*
 ovatis oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis.
Perficaria floribus hexandris digynis. *Fl. suec. 319.*
Perficaria florum staminibus senis, stylo duplo. *Hort. cliff. 42. Gron. virg. 157. Roy. lugdb. 216.*
Perficaria mitis. Baub. hist. 3. p. 779. Fl. lopp. 71.
Perficaria mitis maculosa & non maculosa, Baub. pin. 101.
Habitat in Europæ cultis. ◎

Fagotritico similis, angustiori folio, convolvuli modo scandens, caule spinulis deflexis densius obsito. *Pluk. mant.* 74. p. 394. f. 5.

Planta posterior e novo belgio. *Laet. amer.* 73. t. 74.
Habitat in Virginiae, Marilandiae madidis.

- urifolium.* 21. **POLYGONUM** foliis hastatis, caule aculeato.
Fagotritico similis spinosa scandens, ari folio latiore, floridana. *Pluk. amalb.* 87. t. 398. f. 3.
Planta prior e novo belgio. *Laet. amer.* 73.
Habitat in Virginia, Florida.

- Tataricum.* 22. **POLYGONUM** foliis cordato-sagittatis, caule inermi erecto, seminibus subdentatis.
Helxine caule erectiusculo inermi, foliis cordato-sagittatis, seminibus subdentatis. *Hort. upf.* 96,
Heixine caule erecto inermi, foliis cordato-sagittatis, seminum angulis dentatis. *Hort. cliff.* 151,
Fagotriticum sibiricum. *Act. stockb.* 1744. p. 117.
t. 4.
Habitat in Tataria. ◎

- Fagopyrum.* 23. **POLYGONUM** foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis æqualibus.
Polygonum caule erectiusculo inermi ramoso, foliis cordato-sagittatis, seminibus laevibus, *Mat. med.* 188.
Helxine caule erectiusculo inermi, foliis cordato-sagittatis, seminibus integerrimis. *Hort. upf.* 96.
Helxine caule erectiusculo inermi, foliis cordato-sagittatis. *Hort. cliff.* 151. *Fl. suec.* 217. *Roy. lugab.* 217.
Erysimum cereale, folio hederaceo, *Baub. pin.* 27.
Ocimum cereale. *Tabern. hist.* 276.
Habitat in Asia. ◎

- Convolvulus.* 24. **POLYGONUM** foliis cordatis, caule volubili, floribus planiusculis.
Helxine caule volubili. *Fl. lapp.* 154. *Fl. suec.* 323.
Hort. cliff. 150. *Gron. virg.* 157. *Roy. lugdb.* 217.
Convolvulus minor, semine triangulo, *Baub. pin.* 294.
Convolvulum nigrum. *Dod. pent.* 396.
Habitat in Europæ agris. ◎

- scandens.* 25. **POLYGONUM** foliis cordatis, caule volubili, floribus carinatis.
Fagopyrum scandens americanum maximum. *Tournef. inf.* 511.
Fagopyrum scandens, caule rubente, semine nigro. *Gron. virg.* 44. *Cold. novcb.* 93. *Fago.*

Fagotriticum volubile majus virginianum. Pluk. aln.
143. t. 177. f. 7.

Fagopyrum scandens f. *Volubilis nigra major*, flore &
fructu membranaceis compressis. Sloan. jam. 46. hist.
1. p. 138. t. 90. f. 1.

B. Fagopyrum praelongum dumetorum, scindibus alatis
duplici more dispositis. Dill. app. 60.

Fagopyrum sylvaticum scandens, flore foliaceo. Pont.
anth. 263.

Habitat in America. ☽

Flores plantae B. non vidi, at *structura hujus est.*

* *Caule arboreo.*

26. *POLYGONUM* foliis subrotundis, caule arboreo, *Uvifera*.
fructibus baccatis.

Uvifera foliis subrotundis amplissimis. Hort. cliff. 487.

Uvifera littorea, foliis amplioribus fere orbiculatis cras-
sis, americana. Pluk. aln. 394. t. 236. f. 7.

Prunus maritima racemosa, folio rotundo glabro, fru-
ctu minore purpureo. Sloan. jam. 183. hist. 2. p. 129.
t. 220. f. 3. Kaj. dendr. 40. Catesb. car. 2. p. 96. t.
96.

Habitat in Caribearum littoribus maritimis. ♂

Ex habitu buc retali (*flores non vidi*), *vel enim hujus*
generis vel proximi erit.

PAULLINIA.

1. *PAULLINIA* foliis ternatis, caule aculeato, cirrhis *afistica*,
nullis. Fl. zeyl. 143. *

Chamælaea trifolia aculeata. Burm. zeyl. 58. t. 24.

Frutex baccifer indicus spinosus trifoliis, floribus spica-
tis. Pluk. aln. 202. t. 95. f. 5.

Kaka-toddali. Rheed. mal. 5. p. 81. t. 41.

Habitat in India. ♂

2. *PAULLINIA* foliis ternatis, petiolis teretiusculis, fo- *Seriana*,
liolis ovato-oblongis.

Paullinia foliis ternatis, foliolis crenatis, pedunculis
cirrhisferis. Hort. cliff. 152.

Seriana scandens triphylla & *racemosa*. Plum. gen. 34.

Habitat in America calidiore. ♂

3. *PAULLINIA* foliis ternatis, foliolis cuneiformibus *caruru*,
obtusis subdentatis.

Paullinia foliis ternatis, foliolis obtusis vix denticulatis
glabris dentinencibus in petiolum proprium. Hort. cliff.
151. *

Cu-

Alsinastrum serpillifolium, flore albo tetrapetalo. *Vaill.*
paris. 5. t. 2. f. 2.

3. *Alsinastrum serpillifolium*, flore roseo tripetalo. *Vaill.*
paris. 5. t. 2. f. 1.

Habitat in Europæ inundatis. ◎

Alsinastrum. 2. **ELATINE** foliis verticillatis. *Roy. lugdb.* 452. *Sauv.*
monsp. 164. *Boem.* *lips.* 127.

Elatine foliis emersis linearibus, immersis capillaceis.
Sauv. act. monsp. 1743. p. 50.

Equisetum palustre, *linariæ scopariæ* folio. *Bauh. pin.* 15.
Alsinastrum gallii folio. *Vaill. paris.* 6. t. 1. f. 6.

2. *Alsinastrum gratiolæ* folio. *Tournef. inst.* 244. *Raj.*
suppl. 502.

Habitat Aboæ, Lipsiæ, Parisiis, Monspelii in fossis.

Classis IX.

ENNEANDRIA
MONOGYNIA.

LAURUS.

1. LAURUS foliis trinerviis ovato-oblongis nervos u- *Cinnamo-*
nentibus. *Fl. zeyl.* 145. *Mat. med.* 190.
Laurus foliis oblongo-ovatis nitidis planis. *Hort. cliff.*
154.
Cinnamomum, foliis latis ovatis, frugiferum. *Burm.*
zeyl. 62. t. 27.
Cinnamomum f. *Canella Zeylanica*. *Bauh. pin.* 408.
Cassia cinnamomea, *Herm. lugd.* 129. t. 655.
Habitat in Zeylona. ♀
2. LAURUS foliis trinerviis lanceolatis nervis supra ba- *Cassia*,
sin unitis. *Fl. zeyl.* 146. *Mat. med.* 191.
Cinnamomum perpetuo florens, folio tenuiore acuto.
Burm. zeyl. 63. t. 28.
Cinnamomum f. *Canella malabarica* f. *javanensis*. *Bauh.*
pin. 409.
Carua. *Rheed. mal.* 1. p. 107. t. 59.
Habitat in Malabaria, Sumatra, Java. ♀
3. LAURUS foliis trinerviis lanceolato-ovatis: nervis *Camphora*,
supra basi unitis. *Mat. med.* 192.
Laurus foliis ovatis utrinque acuminatis trinerviis nitidi,
petiolis laxis. *Hort. cliff.* 154.
Laurus Camphorifera. *Kämpf. jap.*
Camphora officinarum. *Bauh. pin.* 500.
Arbor camphorifera japonica. *Breyn. prodr.* 2. p. 16. ii.
16. t. 2.
Habitat in Japonia. ♀
4. LAURUS foliis lanceolatis venosis perennantibus, flo- *nobilis*,
ribus quadridicidis dioicis. *Hort. cliff.* 155. *Hort. apf.*
108. *Mat. med.* 194. *Rey. lugd.* 98.
Laurus vulgaris. *Bauh. pin.* 460.
Laurus. *Com. epit.* 60.
Habitat in Italia, Græcia. ♀

- indica.* 5. LAURUS foliis lanceolatis perennantibus venosis planis, ramulis tuberculatis cicatricibus, floribus racemosis. *Hort. cliff.* 154. *Gron. virg.* 159.
Laurus indica. *Pluk. alm.* 210. *t. 301. f. 1.*
Laurus latifolia indica. *Barr. rar.* 123. *t. 877.*
Cinnamomum sylvestre americanum. *Seb. thes.* 2. *p. 90. t. 84. f. 6.*
Habitat in Virginia. ♂
- Persea.* 6. LAURUS foliis ovatis coriaceis transverse venosis perennantibus, floribus corymbosis.
Persea. *Clus. bifl.* 1. *p. 2.*
Persea americana. *Baub. pin.* 441.
Pyro similis fructus in nova hispania, nucleo magno.
Baub. pin. 439.
Prunifera arbor fructu maximo pyriformi viridi, pericarpio esculento butyraceo nucleus unicum maximum nullo officulo tegumentum cingente. *Slaan. jam.* 132. *bifl.* 2. *p. 132. t. 222. f. 2.* *Raj. dendr.* 48.
Arbor americana, amplissimis pergamenis foliis, superficie nitidissima, fructu pyriformi crustaceo cortice coriato. *Pluk. alm.* 39. *t. 267. f. 1.*
Habitat in America calida. ♂
- Borbonia.* 7. LAURUS foliis lanceolatis transverse venosis, calycibus fructus baccatis. *Hort. cliff.* 154. *Gron. virg.* 46.
Roy. Ingdb. 226.
Laurus carolinensis, foliis acuminatis, baccis cæruleis, pedicellis longis rubris insidentibus. *Catesb. car.* 1. *p. 63. t. 63.*
Habitat in Carolina, Virginia. ♂
- affinis.* 8. LAURUS foliis venosis oblongis acuminatis annuis, ramis supra-axillaribus.
Laurus foliis lanceolatis enervibus annuis. *Gron. virg.* 159.
Laurus foliis enervibus ovatis utrinque acutis. *Gron. virg.* 46.
Habitat in Virginia ad ripas riuorum. ♂
Pedunculi hujus fructiferi colorati sunt.
- Benzoin.* 9. LAURUS foliis enerviis ovatis utrinque acutis integris annuis. *Hort. cliff.* 154. *Mat. med.* 195. *Gron. virg.* 46. *Roy. Ingdb.* 226.
Arbor virginiana, citrea vel limonii folio, Benzoinum fundens. *Comm. hort.* 1. *p. 189. t. 97.*

Arbor virginiana, pishanainis folio, baccata Benzoinum redolens. *Pluk. alia.* t. 139. f. 3. 4.

Habitat in Virginia. 5

10. *LAURUS* foliis integris trilobisque. *Hort. cliff.* 154. *Sassafras.*
Mat. med. 193. *Gren. virg.* 46. *Roy. lugdb.* 227.
Coid. noveb. 94.

Cornus mas odorata, folio trifido: margine plano, Sassafras dieta. *Pluk. alm.* 120. t. 222. f. 6. *Catesb. car.* 1. p. 55. t. 55.

Sassafras arbor, ex florida, ficalneo folio. *Bauh. pin.* 431.

13. *Cornus mas* s. *Sassafras laurinis* foliis indivisis. *Pluk. amalch.* 66.

Habitat in Virginia, Carolina, Florida. 5

11. *LAURUS* foliis enerviis obovatis obtusis. *Mat. med. Winterana.* 196.

Winteranus. Hort. cliff. 488.

Cinnamomum s. *Canella peruviana. Bauh. pin.* 409.

Cassia liguea jamaicensis, laureolæ foliis subcinereis, cortice piperis modo acri. *Pluk. alia.* 89. t. 160. f. 1.

Cassia cinnamomea s. *Cinnamomum sylvestre barbadense.* *Pluk. alm.* 89. t. 160. f. 7.

Arbor baccifera laurifolia aromaticæ, fructu viridi calcinato racemoso. *Sloan. jam.* 165. *hist.* 1. p. 87. t. 191. f. 2. *Catesb. car.* 2. p. 50. t. 50.

Habitat in Jamaica, Barbados, Carolina. 5

Flores ipse non vidi.

TRIGYNIA.

SPONDIAS.

1. *SPONDIAS. Hort. cliff.* 484.

Mombin arbor, folio fraxini, fructu luteo racemoso. *Plum. gen.* 44. *Mombin.*

Prunus brasiliensis, fructu racemoso, ligno intus pro officulo. *Sloan. jam.* 182. *hist.* 2. p. 126.

Prunus americana. Mer. sur. 13. t. 13.

Acaja & Ihametara. Marcgr. bras. 129.

Habitat in Brasilia, Jamaica. 5

RHEUM.

1. *RHEUM* foliis glabris, petiolis subsulcatis.

Rheum foliis glabris. Hort. upj. 98. *Mat. med.* 198. *Rheum. R. com.*

Rheum. Hort. cliff. 155.

Rhaponticum. *Alp. rapont.* I. t. 1.

Rhaponticum folio lapathi majoris glabro. *Baub. pin.*
116.

Habitat in Thracia, Scythia. 2

Rhabarbarum. 2. RHEUM foliis subvillofis, petiolis æqualibus. *Diss.*
Rhubarb. I. t. 1. *

Rheum foliis subvillofis, *Hort. upf.* 98. *Mat. med.* 197.
Rhabarbarum sinense, folio crispo, flagellis rarioribus &
minoribus. *Amm. herb.* 206.

Rhabarbarum folio longiori hirsuto crispo, florum thyrs-
fo longiori & tenuiori. *Amm. ruth.* 9.

Acetosa montana, folio cubitali oblongiore crispo,
floribus in fusciridi luteolis. *Messerschmidii.* *Amm.*
ruth. 226.

Habitat in China ad murum ♂ in Sibiria. 2

Ribes. 3. RHEUM foliis granulatis, petiolis æqualibus.
Lapathum orientale, aspero & verrucoso folio, Ribes
arabis dictum: *Dill. elth.* 191. t. 158. f. 192.

Lapathum orientale tomentosum rotundifolium, Ribes
arabum dictum. *Breyn. E. N. C. cent.* 7. p. 7.

Lapathum orientale asperum, folio subrotundo, fructu
magnu purpureo. *Pocock orient.* 189. t. 84.

Ribes arabum. *Rauw. It.* 266. 282.

Ribes arabum, foliis petatidis. *Baub. pin.* 455.

Habitat in Persia, Libano, Carmelo. 2

Flores hujus speciei non vidi. Facies suadet hujus genera-
ris esse.

HEXAGYNIA.

BUTOMUS

umbellatus. 1. BUTOMUS. *Fl. lapp.* 159. *Fl. suec.* 328. *Roy.*
lugdb. 45. *Hall. helv.* 298.

Juncus floridus major. *Baub. pin.* 112.

Sedo affinis Juncoides umbellata palustris. *Moris. hist.*
3. p. 468. f. 12. t. 5. f. 1.

Gladiolus aquatilis. *Dod. pempt.* 600.

Habitat in Europæ aquofis. 2

Classis X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

SOPHORAE.

1. SOPHORA foliis pinnatis. foliolis numerosis villosis *alopecuroides.*
oblongis.
Sophora. Hort. cliff. 356.
Ervum orientale alopecuroides perenne, fructu longissimo. Tournes. cor. 27. Dill. cltb. 136.
Glycyrrhiza siliquis nodosis quasi articulatis. Buxb. cent. 3. p. 25. t. 46
Habitat in Oriente. 2
2. SOPHORA foliis pinnatis: foliolis numerosis subrotundis.
tomentosa, foliolis subrotundis *Fl. zeyl. 163.**
Indigophora foliis tomentosis. Hort. cliff. 487.
Colutea zeylanica argentea tota. Herm. lugd. 169. t. 171. Raj. hist. 1720.
Habitat in Zeylona. 5
3. SOPHORA foliis pinnatis, foliolis septenis glabris. *heptaphylla.*
Sophora glabra, foliolis septenis. *Fl. zeyl. 104.*
*Fruticulus sinensis, fennæ sylvestris folio angustiore,
 nodosa siliqua rostro longiore donata Pluk. amalb.
 38. t. 451. f. 10.?*
Habitat in India. 5
4. SOPHORA foliis ternatis sessilibus: foliolis linearibus.
Genistoides.
Genista africana, foliis galii. Old. afr. 31.
Habitat ad Cap. b. Spei.
5. SOPHORA foliis ternatis subsessilibus: foliolis subrotundis glabris.
*Cytisus foliis fere sessilibus, calycibus bractea triplici
 auctis. Gron. virg. 82.*
*Cytisus procumbens americanus, flore luteo, ramosissi-
 mus, qui Anil suppeditat. Pluk. alm. 129. t. 86. f.
 2. Ehret. t. 1. f. 3.*
Habitat in Barbados, Virginia. A a 3
6. SO-

- Inpanoides.* 6. SOPHORA foliis ternatis petiolatis: foliolis ovalibus pilosis.
Sophora foliis ternatis, spica verticillata. *Amaen. acad.* 2.
p. 350. *
Habitat in Kamtschatca. *G. Demidoff.*

ANAGYRIS.

- attida.* 1. ANAGYRIS. *Clus. hist.* 1. p. 93.
Anagyris floribus lateralibus. *Roy. lugdb.* 371.
Anagyris foetida. *Bauh. pin.* 391.
Habitat in Italiae, Siciliae, Hispaniae montibus. 5

CERCIS.

- siliquastrum* 1. CERCIS foliis cordato-orbiculatis glabris. *Hort. cliff.* 156. *Hort. upf.* 99. *Roy. lugdb.* 463.
Siliqua sylvestris rotundifolia. *Bauh. pin.* 402.
Arbor judæ. *Dod. pempt.* 786.
Habitat in Italia, Hispania, Narbona, 5
- canadensis.* 2. CERCIS foliis cordatis pubescentibus. *Hort. cliff.* 156. *Hort. upf.* 99. *Roy. lugdb.* 463. *Gron. virg.* 47.
Ceratia agrestis virginiana, folio rotundo minori. *Raj. dendr.* 100.
Habitat in Virginia. 5

BAUHINIA.

- scandens.* 1. BAUHINIA caule cirrhifero.
Clematis indica, folio bifido, flore fructuque carens arbores transcendens. *Raj. suppl.* 328.
Naga-mu-valli. *Rheed. mal.* 8. p. 57. t. 29.
Habitat in Malabarja. 5
- aculeata.* 2. BAUHINIA caule aculeato. *Hort. cliff.* 156. t. 14.
Roy. lugdb. 463.
Plumeria aculeata, folio rotundo & emarginato. *Plum. gen.* 23.
Habitat in America calidiore. -5
- divaricata.* 3. BAUHINIA foliis ovatis: lobis divaricatis.
Bauhinia foliis quinquererviis: laciniis acuminatis remotissimis. *Hort. cliff.* 156. t. 15. *Roy. lugdb.* 464.
Habitat in America. 5
- unguata.* 4. BAUHINIA foliis ovatis: lobis parallelis.
Bauhinia foliis ovatis oblongis recta linea bifidis. *Hort. cliff.* 157,
Habitat in America. 5
5. BAU-

5. BAUHINIA foliis cordatis: lobis coadunatis obtusis. *variegata*.
Arbor f. *Thomæ* f. *Afflita*. *Zanon.* *hist.* 26. t. 15.
Chovanna-mandaru. *Rheed.* *mal.* 1. p. 57. t. 32. *Raj.*
hist. 1751.
Habitat in Malabaricæ, Maderæ *arenofis*. ♂
Corolla patentæ: *Petalis ovatis, acutis, roseis, luteo purpureoque variegatis*.
6. BAUHINIA foliis subcordatis bipartitis rotundatis sub- *purpurea*.
tus tomentosus.
Chovanna-maudaru. *Rheed.* *mal.* 1. p. 59. t. 33.
Habitat in Indiæ *arenofis*. ♂
Flores patentæ, purpurascentes: *Petalis lanceolatis, distantibus*.
7. BAUHINIA foliis cordatis: lobis semiorbiculatis *to-* *tomentosa*, *memosis*.
Bauhinia foliis cordato-subrotundis: *Iaciniis rotundatis*.
Hort. cliff. 157. *Hort. nps.* 99. *Fl. zeyl.* 147. *Roy.*
lugdb. 464.
Bauhinia foliis subrotundis, flore flavescente striato.
Burm. zeyl. 44. t. 18.
Mandaru maderaspataense, foliis firmioribus bisulcis gla-
britie splendentibus. *Pluk. alm.* 240. t. 44. f. 6.
Chauschena-pon. *Rheed.* *mal.* 1. p. 63. t. 35.
Habitat in India. ♂
Corolla campanulatae, albo flavescentes: *Petalis obovatis*
8. BAUHINIA foliis ovatis: lobis acuminatis semiovatis. *acuminata*.
Bauhinia intermis, foliis cordatis semiobcordatis: *Iaciniis a-*
cuminato-ovatis erectis dehiscentiis. *Hort. cliff.* 157.
Fl. zeyl. 148.
Sennæ spuriæ aut Asphalto affinis arbor siliquosa, foliis
bifidis. *Sloan. jam.* 150. *hist.* 1. p. 51.
Velutta-mandaru. *Rheed.* *mal.* 1. p. 61. t. 34. *Raj.*
hist. 1751.
Habitat in Indiis. ♂
Corolla campanulatae, albæ: *Petalis obtusis*.

PARKINSONIA.

1. PARKINSONIA. *Hort. cliff.* 157. t. 13. *Hort. nps. aculeata*
99. Roy. lugdb. 465.
Parkinsonia aculeata, foliis minutis uni costæ adnexis.
Plum. gen. 25.
Parkinsonia aculeata, foliis minutis uni costæ affixis.
Walth. hort. 6. t. 13.
Habitat in America calidiore. ♂ C.A.S.

CASSIA.

* *Senn.e.**diphylla.*

1. CASSIA foliis conjugatis, stipulis cordato-lanceolatis.
Habitat in India. ○
Frutex Caule tereti. Folia conjugata s. duo in petiolo brevi, semiorbiculata, obtusa, striata. Stipulae cordato-lanceolatae, totos ramos obtegentes.

abfus.

2. CASSIA foliolis bijugatis ovatis. *Fl. zeyl.* 153. *
*Senna quadrifolia, siliqua plana hirsuta, flore aureo sangui-
 neo. Burm. zeyl. 212. t. 97.*
*Senna exigua maderaspatana tetraphylla siliquifera glabra :
 florum pediculis ad exortum foliorum propendentibus.
 Pluk. alm. 341. t. 60. f. 1.*
*Loto affinis ægyptiaca. Baub. pin. 352
 Habitat in India, Ægypto. ○*

Tagera.

3. CASSIA foliolis bijugatis, stipulis ciliatis.
*Cassia 6, Senna ipuria tetraphylla arborescens, siliquis
 tenuibus longissimis pendulis. Amm. herb. 603. n. 33?*
Tagera. Rheed. mal. 2. p. 103. t. 52? Raj. bist. 1743?
Habitat in India.
*Fruticulus procumbens: Ramis filiformibus. Petiolibre-
 viissimi; Folia quatuor semiorbiculata, venosa, quo-
 ram duo exteriora majora. Stipulae cordatae s. cordato-lanceolatae, margin. pilosae.*

Tera.

4. CASSIA foliolis trijugatis ovatis: exterioribus majo-
 ribus; glandula tubulata inter inferiora. *Roy. lugdb.*
468. Fl. zeyl. 152. Hort. upf. 100.
Cassia humilis, siliquis foenu græci. Plum. spec. 18.
Cassia siliqua quadrangulari. Dill. elth. 72. t. 63. f. 73.
Habitat in India. ○
*Caules & Petioliscabri. Stipulae lineares, acuminatae, pi-
 losae. Glandulæ acuminatae, apice fusce, inter singu-
 la paria 2 inferiora. non vero inter extimum par sita.*

- bicaspularis. 5. CASSIA foliolis trijugatis obovatis glabris: interiori-
 bus rotundioribus minoribus: glandula interjecta glo-
 bosa. *Hort. cliff. 159. Hort. upf. 100. Roy. lugdb. 468.*
Cassia hexaphylla, siliqua bicapsulari. Plum. spec. 18.
Habitat in India. t
Arborescens est, & glaberrima. Foliola interiora breviora

- emarginata. 6. CASSIA foliolis trijugatis ovatis rotundatis emarginata-
 tis æqualibus. *Hort. cliff. 159. Roy. lugdb. 467.*

Cas.

Cassia minor hexaphylla fruticosa, sennæ foliis. Sloan.
jam. 146. hist. 2. p. 44. t. 180. f. 1. 2. 3. 4. Raj.
dendr. 110.
Habitat in Caribæis. ♂

7. CASSIA foliolis trijugatis ovatis obtusiusculis. *obtusifolia.*

Cassia foetida, foliis sennæ italicæ. Dill. elth. 71. t. 62.
f. 72.

Cassia minor herbaea plerumque hexaphylla, folio ob-
tuso. Sloan. jam. 143. hist. 2. p. 47. t. 180. f. 5?

Habitat in Cuba. ♂

8. CASSIA foliolis trijugatis quadrijugatisque subovatis. *Senna.*

Hort. cliff. 159. Mat. med. 200. Roy. lugdb. 468.

Senna Alexandrina f. foliis acutis. Baub. pin. 397.
Moris. hist. 2. p. 201. f. 2. t. 24. f. 1.

9. CASSIA foliolis quadrijugatis ovato-lanceolatis retro-*falcata.*

*falcatis: glandula baseos petiolorum. Hort. cliff. 159.**

Habitat in America. ♂

10. CASSIA foliolis quinquejugatis ovato-lanceolatis *occidentalis.*
margine scabris; exterioribus majoribus; glandula ba-
seos petiolorum.

Cassia foliolis quatuor parium ovato-lanceolatis, glandu-
la baseos petiolorum. Hort. cliff. 159. Roy. lugdb. 467.

Senna occidentalis, odore opii viroso, orobi pan-
nuncii foliis mucronatis, glabra. Comm. hort. 1. p
51. t. 26.

Habitat in Jamaica.

Caulis sesquipedalis, punctis vagis scaber, exaratus des-
sumi a singulo petiolo sulcis duabus. Folia superiora
Foliolis quinquet orium, ovato lanceolatis, glabris mar-
gine scabris, acuminatis, exterioribus seorsim majori-
bis, fætidis. Racemus terminalis. Flores lutei absque
macula.

11. CASSIA foliolis quinquejugatis ovato-lanceolatis *glabra planiflqua.*
bris, glandula baseos petiolorum. Roy. lugdb. 46.

Cassia filique planis. Plum. spec. 18.

Habitat in America calidiore.

12. CASSIA foliolis quinquejugatis ovatis acuminatis *fistula.*
glabris, petiolis eglandulosis. Fl. zeyl. 149. Mat. mea.

199.

A 25

Cass-

Cassia foliolis quinque parium lanceolatis: extimis minoribus. Hort. cliff. 158.

Cassia fistula alexandrina. Banb. pin. 405. Comm. hort. 1. p. 215. t. 110.

Conn. Rheed. mal. 1. p. 37. t. 21.

Habitat in India, Ægypto.

hirata. 13. *CASSIA foliolis sexjugatis ovatis acuminatis lanatis. Hort. cliff. 159. Roy. lugdb. 467.*

Cassia americana foetida, foliis amplioribus villosis. Tournef. inst. 619.

Senna occidentalis, odore opii viroso, foliis orobi pan-
nonici mucronatis hirsutis. Herm. lugdb. 556.

Habitat in America.

tigustrina. 14. *CASSIA foliolis septemjugatis lanceolatis: extimis minoribus, glandula baseos petiolorum. Hort. cliff. 159. Hort. apf. 100. Gron. virg. 47. Roy. lugdb. 467.*

Cassia ligultri folio. Plum. spec. 10. Dill. elth. 350. t. 269. f. 338.

Cassia bahamensis, pinnis foliorum mucronatis angustis, calyce floris non reflexo. Mart. cent. 21. t. 21.

Habitat in Virginia, Bahama. 2

alata. 15. *CASSIA foliolis octojugatis ovali-oblongis: interioribus minoribus, petiois eglandulosis, stipulis patulis. Hort. cliff. 158. Hort. apf. 100. Roy. lugdb. 467.*

Cassia sylvestris foetida, siliquis alatis. Plum. spec. 18. Faba dulcis. Mer. surin. 58. t. 58.

Habitat in America calidiore. 5

marilandica. 16. *CASSIA foliolis octojugatis ovato-oblongis æqualibus, glandula baseos petiolorum. Hort. cliff. 159. Hort. apf. 100. Roy. lugdb. 467.*

Cassia mimosa foliis, siliqua hirsuta. Dill. elth. 351. t. 260. f. 339.

Cassia marilandica, piunis foliorum oblongis, calyce floris reflexo. Mart. cent. 23. t. 23.

Habitat in Virginia, Marilandia. 2

biflora. 17. *CASSIA foliolis octojugatis ovalibus emarginatis, glandula macronata inter intima. Hort. cliff. 159.*

Habitat in Indiis. 5

tennissima. 18. *CASSIA foliolis novemjugatis oblongis, glandula subulata inter intima. Roy. lugdb. 478.*

Sen-

- Senna spuria frutescens, siliquis tenuissimis. *Haxfi* miss.
Habitat in Havana. b
19. CASSIA foliolis decemjugatis lanceolatis, glandula *sepulta*,
 baseos oblonga. *Fl. zeyl.* 150. *
 Senna vigintifolia, siliquis teretibus. *Burm. zeyl.* 213.
 t. 98.
- Ponnam-Tongera. *Rheed. mal.* 2. p. 101. t. 52..
Habitat in India.
20. CASSIA foliolis duodecim-jugatis obtusis acumine, *arriculata*,
 glandulis subulatis pluribus, stipulis reniformibus bar-
 batis. *Fl. zeyl.* 151. *
 Senna spuria maderaspatana, caule ad foliorum alas ge-
 minatis subrotundis appendiculis auriculato. *Pluk. alm*
 341. t. 314. f. 4. *Raj. dendr.* 110.
Habitat in India.
21. CASSIA foliolis duodecim jugatis oblongis obtusis *javanica*,
 glabris, glandula nulla.
 Cassia fistula javanica, flore carneo. *Comm. hort.* 1. p.
 217. t. 111.
Habitat in India.
Flores mibi non protulit.
- * *Chamæcrista foliolis numerosis.*
22. CASSIA foliolis multijugatis, glandula petioli pedi- *Chamæcrista*
 cellata, stipulis ensiformibus. *Hort. upf.* 101.
 Cassia foliolis plurimum parium linearibus, stipulis su-
 bulatis. *Hort. cliff.* 158. *Gron. virg.* 47.
 Chamæcrista pavonis major. *Comm. hort.* 1. p. 53. t.
 37.
 ChamæChrista pavonis americana, siliqua multiplici.
Breyn. cent. 64. t. 24.
Habitat in Jamaica, Barbados, Virginia. ☽
Foliola 20; Peduncellus sponte supra petiolum egrediens.
23. CASSIA foliolis multijugatis linearibus: glandula ba- *mimosae*
 seos petiolorum obsoleta, stipulis setaceis. *Fl. zeyl.*
 154. *
Habitat in Zeylona.
Petioli absque glandula. Caulis non flexuosus. Stipula
lanceolatae, seta terminatae.
24. CASSIA foliolis multijugatis, stipulis dimidiato-cor- *flexuosa*,
 datis.
 Senna spuria occidentalis. siliqua singulari, foliis herbæ
 mi-

mimosæ. *Herm. Ingdb.* 558. *Sloan. jam.* 150. *Raj. suppl.* 18.

Chamæcrista pavonis brasiliæ, siliqua singulari
Breyn. cent. 65. t. 23.

Habitat in Brasilia. ◎

- multitans.* 25. *CASSIA* foliolis multijugatis, floribus pentandris.
Cassia calycibus acutis, floribus pentandris. *Hort. cliff.* 497. t. 36. *Hort. upf.* 101.
Senua spuria virginiana, mimosæ foliis, floribus parvis
nictitantibus. *Pluk. alm.* 341. t. 314. f. 3.
Habitat in Virginia. ◎

- procumbens.* 26. *CASSIA* foliis multijugatis, caule procumbente.
Cassia americana procumbens herbacea, mimosæ foliis,
floribus parvis, siliquis angustis planis. *Comm. petrop.* t. 11.
Habitat in Indiis. ◎

POINCIANA.

- pulcherrima.* 1. *POINCIANA* aculeis geminis. *Hort. upf.* 101.
Poinciana foliis duplicato-pinnatis: foliolis oblongo-o-
vatis, caule inermi. *Hort. cliff.* 153. *Fl. zeyl.* 159.
Roy. Ingdb. 159.
Frutex pavoninus, *Crista pavonis*. *Breyn. cent.* 61. t.
Flos pavonis. *Mer. sur.* 45. t. 45.
Tsietti-mandaru. *Rheed. mal.* 6. p. 1. t. 1.
Habitat in Indiis. ♀

CÆSALPINIA.

- brasiliensis.* 1. *CÆSALPINIA* foliolis obovatis integerrimis. *Mat. med.* 205.
Cætælpina polyphylla. aculeis horrida. *Plum. gen.* 26.
Pseupo-Santalum croceum. *Sloan. jam.* 213. *bifl.* 2. p.
184. t. 132. f. 34. *Raj. dendr.* 132. *Catesb. car.* 2.
p. 51. t. 51.
Habitat in Jamaicæ, Carolinæ collibus. ♀

- Crista.* 2. *CÆSALPINIA* foliis ovatis integerrimis.
Cæfalpinia aculeis recurvis, foliolis ovatis. *Fl. zeyl.*
157. * *Hort. upf.* 102.
Acacia gloria, lentiæ folio, spinosa, flore spicato lu-
teo, siliqua magna. *Pluk. alm.* 4. t. 2. f. 2.
Christa pavonis, *glycyrrhizæ* folio, minor repens spi-
no-

nosissima, flore luteo spicato minimo, siliqua latissima echinata. Breyn. ic. 58. t. 28

Habitat in Zeylona. ♂

3. CÆSALPINIA foliolis emarginatis, filamentis lana-*Sappan.*
tis. Fl. zeyl. 158. * Mat. med. 203.

Ligno brasiliano simile. Bauh. pin. 393.

Fiam-pangam. Rheed. mal. 6. p. 3. t. 2.

Habitat in Indiis. ♂

4. CÆSALPINIA foliolis emarginatis, leguminibus ful-*vescara.*
eatis ovalibus

Cæsalpina. Amm. herb. 604.

Senna spuria arborea spinosa, foliis alatis ramosis f. decompositis, flore luteo, siliquis brevibus sulcatis nigris, sabinæ odore. Sloan. jam. 149. bipl. 2. p. 150.
t. 181. f. 12. Raj. dendr. III.

Colutea vera crucis vesicaria. Plak. alm. 111. p. 165. t. 3.

Habitat in America calidiore. ♂

GUILANDINA.

1. GUILANDINA aculeata, foliolis ovalibus acumina-*Bonduc.*
tis. Fl. zeyl. 156. Hort. upf. 101

Guilandina caule fructuque aculeatis. Hort. cliff. 158.

Bonduc vulgare minus polyphyllum. Plun. gen. 25.

Arbor exotica spinosa, foliis lentisci. Bauh. pin. 399.

Careti. Rheed. mal. 6. p. 35. t. 22.

Habitat in Indiis. ♂

2. GUILANDINA inermis, foliis subbipinnatis: foliolis *Moringa.*
inferioribus ternatis. Fl. zeyl. 155. Mat. med. 202.

Lignum peregrinum aquam cæruleam reddens. Bauh.
pin. 415.

Moringha zeylanica, foliorum pinnis pinnatis, flore ma-
jore, fructu anguloso. Barm. zeyl. 162. t. 75.

Morungu Rheed. mal. 6. p. 19. t. -

Habitat in Zeylona. ♂

Semina ex Asia tribus membranis longitudinaliter alata
suere, ex Africa vero membranis his caruere.

3. GUILANDINA inermis, foliis bipinnatis: basi apice-*dioica.*
que simpliciter pinnatis. Gen. plant. 2. p. 518.

Habitat in Canada. ♂

GUAJACUM.

1. GUAJACUM foliolis bijugatis obtusis.

Guajacum officinale.

Guajacum foliis pinnatis: foliolis quaternis obtusis. *Hort. cliff.* 187. *Mat. med.* 207.

Guajacum flore cæruleo, fructu subrotundo. *Plum. gen.* 39.

Guajacum jamaicense, foliis velut muria conditis spissius virentibus, flore subcæruleo. *Pluk. alm.* 180. t. 35. f. 4.

Guajacum magna matrice. *Banh. pin.* 448.

Pruno vel *Evonymo* affinis arbor, folio alato buxeo subrotundo. *Sloan. jam.* 186. *bifl.* 2. p. 133. t. 222. f. 3. 4. 5. 6.

Arbor ligni Sandi vel *Guajacum*. *Seb. thes.* 1. p. 86. t. 53. f. 2.

3. *Guajacum jamaicense*, lentisci subrotundis foliis late virentibus, flore albo. *Pluk. alm.* 180. t. 35. f. 3.

Habitat in Hispaniola, Jamaica. 5

fanatum.

2. **GUAJACUM** foliolis multijugatis obtusis.

Guajacum foliis pinnatis, foliolis obverse ovatis integerimis. *Roy. lugdb.* 208.

Guajacum flore cæruleo fimbriato, fructu tetragono. *Plum. gen.* 39.

Guajacum propemodum sine matrice. *Banh. pin.* 448.

Jasminum vulgo americanum 1. *Euonymo* affinis occidentalis, alatis rusci foliis, nucifera, cortice ad genicula fungoso. *Pluk. alm.* 139. t. 94. f. 4.

Habitat in Americes insula s. Johannis de Porto Ricco. 5

afrum.

3. **GUAJACUM** foliolis multijugatis acutis.

Guilandinoides. *Hort. cliff.* 489.

Acacia africana, quæ *Acaciæ* similis, foliis myrti parvis aculeatis pinnatis, flore coccineo tetrapetaloide. *Waltb. hort.* 2. t. 2.

Afria arbor acaciæ similis, foliis myrti aculeatis splendentibus. *Borb. lugdb.* 2. p. 57.

Habitat in Æthiopia. 5

CYNOMETRA

candiflora. 1. **CYNOMETRA** trunco florifero. *Ael. apf.* 1741. p. 79. *Fl. zeyl.* 166.

Cynomorium. *Rumpf. amb.* 1. p. 163. t. 62.
Habitat in India. 5

ramiflora. 2. **CYNOMETRA** ramis floriferis. *Ael. apf.* 1741. p. 79. *Fl. zeyl.* 167.

Cy-

Cynomorium sylvestre. *Rampf. amb.* 1. p. 164. t. 63.

Iripa. *Rheed. mal.* 4. p. 65. t. 31.

Habitat in India. 5

ANACARDIUM.

1. ANACARDIUM. *Hort. cliff.* 161. *Fl. zeyl.* 165. *occidentale.*
Mat. med. 206. *Hort. upf.* 102. *Roy. lugdb.* 463.
Anacardii alia species. *Bauh. pin.* 512.
Pomifera L. *potius Prunifera indica*, *nuce reniformi.*
Catesb. car. 3. p. 9. t 9.
Acajou. *Pif bras.* 58. *mant.* 193.
Caschou. *Mer. Juirin.* 16. t. 16.
Kapa-maya. *Rheed. mal.* 3. p. 65. t. 54.
Habitat in Indiis. 5

DICTAMNUS.

1. DICTAMNUS. *Hort. cliff.* 161. *Hort. upf.* 102. *albus.*
Mat. med. 208. *Roy. lugdb.* 463. *Savv. monsp.*
232.
Dictamus albus vuigo Fraxinella. *Bauh. pin.* 222.
Fraxinella. *Reneal. Spec.* 122. t. 121.
Habitat in Germania, Gallia, Italia. 4

RUTA.

1. RUTA foliis decompositis. *Hort. cliff.* 145. *Hort. graveolens.*
upf. 102. *Mat. med.* 209. *Roy. lugdb.* 461.
Ruta sylvestris major. *Bauh. pin.* 336. *Moris. hist.* 2.
p. 507. f. 5. t. 14. f. 3.
2. Ruta chalepensis tenuifolia, florum petalis villis scatenatis. *Moris. hist.* 2. *p. 509.*
Ruta hortensis altera. *Bauh. pin.* 336. *Raj. hist.* 874.
3. Ruta hortensis latifolia. *Bauh. pin.* 336.
Ruta graveolens hortensis. *Dod. pent.* 119.
4. Ruta hortensis latifolia arbusculæ similis. *Børb. lugdb.*
1. p. 260.
Ruta africana maxima. *Schwer. hort.* 24.
Habitat in Europæ australis, Alexandriæ, Mauritaniæ
sterilibus. 5
Flos primarius quinquefidus, reliqui quadrifidi. *Phil.*
Bot. 178.
Confer: Ruta sylvestris minor. *Bauh. pin.* 336. *Cam. montana.*
epit. 475. *Ruta montana legitima.* *Clus. hist.* 2. *p.*
136. app. alt. fig. structura eadem, facie distincta.

- patavina.* 2. RUTA foliis ternatis sessilibus.
PseudoReta patavina trifolia, floribus luteis umbellatis.
Mich. gen. 22. t. 19.
Habitat prope Patavium.
- linifolia.* 3. RUTA foliis simplicibus indivisiis.
Ruta foliis simplicibus solitariis. *Hort. cliff.* 146.
Ruta sylvestris linifolia hispanica. *Bocc. mus.* 2. p. 82
t. 73. *Barr. ic.* 1186.
- β. Ruta montana, foliis integris subrotundis. *Buxb. cent.*
2. p. 30. t. 28. f. 2.
- γ. Ruta orientalis, linearie folio, flore parvo. *Tournef. cor.*
19. *Buxb. cent.* 2. p. 30. t. 28. f. 1.
Habitat in Hispania; Q. in Rodastro; γ. in Media. 2

TOLUIFERA.

- Balsamum.* 1. TOLUIFERA. *Mat. med.* 201.
Balsamum Tolutanum, foliis ceratiae similibus. *Bauh.*
pin. 401.
Habitat in America prope Carthaginem. 3

HÆMATOXYLUM

- Campechianum.* 1. HÆMATOXYLUM. *Hort. cliff.* 160. *Roy. lugdb.*
465.
Lignum campechianum; species quædam. *Sloan. jam*
213. *bifl.* 2. p. 183. t. 10 f. 1. 2. 3. 4. *Catesb.*
cav. 5. p. 66. t. 66.
Habitat in Campeche Americes. 3

ADENANTHERA.

- pavonina.* 1. ADENANTHERA foliis decompositis. *Roy. lugdb.*
462. *Vir. cliff.* 36. *Fl. zeyl.* 160. *
Poinciana foliis duplicato-pinnatis: foliolis alternis. *Hort.*
cliff. 158.
Mandshadi. *Rheed. mal.* 6. p. 25. t. 14.
Habitat in India. 3

MELIA.

- Azedarach.* 1. MELIA foliis bipinnatis. *Fl. zeyl.* 162.
Melia foliis decompositis. *Hort. cliff.* 161. *Roy. lugdb.*
462.
Azedarach. *Dod. pent.* 848.
Arbor fraxini folio, flore cæruleo. *Bauh. pin.* 415.
Pseudo-Sycomorus. *Cam. epit.* 181.

β. Aze

1. Azedarach sempervirens & florens. *Tournef. inst.* 616. *sempervi-*
Azadirachta indica, foliis ramolis minoribus, flore al- *rens.*
 bo subcaruleo purpurascente majore. *Comm. hort.* 1.
 p. 147. t. 76.
Habitat in Syria, & in Zeylona. b
2. MELIA foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 161. *Fl zeyl.* 161. * *Azadirachta*
Roy. lugdb. 462.
Olea malabarica, *fraxini* folio. *Pluk. alm.* 269. t. 247.
 f. 1.
Azedarach foliis falcato-serratis. *Burm. zeyl.* 40 t. 15.
Azadirachta indica, folio *fraxini*. *Breyn. ic.* 21. t. 15.
Arbor indica, *fraxino* similis, *oleæ* fructu. *Bauh. pin.*
 416.
Aria Bepou. *Rheed. mal.* 4. p. 107. t. 52.
Habitat in India. b

ZYGOPHYLLUM.

1. ZYGOPHYLLUM capsulis prismatico-pentædris. *Fabago.*
Hort. upf. 103.
Zygophyllum foliis petiolatis. *Hort. cliff.* 160. *Roy.*
lugdb. 460.
Capparis portulacæ folio. *Bauh. pin.* 480.
Capparis *Fabago.* *Dod. pempt.* 741.
Habitat in Syria. 2
Folia ovata, petiolata. Petala obtusa.
2. ZYGOPHYLLUM capiularum angulis compresso-*Morganiæ.*
 membranaceis.
Fabago triphylla & *tetraphylla*, flore tetrapetalō, fructu
 membranaceo quadrangulari. *Burm. afr.* 7. t. 3
 f. 2.
Fabago capensis frutescens major. *Dill. elth.* 142. t.
 116. f. 141.
Planta africana frutescens, portulacæ foliis, *Morganiæ*
 syrorum, ex brevi pediculo binis. *Pluk. amalib.* 173.
 t. 429. f. 4.
Habitat in Æthiopia. b
Folia obverse ovata, petiolata; Petala acuta.
3. ZYGOPHYLLUM capsulis globoso-depressis. *sessilifolium.*
Zygophyllum foliis sessilibus. *Hort. cliff.* 160. *Roy.*
lugdb. 460.
Fabago capensis frutescens minor. *Dill. elth.* 142. t.
 116. f. 142.

Fabago humilis quadrifolia glabra, flore albido, fructu rotundo. Burm. afr. 4. t. 2. f. 1.

Fabago africana arborescens, flore sulphureo, fructu rotundo. Comm. rar. 10. t. 10.

Habitat in Aethiopia. ♂

Folia jutifolia, oblonga. Petala crenata.

fulvum.

4. **ZYGOPHYLLUM** capsulis ovatis acutis.

Fabago flore luteo, petalorum ungvibus rubris, fructu sulcato acuto oblongo. Burm. afr. 6. t. 3. f. 1.

Habitat in Aethiopia. ♂

Folia sessilia.

coccineum.

5. **ZYGOPHYLLUM** capsulis cylindricis.

Fabago arabica teretifolia, flore coccineo. Shaw. afr. 231. f. 231.

Habitat in Aethiopia.

Folia teretia.

spinosa.

6. **ZYGOPHYLLUM** caule aculeato.

Fabago tenuifolia spinosa, fructu rotundo. Burm. afr. 5. t. 5.

Habitat in Aethiopia. ♂

Folia linearia, acuta.

FAGONIA.

cretica.

1. **FAGONIA** spinosa, foliolis lanceolatis planis lœvibus.

Hort. upf. 103.

Fagonia spinosa. Hort. cliff. 160.

Trifolium spinosum creticum. Baub. pin. 330. prodr. 142. Clus. hist. 2. p. 242.

Habitat in Creta. ☽

hispanica.

2. **FAGONIA** inermis.

Fagonica hispanica non spinosa. Tournef. inst. 265.

Habitat in Hispania. ♀

arabica.

3. **FAGONIA** spinosa, foliolis linearibus convexis.

Shaw. afr. 229.

Fagonia arabica longissimis acuteis armata. Shaw. afr. 229.

Habitat in Arabia.

TRIBULUS.

maximus.

7. **TRIBULUS** foliolis quadrijugis: exterioribus majoribus.

Tribulus foliolis trium parium pinnatis. Hort. cliff. 160. Tri-

1. *Tribulus terrestris* major, flore maximo odorato. *Sloanejam.* 90. *hist.* 1. p. 209. t. 132. f. 1. *Raj. suppl.* 650.
Habitat in Jamaicæ aridis. ◎
2. **TRIBULUS** foliolis quinquejugatis subæqualibus. *tanuginosus.*
Tribulus foliolis quinque parium. *Fl. zeyl.* 168. *
Tribulus terrestris zeylanicus, caulinis villolis, fructu
acuminato. *Burm. zeyl.* 226. t. 106. f. 2.
Habitat in Zeylona.
3. **TRIBULUS** foliolis sexjugatis subæqualibus. *Hort. terrestris.*
cliff. 160. *Hort. upf.* 103. *Roy. lugdb.* 460. *Sauv.*
monsp. 227.
Tribulus terrestris, ciceris folio, fructu aculeato. *Baub.*
pin. 250.
Tribulus terrestris. *Lob. ic.* 2. p. 84.
Tribulus terrestris minor incanus hispanicus. *Barr. rar.*
54. t. 558.
Habitat in Europa australi ad semitas. ◎
4. **TRIBULUS** foliolis octojugatis subæqualibus. *Cistoides.*
Tribulus foliis octo parium pinnatis. *Roy. lugab.* 460.
Tribulus terrestris major curassavicus. *Herm. par.* 236.
t. 236.
Tribulus terrestris americanus, argemones flore flavo.
Pluk. aln. 374. t. 64. *Raj. suppl.* 649.
Habitat in America calidicore.

MONOTROPA.

1. **MONOTROPA** floribus lateralibus oclandris; terminali decandro. *Fl. suec.* 329. *Phil. bot.* §. 178.
Orobanche quæ Hypopithys dict potest. *Baup. pin.* 88.
prodr. 31.
Orobanche Hypopithys lutea. *Menz. pug.* 3. f. 5.
Orobanche flore breviore duplice, verbasculi odore.
Moris. hist. 3. p. 504. f. 12. t. 16. f. 20.
Orobanche verbasculi odore. *Plot. oxf.* 146. t. 9. f. 6.
Pluk. aln. 273. t. 200. f. 5.
Habitat in Sueciæ, Germaniæ, Angliaæ, Canada
silvis. Parasitica radicum.
2. **MONOTROPA** caule unifloro decandro. *uniflora*
Monotropa flore nutante. *Gron. virg.* 41.
Orobanche monanthos virginiana, flore majore penta-
petalo. *Moris. hist.* 3. p. 502. f. 12. t. 16. f. 5.
mal.

Orobanche virginiana, flore pentapetalo cernuo. *Pluk. alm.* 273. t. 209. f. 2. *Catesb. car.* 1. p. 36. t. 36. *bon.*
Habitat in Marilandia, Virginia, Canada.

JUSSIÆA.

- repens.* 1. *JUSSIÆA repens*, floribus pentapetalis decandris, pedunculis folio longioribus. *Fl. zeyl.* 169.
Nir-Carambu. Rheed. mal. 2. p. 99. t. 51. *Raj. hist.* 1510.
Habitat in India.
- peruviana.* 2. *JUSSIÆA erecta*, floribus pentapetalis, pedunculis foliosis.
Onagra laurifolia, flore ampio pentapetalo. *Few. peruv.* 716. t. 11.
Habitat in Lima.
- suffruticosa.* 3. *JUSSIÆA erecta villosa*, floribus tetrapetalis octandris pedunculatis.
Ludwigia capsulis oblongis uncilialibus. Roy. lugdb. 252.
Lysimachia indica non papposa, flore luteo minimo, siliquis caryophyllum aromaticum æmulantibus. *Herm. lugab.* 396.
Carambu. Rheed. mal. 2. p. 55. t. 49. *Raj. hist.* 1510.
Habitat in India.
- erecta.* 4. *JUSSIÆA erecta glabra*, floribus tetrapetalis octandris sessilibus. *El. zeyl.* 170. *Hort. ups.* 103.
Ludwigia capsulis oblongis. Hort. cliff 491.
Lycimachia viscosa glabra, parietariæ foliis, *virginiana*.
Pluk. alm. 235. t. 203. f. 4.
Jasminum catalonicum, flore luteo. *Seb. thes.* 1. p. 42. t. 24. f. 3.
Habitat in America & forte in Virginia. ◎

SCHINUS.

- Myricoides.* 1. *SCHINUS foliis simplicibus lanceolatis sinuatis.*
Habitat in Æthiopia. b
Frutex panicula diffusa, distinctissimus a Myrica, cui simillimus facie.
- Molle.* 2. *SCHINUS foliis pinnatis: foliolis ferratis: impari longissimo, petiolo æquali.*
Schinus foliis ferratis impari longissimo. Hort. cliff. 483.
Lenticus peruviana. Bauh. pin. 399.
Len-

Lentiscus africana. *Seb. thes.* 2. p. 7. t. 5. f. 5.

Molle. *Clus. monard.* 322. t. 322.

Habitat in Peru. ♂

3. *SCHINUS* foliis pinnatis, petiolo æquali, foliolis in-*Areira*.
tegerrimis æqualibus.

Molle foliis non serratis. *Few. peruv.* 3. p. 43. t. 30

Arœira. *Pif. bras.* 132.

Habitat in Brasilia, Peru. ♂

4. *SCHINUS* foliis pinnatis:foliolis oblongis,petiolo mar-*Fagara*.
ginato articulato inermi. *Mat. med.* 533.

Lauro affinis, *jasmini* folio alato, costa media membranulis utrinque extantibus alata, ligno duritie ferro vix cedens. *Shan. jam.* 137. *bifl.* 2. p. 25. t. 162.
f. 1. *Raj. dendr.* 86.

Habitat in Jamaicæ campestribus. ♂

Confer Seo s. Sancio. Kämpf. amœn. 892.

5. *SCHINUS* foliis pinnatis, petiolo marginato articulato *tragodes*.
futus aculeato.

Schinoides petiolis subtus aculeatis. *Hort. cliff.* 489. *

Rhoi obsoniorum similis leptophyllum *tragodes* ameri-
cana spinosa, rachi medio appendicibus avcto. *Plak.*
alm. 319. t. 107. f. 4.?

Habitat in America. ♂

6. *SCHINUS* foliis pinnatis, pedicolo marginato articula-*Limonis*.
to, spinis axillaribus solitariis. *Fl. zeyl.* 175. *

Malus Limonia india, fructu pusillo. *Kaj bifl.* 1658.

Tierou katou Naregam. *Rheed. mai* 4. p. - - - t. 12.

Habitat in India utraque. 3

BARTRAMIA.

1. *BARTRAMIA*. *Fl. zeyl.* 174. *indica*.

Triunfetta XIII. *Amm. herb.* 370.

Lappula benghalensis tetraspermous, ribessi folio, echinis orbicularibus ad foliorum ortum plurimis simu! fessilibus. *Plak. alm.* 206. t. 41. f. 5.

Agrimony maderaspatana, folio rotundo singulari sub-
tus incano. *Pet. gaz.* 31. t. 42. f. 10.

Habitat in India. ♂

MELASTOMA.

1. *MELASTOMA* foliis denticulatis ovatis acutis. *Acinoden-*
Melastoma foliis ovato-lanceolatis crena is nervis quin-
B b 3 que *dron.*

que longitudinalibus: extimis obsoletioribus. *Hort. cliff.* 162.

Acinodendrum americanum pentaneuron, foliis crassis hirsutis ad ambitum rarioribus ferris. *Pluk. mant.* 4. t. 159. f. 1.

Grossularia americana, plantaginis folio amplissimo. *Plum. spec.* 18.

Grossulariae fructu non spinosa, malabathri foliis longa & rufa lanugine hirsutis, fructu maiore cæruleo. *Sloanez. jam.* 165. *hist.* 2. p. 85. t. 197. f. 2.

Habitat in America calidiore. 5.

Grossularia 2. *MELASTOMA* foliis denticulatis ovatis acuminatis: nervis interioribus ante basin coadunatis.

Grossularia alia plantaginis folio, fructu rariore violaceo. *Plum. hist. miss.*

Arbor americana, latiori & acuminato folio trinervio, utrinque glabro & margine leviter crenato. *Pluk. alm.* 40. t. 249. f. 4. 1.

Habitat in Surinamo. D. Bartsch.

3. *MELASTOMA* foliis denticulatis lanceolatis quinque-nervibus, caule hispido.

Grossularia plantaginis folio angustiore hirsuto. *Plum. spec.* 18.

Arbuscula jamaicensis quinquenervis, minutissime dentatis foliis & caule pubescentibus. *Pluk. alm.* 40. t. 264. f. 1.

Habitat in America meridionali. 5.

4. *MELASTOMA* foliis integerrimis ovato-lanceolatis subtus sericeis; nervis ante basin coadunatis. *Hort. cliff.* 162.

Acinodendrum americanum, ampliore folio trinervi, inferius alba lanugine incano, maximo utrinque glabro. *Pluk. mant.* 4. t. 250. f. 2.

Arbor racemosa brasiliensis, folio malabathri. *Breyn. cent.* 3. t. 2. 4.

Muiua. *Marcgr. bras.* 117.

Habitat in Brasilia, Jamaica, Surinamo. 5.

5. *MELASTOMA* foliis lanceolato-ovatis quinquenervibus scabris. *Fl. zeyl.* 171. *

Melastoma quinquenervia hirta major, capitulis sericeis villosis. *Bärm. zeyl.* 155. t. 73.

Kadali. *Rheed. mal.* 4. p. 87. t. 42.

Habitat in India. 5.

6. MELASTOMA foliis lanceolatis trinervibus scabripera.
bris. Fl. zeyl. 172.
Katou-Kadali. Rheed. mal. 4. p. 91, t. 43. Raj. his
t. 1493.
Habitat in India. ♂
7. MELASTOMA foliis ovatis trinervibus glabris marginatae,
ne hispidis. Fl. zeyl. 173. *
Habitat in India. ♂

KALMIA.

1. KALMIA foliis ovatis, corymbis terminalibus. Gex. latifolia
nov. 1079. *
Andromeda foliis ovatis obtusis, cærollis corymbosis
infundibuliformibus, genitalibus declinatis. Gron. virg.
160.
Chamaæ Daphne foliis tini, floribus bullatis. Catesb. car
2. p. 98. t. 98.
Cistus Chamaæ Rhododendros mariana laurifolia, floribus
expansis summo ramulo in umbelam plurimis.
Pluk. alm. 49. t. 379 f. 6.
Habitat in Mariolandia, Virginia, Pensylvania. ♂
2. KALMIA foliis lanceolatis, corymbis lateralibus angustifolia
Gen. nov. 1079. *
Azalea foliis lanceolatis integerim non nervosis gla
bris, corymbis terminalibus. Gron. virg. 21.
Chamaæ Daphne sempervirens, foliis oblongis angustis,
foliorum fasciculis oppositis Catesb. car. 3. p. 17. t.
17. f. 1.
Cistus sempervirens laurifolia, floribus eleganter bullati.
Pluk. alm. 106. t. 161. f. 3.
Anonyma. Cold. noveb. 100.
Habitat in Pensylvania, Nova Cæsarea, Noveborzeo. ♂

LEDUM.

1. LEDUM. Fl. lapp. 160. palustre
Ledum foliis linearibus subtus hirsutis, floribus corym
bos. Fl. suec. 341. Mat. med. 210
Cistus Ledon foliis rosmarini ferrugineis. Bauh. pin
467.
Rosmarinum sylvestre. Cam. epit. 546.
*Habitat in Europæ septentrionalis paludibus uligino
sis.* ♂

RHODODENDRON.

- ferrugineum* 1. RHODODENDRON foliis glabris subtus leprosīs, corollis infundibuliformibus.
Azalea maculis ferrugineis subtus adspersa, floribus decandris. *Lemonier. Sauv. monsp.* 57.
Ledum foliis glabris, flore tubuloso. *Hall. helv.* 417.
Ledum alpinum, foliis ferrea rubigine nigricantibus. *Baub. pin.* 468. *Raj. hist.* 1005.
Evonymus theophrasti. *Dalech. hist.* 27.
Montana aliobrogum lentiscifolia. *Lob. ic.* 366.
Habitat in Alpibus Helveticis, Allobrogicis, Pyrenæis. 5
- dauricum*. 2. RHODODENDRON foliis glabris utrinque nudis, corollis rotatis.
Chamærhododendros folio glabro majusculo, amplio flore roseo. *Amm. ruth.* 181. t. 21.
Habitat in Dauria.
- hirsutum*. 3. RHODODENDRON foliis ciliatis nudis, corollis infundibuliformibus.
Ledum foliis glabris ciliatis ovatis, flore tubuloso. *Hall. helv.* 418.
Ledum alpinum hirsutum. *Baub. pin.* 468. *Raj. hist.* 1005.
Ledum alpinum. *Clus. hist.* 1. p. 82.
Balsamum alpinum. *Lob. ic.* 468.
Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis, Styriacis, 5
- Chamaecistus* 4. RHODODENDRON foliis ciliatis, corollis rotatis
Ledum foliis serpylli ad margines cilii instar pilosis, flore purpureo. *Mich. gen.* 225. t. 106.
Chamaecistus hirsuta. *Baub. pin.* 466.
Chamaecistus VIII, *Clus. hist.* 1. p. 76.
Cistus pumilus montis baldi. *Baub. hist.* 2. p. 19. *Raj. hist.* 1005.
Cistus Chamærhododendros foliis confertis ferrea rubigine nitentibus margine pilosis. *Pluk. alm.* 106. t. 23. f. 4.
Habitat in Baldo & prope Salisburgum. 5
- maximum*. 5. RHODODENDRON foliis nitidis ovalibus margine acuto reflexo.
Ledum laurocerasi folio. *Annon. acad.* 2. p. 200.
Chamærhododendros, lauri folio, sempervirens, floribus bullatis corymbosis. *Catesb. car.* 3. p. 17. t. 17. f. 2
Habitat in Virginia. Collinson 5

Rami

Rami & Folia magnitudine & consistentia Padi Lau-rocerasi dicti, venis reticulatis inscripta, marginere-flexa.

ANDROMEDA.

1. ANDROMEDA pedunculis solitariis lateralibus, co-*terragona*.
rollis campanulatis, foliis oppositis imbricatis obtusis
revolutis.
Andromeda foliis quadrifariam imbricatis obtusis. *Fl.*
suec. 338.
Andromeda, foliis quadrifariam imbricatis obtusis, eva-lis storens. *Fl. lapp.* 166. *t. 1. f. 4. Hort. cliff.* 163.
Habitat in Alpibus Lapponicis. 2
2. ANDROMEDA pedunculis solitariis terminalibus, *hypnoidea*.
corollis campanulatis, foliis confertis subulatis.
Andromeda foliis aciformibus confertis. *Fl. lapp.* 165.
t. 1. f. 3. Fl. suec. 337.
Habitat in Alpibus Lapponicis. 2
3. ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis ova-*cærulae*.
tis, foliis sparsis linearibus obtusis planis.
Andromeda foliis linearibus obtusis sparsis. *Fl. lapp.*
165. *t. 1. f. 5. Fl. suec.* 336. *Hort. cliff.* 163.
Erica folio abietis, flore arbutei. *Buxb. cent.* 4. *p. 26.*
t. 53.
Habitat in Lapponiae Alpibus. 3
4. ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis cy-*mariana*.
lindricis, foliis alternis ovatis integerimis.
Andromeda foliis ovatis, pedunculis fasciculatis, capsu-lis pentagonis apice dehiscentibus. *Gron. vire.* 49.
Arbuscula mariana, brevioribus evonymi foliis pallide-virentibus, floribus arbuteis ex eodem nodo plurimis,
spicatim uno versu erumpentibus. *Pluk. mant.* 25. *t.*
448.
Habitat in Virginia. 5
5. ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis ova-*Polifolia*.
tis, foliis alternis lanceolatis revolutis.
Andromeda foliis alternis lanceolatis margine reflexis.
Fl. lapp. 163. *t. 1. f. 3. Fl. suec.* 335. *Hort. cliff.*
163. *Rov. Ingdb.* 440. *Hail. helv.* 416.
Polifolia. *Buxb. atl.* 2. *p. 345. cent. 5. p. 28. t. 49. f. 1.*
Erica humilis, rosmarini foliis, unedonis flore, capsula-cistoide. *Pluk. alm.* 136. *t. 175. f. 3.*
Habitat in Europæ frigidioris paludibus turfosis. 5

- paniculata.* 6. ANDROMEDA racemis secundis nudis paniculatis, corollis subcylindricis, foliis alternis oblongis crenulatis.
Andromeda foliis ovatis acutis crenulatis planis alternis, floribus racemosis. *Hort. cliff.* 162. *Gron. virg.* 45.
Frutex foliis serratis, floribus longioribus spicatis subviridibus, spica pentagona. *Catesb. car.* 2. p. 43. t. 43.
Vitis idaea americana, longiori mucronato & crevato folio, floribus urceolatis racemosis. *Pluk. alm* 391.
Habitat in Virginia.
- racemosa.* 7. ANDROMEDA racemis secundis bracteatis, corollis gibbo-cylindricis, foliis alternis oblongis serratis
Habitat in Pennsylvania. *Kalm.*
Hec differt a priori 1. Racemis minus paniculatis. 2.
Bractea sub singulo flore lineari-lanceolata, stricta, flora longiore, viridi, decidua; in precedenti nullabractea. 3. *Capsulis retincentibus stylum, quem antecedens dimittit.* 4. *Folius magis serratis.*
- arborea.* 8 ANDROMEDA racemis secundis nudis, corollis rotundo-ovatis.
Andromeda arborea, foliis oblongo-ovatis integerrimis, floribus paniculatis nutantibus, racemis simplicissimis. *Gron. virg.* 48.
Frutex foliis oblongis acuminatis, floribus spicatis uno verso dispositis. *Catesb. car.* 1. p. 71. t. 71.
Habitat in Virginia, Carolina. 5
- calyculata.* 9. ANDROMEDA racemis secundis feliaccis, corollis subcylindricis, floribus alternis lanceolatis obtusis punctatis.
Cistus Ledon f. *Andromeda*, floribus monopetalis parvis albis tubulosis spicatum in summis ramicis dispositis, foliis & facie vitis idæa, capsula minima siccata quinquepartita. *Gron. virg.* 21. ?
ChamæDaphne. Buxb. act. 1. p. 241. t. 8. f. 1.
Habitat in Virginia, Canada, Sibiria. 6
Frutex foliis ovali-lanceolatis, coriaceis, myricæ conflentia, obtusis, margine recurvis, adspersis punctis vix conspicuis, callosis, ab utraque parte. Racemi ex ramis propriis, foliolis ovalibus alternis, in quorum ala Flos solitarius, pedicellatus. Calyx a basi tegitur duobus foliolis ovatis. Flores ad unum latus nutant. Stamina 10, anthoris oblongis.

EPIGÆA.

1. EPIGÆA. *Gen. nov.* 1087. *repens.*
Memecylum. Mich. gen. 13.
Arbutus foliis ovatis integris, petiolis laxis longitudine
foliorum. Gron. virg. 49.
Pyrolæ affinis repens fruticosa, foliis rigidis scabritie ex-
asperatis, flore pentaperaloide fistuloso. Pluk. alm.
309. t. 107. f. 1.
Habitat in Virginie, Canadae pinetis. ♂

GAULTHERIA.

1. GAULTHERIA. *Kalm. Gen. nov.* 1080. *f. 6.* *procumbens.*
Anonyma pedunculis arcuatis. Cold. noveb. 98.
Habitat in Canadæ sterilibus arenosis. ♂

ARBUTUS.

1. ARBUTUS caule erecto, foliis glabris serratis, bac- *Unedo.*
cis polyspermis. Hort. cliff. 163. *Roy. lugdb.* 440
Sauv. monsp. 59.
Arbutus folio serrato. Baub. pin. 460.
Arbutus. Cam. epit. 168.
Habitat in Europa australi. ♂
Baccæ polyspermae tuberculis seminum exasperatae.
2. ARBUTUS caulis procumbentibus, foliis ovatis sub- *acadiensis.*
serratis, floribus sparsis, baccis polyspermis.
Vitis idæa acadiensis, foliis alaterni. Tournefort.
Habitat in Acadia. ♂
3. ARBUTUS caulis procumbentibus, foliis rugosis ser- *alpina.*
ratis. Fl. lapp. 161. *Fl. succ.* 340. *Hort. cliff.* 163
Roy. lugdb. 440. *Hall. helv.* 415.
Vitis idæa foliis oblongis albicantibus. Baub. pin. 470.
Vitis idæa. Clus. hist. 1. 61.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Sibiria. ♂
4. ARBUTUS caulis procumbentibus, foliis integer *Uva ursi.*
rimis. Fl. lapp. 162. *t. 6. f. 3.* *Fl. succ.* 339. *Mart.*
med. 211. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall.*
helv. 415.
Uva ursi. Clus. hist. 1. *p.* 63.
Radix idæa putata & Uva ursi. Baub. hist. 1. *p.* 524.
Arbutus noveboraceensis Bearberry. Cold. nov. 104.
Habitat in Europa frigida, Canada. ♂

CLETHRÆ,

- alnifolia.* 1. CLETHRÆ. Gron. virg. 47.
*Alnifolia americana ferrata, floribus pentapetalis albis
 in spicam dispositis. Pluk. alm. 18. t. 115. f. 1. Gatesb.
 car. 1. p. 66. t. 66.*
Habitat in Carolina, Virginia, Pensylvania. ♂
- rotundifolia* 1. PYROLA staminibus adscendentibus, pistillo declinato. Fl. suec. 330. Mat. med. 212. Annen. acad. 1. p. 156.
Pyrola staminibus & pistillis declinatis. Fl. lapp. 169.
Pyrola foliis integerrimis. Vir. cliff. 37. Roy. lugd. 440.
Pyrola foliis subrotundis, scapo racemoso. Hort. cliff. 162.
Pyrola rotundifolia major. Baub. pin. 191.
Pyrola noveboracensis. Cold. noveb. 99.
Habitat in Europa septentrionaliore, Virginia, Brasilia. ♀
- minor.* 2. PYROLA floribus racemosis dispersis, staminibus pistillisque rectis. It. gotl. 206. Fl. suec. 331.
Pyrola foliis subrotundis, scapo undique racemoso, genitalibus rectis. Act. Stockh. 1741. p. 192.
Pyrola foliis obiter ferratis subrotundis racemosis, floribus tuba recta. Hall. helv. 420.
Pyrola minor. Riv. pent. 149. Raj. angl. 3. p. 363.
Habitat in Europa frigidiore. ♀
- secunda* 3. PYROLA racemo unilaterali. Fl. suec. 332.
Pyrola floribus uno versu sparsis. Fl. lapp. 168.
Pyrola folio mucronato ferrato. Baub. pin. 181.
Pyrola 2 tenerior. Clus. pan. 506.
Habitat in Europæ borealis sylvis. ♂
- umbellata.* 4. PYROLA pedunculis subumbellatis. Fl. suec. 333.
Pyrola frutescens, arbuti flore. Baub. pin. 191.
Pyrola 3 fruticans. Clus. pan. 507.
Habitat in Euroqæ, Asiæ & Americæ septentrionalis sylvis. ♂
- maculata.* 5. PYROLA pedunculis bifloris.
Pyrola petiolis apice bifloris vel trifloris. Gron. virg. 48.
Pyrola marilandica minor, folio mucronato arbuti. Pet. muf. 675.

Pyro-

Pyrola mariana, arbuti foliis angustioribus, trifoliata ad medium nervium linea alba utrinque per longitudinem discurrente. *Pluk. mant.* 157. t. 349. f. 4.
Habitat in Americæ septentrionalis sylvis. ♂

6. PYROLA scapo unifloro. *Fl. lapp.* 167. *Fl. suec.* 334. *uniflora*.
Hall. belv. 420.

Pyrola rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 191.

Singulari flore ampliore. *Moris. hist.* 3. p. 505. f. 12.
 t. 10. f. 2.

Habitat in Europæ borealis sylvis. ♀.

DIGYNIA.

ROYENA.

1. ROYENA foliis ovatis scabriusculis. *Hort. cliff.* 149. *tacida*.
Roy. lugdb. 411.

Staphylocadron africanum sempervirens, foliis splen-
 dentibus. 1. p. 187. t. 96.

Staphylocadrum africanum, folio singulari lucido.
Herm. parad 232. t. 232.

Pistacia africana. *Pluk. alm.* 298. t. 63. f. 4. t. 317. f. 5.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♂

2. ROYENA foliis lanceolatis glabris. *Roy. prodr.* 441. *glabra*.

Royena foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 149.

Vitis idæa æthiopica, buxi minoris folio, floribus albis.
Comm. hort. 1. p. 125. t. 65.

Vitis idæa æthiopica, myrti foliis, flosculis dependenti-
 bus. *Pluk. alm.* 391. t. 321. f. 4.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♂

3. ROYENA foliis lanceolatis hirsutis. *Roy. lugdb.* 441. *hirsuta*.

Arbutus foliis lanceolatis integerrimis hirsutis. *Hort.*
cliff. 163.

Staphylocadrum africanum, folio lanuginoso rosmari-
 ni latiore. *Boerb. lugdb.* 2. p. 235.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♂

HYDRANGEA.

1. HYDRANGEA. *Cron. virg.* 50. † *arboreum*.

Habitat in Virginia. ♂

Frutex ex ordine Arbuscularum XIX, foliis oppositis,
 floribus in cymulis digestis.

Folia dupli ordine punctorum callosorum notata evadunt albida.

hurseriana. 5. **SAXIFRAGA** foliis aggregatis imbricatis subulatis lævibus, caule subnudo unifloro.

Sedum alpinum, saxifragæ albæ flore. Baub. pin. 284. Burs. XVI: 6.

Habitat in Tauro, Rastadiensi, 2

Facies Sedi minoris. Folia juniperina, dense imbricata, acuta, carinata, glabra. Caulis vix digitalis, rufescens te hispidus s. glutinosus, foliolis 3. s. 4. alteris, linearibus. Flos magnitudine Saxifrage granulatae: venis incarnatis.

bryoides. 6. **SAXIFRAGA** foliis ciliatis reflexis, caule nudiusculo unifloro.

Saxifraga foliis densissimis, foliolis ciliatis, caule unifloro. Hall. helv. 403.

Saxifraga pyrenaica minima lutea musco similis. Tournef. inst. 253.

Sedum muscosum. Baub. hist. 3. p. 695. Sehruch. alp. 142. t. 21. f. 2.

Sedum ejusdem alpinum quartum. Col. ecphr. 2. p. 66. t. 67. f. 1. 2.

Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis.

brachialis. 7. **SAXIFRAGA** foliis imbricatis subulatis ciliatis spinosis, caule subnudo multifloro.

Habitat in Sibiria.

Stolones oblongi, confertim imbricati; Foliis planis, subulatis, mucronato-spinosis, spinoso-ciliatis. Caulis altus nudiusculus, foliis aliquot minimis mucronatis margine levibus. Panicula parva.

stellaris. 8. **SAXIFRAGA** foliis ferratis, caule nudo ramoso petalis acuminatis.

Saxifraga foliis lanceolatis dentato-ferratis, caule nudo simplici. Fl. suec. 355.

Saxifraga caule nudo simplici, foliis lanceolatis dentatis, petalis acutis. Fl. lapp. 175.

Sanicula myosotis, floribus albicantibus fere umbellatis. Pluk. alm. 331. t. 58. f. 2. &. t. 222. f. 4.

Sedum montanum hirsutum, mucronato & dentato folio, flore albo guttato. Moris. hist. 3. p. 478. f. 12 t. 9. f. 13.

Habitat in Alpibus Spitsbergensibus, Lapponicis, Helveticis, Styriacis. Westmortlandicis.

9. SAXIFRAGA foliis ovalibus retusis obsolete ferratis *crassifolia*, petiolatis, caule nudo, panicula conglomerata.
Saxifraga foliis ovalibus crenulatis, caulis nudis. *Gmel.*
Habitat in Alpibus Sibiricis. 2
Radix crassitie fere digitii. Folia saxe palmaria, coriacea, ovalia, retusa, repando-crenata, glabra, petiolis longitudine fere foliorum. Panicula arcta, congesta, in caule omnino nudo. Flores purpurascentes. Facies sequentis, sed majoris omnia & reliqua.
- 10 SAXIFRAGA foliis obovatis crenatis subsefilibus, *nivalis*: caule nudo, floribus congestis.
Saxifraga foliis subovatis crenatis, caule nudo, floribus capitatis. *Fl. suec.* 354.
Saxifraga caule nudo simplici, foliis elliptico-subrotundis crenatis, floribus capitatis. *Fl. lapp.* 176, t. 2. f. 5. 6.
Saxifraga foliis cordato-ovalibus crenatis; corolla alba, caule hispido aphylo. *Gron. virg.* 160.
Saxifraga foliis oblongo-totundis dentatis, floribus compactis. *Ruj. angl.* 3. p. 354. t. 16. f. 1.
Seipervivum minus dentatum. *Matt. spitzb.* 43. t. F. f. A.
Habitat in summis Alpibus Spitzbergensibus, Lapponicis, Arvoniciis, Virginia, Canada. 2
11. SAXIFRAGA foliis cordato-ovalibus retusis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. *Hort. cliff.* 167. *
Geum foliis petiolatis retusis, ora cartilaginea, ferrata, caule ramoso. *Hall. helv.* 400.
Sanicula montana rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 243.
Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis. 2
12. SAXIFRAGA foliis reniformibus dentatis, caule nudo paniculato. *rotundifolia*.
Geum folio circinato acuto crenato, pistillo floris rubro. *Magn. hort.* 87. t. 87.
Habitat in Alpibus Pyrenaeis, Sibericis. 2
*Facies *Saxifrage rotundifoliae*, sed caulis nudus.*
13. SAXIFRAGA foliis obovatis dentatis petiolatis, caule nudo paniculato. *punctata*.
Geum bicorne ferratum, pallidiore folio rotundiore, floribus punctatis. *Morit. hist.* 3. p. 478. t. 12. f. 9. f. 17.
Habitat in Siberia, 2

* *Foliis indivisis, Caule folioso.*

oppositifolia. 14. SAXIFRAGA foliis caulinis ovatis oppositis imbricatis: summis ciliatis. *Fl. suec.* 359.

Saxifraga foliis ovatis quadrangulo imbricatis, ramis procumbentibus. *Fl. lapp.* 179. t. 2. f. 1. *Hall. helv.* 403.

Sedum alpinum ericoides purpurascens. *Bauh. pin.* 284. *prod.* 132. *Moris. hist.* 3. p. 480. f. 12. t. 10. f. 36.

Habitat in rupibus Alpium Spitzbergensium, Lapponicarum, Pyrenaicarum, Helveticarum. 2

Caulis filiformis, dependentes, repentes. Folia ovata, quadrisarium imbricata, opposita, sessilia, ciliata. Flos terminalis, solitarius, sessilis.

aspera.

15. SAXIFRAGA foliis caulinis lanceolatis alternis spinoso-ciliatis, caule inferne procumbente.

Saxifraga foliis simplicibus ciliatis, caule folioso ramoso. *Hall. helv.* 403.

Sedum alpinum, foliis crenatis asperis. *Bauh. pin.* 284. *prod.* 132.

Sedum alpinum hispidum fere spinosum, flore pallido. *Bauh. hist.* 3. p. 695. *Moris. hist.* 3. p. 479. f. 12. t. 10. f. 25.

Sedum minimum alpinum villosum alterum. *Park. theatr.* 738.

Habitat in Alpibus Helveticis.

autumnalis. 16. SAXIFRAGA foliis caulinis linearibus alternis ciliatis radicalibus aggregatis.

Saxifraga ciliorum margine ciliari, floribus luteis maculosis. *Hall. helv.* 399.

Saxifraga angustifolia autumnalis, flore luteo guttato, foliis florum magis acuminatis. *Breyn. cent.* 106. t. 48.

Sedum angustifolium autumnale, flore luteo guttato. *Moris. hist.* 3. p. 477. f. 12. t. 8. f. 6.

Habitat in humeribus Borussiae, Angliae, Helvetiae. Calyx corolla longe brevior & viridis est.

Hirculus. 17. SAXIFRAXA foliis caulinis lanceolatis alternis nudis inermibus, caule erecto.

Saxifraga petalis latissimis luteis lineatis. *Hall. helv.* 399. t. 8.

Geum palustre luteum bicornue, nardi celticæ similis. *Moris. hist.* 3. p. 477.

Chamaecistus frisicus, foliis nardi celticæ. *Bauh. pin.* 466.

Hir-

Hirculus qui *Chamæcisti* genus. *Clus. cur.* 5.

Habitat in Suecia, Helvetia, Lapponia, Sibiria.

Petala ad basin Lacuna nectarifera ex rimabivalvi apicibus acutis instructa.

18. SAXIFRAGA foliis caulinis linearis-subulatis sparsis *aizoides*, nudis inermibus, caulis decumbentibus.

Saxifraga foliis linearibus sparsis glabris. *Fl. suec.* 357.

Saxifraga foliis subulatis sparsis *Fl. lapp.* 178.

Sedum alpinum, flore pallido. *Bauh. pin.* 284. *Moris. hist.* 3. p. 477. s. 12. t. 6. f. 3.

Sedum minus VI. *Clus. hist.* 2. p. 60.

Habitat in Alpibus Lapponicis, Styriacis, Westmorlandicis, Baldo.

19. SAXIFRAGA foliis caulinis reniformibus dentatis *rotundifolia*, petiolatis.

Saxifraga foliis reniformibus acute crenatis, caule ramoso folioloso. *Hort. cliff.* 167. *Roy. lugdo.* 453. *Hall. helv.* 400.

Sanicula montana rotundifolia major. *Bauh. pin.* 243.

Sanicula alpina. *Cam. epit.* 764.

Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis. 2

* *Foliis lobatis, Caule erecto.*

20. SAXIFRAGA foliis caulinis reniformibus lobatis, *granulata*, caule ramoso, radice granulata. *Hort. cliff.* 167. *Fl. suec.* 350. *Mat. med.* 215. *Roy. lugdb.* 453. *Hall. helv.* 401.

Saxifraga rotundifolia alba. *Bauh. pin.* 309.

Saxifraga alba. *Dod. pent.* 316.

Saxifraga IV. *Cam. epit.* 719.

Habitat in Europæ apricis. 2

21. SAXIFRAGA foliis caulinis palmato-lobatis; cauli-*bulbifera*, nis sessilibus, caule ramoso bulbifero.

Saxifraga bulbosa altera bulbifera montana. *Col. ecphr.* 1. p. 318. t. 317.

Saxifraga ad folia bulbos gerens. *Bauh. pin.* 309.

Sedum bicorne rotundifolium erectum, radice granulata, & ad caulem tubercula proferens. *Moris. hist.* 3. p. 474. s. 12. t. 9. f. 24.

Habitat in Italia, pratis saxosis umbrosis. 2

22. SAXIFRAGA foliis caulinis palmatis petiolatis, caule simplicissimo unifloro bulbifero.

- Saxifraga foliis palmatis, caule simplici unifloro. *Fl. lapp.* 172. *t. 2. f. 4. Hort. cliff.* 167. *Fl. succ.* 351.
Habitat in Alpibus Lapponicis frequens. ♀
Flos parum nutat. Folia caulinaglabra, magis palmata & gerumen supra receptaculum magis quam in antecedente, ut distinctissima a priore planta. Videtur tamen affinis sequentis, licet & ab hac distincta.
- caulinis.* 23. SAXIFRAGA foliis caulinis palmatis: summo florali ovato, caule simplici subbifloro.
 Saxifraga foliis radicalibus quinquelobis, florali ovato, *Fl. lapp.* 174. *t. 2. f. 7. Fl. succ.* 352.
Habitat ad Alpium Lapponicarum latera & rivulos.
- grœnlaudica.* 24. SAXIFRAGA foliis caulinis palmato-multifidis sparsis: laciniis acutis, caule erecto.
 Saxifraga tridactylites grœnlaudica, caulis valde foliosus. *Dill. elib.* 337. *t. 353. f. 329.*
Habitat in Grœnlandia, forte etiam in Pyrenæis & Helveticis Alpibus.
- tridactylites.* 25. SAXIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso. *Fl. succ.* 353.
 Saxifraga foliis trifidis basi angustis, caule erecto. *Roy. lugdb.* 457. *Sauv. monsp.* 208.
 Saxifraga foliis omnibus trilobis basi angustis, caule erecto. *Fl. lapp.* 173. *Hort. cliff.* 168.
- tectorum.* Sedum tridactylites tectorum. *Baub. pin.* 285.
 Paronychia altera. *Dod. perapt.* 113.
- alpina.* ♂. Saxifraga alba petræa. *Pon. bald.* 339. *f. 337.* *
 Saxifraga aizoides alpina, trifido folio, major alba. *Plak. alm.* 331. *t. 222. f. 3.*
 Sedum tridactylites alpinum majus album. *Baub. pin.* 284. *Morif. hist.* 3. *p. 479. f. 12. t. 9. f. 28.*
Habitat & in Europæ arenosis, ♂ in Alpibus Lapponicis, Pyrenæis. ☽
- sedoides.* 26. SAXIFRAGA foliis caulinis aggregatis alternis oppositisque sublanceolatis, flore pedunculato.
 Saxifraga alpina minima, foliis ligulatis in orbe circumactis, flore ochroleuco. *Segn. ver.* 450. *t. 9. f. 3.*
Habitat in Alpibus Tridentinis, Sibiricis.
- cespitosa.* 27. SAXIFRAGA foliis radicatis aggregatis linearibus integris trifidisque, caule erecto subnudo subbifloro.
 Saxifraga foliis simplicibus & trifidis, caule pene aphylo paucifloro. *Hall. helv.* 405.

Saxi-

Saxifraga foliis partim integris partim trifidis. Segu. ver.

451. t. 9. f. 4.

Sedum tridactylites alpinum minus. Baub. pin. 284.
prodr. 131.

*Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Tridentinis,
Monspelli.* 2

* Foliis lobatis Caulibus procumbentibus

28. SAXIFRAGA foliis caulinis cordatis trilobis integratis
grisque, caulibus procumbentibus.

Saxifraga exigua, foliis cymbalariæ. Baub. cent. 2. p.

40. t. 45. f. 2.

Habitat in Oriente.

29. SAXIFRAGA foliis caulinis ovatis lobatis, caule filiformi flaccido.

Saxifraga cretica annua minima, hederaceo folio. Tozer-
nef. cer. 18.

Habitat in Creta.

30. SAXIFRAGA foliis caulinis linearibus integris trifida-
disve, stolonibus procumbentibus, caule erecto nudiusculo.

*Saxifraga procumbens, foliis linearibus integris trifida-
que.* Hort. cliff. 168. Roy. lugdb. 453. Sauv. monsp.
208. Gort. gelr. 248.

*Saxifraga foliis omnibus angustis petiolatis apice triden-
tatis, caule folioso ramoso viscido.* Hall. helv. 404.

Sedum alpinum, trifido folio. Baub. pin. 284. Moris.
hist. 3. p. 479. f. 12. t. 9. f. 26.

β. *Saxifraga procumbens, foliis linearibus integris trifidis
& quinquefidis.* Roy. lugdb. 454. Sauv. monsp. 208.
*Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis, Pyrenaicis,
Westmorlandicis.* 2

31. SAXIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus apice adscendens.
dentatis, caule adscendentente subvilloso..

Sedum tridactylites alpinum, caule folioso. Baub. pin.
284.

Sedum tridactylites alpinum majus. 3. Baub. prodr. 131.
Bur. XVI. 89.

Habitat in Pyrenæis, Baldo, TAURO Rastadiensi. 2

TIARELLA.

1. TIARELLA foliis cordatis. Gen. nov. 188. cordifolia.

Mitella scapo nudo. Hort. cliff. 167. * Roy. lugdb.
459. Gren. virg. 160. Cor-

Cortusa americana, florè spicato, petalis integris. *Herm.*
par. 129. *t.* 129.

Habitat in America & Asia septentrionali. 2

- trifoliata.* 2. *TIARELLA* foliis ternatis. *Gen. nov.* 188.
Mitella foliis ternatis. *Amœn. acad.* 2. *p.* 351.
Habitat in Asia boreali. *G. Demidoff.* 2

MITELLA.

- diphylla.* 1. *MITELLA* scapo diphylo. *Gen. nov.* 29. *Hort. cliff.*
167. * *Roy. lugdb.* 459. *Cold. noveb.* 96.
Cortusa americana altera, floribus minutim fimbriatis.
Meatz. *pug.* *t.* 10.
Cortusa americana, spicato flore, petalis fimbriatis. *Herm.*
par. 130.
Habitat in America septentrionali.

- nuda.* 2. *MITELLA* scapo nudo. *Amœn. acad.* 2. *p.* 352.
Habitat in Asia boreali. 2

SCHLERANTHUS.

- annuus.* 1. *SCLERANTHUS* calycibus fructus patulis. *Fl. suec.*
348.
Scleranthus. *Hort. cliff.* 166. *Roy. lugdb.* 215.
Polygonum, gramineo folio, majus erectum. *Bauh.*
pin. 281.
Polygonum montanum, vermiculatæ foliis. *Bauh. pin.*
281.
Vermiculata nova planta. *Cal. ecphr.* 1. *p.* 295. *t.* 294?
Habitat in Europæ arvis, arenosis. ☺

- perennis.* 2. *SCLERANTHUS* calycibus fructus clausis. *Fl. suec.*
349.
Knavel incanum, flore majore, perenne. *Raj. angl.* 3.
p. 160. *t.* 5. *f.* 1.
Alchimilla gramineo folio, majori flore. *Vaill. paris.* 4.
t. 1. *f.* 5.
Habitat in Europæ campis apricis arenosis. 2

GYPSOPHILA.

- aggregata.* 1. *GYPSOPHILA* foliis mucronatis recurvatis, floribus aggregatis. *Gen. nov.* 1103.
Saponaria calycibus pentaphyllis, floribus aggregatis, foliis mucronatis canaliculatis recurvis. *Hort. upf.* 107.
Caryophyllus saxatilis, ericæ foliis, umbellatis corymbis.

bis. *Baeh.* pin. 211. prodr. 105. *Raj. hist.* 1033.
Magn. monsp. 53. t. 5.

Habitat in monte Vignon Galliae, Monspelii, Pyrenaeis. 2

2. **GYPSOPHILA** foliis lanceolatis, staminibus pistillo *repente*.
 brevioribus. *Gen. nov.* 1103.
Saponaria caule simplici, foliis subulatis planis, ex alis
 ramulosa. *Hort. cliff.* 166.
Alpine orientalis altissima, gramineo folio, flore albo.
Buxb. cent. 3. p. 32. t. 60.
Alpine angustifolia caryophylloides multiflora glabra
 purpureascens, radice astragalisti. *Pluk. alm.* 22. t. 75.
 f. 2.
Caryophyllus saxatilis, foliis gramineis, minor. *Baeh.*
 pin. 211. *Burj. XI.* 126.
Habitat in Sibiria, Austria, Helvetia montibus. 2
Corolla albæ, extus incarnatae, emarginatae; antheræ
rufescentes polline violaceo.
3. **GYPSOPHILA** foliis lanceolatis scabris, corollis *re-paniculata*.
 volutis. *Gen. nov.* 1108.
Alpine frutescens, *caryophylli* folio, flore parvo albo.
Gerb. tanaïs. 15.
Habitat in Sibiria, Tatariæ desertis sabulosis, Tawrow,
Bielogrod. 2
Folia margine scabra, acuta. Stamina in fundo floris
latent. Petala revoluta, minora quam in congeneribus.
Styli longiores corolla, incurvi.
4. **GYPSOPHILA** foliis lanceolatis subtrinerviis rectis. *altissima*.
Gen. nov. 1103.
Saponaria calycibus pentaphyllis, corymbis fastigiatis,
foliis lanceolatis, caule adscendente. *Hort. upf.* 107.
Habitat in Siberia. 2
Differet a sequente magnitudine dupla vel quadrupla o-
mnia partium; Structura eadem, tamen aiversa spe-
cies.
5. **GYPSOPHILA** foliis lanceolato-linearibus obsolete *fastigata*.
 triquetris lœvibus obtusis secundis. *Gen. nov.* 1103.
Saponaria caule simplici, foliis linearibus ex alis folio-
 rum confertis teretibus. *Hort. cliff.* 166.
Saponaria calycibus pentaphyllis, corymbis fastigiatis,
foliis linearibus, caule adscendente. *It. gotl.* 282. *Fl.*
suec. 246. *Sauv. monsp.* 145.
Saponaria petalis ovatis, foliis glaucis pulposis linearibus. *Hall. jen.* 117. t. 2. f. 1.

Caryophyllum saxatile, floribus gramineis, umbellatis corymbis. Baub. pin. 211.

Polygonum majus erectum angustifolium, floribus candidis. Mentz. pug. t. 2. f. 2.

Habitat in Gotlandia, Borussia, Helvetia rupibus & Caulis in hac, non in antecedente, ante florescentiam procumbit, binc folia fernanda.

persolata. 6. *GYPSOPHILA* foliis ovato-lanceolatis semiamplexi-caulibus.

Saponaria foliis lanceolatis, calycibus campanulatis angulariatis. Hort. cliff. 165.

Spergula multiflora, foliis inferioribus saponariæ, superioribus behen similibus. Dill. elts. 368. t. 276. f. 357
Habitat in Hispania & Oriente.

tigida. 7. *GYPSOPHILA* foliis linear-lanceolatis planis, caule dichotomo, pedunculis bifloris, petalis emarginatis. Gen. nov. 1103.

Saponaria caule dichotomo, foliis subulatis planis. Hort. cliff. 445. Roy. lugd. 445.

Saponaria caule brachiatæ, capillaceo folio, calyx campanulato, floribus sparsis. Sauv. monsp. 145.

Tunica minima. Dalech. bist. 1191.

Habitat Monspelii et forte in Belgio. 4

monspelie. 8. *GYPSOPHILA* foliis linearibus planis, caule dichotomo, petalis crenatis. Gen. nov. 1103.

Saponaria calycibus pentaphyllis, corollis crenato-emarginatis, foliis subulatis planis. Fl. suec. 347. Sauv. monsp. 144.

Saponaria foliis linearibus. Fl. lapp. 171.

Caryophyllum minimus muralis. Baub. pin. 211.

Lychnis parva palustris, foliis acutis lanceolatis, flosculis purpureis. Mentz pug. t. 7. f. 4.

Habitat in Suecia, Germania, Helvetia ad vias. ⊙

Similis Dianthus saxifraga, at caret synamis calycinis.

SAPONARIA.

affinalis. 1. *SAPONARIA* calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. Hort. cliff. 165. Hort. apf. 106. Mat. med. 214. Roy. lugd. 444. Gron. virg. 160. Gort. gelr. 245.

Saponaria major laevis. Baub. pin. 206.

Saponaria vulgaris. Cam. epit. 152.

hybrina. 2. *Saponaria concava anglica.* Baub. pin. 206. Moris. bist. 2. p. 548. f. 3. t. 22. f. 52.

Gen-

Gentiana folio convoluto. *Baub. hist.* 3. p. 521.
Habitat in Europa media. ♀

2. *SAPONARIA* calycibus pyramidatis quinquangularibus, foliis ovatis acuminatis sessilibus. *Hort. cliff.* 166. *Hort. upf.* 107. *Roy. lugdb.* 443. *Guet. stamp.* 287. *Sauv. monsp.* 153.
Lychnis segetum rubra, foliis perfoliatis. *Baub. pin.* 204.
Vaccaria. *Dod. pempt.* 104.
Habitat inter segetes Galliae, Germaniae ☽
3. *SAPONARIA* calycibus cylindricis villosis, caulinibus *Ocynoides*, dichotomis procumbentibus.
Saponaria minor quibusdam. *Baub. hist.* 3. p. 344.
Lychinis vel Ocynoides repens montanum. *Baub. pin.* 206.
Habitat in Helvetia & Monspelii locis petrofisis. ♀
4. *SAPONARIA* calycibus cylindricis villosis, caule di-orientalis, chotomo erecto patulo. *Hort. upf.* 106. n. 2. *
Saponaria caule dichotomo, foliis lanceolatis petiolatis, floribus solitariis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 445.
Lychnis orientalis annua supina, antirrhini folio, flore minimo purpurascente. *Tournef. cor.* 25. *Dill. eltb.* 205. t. 167. f. 204.
Habitat in Oriente. ☽
Sinuosa precedenti; huic *Folia linearis lanceolata, illi lanceolato-ovata.*

DIANTHUS.

* *Flores aggregati.*

1. *DIANTHUS* floribus aggregatis fasciculatis, squamis *barbatus*, calycinis ovato-subulatis tubum & quantibus, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 165. *Hort. upf.* 165. *Roy. lugdb.* 444. *Sauv. monsp.* 144.
Caryophyllus hortensis barbatus latifolius. *Baub. pin.* 208.
Thyrsis. *Reneal. spec.* 47.
- β. *Caryophyllus baroatus hortensis angustifolius*, *Baub. pin.* 209.
Armerius flos alter. *Dod. pempt.* 176.
Habitat in - - - - ♀
2. *DIANTHUS* floribus subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubum sub&quantibus, foliis linearibus. *Hort. upf.* 105.

Dianthus floribus aggregatis, squamis calycinis lanceolatis, corollis crenatis. Guett. stamp. 284.

Caryophyllum sylvestris vulgaris latifolius. Baub. pin. 209.

Caryophyllum arvensis, calyculo florum numeroſo. Læſ. pruſſ. 37. f. 7.

β. *Caryophyllum sylvestris, flore rubro plurimo de summo caule prodeunte.* Segu. ver. 434. t. 8. f. 2.

Habitat in Germaniæ, Italiae Siciliæ sterilibus apricis. 2

Armeria.

3. *DIANTHUS floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis lanceolatis villosis tubum æquantibus.* Hort. cliff. 165. Fl. suec. 345. It. gotl. 301. Roy. lugdb. 443. Sauv. monsp. 144.

Caryophyllum barbatus sylvestris. Baub. pin. 208.

Armeria sylvestris altera. Lob. ic. 448.

Habitat in sterilibus Gotlandiæ, Germaniæ, Galliæ, Italiae. ◎

prolifer.

4. *DIANTHUS floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis obtusis muticis tubum superantibus.*

Dianthus floribus aggregatis, capitulo magno, squamis calycinis ovatis obtusis magnis. Hort. upf. 106. Sauv. monsp. 144.

Caryophyllum sylvestris prolifer. Baub. pin. 209. Segu. veron. 26. t. 7. f. 1.

Caryophyllum sylvestris annuus, multis capsulis simul junctis donatus. Moris. hist. 2. p. 563.

Habitat in Germaniæ & australioris Europæ pascuis sterilibus. ◎

* *Flores solitarii, plures in eodem caule.*

Caryophyllum 5. *DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis.* Hort. cliff. 164. Hort. upf. 104. Mat. med. 213. Roy. lugdb. 443. Sauv. monsp. 143.

coronarius. α. *Caryophyllum hortensis simplex, flore majore.* Baub. pin. 208.

β. *Caryophyllum altilis major.* Baub. pin. 207.

γ. *Caryophyllum maximus ruber & variegatus.* Baub. pin. 209.

imbricatus. δ. *Caryophyllum - - - flore pleno ex squamis calycinis longissime imbricatis.* Hort. cliff. l. c.

Caryophyllum spicam frumenti referens. E. N. C. cent. 3. p. 368. t. 9. Hort. cliff. 164. Phil. bot. 8.

inodorus. ε. *Tunica angustifolia procumbens, petalis ferratis.* Hall. helv. 382. Ca-

- Carpophyllum sylvestris biflorus*, *Baub. pin.* 209. *prodr.* 104.
Caryophyllum sylvestris, flore rubro inodoro, calyce oblongo cum brevibus ungibus. *Segu. ver.* 435. t. 7. f. 3.
Habitat in Italia. Rajus.
Coronarius & cum reliquis Y. B. & forte ex e inodoro
prognatus est.
Varietas & maxime singularis est.
6. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis *lan-* *deltoides*,
ceolatis binis, corollis crenatis. Hort. cliff. 164. *Fl.*
suec. 342. *Sauv. monsp.* 143.
Caryophyllum minor repens nostras. Raj. hist. 988. *Dill.*
elth. 402.
Caryophyllum sylvestris vulgaris latifolius. Baub. pin. 209,
Betonica coronaria L. Caryophyllum minor, folio viridi
nigricante, repens. Baub. hist. 3. p. 329.
Habitat in Europæ pratis. 2
7. DIANTHUS floribus subsolitariis, squamis calycinis *glaucus*,
lanceolatis quaternis, corollis crenatis. Hort. cliff.
164. Hart. upf. 104.
Tunica ramosior, flore candido cum corolla purpurea.
Dill. elth. 400. t. 298. f. 348.
Habitat in Anglia. 2
8. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis *su-* *chinensis*,
bulatis patulis tubum æquantibus, corollis crenatis.
Hort. cliff. 164. *Hort. upf.* 104. * *Roy. lugdb.* 443.
Caryophyllum sinensis supinus, leucoji folio, flore unico.
Tournef. act. 1705. p. 348. f. 5.
Habitat in China. ②
9. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis *plumarius*,
subovatis brevissimis, corollis multifidis fauce pub-
scentibus.
Dianthus floribus solitariis, petalis multifidis basi cana-
liculatis. Hort. upf. 105. * *Sauv. monsp.* 143.
Dianthus floribus solitariis, corollis lacero-partitis, squa-
mis calycinis ovatis acutis. Fl. suec. 344.
Dianthus petalis multifidis Fl. lapp. 170. *Hort. cliff.*
174. Roy. lugdb. 443.
Caryophyllum flore tenuissime dissesto. Baub. pin. 209.
Caryophyllum sylvestris, flore laciniato odoratissimo.
Baub. pin. 210.
Habitat in Europæ & Canadæ pascuis nemorosis.

* *Cau-*

* *Caule unifloro herbaceo.*

- arenarius.* 10. DIANTHUS caulis unifloris, squamis calycinis ovatis, corollis multifidis, foliis linearibus. *It. goth.* 318. *Fl. suec.* 343.
Dianthus foliis brevibus, squamis muticis, caule unifloro. *Savv. meth.* 143.
Caryophyllus sylvestris humilis, flore unico. *Bauh. pin.* 209.
Caryophyilus sylvestris 1. *Clas. hist.* 1. p. 282. *Dill. elth.* 402.
Armerius flos tertius. *Dod. pempt.* 176.
Habitat in Europæ frigidioris arena mobili. 2
Affinitatem hujus summam cum precedente docet corol-
la fax.
- alpinus.* 11. DIANTHUS caule unifloro, corollis crenatis, squa-
 mis calycinis exterioribus tubum æquantibus, foliis
 linearibus obtusis.
Caryophyllus pumilus latifolius. *Bauh. pin.* 209. *prodr.*
 104. *Burs. XI.* 95.
Caryophyllus sylvestris, flore magno inodoro hirsuto.
Bauh. pin. 209.
Caryophyllus sylvestris 2. *Clas. hist.* 1. p. 283. f. 1.
bon.
Habitat in Stiria, Austria. 2
Radix lignosa, exserens caules plures. Caulis longitudi-
ne digiti, articulis tribus constans. Folia caulis line-
ria, obtusiuscula, plana, obtusa, vel versus terram,
ubi cespites constituant, lanceolato-linearia. Calycis
squamæ exteriore longitudo tubi calycis; interiores
dimidio breviores. Corolla magna. Petala calycis lon-
gitudine, rotundata, dentibus brevissimis numerosis cre-
nata, fauce parum villosa.
- erigens.* 12. DIANTHUS caule subunito, corollis crenatis,
 squamis calycinis brevissimis, foliis subulatis.
Caryophyllus sylvestris repens multiflorus. *Bauh. pin.*
 209. *Burs. XI.* 99.
 β. Tumica rupestris, folio cæsio molli, flore carneo. *Dill.*
elth. 401. t. 298. f. 385.
Habitat Monspelii. 2
Radix perennis. Folia radicalia copiosa, erecta, in cespiti-
tem imbricata, acuminata, facie flatices ferme. Cau-
les aliquot, spithamei, & articulis simplicissimis con-
stantes, foliis minoribus & summis minimis ex vagi-
na persolia aortis. Calycis squamæ latae, ovatae, acu-
tae,

ta, brevissime; paribus remotis. Corollæ limbis di-
midio brevior tubo calycis, rotundatus, crenatus. Flos
unicus in caule, interdum & alter ex ala solii supremi.

* *Frutescentes.*

13. DIANTHUS caule fruticoso, foliis subulatis. *arboreus.*

Caryophyllus creticus arboreus, juniperi folio. Tournef.

cor. 23.

Caryophyllus arborescens creticus. Baub. pin. 208,

prod. 104.

Betonica coronaria arborea cretica. Baub. hist. 3. p. 328,

Habitat in Creta. b

14. DIANTHUS caule fruticoso, foliis lanceolatis. *fruticosus.*

Caryophyllus græcus arboreus, leucoji folio perana-

ro. Tournef. cor. 23. itin. 1. p. 183. t. 9.

Habitat in Græcia. b

* *Calycibus angulatis.*

15. DIANTHUS calycibus quinquangularibus, squarnis *Saxifragus.*

calycinis lanceolatis & equalibus, foliis subulatis.

Dianthus radice repente, ramis decumbentibus, foliis su-

bulatis. Roy. lugdb. 444.

Dianthus calyce lato & brevissimo. Hall. helv. 381.

Caryophyllus saxifragus strigosior s. Caryophyllus sylve-

stris, flore minimo. Baub. pin. 211.

Lychnis pumila caryophylata, flore rubello, italis Hæ-

morrhoidalis aldrovandi. Barr. rar. 64. t. 998.

Habitat in Helvetia, Gallia, Ingolstadii. 2

TRIGYNIA.

DRYPIS.

1. DRYPIS. *Ger. emac. 1312.*

spinosa.

Drypis italica aculeata, floribus albis umbellatis compa-

ctis. Mich. gen. 24. t. 23.

Drypis theophrasti & angvillaræ. Dalech. hist. 1480.

Lob. ic. 789. Tabern. ic. 144. Baub. hist. 3. p. 722.

Spina umbella, foliis vidua. Baub. pin. 388.

Carduus foliis tenuissime spinosis ad instar juniperi.

Moris. hist. 3. p. 161. f. 7. t. 32. f. 8.

Habitat in Italia, Mauritania.

CUCUBALUS.

baccifer.

1. CUCUBALUS calycibus campanulatis, petalis distantibus, fructu colorato, ramis divaricatis.

Cucubalus caule ramoso, floribus trigynis, fructu colorato globoso. *Hort. cliff.* 170. *Hort. upf.* 107. *Roy. lugdb.* 448. *Sauv. monsp.* 152.

Al sine scandens baccifera. *Baub. pin.* 250.

Al sine repens. *Dod. pentr.* 403.

Habitat in Tataria, Germaniae, Galliae, Italiae nemoribus. 2

Behen.

2. CUCUBALUS calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. *Fl. suec.* 360.

Cucubalus floribus trigynis, calycibus glabris, capsulis trilocularibus. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 448.

Cucubalus calycibus ovatis hermaphroditis. *Fl. lapp.* 180.

Lychnis sylvestris, quæ Behen album vulgo. Baub. pin. 205.

Papaver spumeum. Lob. ic. 340.

3. Lychnis maritima repens. *Baub. pin.* 205. *It. gotl.* 197.
Habitat in Europæ septentrionalioris pratis siccis. 2

Fabarius.

3. CUCUBALUS foliis obovatis carnosis. *Roy. lugdb.* 448.

Lychnis maritima saxatilis, folio anacampserotis. Tournef. cor. 24. *Boerb. lugdb.* 1. p. 214.

Behen album s. *Polemonium saxatile*, fabariæ folio, sicutum. *Bocc. mus.* 133. t. 92.

Habitat in Sicilia.

viscosus.

4. CUCUBALUS floribus lateralibus decumbentibus, caule indiviso, foliis basi reflexis.

Cucubalus foliis amplexicaulibus, floribus verticillatis, pedunculis erectis. *Roy. lugdb.* 448.?

Lychnis montana viscosa noctiflora hirsuta latifolia alba, floribus absque appendicibus. Till. pis. 105.

Lychnis orientalis maxima, buglossi folio undulato. Tournef. cor. 24. *itin.* 2. p. 361. t. 361.

Lychnis major noctiflora drubensis. Raj. hist. 995.?

Habitat in Svecia, Italia, Anglia. 3

stellatus.

5. CUCUBALUS foliis quaternis. *Hort. upf.* 110.

Drypis foliis quaternis. Cold. noveb. 106.

Silene foliis quaternis. Gron. virg. 50.

Lychnis caryophyllæus virginianus, gentianæ foliis glabris

bris quatuor ex singulis geniculis caulem amplexantibus, flore amplio fimbriato. *Raj. hist.* 1895.

Habitat in Virginia, Canada.

Petala, absque corona, quadrifida, lobis bipartitis.

6. CUCUBALUS caule dichotomo, petalis quadrifidis. *quadrifidus.*
Lychnis viscosa angustifolia major. *Baub. pin.* 205.
Lychnis sylvestris X. *Clus. hist.* 1. p. 291.
Caryophyllus minimus humilis alter exoticus, flore
 candido amoenō. *Lob. ic.* 445.
Habitat in Styriæ monte ad oppidum Eisenertz. 2
7. CUCUBALUS floribus erectis, petalis emarginatis *ægyptiacus.*
 retroflexis: utrinque denticulo notatis. *Hasselqu.*
Habitat in Ægypto.
8. CUCUBALUS petalis bipartitis, floribus secundis de- *tataricus.*
 cumbentibus, pedunculis oppositis solitariis erectis,
 caule simplicissimo. *Hort. upf.* 111. *
Lychnis septentrionalium, foliis hyssopi, floribus uno
 versu politis albis. *Hall. gott.* 33. *
Habitat in Tataria. 2
9. CUCUBALUS petalis bipartitis, floribus paniculatis, *catholicus.*
 flaminibus longis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. upf.*
 111. *
 Silene foliis ovatis utrinque acutis, caule paniculato, flo-
 ribus mutantibus tenuissimis. *Roy. lugdb.* 447.
Lychnis viscosa altissima, flore muscoso, ocymastrifac-
 cie. *Cupan. cath.* 110.
- β. Lychnis nocturna non viscosa, herbaceo flore. *Dill.*
elth. 425. *t.* 316. *f.* 408.
Habitat in Italia, Sicilia. 2
10. CUCUBALUS floribus dioicis, petalis setaceis *Otites.*
 indivisis. *Hort. cliff.* 272. *Roy. lugdb.* 445.
Lychnis viscosa, flore muscoso. *Baub. pin.* 206,
Sesamoides magnuin salmanticum. *Clus. hist.* 1. p. 275.
Habitat in Silezia, Austria, Gallia, Sibiria. 2
11. CUCUBALUS acaulis. *Fl. lapp.* 104. *Fl. suec.* 368. *acaulis.*
Roy. lugdb. 447. *Hall. helv.* 375
Lychnis alpina puinila, folio gramineo. *Baub. pin.* 206.
Dill. elth. 206. *t.* 167. *f.* 206.
Muscus alpinus, lychnidis flore. *Baub. hist.* 3. p. 767.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Anglicis. 2

- reflexus.* 12. *CUCUBALUS* floribus spicatis alternis secundis subsessilibus, corollis obsoletis nudis. *Hort. upf.* 112. *
Lychnis segetum meridionalium annua hirta, floribus albis uno versu dispositis. *Moris. hist.* 2. p. 544. *Raj. hist.* 996.
Lychnis sylvestris alba, spica reflexa. *Magn. monsp.* 171.
t. 170.
Habitat Monspelii. ◎

SILENE.

* *Floribus lateralibus solitariis.*

- anglica.* 1. *SILENE* hirsuta, petalis emarginatis, floribus erectis, fructibus reflexis hirsutis alternis. *Hort. upf.* 113.
Viscago cerastii foliis, vasculis pendulis anglica. *Dill. eltb.* 417. *t.* 309. *f.* 398.
Lychnis sylvestris hirsuta annua, flore minore albo. *Vaill. parif.* 121. *t.* 16. *f.* 12..
Habitat in Anglia, Gallia. ◎
Petala in hac emarginata non crenata, in sequente & emarginata & crenata.
- lusitanica.* 2. *SILENE* hirsuta, petalis dentatis coronatis, floribus erectis, fructibus reflexis subsessilibus alternis. *Hort. upf.* 113. *Hort. cliff.* 172.
Silene floribus alternis, petalorum limbis integris crenatis. *Hort. cliff.* 172.
Viscago hirsuta lusitanica, stellato flore. *Dill. eltb.* 420. *t.* 311. *f.* 401.
Habitat in Lusitania. ◎
- quinquevol-*
nera. 3. *SILENE* petalis integerrimis subtotundis, fructibus erectis alternis. *Hort. cliff.* 171. *Roy. Ingdb.* 446.
Silene spica incurva uno versu florida, foliis imis spathulatis. *Sauv. monsp.* 146.
Lychnis hirsuta minor, flore variegato. *Dod. mem.* 4. p. 291.
Habitat in Hispania, Lusatia, Italia, Gallia. ◎
- nocturna.* 4. *SILENE* floribus spicatis alternis secundis sessilibus, petalis bifidis.
Silene foliis lanceolatis, caule ramoso & floribus secundis erectis, calycibus hirsutis. *Roy. Ingdb.* 447.
Viscago hirta noctiflora, floribus obsoletis spicatis. *Dill. eltb.* 420. *t.* 310. *f.* 400.
Lychnis sylvestris nocturna pilosa, floribus unius ordinis dilute-purpureis. *Cup. cath.* 119. *Raj. suppl.* 480.
Ly-

Lychnis segetum meridionalium annua hirta, floribus albis uno versu dispositis. Moris. hist. 2. p. 346. f.

5. t. 36. f. 7.

Habitat in Italia, Pensylvania. ◎

5. SILENE floribus subspicatis alternis secundis, petalis *gallica*, indivisis, fructibus erectis.

Silene hirsuta, foliis sessilibus oblongo-cuneiformibus obtusis, calycibus striatis, fructibus erectis alternis. Dabib. paris. 129.

Viscago hirta gallica, flore parvo carneo, petalis integris. Dill. eth. 419. t. 310. f. 399.

Habitat in Gallia. ◎

6. SILENE hirsuta, petalis emarginatis, fructibus erectis *cerastoides*, alternis hirsutis sessilibus.

Viscago cerastei foliis, vasculis erectis sessilibus. Dill. eth. 416. t. 309. f. 397.

Habitat in Europa australi. ◎

* *Floribus laterilibus confertis.*

7. SILENE petalis bifidis, floribus lateralibus secundis *cer-nutans*, caule recurvato.

Silene foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nutantibus, calyce striato, corolla involuta. Hort. cliff. 171.

Fl. suec. 366. Roy. lugdb. 446.

Lychnis montana viscosa alba latifolia. Baub. pin. 205.

Habitat in Europæ borealis pratis aridis. 2.

8. SILENE petalis bifidis : coronula subcoadunata, floribus secundis, pedunculis oppositis trifloris, ramis alternis.

Silene petalis bifidis coronatis : corolla coadunata, calycibus erectis ratis pilosis. Hort. upf. 114.

Habitat in Tataria. 2

9. SILENE petalis bifidis, caule fruticoso, foliis lato-lanceolatis, panicula trichotoma.

Silene caule folioso fruticoso, foliis linear-lanceolatis acutis glabris, capsulis ovatis. Vir. cliff. 38. Hort. cliff. 171. n. 4. Hort. upf. 111. n. 2. Roy. lugdb. 446.

Lychnis sylvestris myrtifolia behen albo similis. Baub. pin. 205.

Ocyrnoides fruticosum. Cam. hort. 109. t. 33.

Saponaria frutescens, acutis foliis, ex Sicilia. Bass. sic. 58. t. 30.

Habitat in Sicilia. 3

gigantea.

10. SILENE folijs radicalibus cochleariformibus obtusis-simis, caule subverticillato.

Silene folijs lanceolatis, caule paniculato nudo, floribus erectis. *Hort. cliff.* 171. *Roy. lugdb.* 446.

Silene folijs obverse ovatis crassis, limbis corollæ bifidis a sole revolutis. *Hach. ultr.* 391.

Lychnis ocytmastræ facie, flore viridi. *Herm. par.* 199. t. 199.

Habitat in Lusitania. ♂

* *Floribus ex dichotomia caulis.*

Conoides.

11. SILENE calycibus fructus globosis acuminatis striae triginta, folijs glabris. *Hort. apf.* 110. *Sauv. monsp.* 146.

Cucubalus calycibus conicis striatis. *Hort. cliff.* 171. *Roy. lugdb.* 448.

Lychnis sylvestris latifolia, calycibus turgidis striatis. *Baub. pin.* 205.

Lychnis sylvestris 2. *Clus. hist.* : p. 288.

Habitat inter segetes Hispaniæ. ☽

conica.

12. SILENE calycibus fructus conicis striae triginta, folijs mollibus. *Hort. apf.* 110.

Lychnis sylvestris augustifolia, calycibus turgidis striatis. *Baub. pin.* 205.

Lychnis glabra annua, folijs oblongis mucronatis, flore amplio rubello, capsula oblonga pyramidali. *Moris. hist.* 2 p. 542. f. 5. t. 36. f. 6.

Habitat in Hispania, Galloprovincia. ☽

Beben.

13. SILENE calycibus ovatis glabris venoso-reticulatis, capsulis trilocularibus.

Lychnis vesicularia cretica, parvo flore purpurascente. *Dill. elth.* 427. t. 317. f. 409.

Lychnis cretica, parvo flore, calyce striato purpurascente *Tournef. cor.*, 24.

Habitat in Creta. ☽

Differt a Cucubalo Beben corona corollæ, petalorum laminis vix à longitudine calycis, radice annua, corollis purpurascensibus, antheris albis; modo hec sufficiant pro specie distincta.

pendula.

14. SILENE calycibus fructiferis pendulis inflatis: angulis decemscabris. *Hort. apf.* 109. *

Cucubalus floribus trigynis erectis, fructibus pendulis, calycibus striae decem crispis. *Hort. cliff.* 170.

Co.

- β. Cucubalus floribus trigynis erectis, calycibus fructus pendulis angulosis. *Hort. cliff.* 171.
Viscago hirsuta sicula, lychnidis aquaticæ facie, supina.
Dill. elth. 421. t. 312. f. 404.
Habitat in Creta & Sicilia. ◎
15. SILENE calycibus deceangularibus: dentibus tubum noctiflora.
 æquantibus.
Cucubalus calycibus fructus ovatis erectis: angulis decem: alternis venosis. Hort. upf. 3. † *Fl. suec. præfat.* *Savv. monsp.* 146.
Lychnis noctiflora. *Baub. pin.* 205. *Raj. hist.* 994.
Ocymoides noctiflorum. *Cam. hort.* 109. t. 34.
Habitat in Suecia, Germania. ◎
16. SILENE calycibus floris cylindricis, panicula dichotoma, calycibus villotis. *virginica.*
Lychnis flore simplici specioso coccineo, foliis oblongis acuminatis adversis, caule viscoso. *Gron. virg.* 161.
Habitat in Virginia. 2
Planta polymorpha. Flores facie Cucubali dioici albi, at saturate ruorū; Calyces angustiores quam in congeneribus, hirsuti. Stamina cum stylis extra florem prominuntur. Caulis nunc simplex digiti longitudine, terminatus floribus in fasciculum collectis, nunc pedalis apice trichotomus, pedunculo intermedio semper unifloro. Folia oblonga s. lanceolata, ut in Gomphrena prima.
17. SILENE foliis lanceolatis glabris, pedunculis trifidis, antirrhina, petalis emarginatis, calycibus ovatis. *Roy. Ingab.* 447.
Silene corymbo dichotomo, floribus pedunculatis, ramis alternis erectis, foliis lanceolatis integerrimis. *Gron. virg.* 50.
Viscago americana noctiflora, antirrhini folio. *Dill. elth.* 442. t. 313. f. 403.
Habitat in Virginia, Carolina. ◎
18. SILENE erecta laevis, calycibus subglobosis glabris vellentibus, corollis inspertis. *Hort. upf.* 112. *
Viscago lusitanica, flore rubello vix conspicuo. *Dill. elth.* 314. t. 314. f. 406.
Habitat in Lusitania. ◎
19. SILENE caule dichotomo paniculato, calycibus latè insperta, vibus, petalis brevissimis emarginatis, foliis glabris lanceolatis.

Viscago laevis, inaperto flore. *Dill. eltb.* 424. t. 315.
f. 407.

Habitat in Europa australi. ◎

eretica. 20. *SILENE erecta laevis*, calycibus erectis sulcatis, petalis emarginatis. *Hort. upf.* 112. *

Viscago foliis inferioribus bellidis, superioribus tunicæ, calyce strictiore & turgidiore. *Dill. eltb.* 422 t. 314 f. 404. 405.

Habitat in Creta.

pottensis. 21. *SILENE* caule dichotomo paniculato, calycibus striatis, petalis bifidis, foliis linearibns.

Silene caule erecto, pedunculis longissimis erectis unifloris, foliis linear-lanceolatis, *Roy. lugdb.* 447. ?

Habitat in Lusitania. Læfl. ◎

Habitus S. inapert.e, at *Folia angustiora*, & *Calyses longitudinaliter striati*. *Planta* spithamea, brachiatæ, dichotoma. *Folia linearia acuta glabra*. *Pedunculi filiformes angustissimi*, longi, erecti, e dichotomia caulis, uniflori. *Calyses clavati*, longi, purpurascentes, striis alternis albis. *Stamina longiundine fere corollæ*.

Mastipula. 22. *SILENE* petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus sessilibus, foliis glabris.

Silene floribus tristylis, foliis lanceolatis sessilibus, capsulis trilocularibus, floribus teruis. *Sauv. monsp.* 145.

Lychnis sylvestris viscosa rubra altera. *Baub. pin.* 205.

Lychnis sylvestris 3. *Clus. hist.* 1. p. 289.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi.

polyphylla. 23. *SILENE* foliis fasciculatis setaceis: ramorum florentium oppositis. *Roy. lugdb.* 447.

Lychnis sylvestris, plurimis foliolis simul junctis. *Baub. pin.* 205.

Lychnis sylvestris VIII. *Clus. hist.* 1. p. 290.

Habitat in Pannonia, Austria, Bohemia. 2

LYCHNIS.

Armeria. 24. *SILENE* floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superioribus cordatis glabris. *Hort. upf.* 110.

Silene foliis lanceolato-ovatis glabris, floribus terminalibus fasciculatis fastigiatis. *Hort. cliff.* 172. *Roy. lugdb.* 446. *Sauv. monsp.* 153

Lych-

Lychnis viscosa purpurea latifolia laevis. Baub. pin. 205.
Armerius flos quartus. Dod. pemt. 176.
Habitat in Anglia, Gallia. ⊖

25. SILENE floribus erectis, petalis emarginatis, calyci-^{resp. affinis.}
 bus teretibus, foliis lanceolatis. Fl. suec. 367. It.
 Wigob. 144. *

Silene floribus erectis laxe distantibus, caule dichotomo.
Fl. lapp. 183.

Alsinæ alpina glabra. Baub. pin. 251. prodr. 118.

Auricula muris alpina glabra. Baub. hist. 3. p. 360.

- β. Caryophyllus holostenus alpinus gramineus. Baub. pin.
 210. prodr. 104. Burf. XI. 117.

Habitat in montibus aridis Sueciæ, Helvetiæ. ♀

Varietas β. foliis linearibus in umbra nata.

26. SILENE caulis unifloris, pedunculis longitudine *Saxifraga*,
 caulis.

Caryophyllum saxifragus. Baub. pin. 211.

Saxifraga antiquorum quibusdam. Baub. hist. 3. p. 338.

Habitat in montibus cretaceis Galliæ, Italiæ. ♀

Radix lignosa, ramosa. Caules plures, digitales, simplicis-
 simi, glabri. Foia opposita linearia acuta glabra, per
 4 ad 6 oppositiones. Pedunculus terminalis, filiformis
 longitudine caulis; raro pedunculus alter lateralis. Flos
 unicus. Calyx clavatus glaber. Petala bifida limbo ca-
 lyce breviore.

* * *

27. SILENE caule folioso herbaceo, foliis lanceolatis a-^{bupleuroides}
 cutis glabris, calycibus erectis. Hort. cliff. 171. Roy.
lugdb. 446.

Lychnis orientalis, bupleuri folio. Tournef. cor. 2. itin.
 2. p. 139. t. 154.

Habitat in Persia.

STELLARIA.

1. STELLARIA foliis cordatis petiolatis, pedunculis ra-^{nemorium,}
 mosis.

Alsinæ altissima nemorum. Baub. pin. 251.

Alsinæ montana hederacea maxima. Col. ecphr. 1. p. 289.
 t. 290.

Habitat in Europæ nemoribus.

2. STELLARIA foliis ovatis sessilibus, caule dichotomo, ^{dichotoma.}
 floribus solitariis, pedunculis fructiferis reflexis.

D d 3

Habi-

Habitat in Alpibus Helveticis, Sibiricis. ♂

Rami divaricati, dicotomi. Pedunculi fructiferi totire flexi.

- medianæ.* 3. **STELLARIA** foliis lanceolatis ferrulatis, petalis quinquepartitis.

Al sine saxatilis, angusto & oblongo salicis folio, flore albo tenuissime laciniato. *Amm. ruth.* 83. t. 10.

Habitat in Sibiria.

- Heleosæ.* 4. **STELLARIA** foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bifidis.

Al sine foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 172. *Fl. suec.* 371.

Rov. lugdb. 449.

Caryophyllus holosteus arvensis, flore majore. *Baub. p. n.* 210.

Gramen. *Fuchs. hist.* 136.

Habitat in Europæ nemoribus.

- graminea.* 5. **STELLARIA** foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis.

Al sine foliis linearibus. *Fl. lapp.* 189. *Fl. suec.* 372.

Hort. cliff. 172. *Rov. lugdb.* 449.

Caryophyllus arvensis glaber, flore minore. *Baup. p. n.* 210.

Gramen floridum minus, *Tabern. ic.* 232.

6. *Al sine, folio gramineo angustiore, palustris.* *Dill. app.* 69.

7. *Caryophyllus holosteus alpinus angustifolius* *Baup. p. n.* 210. *prodr.* 104. n. 6. *Burs. XI:* 2.

Habitat in siccis juniperetis sepiibus tectis Europæ. 4

- Cerastoides.* 6. **STELLARIA** foliis oblongis, pedunculis subbifloris.

Caryophyllus holosteus montanus angustifolius alter.

Baup. p. n. 210. prodr. 104. Burs. XI: 118.

Habitat in Alpibus Lapponicis, Horta Dei monspeliensi.

- bifloræ.* 7. **STELLARIA** foliis subulatis, scapis subbifloris, petalis emarginatis, germinibus oblongis, calycibus striatis.

Sagina ramis erectis bifloris. *Fl. lapp.* 158 *

Mœhringia scapis bifloris. *Fl. suec.* 316.

Arenaria foliis subulatis, calycibus striatis, germinibus oblongis, floribus corymbolis. *Ansæn. acad.* 1. p. 158. *

Habitat in Alpibus Lapponicis. 2

Planta parva, facile Saginae. Folia radicalia subulata, in acer-

*aceruum congesta. Caules digitales, filiformes, maxima
parte nudi: superne bifidi in 2 pedunculos subjecto pa-
ri foliorum: altero pedunculo in medio folialis duobus.*

ARENARIA.

1. ARENARIA foliis ovatis acutis carnosis. *Fl. suec. p. 375. Fl. lapp. 149. It. atl. 151.*
Alpine littoralis, foliis portulacæ. *Baub. pin. 251.
Løf. pruss. 12. t. 2.*
*Telephium maritimum, portulacæ folio. Buxb. atl. 3.
p. 271.*
Habitat ad littora maris Europæ borealis. ♀
2. ARENARIA foliis ovatis carinatis recurvis quadri-
fariam imbricatis. *Baub. pin. 211. prodr. 125. Burs.
XI. 135.*
Habitat in Pyrenæis ♀
*Herba omnino Gypsophilæ aggregata, sed Pedunculus nu-
niflorus, terminalis.*
3. ARENARIA foliis ovatis obtusis, pedunculo laterali lateriflora,
biflora.
Habitat in Siberia.
*Caulis digitalis filiformis simplicissimus. Folia ovato-
obtusa subpetiolata glabra. Pedunculus axillaris uni-
cus longus bifidus. Corolla calyce longior.*
4. ARENARIA foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. *Fl. suec. 374. * Roy. lugdb. 471.
Hort. cliff. 173. Roy. lugdb. 451.*
Alpine plantaginis folio. *Baub. hist. 3. p. 364.*
Habitat in Europæ sylvis. ♂
5. ARENARIA foliis subovatis acutis sessilibus, corollis *serpyllifolia.*
calyce brevioribus. *Fl. suec. 373. Hort. cliff. 173.
Roy. lugdb. 451.*
Alpine minor multicaulis. *Baub. pin. 251.*
Alpine minor. *Fuchs. hist. 23.*
Habitat in Europæ sylvis glareosis. ♂
6. ARENARIA foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *Fl. suec. 376.*
 - α. Alpine, spargula facie, minor f. *Spergula minor, sub- campestris.
cæruleo flore. Baub. pin. 251. prodr. 119*
*Polygonum foliis gramineis, spargula capitatis. Løf.
pruss. 203. t. 63.*
 - β. *Arenaria foliis lineatibus longitudine intermediorum. marina.
Hort. cliff. 173. Gron. virg. 161. Roy. lugdb. 451.*

Spergula marina nostras. Raj. hist. 1034.

Alsine *spergula* facie media. Baub. pin. 251.

Habitat a in Europæ arenæsis collibus, b. in litoribus marinis. ☩

Stamina in campestri certe 10. sunt; in maritima prope Aboam stamna tantum 5 observavit D. Kalm.

saxatilis.

7. ARENARIA foliis subulatis, caulis paniculatis, calycum foliolis ovatis.

Arenaria foliis subulatis, calycinis laciniis membrana ipsi latiore auctis obtusis. Guett. stamp. 2. p. 281.

Spergula foliis aciformibus dentis, ramis ramosis subnudis. Sauv. monsp. 45.

Alsine *glabra*, tenuissimis foliis, floribus albis. Herm. par. 12. f. 12.

Alsine *saxatilis* & *multiflora*, capillaceo folio. Vaill. paris 7. t. 2. f. 3.

Alsine *saxatilis*, *laricis* folio, minor & minori flore. T. Magn. monsp. 11. t. 11.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Sibiria. ✕

tenuifolia.

8. ARENARIA foliis subulatis, caule paniculato, pedunculis simplicibus, capsulis erectis, petalis calyce brevioribus.

Arenaria foliis subulatis, calycinis laciniis membrana ipsi angustiore auctis acutissimis. Guett. stamp. 2. p. 282.

Alsine *tenuifolia*. Baub. hist. 3. p. 364. Vaill. paris. 7. t. 3. f. 1. Segn. ver. 418. t. 6. f. 2.

Habitat in Helvetia, Gallia, Anglia, Italia. ✕

Habet in flore stamina decem.

laticifolia.

9. ARENARIA foliis setaceis, caule superne nudiusculo, calycibus subhirsutis.

Alsine foliis fasciculatis, petiolis simplicibus, calyce hirsuto. Hall. helv. 388.

Alsine *alpina*, junceo folio. Baub. pin. 251. prodr. 118.

Lychnoides, juniperi folio, pereunis. Vaill. paris. 121.

Habitat in montosis Helvetiæ, Genevæ, Parisiorum, Monspeli. ✕

mucronata.

10. ARENARIA foliis setaceis mucronatis, corollis brevissimis, calycibus inferne mucronatis.

Alsine foliis fasciculatis tenuissimis durisque, petalis integris. Hall. helv. 387. t. 7. f. 2.

Habitat in Helvetia.

11. ARENARIA foliis ovatis ciliatis acutis. *ciliata.*
Alpine, serpilli folio, multicaulis & multiflora. Segn. ver.
421. t. 5. f. 2.
12. Arenaria foliis ovatis nervosis sessilibus imbricatis acutis. *Amoen. acad. 1. p. 162. n. 155.*
12. Alpine foliis lanceolatis, petalis integris calyce majoribus. *Hall. helv. 390. t. 7. f. 3.*
Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenæis. 2.
12. ARENARIA foliis subulatis subtus hispidis.
Habitat Monspelii in monte calcaris.
Habitus spergulae. Caules simplices, pilis rariis adspersi. hispida.
Folia opposita, subulata, plana, subtus pilis rariis hispida. Panicula primum dichotoma, max alternis pedunculis ramosa.

CHERLERIA.

1. CHERLERIA. *Hall. helv. 391. t. 6.*
*Lychnis alpina, muscosis foliis densius stipatis, floribus *Setoides*. parvis, calyce duriore. Pluk. atm. 233. t. 42. f. 8.*
Sedum montanum perpusillum luteum.. Moris. hist. 3.
p. 471. f. 12. t. 6. f. 14.
Sedum montanum perpusillum, luteolis floribus. Park. theatr. 738.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Valesiæ, Gothardo. 2.

GARIDELLA.

- GARIDELLA. *Hort. cliff. 170. Hort. upf. 108. Nigella-
*Roy. lugdñ. 481. strum.**
- Garidella tollis tenuissime divisis. Garid. prov. 203. t. 39.*
Nigellastrum ratis & fœniculaceis foliis. Magn. hort.
143. t. 143.
Nigella cretica, folio fœniculi. C. B. Moris. hist. 3. p.
516. f. 12. t. 18. f. 6.
Habitat in Galloprovincia. ⊙

MALPIGHIA.

1. MALPIGHIA foliis ovatis integerrimis glabris, pe-*glabra.*
dunculis umbellatis. Hort. cliff. 169. Hort. upf. 108.
Roy. lugdñ. 459.
Cerasus jamaicensis, fructu tetrapyroeno. Comm. hort. 1.
p. 145. t. 75.

Cerasus americana, myrti conjugatis foliis, fructu acerbo tetrapyro. *Pluk. atm.* 94. t. 157. f. 7.

Arbor baccifera, folio subrotundo, fructu cerasino siccato rubro polypyreno: officulis canaliculatis. *Sloan. jam.* 172. *bist.* 2. p. 106. t. 207. f. 2. *Raj. dendr.* 74.

Habitat in Jamaica, Brasilia, Surinamo, Curaçao. ♂

urens.

2. **MALPIGHIA** foliis oblongo-ovatis: setis decumbentibus rigidis, pedunculis unifloris aggregatis.
Malpighia angustifolia & latifolia, fructu subtus spinoso. *Plum. gen.* 46.

Mespilus americana, folio lato subtus spinoso, fructu rubro. *Tournef. inst.* 642.

Arbor baccifera, folio oblongo subtilissimis spinis subtus obsito, fructu cerasino sulcato polypyreno. officulis canaliculatis. *Sloan. jam.* 172. *bist.* 2. p. 106. t. 207. f. 3. *Raj. dendr.* 74.

Habitat in America calidiore. ♂

eracifolia.

3. **MALPIGHIA** foliis ovatis integerrimis subtus tomentosis, racemis terminalibus.

Malpighia latifolia, cortice sangvineo. *Barr. æquin.* 72.?

Tiliæ affinis laurifolia, arbuti floribus albis racemosis odoratis, fructu pentagono. *Sloan. jam.* 136. *bist.* 2. p. 20. t. 163. f. 1.?

Habitat in America calidiore. ♂

Arbor. Foliis ovatis palmaribus crassis subpetiolatis integerrimis, supra pubescentibus, subtus tomentosis. Racemi terminales longi tomentosi.

verbascifolia

4. **MALPIGHIA** foliis lanceolato-ovatis tomentosis integerrimis, racemis terminalibus.

Malpighia humilis, verbasci folio & facie, caule crassissimo. *Barr. æquin.* 71.

Habitat in America calidiore. ♂

Folia lanceolato-ovata, in petiolos desinentia, pedalia, villosa, subtus densissimo tomento vestita. Racemi terminales, longi, villosi.

aquifolia.

5. **MALPIGHIA** foliis lanceolatis dentato-spinosis subtus hispidis.

Malpighia angustis & acuminatis aquifolii foliis. *Plum. gen.* 46.

Habitat in America calidiore. ♂

escrigera.

6. **MALPIGHIA** foliis subovatis dentato-spinosis.

Mal-

Malpighia humilis, ilicis cocciglandiferae foliis. *Plum.*
gen. 46.

Habitat in America calidiore. ♂

BANISTERIA.

1. BANISTERIA foliis alternis lanceolatis serratis. *lupuloides.*
Paullinia foliis simplicibus lanceolatis serratis. *Hort. upf.*
97.
Lupulus sylvestris americana clavicalis donata. *Pluk.*
alm. 229. t. 201. f. 4. & t. 163. f. 3.
Habitat in Barbados. ♂
2. BANISTERIA foliis sinuato-angulosis. *angulosa.*
Acer scandens, folio anguloso. *Plum. spec. 18.*
Clematis angulosa folio aceris fructu. *Plum. amer. 77.*
t. 92. Raj. suppl. 328.
Habitat in America calidiore. ♂
3. BANISTERIA foliis ovatis, spicis lateralibus, semi-purpurea
nibus erectis.
Acer scandens, pseudoacaciae folio, flore purpurascen-
te. *Plum. spec. 18.*
Habitat in America meridionali. ♂
4. BANISTERIA foliis ovato-oblongis acuminatis, ra-benghalensis.
cenis lateralibus, seminibus patentibus. *Fl. zeyl. 176.**
Acer scandens, foliis citri, flore cæruleo spicato. *Plum.*
spec. 18.
Acer scandens, foliis laurinis *Sloan. jam. 137. bisl. 2.*
p. 26. Raj. dendr. 94.
Acer beughalensis, laurinis foliis, fructu tergeminno. *Pluk.*
alm. 7. t. 3. f. 1.
Habitat in Indiis ♂
5. BANISTERIA foliis ovatis, ramis dichotomis. *dichotoma.*
Banisteria foliis ovatis, ramis dichotomis, seminibus ex-
trorsum tenuioribus, introrsum lacinulam emittenti-
bus. *Hort. cliff. 169.**
Habitat in America calidiore. ♂
6. BANISTERIA foliis ovatis, ramis brachiatis, semini-fulgen-
bus extrorsum tenuioribus.
Banisteria foliis ovatis, ramis ramosis, seminibus extror-
sum tenuioribus, introrsum lacinulam emittentibus.
*Hort. cliff. 169.**
Acer scandens, convolvuli folio, flore ex aureo cinereo.
Plum. spec. 18.

Acer

Acer scandens minus, apocyni facie, folio subrotundo.
Sloan. jam. 138. bist. 2. p. 27. t. 162. f. 2. Raj. dendr. 94.

Triopteris americana scandens, fructu fulgente majore aureo. *Pluk. mant. 185.*

Habitat in America. 5

brachiata. 7. *BANISTERIA* foliis subovatis, ramis brachiatis, seminibus introrsum angustioribus.

Banisteria foliis subovatis, ramis ramosis, seminibus introrsum tenuioribus nullam lacinulam emittentibus
*Hort. cliff. 169. **

Habitat in America. 5

TRIOPTERIS.

jamaicensis. 1. *TRIOPTERIS.* *Hort. cliff. 169. **

Triopteris jamaicensis, angusto salicis folio, fructu minore fusco. *Pluk. alm. 377.*

Aceri vel Paliuro affinis, angusto oblongo ligustrifolio, flore tetrapetalo herbaceo. *Sloan. jam. 138. bist. 2. p. 27. t. 162. f. 3. Raj. dendr. 94.*

Habitat in America calidiore. 5

PENTAGYNIA.

AVERRHOA.

Bilimbi. 1. *AVERRHOA* caudice nudo fructificante, pomis oblongis obtusangulis. *Fl. zeyl. 177. **

Blinbingum teres. *Rumpf. amb. 1. p. 118. t. 16.*

Bilimbi. *Rheed. mal. 3. p. 55. t. 45. 46.*

Habitat in India. 5

Carambola. 2. *AVERRHOA* axillis foliorum fructificantibus, pomis oblongis acutangulis. *Fl. zeyl. 178. **

Mala goënja, fructu octangulari pomi vulgaris magnitudine. *Baub. pin. 433.*

Prunum stellatum. *Rumpf. amb. 1. p. 115. t. 35.*

Tamara Tonga s. Carambolas. *Rheed. mal. 3. p. 51. t. 43. 44.*

Habitat in India. 5

acida. 3. *AVERRHOA* ramis nudis fructificantibus, pomis subrotundis. *Fl. zeyl. 179.*

Neli-pouli. *Rheed. mal. 3. p. 57. t. 47. 48. Raj. bist. 1450.*

Habitat in India. 5

CO-

COTYLEDON

1. COTYLEDON foliis subrotundis planis integeri- *orbiculata*
mis. *Hort. cliff.* 276, *Roy. lugdb.* 454.
Cotyledon africanum frutescens incanum, orbicularis fo-
liis. *Herm. lugdb.* 349. t. 551. *Meris. hist.* 3. p.
474. f. 12. t. 7. f. 39.
Cotyledon africana frutescens, folio longo & atigusto,
fiore flavescente. *Comm. rar.* 23. t. 23.
Habitat ad Cap. b. Spei. 5
2. COTYLEDON foliis semiglobosif. *Hort. cliff.* 176. *hemispheri- ca..*
Roy. lugdb. 454.
Cotyledon capensis, folio semiglobato. *Dill. eltb.* 112.
t. 95. f. 111.
Habitat in Aethiopis. 5
3. COTYLEDON foliis ovalibus crenatis, caule spi- *serrata*.
cato.
Cotyledon foliis radicalibus lanceolatis crenatis: cauli-
nis subulatis. *Hort. cliff.* 497. *Roy. lugdb.* 454.
Cotyledon cretica, folio oblongo umbriato. *Dill. eltb.*
113. t. 95. f. 112.
Habitat in Creta, Sibiria.
4. COTYLEDON foliis oblongis spinoso-mucronatis, *spinoso*,
caule spicato.
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.*
Habitus speciei 3, Folia integra spina setacea termina- ta, flores quinquepartiti.
5. COTYLEDON foliis cucullatis ferrato-dentatis al- *umbilicus* ♀
ternis, caule ramoso, floribus erectis.
Cotyledon foliis peltatis. *Vir. cliff.* 39. *Roy. lugdb.* 454.
Cotyledon flore luteo, radice repente. *Dod. mem.* 265. *repens*,
t. 73.
Cotyledon radice tuberosa longa repente. *Meris. prael.*
257. *Raj. hist.* 1878.
Cotyledon luteum umbilicatum spicatum, radice repen-
te majus. *Meris. hist.* 3. p. 471.
Umbilicus repens. *Cam. epit.* 858.
- β. Cotyledon vera, radice tuberosa. *Banh. hist.* 3. p. 683. *tuberosa*.
Cotyledon major. *Banh. pin.* 285. *Raj. hist.* 1878.
Cotyledon umbilicus veneris. *Clas. hist.* 2. p. 63.
Sedum luteum murale spicatum, folio umbilicato ro-
tundo. *Meris. hist.* 3. p. 470. f. 12. t. 10. f. 4.
Habitat in Lusitania. 5

- laciniatum.* 6. **COTYLEDON** foliis laciniatis, floribus quadrifidis.
Hort. cliff. 175. *Roy. lugdb.* 454.
Cotyledon afra, folio crasso lato laciniatum, flosculo aureo. *Boerb. lugdb.* 1. p. 288. t. 288.
Telephium africanum, angustiori folio, flore aurantia. *Pluk. atm.* 362. t. 228. f. 3.
Habitat in Egypto. 5

SEDUM.* *Planifolia.*

- vorticillatum.* 1. **SEDUM** foliis quaternis. *Aman. acad.* 2. p. 252. t. 4. f. 14. *
Sedum aparines facie, tauromenitanum. *Raj. extr.* 233. *Moris. hist.* 3. p. 473.
Habitat in Europa maxime australi, & Sibiria. 5
- Telephium.* 2. **SEDUM** foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto.
Sedum foliis planiusculis patentibus serratis, corymbo terminali. *Hort. cliff.* 176. *H. succ.* 386. *Mat. med.* 217. *Roy. lugdb.* 456.
Telephium vulgare. *Baub. pin.* 287
album, *Telephium album.* *Fuchs. hist.* 800.
purpureum 3. *Telephium purpureum majus.* *Baub. pin.* 287.
γ. *Telephium purpureum minus.* *Baub. pin.* 287. *prodr.* 133.
maximum. 4. *Telephium latifolium peregrinum.* *Baub. pin* 287.
ε. *Sedum* foliis ovalibus serratis, umbellis in alis foliorum. *Hall. helv.* 35.
Telephium hispanicum 1. *Cluf. hist.* 2. p. 66.
Telephium repens, folio deciduo. *Baub. pin.* 287.
Anacampseros maxima. *Baub. hist.* 3. p. 682.
Habitat in Europæ siccissimis. 2
- Anacampseros* 3. **SEDUM** foliis cuneiformibus integerrimis, caulis decumbentibus, floribus corymbosis.
Sedum foliis spathulatis indivisis, umbella terminali. *Savv. monsp.* 77.
Telephium VI. *Cepaea planctii.* *Cluf. hist.* 2. p. 67.
Anacampseros minor, retundiore folio, sempervirens. *Baub. hist.* 3. p. 682.
Habitat in - - - - - 2
- Aizoon* 4. **SEDUM** foliis lanceolatis serratis planis, caule erecto, cyma sessili terminali.
Sedum foliis planis serratis, corymbo folioso. *Hort. upf.* 216. *

Anacampseros flore flavo. *Amm. ruth.* 96. t. II.
Habitat in Siberia. 5

5. *SEDUM* foliis cuneiformibus concavis subdentatis *hybridum*.
 aggregatis, ramis repentibus, coma terminali. *Hort.*
upf. 116.

Sedum minus repens, chamaedryos foliis, e singulis fo-
 liofum aliis radices agens. *Amm. ruth.* 93.
Habitat in Tataria ad radices montium uralensium. 5

6. *SEDUM* foliis planiusculis angulatis, floribus latera *stellatum*.
 libus sessilibus solitariis. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.*
456.

Sedum echinatum vel *stellatum*, flore albo. *Baub. hist.*
3. p. 680.

Cotyledon stellata. *Baub. pin.* 295.

Habitat in Italia, Gallia, Helvetia.

7 *SEDUM* foliis planis, caule ramoso, floribus panicu- *Cepaea*.
 latis. *Hort. cliff.* 176. * *Roy. lugdb.* 456. *Sauv.*
monsp. 76.

Sedum annuum album, oblongo portulacæ minoris fo-
 lii. *Morif. hist.* 3. p. 473. f. 12. t. 7. f. 37.

Cepaea. *Baub. pin.* 288. *Clus. hist.* 2. p. 68.

Habitat Monspelii, Genevæ. ◎

* *Teretifolia*

8. *SEDUM* foliis oppositis ovatis obtusis carnosis, caule *dasyphyllum*
 infirme, floribus sparsis,

Sedum foliis cordato-ovatis compressis sèpius oppositis,
 floribus sparsis. *Sauv. monsp.* 8.

Sedum foliis semiglobosis subovatis sessilibus quadrifa-
 riam imbricatis. *Wachend. ultr.* 391.

Sedum parvum, folio circinato, flore albo. *Baub. hist.*
3. p. 691.

Sedum minus, folio circinato. *Baub. pin.* 283. *Morif.*
hist. 3. p. 473 f. 12. t. 7. f. 35.

Aizoon dasyphyllum. *Dalech. hist.* 1133.

Habitat in Helvetia, Lusitanie, Hispania. ◎

9. *SEDUM* foliis subulatis confertis batì membranacea *repens*.
 solutis, floribus cymosis. *Hort. cliff.* 176. *It. gal.*
178. Pl. suec. 388. *Roy. lugdb.* 466. *Gort. galr.* 268.

Sedum rupestre *repens*, foliis compressis. *Dill. elth.* 343.
t. 256. f. 333.

10. *Sedum minus* luteum, folio acuto. *Baub. pin.* 283.
Z. Se-

γ. Sedum minus luteum, ramulis reflexis. Baub. pin. 283.
Habitat ad radices montium Europæ. 2

album. 10. SEDUM foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. Hort. cliff. 177. Fl. suec. 387. Roy. lugd. 457. Hall. helv. 398.
 Sedum minus teretifolium album. Baub. pin. 283.
 Vermicularis f. Illecebria major. Lob. hist. 205.
Habitat in Europæ petris.

rubens. 11. SEDUM foliis subcylindricis obtusis alternis, cyma semper erecta.
 Sedum arvense, flore rubente. Baub. pin. 283. prodr. 132.
Habitat in Galilia, Italia.

acre. 12. SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis eretiusculis alternis, cyma trifida. Hort. cliff. 177. Fl. suec. 389. Mat. med. 218. Roy. lugd. 456.
 Semper vivum minus vermiculatum acre. Baub. pin. 283.
 Illecebria f. Semper vivum tertium. Dod. pent. 129.
Habitat in Europæ campis siccissimis sterilissimis. 2

sexangulare. 13. SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis eretiusculis sexfariam imbricatis. Fl. suec. 390.
 Semper vivum minus vermiculatum insipidum. Baub. pin. 284?
 Semper vivum minimum. Cam. epit. 856.
Habitat in Europæ borealis rampis apricis siccis. 2

Differat a precedenti, cui simillimum, Foliis sexfariam oblique imbricatis, Ramis nunquam copiosis, ut cespitem constituant, Floribus in singulo ramo cymæ raro ultra tres.

annuum. 14. SEDUM caule erecto solitario annuo, foliis ovatis sessilibus gibbis alternis, cyma recurva. Fl. suec. 391.
 Sedum minimum non acre, flore albo. Raj. angl. 3. p. 270. t. 12. f. 2. figura tenuis.
Habitat in Europa boreali. ○

villosum. 15. SEDUM caule erecto, foliis planiusculis, pedunculisque subpilosis.
 Sedum palustre subhirsutum purpureum. Baub. pin. 283.
 Sedum minus 111. f. palustre. Clus. hist. 2. p. 59.
Habitat in pratis paludosis Germaniæ, Angliæ, Galliæ.

PENTHORUM:

fedoides. 1. PENTHORUM. Gron. virg. 51.* Act. zps. 1744. p. 12. t. 2.
Habitat in Virginia. 2. ○

OXA-

OXALIS.

* *Scapo radicali.*

1. OXALIS scapo unifloro, foliis ternatis, radice squa- *Acetosella*,
moso-articulata. *Hort. cliff.* 175. *Fl. suec.* 385. *Roy.*
Iugdb. 458. *Mat. med.* 216.
Oxalis foliis ternatis, scapo unifloro. *Fl. lapp.* 194.
Trifolium acetosum vulgare. *Bauh. pin.* 330.
Trifolium acetosum. *Dod. pempt.* 578.
2. OXALIS scapo unifloro, foliis ternatis, radice bul- *purplea*.
bosca. *Hort. cliff.* 175. *Roy. Iugdb.* 458.
Oxalidi affinis planta bulbosa africana, flore purpleo
magno. *Breyn. cent.* 102. t. 46.
Oxys bulbosa africana rotundifolia, caulis & floribus
purpleis amplis. *Comm. hort.* 1. p. 41. t. 21.
Oxys bulbosa trifolia hirsuta, flore albo. *Burm. afr.* 67.
t. 27. f. 3.
Habitat in Aethiopia. 2
3. OXALIS scapo unifloro, foliis ternatis semibifidis: *longiflora*,
lobis lanceolatis.
Habitat in Virginia.
Caulis nudus, simplex, squamis aliquot adspersus, e radice
per terram exit terminatus Umbella ex foliis novem
& flore unico. Folia petiolata, ternata: foliolis sessili-
bus plus quam semibifidis: lobis lanceolatis. Pedun-
culus uniflorus, in medio stipularum pari notatus.
Flos unicus, longus.
4. OXALIS scapo unifloro foliis ternatis bipartitis. *flava*,
Oxalis bulbosa, angustis digitatis foliis, flore solitario
luteo. *Burm. afr.* 68. t. 27. f. 4.
Oxys africana bulbosa, floribus amplis luteis, foliis mi-
nimis hirsutis. *Raj. suppl.* 549.
Oxalis africana bulbosa, foliis simpliciter decaphyllis,
flore flavo. *Burm. afr.* 69. t. 27. f. 5.
Oxalis bulbosa, simplici caule ad summum folioso, flo-
re luteo. *Burm. afr.* 81. t. 30. f. 1.
Habitat in Aethiopia. 2
5. OXALIS pedunculis unifloris, caule dichotomo. *incarnata*,
Oxalis caule bulbifero. *Hort. cliff.* 175. *Roy. Iugdb.*
458.

*Oxys bulbosa æthiopica minor, folio cordato, flore ex
albido purpurascente. Comm. hort. I. p. 43. t. 22.
Habitat in Æthiopia. 2*

violacea. 6. OXALIS scapo umbellifero, foliis ternatis ob-
cordatis.

*Oxalis caule aphylo; flore purpureo, radice tuberosa
rotunda. Gron. virg. 161.*

*Oxys purpurea virginiana, radice liliæ more nucleata.
Pluk. aln. 274. t. 102. f. 4.*

Habitat in Virginia, Canada. 2

Pes caprae. 7. OXALIS scapo umbellifero, foliis ternatis bipartitis.

*Oxalis bulbosa pentaphylla & hexaphylla, floribus m-
gnis luteis & copiosis. Burm. afr. 80. t. 29.*

Habitat in Æthiopia. 2

sensitiva. 8. OXALIS scapo umbellifero, foliis pinnatis. Fl. zeyl
180.

*Oxyoides malabarica sensitiva, caule viridi glabro, flore
luteo majore. Garc. act. angl. 1730. p. 379. t. 2.*

*Herba Mimosæ malabariensis. Zan. hist. 199. t. 61.
Herba viva. Clus. exot. 290.*

*Herba viva foliis polypodii. Bauh. pin. 259.
Todda vaddi. Rheed. mal. 9. p. 33. t. 19.*

Habitat in India.

* * *Foliis caulinis alternis.*

versicolor. 9. OXALIS caule simplici, pedunculo unifloro abbre-
viato, foliis filiformibus subramosis

*Oxalis bulbosa trifolia, foliis linearibus obtusis, flore
externe rubro, intus albo. Burm. afr. 65. t. 27. f. 1.*

*Oxys africana, foliis tenuissimis in summitate caulis.
Raj. suppl. 598.*

β . *Oxys bulbosa africana angustifolia, flore rubro obso-
leto ampio. Raj. suppl. 548.*

*Oxys africana, foliis tenuissimis, flore ampio versicolo-
re. Pluk. amalb. 169. t. 434. f. 6.*

*Oxalis bulbosa angustifolia, caule folioso, flore rubro.
Burm. afr. 66. t. 27. f. 2.*

Habitat in Æthiopia. 2

biria 10. OXALIS caule ramoso, pedunculis unifloris, foliis
sessilibus lanceolatis.

*Oxalis caule ramoso, foliis linear-lanceolatis sessilibus,
floribus lateralibus solitariis. Roy. Ingdb. 532.*

*Oxalis radice longa fibrosa, caulis rainosis, foliis ter-
nis angustis, florum petiolis longissimis. Burm. afr.*

71. t. 28. f. 2.

Oxys

Oxys africana, hirsutis latioribus foliis, flore magno purpureo. *Pluk. amalh.* 164.

β. *Oxalis bulbosa*, foliis angustis ternis hirtis, flore purpureo. *Burm. afr.* 70. t. 28. f. 1.

Oxys africana bulbosa, flore purpureo, caule folioso. *Raj. suppl.* 599.

Oxys africana bulbosa, dorychnii monspeliensium parvis foliis, floribus purpureis amplis. *Pluk. amalh.* 164. t. 434. f. 7.

Habitat in Aethiopia.

11. *OXALIS* caule ramoso diffuso, pedunculis umbelli-*corniculata*. feris. *Hort. cliff.* 175. *Hort. upf.* 116. *Roy. lugdb.* 458. *Sauv. monsp.* 173. *Gort. gelr.* 91.

Oxys flavo flore. *Clus. hist.* 2. p. 249.

Trifolium acetosum corniculatum. *Bauh. pin.* 330. luteum minus repens. etiam procumbens. *Moris. hist.* 2. p. 183. f. 2. t. 17. f. 2.

Habitat in Italia, Sicilia. ☺

Conser. *Oxalis lutea annua*, floribus dentatis. *Few. per.* 3. p. 49. t. 24.

12. *OXALIS* caule ramoso erecto, pedunculis umbelli-*strida*. feris. *Gron. virg.* 161.

Oxys americana erectior. *Tournef. inst.* 80.

Trifolium acetosum corniculatum luteum majus rectum. indicum f. *virgineum*. *Moris. hist.* 2. p. 184. f. 2. t. 17. f. 3.

Habitat in Virginia.

13. *OXALIS* caule fruticoso, foliis ternatis: intermedio *frutescens*. petiolato.

Oxys lutea frutescens, trifolii bituminosi facie. *Plum.* spec. 2.

Habitat in America meridionali. ☮

AGROSTEMMA.

1. *AGROSTEMMA* hirsuta, calycibus corollam æquans. *Gibago.* ribus, petalis integris nudis.

Agrostemma. *Hort. cliff.* 175. *Fl. suec.* 383. *Roy. lugdb.* 449.

Lychnis segetum major. *Bauh. pin.* 204.

Lolium Fuchs. *hist.* 127.

Habitat inter Europæ segetes. ☺

- Calci rosa.* 2. AGROSTEMMA glabra, foliis linear-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis. *Hort. upf.* 115. *
Lychnis segetum, Nigellastrum minus glabrum dicta, flore eleganter rubello. *Moris. hist.* 2. p. 543. f. 5.
t. 22. f. 32.
Lychnis foliis glabris, calyce duriore. *Bocc. sic.* 27.
PseudoMelanthium glabrum sicutum. *Raj. hist.* 999.
Habitat in Sicilia. ☺
- Coronaria.* 3. AGROSTEMMA tomentosa, foliis ovato-lacinatis, petalis integris coronatis. *Hort. upf.* 115.
Coronaria. *Hort. cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 449.
Lychnis coronaria dioscoridis sativa. *Baub. pin.* 203.
Lychnis. *Cam. epit.* 569.
Habitat in Italia. ♂
- Flos jovis.* 4. AGROSTEMMA tomentosa, petalis emarginatis.
Lychnis coronaria sylvestris. *Baub. pin.* 204. *Moris. hist.* 2. p. 540. f. 5. t. 36. f. 2.
Lychnis umbellifera montana helvetica. *Zan. hist.* 128.
t. 51. Raj. hist. 993.
Habitat in Helvetia.

LYCHNIS.

- chalcedonica* 1. LYCHNIS floribus fasciculatis fastigiatis. *Hort. cliff.* 174. *Hort. upf.* 115. *Roy. lugdb.* 449.
Lychnis hirsuta, flore coccineo, major. *Baub. pin.* 203.
Flos constantinopolitanus. *Dod. pentpt.* 178.
Habitat in Tataria. ♀
- Flos cuculi*. 2. LYCHNIS petalis quadrifidis, fructu subrotundo. *Hort. cliff.* 174. *Fl. suec.* 304. *Roy. lugdb.* 139.
Caryophyllus pratensis, flore laciniato simplici f. *Flos cuculi*. *Baub. pin.* 210.
β. *Caryophyllus pratensis*, flore pleno. *Baub. pin.* 210.
Odontites plinii. *Clus. hist.* 1. p. 292. 293.
Habitat in partis Europæ humidiusculis. ♀
- Viscaria.* 3. LYCHNIS petalis integris.
Silene floribus pentagynis, capsulis quinquelocularibus. *Hort. cliff.* 172. *Fl. succ.* 364. *Roy. lugdb.* 445
Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia. *Baub. pin.* 205.
Lychnis sylvestris VI. *Clus. hist.* 1. p. 289.
Habitat in Europæ septentrionalis pratis siccis. ♀
- spinosa.* 4. LYCHNIS petalis bifidis corymbosis.
Silene floribus corymbosis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus. *Roy. lugdb.* 447.

*Silene lapponica alpina, facie viscaria. Fl. lapp. 185. **
Silene floribus in capitulum congestis. Hall. helv. 376.

t. 7.

*Habitat in Alpibus Lapponicis, Heiveticis, Sibiricis,
 Pyrenaicis. 2 3*

5. LYCHNIS petalis bifidis, caule dichotomo, folijs sub-sibirica-
 hirtis.

Habitat in Siberia. Gmelin. 2

*Statura Silenes rufopetbris, sed Radix perennis, Folia mi-
 nus glabra, & Styli 5 distinguunt plantam.*

6. LYCHNIS floribus dioicis. *Hort. cliff. 171. Fl. suec. dioica.*
 361. *Roy. lugdb. 448.*

*Cucubalus caule composito, calycibus oblongo-ovatis.
 Fl. lapp. 182.*

*Lychnis sylvestris s. aquatica purpurea simplex. Bauh.
 pin. 204.*

*Lychnis sylvestris noctiflora alba simplex, calyce amplis-
 simo. Till. pis. 105. t. 41. f. 1.*

Melandrium pliniij genuinum. Clus. hist. 1. p. 294. mas.

β. Cucubalus floribus herinaphroditis pentagynis, captulis
 unilocularibus. *Hort. cliff. 170.*

Lychnis sylvestris alba simplex. Bauh. pin. 204.

γ. Lychnis alba inmultiplex. *Bauh. pin. 204.*

Habitat in Europæ frigide pratis succulentis. 2

7. LYCHNIS calyce inflato, corolla calyce breviore, cau- apetata-
 le subunifloro.

*Cucubalus caule simplicissimo unifloro, petalis calyce
 brevioribus. Fl. suec. 363.*

*Cucubalus caule simplicissimo unifloro, corolla inclusa.
 Fl. lapp. 181. t. 12. f. 1.*

Habitat in Alpibus Lapponicis, Sibiricis.

In Siberia planta caule multiflora lecta est.

CERASTIUM.

* *Capsulis oblongis.*

1. CERASTIUM folijs connatis. *Hort. cliff. 173. Hort. persoliatum.*
 npf. 115. *Roy. lugdb. 450.*

*Myosotis orientalis persoliata, lychnidis folio. Tournef.
 cor. 18. Dill. elth. 295. t. 217. f. 284.*

Habitat in Græcia. ①

2. CERASTIUM erectum villoso-viscosum. *Hort. cliff. viscosum.*
 174. *Fl. suec. 379. Roy. lugdb. 450.*

Cerastium corolla calyci æquali. Fl. lapp. 193.
Myosotis hirsuta altera viscosa. Vaill. paris. 142.
t. 30. f. 1.
Alpine hirsuta altera viscosa. Bauh. pin. 257.
Habitat in Europæ pratis macilentis. ⊙

- semidecanum.* 3. *CERASTIUM floribus pentandris, petalis emarginatis. Hort. cliff. 173. Fl. suec. 382. It. xl. 17. Roy. lugdb. 450. Gron. virg. 51. Gort. gelr. 90.*
Cerastium corolla calyce breviore. Fl. lapp. 193.
Cerastium hirsutum minus, parvo flore. Raj. angl. 3. p. 348. t. 15. f. 1.
Myosotis arvensis hirsuta minor. Vaill. paris. 142. t. 30. f. 2.
Habitat in campis apricis sterilißimis Europæ borealis. ⊙
Filamenta huic 5 sterilia, 5 antherifera.
- pentandrum.* 4. *CERASTIUM floribus pentandris, petalis integris. Læfl. descr. 26.*
Habitat in Hispania.
Planta minima, similis C. semideandro, a quo differt: colore viridi nec incano. Staminibus 5 fertilibus; nec 5 aliis anthera destitutis. Petalis calyce longe brevioribus lanceolatis acutis; nec acute emarginatis.
- arvense.* 5. *CERASTIUM foliis linear-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce majoribus. Fl. suec. 381.*
Cerastium foliis calycibusque hirsutis. Hort. cliff. 174. Roy. lugdb. 450.
Myosotis arvensis hirsuta, flore majore. Vaill. paris. 141. t. 30. f. 4.
Caryophyllus arvensis hirsutus, flore majore. Bauh. pin. 210,
Habitat in Scania & australiori Europa. 2
- dichotomum* 6. *CERASTIUM foliis lanceolatis, caule dichotomo ramosissimo, capsulis erectis, Roy. lugdb. 450.*
Lychnis segetum minor. Bauh. pin. 204.
Alpine corniculata. Clus. hist. 2. p. 184.
Habitat inter segetes Hispaniæ. ⊙
- alpinum.* 7. *CERASTIUM foliis ovato-lanceolatis, caule divise, capsulis oblongis.*
Cerastium foliis lanceolatis, corollis calyce majoribus. Fl. suec. 380.
Cerastium foliis lanceolato-ovatis, caule subunifloro. Roy. lugdb. 451.

Cerastium corolla calyce majore. Fl. lapp. 192.
Alsine myosotis facie, lychnis alpina, flore amplo niveo,
repens. Raj. angl. 3. p. 349. t. 15. f. 2.
Habitat in Alpibus Europæ.

* *Capulis subrotundis,*

8. CERASTIUM foliis lanceolatis, pedunculis ramosis, *repens.*
capsulis subrotundis.

Cerastium caule perenni procumbente, foliis lanceolatis
tomentosis. Roy. lugdb. 450.

Cerastium perenne procumbens. Hort. cliff. 174.
Myosotis arvensis, polygoni folio. Vaill. parif. 141. t.
30. f. 5.

Lychnis incana repens. Bauh. pin. 206.
Habitat in Gallia, Italia. ♀

9. CERASTIUM foliis linearibus acuminatis glabris, *pe- strictum.*
dunculis unifloris subtomentosis, capsulis globosis.

Myosotis caule hirsuto, foliis perangustis glabris, flore
calycem excedente. Hall. helv. 384. t. 5. f. 1.

Alsine apina subhirsuta, linariæ folio. Scheuch. alp. 2.
p. 130.

Caryophyllus holosteus alpinus, foliis strictissimis gla-
bris acutis, flore magno. Burs. XI. 119.

Habitat in Alpibus Austriacis, Helveticis.

10. CERASTIUM caule perenni procumbente, foliis *suffruticoso-*
linearis-lanceolatis subhirsutis.

Myosotis tenuissimo folio rigido. Tournef. inst. 205.

Habitat in Europa australi. ♂

11. CERASTIUM foliis lanceolatis scabris, petalis *cre- maximam.*
natis, capsulis globosis.

Habitat in Sibiria. D. Gmelin.

12. CERASTIUM foliis cordatis sessilibus, floribus *fo- aquaticum.*
litariis, fructibus pendulis.

Alsine major. Bauh. pin. 250.

Alsine maxima solanifolia. Mentz. pug. 2. t. 1. f. 3.

Habitat ad littora lacuum Europæ. ♀

13. CERASTIUM foliis ovatis subtomentosis, ramis *u- latifolium.*
nifloris, capsulis globosis.

Caryophyllus holosteus alpinus latifolius. Bauh. pin.
211. prod. 104.

Habitat in Alpibus Helvetiæ. ♀

- tomentosum.* 14. CERESTIUM foliis oblongis tomentosis, pedunculis ramosis, capsulis globosis.
Cerastrum foliis lanceolato-linearibus subhirsutis, corolla calycem superante. *Sauv. monsp.* 142.
Caryophyllus holosteus tomentosus latifolius. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104.
β. *Caryophyllus holosteus* tomentosus angustifolius. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104.
Habitat in Granada. 2

SPERGULA.

- eruensis.* 1. SPERGULA foliis verticillatis, floribus decaudris.
Hort. cliff. 173. *Fl. suec.* 377. *Roy. lugdb.* 451.
Spergula fructu pendulo. *Fl. lapp.* 190.
Spergula. *Dod. pempt.* 527.
Al sine Spergula dicta major. *Bauh. pin.* 251.
Habitat in Europæ agris. ⊖
- pentandra.* 2. SPERGULA foliis verticillatis, floribus pentandris.
Lœfl. desir. 23.
Spergula foliis filiformibus verticillatis rariss., seminibus nigris. *Sauv. monsp.* 167.
Al sine spergula facie minima, seminibus emarginatis.
Tournef. infi. 244. *Vaill. parif.* 8.
Al sine spergula facie minima. *Magn. monsp.* 14.
Arenaria teretifolia verna, flore albo, semine limbo foliaceo cincto. *Rupp. jen.* 101.
Spergula annua, semine foliaceo nigro circulo membranaceo albo cincto - - - *Moris. hist.* 2. p. 551.
blæf. 28. *Dill. giss.* 46. *E. N. C. cent.* 5. p. 275.
t. 4.
Habitat in Germania, Gallia, Anglia, Hispania. ⊖
- nodosa.* 3. SPERGULA foliis oppositis subulatis laevibus, caulis simplicibus:
Spergula foliis oppositis, pedunculis simplicibus. *Hort. cliff.* 173. *Fl. suec.* 378. *Roy. lugdb.* 451.
Al sine nodosa germanica. *Bauh. pin.* 251.
Al sine palustris, ericæ folio, polygonoides, articulis creibrioribus, flore albo pulchello. *Pluk. alm.* 23. t. 7.f.
Polygonum, foliis gramineis, alterum. *Lœf. pruss.* 204.
t. 64.
Habitat in Europæ frigioris campis subhumidis. 2

4. SPERGULA foliis oppositis subulatis ciliatis fasciculatis.
larieina.

Habitat in Sibiria. D. Gmelin.

5. SPERGULA foliis oppositis linearibus lœvibus, pedunculis solitariis longissimis, caule repente.

Alpine tenuifolia, pedunculis florum longissimis. Vail,
paris. 8. Sauv. monsp. 142.

Habitat in Gallia, Sibiria. D. Gmelin.

DECAGYNIA.

NEURADA.

1. NEURADA. *Hort. upf. 117.*

Chamædrifolia tomentosa mascareniensis. Pluk. alm. 97. *procumbens.*

t. 275. f. 6.

Habitat in Ægypto, Arabia. ☽

PHYTOLACCA.

1. PHYTOLACCA foliis integerrimis. *Hort. cliff. 177. americana.*

Hort. upf. 117. Gron. virg. 161. Roy. lug. db. 222.

Phytolacca vulgaris. Dill. elth. 318. t. 239. f. 309.

Solanum racemosum americanum. Pluk. alm. 353. t.
225. f. 3.

2. Phytolacca mexicana, baccis sessilibus. *Dill. elth. 218*

t. 239. f. 308.

Habitat in Virginia, Mexico. ♀

2. PHYTOLACCA foliis serratis. †

Nalagu. Rheed. mal. 2. p. 43. t. 26. Raj. hist. 1635? afnitica.

Habitat in Malabar.

Classis XI.

DODECANDRIA

Stamina inter XI & XIX inclusive

MONOGYNIA.

ASARUM.

- europaeum.* 1. ASARUM foliis reniformibus obtusis binis.
Asarum foliis subcordatis petiolatis. *Hort. cliff.* 178. *Fl. suec.* 392. *Mat. med.* 219. *Guett. stamp.* 198. *Roy. lugdb.* 207.
Asarum. *Baub. pin.* 197. *Cam. epit.* 19.
Habitat in Europæ nemoribus. 2
- canadense.* 2. ASARUM foliis reniformibus mucronatis.
Asarum foliis subcordatis petiolatis. *Gron. virg.* 52.
Asarum canadense, mucronato folio. *Moris. hist.* 3. p. 511. f. 13. t. 7. f. 4.
Asarum canadense. *Corn. canad.* 24. t. 25.
Habitat in Canada. 2
An varietas precedentis; sic suadent Folia bina; dissident alia.
- virginicum.* 3. ASARUM foliis cordatis obtusis glabris petiolatis.
Gron. virg. 162,
Asarum virginianum, pistoletiae foliis subrotundis, cynamomis more maculatis. *Pluk. alm.* 53. t. 78. f. 2.
Moris. hist. 3. p. 511. f. 17. t. 7. f. 3.
Habitat in Virginia, terra Mariana, Carolina. 2
- Hypocistis.* 4. ASARUM foliis sessilibus imbricatis, floribus quadrifidis. *Mat. med.* 220.
Asarum aphyllum squamosum. *Sauv. monsp.* 4.
Hypocistis. *Baub. pin.* 465. *Cam. epit.* 96. 97. *Clus. hist.* 1. p. 68. 79.
Habitat in Hispania, Lusitania parasitica cisti

GETHYLLIS.

- africana.* 1. GETHYLLIS. *Hort. cliff.* 493. *
Habitat in Africa.
Statura Croci.

RHIZOPHORA.

1. RHIZOPHORA foliis ovato-oblongis obtusiusculis integerrimis, calycibus sessilibus, fructibus cylindraceo-subulatis. *Fl. zeyl.* 181. * *conjugata.*
Habitat in India. ♀
2. RHIZOPHORA foliis ovato-lanceolatis integerrimis, *gymnorhiza.* radice terræ superimposita.
Rhizophora calycum laciniis persistentibus patentibus verius fructum incurvatis. *Wackend. ult.* 89.
Candel. Rheed. mal. 6. p. 57. t. 31. 32. *Raj. hist.* 1769.
Habitat in Indiæ ripis salinis. ♀
3. RHIZOPHORA foliis obtusis, pedunculis bigeminatis *Candel.* folio longioribus, fructibus subulatis.
Tsierou-Kandel. Rheed. mal. 6. p. 63. t. 35. *Raj. hist.* 1770.
Habitat in Indiæ salinis. ♀
4. RHIZOPHORA foliis acutis, fructibus subulato-clavatis.
Rhizophora segmentis calycum persistentibus reflexis, fructu acuminato. *Wack. ultr.* 90.
Magles aquatica, foliis subrotundis & punctatis. *Plum. gen.* 13.
Mangle pyri foliis, cum siliquis longis, sicui indicæ affinis. *Bauh. hist.* 1. p. 415. *Sloan. jam.* 155. *hist.* 2. p. 63.
Peckandel. *Rheed. mal.* 66. p. 91. t. 34. *Raj. hist.* 1770.
Habitat in paludibus Caribæorum, Malabariæ. ♀
5. RHIZOPHORA fructibus cylindricis obtusis. *cylindrica.*
Kari-Kandel. *Rheed. mal.* 6. p. 59. t. 33. *Raj. hist.* 1770.
Habitat in uliginosis Malabariæ. ♀

SAMYDA.

1. SAMYDA. *Amœn. acad.* 1. p. 401. * *Guidonia.*
Guidonia, nucis juglandis folio, major. *Plum. gen.* 24.
 β Guidonia, nucis juglandis folio, minor. *Plum. gen.* 24.
Habitat in America calidore. ♀

GARCINIA.

1. GARCINIA. *Hort. cliff.* 182. *Mangostina*
Man-

Mangostans. *Garc. act. angl.* 431. *t. 1. Bont. jav.* 115.
 Mangostana. *Rumpf. amb.* 1. *p. 132. t. 43.*
Laurifolia javanensis. Baub. pin. 461. *Raj. hist.* 1662.
Habitat in Java. 5

STYRAX.

- officinale.* 1. STYRAX. *Hort. cliff.* 187. *Hort. upf.* 122. *Mat. med.* 227. *Roy. lugdb.* 265. *Sanv. monsp.* 306.
Styrax folio mali cotonci. Baub. pin. 452.
Styrax. Cam. epit. 38.
Habitat in Syria, Judæa, Italia. 5

CRATEVA.

- Tapia.* 1. CRATEVA inermis. *Fl. zeyl.* 211.
Crateva. Hort. cliff. 484.
*Apioscorodon f. Arbor americana triphyllos, allii odo-
 re, poma ferens. Pluk. alm.* 34. *t. 137. f. 7.*
Niirvala. Rheed. mal. 3. *p. 49. t. 22.*
Habitat in India utraque. 5
- Marmelos.* 2. CRATEVA spinosa. *Fl. zeyl.* 212.
*Cucurbitifera trifolia spinosa medica, fructu pulpa cy-
 donii æmula. Pluk. alm.* 125. *t. 170. f. 5.*
Cydonia exotica. Baub. pin. 435.
Covalam. Rheed. mal. 3. *p. 37. t. 37.*
Habitat in India. 5

TRIUMFETTA.

- Lappula.* 1. TRIUMFETTA. *Hort. cliff.* 210.* *Hort. upf.* 148.
Roy. lugdb. 476.
*Lappula bermundensis althæoides spicata, fructu orbic-
 ulari majore. Pluk. alm.* 206. *t. 245. f. 7.*
*Agrimonia lappacea inodora, folio subrotundo dentato.
 Sloan. jam.* 92. *hist.* 1. *p. 211. Raj. suppl.* 247.
Habitat in Jamaica, Brasilia, Bermudis. 5

PEGANUM.

- Harmala.* 1. PEGANUM foliis multifidis. *Hort. upf.* 144.
Peganum. Hort. cliff. 206. *Hort. upf.* 144. *Roy. lugdb.*
 461.
Ruta sylvestris, flore magno albo. Baub. pin. 336,
Harmala. Dod. pent. 121.

Habi-

Habitat in arena Madritii, Alexandriæ, Cappadociæ, Galatiæ. ♀

2. PEGANUM foliis indivisis.

*Harmala montana daurica perennis multicaulis, polyga- daurica.
læ folio, flore albo. Amm. ruth. 91.*

3. Harmala montana, polygalæ foliis, floribus luteis. *Amm.
ruth. 92.*

Habitat in Sibiria. ♀

PORTULACA.

1. PORTULACA foliis cuneiformibus, floribus sessili- *oleracea,*
*bus. Roy. lugdb. 473. Gron. virg. 59. Hort. upf.
146. Mat. med. 260. Dalib. parif. 158. Hall. helv.
392. Savv. monsp. 168.*

*Portulaca foliis cuneiformibus verticillatis sessilibus, flo-
ribus sessilibus. Hort. cliff. 207.*

Portulaca angustifolia sylvestris. Baub. pin. 288.

β. Portulaca latifolia sativa. *Baub. pin. 288.*

Portulaca domestica. Lob. ic. 388.

*Habitat in Europa australi, India, Ins. Ascensionis,
America, ⊖*

2. PORTULACA foliis subulatis alternis: axillis pilosis, *pilosa.*
floribus sessilibus.

*Portulaca foliis linearibus acutis, caule procumbente pilo-
so. Roy. lugdb. 473.*

*Portulaca curassavica, angusto longo lucidoque folio,
procumbens. Comm. hort. 1. p. 2. t. 5.*

*Portulaca corassavica lanuginosa procumbens. Herm.
par. 215. t. 215-*

*Portulaca lanuginosa procumbens, vermiculata foliis,
americana. Pluk. alm. 304. t. 247. f. 7. 5.*

β. Portulaca corassavica lanuginosa, psyllii folio, erectior
& elatior, more dilutius rubente. *Herm. par. 214. t.
214.*

*Portulaca curassavica lanuginosa, kali folio, erectior &
elatior. Pluk. alm. 303. t. 105. f. 4.*

Habitat in America meridionali. ⊖

*Folia alterna, sed terminalia s. floralia octo in orbem di-
gesta. Flores sessiles, terminales, calyce bifido, Stami-
nibus quindecim, Stylo quinquefido.*

3. PORTULACA foliis ovatis gibbis, pedunculo multi- *Anacampso-
floro, caule fruticoso.* *res.*

An-

Anacampseros foliis ovatis convexis acutiusculis. *Hort.*
nps. 146.

Anacampseros foliis acuminatis. *Hort. cliff.* 207. *Roy.*
lugdb. 412.

Telephastrum folio globoso. *Dill. elth.* 375. t. 281.f.
363.

Portulaca africana sempervirens, flore rubicundo.
Comm. hort. 2. p. 177. t. 89. *Raj. suppl.* 507.

Habitat ad Cap. b. spei. 5

*Axillæ foliorum pilosæ sunt, & Folia succulenta conjungunt hanc cum Portulacis, quamvis stamina plurima
& Capsula apice dehiscens.*

Portulaca- 4. *PÓRTULACA* foliis lanceolatis convexis, pedunculis unifloris.

Portulaca curassavica, angusto longo lucidoque folio.
Iherm. par. 212. t. 212.

Habitat in Curassao.

Calyx quinquefidus, Capsula horizontaliter dissiliens.

LYTHRUM.

Salicaria. 1. *LYTHRUM* foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris.

Lythrum foliis oppositis. *Hort. cliff.* 178. *Fl. suec.*
393. *Roy. lugdb.* 458. *Guett. stamp.* 2. p. 122.

Lythrum floribus verticillatis. *Fl. lapp.* 197.

Lysimachia spicata purpurea. *Baub. pin.* 246.

Lysimachia purpurea communis major. *Clus. hist.* 2.
p. 51.

β. *Blattaria* tubra spicata major, folio subrotundo. *Moris.*
hist. 2. p. 490. f. 5. t. 10. f. 11.

γ. *Lysimachia* trifolia spicata purpurea. *Bocc. mus.* 167.

δ. *Lysimachia* quadrifolia purpurea, mollioribus & longioribus foliis. *Bocc. mus.* 167.

Habitat in Europa ad ripas aquarum. 2

verticilla- 2. *LYTHRUM* foliis oppositis subtus tomentosis subpetiolatis, floribus verticillatis lateralibus.

Lythrum foliis oppositis, floribus verticillatis. *Gron.*
virg. 52.

Habitat in Virginia.

petiolatum. 3. *LYTHRUM* foliis oppositis linearibus petiolatis, floridus dodecandris.

Lythrum foliis petiolatis. *Gron. virg.* 52.

Habitat in Virginia.

4. LYTHRUM foliis oppositis linearibus, floribus op- *linear.*
positis hexandris.

Lythrum foliis linearibus, floribus hexandris solitariis.

Gron. virg. 162.

Habitat in Virginia.

Caulis filiformis erectus angulatus Foliis oppositis line-
aribus, terminatus spica majore & duabus lateralibus
minoribus compositis ex Floribus oppositis remotis, sub
singulis folio. Facies sequentis.

5. LYTHRUM foliis alternis linearibus, floribus hexan- *Hyssopifolia,*
dris. Hort. upf. 118.

Lythrum foliis alternis. Hort. cliff. 178. Sauv. monsp.
53. Roy. lugd. 458. Gort. gelr. 271.

Salicaria hyssopifolia latiore. Hall. jen. 147. t. 2. f. 3.
Hyssopifolia. Bauh. pin. 218.

B. Lysimachia rubra non siliquosa. Bauh. pin. 246

γ. Lysimachia linifolia purpureo-cærulea Bauh. pin. 246.
Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Angliæ, Galliæ in-
undatis. ⊖

6. LYTHRUM foliis alternis linearibus, floribus tetra- *hyssopifolia.*
petalis.

Lythrum foliis linearibus. Sauv. monsp. 49.

Salicaria minima tenuifolia. Tournef. inst. 254.

Hyssopifolia minor f. potius thymifolia maritima. Bauh.
hist. 3. p. 792.

Polygonum aquaticum minus. Barr. ic. 773. f. 2.

Habitat in Italî & G. Narbonensis uliginosis. ⊖

Petala 4, stamina 2, calyx 4dentatus. Folia lineari-
lanceolata, alterna, ima opposita. Flores solitarii axil-
lares. Calyx stipulis 2 lateralibus fulcitus. D. Sau-
vages.

7. LYTHRUM foliis alternis lanceolatis, panicula vir- *virgatum*
gata, floribus dodecandris.

Salicaria orientalis, salicis folio acutissimo & glabro.
Tournef. cor. 18.

Salicaria glabra ramosissima, longissimis & angustissimis
foliis. Ann. ruth. 89.

Salicaria glabra, longioribus & angustioribus foliis
Ann. ruth. 88.

Habitat in Sibiria, Tataria,

Caulis paniculatus Ramis alternis longis. Flores 2 f. 3
pedicellati ex singula ala alterna racemi.

DIGYNIA.

HELIOCARPUS.

americanus 1. HELIOCARPUS. *Hort. cliff.* 211. * *t.* 16.
Habitat in America meridionali. 5

AGRIMONIA.

Eupatoria. 1. AGRIMONIA foliis caulinis pinnatis, fructibus hispidis. *Hort. cliff.* 179. *Fl. suec.* 394. *Hort. upsc.* 118. *Mat. med.* 221. *Gron. virg.* 53. *Roy. lugdb.* 249. *Hall. helv.* 407. *Guett. stamp.* 1. *p.* 293. *Dalib. paris.* 139.

Eupatorium veteranum s. *Agrimonia*. *Baub. pin.* 321.
Eupatorium. *Fuchs. hist.* 244. *Cam. epit.* 756.

β. *Agrimonia medio modo odorata*. *Moris. blies.*

γ. *Eupatorium odoratum*. *Baub. pin.* 321.

Agrimonia orientalis humilis, radice crassissima repente.
Tournef. cor. 21.

Habitat in Europæ pratis apricis argillaceis. 2

Agrimoniæ 2. AGRIMONIA foliis caulinis ternatis, fructibus glabris. *Hort. cliff.* 179. *Roy. lugdb.* 241.

Agrimoniæ similis *Baub. pin.* 321.

Agrimonioides. *Col. ecphr.* 1. *p.* 145. t. 144. *Baerb.*
lugdb. 1. *p.* 179.

Habitat in Italie nemoribus umbrosis humentibus.

TRIGYNIA.

RESEDA.

Luteola. 1. RESEDA foliis lanceolatis integris, calycibus quadrifidis.

Reseda foliis simplicibus lanceolatis integris. *Hort. cliff.* 212. *Vir. cliff.* 49. *Fl. suec.* 439. *Roy. lugdb.* 483.
Dalib. paris. 160.

Luteola herba salicis folio. *Baub. pin.* 100.

Lutum herba. *Dod. perempt.* 80.

Habitat in Europa ad vias & pagos. ②

canescens. 2. RESEDA foliis subulatis sparsis. *Sauv. monsp.* 48.

Reseda foliis simplicibus oblongis integris. *Guett. fl. aser.*
1. *p.* 225.

Reseda alba minor. *Baub. pin.* 100.

Sesamoides salmanticum parvum L. Clas. hist. I. p.
296. t. 275.

Habitat in Salmantica.

3. RESEDA foliis linearibus basi dentatis, floribus tetragynis.

Reseda linariae foliis. Baub. pin. 100. prodr. 41. Burf. IV. 88.

Reseda linariae folio, glaucum pyrenaicum, flore flamineo. Moris. hist. 3. p. 601. f. 15. t. 1. f. 4.

Reseda linariae folio, pyrenaica, glauco folio. Pluk. atm. 317. t. 107. f. 2. Raj. suppl. 511.

Luteola pumila pyrenaica, linariae folio. Tournef. inst. 424.

Habitat in Pyrenæis.

4. RESEDA foliis linearibus obtusis, floribus pentagynis. *purpurea*

α. Reseda alba minor L. Baub. pin. 100. Raj. hist. 1054.

Sesamoides salmanticum parvum L. Clas. hist. I. p. 296.

Sesamoides foliis crassis, floribus ex herbaceo purpara-

scentibus. Tournef. inst. 424.

Habitat in collibus Salmanticis. Monspelii.

5. RESEDA foliis lanceolatis integris, fructibus stellatis. *Sesameoides*

Sesamoides fructu stellato. Tournef. inst. 424.

Habitat Monspelii in Horto Dei.

6. RESEDA foliis pinnatis, floribus tetragynis. *Hort. upf. alba.*

149.

Reseda foliis pinnatis integerimis. Hort. cliff. 212

Reseda maxima. Baub. pin. 100. Lob. hist. 110.

β. Reseda minor alba, foliis dentatis. Barr. rar. 78. t.

588.

Habitat Monspelii. ♂

7. RESEDA foliis omnibus trifidis, inferioribus pinna-

tis. Hort. cliff. 213. Hort. upf. 149. Roy. lugdb.

483. Hall. helv. 215. Dalib. paris. 159. Gort. gelr. 310.

Reseda vulgaris. Baub. pin. 100. Raj. hist. 1053.

Reseda lutea. Baub. hist. 3. p. 467.

β. Reseda gallica crispa. Bocc. sic. 77. t. 41. f. 3.

Reseda inassiliensis, foliis latioribus crispis. Pluk. atm.

317. t. 55. f. 4.

Habitat in Europæ australioris montibus cretacis. ♂

8. RESEDA foliis integris trilobisque, calycibus maxi-

mis. Hort. cliff. 412. Dalib. paris. 159.

F f

Rese-

- Reseda floribus trigynis, calycibus maximis hexaphyliis
Hort. upf. 150.
 Reseda minor vulgaris. *Tournef. inst.* 423.
 Resedæ affinis Phyteuma. *Baub. pin.* 100. *prodr.* 42.
t. 42.
 Erucago apula trifida & quinquefolia. *Col. ecphr.* 267.
t. 269.
 β. Reseda minor vulgaris, folio minus inciso. *Tournef.*
inst. 423.
 γ. Reseda minor vulgaris, foliis integris. *Tournef. inst.* 423.
 Phyteuma. *Baub. hist.* 3. *p.* 386. *fig.*
Habitat in Gallia, Italia. ◎

EUPHORBIA.

* *Fruticosæ aculeatæ.*

- antiquorum.* 1. EUPHORBIA aculeata subnuda triangularis articula-
 ta: ramis patentibus. *Hort. cliff.* 196. * *Hort. upf.*
 138. *Fl. zeyl.* 199. *Mat. med.* 154. *Roy. lugdb.*
 194. *Diff. euph.* 1. *
 Euphorbium antiquorum verum. *Comm. hort.* 1 *p.* 23.
t. 12.
 Schadidacalli. *Rheed. mal.* 2. *p.* 81. *t.* 42.
 β. Tithymalus aizoides triangularis & quadrangularis ar-
 ticulosus & spinosus, ramis compresſis. *Comm. præl*
21. t. 55. *f.* 5.
Habitat in India. Ȣ
- canariensis* 2. EUPHORBIA aculeata nuda subquinquangularis, a-
 culeis geminatis. *Hort. cliff.* 196. * *Hort. upf.* 138.
Roy. lugdb. 194. *Diff. euph.* 2. *
 Tithymalus aizoides fruticosus canariensis aphyllus qua-
 drangularis & quinquangularis, spinis geminis adun-
 cis atronitentibus armatus. *Comm. hort.* 2. *p.* 207
t. 104.
 Tithymalus aizoides lactifluus s. Euphorbia canariensis
 quadrilatera & quinquelatera, cerei effigie. *Pluk. alm.*
370. t. 320. *f.* 2.
Habitat in Canariis. Ȣ
- heptagona-* 3. EUPHORBIA aculeata nuda septemangularis: spinis
 solitariis subulatis floriferis. *Hort. cliff.* 196. * *Roy.*
lugdb. 194. *Diff. euph.* 6. *
 Euphorbium heptagonum, spinis longissimis in apice fru-
 giferis. *Bærb. lugdb.* 1 *p.* 258. *t.* 258.
Habitat - - - Ȣ

4. EUPHORBIA aculeata nuda: angulis tuberosis spinis interstitiis. *Diff. euph.* 5. *mammillaris*
Euphorbium polygonum, aculeis longioribus ex tubercularum internodiis prodecentibus. *Isn. act.* 1720. p. 386.
Tithymalus aizoides africanus, validissimis spinis ex tuberculorum internodiis provenientibus. *Comm. prael.* 59. t. 9.
Habitat in Aethiopia. ♂
Differt ab Heptagona angulis duplicatis torulosis; spinæ solitariae inter singula tubercula longitudinaliter digesta. Flores non vidi; an ex spinarum apice, ut heptagonum?
5. EUPHORBIA aculeata nuda multangularis, spinis foliariis subulatis. *Roy. lugdb.* 195. *Diff. euph.* 4. *cereiformis.*
Euphorbium polygonum spinosum, cerei effigie. *Isnard.* *act.* 1720. p. 385.
Euphorbium cerei effigie, caulis gracilioribus. *Børh.* *lugdb.* 1. p. 258.
Euphorbium aphyllum-angulosum, florum coma densissima. *Burm. afr.* 19. t. 9. f. 3.
Tithymalus africanus spinosus, cerei effigie. *Moris. hist.* 3. p. 245. *Pluk. alm.* 370. t. 231. f. 1.
Habitat in Aethiopia. ♂
6. EUPHORBIA aculeata nuda multangularis: aculeis officinarum geminatis. *Hort. cliff.* 196. * *Hort. upf.* 138. *Roy.* *lugdb.* 195. *Diff. euph.* 3. *
Euphorbium polygonum spinosum, cerei effigie. *Isnard.* *act.* 1720. p. 500. t. 10.
Euphorbium cerei effigie, caulis crassioribus spinis validioribus armatum. *Comm. hort.* 1. p. 21. t. II.
Seb. thes. 1. p. 29. t. 19. f. 2.
Euphorbium. *Bæh. piñ.* 387.
Habitat in Aethiopia & Africa calidore. ♂
7. EUPHORBIA aculeata seminuda: angulis oblique tuberculatis. *Hort. cliff.* 196. * *Hort. upf.* 139. *Fl. zeyl.* 200. *Roy. lugdb.* 194. *Diff. euph.* 7. * *neriifolia.*
Euphorbium afrum spinosum, foliis latioribus non spinosis. *Seb. thes.* 1. p. 18. t. 9. f. 1.
Tithymalus aizoides arborescens spinosus, caudice angulari, nerii folio. *Comm. præl.* 22. 56. t. 6.
Tithymalus indicus spinosus, nerii folio. *Comm. hort.* 1. p. 25. t. 13.

Ela Calli. Rheed. mal. 2. p. 83. t. 43.

Habitat in India. ♂

* *Fruticosæ inermes.*

(*Vel caulis nec dichotomus, nec umbelliferus* 13. 15.)

- Caput medu-* **8. EUPHORBIA** inermis imbricata tuberculis foliolis
se lineari instructis. *Hort. cliff.* 197. *Hort. upf.* 139.
Roy. lugdb. 195. *Diff. euph.* 8.
Planta lactaria africana. *Comm. hort.* 1. p. 33. t. 17.
Tithymalus aizoides africanus, simplici squamato caule,
chamænerii folio. *Comm. præl.* 58. t. 8. ♂ p. 23.
57. t. 7.
- B. Euphorbium** anacantum squamosum, lobis florum tridentatis. *Isnard. act.* 1720. p. 502. t. 11.
- y. Euphorbium** erectum aphyllum, ramis rotundis, tuberculis tetragonis. *Burm. afr.* 16. t. 7. f. 2.
- g. Euphorbium** humile procumbens, ramis simplicibus copiosis, caule crassissimo tuberoso. *Burm. afr.* 20. t. 10. f. 1.
- e. Euphorbium** procumbens, ramis plurimis simplicibus squamolisis, foliis deciduis. *Burm. afr.* 17. t. 8.
- ζ Euphorbium** procumbens, ramis geminatis, caule glabro oblongo cinereo. *Burm. afr.* 18. t. 9. f. 1.
Habitat in Æthiopia. ♂
Distinctissima planta petalis palmatis. ♂
- viminalis.* **9. EUPHORBIA** inermis nuda fruticosa filiformis vobubilis: cicatricibus oppositis. *Hort. cliff.* 197. *
Hort. upf. 140. *Diff. euph.* 9. *
Felfel Tavil. *Alp. egypt.* 100. t. 190. *Dill. eltb.* 368.
Habitat in Africæ maritimis. ♂
- mauritanica* **10. EUPHORBIA** inermis semiuncta fruticosa filiformis flaccida, foliis alternis. *Hort. cliff.* 197. *Hort. upf.* 140. *Roy. lugdb.* 195. *Diff. euph.* 10. *
Tithymalus aphyllus mauritanicus. *Dill. eltb.* 384. t. 289. & 373.
Habitat in Africæ maritimis. ♂
- Tirucalli.* **11. EUPHORBIA** inermis subnuda fruticosa filiformis erecta, ramis patulis determinate confertis. *Hort. cliff.* 197. *Hort. upf.* 139. *Fl. zeyl.* 197. *Roy. lugdb.* 195. *Diff. euph.* 11. *
Tithymalus indicus frutescens. *Comm. hort.* 1. p. 27.
t. 14.
Tithymalus arborescens, caule aphylo. *Pluk. phyt.* 319.
f. 9.
TiruCalli. *Rheed. mal.* 8. p. - - - t. 44.
Habitat in India. ♂

12. EUPHORBIA inermis fruticosa, foliis didiche *Tithymaloi-*
alternis ovatis. *Hort. cliff.* 198. * *Roy. lugdb.* 195. des.
Diss. euph. 12. *
- Tithymalus curassavicus myrtifolius*, flore coccineo mel- *myrtifolia*.
lituo. *Herm. par.* 234. t. 234.
- Tithymalus curassavicus myrtifolius*, flore papilionaceo
coccineo parvo *Comm. hort.* 1. p. 31. t. 16. *Pluk.*
alm. 369. t. 230. f. 2.
- β. *Tithymaloides laurocerasi* folio non serrato. *Dill. eth.* *padifolia*.
383. t. 288. f. 372.
Habitat in Curassao, at B. forte in India. 5
13. EUPHORBIA inermis, foliis serratis petiolatis dif- *heterophylla*.
formitus ovatis lanceolatis panduriformibus. *Diss. euph.*
13.
- Tithymalus curassavicus*, salicis & atriplicis foliis va-
riis, caulis viridianibus. *Pluk. alm.* 369. t. 12. f. 6.
- Tithymalus curassavicus*, salicis & atriplicis foliis hirsutis,
caulis subrubentibus. *Aiorij. hist.* 3. p. 336.
Habitat in America calidore.
14. EUPHORBIA foliis oppositis subcordatis petiolatis *cotinifolia*.
emarginatis integerriinis, caule fruticoso. *Diss. euph.*
15.
- Euphorbia ineris*, caule fruticoso, foliis oppositis sub-
cordatis emarginatis, petiolis folio longioribus. *Hort.*
cliff. 198. *Roy. lugdb.* 196.
- Tithymalus curassavicus*, folio cotini triphyllus, peta-
lis florum serratis. *Pluk. alm.* 369. t. 230. f. 3.
- Tithymalus arboreus curassavicus*, cotini folio. *Seb. thes.*
1. p. 75. t. 46. f. 4.
- Tithymalus arboreus americanus*, cotini folio. *Comm.*
hort. 1. p. 29. t. 15.
Habitat in Curacao. 5
15. EUPHORBIA inermis herbacea ramosa, foliis sub- *ocymoidea*.
cordatis integerimis petiolo brevioribus, floribus so-
litariis. *Diss. euph.* 14.
- Euphorbia inermis*, foliis subcordatis obtusis integerimis
petiolatis, caule ramoso erecto. *Roy. lugdb.* 199.
Habitat in Campechia. *Houst.*
- * *Dickotomae umbella bifida aut nulla*.
16. EUPHORBIA dichotoma, foliis serrulatis ovatis ob- *origanoides*.
tusis trinerviis, panicula terminali, caulis simplici-
bus. *Diss. euph.* 17. *

Habitat in Insula Ascensionis. ♀

Planta refert ita Origanum, ut primo intuitu nequeat non pro eo agnosci.

hypocrateifolia 17. EUPHORBIA dichotoma, foliis serratis ovali-oblongis glabris, corymbis terminalibus, ramis divaricatis. *Diff. euph.* 16. *

Euphorbia inermis, foliis ovalibus oppositis hinc serratis uniformibus, ramis alternis, caule erectiusculo. *Hort. cliff.* 198. *Hort. upf.* 143. * *Roy. Jngdb.* 196. *Gron. virg.* 58.

Tithymalus erectus, floribus rarioribus, foliis oblongis glabris integris. *Burm. zeyl.* 224. t. 105. f. 2.

Tithymalus erectus acris, parietariæ foliis glabris, floribus ad caulum nodos conglomeratis. *Sloan. jam.* 82. *bif.* 1. p. 197. t. 126.

Habitat in India. ◎

hirta. 18. EUPHORBIA dichotoma, foliis ferrulatis ovatis acuminate, pedunculis capitatis axillaribus, caulinis pilosis. *Diff. euph.* 18. *

Euphorbia inermis, foliis oppositis ovalibus serratis uniformibus, pedunculis capitatis axillaribus. *Fl. zeyl.* 197. *

Tithymalus botryoides zeylanicus, cauliculis villosis. *Burm. zeyl.* 223. t. 104.

Habitat in India. ◎

pilosifera. 19. EUPHORBIA dichotoma, foliis serratis ovali-oblongis, pedunculis bicapitatis axillaribus, caule erecto. *Diff. euph.* 19.

Tithymalus botryoides erectus, florum capitulis conjugatis & longiori pediculo insidentibus. *Burm. zeyl.* 224. t. 105. f. 1. *Pet. gaz.* t. 87. f. 14.

Habitat in India. ◎

thymifolia. 20. EUPHORBIA dichotoma, foliis serratis ovali-oblongis, capitulis axillaribus conglomeratis subsessilibus, caulinis procumbentibus. *Diff. euph.* 20.

Tithymalus foliis oppositis oblique cordatis obtusis serratis, pedunculis multifloris. *Fl. zeyl.* 198.

Tithymalus indicus annuus dulcis, floribus albis, caulinis viridantibus & rubentibus. *Pluk. aim.* 372. 1. 113. f. 2.

β. Tithymalus humilis ramosissimus hirsutus, foliis thymi serratis. *Burm. zeyl.* 225. t. 105. f. 3.

Habitat in India. ◎

21. EU-

21. EUPHORBIA dichotoma, foliis serratis oblongis *maculata*, pilosis, floribus axillaribus solitariis, ramis patulis.

Tithymalus f. Chamæsyce altera virginiana, foliis crenatis & macula fusca eleganter notatis. *Pluk. alm.* 372. t. 65. f. 8.

Habitat in America septentrionali. ◎

Caules dichotomi: Ramis altervis, patentibus, supra purpurascens. Folia ovali-oblonga, trinervia, subpilosæ, serrata, altero latere maxima parte integerrima, tenera adhuc planta notata macula fusca. Flores axillares, solitarii, parvi, calyce rufo.

22. EUPHORBIA dichotoma, foliis crenulatis subrotundis, floribus solitariis axillaribus, caulis procumbentibus. *Chamæsyce.* *Diff. eupb.* 22. *

Euphorbia inermis, foliis oblique cordatis ferrulatis uniformibus, ramis alternis, floribus solitariis. *Hort. cliff.* 198. * *Roy. lugdb.* 196. *Gmel. fib.* 2. p. 237.

Chamæsyce. *Baub. pin.* 293. *Clus. hist.* 2. p. 187.

Habitat in Europa australi, Sibiria. ◎

23. EUPHORBIA dichotoma, foliis integerrimis semi-cordatis, floribus solitariis axillaribus, caulis procumbentibus. *Peplis.* *Diff. eupb.* 21.

Euphorbia foliis subrotundis obtusis, floribus foliariis in foliorum alis. *Guett. stamp.* 2. p. 420.

Peplis maritima, folio obtuso. *Baub. pin.* 293.

Peplis. *Clus. hist.* 2. p. 187. *Cam. epit.* 970.

Peplion. *Dalech. hist.* 970.

Habitat in Narbonæ, Hispaniæ maritimis. ◎

24. EUPHORBIA foliis oppositis integerrimis lancolatipolygonifolia tis obtusis, floribus solitariis axillaribus, caulis procumbentibus. *Diff. eupb.* 23. *

Euphorbia procumbens, ramulis alternis, foliis lanceolato-linearibus, floribus solitariis. *Gron. virg.* 58.

Euphorbia minima ramosissima angustifolia. *Raj. suppl.*

431.

Habitat in Canada, Virginia. ◎

25. EUPHORBIA dichotoma, foliis integerrimis lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris folia æquantiibus, caule erecto. *Diff. eupb.* 24.

Tithymalus flore exiguo viridi apicibus flavis, antequam folia emittit florens. *Gron. virg.* 58.

Habitat in Virginia, Canada. 2

- portulacei-* 26. **EUPHORBIA** dichotoma, foliis integerrimis ovalibus retusis, pedunculis axillaribus unifloris folia æquantibus, caule erecto. *Diff. euph.* 25. *
Tithymalus perennis, *portulacea* folio. *Few. peruv.* 707.
t. 2?
- Habitat in Philadelphia. Kalm. 2*
- * *Umbella trifida.*
- Peplax.* 27. **EUPHORBIA** umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis
Diff. euph. 27. *
Euphorbia foliis obversis ovatis integerrimis, umbella universali trifida triphylla, partialibus dichotomis diphyllis. *Hort. cliff.* 199. *Fl. suec.* 437. * *Roy. Ingdb.* 197. *Dalib. paris.* 156.
Peplax f. Esula rotunda. *Baub. pin.* 292.
Peplax. Fuchs. hist. 603. *Dod. pempt.* 375.
Habitat in Europa cultis oleraceis. ☺
- falcata.* 28. **EUPHORBIA** umbella trifida: dichotoma, involucellis cordato-subfalcatis acutis, foliis lanceolatis obtusiusculis. *Diff. euph.* 28.
Habitat in Europa australi.
- exigua.* 29. **EUPHORBIA** umbella trifida: dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Diff. euph.* 29. *
Euphorbia inermis, foliis alternis linearibus acutis, umbella universali trifida, partialibus dichotomis diphyllis. *Hort. cliff.* 199. *Hort. atp.* 143. * *Roy. Ingdb.* 197. *Dalib. paris.* 157. *Gort. gelr.* 304.
Tithymalus f. Esula exigua. *Baub. pin.* 291.
Esula minima tragi. *Dalech. hist.* 1656.
- retusa.* β. *Tithymalus f. Esula exigua*, foliis obtusis. *Baub. pin.* 291 *prod.* 132.
γ. *Tithymalus exiguus saxatilis.* *Baub. pin.* 291. *prod.* 132. *Magn. monsp.* 259. *t. 258. Burf. XVI.* 55.
Habitat in Lusatia, Gallia, Helyvetia, Hispania inter segetes; b. Monspelii in saxosis. γ. Paduae & Massiliæ. ☺
- tuberosa.* 30. **EUPHORBIA** umbella trifida, involucro tetraphyllo, caule nudo, foliis oblongis emarginatis. *Diff. euph.* 26.
Euphorbia inermis, foliis oblongis obtusis emarginatis. *Roy. Ingdb.* 199.
Tithymalus humilis, folio lapathi. *Braub. cent.* 2. *p. 27. t. 23.*

Tithy-

Tithymalus tuberosus acaulos, foliis oblongis cucullatis & planis. *Burm. afr. 9. t. 4.*

Tithymalus africanus humilis, foliis latioribus oblongis, tuberosa radice. *Raj. suppl. 933.*

Habitat in Aegypto & Ethiopia. ♀

* *Umbella quadrifida.*

31. EUPHORBIA umbella quadrifida: dichotoma, foliis oppositis integerrimis. *Diff. euph. 30.* *

Euphorbia inermis, foliis oppositis lanceolatis integerrimis, umbella universali quadrifida tetraphylla, ulterioribus dichotomis. *Hort. cliff. 140. Mat. med. 256.*

Euphorbia inermis, foliis oppositis lanceolatis, umbella universali trifida polyphylla, partialibus triphyllis, reliquis diphyllis. *Hort. cliff. 198. Roy. lugdb. 196. Dalib. paris. 155.*

Lathyrus major. *Bauh. pin. 293.*

Lathyrus. *Cam. epit. 968. Fucks. hist. 454.*

Habitat in Gallia, Italia ad agrorum margines. ♂

* *Umbella quinquefida.*

32. EUPHORBIA umbella subquinquefida simplici, in-*spinosa.* volucellis ovatis: primariis triphyllis, foliis oblongis integerrimis, caule fruticoso. *Diff. euph. 33.* *

Euphorbia inermis fruticosa, foliis lanceolatis integerrimis, floribus solitariis terminalibus, involucris triphyllis. *Hort. cliff. 201. Roy. lugdb. 196.*

Euphorbia inermis fruticosa, ramis siccis pungens, foliis ad umbellas ternis saepius ovatis, floribus solitariis.

Sauv. monsp. 51.

Tithymalus maritimus spinosus. *Bauh. pin. 291.*

Habitat in Creta. ♀

33. EUPHORBIA umbella quinquesida: bifida, involu-*Apies.* cellis obcordatis. *Diff. euph. 31.*

Tithymalus tuberosa pyriformi radice. *Bauh. pin. 292.*

Tithymalus tuberosa radice. *Clus. hist. 2. p. 190.*

Habitat in Crera.

34. EUPHORBIA umbella quinquefida: bifida, involu-*dulcis.* cellis subovatis, foliis lanceolatis obtusis integerrimis. *Diff. euph. 35.*

Tithymalus montanus non acris. *Bauh. pin. 292.*

Pityusa f. *Esula minor altera*, floribus rubris. *Lab. ic. 353.*

Habitat in Gallia, Italia, Germania.

- Pithyusa.* 35. EUPHORBIA umbella quinquefida: bifida, involucellis ovatis mucronatis, foliis lanceolatis: infimis involutis retrorsum imbricatis. *Diff. eupb.* 36.
Tithymalus foliis brevibus aculeatis. *Bauh. pin* 292.
Pithyusa. Dalech. hist. 1652.
Habitat in arenosis Belgii, Hispaniae, Italiæ. 2
- portlandica.* 36. EUPHORBIA umbella quinquefida: dichotoma, involucellis cordatis, foliis linear-lanceolatis obtusifusculis acuminatis reflexis.
Tithymalus maritimus minor. Raj. syn. 3. p. 313. t. 24. f. 6.
Habitat in Angliae Devonschire. 2
- Paralias.* 37. EUPHORBIA umbella subquinquefida: bifida, involucellis cordato-reniformibus, foliis sursum imbricatis. *Diff. eupb.* 53.
Euphorbia inermis, foliis setaceo-linearibus confertis, umbella universali multifida, partialibus ramosè bifidis.
Hort. cliff. 200. *Roy. lugd.* 193. *Gort. getr.* 306.
Tithymalus maritimus. Bauh. pin. 291. *Dod. pempt.* 370. f. 1. 2.
Tithymalus paralios. Cam. epit. 962.
Habitat in Europæ arena maritima. 2
- aleppica.* 38. EUPHORBIA umbella quinquefida: dichotoma, involucellis ovato-lanceolatis mucronatis, foliis inferioribus setaceis. *Diff. eupb.* 37.
Tithymalus foliis inferioribus capillaceis; superioribus myro similibus. *Morif. hist.* 3. p. 338.
Tithymalus cyparissius. Alp. exot. 65. t. 64.
Habitat in Creta, Aleppo. 2
- segetalis.* 39. EUPHORBIA umbella quinquefida: dichotoma, involucellis cordatis acutis, foliis linear-lanceolatis, ramis floriferis. *Diff. eupb.* 34.
Euphorbia inermis, foliis alterniis linearibus acutis, partialibus umbellæ ovato-rhombeis, petalis bicornibus.
Hort. upf. 142. *
Euphorbia inermis, foliis linearibus acutis ad umbellam quinis isocelibus, ad umbellulas ter dichotomas ovato-trigonis. *Sauv. monsp.* 46.
Tithymalus annuus, lunato flore, linariæ folio longiore
Morif. hist. 3. p. 339. f. 10. t. 2. f. 3.
Tithymalus maritimo affinis, linariæ folio. *Bauh. pin* 291?

Tithy-

Tithymalus segetum longifolius. *Raj. angl.* 2. p. 312. *
Habitat in Mauritania. ◎

40. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus serratis. *Diff. euph.* 42.
Euphorbia foliis crenatis, umbella universali quinquefida pentaphylla, partialibus trifidis, propriis triphyllis. *Hort. cliff.* 198. *Fl. suec.* 436. * *Roy. lugbd.* 197. *Dalib. paris.* 156.
Euphorbia inermis, foliis subrotundis crenatis. *Fl. lapp.* 220.
Tithymalus helioscopius. *Baub. pin.* 291. *Fuchs. hist.* 811.
Habitat in Europæ cultis. ◎
Umbelle radii bis trifidi, dein dichotomi & Involucro similia.
41. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis diphylis reniformibus, foliis amplicaulibus cordatis serratis. *Diff. euph.* 43. *
Euphorbia inermis, foliis denticulatis: caulinis lanceolatis, umbellaruin cordatis. *Hort. cliff.* 200. *Roy. lugbd.* 197.
Tithymalus characias, folio serrato. *Baub. pin.* 290.
Tithymalus myrtites valentinus. *Clas. hist.* 2. p. 189.
Habitat in Narbona Hispania. ◎
42. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis subovatis, foliis lanceolatis serrulatis, capsulis verrucotis. *Diff. euph.* 32.
Euphorbia inermis, foliis linearibus, umbella universali trifida triphylla, partialibus trifidis, propriis dichotomis diphylis, foliolis subrotundis. *Guett. stamp.* 269. *Dalib. paris.* 154.
Tithymalus myrsinites, fructu verrucæ simili. *Baub. pin.* 291.
Tithymalus foliis subhirsutis ad caulem ellipticis, subflobibus binis subrotundis. *Hall. belv.* 191. *
Habitat in Gallia, Helvetia.
43. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis foliisque oblongis obtutis, petalis membranaceis. *Diff. euph.* 38.
Euphorbia inermis, foliis lanceolatis obtusis alternis, ramis floriferis dichotomis. petalis maximis subrotundis. *Gron. virg.* 58.
Habitat in Virginia, Canada.

- coralliooides.* 44. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, capsulis lanatis. *Diss. euph.* 39.
Euphorbia inermis fruticosa, foliis lanceolatis, involucro universali quinquefido, partialibus trifidis, reliquis bifidis. *Hort. upf.* 142. * *Roy. lugdb.* 198.
Tithymalus arboreus, caule corallino, folio hyperici, pericarpio barbato. *Barrh. lugab* 1. p. 256.
Habitat in Sicilia, Mauritania, Oriente. 2
- pilosæ.* 45. EUPHORBIA umbella quinquesida: trifida: bifida, involueris ovatis, petalis integris, foliis lanceolatis subpilosis apice serrulatis.
Euphorbia foliis alternis ex ovali-lanceolatis, umbellis diphyllois subtriangularibus, capsulis erectis muricatis, caule simplici. *Gmel. fib.* 2. p. 226. t. 93.
Tithymalus palustris villosus mollior erectus. *Barr. rar.* 41. t. 88j.
Tithymalus inermis hirsutus. *Baub. pin.* 292? *prodr.* 135? *Magn. monsp.* 255.
Habitat in Sibiria. 2
Habitus exacte E. palustris, ut facile pro eadem sumeretur, eodemque tempore floret, paulo tamen maior. Folia lato-lanceolata, alterna, xtrinque vix manifeste pilosa, apice ita tenuissime ferrata, ut vix observentur serraturæ. Umbellæ cum umbellulis lateralibus ita coacervatae, ut primaria difficilius eruatur, luteæ petalis & involucris. Flores primarii majculi pentapetalii; reliqui hermaphroditi tetrapetali; petalis transverse ovalibus. Fructus verrucosii & pilis albis subtilissimis adspersi. Rami steriles ex aliis foliorum inferiorum, ut ex summis aliis pedunculi umbelluliferi.
- orientalis.* 46. EUPHORBIA umbella quinquefida: quadrifida: dichotoma, involucellis subrotundis acutis, foliis lanceolatis. *Diss. euph.* 40.
Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, involucro universali quinquefido lanceolato, partiali tetraphyllo subrotundo, propriis diphyllois. *Roy. lugdb.* 198.
Tithymalus orientalis, salicis folio, caule purpureo, flore magno. *Tournef. cor.* 2.
Habitat in oriente.
- platyphyllas.* 47. EUPHORBIA umbella quinquesida: subquadrifida. dichotoma, involucellis primariis tetraphyllis, foliis serratis lanceolatis sessilibus. *Diss. euph.* 41.

Euphorbia inermis, foliis alternis lanceolatis amplexi-caulibus subserratis, umbella universali quinquesida pentaphylla, partialibus bifidis. *Hort. upf.* 141. *

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, umbella universali partialiumque prima quinquesida: secunda trifida: reliquis bifidis. *Roy. lugdb.* 198. *Dalib. paris.* 156.

Tithymalus arvensis latifolius gerinanicus. *Baub. pin.* 291.

Tithymalus platyphyllus. *Fuchs. hist.* 813.

Habitat in agris Galliae, Angliae, Germaniae. ☺

* *Umbellæ multifida*.

48. *EUPHORIA umbella multifida*: dichotoma, involucellis subcordatis, petalis subbicarinibus, ramis sterilibus foliis unitorinibus. *Diff. eupb.* 48. *Efusa*.

Euphorbia inermis, foliis lanceolato-linearibus, involuci universalis foliis quinis ovato-acutis, partialis semiorbiculatis. *Hort. upf.* 141. *Sauv. monsp.* 47.

Euphorbia inermis, foliis ligulatis patulis ad umbellam quinis ovato-oblongis acutis, bracteis trigonis. *Sauv. monsp.* 51?

Tithymalus lithospermii majoris folio. *Magn. monsp.* 304?

Efusa minor. *Dalech. hist.* 1653. *Dod. pempt.* 374.

Habitat in Germania, Belgio, Gallia. ♀

Flores omnes fertiles: petala flavescens, 4, obsolete bicornia? *Fructus glaber*. *Umbellæ caulis laterales dichotomæ*.

49. *EUPHORIA umbella multifida*: dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus foliis setaceis, caulinis lanceolatis. *Diff. eupb.* 49. *Cyparissias*.

Euphorbia inermis, foliis consertis linearibus, umbella universalis multifida, partialibus dichotonis: foliolis subrotundis. *Hort. cliff.* 199. * *Hort. upf.* 142. *

Roy. lugdb. 197. *Dalib. paris.* 155. *Gort. gelr.* 105.

Tithymalus cyparissius. *Baub. pin.* 291. *Dalech. hist.* 1644.

Tithymalus cypressinus. *Tabern. hist.* 990.

Habitat in Mænia, Bohemia, Helvetia, G. Narbonensi.

50. *EUPHORIA umbella suboctifida*: bifida, involucellis subovatis, foliis spathulatis patentibus carnosis mucronatis margine scabris. *Diff. eupb.* 52. *Myrsinætes*.

Euphorbia inermis, foliis superioribus reflexis lanceolatis, umbella universalis trifida, partialibus bifidis. *Hort. cliff.* 199. *Hort. upf.* 141. *Eu-*

Euphorbia inermis, foliis ligulatis spinula terminatis, ad umbellam duodenis, bracteis trigonis spinula terminatis. *Sauv. monsp.* 51.

Tithymalus myrsinoides latifolius. *Bauh. pin.* 296.

Tithymalus myrsinoides legitimus. *Clus. hist. 2. p.* 189.

Habitat in Calabria, Monspelli. 2

Caules multi, pedales, deflexi, virides, inferne a casu foliorum cicatrificati. Folia alterna, spathulata, coriacea, concava, glauco-viridia, patentia, mucronata, margine subscabra, superiora reflexa. Umbella 7-9 fida, radiis semel bifidis. Involucrum universale foliolis 7-9, ovatis, tenuioribus, acutis; Involucella diphylla, subcordata, latiora, concava, acuta, marginie subscabra. Flores intra involucella primaria & secundaria masculi, reliqui hermaphroditi. Calyces ore serrati. Petala 4, flava, bicornia apicibus teretibus nittentia. Capsula glabra.

palustris.

51. EUPHORBIA umbella multifida: subtrifida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis sterilibus. *Diss. euph.* 47. *

Euphorbia foliis lanceolatis, umbella universali multifida polyphilla, partialibus trifidis triphyllis, propriis dichotomis. *Hort. cliff.* 200. *Fl. suec.* 438. * *Mat. med.* 255. *Roy. Ingab.* 198. *Dalib. paris.* 153. *Gort. gelr.* 307.

Tithymalus palustris fruticosus. *Bauh. pin.* 292.

Esula major. *Dalech. hist.* 1653.

Habitat in Suecia australi, Germania, Belgio. 2

hiberna.

52. EUPHORBIA umbella sexfida: dichotoma, involucellis ovalibus, foliis integerrimis, ramis nullis, capsulis verrucotis. *Diss. euph.* 50.

Tithymalus latifolius hispanicus. *Bauh. pin.* 291. *Tarbern. hist.* 987.

Tithymalus hibernicus, vasculis muricatis erectis. *Dill. elth.* 387. *t. 290. f.* 374.

Habitat in Hibernia, Sibiria, Austria, Pyrenæis. 2

Dendroides.

53. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, involucellis subcordatis: primariis triphyllis, caule arboreo. *Diss. euph.* 51.

Tithymalus myrtifolius arboreus. *Bauh. pin.* 290.

Tithymalus dendroides. *Cam. epit.* 965.

Habitat in Italia, Creta, Insulis Stæchadum. 5

54. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, invo- *Amygdaloides*,
lucellis perfoliatis orbiculatis, foliis obtusis. *Diff.* *euph.* 46.
Tithymalus characias amygdaloides. *Baub. pin.* 290
Habitat in Gallia, Germania.
55. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, invo- *Sylvatica*,
lucellis perfoliatis subcordatis, foliis lanceolatis inte-
gerimis. *Diff. euph.* 45.
Tithymalus sylvaticus, lunato flore. *Baub. pin.* 290.
Moris. hist. 3. p. 335. f. 10. t. 1. f. 3. Barr. ic. 830.
839. 829.
Tithymalus lunato flore. *Col. ecphr.* 2. p. 57. t. 57.
Habitat in Germania, Gallia, Hispania, Italia. 5
56. EUPHORBIA umbeila multifida: bifida, involucel- *Characiata*.
lis perfoliatis emarginatis, foliis integerrimis, caule
frutescente. *Diff. euph.* 44.
*Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, umbella universa-
li multifida, partialibus dichotomis, involucris semi-
bifidis perfoliatis.* *Hort. cliff.* 199. *Hort. upf.* 142. *
Roy. lugdb. 197.
Tithymalus characias rubens peregrinus. *Baub. pin.* 290.
Tithymalus characias 1. *Clus. hist.* 2. p. 188.
Tithymalus foliis pini. *Baub. pin.* 292.
Habitat in Gallia, Hispania, Italia. 5
Caules quadripedales, fruticosi, secundum annos ramosi,
craffitie digitii. Rami annotini superne craffiores, sub-
villoso, infra folia adspersi cicatricibus transversis. Ra-
musp florifer primo vere ex apice ramorum excrescit,
fruticat, perit, cum ad latera baseos novi rami prode-
unt. Folia lanceolata, coriacea, subtomentosa, viridia,
reflexa nervo atrinque elevato, versus flores latiora
obtusiora. Umbella parva, conferta, terminalis, ses-
silis: Radiis numerosis semel bifidis. Involucrum u-
niversale polyphyllum, sublanceolatum, parvum, refle-
xum; Involucella perfoliata, semibifida. Flores intra
involucella primaria masculi, reliqui hermaphroditi;
omnes Petalis 4, purpureis, humidis. Germina vil-
losa

PENTAGYNIA

GLINUS.

I. GLINUS.

Alfine lotoides sicula. *Bocc. sic. 21, t. 11. Moris. hist. 2.* *lotoides.*
p. 552. *Alfi-*

Alsine heliotropio cognata. *Cup. cath.*

Portulaca bætica, luteo flore, spuria aquatica. *Barr. rar.*
478. t. 336.

Habitat in Sicilia, Hispania ad fessas.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM.

- arboreum.* 1. **SEMPERVIVUM** caule arborescente laeviramoso.
Sempervivum caule inferne nudo lævi ramoso. *Hort. cliff.* 179. *Hort. upf.* 318. *Roy. lugdb.* 456.
Sedum majus arborescens, foliulis candidis. *Baub. pin.* 282.
Sedum majus legitimum. *Cluj. hist.* 2. p. 58.
Habitat in Lusitania; Creta, Corcyra, Zacyntho. 5.
- canariense.* 2. **SEMPERVIVUM** caule foliorum ruderibus lacero,
foliis retusis.
Sempervivum caule infra folio lacero, foliis cuneiformibus:
summis subrotundis. *Hort. cliff.* 179. *Roy. lugdb.* 457.
Sedum canarium, foliis omnium maximis. *Comm. hort.* 2. p. 180. t. 95.
Sedum majus canarium acaulon, pilis ad oras foliorum
hispidis. *Pluk. atm.* 340. t. 314.f. 1. *Raj. suppl.* 362.
Habitat in Canariis. 5
- rectorium.* 3. **SEMPERVIVUM** foliis ciliatis, propaginibus paten-
tibus.
Sempervivum foliis radicalibus carnosis ciliatis, cauli-
nis imbricatis membranaceis, corymbo racemoso re-
flexo. *Hort. cliff.* 179. *Fl. succ.* 375. *Mat. med.* 222. *Roy. lugdo.* 457.
Sempervivum majus alterum s. Barba jovis. *Dod. pent.* 127.
Sedum majus vulgare. *Baub. pin.* 283.
Habitat in Europeæ tectis & collibus. 2
- globiferum.* 4. **SEMPERVIVUM** foliis ciliatis, propaginitus glo-
bosis.
Sempervivum foliis radicalibus in globum congestis ci-
liatis, propaginibus globosis. *Hort. cliff.* 180. *Roy. lugdb.* 457.
Sedum majus vulgari simile, globulis decidentibus.
Morij. hist. 3. p. 472. f. 12. t. 7. f. 18.

Se-

DODECANDRIA DODECAGYNIA. 465

Sedum vulgari magno simile. Baub. hist. 3. p. 688.
Habitat in Rutheno D. Gmelin. 2

5. **SEMPERVIVUM** foliis pills intertextis, propaginis ^{arachnornæ}
bus globosis. ^{num.}

Sempervivum foliis radicalibus in globum congestis: vil-
*lis reticulatim connexis. Hort. cliff. 180. * Roy.*
Lugd. 457.

Sempervivum tubrum montanum gnaphalooides. Col.
ecphr. 1. p. 292 t. 291.

Sedum montanum tomentosum. Baub. pin. 284.

Habitat in Alpibus Italiæ, Helvetiæ. 2

6. **SEMPERVIVUM** foliis integerrimis, propaginibus ^{montanis}
patulis.

Sedum rosulis liberis, foliis lævibus. Hall. helv. 393.

Sedum alpinum, rubro magno flore. Baub. pin. 284.

Sedum majus montanum, foliis non dentatis, floribus
rubentibus. Baub. pin. 283.

Sedum minus, flore rubente. Best. cyst. vern. 6. t. 8,
f. 2.

Habitat in rupibus Helvetiæ. 2

Cl^{ass}. XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

CACTUS.

Echino Melocætis subrotundi.

- mammilla-* *rie.* 1. CACTUS subrotundus testus tuberculis ovatis barbatis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upf.* 119. *Roy. lugdb.* 278
Echinomelocactus minor lactescens, tuberculis s. mammillis majoribus. Herm. par. 136. t. 136.
Ficoides s. Melocactus mammillaris glabra sulcis catens fructum suum undique fundens. Pluk. alm. 148. t. 29. f. 1.
Ficoides s. Ficus americana sphærica tuberculata lactescens, flore albo. Comm. hort. 1. p. 105. t. 55.
Habitat in Americæ calidioris rupibus. 5
- Melocactus.* 2. CACTUS subrotundus quatuordecim-angularis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upf.* 119 *Roy. lugdb.* 297.
Melocactus indiæ occidentalis. Baub. pin. 384.
Echinomelocactus. Clus. exot. 92. t. 92.
Habitat in Jamaica, America calidiore. 5
 * Cerei erecti stantes per se.
- heptagonus.* 3. CACTUS erectus oblongus septemangularis. *Hort. cliff.* 181. * *Roy. lugdb.* 279.
Habitat in America. 5
- tetragonus.* 4. CACTUS quadrangularis longus erectus; angulis compressis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upf.* 119. *Roy. lugdb.* 280.
Cereus erectus minor, fructu spinoso, costarum numero varians. Herm. par. 117.
Habitat in Curacao, America calidiore. 5
- hexagonus.* 5. CACTUS erectus sexangularis longus. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upf.* 119. *Roy. lugdb.* 279.
Cereus surinamensis. Eph. N. C. 3. p. 394. t. 7. 8
Cereus erectus altissimus surinamensis. Herm. par. 116
Raj. dendr. 23.
Habitat Surinami. 5
6. CA-

6. CACTUS subquinquangularis erectus longus articulatus pentagonus.
latus. Hort. cliff. 182. * Roy. lugdb. 280.
Habitat in America.
7. CACTUS erectus longus octangularis: angulis comprehendens,
prellis undatis, spinis lana longioribus. Hort. cliff.
182. Roy. lugdb. 279.
Habitat in America calidiore. 5
8. CACTUS erectus longus subnovemangularis: angulis longinquis,
obsoletis, spinis lana brevioribus. Hort. cliff. 182.
Roy. lugdb. 279.
Cereus curassavicus erectus maximus, fructu rubro non
spinoso, lanagine flavescente Herm. par. 115. t. 115.
Habitat in Curacao. 5
9. CACTUS erectus longus suboctangularis: angulis ob pernoianus,
tutis. Hort. cliff. 181. Hort. upf. 120. Roy. lugdb. 279.
Cereus erectus, fructu rubro non spinoso. Herm. par.
114.
Cereus peruvianus spinosus, fructu rubro nucis imaginidine. Baub. pin. 458.
Euphorbij arbor cerei effigie. Lob. ic. 2. p. 25.
Habitat in Jainaicæ, Peru apriæ aridis maritimis. 5
10. CACTUS erectus articulatus sub-decangularis: articulatus Royenii,
ticulis subovatis, spinis lanam squantibus. Roy. lugdb.
279.
Habitat in America. 5
- * Cerei repentes radiculis lateribus.
11. CACTUS repens subquinquangularis. grandiflorus.
Caetus scandens, angulis quinque pluribusque obtusis.
Hort. cliff. 182. Hort. upf. 121. * Roy. lugdb. 280.
Cereus americanus major articulatus, flore maximo no-
te le aperiente s. suavissimum odorem spirante. Volck.
hesp. 1. p. 133. t. 234.
Habitat in Jamaica, VeraCruce. 5
12. CACTUS repens decemangularis. flagellifer.
Caetus scandens, angulis decem obsoletis. Hort. upf. mis.
121.
Cereus minor scandens polygonus spinosissimus, flore
purpureo. Erbet. tab. 2. f. 2.
Ficoides americanum s. Cereus minima serpens ameri-
cana Pluk. alm. 148. t. 158. f. 6.
Habitat in America calidiore. 5

triangularis. 13. CACTUS repens triangularis.

Cactus triangularis scandens articulatus. *Hort. cliff.* 182. *Hort. upf.* 121. *Roy. lugdb.* 280.

Ficoides americanum, s. Cereus crectus cristatus, foliis triangularibus profunde canaliculatis. *Pluk. alm.* 147. t. 29. f. 3.

Habitat in Brasilia, Jamaica.

* *Opuntia compressæ articulis proliferis.*

moniliformis. 14. CACTUS articulato-prolifer, articulis globosis spinosis glomeratis.

Melocactus, ex plurimis globulis opuntiae modo nascientibus, spinosissimus. *Plum. spec.* 20.

Habitat in America calidiore. ♂

Opuntia. 15. CACTUS articulato-prolifer, articulis ovatis, spinis setaceis.

Cactus compressus articulatus ramosissimus, articulis ovatis: spinis setaceis. *Hort. cliff.* 183. *Hort. upf.* 120.

Gron. virg. 54. *Roy. lugdb.* 280.

Opuntia vulgo herbariorum. *Bauh. hist.* 1. p. 154.

Ficus indica, folio spinoso, fructu majore. *Bauh. pin.* 458.

Habitat in America, Peru, Virginia, nunc in Hispania, Lusitania. ♂. ♀.

Ficus indica. 16. CACTUS articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis, spinis setaceis.

Cactus compressus articulatus ramosus, articulis ovato-oblongis: spinis setaceis *Hort. cliff.* 183. *Hort. upf.* 120. *Roy. lugdb.* 280.

Habitat in America calidiore. ♂

Tuna. 17. CACTUS articulato: prolifer, articulis ovato-oblongis: spinis subulatis.

Cactus compressus articulatus ramosus, articulis ovato-oblongis, spinis subulatis. *Hort. cliff.* 183. *Hort. upf.* 120. *Roy. lugdb.* 280.

Tuna major, spinis validis flavicantibus, flore gibbo. *Dill. eth.* 396. t. 295. f. 238.

Opuntia major, folio oblongo rotundo: spinis longis & validissimis, flore luteo. *Sloan. jam.* 103. *hist.* 2. p. 149. t. 224. f. 1.

Habitat in Jamaica & America calidiore. ♂

cochenillifer 18. CACTUS articulato-prolifer: articulis ovato-oblongis subinermibus.

Cactus compressus articulatus ramosus, articulis ovato-oblongis subinermibus. *Hort. upf.* 121. *Tu-*

- Tuna mitior, flore sanguineo, cochinillifera. *Dill. elth.*
399. *t. 297. f. 383.*
- Ficus indica major laevis s. spinosa vermiculos preferens. *Pluk. alm.* 146. *t. 281. f. 383.*
- Opuntia maxima, folio oblongo rotundo majore spinulis nonnullis & innocentibus oblitio. *Sloan. jam.* 194.
bif. 2. p. 152. t. 8. f. 1. 2.
- Habitat in Jamaica & America calidiore.* ♂
19. CACTUS articulato-prolifer, articulis cylindrico-^{curassavicus.}
ventricosis compressis.
- Cactus tereti-compressus articulatus ramosus. *Hort. cliff.*
182. *Hort. upf. 120. Roy. lugdb. 280.*
- Ficus indica s. Opuntia curassavica minima. *Comm. hort.*
1. *p. 107. t. 56.*
- Ficus indica s. Opuntia minor caulescens arbusculæ in
modum, ramis cineritiis spinosissima. *Pluk. alm.* 147.
t. 281. f. 3.
- Habitat in Curacao.* ♂
20. CACTUS prolifer ensiformi-compressus ferrato-re-^{Phyllanthus.}
pandus.
- Cactus foliis ensiformibus obtuse serratis. *Hort. cliff.*
183. *Roy. lugdb. 281.*
- Cereus scolopendri folio brachiato. *Dill. elth.* 73. *t. 64.*
f. 74.
- Phyllanthus americana, sinuosus foliis longis. *Pluk. alm.*
296. *t. 247. f. 5.*
- Habitat in Brasilia, Surinamo, Americe meridionali.* ♂
21. CACTUS caule tereti arboreo spinoso, foliis lanceo-^{Pereeskia.}
lato-ovatis. *Hort. upf. 122.*
- Pereeskia. *Hort. cliff. 122. Roy. lugdb. 281.*
- Pereeskia aculeata, flore albo, fructu flavescente. *Plum.*
gen. 37. Dill. elth. 305. t. 227. f. 294.
- Malus americana spinosa, portulacæ folio, fructu folioso,
semine reniformi splendente. *Comm. hort.* 1. *p.*
135. *t. 70.*
- Portulaca americana latifolia ad foliorum ortum lanugine
obducta, longioribus aculeis horrida. *Pluk. alm.*
135. *t. 215. f. 6.*
- Habitat in America calidiore, Jamaica, Margaretha.* ♂
22. CACTUS caule tereti arboreo spinoso, foliis cunei-^{portulacifolia.}
formibus retusis.
- Opuntia arbor spinosissima, foliis portulacæ cordatis.
Pluk. spec. 6.

Habitat in America calidiore. ♂

Fructus hujus minime foliis adpersus, uti praecedentis.

PHILADELPHUS.

- coronarius.* 1. PHILADELPHUS foliis subdentatis,
Philadelphus. Hort. cliff. 188. Hort. upf. 122.
Syringa alba f. Philadelphus athenæi. Bauh. pin. 399.
Prutex coronarius. Clus. hist. 1. p. 55.
Habitat in - - - - ♂
Flos primarius quinquefidus calyce, corolla, pistillo, capsula. Phil. bot. 178
- inodorus.* 2. PHILADELPHUS foliis integerrimis.
Philadelphus flore albo majore inodoro Catesb. car. 2.
p. 84. t. 84
Habitat in Carolina. ♂

PSIDIUM.

- Guajava.* 1. PSIDIUM.
Psidium rainis tetragonis. Hort. upf. 122.
Psidium caule quadrangulo. Hort. cliff. 184. Fl. zeyl. 192.
Guajava alba acida, fructu rotundiore. Pluk. aim. 181.
t. 193. f. 4.
β. *Guajava alba dulcis.* Comm. hort. 1. p. 121. t. 63.
Habitat in India. ♂

EUGENIA.

- enolaccensis.* 1. FUGENIA foliis integerrimis, pedunculis ramosis lateralibus. Fl. zeyl. 187.
Persici officulo fructus malaccensis rubens. Bauh. pin. 441.
Nati-schambu Rheed. mal. 1. p. 29. t. 18. Raj. hist. 1478.
Habitat in India. ♂
- Jambu.* 2. EUGENIA foliis integerrimis, pedunculis ramosis terminalibus. Fl. zeyl. 188
Persici officulo fructus malaccensis ex candido rubescens. Bauh. pin. 441.
Malacca schambu Rheed. mal. 1. p. 27. t. 17. Raj. hist. 1478.
Habitat in India. ♂
- uniflora* 3. EUGENIA foliis integerrimis, pedunculis unifloris lateralibus. Fl. zeyl. 189.

Eugenia. Roy. lugdb. 265.

Eugenia indica, myrti folio deciduo, flore albo, fructu suaverubenti molli leviter sulcato & odoro. *Mich. gen. 226. t. 108.*

Myrtus indica, foliis rigescensibus latis & recurvis pa- rum odoratis. *Till pf. 117. t. 44.*

Habitat in India. ♂

4. EUGENIA foliis crenatis, pedunculis terminalibus, *neutangala.* pomis oblongis acutangulis. *Fl. zeyl. 190.* *

Tieria-Samistravadi. Rheed. mal. 4. p. 51. t. 7. Raj. hift. 1480.

Habitat in India. ♂

5. EUGENIA foliis crenatis, racemis longissimis, *po-racemosa.* mis ovatis. *Fl. zeyl. 191.* *

Sainstravadi f. Caibarsiumbu. Rheed. mal. 4. p. 11. t. 16. Raj. hift. 1479.

Habitat in India. ♂

MYRTUS.

1. MYRTUS floribus solitariis: involuero diphyllo. *Hort. communis.* cliff. 42. *Hort. upi* 123. *Mat. med. 224. Roy. lugdb. 269.*

Myrtus communis italicica. Baub. pin. 468.

2. Myrtus bætica latifolia 1. 2. *Baub. pin. 469. Clus. bætica.* hift. 1. p. 65.

γ. Myrtus minor vulgaris. *Baub. pin. 469.*

tarentina.

δ. Myrtus foliis mininis & mucronatis. *Baub. pin. 469.*

mucronata.

ε. Myrtus sylvestris, foliis acutissimis. *Baub. pin. 469.*

acutifolia.

ζ. Myrtus angustifolia bætica. *Baub. pin. 469.*

angustifolia

η. Myrtus latifolia belgica. *Baub. pin. 469.*

bælica.

Ω. Myrtus latifolia romana. *Baub. pin. 468.*

romana.

Habitat in Europa australi, Asia, Africa. ♂

2. MYRTUS floribus solitariis, pedunculis nudis, petal-*brasilianna.* lis subciliatis.

Arbor brasiliiana, myrti laureæ foliis inodoris. Comm hort. 1. p. 173. t. 89.

Habitat in Brasilia. D. Wachend. ♂

Folia ovata, obtusa, petiolata, glabra, opposita. Flores solitarii, axillares, pedunculati, pedunculo ophyllio.

Corollæ petala 4. s. 5, lacero-ciliata, obverse ovata, concava, reflexa. Stamina circiter 40.

3. MYRTUS pedunculis multifloris, foliis lanceolato-*cumini.* ovatis. *Fl. zeyl. 185.* *

Habitat in Zeylona. ♂

4. MYR

- Zeylanica.* 4. **MYRTUS** pedunculis multifloris, foliis ovatis subpetiolatis.
Myrtus foliis ovatis acuminatis obtusiusculis. *Fl. zeyl.* 182. *
- Myrtus zeylanica* odoratissima, baccis niveis monococcis. *Herm. lugdb.* 434. t. 435.
- Myrtoides* foliis ovatis. *Hort. cliff.* 489. *Roy. lugdb.* 535.
Habitat in Zeylona. 5
- androsaemoides.* 5. **MYRTUS** pedunculis multifloris, foliis subovalibus sessilibus. *Fl. zeyl.* 184. *
Habitat in Zeylona. 5
- caryophylla-* 6. **MYRTUS** pedunculis multifloris, foliis obovatis. *Fl. zeyl.* 183. *Mat. med.* 225.
Caryophyllum aromaticus ind. occid. foliis & fructu rotundis. *Pluk. alm.* 188. t. 155. f. 3.
Habitat in Zeylona. 5
- Pimenta.* 7. **MYRTUS** foliis alternis. *Fl. zeyl.* 186. *Mat. med.* 225.
Myrtus calycibus absque appendiculis. *Hort. cliff.* 501.
Myrtus arborea aromatica, foliis laurini. *Sloan. jam.* 161, *bif.* 2. p. 76. t. 191. f. 1.
Caryophyllum aromaticus americanus, lauri acuminatis foliis, fructu orbiculari. *Pluk. alm.* 88. t. 155. f. 4.
Habitat in India. 5

PUNICA.

- Granatum.* 1. **PUNICA.** *Hort. cliff.* 134. *Hort. apf.* 122. *Mat. med.* 223. *Roy. lugdb.* 267.
Malus punica sylvestris. *Baub. pin.* 438.
Malus punica sativa. *Baub. pin.* 438.
Malus punica. *Cam. epit.* 130. 131.
- β. *Balaustia* flore pleno majore & minore. *Baub. pin.* 438.
Habitat in Hispania, Italia, Mauritania solo cretaceo. 5

AMYGDALUS.

- Perseca.* 1. **AMYGDALUS** foliorum serraturis omnibus acutis.
Hort. cliff. 189. *Hort. apf.* 123. *Mat. med.* 230.
Roy. lugdb. 267.
Perseca molli carne & vulgaris. *Baub. pin.* 440.
Perseca rubra. *Cam. epit.* 145.
- β. *Nucipersica*, quæ nucum juglandium faciem repræsentat. *Baub. pin.* 440. *Raj. bif.* 1516.
Habitat - - - 5

2. AMYGDALUS foliis petiolatis: serraturis infimis *communis*.
glandulosis. *Hort. cliff.* 186. *Hort. upf.* 123. *Mat. med.* 229. *Roy. lugdb.* 267.
Amygdalus sylvestris. *Baub. pin.* 442.
- β. Amygdalus sativa. *Baub. pin.* 441.
Amygdalus. *Dod. pempt.* 798.
- γ. Amygdalus amara. *Tournef. inst.* 627.
Habitat in Mauritaniae sepiibus. 5
3. AMYGDALUS foliis petiolatis basi attenuatis. *Hort. nana.*
cliff. 186. *Hort. upf.* 124. *Roy. lugdb.* 267.
Amygdalus indica nana. *Pluk. alm.* 28. t. 11. f. 3.
Armeniaca persicæ foliis, fructu exsucco. *Amm. ruth.*
273. t. 30?
Habitat in Asia septentrionali?

PRUNUS.

1. PRUNUS floribus racemosis, foliis deciduis basi sub- *Padus.*
tus biglandulosis.
Padus glandulis duabus basi foliorum subjectis. *Hort. cliff.* 185. *Fl. suec.* 395. *Roy. lugdb.* 269. *Hell. helv.* 397.
Padus foliis annuis. *Fl. lapp.* 198.
Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli. *Baub. pin.* 451.
Habitat in Europa. 5
2. PRUNUS floribus racemosis, foliis deciduis basi anti- *virginiana.*
ce glandulosis.
Cerasus sylvestris, fructu nigricante in racemis longis
pendulis phytolaccæ instar congestis. *Gron. virg.* 54.
Roy. lugdb. 537.
Cerasi similiis arbuscula mariana, padi folio, flore albo
parvo racemoso. *Pluk. mant.* 43. t. 339. *Cateso. car.* 1. p. 28. t. 28.
Habitat in Virginia. 5
3. PRUNUS floribus racemosis, foliis sempervirentibus *lusitanica.*
eglandulosis.
Padus foliis glandula destitutis. *Vir. cliff.* 42. *Hort. upf.* 126. *Roy. lugdb.* 269.
Padus foliis sempervirentibus ovatis. *Hort. cliff.* 185.
LauroCerasus lusitanica minor. *Dill. elzb.* 193. t.
159. f. 193.
Habitat in Lusitania, Pennsylvania. 5

- Lacerto Cerasus.* 4. PRUNUS floribus racemosis, foliis sempervirentibus dorso biglandulosis.
Padus glandulifera duabus dorso foliorum innatis. *Vir. cliff.* 42. *Hort. upf.* 126. *Roy. lugdb.* 269.
Padus foliis sempervirentibus lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.* 185.
Cerasus folio laurino. *Baub. pin.* 450.
Laurocerasus. *Clus. hist.* 1. p. 4. *Cam. hort.* t. 23.
Habitat in Trapezunte unde in Europam venit 1576. b
- Mahaleb.* 5. PRUNUS floribus corymbosis, foliis ovatis.
Cerasus foliis ovatis. *Vir. cliff.* 43. *Hall. helv.* 360.
Roy. lugdb. 268. crenatis. *Hort. cliff.* 487.
Ceraso affinis. *Baub. pin.* 451.
Mahaleb. *Cam. epit.* 91.
Habitat in Helvetia. b
- Armeniaca.* 6. PRUNUS floribus sessilibus, foliis subcordatis.
Prunus foliis ovato-cordatis. *Hort. cliff.* 186. *Hort. upf.* 124. *Roy. lugdb.* 268.
Mala Armeniaca majora. *Baub. pin.* 442.
Mala Armeniaca majora, nucleo dulci. *Baub. pin.* 442.
Malus Armeniaca minor. *Baub. pin.* 442.
Habitat - - - -
- Sibirica.* 7. PRUNUS floribus sessilibus, foliis ovato-oblongis.
Armeniaca betulae folio & facie, fructu exsucco. *Amm. ruth.* 272. t. 29.
Habitat in Sibiria
An haec satis distincta a precedenti?
- Cerasus.* 8. PRUNUS pedunculis simplicibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis.
Cerasus foliis ovato-lanceolatis. *Vir. cliff.* 43. *Hort. upf.* 125. *Mat. med.* 233. *Roy. lugdb.* 267. *Hall. helv.* 356.
- Caproniana.* α . Cerasus sativa rotunda rubra & acida. *Baub. pin.* 449.
 β . Cerasus hortensis, flore roseo. *Baub. pin.* 450.
 γ . Cerasus hortensis, flore pleno. *Baub. pin.* 450.
 δ . Cerasa alba dulcia. *Baub. pin.* 450.
 ϵ . Cerasa carne tenera & aquosa. *Baub. pin.* 450.
 ζ . Cerasus sylvestris ac major, fructu subdulci: nigro colore inficiente. *Baub. pin.* 450.
 η . Cerasus acidissima sanguineo succo. *Baub. pin.* 450.
 ϑ . Cerasus pumila. *Baub. pin.* 450.
Cerasus racemosa hortensis. *Baub. pin.* 450.
- x. Ce-

- γ. *Cerasa sativa majora*. *Baub. pin.* 450. *Bigarella.*
 λ. *Cerasa crassa carne dura*. *Baub. pin.* 450. *Duracina.*
Habitat in Europa. ♂.
9. PRUNUS pedunculis simplicibus, foliis lanceolato-domestica,
 ovatis convolutis.
Prunus inernis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.*
 : 186. *Hort. upf.* 124. *Mat. med.* 232. *Roy. lugdb.*
 268.
Prunus. *Baub. pin.* 443.
- β *Pruna majora dulcia & parva atro-cærulea*. *Baub. pin.* *Damascena.*
 443. n. 23.
- γ. *Pruna magna crassa subacida*. *Baub. pin.* 443. *hungarica.*
 δ. *Pruna oblonga cærulea*. *Baub. pin.* 443. *juliana.*
 ε. *Pruna nigra*: *carne dura*. *Baub. pin.* 443. *pernicona.*
 ζ. *Pruna coloris ceræ ex candido in luteum pallescente*. *cerea.*
Baub. pin. 443.
- η. *Pruna magna rubra rotunda*. *Baub. pin.* 443. *acinaria.*
 ι. *Pruna rotunda flava dulcia mali amplitudine*. *Baub. maliformis.*
pin. 443.
- ι. *Pruna angusto maturescētia minora & austeriora*. *Baub. augustana.*
pin. 443.
- κ. *Pruna parva præcoccia*. *Baub. pin.* 443. *præcox.*
 λ. *Pruna parva ex viridi flavescentia*. *Baub. pin.* 443. *cereola.*
 μ. *Pruna amygdalina*. *Baub. pin.* 443. *amygdalina*
 ν. *Pruneoli albi oblongiusculi acidi*. *Baub. pin.* 443. *galatensis.*
 ο. *Pruna ex flavo rufescentia mixti saporis gratissima*. *Brignola.*
Baub. pin. 443.
- ζ. *Prunus fructu rotundo nigro-purpureo dulci*. *Baub. pin.* *myrobalan.*
 444.
Habitat in Europæ australioris locis elevatis. ♂
- ιο. PRUNUS spinosa, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 186. *spinosa.*
Fl. suec. 397. *Mat. med.* 231. *Roy. lugdb.* 268. *Hall.*
helv. 355.
Prunus sylvestris. *Baub. pin.* 444. *Tabern. ic.* 992.
Habitat in Europæ collibus apricis. ♂

DIGYNIA.

CRATÆGUS.

1. CRATÆGUS foliis ovatis inæqualiter serratis sub-*Aris.*
tus tomentosus. *Hort. cliff.* 187. *Fl. suec.* 398. *Vir.*
cliff. 43. *Mat. med.* 234. *Roy. lugdb.* 271. *Sauv.*
monsp. 306.

Alni

Alni effigie, lanato folio, major. *Bauh. pin.* 452.

Aria. Dalech. hist. 202.

Sorbus alpina. Bauh. hist. 1. p. 65.

suecica. β . *Cratægus inermis* foliis ellipticis serratis transversaliter sinuatis subtus villosis. *Fl. lapp.* 199.

Sorbus sylvestris anglica Raj. hist. 1459.

Habitat in Europæ, Helvetiæ, frigidis: β . in Suecia, Anglia. 5

terminalis. 2. *CRATÆGUS* foliis cordatis septangulis: lobis infinitis divaricatis.

Cratægus foliis cordatis acutis: lacinulis acutis serratis.

Hort. cliff. 187. *Roy. lugdb.* 271. *Sauv. monsp.* 286.

Sorbus terminalis & Cratægus theophrasti. Bauh. hist. 1. p. 63.

Sorbus terminalis. Cam. epit. 162.

Mespilus, apii folio, sylvestris non spinosa f. *Sorbus terminalis. Bauh. pin.* 454.

Habitat in Anglia, Germania, Helvetia, Burgundia. 5

censinea. 3. *CRATÆGUS* foliis ovatis repando-angulatis serratis glabris. *Hort. cliff.* 187. *Hort. upf.* 126. *Gron. virg.* 54. *Roy. lugdb.* 272.

Mespilus, apii folio, virginiana spinis horrida, fructu ampio coccineo. *Pluk. alm.* 249. t. 46. f. 4.

Mespilus spinosa f. *Oxyacantha virginiana maxima. Angl. hort.* 49. t. 13. f. 1.

Habitat in Virginia, Canada. 5

Variat cum validis spinis lateralibus & absque spinis.

Crus galli. 4. *CRATÆGUS* foliis lanceolato-ovatis serratis glabris, ramis spinosis.

Mespilus aculeata pyrifolia denticulata splendens, fructu insigni rutilo, virginiensis. Pluk. alm. 249. t. 46. f. 1.

Mespilus pruni foliis, spinis longissimis fortibus, fructu rubro magno. *Clayt. virg.* 55.

tomentosa. 5. *CRATÆGUS* foliis cuneiformi-ovatis serratis subangulatis subtus villosis, ramis spinosis.

Mespilus inermis, foliis ovato oblongis serratis subtus tomentosis. Gron. virg. 55.

Habitat in Virginia. 5

viridis. 6. *CRATÆGUS* foliis lanceolato-ovatis subtrilobis serratis glabris, caule inermi.

Mespilus inermis, foliis oblongis integris acuminatis serratis parvis utrinque viridibus. Gron. virg. 163.

Habitat in Virginia. 5

7. *CRA-*

7. CRATÆGUS foliis lanceolatls ferratis, caule inermi, *indica*, corymbis squamosis.

Habitat in India. 5

Frutex ramis inermibus. Folia lato-lanceolata, obtusis serrata, crassiuscula, petiolata. Corymbi terminales pedunculis squamosis, bracteis subulatis.

8. CRATÆGUS foliis obtusis bitrifidis ferratis *Hort. Oxyacantha*. cliff. 188. Fl. suec. 399. Roy. lugdb. 272.

Meipilus, apii folio, sylvestris spinosa f. Oxyacantha.
Bauh. pin. 454.

Oxyacantha f. Spina acuta. Dod. pempt. 751

Habitat in Europæ pratis apricis duris. 5

9. CRATÆGUS foliis obtusis bitrifidis subdentatis. *Azarolut.*

Mespilus apii folio laciniato. Bauh. pin. 453.

Meipilus Aronia veterum. Bauh. hist. I. p. 67.

- β. Mespilus orientalis, apii folio, subtus hirsuto. *Pock. Aronia*. orient. 189. t. 85.

Habitat Florentiæ, Monspelii. 5

Differre videtur ab Oxyacantha sola magnitudine, ut Sorbus domestica a sylvestri; in hac quadruplo majora omnia; spine in culta pauciores & sepe nullæ.

TRIGYNIA.

SORBUS.

1. SORBUS foliis pinnatis utrinque glabris. *Hall. helv. mucronata*.
250.

Sorbus foliis pinnatis. Hort. cliff. 188. Fl. suec. 400.

Mat. med. 235. Roy. lugdb. 274.

Sorbus sylvestris, foliis domesticæ similis. Bauh. pin. 415.

Sorbus sylvestris. Cam. epit. 161.

Habitat in Europæ frigidioribus. 5

2. SORBUS foliis pinnatis subtus tomentosis. *Hall. helv. domestico*.
351

Sorbus sativa. Bauh. pin. 415.

Sorbus legitima. Clus. I. p. 10.

Habitat in Europæ calidioribus. 5

PENTAGYNIA,

MESPILUS.

- germanica.* 1. MESPILUS inermis, foliis lanceolatis integerimis subtus tomentosis, calycibus acuminatis. *Hort. cliff.* 189. *Hort. upf.* 129. *Mat. med.* 236. *Roy. lugdb.* 270. *Behr. lips.* 174.
Mespilus germanica, folio laurino non serrato. *Baub. pin.* 453.
Mespilus. *Dod. pempt.* 801.
2. Mespilus, folio laurino, major. *Baub. pin.* 453.
Habitat in Europa australi. 5
- Pyracantha.* 2. MESPILUS spinosa, foliis lanceolato-ovatis crenatis, calycibus fructus obtusis. *Hort. cliff.* 189. *Vir. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 271.
Oxyacantha dioscoridis L. Spina acuta, pyri folio. *Baub. pin.* 454.
Uva urin. *Dalech. hist.* 164.
Habitat in Galloprovinciæ, Italiæ sepibus. 5
- arbutifolia.* 3. MESPILUS inermis, foliis lanceolatis crenatis subtus tomentosis. *Hort. cliff.* 189. *Roy. lugdb.* 271.
Sorbus virginiana, folio arbuti. *Herm. lugdb.* 578. t. 669.
Sorbus aucuparia virginiana, foliis arbuti, *Breyn. prodr.* 1. p. 15.
Habitat in Virginia. 5
- Ameionchier* 4. MESPILUS inermis, foliis ovalibus ferratis, caulinis hirsutis.
Mespilus inermis, foliis ovalibus ferratis acutis. *Hort. cliff.* 189. *Roy. lugdb.* 271.
Aini affigie, lanato folio, minor. *Baub. pin.* 452.
Vitis idæa III. *Cluf. hist.* 1. p. 75.
Habitat in Helvetia, Austria, Galloprovincia. 5
Tenella adhuc herba ramis petiolis pedunculis foliis subtus villosa-tomentosa est, adulta fructifera glabra lanum exuit.
- canadensis.* 5. MESPILUS inermis, foliis ovato-oblongis glabris ferratis, cauie inermi.
Mespilus inermis, foliis subtus glabris obverse-ovatis. *Grun. virg.* 54.
Habitat in Virginia, Canada. 5

6. *MESPILUS* foliis ovatis integerimis. *Hort. cliff.* *Cotoneaster.*
 189. *Fl. suec.* 403. *Roy. lugdb.* 271. *Hall. helv.* 352.
Cotoneaster folio rotundo non ferrato. *Baub. pin.* 452.
Chamaespilus gesneri. *Clus. hist.* 1. p. 60.
Chamaespilus cordi. *Baub. pin.* 452.
Habitat in Europa frigidioris collibus apricis inque Pyreneis, Ararat. b
7. *MESPILUS* inerimis foliis ovalibus serratis glabris, *Chamaespilus.*
 floribus capitatis, bracteis deciduis linearibus.
Crataegus foliis ovalibus utrinque glabris plicatis individis serratis. *Hort. cliff.* 497. *Vir. cliff.* 43. *Roy. lugdb.*
 272. *Hall. helv.* 353.
Cotoneaster folio oblongo ferrato. *Baub. pin.* 452.
Cotoneaster forte gesneri. *Clus. hist.* 1. p. 63.
Habitat in alpibus Austriacis, Pyrenaeis. b
Folia pruni argute serrata serraturis versus apicem inflexis tenuissimis, utrinque nuda. Stipulae lineares, petiolis longiores, deciduae. Corymbus ex aliis pedunculatus, conglobatus in capitalum, pedunculo subvillosi, foliis dimidio brevior. Bracteae inter flores lineares, flore longiores, coloratae, deciduae.

PYRUS.

1. *PYRUS* foliis serratis, foliis basi productis. *Hort. cliff.* *communis.*
 190. *Hort. upf.* 130. *Fl. suec.* 401. *Roy. lugdb.* 266.
Hall. helv. 351.

- Pyrus sylvestris.* *Baub. pin.* 439. *Dod. pent.* 351. *Pyraaster.*
Pyrus Bergamotta gallis. *Baub. hist.* 1. p. 45. *salernia.*
Pyrus boni christiani. *Baub. hist.* 1. p. 44. *pompejana.*
Pyrus jesu f. moschatellina rubra. *Baub. hist.* 1. p. 44. *favonia.*
Pyra dorsalia eademque liberalia dicta. *Baub. hist.* 1. p. *Volerna.*

53.
Habitat in Europa. b

2. *PYRUS* foliis serratis, pomis basi concavis. *Hort. cliff.* *Malus.*
 189. *Hort. upf.* 130. *Fl. suec.* 402. *Mat. med.* 237.
Roy. lugdb. 266. *Hall. helv.* 351.

- Malus sylvestris.* *Baub. pin.* 435. *Dod. pent.* 790. *sylvestris.*
Malus pumila, que potius frutex quam arbor. *Baub. paradisiaca.*
pin. 433. *prasmilia.*
Malus prasmilia. *Baub. pin.* 433. *prasmilia.*
Malus sativa, fructu sanguinei coloris ex austero sub-*rubelliana.*
dulci. *Tournef. inst.* 635. *celliana.*
Mala corymbifera dicta *Baub. hist.* 1. p. 21. *celliana.*

ζ. Po-

- spiratica.* 2. *Poma orbiculata.* *Ruell. stirp.*
Habitat in Europa. ♂
- coronaria.* 3. *PYRUS foliis ferrato-angulofisis.*
Malus sylvestris, floribus odoratis. *Gron. virg.* 55.
Habitat in Virginia. ♂
- Cydonia.* 4. *PYRUS foliis integerrimis.* *Hort. cliff.* 160. *Mat.*
med. 238. *Roy. lugdb.* 267.
Malus cotonea sylvestris. *Baub. pin.* 435.
β. *Malus cotonea major.* *Baub. pin.* 434.
γ. *Malus Cotonea minor.* *Baub. pin.* 434.
Cotonea & Cydonia. *Lob. hist.* 580.
Habitat ad ripas petrosas Danubii. ♂

TETRAGONIA.

- fruticosa.* 1. *TETRAGONIA foliis linearibus.* *Roy. lugdb.* 250.
Tetragonia. *Hort. cliff.* 188. *Hort. upf.* 126.
Tetragonocarpus africana rutilans, foliis longis & angustis. *Comm. hort.* 2. p. 205. t. 103.
Evonymo affinis africana, portulacæ folio. *Seb. thes.* 2.
p. 13. t. 11. f. 8.
Habitat in Æthiopia. 2
- herbacea.* 2. *TETRAGONIA foliis ovatis.* *Roy. lugdb.* 450
Tetragonocarpos africana, radice magna crassa & carnosæ. *Comm. hort.* 2. p. 203. t. 102.
Habitat in Æthiopia. ♂

MESEMBRYANTHEMUM.

* *Albis corollis.*

- nodifloram.* 1. *MESEMBRYANTHEMUM foliis alternis teretiusculis obtusis ciliatis.* *Hort. upf.* 129.
Kali crassulæ minoris foliis. *Baub. pin.* 289. *Moris.*
hist. 2. p. 610. f. 5. t. 33. f. 7.
Kali neapolitanum aizoides repens. *Col. ecphr.* 2. p.
72. t. 73.
Kali II. *Alp. egypt.* 125. t. 127.
Habitat in Ægypto, Neapoli. ⊙

- crystallinum* 2. *MESEMBRYANTHEMUM foliis. alternis ovatis obtusis undulatis.* *Hort. cliff.* 216. *Hort. upf.* 127.
Roy. lugdb. 281.
Mesembryanthemum crystallinum, plantaginis folio un-
duelato. *Dill. elib.* 231. t. 180. f. 211.

Ficoides africana, folio plantaginis undulato micis ar-
genteis adsperso. T. *Bradl. succ.* 5. t. 15. f. 48.
Habitat in Africa? ♂

3. MESEMBRYANTHEMUM foliis semiteretibus *geniculij-*
floribus sessilibus axillaribus. *rum.*

Mesembr. ramis undique papillosis folio crassioribus.
Hort. cliff. 218. *Roy. Lugd.* 285.

Mesemb. capense geniculiflorum neapoitanum creditum.
Dill. elth. 271. t. 205 f. 261.

Ficoides neapoitanus, flore candido. H. *Bradl. succ.* 5.
t. 17. f. 34.

Ficoides capense, folio tereti, flore albido, *Pet. gaz.*
t. 78. f. 3.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♂

4. MESEMBRYANTHEMUM foliis semicylindrica-*neotiflorum.*
cis, floribus quadifidis.

Mesembr. foliis subulatis semicylindricis laevibus vix
connatis apice recurvis. *Hort. cliff.* 220. *Roy. Lugd.*
286.

Mesembr. noctiflorum, flore intus candido extus phœ-
nicio odoratissimo. *Dill. elth.* 273. t. 206 f. 262.

- β. Mesemb. noctiflorum, flore intus candido extus phœ-
nicio odoratissimo. *Dill. elth.* 274. t. 206. f. 263.

Habitat in Africa. ♂

Calyx *hic quadrifidus*, styli 4, fructus quadrilocularis.

5. MESEMBRYANTHEMUM foliis subtrigonis su-*umbellatum.*
bulatis, caule eteflo, corymbo trichotomo.

Mesembr. frutescens, floribus albis umbellatis. *Dill.*
elth. 277. t. 208. f. 266.

Ficoides africana erecta teretifolia, floribus albis um-
bellatis. *Herm. par.* 166. t. 166. *Bradl. succ.* 4. p. 12
t. 44.

Habitat ad Caput b. Spei. ♀

6. MESEMBRYANTHEMUM acaule, foliis subterete-*calamiforme.*
tibus connatis, floribus octagynis.

Mesembr. calamiforme. *Dill. elth.* 239. t. 186. f. 228.

Ficoides capensis humilis, cepæ folio, flore stamineo,
Bradl. succ. 2. p. 10. f. 19.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♀

7. MESEMBRYANTHEMUM foliis lanceolatis pla-*Tripolium.*
nis crenulatis. *Hort. cliff.* 217. *Hort. nps.* 128. *Roy.*
Lugd. 283

H h

Me-

Mesembr. tripolii folio, flore argenteo. Dill. eltb. 230
i. 179. f. 220.

Ficoides africanum, Mesembryanthemum f. Ficus aizoïdes major procumbens, tripolii folio magis succulento denticulis fimbriato. Pluk. mant. 77. t. 329. f. 4.

Habitat in Africa. ♂

* *Rubicundis corollis.*

bellidiflorum 8. MESEMBRYANTHEMUM acaule, foliis triquetris linearibus apice trifariam dentatis. Hort. cliff. 218.*
Roy. lugdb. 283.

Mesembr. bellidiflorum. Dill. eltb. 244. t. 189 f. 233.

Habitat in Africa. ♀

deltoides. 9. MESEMBRYANTHEMUM caulescens, foliis deltoidibus triquetris dentatis. Hort. cliff. 218.* *Roy. lugdb.* 284.

Mesembr. deltoides & dorso & lateribus muricatis. Dill. eltb. 255. t. 195. f. 246.

Ficus aizoides africana erecta, folio triangulari breviusculo fimbriato, floribus roseis odoratis. Volk. hesp. 223. t. 224. f. 5.

β. Mesembr. deltoides, dorso & lateribus inuricatis, manus. Dill. eltb. 254. t. 196. f. 247..

γ. Mesembr. deltoides, non dorso sed lateribus muricatis. Dill. eltb. 253. t. 195. f. 243. 244.

Habitat in Africa. ♂

barbatum. 10. MESEMBRYANTHEMUM foliis apice barbatis. Hort. cliff. 216. * *Hort. upf.* 127. *Roy. lugdb.* 282.

Mesembr. radiatum, ramulis prolixis recumbentibus Dill. eltb. 245. t. 190. f. 234.

Ficoides capensis, tereti folio: apicibus hirtis. Pet. gaz. t. 77. f. 6.

Ficoides capensis frutescens, folio tumido extremitatestellata, flore purpureo, Bradl. succ. 1. p. 6. t. 5. ♂ 15.

Ficus aizoides, folio tereti in villos radiatos abeunte, flore rubro. Volk. hesp. 222. t. 124. f. 6.

β. Meseinbr. radiatum humile, foliis minoribus. Dill. eltb. 246. t. 190. f. 235.

γ. Meseinbr. radiatum humile, foliis majoribus. Dill. eltb. 248. t. 190. f. 236.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♂

bispinum. 11. MESEMBRYANTHEMUM caule hispido, foliis cylindricis deflexis.

Me-

- Mesembr. caule hispido. *Hort. cliff.* 217. * *Roy. lugdb.* 282.
 Mesembr. pilosum micans, flore saturate purpureo. *Dill.*
elth. 289. *t.* 277. *f.* 278.
 ♂. Mesembr. pilosum micans, flore purpureo pallidiore.
Dill. elth. 290. *t.* 214. *f.* 280. 279.
 ♀. Mesembr. pilosum micans, flore purpureo striato. *Dill.*
elth. 291. *t.* 215. *f.* 281.
 Ficoides f. *Ficus aizoides africana*, folio longo tenui,
 flore aurantio. *Bradl. succ.* 4. *p.* 13. *t.* 35.
Ficus aizoides teretifolia, foliis crystallino rore elegan-
 ter conspersis, floribus dilute roseis. *Volk. besp.* 221.
t. 224. *f.* 2.
Habitat: ad Cap. b. Spei. 5
12. MESEMBRYANTHEMUM caule foliisque pubescentibus *villosum*.
Hort. cliff. 217. * *Roy. lugdb.* 282.
Habitat in Africa. 5
13. MESEMBRYANTHEMUM foliis subulatis sub-*scabrum*.
 ius unicus scabris. *Hort. cliff.* 219. * *Hort. upf.* 129.
 Mesembr. purpureum *scabrum*, staminibus expansis *Dill.*
elth. 259. *t.* 197. *f.* 250.
 Ficoides capensis, triangulari folio acuto, flore purpu-
 reo. *Pet. gaz.* *t.* 77. *f.* 3.
 ♂. Mesembr. purpureum *scabrum*, staminibus collectis.
Dill. elth. 260. *t.* 197. *f.* 251.
Habitat in Africa. 5
14. MESEMBRYANTHEMUM articulis caulinis ter-*acuminatum*
 minatis in folia acuminata subtus dentata. *Hort. cliff.*
218. Roy. lugdb. 284.
 Mesembr. perfoliatum, foliis minoribus diacanthis. *Dill.*
elth. 250. *t.* 193. *f.* 239.
 ♂. Ficoides afra. folio triangulari glauco perfoliato brevis-
 limo apice spinoso. *Bradl. succ.* 3. *t.* 27.
 ♂. Mesembr. perfoliatum, foliis majoribus triacanthis. *Dill.*
elth. 251. *t.* 193. *f.* 240.
 Ficoides africana frutescens perfoliata, folio triangulari
 glauco punctato. *Bradl. succ.* 5. *p.* 13. *t.* 46.
Habitat in Africa. 5
15. MESEMBRYANTHEMUM spinis ramosis. *Hort. spinosum*.
cliff. 216. * *Roy. lugdb.* 231.
 Mesembr. struticescens, ramis triacanthis *Dill. elth.*
276. t. 208. *f.* 265.
 Ficoides africana, aculeis longissimis & foliolis nascend-
H h 2 *bus*

bus ex foliorum alis. *Tournef. act. 1705. p. 316*

Bradl. succ. 41. t. 39.

Habitat in Africa. ♂

- tuberosum.* 16. MESEMBRYANTHEMUM foliis subulatis papillosis, radice capitata. *Hort. cliff. 216. * Roy. lugdb. 282.*
Mesenibr. fruticescens, radice ingenti tuberosa. *Dill. elth. 275. t. 207. f. 264.*
Habitat in Africa. ♂

- tenuifolium.* 17. MESEMBRYANTHEMUM foliis subulatis semi-teretibus glabris internodio longioribus. *Hort. cliff. 220.*
Hort. upf. 128. Roy. lugdb. 286.
Mesembr. tenuifolium procumbens, folio tenuiore viridi, flore coccineo. *Dill. elth. 264. t. 201. f. 256.*
Ficoides capensis humilis teretifolia, fiore coccineo.
Bradl. succ. 1. p. 13. t. 9.
Ficoides africana minor procumbens, folio tenuiore viridi, flore coccineo. *Morij. hist. 3. p. 507. f. 12. t. 8. f. 6.*
Habitat in Africa. ♂

- stipulaceum.* 18. MESEMBRYANTHEMUM foliis subulatis subcylindraceis obsolete papillosis distinctis. *Hort. cliff. 220. Roy. lugdb. 287.*
Mesembr. frutescens, flore purpureo rariore. *Dill. elth. 279. t. 209. f. 267. 268.*
Habitat in Africa. ♂

- crassifolium.* 19. MESEMBRYANTHEMUM caule repente semi-cylindracco, foliis semicylindricis laevibus connatis apice triquetris. *Hort. cliff. 217. * Roy. lugdb. 283.*
Mesembr. crassifolium repens, fiore purpureo. *Dill. elth. 266. t. 201. f. 257.*
Ficoides africana reptans, folio triangulari viridi, flore saturate purpureo. *Bradl. succ. 4. p. 16. t. 38.*
Habitat in Africa. ♀

- falcatum.* 20. MESEMBRYANTHEMUM foliis acinaciformibus distinctis laevibus, ramis teretibus. *Hort. cliff. 219. * Roy. lugdb. 285.*
Mesembr. falcatum minimum, flore purpureo parvo. *Dill. elth. 288. t. 213. f. 276.*
Ficoides afra, folio triangulari ensiformi brevissimo, flore dilute purpurascente filamentoso. *Bradl. succ. 5. p. 9. t. 42.*
Habitat in Africa. ♂

* *Luteis corollis.*

21. MESEMBRYANTHEMUM foliis acinaciformibus *acinaciforme*
connatis: angulo cardinali scabris, ramis angulatis. *Hort. cliff.* 219. *Roy. lugdb.* 284.
Mesembr. acinaciforme, flore amplissimo purpureo. *Dill. purpureum elth.* 282. *t. 211. f. 270.* ♂ *t. 212. f. 271.*
♂. Metembr. falcatum majus, flore ample luteo. *Dill. elth. flavum.*
283. t. 212. f. 272.
Ficoides s. *Ficus aizoides africana major procumbens,*
triangulari folio, fructu maximo eduli *Herm. lugdb.*
244. t. 245. Moris. bist. 3. p. 506. f. 12. t. 7. f. 1.
γ. Mesembr. falcatum majus, flore purpureo mediocri.
Dill. elth. 285. t. 211. f. 273.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♂
22. MESEMBRYANTHEMUM foliis subtriquetris *bicolor.*
scabris, corollis bicoloribus.
Mesembr. tenuifolium frutescens, flore croceo. *Dill. elth. 207. t. 202. f. 258.*
Ficoides s. *Ficus aizoides africana minor erecta, triangulari folio viridi, flore intus aureo; foris purpureo.*
Herm. lugdb. 250. t. 249. Moris. bist. 3. p. 507. f. 12. t. 6. f. 4.
Ficoides capensis frutescens, folio tereti punctato, petalis luteis. *Bradl. succ. 1. p. 8. t. 7.*
Habitat in Africa. ♂
Corolla extus purpurea, intus flavæ.
23. MESEMBRYANTHEMUM foliis subulatis tri-*serratum,*
quetratis: angulo cardinali retrosum serratis. *Hort. cliff.*
218. Roy. lugdb. 284.
Mesembr. serratum, flore acetabuliformi luteo. *Dill. elth. 249. t. 192. f. 238.*
Habitat in Africa. ♂
24. MESEMBRYANTHEMUM foliis subulatis sub-*micans.*
cylindraceis papillotis distinctis, caule scabro. *Hort. cliff. 220. * Roy. lugdb. 287.*
Mesembr. *micans*, flore phœnicco: filamentis atris.
Dill. elth. 292. t. 215. f. 282.
Ficoides capensis, tereti folio, flore croceo. *Pet. gaz. t. 7. f. 9.*
Ficoides capensis, folio tereti argenteo, petalis perplurimis aurantiacis. *Bradl. succ. 1. p. 9. t. 8.*
Habitat ad Cap. b. Spei. ♂

- splendens.* 25. MESEMBRYANTHEMUM foliis linearibus obsolete triquetris distinctis: summis imbricatis laevibus. *Hort. cliff.* 220. *
 Mesembr. foliis confertis splendentibus, flore pallido. *Dill. elth.* 270. t. 204. f. 260.
Ficoides capensis frutescens, foliis teretibus confertis glaucis, flore albo. *Bradl. succ.* 1. p. 7. t. 6.
 ♂ Mesembr. foliis triquetris gibbis oppositis imbricatis, ramis inferne nudis. *Hort. cliff.* 220. *Roy. lugdb.* 286.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♀
- rostratum.* 26. MESEMBRYANTHEMUM acaule, foliis semi-cylindricis connatis externe tuberculatis. *Hort. cliff.* 219. *Roy. lugdb.* 285.
 Mesembr. rostrum ardeæ referens. *Dill. elth.* 240. t. 186. f. 279.
Habitat in Africa. ♀
- verruculatum.* 27. MESEMBRYANTHEMUM foliis subcylindricis acutis connatis arcuatis laevibus. *Hort. cliff.* 220. *Hort. upf.* 128. *Roy. lugdb.* 285.
 Mesembr. foliis verruculiformibus, floribus mellinis umbellatis. *Dill. elth.* 268. t. 203. f. 259.
Habitat in Africa. ♂
- glaucum.* 28. MESEMBRYANTHEMUM foliis subulatis triquetris strictis acutis: punctis pellucidis obsoletis sparsis. *Hort. cliff.* 220. *Roy. lugdb.* 283
 Mesembr. scabrum, flore sulphureo convexo. *Dill. elth.* 156. t. 196. f. 248.
Ficoides africana frutescens, folio triangulari breviore glauco. *Morif. hist.* 3. p. 507. f. 12. t. 5. f. 3.
Ficoides afra, caule lignoso, erecta, folio triangulari ensiformi scabro, flore luteo magno. *Bradl. succ.* 4. p. 15. t. 32.
Ficoides s. Ficus aizoïdes africana minor erecta, folio triangulari glauco, flore luteo. *Herm. lugdb.* 247. t. 248.
Habitat in Africa. ♂
- loreum.* 29. MESEMBRYANTHEMUM caulescens, foliis subulatis semicylindricis recurvis connatis longis. *Hort. cliff.* 219. *. *Hort. upf.* 128. *Roy. lugdb.* 285.
 Mesembr. foliis corniculatis longioribus. *Dill. elth.* 262. t. 199. f. 253. 254.
Ficoides capensis, folio triangulari, flore luteo intus pallido. *Pet. gaz.* t. 77 f. 10.

♂ Me

$\delta.$ Mesembr. foliis corniculatis brevioribus. Dill. elth. 261. t. 198. f. 252.

Ficoides africana reptans, folio triangulari crasso longissimo, flore intus luteo extus aurantiaco. Bradl. succ. 4. p. 18. t. 40.

$\gamma.$ Mesembr. loreum. Dill. elth. 264. t. 200. f. 255.
Habitat in Africa. 2

30. MESEMBRYANTHEMUM foliis planis oppositi tortuosum. tis ovatis acuminatis connatis integerrimis. Hort. cliff. 217. * Roy. lugdb. 283.

Mesembr. tortuosum, foliis sempervivi expansis. Dill. elth. 234. t. 182. f. 223.

Ficoides capensis, folio lato acuto, flore albo intus luteo, Pet. gaz. t. 78. f. 10.

Ficoides africana procumbens, foliis planis conjugatis lucidis. Bradl. succ. 3. p. 7. t. 16.

$\beta.$ Mesembr. tortuosum, foliis sempervivi congestis. Dill. elth. 233. t. 181. f. 222.

Ficoides capensis procumbens, oleæ folio, flore albo medio croceo. Bradl. succ. 2. p. 7. t. 16.

Habitus ad Cap. b Spei. 2

Petala exteriora albida, interiora flava sunt.

31. MESEMBRYANTHEMUM subacuale, foliis ci-[•]dentatis. listo-dentalis. Hort. cliff. 218. * Roy. lugdb. 283.

Mesembr. riëtum caninum referens. Dill. elth. 241. t. caninum. 188. f. 231.

Ficoides capensis humilis, folio triangulari prope summitatem dentato, flore luteo. Bradl. succ. 2. p. 8. t. 17.

$\beta.$ Mesembr. riëtum felinum repræsentans. Dill. elth. 240. felinum. t. 187. f. 230.

Ficoides afra, folio triangulari ensiformi crasso brevi ad margines laterales multis majoribus spinis aculeato. Mart. cent. 30. t. 30.

Habitus ad Cap. b Spei. 2

32 MESEMBRYANTHEMUM foliis dolabritorni-^{dolabritorni-} bus. Hort. cliff. 219. Roy. lugdb. 284.

Mesembr. folio dolabritorni. Dill. elth. 248. t. 191. f. 237.

Ficoides capensis humilis, foliis cornua cervi referentibus, petalis luteis, noctiflora. Bradl. succ. 1. p. 11. t. 10.

Habitat in Africa. 2

33. MESEMBRYANTHEMUM foliis difformibus difforme. Roy. lugdb. 287.

Mesembryanth. foliis difformibus, flore luteo. *Dill. elth.* 252. *t.* 194. *f.* 241. 242.

Ficoides Mesembryanthemum crassissimo & valde succulento folio nigris punctis notato. *Pluk. alm.* 148. *t.* 225. *f.* 4.

Habitat in Aethiopia. 5

inguiforme. 34. *MESEMBRYANTHEMUM* acaule, foliis linguiformibus altero margine crassioribus. *Hort. cliff.* 219. *Hort. upf.* 128. *Roy. lugdb.* 282

Mesembryanth. folio scalprato. *Dill. elth.* 235. *t.* 183. *f.* 224.

β. *Mesembr.* folio linguiformi latiore. *Dill. elth.* 236. *t.* 184. *f.* 224.

γ. *Mesembr.* folio linguiformi angustiore. *Dill. elth.* 238. *t.* 185. *f.* 226.

δ. *Mesembr.* folio linguiformi longiore. *Dill. elth.* 23. *t.* 185. *f.* 227.

Habitat in Africa. 24

Hec Decagyna est.

pugioniforme. 35. *MESEMBRYANTHEMUM* foliis alternis subulatis triquetris longissimis. *Hort. cliff.* 216. * *Hort. upf.* 129. *Roy. lugdb.* 281.

Mesembr. folio pugioniformi, flore ampio stramineo. *Dill. elth.* 280. *t.* 210. *f.* 269.

Ficus capensis, caryophylli folio, flore aureo speciosa. *Bradl. succ.* 2. *p.* 5. *t.* 14.

Habitat ad Cap. b. Spei. 5

Hec polygyna est.

AIZOON

canariense. 1. *AIZOON* foliis cuneiformi-ovatis, floribus sessilibus. *Hort. upf.* 127.

Aizoon foliis obverse ovatis. *Hort. cliff.* 41, *Roy. lugdb.* 221.

Ficoidea procumbens, portulacæ folio. *Niss. act.* 1711. *p.* 422. *t.* 13. *f.* 1.

Kali aizoides canariensis procumbens. *Pluk. alm.* 202. *t.* 304. *f.* 4. *Volk. norib.* 236. *t.* 236.

Habitat in Canariis. ◎

hispanicum. 2. *AIZOON* foliis lanceolatis, floribus sessilibus.

Ficoidea hispanica annua, folio longiore. *Dill. elth.* 143. *t.* 117. *f.* 143.

Habitat in Hispania. ◎

paniculatum 3. *AIZOON* foliis lanceolatis, floribus paniculatis.

Aizo-

Aizoon foliis lanceolatis subtus hirsutis. *Roy. lugdb.* 221.
Habitat in Africa.

SPIRÆA.

1. SPIRÆA foliis lanceolatis obtusis ferratis nudis, floribus *saliifolia*,
 bus duplicato-racemosis. *Hort. cliff.* 191. *Hort. upf.*
 131. *Roy. lugdb.* 277.
Spiræa theophrasti forte. *Clus. hist.* t. p. 30.
Fratex spicatus, foliis ferratis salignis. *Baub. pin.* 475.
Spiræa salicis folio longiore ferrato, floribus rubris.
Amm. ruth. 265.
Habitat in Sibiria, Tataria. 5
2. SPIRÆA foliis lanceolatis inæqualiter ferratis subtus *tomentosæ*,
 tomentolis, floribus duplicato-racemosis.
Ultmaria pentacarpos, integris ferratis foliis parvis sub-
 tus incanis, *virginiana*. *Plak. alm.* 393. t. 321 f. 5.
Habitat in Philadelphia. *Kalm.* 5
Differt a precedenti: *Foliis magis profunde & inæquali-*
ter ferratis; *foliis subtus valde tomentosis adeoque*
crassis; *racemo terminali composito densiori longiori*.
Floribus demum magis rubris, & *Corollis octuplo-min-*
noribus.
- 3 SPIRÆA foliis integerrimis, umbellis sessilibus. *Hort. hypericifolia*
upf. 131.
Spiræa foliis integerrimis, pedunculis simplicibus. *Hor.*
cliff. 190. *Roy. lugdb.* 277.
Pruno sylvestri affinis *canadensis*. *Baub. pin.* 517. *Plak.*
alm. 308. t. 218. f. 5.
Habitat in Canada. 5
4. SPIRÆA foliis ovatis inciso-ferratis glabris, umbellis *chamædrycæ-*
tinæ,
 pedunculatis.
Spiræa chamædryos foliis. *Amm. ruth.* 269.
Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.* 5
5. SPIRÆA foliis oblongiusculis apice ferratis, corymbis *crenata*,
 lateralibus.
Spiræa hispanica, *hyperici* folio crenato. *Barr. rar.* 1376.
 t. 564.
Spiræa hyperici folio ampliore, modo integro modo den-
 tato. *Amm. ruth.* 270.
Habitat in Sibiria, Hispania. 5
6. SPIRÆA foliis lobatis ferratis, corymbis terminalibus. *sp. folia*.

Spiræa foliis incisis angulatis, floribus corymbosis. *Hort. cliff.* 190. *Gron. virg.* 55. *Roy. lugdb.* 277.

Evonymus virginiana, ribesii folio, capsulis eleganter bullatis. *Comm. hort.* 1. p. 169. t. 87.

Habitat in Virginia, Canada. 5

farbifolia. 7. *SPIRÆA* foliis pinnatis, foliolis uniformibus serratis, caule fruticolo, floribus paniculatis.

Spiræa foliis pinnatis. *Aman. acad.* 2. p. 352. *

Spiræa sorbi folio crenato, floribus in thyrsos albis. *Amm. ruth.* 186.

Habitat in Sibiriæ uliginosis. 5

Aruncus. 8. *SPIRÆA* foliis supradecompositis, spicis paniculatis, floribus dioicis.

Aruncus. *Hort. cliff.* 463. *Roy. lugdb.* 278. *Gron. virg.* 121.

Barba capræ floribus oblongis. *Bauh. pin.* 163.

Barba capræ. *Cam. hort.* 26. t. 9.

Habitat in Austriæ. Alvernæ montauis. 2

Filipendula. 9. *SPIRÆA* foliis pinnatis: foliolis uniformibus serratis, caule herbaceo, floribus cymosis.

Filipendula foliis pinnatis: foliolis uniformibus. *Flort. cliff.* 191. *Fl. suec.* 404. *Mat. med.* 239. *Roy. lugdb.* 277.

Filipendula vulgaris. *Bauh. pin.* 163.

Filipendula. *Cam. epst.* 658.

Habitat in Europæ pajuis. 2

Ulmaria. 10. *SPIRÆA* foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymosis. *Fl. lapp.* 201. *Hort. cliff.* 191. *Fl. suec.* 405. *Mat. med.* 241. *Roy. lugdb.* 277.

Barba capræ floribus compactis. *Bauh. pin.* 164.

Regina prati *Dod. pempt.* 57.

Habitat in Europæ pratis uliginosis, umbrosis. 2

nifolinta. 11. *SPIRÆA* foliis ternatis serratis subæqualibus, floribus subpaniculatis.

Filipendula foliis ternatis. *Hort. cliff.* 191. *Hort. npf.* 131. *Roy. lugdb.* 277. *Gron. virg.* 55.

Ulmaria major trifolia, flore amplio pentapetalo, *virginiana*. *Pluk. alm.* 393. t. 236. f. 5. *Raj. suppl.* 330.

Ulmaria virginiana trifolia, floribus candidis amplissimis & acutis. *Moris. bist.* 3. p. 322.

Habitat in Virginia, Canada.

I ALIBARDA

DALIBARDA

*repens**Habitat in Canada. Kalm. 2*

*Radix repens. Stolones reptantes, herbacei. Folia cor-
data, obtusa, obtuse crenata, venoja, pilis raris ad-
spersa. Petioli pilosi, foliis sèpius longiores. Scapi nudi,
pilosi, longitudine petiolorum, uniflori. Calyx quinque-
partitus. Corolla alba. Semina 5, nuda, avata. Di-
versa Rubo seminibus nudis.*

POLYGYNIA.

ROSA.

1. ROSA inermis, calycis foliolis indivisis, fructu ob- cinnamomeo
longo. *Hall. belv. 348.*
*Rosa sylvestris, odoratissimo rubro flore. Bauh. pin.
483*
Habitat in Helvetia. 5
2. ROSA aculeata, foliis odoratis subtus rubiginosis. *Hall. eglanteria.
belv. 350. Dalib. parisi. 145.*
Rosa sylvestris, foliis odoratis. Bauh. pin. 483.
Rosa eglanteria. Tabern. ic. 1087.
Habitat in Helvetia, anglia. 5
3. ROSA foliis utrinque villosis, fructu spinoso. *Hall. villosa.
belv. 350.*
Rosa sylvestris pomifera major. Bauh. pin. 484.
Habitat in Europa australi. 5
4. ROSA caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus canina-
semipinnatis. *Fl. suec. 406.*
*Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. Bauh.
pin. 483.*
Habitat in Europa. 5
5. ROSA caule petiolisque aculeatis, calycis foliolis in- *spinosissima.*
divisis. *Fl. suec. 407.*
*Rosa campestris spinosissima, flore albo odorato. Bauh
pin. 483.*
Habitat in Europa. 5
6. ROSA caulo aculeato, pedunculis hispidis, calycibus *centifolia.*
semipinnatis glabris.
Rosa multiplex media Bauh. pin. 482.

Ro-

Rosa centifolia batavica 11. *Clus. hist.* 1. p. 114.
Habitat in Europa. ♂

- alba* 7. *ROSA caule aculeato, pedunculis levibus, calycibus semipinnatis glabris.*
Rosa alba vulgaris major. *Baub. pin.* 482.
Rosa alba, flore pleno. *Best. cyt. vern.* 6. t. 3. f. 1.
Habitat in Europa. ♂
- gallica.* 8. *ROSA foliis carinatis subtus scabris.* *Dalib. paris.* 145.†
Habitat in Gallia. ♂
- indica.* 9. *ROSA subinermis, foliolis quinis subtus tomentosis: impari majori, stipulis obsoletis.*
Rosa chusan glabra, juniperi fructu. *Pet. gaz.* 56. t. 35. f. 11.
Habitat in China, ♂
Rami inermes; rarius armati una alterave spina tenuissima versus folia vel in petiolis. Folia pinnata: Foliolis quinis, subtus tomentosis, supra glabris, serratis: extimo duplo majore. Pedunculi longi, nudi, simplices. Calyx incisus, levis. Fructus magnitudine Sorbi aucupariae. Species Rosarum difficile distinguuntur, difficilius determinantur; mihi videtur naturam mischisse plures vel lusu ex uno plures formasse; hinc qui paucas vidit species facilius eas distinguit, quam qui plures examinavit.
- semperfiriens.* 10. *ROSA caule aculeato, foliolis quinis glabris perennantibus.*
Rosa sempervirens jungermanni. *Clus. hist.* 2. app. alt.
Dill. elth. 326. t. 246. f. 318.
Rosa moschata sempervirens. *Baub. pin.* 482.
Habitat in Germania. ♂
- pendulina.* 11. *ROSA fructibus oblongis pendulis.*
Rosa sangvisorae majoris folio, fructu longo pendulo.
Dill. elth. 325. t. 245. f. 317.
Habitat in Europa. ♂
- carolina-* 12. *ROSA foliis serratis medio tenus integerrimis.*
Rosa carolina fragrans, foliis medio tenus serratis. *Dill. elth.* 325. t. 245. f. 316.
Habitat in Carolina.
- RUBUS.
- * *Frutescentes.*
- idea-* 1. *RUBUS foliis quinque-pinnatis ternatisque, caule aculea-*

culeato, petiolis canaliculatis. *Fl. suec.* 408. *Mat. med.* 242.

Rubus caule erecto hispido, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 204. *Hort. cliff.* 192. *Hort. upf.* 133. *Roy. lugdb.* 273

Rubus idæus spinosus. *Baub. pin.* 479.

β. *Rubus* idæus fructu albo. *Baub. pin.* 479.

γ. *Rubus* idæus lœvis. *Baub. pin.* 479.

Habitat in Europæ lapidosis. 2-3

2. RUBUS foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule a-occidentalis culeato, petiolis teretibus.

Rubus foliis longioribus subtus molli lanugine obductis & incanis, flore & fructu minoribus. *Sloan. jsm.* 173. *bifl.* 2. p. 109. t. 213. f. 1. *Raj. dendr.* 76.

Rubus idæus, fructu nigro, virginianus. *Dill. elth.* 327. t. 287. f. 319.

Habitat in Canada. *Kalm.*

Caulis teres, levis; aculeis recurvis. Petioli teretes aculeis recurvis. Folia ternata, intermedio pedicellato, ovata, inciso-serrata, subtus albo-tomentosa. Racemus terminalis. Fructus niger, varias etiam fructurubro. magis acido quam *R. idæi*. Differt imprimis a *R. idæo*, cui simillimus, petiolis teretibus nec canaliculatis.

3. RUBUS foliis ternatis nudis, caulis petiolisque hispidis.

Habitat in Canada. *Kalm.* 5

Caulis viticulis longis, procumbentibus, lignosis, una cum petiolis adspersi setis rigidis. Folia ternata, nuda, inciso-serrata; intermedio pedicellato; pedunculi etiam hispidi.

4. RUBUS foliis ternatis nudis, caule aculeato: *Hort. cæsus.* cliff. 192. *Fl. suec.* 163. *Gron. virg.* 163. *Roy. lugdb.* 273. *Hall. belv.* 344.

Rubus repens, fructu cæsio. *Baub. pin.* 479.

Rubus minor. *Dod. pempt.* 742.

Habitat in Europæ dumetis. 5

Folia subtus non tomentosa, quamvis sœpe pubescentia.

5. Rubus foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolis-fruticosus. que aculeatis. *Fl. suec.* 409.

Rubus caule aculeato, foliis ternatis ac quinatis. *Hort. cliff.* 192. *Gron. virg.* 163. *Roy. lugdb.* 273.

Rubus vulgaris f. *Rubus* fructu nigro. *Baub. pin.* 479.

Rubus. *Com. epit.* 751.

β. *Rubus* vulgaris major, fructu albo. *Raj. angl.* 3. p. 467. γ. *Ru-*

2. *Rubus flore albo pleno. Magn. Hort. 175.*

Habitat in segribus praesertim maritimis Europæ. 5

~~anadensis.~~ 5. **RUBUS** foliis digitatis denis quinis ternatisque, caule inermi.

Habitat in Canada. Kilm.

Caulis subpurpureus. Foliola lanceolata, utrinque nuda, tenuissima, argute serrata. Bractæ lanceolatæ. Stipulæ lineares, acutæ.

~~odoratus~~ 7. **RUBUS** foliis simplicibus palmatis, caule inermi multifolio multifloro. *Hort. cliff. 192. * Hort. upf. 133.*

Roy. lugdb. 274.

Rubus odoratus. Carn. canad. 149. t. 150.

Habitat in Canada. 2-5

* *Herbacei.*

saxatilis. 8. **RUBUS** foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis. *Fl. suec. 411.*

Rubus caule repente annuo, foliis ternatis. Fl. lapp. 206. Roy. lugdb. 274. Hall. helv. 344. Roy. lugdb. 274.

Chamæ Rubus saxatilis. Bauh. pin. 110.

Habitat in Europæ collibus lapidosis. 2

~~arcticus.~~ 9. **RUBUS** foliis ternatis, caule inermi unifloro. *Fl. suec. 412. Mat. med. 244.*

Rubus caule unifloro, foliis ternatis. Fl. lapp. 207. t. 5. f. 2. Hort. cliff. 292. Roy. lugdb. 274.

Rubus humilis, flore purpureo. Buxb cent. 5. p. 13. t. 26. mala.

Rubus trifolius humilis non spinosus, sapore & odore fragariæ, fructu rubro polycocco. Amm. ruth. 185.

Habitat in Bothnia Sueciae, Sibiria, Canada. 2

Chamæmo- 10. **RUBUS** foliis simplicibus lobatis, caule unifloro. *Fl. suec. 413. Mat. med. 244.*

Rubus caule bifolio unifloro, foliis simplicibus. Fl. lapp. 208. t. 5. f. 1. Hort. cliff. 192. Roy. lugdb. 279.

Chamæ Rubus foliis ribes. Bauh. pin. 480.

Morus norvegica. Till. abvens. 47. t. 150.

Habitat in Sueciae paludibus uliginosis, turfosis frequens. 2

FRAGARIA.

vesca. **FRAGARIA** flagellis reptans. *Hort. cliff. 192. Hort. upf. 133. Fl. suec. 414. Mat. med. 245. Roy. lugdb.*

274. Hall. helv. 243.

Fra-

- Fragaria vulgaris.* *Baub. pin.* 326. *Fl. lapp.* 209. *Gron. sylvestris.*
virg. 56.
- Fragaria fructu albo.* *Baub. pin.* 326.
- B.* *Fragaria fructu parvi pruni magnitudine.* *Baub. pin. sativa.*
327.
- γ.* *Fragaria chiloensis, fructu maximo, foliis carnosis hirsutis.* *chiloensis.*
Dill. etb. 145. *t. 120. f. 146.*
- Habitat in Europæ borealis flerslibus, duris, apricis.* 2
2. *FRAGARIA* caule erecto suffruticoso, foliis hirsutis. *muricata.*
Fragaria arborea, flore herbaceo. *Zan. hist.*
- Fragaria major vesca,* flore herbaceo, *Moris. hist.* 2. p.
186.
- Habitat in - - - - b*
- Folia inter flores distinguunt hanc a prima.*
3. *FRAGARIA* caule decumbente repente. *Roy. lugdb. sterilis.*
274. *Dalib. paris.* 147. *Sauv. monsp.* 177.
- B.* *Fragaria sterilis.* *Baub. pin.* 327.
- Fragaria sterilis* f. *minime vesca hirsuta minime incana.*
Moris. hist. 2. p. 196. f. 2. t. 19. f. 5.
- Fragaria sylvestris* *minime vesca* f. *sterilis.* *Lob. ic.* 698
- Habitat in Anglia.* 2
- Caules procumbentes, nullus rectus; Pedunculi axillares,*
uniflori; Foliola ovalia; Baccæ exsuccæ.

POTENTILLA

* *Foliis pinnatis.*

1. *POTENTILLA* foliis pinnatis, caule fruticoso. *Hort. fruticosa.*
cliff. 193. *Fl. suec.* 416. *Roy. lugdb.* 275.
- Pentaphylloides rectum fruticosum eboracense.* *Moris.*
hist. 2. p. 193. f. 2. t. 23. f. 5. *Hortul. angl.* 54
t. 54.
- Pentaphylloides rectum frutescens.* *Walth. hort.* 95. t. 17
- Pentaphylloides fruticosa elatior.* *Amm. rath.* 88. t. 17.
& 89. t. 18. f. 1.
- Habitat in Eboraco, Anglia, Oelandia australi, Sibiria.* b
2. *POTENTILLA* foliis pinnatis serratis, caule repente. *Anserina*
Fl. lapp. 210. *Fl. suec.* 415. *Hort. cliff.* 193. *Mat.*
med. 246. *Roy. lugdb.* 275.
- Potentilla.* *Baub. pin.* 321. *Cam. epit.* 758.
- Habitat in Europæ paucis; in argillosis argentea.* 2
3. *POTENTILLA* foliis bipinnatis utrinque tomento-*serice-*
fisis; segmentis parallelis approximatis, caulis decum-
bentibus. Po-

Potentilla foliis duplicato-pinnatis: pinnulis linearibus integrimis brevibus. *Gmel. mss.*

Habitat in Siberia. 2

Habitus foliorum P. anserinæ argenteæ, quamvis minima sunt; caulis vero & fructificationes P. verne. Radix squamis foliorum ruderibus nigris vestita. Folia pinnata ex 13 circiter foliolis ovatis, tomentosis, sericeis, pectinato-pinnatifidis, & parallelis. Pedunculi pilosi. Caules foliis duplo s. triplo longiores, decumbentes absque farmentis, nec repentes, in media solis unico minori magisque divaricato instruti, teretes, apice Floribus aliquot luteis, alternis, penduculatis.

multiplici.

4. *POTENTILLA* foliis bipinnatis: segmentis integrimis distantibus subtus tomentosis, caule decumbente. *Pentaphylloides supinum minus, folio glabro, non serrato.* *Amm. ruth. 116.*

Pentaphylloides repens, foliis pinnatis. *Bauh. cent. 1. p. 30. t. 49. f. 1.*

5. *Pentaphylloides supina minor, foliis alatis hirsutis varie dissecatis.* *Amm. ruth. 117.*

Habitat in Siberia, Tataria, Cappadocia. 2

Habitus multa indicat affinitatem cum P. argentea. Folis ex septem foliolis, segmentis linearibus s. lanceolatis, quinis s. summum septenis, alternis, at in impari oppositis, a se invicem bicantibus sive apice remotis, subtus tomentosis.

fragarioides. 5. *POTENTILLA* foliis pinnatis ternatisque: extimis majoribus, flagellis reptantibus.

Potentilla foliis ternatis hirsutis utrinque viridibus: lobatis accessoriis. *Gmel. mss.*

Habitat in Siberia. 2

Facies Fragariae sterilis. Radix subtuberosa. Folia sericea petiolis pilosis, pinnata ex 3. 5. vel 7. Foliolis ovatis, oppositis, serratis, basi quo propioribus eominiорibus. Stolones decumbentes.

repens.

6. *POTENTILLA* foliis pinnatis alternis: foliolis quinque ovatis crenatis, caule erecto. *Hort. cliff. 193. It. wgoth. 63. 76. Roy. lugdb. 275.*

Pentaphylloides erectum. *Bauh. hist. 2. p. 398. Moris. hist. 2. p. 192. s. 2. t. 20. f. 1.*

Quinquefolium fragiferum. *Bauh. pin. 326. Clus. hist. 2. p. 107. n. 5.*

Ha-

*Habitat ad latera montium Westrogothiæ, Sibiriæ,
Germaniæ. ♀*

7. POTENTILLA foliis pinnatis subæqualibus: foliolis *bifurca*.
oblongis sub-bifidis: extimus confluentibus.

Pentaphylloides orientale supinum, foliis alatis bifidis
vel trifidis. *Tournef. cor. 21.*

Habitat in Sibiria. ♀

8. POTENTILLA foliis pinnatis: foliolis subrotundis *pimpinellæ-*
dentatis æqualibus, caule erecto. *des.*

Pentaphylloides orientale erectum, folio & facie pimpinelliæ.
Tournef. cor. 21. Buxb. cent. 1. p. 30. t. 48.

Habitat in Armeniae saxosis. ♀

9. POTENTILLA foliis pinnatis, caule dichotomo de-*supina*.
cumbente. *Hort. cliff. 193. Hort. upf. 133. Roy.*
Iugdb. 275.

Pentaphyllum alpinum minus supinum. *Pluk. alm. 285.*
t. 106. f. 7.

Pentaphyllum supinum quorundam, potentillæ facie.
Clus. hist. 2. p. 107.

Quinquefolio fragifero affinis. *Bauh. pin. 326.*

Habitat ad Moguntiam & in Sibiria. ♂

* *Foliis quinatis.*

10. POTENTILLA foliis digitatis lanceolatis serratis *redit.*
utrinque subpilosis, caule erecto.

Potentilla foliis digitatis, caule erecto corymboso. *Hort.*
*upf. 133. * Roy. Iugdb. 275.*

Quinquefolium rectum luteum. *Bauh. pin. 325.*

Quinquefolium alterum vulgare *Dod. pent. 116.*

Habitat in Italia, Narbona, ad agrorum margins. ♂

Folia utrinque viridia, et adulta sere nuda.

11. POTENTILLA foliis quinatis cuneiformibus incis-*argentea*.
sis subtus tomentosis, caule erecto.

Potentilla foliis digitatis, caule erecto corymboso. *Hl.*
suec. 417.

Potentilla foliis digitatis inciso-serratis, caule erecto.
Hort. cliff. 193.

Quinquefolium folio argenteo. *Bauh. pin. 325.*

Pentaphyllum minus. *Cam. epit. 760.*

Habitat in Europæ ruderatis. ♀

12. POTENTILLA foliis septenis quinatisque cuneiformi-*birta*.
bus incisis pilosis, caule adscendente.

Quinquefolium montanum rectum hirsutum. *Baub. pin.*
325. *prodr.* 139.

Habitat Montpelii *D. Sauvages*; *inque Pyrenæis.* 2
Diffrerit a præcedente Foliis radicalibus septenis, & sub-
tus longis distinctis pilis hirsutis, nec tomentosis, apice
argutius furcatis. Pedunculi uniflori, longi.

Lipularis. 13. POTENTILLA foliis digitatis sessilibus stipulæ in-

sidentibus.

Potentilla foliis novenis stipulis-insidentibus. *Gmel. miss.*
Habitat in Sibiria. 2

Caulis adscendens, filiformis, lœvis, apice divisus. Sti-

pulæ amplexicaules, solitarie, emarginatæ. Foliola
8. ad 9. lineari-lanceolata, subjerrata, glabra, ex e-

marginatura stipulæ pendentia absque petiolo.

verna. 14. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis acute
serratis, caulinis ternatis, caule declinato. *Fl. succ.*
419.

Potentilla foliis quinatis incisis, caule assurgentæ. *Fl.*
lapp. 212. *Hort. cliff.* 194. *Roy. lugdb.* 276.

Potentilla foliis quinatis acute serratis ora sericea, pe-

talibus maculatis. *Hall. helv.* 339. t. 6. f. 4.

Quinquefolium minus repens alpinum aureum. *Baub.*
pin. 325.

Habitat in Europæ pascuis siccis, frigidioribus. 2

canadensis. 15. POTENTILLA foliis quinatis villosis, caule ad-

scendente hirsuto.

Habitat in Canada. *Kalm.*

Habitus fragarie. Folia radicalia quinata: foliolis ob-

verse ovatis, acute serratis, supra pubescentibus, sub-

tus villosis albo-sericeis, petiolis valde albo hirsutis.

Caulis digitalis, ramosus, rarioribus foliis. Corollæ
luteæ. Similis præcedenti, a qua differt Foliis valde
pilosis, argute serratis, subrotundis & Caule valde
hirsuto.

alba. 16. POTENTILLA foliis digitatis apice conniventí-serrati-

s, caulinis filiformibus procumbentibus, receptacu-

lis hirsutis. *Hort. cliff.* 194. *Roy. lugdb.* 276.

Quinquefolium album. *Hall. it. helv.* 70.

Quinquefolium : lbum minus alterum. *Baub. pin.* 325

Pentaphyllum majus, flore albo. *Clas. hist.* 2. p. 105.

2. Quinquefolium album majus. *Baub. prodr.* 325.

Quin-

Quinquefolium album minus. *Baub. pin.* 325. *prodr.*

139.

Habitat in alpibus Stiriae, Austriae, Panonie. ♀

17. POTENTILLA foliis digitatis, caule repente, per-
dunculis unifloris. *Fl. suec.* 418. *Mat. med.* 247.

Potentilla foliis digitatis longitudinaliter patent-serratis,
caule repente. *Hort. cliff.* 194. *Gron virg.* 163.

Quinquefolium majus repens. *Baub. pin.* 325.

Quinquefolium majus luteum. *Fuchs. hist.* 624.

Habitat in Europae apricis argillosis. ♀

* *Foltis ternatis.*

18. POTENTILLA foliis ternatis, caule ramoso etc.
monspeliensis
etc., pedunculis supra genicula enatis. *Hort. upf.*
134. *

Pentaphylloides majus erectum, flore luteo. *Moris. hist.*

2. p. 193; f. r. 20. f. 2.

Pentaphylloides fragariæ folio. *Magn. monsp.* 304.

Fragaria sterilis alpina caulescens. *Boerh. lugdb.* 1. p. 42.

Habitat Monspelii. ♂

Foliola ovata, obtusa, obtuse & equaliter serrata.

19. POTENTILLA foliis ternatis, caule dichotomo, norvegico.
pedunculis axillaribus.

Potentilla foliis ternatis, caule corymbofo erecto. *Fl.
suec.* 420.

Potentilla foliis ternatis incisis, caule diffuso. *Fl. lapp.*
211. *Hort. cliff.* 193. *Roy. lugdb.* 275.

Quinquefolium hirsutum luteum paucioribus laciinis.
Læsel. pruss. 218. f. 70.

*Habitat in Norvegiae, Sueciae, Borussiae, Canadæ a-
gris. ♂*

Foliola lanceolata, serrata, dentata.

20. POTENTILLA foliis ternatis incisis subtus tomen- nivea.
tosis, caule adscendente.

Fragaria sterilis, foliis subtus incanis, magno flore albo.

Vaill. paris. 55?

Habitat in Alpibus Lapponiae, Sibiriae.

Structura *P. vernæ*, sed folia *P. argenteæ*, at terna &
latiora, magisque hirsuta, subtus tomentosa nivea. Co-
rolla lutea.

21. POTENTILLA foliis ternatis dentatis utrinque grandiflora.
subpilosis, caule erecto foliis longiore.

Potentilla foliis ternatis, petalis cordatis luteis. *Hall*
helv. 342. *t.* 6. *f.* 2.

Fragaria sterilis, amplissimo folio & flore, petalis cor-
datis. *Vaill. paris.* 55. *t.* 10. *f.* 1.

Habitat in Helvetia, Sibiria. ☺

Folia utraque pagina concoloria, nec inferiori argentea.

aenulosa. 22. **POTENTILLA** foliis ternatis dentatis utrinque to-
mentosis, caule foliis breviore.

Potentilla foliis ternatis mollibus incanis, caulis vix
uncialibus. *Gmel. mff.*

Habitat in Sibiria. ♀

*Folia ternata, rugosa, tomentosa, pilosa, coriacea, cunei-
formis, dentata. Stipulae latæ, acute, pilosa. Caulis
biflorus, s. Scapus sepe uniflorus, petiolis brevior. Co-
rolla maxima, lutea: petalis emarginatis, basi flavis.
Stamina lutea.*

TORMENTILLA.

erecta. 1. **TORMENTILLA** caule erecto.

Tomentilla. Cam. epit. 685. *Fl. lapp.* 213. *Fl. suec.*
421. Mat. med. 249. *Hort. cliff.* 194. *Roy. lugdb.*
276.

Tomentilla sylvestris. Baub. pin. 326.

Habitat in Europæ pastuis fiscis. ♀

repans. 2. **TORMENTILLA** caule repente.

*Pentaphyllum minus viride, flore aureo tetrapetalo, ra-
diculas in terram e geniculis dimittens. Moris. hist.* 2.
p. 190.

Pentaphyllum reptans alatum, foliis profundius ferratis.

Plot. oxf. 6. §. 7. *t.* 9. *f.* 5.

Habitat in Anglia. ♀

GEUM.

virginianum 1. **GEUM** floribus erectis, fructu globose: aristis unci-
natis nudis, foliis ternatis. *Hort. cliff.* 195. *Gron.*
virg. 56.

*Caryophyllata virginiana, albo flore minore, radice in-
odora. Herm. par.* III. *t.* III.

Habitat in Virginia. ♀

*Folia caulina inferiora ternata, superiora simplicia; co-
lor corollæ albus, nec ut in sequenti lutens; Stipulae
integræ.*

2. GEUM floribus erectis, fructu globoſo: ariftis unci- *urb. m. m.*
natis nudis, foliis lyratis. *Hort. cliff.* 195. *Fl. suec.*
423. *Mat. med.* 249. *Roy. lugdb.* 276.
Caryophyllata vulgaris. *Baub. pin.* 321.
Caryophyllata. *Dod. pent.* 137.
Habitat in Europæ umbrosis. 2
Folia radicalia lyrata in hac, & stipulae dentatae.
3. GEUM floribus nutantibus, fructu oblongo: ariftis *rivate.*
plumosis. *Hort. cliff.* 195. *Fl. suec.* 424. *Roy. lugdb.*
276.
Geum rivale. *Fl. lapp.* 216.
Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Baub. pin.* 321.
Caryophyllata septentrionalium. *Lob. ic.* 694.
 β . *Caryophyllata aquatica altera.* *Baub. pin.* 322.
Habitat in Europæ pratis subhumidis. 2
4. GEUM flore eretto solitario, fructu oblongo: ariftis *montanum.*
ſtis plumotis.
Caryophyllata pinnis confertioribus extrema subrotunda,
tubis rectis. *Hall. helv.* 336. *
Caryophyllata alpina lutea. *Baub. pin.* 322.
Caryophyllata montana. *Cam. epit.* 727.
 β . *Caryophyllata alpina minor.* *Baub. pin.* 322. *prodr.*
139.
Caryophyllata alpina minima, flore aureo. *Barr. rar.*
588. t. 399.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ, Delphinatus. 2
5. GEUM foliolis uniformibus incisis: alternis minori- *reptans.*
bus, cauie repente.
Caryophyllata alpina, apii folio. *Baub. pin.* 322.
Caryophyllata alpina tenuifolia incana, flore luteo
longius radicata. *Barr. rar.* 589. 400. *Bocc. mus.*
160. t. 128.
Habitat in Helvetia & valle Barsilionensi.

DRYAS.

1. DRYAS pentapetala, foliis pinnatis. *Amœn. acad.* 2. *pentapetala.*
p. 353. *
Habitat in Kamtschatka. 2
2. DRYAS octopetala, foliis simplicibus. *octopetala.*
Dryas. *Fl. lapp.* 215. *Fl. suec.* 426. *Hort. cliff.* 195.
Roy. lugdb. 279. *Hall. helv.* 335. *Segn. ver.* 512.

Chamædrys 3. f. *montana*. *Clus. hist.* 2. p. 351.
Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Austriacis,
Sabaudicis, Hibernicis, Sibiricis. 2

COMARUM.

- palustre.* 1. COMARUM. *Fl. lapp.* 214. *Fl. suec.* 422. *Hort.*
cliff. 195. *Roy. lugdb.* 276. *Hall. helv.* 337.
Quinquefolium palustre rubrum. *Bauh. pin.* 325.
Pentaphyllum palustre. *Cord. hist.* 95.
Habitat in Europæ uliginosis. 2

Classis XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

MARCGRAVIA.

1. MARCGRAVIA.

Marcgravia scandens, fructu radiatim posito. Pluk. gen. 7.

Habitat in America calidiore. 5

Folia alterna, petiolata, ovato-lanceolata, integerrima.

Umbella simplex pedunculis numerosis, in orbem positum, equisibus, horizontaliter patentibus. Flores adscendentibus, nondum; corolla calyceque caducis. Discus umbellae constans glandulis nectariferis, sessilibus, saepius quinis, erectis, forma corollæ ringentis, galeæ s. supremi petali aconiti, ore ambitum recipientibus.

MORISONIA.

1. MORISONIA.

Morisonia arbor nucis juglandis folio. Pluk. gen. 36.

Habitat in America calidiore. 5

Folia alterna, petiolata, ovata, obtusa.

BREYNIA.

1. BREYNIA foliis oblongo-ovalibus. Roy. lugdb. 476. indica.

Breynia elæagni foliis. Plum. gen. 40. Breyn. id. 13.

t. 13.

Ceratoniæ affinis arbor siliquosa, oleæ folio, flore tetrapetalo albido; siliqua tereti ventricosa. Sloan. jam.

153. hist. 2. p. 60. Raj. denár. 100.

Habitat in America calidiore. 5

CAPPARIS.

1. CAPPARIS aculeata. Hort. cliff. 203. Mat. med. 259. spinosa.

Roy. lugdb. 476.

Capparis spinosa, fructu minore, folio rotundo Baub. pin. 480.

β. Capparis folio acuto. Baub. pin. 480.

Capparis sicula, duplicata spina, folio acuto. Bocc. sic 79. t. 42. f. 3.

γ. Cap-

- γ. *Capparis aculeis geminis, foliis ovatis utrinque acutis.*
*Fl. zeyl. 210. **
Habitat in Europæ australis arenosis, ruderatis. b
- synophallo-phora.* 2. *CAPPARIS inermis, foliis ovalibus alternis perennantibus.* *Hort. cliff. 204.*
Habitat in America b
- Baducca.* 3. *CAPPARIS inermis, foliis ovato-oblongis determinate confertis perennantibus.* *Hort. cliff. 204. **
Capparis arboreus indica Baducca dicta. Raj. hist. 1630.
Baducca. Rheed. mal. 6. p. 105. t. 57.
Habitat in India. b

ACTÆA.

- spicata.* 1. *ACTÆA racemo ovato fructibusque baccatis.*
Aetæa. Hort. cliff. 209. Fl. svec. 431. Hort. upf. 138.
Mat. med. 253. Roy. lugd. 480. Dalib. parif. 152.
Aetæa caule inermi. Fl. lapp. 217.
Aconitum bacciferum. Barb. pix. 182.
Christophoriana. Clus. hist. 2. p. 86.
2. *ACTÆA racemis niveis.* *Corn. canad. 76. t. 77.*
Christophoriana americana racemosa, baccis niveis &
rubris. Moris. hist. 2. p. 8. f. 1. t. 2. f. 7.
Habitat in nemoribus Europæ; β. America. 2
Petala rhombea, plano-membranacea.
- racemosa.* 2. *ACTÆA racemis longissimis, fructibus unicapsularibus.*
Aetæa racemis longissimis. Gron. virg. 59. Mat. med. 253.
Christophoriana americana procerior & longius spicata.
Hort. elth. 79. t. 67. f. 78.
Christophorianæ facie herba spicata. Amalb. 54. t.
383. f. 3.
Habitat in Florida, Virginia, Canada. 2
Petala crassa, gibba, minima, pedicellata, acumine setaceo acuminata, calycis foliolis plura.
- cimicifuga.* 3. *ACTÆA racemis paniculatis, fructibus quadricapitularibus.*
*Cimicifuga. Amæn. acad. 2. p. 354. **
Thaliætroides foetidissimum, christophorianæ facie. Amm. rath. 102.
Habitat in Sibiria D. Kraszenninnikof. 2
Petala 4. subrotunda, calyce majora, teneriora. Styli 4.
BUC-

POLYANDRIA MONOGYNIA 305

BOCCONIA

1. BOCCONIA.

Bocconia ramosa, sphyndylii folio tomentoso. *Plum.* *fruticosa.*
gen. 55.

Chelidonium majus arboreum, foliis quercinis. *Sloane-*
jam. 82. *bifl.* 1. p. 195. t. 125.

Habitat in Jamaica, Mexico. ♀

SANGUINARIA.

1. SANGUINARIA. *Hort. cliff.* 202. *Gren. virg.* 57. *canadensis.*

Sanguinaria minor, flore simplici. *Dill. elth.* 335. t.
252. f. 326.

Chelidonium majus canadense acaulon. *Corn. canad.*
212. *Moris. bifl.* 2. p. 257. f. 3. t. 11. f. 1. *Raj.*
bifl. 1887.

2. *Sanguinaria major*, flore simplici. *Dill. elth.* 335. t.

252. f. 325.

3. *Sanguinaria major*, flore pleno. *Dill. elth.* 335. t. 252. f. 326.

Habitat in America septentrionali. ♀

PODOPHYLLUM.

1. PODOPHYLLUM foliis peitatis lobatis. *petatum.*

Podophyllum. *Hort. cliff.* 202. *Hort. sps.* 137. *Gren.*
virg. 57. *Roy. lugdb.* 480.

Anapodophyllum canadense. *Catesb. cer.* 1. p. 24. t. 24.

Aconitifolia humiliis, flore albo unico campanulato, fra-
etu cynosbati. *Mentz.* pag. t. II.

Habitat in America septentrionali. ♀

2. PODOPHYLLUM foliis binatis semicordatis. *diphyllum.*

Habitat in Virginia. *Collinson.* ♀

Folia radicalia, petiolata, binata ut in Hymenea, gla-
tra, integrerrima, semicordata, absque pedicellis. Sca-
pus radicalis, uniflorus, fructu antecedentis. Flos mi-
hi non visus.

CHELIDONIUM.

1. CHELIDONIUM pedunculis umbellatis. *majus.*

Chelidonium pedunculis multifloris umbellatis. *Hort.*
cliff. 201. *Fl. suec.* 430. *Hort. sps.* 137. *Nat. med.* 252.
Roy. lugdb. 478. *Dalib. paris.* 152.

Chelidonium majus vulgare. *Bauh. pin.* 144.

Chelidonium majus. *Fuchs. bifl.* 865.

- B.* *Chelidonium majus*, foliis querinis. *Baub. pin.* 144.
Chelidonium majus, folio laciniatō. *Clus. hist.* 2. p. 203.
Habitat in Europæ ruineratis. ♀

Glaucium. 2. **CHELIDONIUM** pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus tenuatis, caule glabro.

Chelidonium glabrum, pedunculis unifloris. *Hort. upf.* 137. *Roy. lugdb.* 478. *Dalib. parif.* 152.

Chelidonium pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 201. *Gron. virg.* 57.

Papaver corniculatum luteum. *Baub. pin.* 171.

Papaver corniculatum, flavo flore. *Clus. hist.* 2. p. 91.
Habitat in Anglia, Helvetiæ, Galliæ, Italiæ, Virginie arenosis. ☽

corniculatum. 3. **CHELIDONIUM** pedunculis unifloris, foliis fossilibus pinnatifidis, caule hispido.

Chelidonium hispidum, pedunculis unifloris. *Hort. upf.* 137. *Sauv. monsp.* 286.

Glaucium hirsutum, flore phœnico. *Tournef. inst.* 254.

Papaver cornutum, phœnico flore. *Clus. hist.* 2. p. 91.
Habitat in Hungaria, Bohemia, Monspelii. ☽

hybridum. 4. **CHELIDONIUM** pedunculis unitoris, foliis pinnatifidis linearibus, caule lœvi.

Papaver caule ramoso, foliis linearibus pinnatifidis, capsulis sulcatis. *Hort. upf.* 135. *Sauv. monsp.* 252. ☺

Papaver corniculatum violaceum. *Baub. pin.* 172.

Papaver corniculatum, violaceo flore. *Clus. hist.* 2. p. 92.

Habitat in Europa australiore. ☽

Strigata 4.

PAPAVER.

* *Capsulis hispidis.*

hybridum. 1. **PAPAVER** capitulo subglobosis torosis hispidis, caule folioso multifloro.

Papaver foliis ternato-pinnatifidis, capsulis sulcatis hispidis. *Hort. cliff.* 201.

Papaver caule ramoso, foliis linear-pinnatifidis, capsulis sulcatis hispidis. *Hort. upf.* 136.

Argemone capitulo breviore. *Baub. pin.* 172.

Argemone capitulo hirsuto rotundo torulis canaliculato.

Moris. hist. 2. p. 278. f. 3. t. 14. f. 9. *Lob. ic.* 276.
Habitat in Europa australiore. ☽

Argemone. 2. **PAPAVER** capsulis clavatis hispidis, caule folioso multifloro.

Papa-

Papaver capsulis hispidis oblongo-turbinatis sulcatis. *Fl. suec.* 429. *Dalib. paris.* 152.

Papaver foliis ternato-pinnatis, fructu angulato. *Hort. cliff.* 201. *Roy. lugdb.* 419. *Sauv. monsp.* 252.

Argemone capitulo longiore. *Baub. pin.* 172. *Lob. ic.* 276.

Argemone capitulo tenuiore longiore hirsuto. *Morif. hist.* 2. p. 278. f. 3. t. 14 f. 10.

Habitat in Europæ campis arenosis. ♂

3. PAPAVER capsula hispida, scapo unifloro nudo hispido, foliis bipinnatis. *alpinum.*

Papaver perenne, pilis rigidissimis, foliis pinnatis, flore luteo hirsuto. *Hall. helv.* 304.

Papaver alpinum saxatile, coriandri folio. *Segu. ver.* 1. p. 416. t. 4. f. 4.

Argemone alpina, foliis scandicis, lutea. *Baub. pin.* 172. *prodr.* 93. *Bursf. IX:* 58.

Argemone alpina, coriandri folio. *Baub. pin.* 172.

Argemone minor penæ. *Dalech. hist.* 1714.

Habitat in Helvetia, Sneeberg Austriae. ♀

Flores plantæ Burserianæ apud C. Baikinum albi errant, nec lutei, afferente Bursero.

4. PAPAVER capsulis hispidis, scapo unifloro nudo hispido, foliis simplicibus pinnato-sinuatis. *Hort. upf.* 136.

Papaver erraticum nudicaule, flore flavo odorato. *Dill. elth.* 302. t. 224. f. 291.

Papaver erraticum, luteo flore, capite oblongo hispido. *Amm. ruth.* 61. n. 81.

Habitat in Sibiria. ♂

Stipulae 8 ad 9.

* *Capsulis glabris.*

5. PAPAVER capsulis glabris globosis, caule piloso malitiotoro, foliis pinnatifidis incisis. *Rhoes.*

Papaver foliis pinnatifidis hispidis, fructu ovato, *Hort. cliff.* 201. *Fl. suec.* 428. *Hall. helv.* 303. *Mat. med.* 251. *Roy. lugdb.* 478. *Dalib. paris.* 151.

Papaver caule multifloro folioso hispido, foliis pinnatifidis, capsulis levibus. *Hort. upf.* 136. *Sauv. monsp.* 252.

Papaver erraticum majus. *Baub. pin.* 171.

Papaver rhoes prius. *Dalech. hist.* 439.

6. PAPAVER erraticum, pleno flore. *Baub. pin.* 171.

Papaver erraticum minus, *Baub. pin.* 171.

7. *Habitat in Europæ arvis, agris.* ♂

- omniflorum*. 6. PAPAVER calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisis.
Papaver caule multifloro, foliis simplicibus glabris incisis caulinis. Hort. upf. 135. Mat. med. 250.
Papaver foliis simplicibus glabris incisis. Hort. cliff. 200.
Hall. helv. 303. Roy. lugdb. 879.
Papaver hortense, semine albo. Baub. pin. 170.
B. Papaver hortense, semine nigro. Baub. pin. 170.
γ. Papaver cristatum, floribus & semine album. Baub. pin. 171.
δ. Papaver cristatum, floribus rubris, semine nigro. Baub. pin. 171.
ε. Papaver, flore pleno, album. Baub. pin. 171.
Habitat in Europæ australioris ruderatis. ◎
Caulis, Folia, Calyx, Capsula glabra. Stigmata 10.
- cambricum* 7. PAPAVER capsulis glabris oblongis, caule multifloro lœvi, foliis pinnatis incisis.
Papaver foliis pinnatis, fructu acuminato. Hort. cliff. 201. Roy. lugdb. 479.
Papaver cambricum perenne, flore sulphureo. Dill. elth. 300. t. 223. f. 290.
Argemone cambro-britannica lutea, capite longiore glabro. Maris. hist. 2. p. 297. f. 3. t. 14. f. 12.
Papaver erraticum pyrenaicum, flore flavo. Baub. pin. 171. prodr. 92. Burf. IX: 45.
Habitat in Cambriæ septentrionalis nemorosis. 2
Stigmata 5. s. 6. distincta. Capsula oblonga, inferne angustior.
- orientale*. 8. PAPAVER capsulis glabris, caulis unifloris scabris foliosis, foliis pinnatis ferratis. Hort. upf. 136.
Papaver foliis pinnatis, fructu globoso. Roy. lugdb. 279.
Papaver orientale hirsutissimum, flore magno. Tournef. cor. 17. itin. 3. p. 127. t. 127. Comm. rar. 34. t. 34.
Habitat in Oriente. ◎
Stigmata 16. Setæ in caule sparsæ, cauli adpresso, basi prominula asperæ. Capsula hispidae.

ARGEMONE.

- mexicana*. 1. ARGEMONE capsulis quinquevalvibus, foliis spinosiss.
Argemone. Hort. cliff. 201. Hort. upf. 135. Roy. lugdb. 479.
Papaver spinosum. Baub. pin. 171. prodr. 93. t. 92.
Clus. hist. 2. p. 93.

Papa-

Papaver spinosum luteum, foliis albis venis notatis.

Moris. hist. 2. p. 277. f. 3. t. 14. f. 5.

Habitat in Mexico, Jamaïca, Caribæis, nunc in Europa australi. ♂

2. ARGEMONE capsulis trivalvibus.

Papaver orientale, hypocoï folio, fructu minimo. *Torr. armeniaca,*
nef. cor. 17.

Habitat in Armenia.

3. ARGEMONE capsulis quadrivalvibus, caule nudo. *pyrenaica,*

Habitat in Pyrenæis. Tournesort.

Hæc semiquadrivalvis, uti species secunda semitrivalvis, & prima semiquinquevalvis; Hæ species vel sub distinēto genere simul tradendæ vel etiam ad genus papaverinum amandanda omnes. Hujus habitus plurimum accedit Papaveri alpino.

MUNTINGIA.

1. MUNTINGIA.

Calabura.

*Muntingia pedunculis unifloris. Hort. cliff. 203. **

Muntingia folio sericeo molli, fructu majori. Plum. gen. 41.

Meispilus americana, alni vel coryli foliis, fructu mucilaginoso albo. *Comm. hort. 1. p. 155. t. 80.*

Calabura alba. Pluk. alm. 75. mant. 34. t. 154. f. 4.

Loti arboris folio angustiore, rubi flore, fructu polyspermo umbilicato. Sloan. jam. 162. hist. 2. p. 80. t. 194. f. 1. Raj. dendr. 32.

Habitat in jamaica. ♂

CLUSIA.

1. CLUSIA foliis aveniis.

major.

Clusia flore albo, fructu coccineo. Plum. gen. 21.

Cenchramidea arbor saxis aduascens, obrotundo pingui folio, fructu pomiformi. Pluk. alm. 92. t. 157. f. 2.

Terebinthus folio singulari non alato rotundo succulento, flore pallide luteo. Sloan. jam. 167. hist. 2. p. 97. t. 200. f. 1. Raj. dendr. 51.

2. Clusia flore roseo major, fructu subviridi. *Plum. gen. 21.*

γ. Clusia alia minor: flore albo, fructu virescente. *Plum. gen. 21.*

Habitat in Jamaicæ & Caribæarum apricis. ♂

Arbor foliis oppositis, obverse ovatis, in petiolos dehirsitibus, integerrimis. Pedunculi axillares, s. ep. triflori.

2. CLU-

- minor.* 2. *CLUSIA* foliis venosis,
Clusia, flore roseo, minor, fructu flavescente, *Plum.*
gen. 21.
Habitat in America meridionali. ♂
Arbor foliis venosis. Racemus florum terminalis.

SARRACENIA.

- purpurea.* 1. *SARRACENIA* foliis gibbis. *Hort. cliff.* 427. *Gron.*
virg. 164.
Sarracena foliis brevioribus latioribus. *Catesb. car.* 2.
p. 70. t. 70.
Coilophyllum virginianum, breviore folio, flore purpu-
rascente. *Morif. hist.* 3. p. 533.
Bucanephillum americanum, limonio congenitum.
Pluk. alm. 71. *amalb.* 46. t. 376. f. 6.
Limonium peregrinum, foliis forma floris aristolochiae.
Bauh. pin. 192.
Habitat in Americæ septentrionalis udis. ♀
- flata.* 2. *SARRACENIA* foliis strictis.
Sarracena foliis rectis. *Hort. cliff.* 497. *Gron. virg.* 164.
Sarracena foliis longioribus & angustioribus. *Cateth. car.*
2. p. 69. t. 69.
Coilophyllum virginianum, longiore folio erecto, flore
luteo. *Morif. hist.* 3. p. 533.
Bucanephillum elatus virginianum f. *Limonio conge-*
noris altera species elatior, foliis triplo longioribus.
Pluk. alm. 72. *amalb.* 46. t. 152. f. 3. (*mala*) t.
376. f. 5. *bona*.
Thuris lippidi folium. *Bauh. hist.* 1. p. 307. *Dalech.*
hist. 1754. *Lob. adv.* 430.
Habitat in Americæ septentrionalis udis. ♀

NYMPHÆA.

- lutea.* 1. *NYMPHÆA* calice magno pentaphyllo. *Fl. lapp.* 218.
Fl. suec. 426. *Hort. cliff.* 203. *Mat. med.* 258. *Rey.*
lugdb. 480. *Dalib. parif.* 150.
Nymphaea lutea major. *Bauh. pin.* 193.
Nymphaea lutea. *Cam. epit.* 635.
Habitat ad Europæ littora sub dulci aqua. ♀
In Canada eadem floris magnitudine vix Calthæ. *Kalm.*
- alba.* 2. *NYMPHÆA* foliis cordatis integerrimis, calyce qua-
drifido.
Nymphaea calyce tetraphyllo, corolla multiplici. *Fl.*
lapp.

lapp. 219. *Fl. suec.* 427. *Hort. cliff.* 203. *Roy. lugdb.* 480. *Dalib. paris.* 150.

Nymphaea alba major. *Baub. pin.* 193.

Nymphaea alba. *Cam. epit.* 634.

Habitat in Europæ & Americæ aquis dulcibus. ♀

3. NYMPHÆA foliis cordatis dentatis. *Fl. zeyl.* 194.* *Lotus.*

Nymphaea indica, flore candido, folio in ambitu serrato.

Sloan. jam. 120. *bifl.* 1. p. 252. *Raj. suppl.* 630.

Lotus ægyptia. *Alp. ægypt.* 103. *exot.* 214. t. 213. 216. 218. 220. 222. 226.

Ambel. *Rheed. mal.* 11. p. 51. t. 26.

Habitat in calidis Indiæ, Africæ, Americæ. ♀

4. NYMPHÆA foliis undique integris. *Hort. cliff.* 203. *Nelumbo.*

Fl. zeyl. 193.

Nymphaea indica, *Faba ægyptia dicta*, flore incarnato.

Herm. par. 205. t. 205.

Nymphaea fabifera, *indiac paludibus gaudens*, foliis umbilicatis amplis, pediculis spinotis, flore roseo purpureo. *Pluk. alm.* 267. t. 207. f. 5. & t. 322. f. 1. *opt.*

Tamara. *Rheed. mal.* 11. p. 59. t. 30.

Bein-Tamara. *Rheed. mal.* 11. p. 61. t. 31. *Raj. suppl.* 632.

5. *Nymphaea affinis glandifera virginiana*, *umbilicato folio*, *flore luteo pleno.* *Moris. bifl.* 3. p. 514. *Raj. suppl.* 632.

Habitat in Indiis. ♀

Varietas 5. *differt seminibus duris, in reliquis convenit ut vix distingvenda videatur.*

BOMBAX.

1. BOMBAX foliis digitatis, caule aculeato.

Xylon foliis digitatis, caule aculeato. *Fl. zeyl.* 221 *Hort.* *Ceiba.* *upf.* 148.

Xylon caule aculeato. *Hort. cliff.* 75. *Roy. lugdb.* 437.

Gossypium arboreum, caule spinoso. *Baub. pin.* 430.

Moul-elavou. *Rheed. mal.* 3. p. 61. t. 52.

Habitat in India utraque. ♂

2. BOMBAX foliis digitatis, caule inermi.

Xylon foliis digitatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* 220. *Hort.* *pentandrum.* *upf.* 148.

Xylon caule inermi. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 437.

Gossypium javanense, *salicis folio.* *Baub. pin.* 430.

Ponja. *Rheed. mal.* 3. p. 59. t. 49. 50. f. 51.

Habitat in Indiis. ♂

3. BOM-

- religiosa.* 3. *BOMBAX* foliis quinquelobis acuminatis subtus tomentosis (*Xylon*). *Fl. zeyl.* 222. *
Gossypium frutescens annum, folio vitiis ampliori quinquefido. *Pluk. alm.* 172. t. 188. f. 2.
Habitat in India. 5

BIXA.

- Orellana.* 1. *BIXA.* *Hort. cliff.* 211. *Mat. med.* 266. *Roy. lugd* 477.
Oreana s. *Orellana* folliculis lappaceis. *Pluk. alm.* 272 t. 209. f. 4. *Comm. hort.* 1. p. 65. f. 33.
Arbor mexiocana, fructu castaneæ, coccifera. *Baub. pin.* 419.
Urucu. *Sloan. jam.* 150. *bijt.* 2. p. 52. t. 181. f. 1.
Habitat in America calidiore. 5

SLOANEÆ.

- dentata.* 1. *SLOANEÆ* foliis cordato-ovatis denticulatis, stipulis ferratis.
Sloanea amplis castaneæ foliis, fructu echinato. *Plum. gen.* 49.
Apeiba. *Marcgr. bras.* 123. t. 123. *Raj. bijt.* 1643.
Habitat in America meridionali. 5
- emarginata.* 2. *SLOANEÆ* foliis oblongis integerrimis emarginatis.
Anona foliis laurinis in suinitate incisis, fructu compresso scabro fusco in medio acumine longo. *Catesbe. car.* 2. p. 87. t. 87.
Habitat in Carolina. 5

MAMMEA.

- americana.* 1. *MAMMEA* staminibus flore brevioribus.
Maminei magno fructu, persicæ sapore. *Plum. gen.* 44
Mamay. *Baub. bijt.* 1. p. 172. *Dalech. bijt.* 1836. *Lact. amer.* 356.
Malus persica maxima, foliis rotundis splendentibus glabris, fructu maximo scabro rugoso. *Sloan. jam.* 179. *bijt.* 2. p. 123. t. 217. f. 3.
Arbor indica Mamei dicta. *Baub. pin.* 417. *Raj. bijt.* 1665.
Habitat in Hispaniola, Jamaica. 5
Rami fabri; Folia oblonga, obtusa.
- spatula.* 2. *MAMMEA* staminibus flore longioribus.
Habitat in Java. *Osbeck.* 5

Arbor magna, s^epius procumbens. Folia pedalia, obvata s. oblonga, l^evia. Pedunculi uniflori. Calyx ovatus, bipartitus. Petala 4, ovata, calyce triplo longiora, brevi decidua, cum Staminibus corolla duplo longioribus, numerosis, subulatis, erectis. Antheræ subrotundæ, minimæ. Fructus tetragonus.

OCHNA.

1. OCHNA. *Fl. zeyl.* 209. * Jabotapita.
Jabotapita cinnamomi folio, floribus spicatis. Burm.
zeyl. 123. t. 56.
- β. *Arbor africana, subrotundo folio margine denticulis acutis aspero, floribus pentapetalis airopurpureis. Pluk.*
alm. 41. t. 263. f. 1. 2.
- γ. *Jabotapita. Marcgr. bras. 101. Raj. hist. 1632.*
Jabotapita pyramidato flore luteo, fructu rubro. Plum.
gen. 42.
Habitat in India, β. in Africa, γ. in America.
Racemi persistunt squarroso injra folia a casu pedicellorum & fractificationum.

CHRYSOBALANUS.

1. CHRYSOBALANUS. Icaco.
Myrobalanus minor, folio fraxini alato, fructu purpureo: officulo magno fibroso. Sloan. jam. 182. hist. 2.
p. 126. t. 219. f. 3. 4. 5. Raj. dendr. 33.
Prunus Icaco. Lab. itin. 3. p. 30.
Icaco fructu purpureo. Plum. gen. 44.
- β. *Icaco fructu ex albo rubescente. Plum. gen. 44.*
- γ. *Icaco fructu nigro. Plum. gen. 44.*
- δ. *Myrobalanus folio fraxini alato, fructu luteo: officulo magno fibroso. Sloan. jam. 181. hist. 2. p. 125. t.*
219. f. 1. 2. Raj. deadr. 43.
Arbor indica juglandi similis 5, f. Hobos. Bauh. pin.
417.
- ε. *Myrobalanus 6. f. Myrobalanis flavis similis fructus.*
Bauh. pin. 446.
Condondum. Rumpf. amb. 1. p. 161. t. 60.
Habitat in Jamaica, Brasilia, Barbiches, Surinamo. 5

CALOPHYLLUM.

1. CALOPHYLLUM foliis ovalibus. *Fl. zeyl.* 201. * *Inophyllum.*
Arbor indica, mali medicæ amplioribus foliis. Pluk.
alm. 41. t. 147. f. 3.

Ponna f. Ponna-maram. *Rheed. mal.* 4. p. 79. t. 38.
Raj. hist. 1525.
Habitat in India. 5

- Calaba.* 2. **CALOPHYLLUM** foliis ovatis obtusis. *Fl. zeyl.*
 202. *
 Calophyllum foliis ovatis obtusis: striis parallelis trans-
 versis. *Hort. cliff.* 206. *Roy. lugdb.* 476.
 Tsiereou-ponna. *Rheed. mal.* 4. p. 81. t. 39.
Habitat in Indiis. 5

TILIA.

- europaea.* 1. **TILIA** floribusnectario destitutis.
 Tilia. *Hort. cliff.* 204. *Fl. suec.* 432. *Mat. med.* 262.
Roy. lugdb. 477. *Dalib. paris.* 153.
 Tilia femina, folio majore. *Bauh. pin.* 426.
 Tilia urbana. *Gesn. tab. III.*
 2. Tilia montana, maximo folio. *Bauh. pin.* 426.
 3. Tilia femina, folio minore. *Bauh. pin.* 426.
 4. Tilia ulmifolio, semine hexagono. *Raj. angl.* 3. p. 473
 5. Tilia foliis molliter hirsutis, viminibus rubris, fructu te-
 tragono. *Raj. angl.* 3. p. 473.
 6. Tilia bohemica, foliis minoribus glabris, fructu oblon-
 go utrinque acuminato minime costulato. *Till. pis-*
 165. t. 49. f. 9.
Habitat in Europæ pratis. 5

- americana.* 2. **TILIA** floribus ectario instructis. *Kalm.*
 Tilia foliis majoribus mucronatis. *Grov. virg.* 58.
 Tilia, amplissimis glabris foliis, nostrati similis. *Pluk.*
mant. 181.
Habitat in Virginia Canada. 5

MICROCOS.

- aniculata.* 1. **MICROCOS** panicula terminali. *Fl. zeyl.* 207. *
 Microcos foliis alternis oblongis acuminatis. *Burm. zeyl.*
 159. t. 74.
 Schageri-Cottam. *Rheed. mal.* 1. p. 105. t. 56.
Habitat in India. 5
- ateriflora* 2. **MICROCOS** pedunculis axillaribus conferuis dichotomis. *Fl. zeyl.* 208. *
 Hamdamanias. *Herm. zeyl.* 3
Habitat in Zeylona. 5

ELÆOCARPUS.

- ELÆOCARPUS. *Fl. zeyl.* 206. * *ferrata.*
Elajocarpos foliis lauri serrato, floribus spicatis. *Burm.*
zeyl. 39. t. 40
Perin-Kara. *Rheed. mal.* 4. p. 51. t. 24. *Raj. hist.*
1546. dendr. 42.
Habitat in India. 5

MESUA.

1. MESUA soliis lanceolatis. *Fl. zeyl.* 203. * *ferren.*
Naghas. *Herm. zeyl.* 7.
Balutta-tsiampacam f. *Castanea rosea* indica. *Rheed. mal.*
3. p. 63. t. 53. Raj. hist. 1680.
Habitat in India. 5

VATERIA

1. VATERIA. *Fl. zeyl.* 204. *indica.*
Pænoe. *Rheed. mal.* 4. p. 33. t. 15.
Habitat in India. 5

THEA.

1. THEA. *Hort. cliff.* 204. *Mat. med.* 264. *sinensis.*
Thee. *Kæmpf. jap.* 605. t. 606.
Thee frutex. *Bart. act.* 4. p. 1. t. 1. *Bont. jav.* 87.
t. 88. Barr. rar. 128. t. 904.
Thee sinenium. *Breyn. cent.* III. t. 112. ic. 17. t.
3. Bocc. mus. 114. t. 94.
Chaa. *Baub. pin.* 147.
Evonymo affinis arbor orientalis nucifera, flore roseo.
Pluk. alm. 139. t. 88. j. 6.
Habitat in Japonia, China. 5
Vidi flores in aliis hexapetalos, in aliis enneapetalos; an
eiusdem speciei judicent, qui possunt vivam inspicere.

CARYOPHYLLUS

1. CARYOPHYLLUS. *Hort. cliff.* 207. *Mat. med.* 26. *aromaticus.*
Caryophyllum aromaticus, fructu oblongo. *Baub. pin.*
410.
Caryophyllum aromaticus ind. orient, fructu clavato mo-
nopyreno. *Pluk. alm.* 88. t. 155. f. 1.
Caryophyllum. *Clus. exot.* 16.
Habitat in Moluccis soijs aridissimo. 5

MENTZELIA.

*aspera.*1. MENTZELIA. *Hort. cliff.* 492.

*Mentzelia foliis & fructibus asperis. Plum. gen. 41.
Onagra americana, folio betonicæ, fructu hispido. Tour-
nef. inst. 302.*

Habitat in America.

*Folia serrata, alterna. Rami alterni. Flores axillares,
solitarii, sessiles.*

PLINIA.

pinnata.

1. PLINIA.

Plinia fructu croceo odorato. Plum. gen. 9.

Habitat in America. ♂

*Arbor Folia pinnata, abrupta; foliolis circiter 12, ova-
to-lanceolatis, integerrimis. Flores sessiles, sparsi per
ramos nudos seniores. Fructus edules.*

MIMOSA.

* *Foliis simpliciter pinnatis.*

*Lebbeck.*1. MIMOSA foliis pinnatis: foliolis oblongo-ellipticis,
petiolis obverse clavatis. *Hasselquist. act. upf.* 1750.
*p. 9. **

Habitat in Ægypto superiore. ♂

*Inga.*2. MIMOSA foliis pinnatis quinquejugis: petiolo articu-
lato marginato.

*Mimosa inermis, foliis pinnatis: petiolis membranaceis
alatis. Hort. cliff.* 209.

*Arbor filiformis brasiliensis, foliis pinnatis costa media
membranulis extantibus alata. Sloan. jam. 153. hist.
2. p. 58. t. 183. f. 1. Raj. hist. 1762.*

Habitat in Brasilia, Jamaica, Surinamo ♂

fagifolia.

3. MIMOSA foliis pinnatis bijugis; petiolo marginato.

*Arbor filiformis, faginis foliis, americana, floribus co-
mosis. Pluk. alm. 44. t. 141. f. 2.*

Habitat in Barbados. ♂

*nodosa.*4. MIMOSA foliis pinnatis bijugis: foliolis interioribus
minoribus, petiolo lineari.

*Mimosa inermis, foliis pinnatis: foliolis quatuor, glan-
dula ovata inter infima minor. Vir. cliff. 49. Hort.
cliff. 209. Roy. lugdb. 471.*

*Phaseolus arboreus tetraphyllos zeylanicus. Pluk. alm.
294. t. 211. f. 5.*

Habitat in Zeylona. ♂

* Fe-

* *Foliis, petiolo bipartito, non pinnatis.*

5. MIMOSA foliis bigeminis acuminatis. Fl. zeyl. 218. * *biginina.*
Katou-conna. Rheed. mal. 6. p. 21. t. Raj. bist.

1746.

Habitat in India. ♂

6. MIMOSA foliis bigeminis obtusis. Hort. upf. 207. *Unguis cati.*
Roy. lugdb. 470.

Acacia quodammodo accedens s. Ceratiæ & Acaciæ,
media jamaicensis spinosa, ligeminatis foliis. Pluk.
phyt. 1. f. 6.

Acacia arborea major spinosa, pinnis quatuor majori-
bus subrotundis, siliquis varie intortis. Sloan. jam. 152.
bist. 2. p. 56.

Habitat in Jamaica, Caribæis. ♂

7. MIMOSA foliis tergeminis. *tergeminis.*

Acacia frutescens non aculeata, flore purpurascente, a-
lia. Plum. bist. mſ. Houſt. mſ.

Habitat in America meridionali. ♂

Petiolus bifidus: pedicello singulo terminato foliolis duo-
bus; sed insuper Foliola duo opposita ad aivaricatio-
nem petioli communis.

* *Foliis conjugatis s. Folia duo pinnata, communi*
petiolo annexa.

8. MIMOSA foliis conjugatis pinnatis: foliolis æquali- *circinalis.*
bus, stipulis spinotis.

Acacia foliis amplioribus, siliquis circinatis. Plum.
spec. 17.

Habitat in America calidore. ♂

9. MIMOSA foliis conjugatis pinnatis: foliolis intimis *purpurea.*
minoribus, caule inermi.

Acacia frutescens non aculeata, flore purpurascente.
Plum. spec. 17.

Habitat in America meridionali. ♂

10. MIMOSA foliis conjugatis pinnatis: foliolis æquali- *cineræ.*
bus, caule aculeis incurvis.

Mimosa maderaspatana spinosa intiæ accedens, cortice
cineræ, ramis communi pediculo binis. Pluk. alm.

4. t. 2. f. 1.

Habitat in India. ♂

11. MIMOSA foliis conjugatis pinnatis: partialibus bi- *væ.*
jugis subrotundis, caule inermi herbaceo.

Mimosa herbacea non spinosa minima repens. *Sloane.*
jam. 153. *hist.* 2. *p.* 58. *t.* 182. *f.* 7. *Raj. suppl.* 480.
Habitat in Jamaicæ pratis. ♀

caſta.

12. *MIMOSA* foliis conjugatis pinnatis: partialibus trijugis subæqualibus, caule aculeato.

Mimosa foliis conjugatis: foliolis pinnatis: pinnis fenis subæqualibus. *Hort. upj.* 145.

Mimosa undique aculeata, foliis geminatis pinnatis: foliolis intimis minimis. *Hort. cliff.* 208.

Æschynomene spinosa latifolia f. Herba viva vel spinosa latifolia, piloso & subrotundo folio. *Comm. hort.* 1. *p.* 55. *t.* 28.

Habitat in India: ♂

Flores spicæ inferiores decandri steriles; superiores decandri fertiles.

ſenſitiva.

13. *MIMOSA* foliis conjugatis pinnatis: partialibus bijugis: intimis minimis, caule aculeato,

Mimosa caule aculeato, foliis geminatis: partialibus tetraphyllis, foliolis intimis minimis. *Roy. lugdb.* 471.

Mimosa spinosa prima f. brasiliæ latifolia, siliquis radiatis. *Breyn. cent.* 31. *t.* 16.

Habitat in Brasilia. ♂

pudica.

14. *MIMOSA* foliis subdigitatis pinnatis, caule aculeato hispido,

Mimosa foliis digitatis: foliolis pinnatis, caule aculeato hispidoque, foliis pinnato-palmatis: singulis numerose pinnatis. *Hort. cliff.* 208. *Hort. upj.* 144.

Mimosa spinosa 3, siliquis parvis echinatis. *Breyn. cent.* 40. *t.* 18.

Æschynomene spinosa, flore globoso albido, siliculis articulatis echinatis. *Comm. hort.* 1. *p.* 57. *t.* 29.

Habitat in Brasilia. ♂

Calyx infundibuliformis, trifidus: lobo altero, latiore.

Corolla nulla. Staminum filaments 4, calyce sexies longiora, erecta, filiformia. Germen subrotundum.

Stylus subulatus, staminibus paulo brevior. Stigma acutum.

* *Foliis dupliquo-pinnatis, inermes.*

Entada.

15. *MIMOSA* inermis, foliis bipinnatis cirrho terminalis. *Fl. zeyl.* 219.

Entada. *Rheed. mal.* 9. *p.* 151. *t.* 67.

Habitat in utraque India. ♂

16. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis, spicarum flori plena-
bus pentandris: inferioribus plenis. *Hort. upf.* 145. *
Mimosa herbacea non spinosa procumbens & palustris,
flore luteo pleno. *Houst. mss. t. I.*
Habitat in Vera Cruce. ☽
17. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis, spicis cernuis, *virgata*,
floribus decandris: inferioribus castratis apetalis. *Fl.
zeyl.* 505. *Hort. upf.* 145.
Mimosa inermis, foliis duplicito-pinnatis, siliquis line-
aris glabris. *Hort. cliff.* 209.
Habitat in India. ♂
18. MIMOSA inermis decumbens, foliis bipinnatis, spi- *pernambu-*
cis cernuis, floribus pentandris: inferioribus castratis. *caua.*
Hort. upf. 145. *
Mimosa americana pigra, siliquis longis angustis allium
olentibus. *Pluk. alm.* 552. t. 307. f. 3.
Habitat in America. ♂
19. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis, leguminibus spi- *arborea*.
raliter circumvolutis, caule arboreo.
Acacia non spinosa jamaicensis, foliis lata basi in metz
formam fatigatis. *Pluk. alm.* 6. t. 251. f. 2.
Acacia arborea maxima non spinosa, pinnis majoribus,
flore albo, siliqua contorta coccinea ventricosa ele-
gantissima. *Sloan. jam.* 157. *bijt.* 2. p. 54. t. 182.f.
I. 2. *Raj. suppl.* 477.
Habitat in Jamaicæ & Caribæarum humidis. ♂
20. MIMOSA inermis foliis bipinnatis: foliolis exterio- *vaga*.
ribus majoribus incurvatis pubescentibus. *Hort. cliff.*
209.
Mimosa non spinosa ind. or; castaneæ foliis, floribus
stamineis amplis, siliqua crustacea placentæ in mo-
dum colorato. *Pluk. mant.* 2. p. 331. f. 1.
Arbor siliquosa brasiliiana, siliqua tortuosa, frutescens.
fraxinellæ foliis. *Breyn. cent.* 1. t. 15. an?
Habitat in India. ♂
21. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: partialibus quin- *latifiliqua*.
quejugis: propriis decemjugis.
Acacia non spinosa, siliquis latis compressis, flore albo.
Plum. spec. 17.
Habitat in America calidiore.
Bracteæ dimidiato-coraatæ. Pedunculi terni; Flores ca-
pitati.

- polystochia.* 22. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: partialibus propterea sexjugis oblongis.
Acacia alia scandens, spica multiplici, siliquis latis.
Plum. spec. 7
Habitat in America calidiore.
Flores spicati: Legamina lata, longa, obtusa.
- peregrina.* 23. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: partialibus secundem jugis: propriis quadragintajugis; glandula baseos petiolaris.
Mimosa inermis, foliis duplicato-pinnatis, glandula ad basin petiolorum, siliquis ovato-oblongis planis. *Hort. cliff. 209.*
Habitat in America. ♂
- glaucia.* 24. MIMOSA inermis, foliis bipinnatis: partialibus sexjugis, leguminibus membranaceis.
Mimosa inermis, foliis duplicato-pinnatis: partialibus untrinque senis pluribusque, siliquis planis membranaceis. *Roy. lugdb. 472.*
Mimosa arboreiflora non spinosa, pinnis acaciæ latioribus inferne glaucis, flore albo. *Breyn. cent. 1. p. 73.*
Acaciæ similis americana non spinosa, floribus globosis albis ramosis. *Kigg. beaum. 3.*
Habitat in America. ♂
- * *Foliis duplicato-pinnatis, spine aculei s. geminii s. solitarii, nec sparsi.*
- cineracea.* 25. MIMOSA spinis solitariis, foliis bipinnatis, floribus spicatis. *Fl. zeyl. 215.* *
Acacia spinosa ex alis spicata, foliis pennas avium referentibus. *Burm. zeyl. 3. t. 2. bona.*
Acacia maderaspatana, minutissimis foliis, aculeis ferocibus alternis froudosa, cortice cinereo. *Pluk. alm. 3. t. 121. f. 5.*
Habitat in India. ♂
- cornigera.* 26. MIMOSA spinis axillaribus geminis connatis, foliis bipinnatis. *Hort. cliff. 208. Roy. lugdb. 470.*
Acacia cornuta ind. orientalis. *Seb. thes. 1. p. 113. t. 70. f. 13.*
Acacia americana, grandibus aculeis ad ramulorum extortum cornua bovina referentibus, siliqua rostrata. *Pluk. alm. 3. p. 122. f. 1.*
Acaciæ similis, spinis corniformibus, mexicana. *Comm. hort. 1. p. 209. t. 107.*
Habitat in Mexico, Cuba. ♂

27. MIMOSA spinis oppositis longitudine foliorum, foliis bipinnatis: partialibus bijugatis. *horrida*.

Acacia maderaspatana, foliis parvis, aculeis e regione binis prægrandibus horrida, cortice cinereo. *Pluk. alm. 3. t. 121. f. 4.*

Habitat in India. ♂

28. MIMOSA spinis geminis approximatis, foliis bipin-*scorpioides*. natis: partialibus bijugatis. *Hort. cliff. 208. Roy. lugdb. 470.*

Acacia foliis scorpioidis leguminosæ. Baub. pin. 392.

Acacia ægyptiaca. Hern. mex. 866. t. 866. bona.

Acacia vera s. Spina ægyptiaca, subrotundis foliis, flore luteo, siliqua brevi & paucioribus isthmis glabris & cortice nigricantibus donata. Pluk. alm. 3. t. 123. f. 1.

Habitat in Ægypto, Arabia. ♂

29. MIMOSA spinis ternis: intermedio reflexo, foliis *Senegal.* bipinnatis, floribus spicatis.

Mimosa aculeata, floribus polyandris spicatis, legume comprepresso lævi elliptico. *Adanson, ex B. Jussieu.*

Mimosa spinis geminis distinctis, foliis duplicato-pinnatis: partialibus utrinque quino-pluribus. Hort. cliff. 209. Hort. upsi. 146. Roy. lugdb. 411. Mat. med. 261.

Acacia. Baub. pin. 392. Alp. ægypt. 9. t. 9.

Acacia altera vera, siliqua longa villosa, cortice candicante donata. Pluk. alm. 3. p. 251. f. 1.

Habitat in Arabia. ♂

Cortice albo distinguitur hæc species primo intuitu. Spinx ad folii exortum tres.

30. MIMOSA spinis geminis distinctis, foliis bipinnatis: *farnesiana.* partialibus octojugatis. *Hort. upsi. 146.*

Acacia indica farnesiana. Ald. farnes. 2. Raj. hist. 977.

Habitat in Domingo. ♂

31. MIMOSA spinis geminis patentibus, foliis bipinnatis: partialibus extimis glandula interstitiis.

Habitat in Ægypto, unde semina per D. Hasselquist. ♂

Habitus A. Farnesiana & Senegal; differt a priore ramis absque punctis callosis, ut ab hoc cortice maius albo sed purpurascens; nec Spinas habet ternas u. senegal, sed vias easque longiores quam farnesiana. Rami purpurascentes, læves. Folia bipinnata, & circiter

ter parium foliorum partialium, inter duo paria partialium exteriorum glandula petiolo communi inserita est.

* *Foliis duplicato-pinnatis: aculei sparsi.*

cæsiæ.

32. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis: foliolis ovali-oblongis oblique acuminatis. *Fl. zeyl.* 217.

Acacia spinosa, indiæ orientalis, foliis subtus cæsiis, floribus globosis luteis. Pluk. mant. I. t. 330. f. 3.
Habitat in India. ♂

pennata.

33. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis numerosissimis linearí-acerosis, panicula aculeata, capitulis globosis. *Fl. zeyl.* 216.

Acacia aculeata multiflora, foliis pennas avium referentibus. Barm. zeyl. 2. t. 1.

Habitat in Zeylona. ♂

India.

34. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis, foliolis incurvis, caule angulato.

Mimosa aculeis undique sparsis solitariis, foliis duplicato-pinnatis, caule angulato. Hort. cliff. 209. *Gron. virg.* 195.

Acacia maderaspatana spinosa, pinnis veluti lunulatis: nervo pinnularum ad unicum latus vergente. Pluk. alm.
4. t. 122. f. 2.

Intsia. Rheed. mal. 4. p. - - - t. 122. f.

Habitat in India. ♂

semipinnata.

35. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis, articulis caulinis superne aculeatis.

Mimosa aculeis ad summitatem internodiorum confertis, foliis duplicato-pinnatis. Hort. cliff. 208.

Habitat in America. ♂

quadrivalvis

36. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis, caule quadrangulo, aculeis recurvis, leguminibus quadrivalvibus.

Mimosa undique aculeata, caule angulato, foliis duplicato-pinnatis: partialibus utrinque ternis. Roy. lugdb. 471.

Mimosa herbacea procumbens ac spinosa, caule quadrangulo, siliquis quadrivalvibus. Houst. mss. fig. bon.
Amm. herb. 586.

Habitat in Vera Cruce. ♀

Aculei recurvi, sparsi in caule, petiolis, pedunculis. Folia partialia utrinque ternæ foliolis plurimis, Pedunculi axillares, terminati Capitulo globoso.

37. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis: partialibus viginti- *tenuifolia*,
jugatis: propriis multi-jugatis.
Acacia repens aculeata, flore albo, foliis omnium mini-
mis. *Plum. spec.* 17.
Habitat in America calidiore.
Aculei recurvi in caule & Pedunculis communiter. Flo-
res capitati, laterales, plures.
38. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis: partialibus quin- *ceratonia*,
que-jugatis: propriis tri-jugatis trinerviis.
Acacia repens aculeata, flore albo, foliis siliquæ. *Plum.*
spec. 17.
Habitat in America calidiore.
Aculei recurvi in caule & petiolis. Pedunculi laterales,
conferti. Flores capitati. Legumina obtusa, sutura a-
cicata.
39. MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis: partialibus quin- *tamarindifolia*,
que-jugatis: propriis deceim-jugatis, petiolis inermibus. *lue.*
Acacia aculeata, flore albo, foliis tamarindi. *Plum. sp. 17.*
Habitat in America meridionali. ♂
Pedunculi ramosi. Flores spicati.

CISTUS.

* *Exstipulatæ fruticosæ.*

1. CISTUS arborescens, foliis cordatis lævibus acumina- *populifolia*,
tis petiolatis. *Hort. cliff.* 205. *Roy. lugdb.* 474.
Cistus Ledon, foliis populi nigræ, major. *Baub. pin.* 467.
Ledum latifolium 2, majus. *Clus. hist.* 1, p. 78.
β. Cistus Ledon, foliis populi nigræ, minor. *Baup. pin.* 467.
Ledum latifolium 2 minus. *Clus. hist.* 1, p. 78.
Habitat in Lusitania. ♂
2. CISTUS arborescens, foliis ovatis petiolatis trinerviis *laevifolia*,
supra glabris: petiolis basi connatis.
Cistus Ledon, foliis laurinis. *Baup. pin.* 467.
Ledon 1 latifolium. *Clus. hist.* 1, p. 77.
Habitat in Hispania. ♂
3. CISTUS arborescens, foliis lanceolatis supra lævibus, *ladanifera*,
petiolis basi coalitis vaginantibus. *Hort. cliff.* 205.
Sauv. monsp. 147. 150.
Cistus ladanifera hispanica incana. *Baup. pin.* 467.
Cistus Ledon 1 angustifolius. *Clus. hist.* 1, p. 77.
Habitat in Hispaniæ, Lusitaniam collibus. ♂
Flores umbellati. Folia crassa, utri inque acuta. *Sauv.*
4. Cl-

- incana.* 4. *CISTUS* arborescens, foliis sessilibus utrinque villo-
fis rugosis: inferioribus ovatis basi connatis; suminis
lanceolatis. *Hort. cliff.* 205. *Hort. upf.* 143. *Roy.*
lugdb. 475.
Cistus mas angustifolius. *Baub. pin.* 464.
Cistus mas 2. *Clus. hist.* 1. p. 69.
Habitat in Hispania, G. Narbonensi. ♂
- monspeliensis.* 5. *CISTUS* arborescens, foliis lanceolatis sessilibus utrin-
qne villoso trinervius, alis nudis. *Hort. cliff.* 205.
Hort. upf. 144. *Roy. lugdb.* 1475. *Sauv. monsp.* 147.
Cistus ladanifera monspeliensium. *Baub. pin.* 467.
Ledum. *Dalech. hist.* 230.
β. *Cistus* Ledon foliis oleæ, sed angustioribus. *Baub. pin.*
467.
Ledon 5. *Clus. hist.* 1. p. 79.
Habitat in Narbonensi & Regno Valentino. ♂
- albida.* 6. *CISTUS* arborescens, foliis oblongis tomentosis in-
canis sessilibus supra aeniis, alis nudis. *Sauv. monsp.*
150.
Cistus mas, folio oblongo incano. *Baub. pin.* 464.
Cistus mas 1. *Clus. hist.* 1. p. 68.
Cistus mas 4. monspeliensis, folio oblongo albido.
Baub. hist. 2. p. 3.
Habitat in G. Narbonensi, Hispania. ♂
- Salicifolia.* 7. *CISTUS* arborescens, foliis ovatis petiolatis utrinque
hirsutis, alis nudis. *Hort. cliff.* 205. *Roy. lugdb.* 475.
Sauv. monsp. 150.
Cistus femina, folio salviæ. *Baub. pin.* 464.
Cistus femina. *Clus. hist.* 1. p. 60.
Habitas in Italia, Sicilia, Narbona. ♂
Pedunculi uniflori, diphylli. Corollæ albæ. D. *Sauv.*
- erispa.* 8. *CISTUS* arborescens, foliis lanceolatis hirsutis repan-
dis, alis nudis. *Hort. cliff.* 206. *Roy. lugdb.* 475.
Sauv. monsp. 147.
Cistus mas, foliis chamaedryos. *Baub. pin.* 464.
Cistus mas 5. *Clus. hist.* 1. p. 69.
Habitat in Lusitania. ♂
Ramuli, pedunculi & calyces tenui lana adspersi.
- balinifolia.* 9. *CISTUS* arborescens, alis nudis, foliolis duobus ca-
lycinis linearibus. *Hort. cliff.* 205. *Roy. lugdb.* 475.
Sauv. monsp. 147.
Cistus femina, portulacæ marinæ folio latiore obtuso.
Baub. pin. 465. *Cistus*

- Cistus folio halimi 1. *Clus. hist.* 1. p. 71.
 β. Cistus femina, portulacæ marinæ folio angustiore mucronato. *Baub. pin.* 465.
 Cistus halimi folio 2. *Clus. hist.* 1. p. 71.
Habitat in Lusitanæ maritimis. ♂

* *Exstipulæ, suffruticosæ.*

10. CISTUS suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis oppositis, floribus umbellatis.
 Cistus foliis linearibus non stipulatis, caule florali umbellato lignoso. *Guett. stamp.* 2. p. 180. *Dalib. paris.* 158.
 Cistus Ledon foliis thymi. *Baub. pin.* 467.
 Ledon X. *Clus. hist.* 1. p. 81.
Habitat in Gallia, Hispania. ♂
11. CISTUS suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis *Fumana*, alternis linearibus, pedunculis unifloris.
 Cistus caule procumbente, foliis alternis. *Fl. succ.* 435.
Guett. stamp. 157.
 Cistus fruticosus procumbens, foliis aciformibus nudis.
Sauv. monsp. 45.
 Helianthemum foliis linearibus sæpius alternis non stipulatis, pedunculis unifloris, caule lignoso. *Guett. stamp.* 2. p. 18.
 ChamæCistus, ericæ folio, luteus elatior. *Baub. pin.* 466.
 Helianthemum tenuifolium glabrum erectum, luteo flore. *Baub. hist.* 2. p. 18.
 β. Cistus fruticosus procumbens, foliis aciformibus nudis, floribus auriculatis. *Sauv. monsp.* 46.
 ChamæCistus, ericæ folio, luteus humilior. *Baub. pin.* 466.
 Helianthemum tenuifolium glabrum, luteo flore, per humum sparsum. *Baub. hist.* 2. p. 18.
Habitat in Gallia, Gotlandia, Helvetia. ♂
Colla calyce rix major est.
12. CISTUS suffruticosus exstipulatus procumbens, foliis oppositis villosis subtus tomentosis.
 Cistus foliis ovatis subtus incanis, alis nudis, caule procumbente. *Sauv. monsp.* 148.
 ChamæCistus foliis myrti minoris incanis. *Baub. pin.* 466.
 ChamæCistus foliis myrti tarentinæ canis & cinereis. *Baub. hist.* 2. p. 18.

ChamæCistus 3. *Clus. hist.* 1. p. 74.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania. ♂

marifolius. 13. CISTUS suffruticosus exstipulatus, foliis oppositis ovatis petiolatis planis subtus tomentosis.

Helianthemum luteum, thymi durioris folio. *Barr. rar.* 521. t. 441.

Habitat Massiliæ. ♀

Oelandicus. 14. CISTUS suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis oppositis oblongis utrinque glabris, petiolis ciliatis, petalis emarginatis.

Cistus caule procumbente, foliis oblongis utrinque glabris, stipulis nullis. *Fl. suec.* 434. *

Habitat in rupibus apricis Oelandiæ. ♀

* Exstipulatæ, herbaceæ.

Tuberaria. 15. CISTUS exstipulatus perennis, foliis radicalibus ovatis trinerviis tomentosis: caulinis glabris lanceolatis; summis alternis.

Cistus perennis, foliis humi appressis villosis; summis glabris. *Sauv. monsp.* 149.

Cistus folio plantaginis. *Baeh. pin.* 465.

Tuberaria nostras. *Baeh. hist.* 2. p. 12.

Tuberaria major. *Baeh. hist.* 2. p. 12.

Habitat in Galloprovincia, Hispania, Pisis. ♀

guttatus. 16. CISTUS herbaceus exstipulatus, foliis oppositis trinerviis, racemis ebracteatis.

Cistus annuus, foliis radicalibus oppositis lanceolatis trinerviis, ramiferis ternatis linearibus. *Sauv. monsp.* 148.

Cistus foliis oblongo acuminatis non stipulatis, caule florali racemoso. *Guett. stamp.* 2. p. 181. *Dalib. paris.* 158.

Cistus flore pallido, punicante macula insignito. *Baeh. pin.* 465.

Helianthemum flore maculoso. *Col. ecpbr.* 2. p. 78. t. 77.

Habitat in G. Narbonensi, Italia. ☽

Racemi capillares omnino, absque ulla vel minimis bracteis.

canadensis. 17. CISTUS herbaceus exstipulatus, foliis omnibus alternis lanceolatis, caule adscendente.

Habitat in Canada. *Kalm.* ♀

Facies *C. Helianthemi*, sed *Folia alterna*.

* *Stipulatæ, herbaceæ.*

18. *CISTUS* *herbaceus* *erectus* *glaber* *stipulatus* *floribus ledifolius*,
soltariis *subsessilibus*, *folio ternato* *oppositis*. *Hort.*
nps. 144. *Sauv. monsp.* 178.

Cistus *stipulis* *quaternis*, *foliis* *oblongis*, *caule* *erecto*.
Hort. cliff. 475.

Cistus *ledi* *folio*. *Baub. pin.* 465.

Cistus *annuus*, *foliis* *ledi*. *Lob. ic.* 2. *p.* 118.

Habitat *Monspelii*. ◎

19. *CISTUS* *herbaceus* *patulus* *villosum* *stipulatum*, *floribus salicifolius*,
soltariis *subsessilibus* *bractea* *triplici* *oppositis*. *Hort.*
nps. 144.

Cistus *stipulis* *quaternis*, *foliis* *subovatis* *subtus* *tomentosus*, *caule* *procumbente*. *Hort. cliff.* 206.

Cistus *folio* *salicis*. *Baub. pin.* 465.

Cistus *annuus* 1. *Cluj. hist.* 1. *p.* 76.

Habitat *in Lusitania, Hispania*. ◎

20. *CISTUS* *herbaceus* *erectus* *stipulatus*, *foliis* *linearis* *egyptiaca*,
lanceolatis *petiolatis*, *calycibus* *inflatis* *corolla* *majorebus*.

Habitat *in Ægypto*. *B. Jussieus*. ◎

Conf. *Cytisus* *foliis* *inferioribus* *confertis*, *superioribus*
oppositis. *Burm. zeyl.* 85. *t.* 36.

* *Stipulatæ, suffruticosæ.*

21. *CISTUS* *suffruticosus* *procumbens* *stipulatus*, *foliis* *surrejanus*,
ovato-oblongis *subpilosis*, *petalis lanceolatis*.

Helianthemum *vulgare*, *petalis* *florum* *perangustis*. *Dill*
elth. 177. *t.* 145. *f.* 174.

Habitat *in Anglia comitatu Surrejano prope Croydon*. ♀

22. *CISTUS* *suffruticosus* *stipulatus*, *foliis* *inferioribus* *orbiculatis*, *superioribus* *ovatis*. *nummularius*.

Cistus *humilis* 1. *ChamæCistus* *nummularia* *folio*.
Magn. monsp. 293.

Helianthemum *ad nummulariam* *accedens*. *Baub. hist.* 2.
p. 20.

Habitat *Monspelii*. ♀

23. *CISTUS* *suffruticosus* *stipulatus*, *foliis* *oblongis*, *calycibus* *laevibus*. *Sauv. monsp.* 148.

ChamæCistus *repens* *serpillifolia* *lutea*. *Baub. pin.* 466.

ChamæCistus *serpylli* *folio* *nigricante* & *hirsuto*, *flore*
aureo odorato. *Baub. hist.* 2. *p.* 17.

Cha-

ChamæCistus 2. *Clus. hist.* 1. p. 73.

Habitat in Alpibus Austriae, Stiriae. 5

thymifolius. 24. CISTUS suffruticosus stipulatus procumbens, foliis ovali-linearibus oppositis congestis. *Sauv. monsp.* 148. †

Helianthemum folio thymi incano. *Bauh. hist.* 2. p. 19.

ChamæCistus incanus, tragorigani folio, hispanicus. *Barr. rar.* 512. t. 415.

Habitat in G. Narbonensi, Hispania. 5

plenos. 25. CISTUS suffruticosus stipulatus, foliis linearibus supertus bisulcatis incanis, calycibus laevibus. *Sauv. monsp.* 147.

ChamæCistus foliis thymi incanis. *Bauh. pin.* 466.

ChamæCistus 4. *Clus. hist.* 1. p. 74.

β. Cistus stipulis quaternis, foliis linear-ovalibus incanis, calycibus tomentosis. *Sauv. monsp.* 148.

Helianthemum flore albo, folio angusto hirsuto *Bauh. hist.* 2. p. 17.

γ. Cistus foliis villosis lanceolatis, axillis foliosis, stipulis subulatis. *Sauv. monsp.* 148.

Helianthemum s. Cistus humilis, folio sampsuci, capitulis valde hirsutis. *Bauh. hist.* 2. p. 20.

Habitat Monspelii. 5

Haec tres α. β. γ. vel varietates vel valde affines: certiora determinent autoptæ.

Helianthemum. 26. CISTUS suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis.

Cistus stipulis quaternis, foliis oblongis utrinque nudis caule procumbente. *Hort. cliff.* 206. *Roy. Ingdb.* 476. *Fl. suec.* 433.

ChamæCistus vulgaris, flore luteo. *Bauh. pin.* 465. *Læs. pruss.* 43. t. 8.

Flos foliis, Panax chironium. *Cam. epit.* 501.

Habitat in Europæ pascais siccis 5

Petala suborbiculata, integerrima, flava, annulo receptaculum ambiente sepias fulvo. Racemus ante florescientiam nutans. Folia pilis raris adpersa.

hirsutus. 27. CISTUS suffruticosus stipulatus foliis ovatis, calycibus hispidis.

Cistus foliis oblongo-linearibus margine revolutis. *Le monier. Sauv. monsp.* 148.

Helianthemum rorismarini folio subtus incano. *Bauh. pin.* 467.

Hel-

Helianthemum, angusto serpilli folio, villosum, flore aureo, italicumq. Barr. rar. 511. t. 488.

Ledon 8. Clus. hist. 1. p. 8.

Habitat in Hispania, Narbona. ♂

8. *CISTUS* suffruticosus stipulatus erexit, foliis lance-apenninica-
olatis hirtis.

Helianthemum album germanicum. Tabern. icon. 1062.

Helianthemum faxatile, foliis & caulibus incanis oblongis, floribus albis. Mentr. pug. 8. f. 3. Dill. eth. 170.

Habitat in Apenninis, Italiam montibus. ♂

Cistorum historia maxime omnium obscura ob varietatum

topiam, illastrabitur si determinent autoptae in singulis

1. *Caudicem arborecentem, fruticosum. canuum s. per-*
rennem.

2. *Caulem erectum s. decumbentem.*

3. *Folia opposita s. alterna: cum figura eorundem.*

4. *Stipulas s. nullas.*

5. *Pedunculum uniflorum, multiflorum: nudum s. bra-*
cteatum.

6. *Petalorum figuram.*

7. *Capsulas glocales s. 3 valves.*

8. *Calycem aequalem s. inaequalem.*

CORCHORUS.

1. *CORCHORUS* capsulis linearibus compressis bivalvis siliquosis.
bus. Hort. apf. 147.

Corchoro affinis chamaedryos folio, flote stamineo, se-
minibus atris quadrangulis duplice serie dispositis.

Sloan. jam. 50. hist. 1. p. 145. t. 94. f. 1. Raj. suppl. 516.

Habitat in Jamaica. ☽

2. *CORCHORUS* capsulis oblongis ventricosis, folio-
rum intimis ferraturis setaceis reflexis. Fl. zeyl. 213.
Hort. apf. 147.

Corchorus foliorum intimis ferraturis maximis reflexis.
Hort. cliff. 209. Roy. lugdb. 478.

Corchorus plinii. Baub. pin. 317.

Corchorus. Cam. hort. 47. t. 12.

3. *Alcea cibaria* s. *Corchorus americana.* Pluk. alm. 17.
t. 127. f. 3.

4. *Alcea olitoria* s. *Corchorus americana.* Pluk. alm. 17.
t. 127. f. 4.

Habitat in Asia, Africa, America. ☽

3. *CORCHORUS* capsulis subrotundis depresso-
sis. Fl. zeyl. 214. *

Corchorus foliorum infimis serraturis minoribus. Hort. cliff. 210. Roy. lugdb. 478.

Alcea olitoria f. Corechorus americanus, prælongis foliis, capsula st. iata subrotunda brevi. Plak. alm. 18. t. 255. f. 4.

Habitat in India. ◎

hisfatus. 4. **CORCHORUS** capsulis subrotundis lanatis, foliis ovatis obtusis tomentosis.

Corchorus americanus lanuginosus, folio chamaedryos, filixa tricapsulari lanuginosa & subaspera. Breyn. prodr. 3. p. 56.

Guazuma frutex chamaedryfolia, fructu lanuginoso, major & minor. Plum. gen. 36.

Habitat in America meridionali.

DIGYNIA.

PÆONIA.

officinalis. 1. **PÆONIA.** *Hort. cliff. 212. Hort. upf. 149. Mat. med. 267. Sauv. monsp. 307.*

feminea. 2. *Pæonia foliis disformiter lobatis. Hall. helv. 311.*

Pæonia communis f. femina. Baub. pin. 323.

Pæonia femina. Fuchs. hist. 202. Lob. ic. 602.

mascula. 3. *Pæonia foliis lobatis ex ovato-lanceolatis. Hall. helv. 311.*

Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas. Baub. pin. 323.

Pæonia mas. Lob. ic. 684.

*Habitat in Nemoribus montium Idæ, Helvetiæ. **

Limits inter species non reperi, hinc conjunxi.

CALLIGONUM.

Polygonoides 1. **CALLIGONUN.** *Hort. cliff. 212.*

Polygonoides orientale, ephedræ facie. Tournef. cor. 47. itin. 3. p. 214. t. 214.

Habitat in monte Ararat. §

TRIGYNIA.

DELPHINIUM.

* *Unicapulares.*

Consolida. 1. **DELPHINIUM** nectariis monophyllis, cœui subdiviso. *Hort. cliff. 217. Fl. suec. 440. Mat. med. 263. Roy. lugdb. 482. Dalib. purif. 158.* Con-

Consolida regalis arvensis. *Bauh. pin.* 142.

Consolida regalis. *Cam. epit.* 521.

Habitat in agris Europæ restilibus. ⊖

2. DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule simplici. *Ajacis.*

Hort. cliff. 213. *Hort. upf.* 150. *Roy. lugdb.* 482.

Consolida regalis hortensis, flore majore & simplici.
Bauh. pin. 142.

Consolida regalis hortensis, flore minore. *Bauh. pin.* 142.

Consolida regalis flore majore & multiplici. *Bauh. pin.*
142.

Flos regius. *Dod. pempt.* 252.

Habitat - - - - ⊖

3. DILPHINIUM nectariis diphyllis, capsulis solitariis, *peregrinum.*
foliis multipartitis obtusis. *Hort. cliff.* 213.

Consolida regalis latifolia, parvo flore. *Bauh. pin.* 142.
prodr. 74. t. 74. *Morif. hist.* 3. p. 466. f. 12. t. 4. f. 3.

Habitat in Italia, Sicilia, Melita.

* *T. capsulares*

4. DELPHINIUM nectariis diphyllis labellis integris, flo- *grandiflo-*
ribus subsolitariis, foliis compositis linearis-inmultiparti- *tum.*
tis. *Hort. upf.* 150. *

Delphinium lusitanicum glabrum, aconiti folio. *Rolof-*
bert. 61. t. 3.

Delphinium elatius subincanum perenne, floribus amplis
azureis. *Amm. ruth.* 175.

Habitat in Sibiria. 2

5. DELPHINIUM nectariis diphyllis: labellis bifidis *a-letum.*
pice barbatis, foliis incisis, caule erecto. *Hort. upf.*
151. *

Delphinium nectariis diphyllis, foliis peltatis multiparti-
tis acutis. *Hort. cliff.* 213.

Aconitum exuleum hisatum, flore consolidae regalis.
Bauh. pin. 131.

Aconitum lycoctonum, flore delphinii filefaci. *Clus.*
hist. 2. p. 94.

Habitat in Sibiria. 2

6. DELPHINIUM nectariis diphyllis, foliis palmatis: *Staphisagria*
lobis integris. *Hort. cliff.* 213. *Hort. upf.* 150. *Mat-*
med. 269. *Roy. lugdb.* 482. *Savv. monsp.* 214.

Staphisagria. *Bauh. pin.* 324. *Dod. pempt.* 366.

Habitat in Istria, Dalmatia, Calabria, Apulia, Creta.
Galloprovincia. 3

ACONITUM.

- lycoëtonum.* 1. ACONITUM foliis palmatis multiñdis villosis.
Aconitum foliis peltatis multifidis, petalo supremo cylindraceo. *Fl. lapp.* 211. *Hort. cliff.* 213. *Fl. suec.* 441.
Roy. lugdb. 482. *Hall. helv.* 312.
Aconitum lycoëtonum luteum. *Bauh. pin.* 183.
Aconitum lycoëtonum, flore luteo. *Beßl. eyßt. æst.*
25. f. 2.
Aconitum II. *Cam. epit.* 827.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Austriæ, Italîæ. 2
- variegatum.* 2. ACONITUM foliis mutifidis: laciñis semipartitis:
superne latis. *Hort. cliff.* 214. *Hort. upf.* 151. *Roy. lugdb.* 482.
Aconitum cæruleum minus. f. *Napellus minor.* *Bauh. pin.* 183.
Aconitum cæruleum parvum. *Dod. pempt.* 441. *Dalech. hist.* 1743.
Habitat in Italîæ, Bohemiæ montibus. 2
- Napellus.* 3. ACONITUM foliorum laciñis linearibus superne latioribus linea exaratis. *Hort. cliff.* 214. *Fl. suec.* 442.
Gron. virg. 165. *Hall. helv.* 312. *Roy. lugdb.* 483.
Aet. stockh. 1739. p. 41. t. 2.
Aconitum cæruleum f. *Napellus* f. *Bauh. pin.* 183.
Napellus verus. *Lob. hist.* 387.
Habitat in Helvetia, Bavaria, Gallia. 2
- pyrenaicum.* 4. ACONITUM foliis multipartitis: laciñis linearibus
incubentibus squarrois. *Hort. upf.* 152. *
Aconitum pyrenaicum luteum, foliorum segmentis ubi
invicem incumbentibus. *Raf. europ.* 367.
Habitat in Sibiria, Tataria, Pyrenæis. 2
- Anthona.* 5. ACONITUM floribus pentagynis.
Aconitum foliorum laciñis linearibus distinctis ubique
eiusdem latitudinis. *Hort. cliff.* 214. *Hort. upf.* 152.
Mat. med. 270. *Hall. helv.* 313. *Roy. lugdb.* 483.
Aconitum salutiferum f. *Anthona.* *Bauh. pin.* 184.
Anthona f. *Antithora.* *Cam. epit.* 837.
Habitat in Alpibus Pyrenæis, Helveticis, Taurinis, Allobrogicis. 2

TETRAGYNIA.

TETRACERA.

1. TETRACERA. *Hort. cliff.* 214. * *volubilis.*
Petrea floribus spicatis, scabris lauri foliis. Amm. herb.
581.
Fagus americanus, ulmi amplissimis foliis, capsulis bige-
mellis. Plak. am. dt. 87.
Arbor americana convolvulacea platyphyllos barbaden-
sibus dicta, foliis ferratis. Plak. alm. 48. t. 146. f. 1.
Habitat in Barbados, Vera Cruce, Marilandia. 5

PENTAGYNIA

AQUILEGIA.

1. AQUILEGIA nectariis incurvis. *Hort. upf.* 152. *Mat. vulgaris.*
med. 272.
Aquilegia. Hort. cliff. 215. Roy. lugdb. 482. Dalib.
paris. 160.
Aquilegia sylvestris. Baub. pin. 144.
B. Aquilegia hortensis simplex. Baub. pin. 144.
C. Aquilegia hortensis multiplex, flore magno C. B. 144.
D. Aquilegia hortensis multiplex, flore inverso. C. B. 144.
E. Aquilegia flore roseo multiplici. C. B. 144.
F. Aquilegia degener virescens. Baub. pin. 144.
Habitat in Europa nemoribus saxosis. 2
2. AQUILEGIA nectariis rectis petalo lanceolato brevi- *alpina.*
oribus.
Aquilegia montata, magno flore. Baub. pin. 144. prodr.
75. Burf. VII: 108. Baub. bist. 3.p. 484. Raj. bist.
707.
Habitat in Helvetia. 3
Folia duplicita-ternata, parva: foliolis multifidis: lobis
sublinearibus, obtusis, facie & teneritudine sequentis;
Nectarii cornicula erectinacula, brevia, petalis dimidio
breviora. Petala lanceolata, longissima.
3. AQUILEGIA nectariis rectis, staminibus corolla longioribus. *Hort. upf.* 153. *canadensis.*
Aquilegia corolla simplici, nectariis fore rectis. Gron.
virg. 59.
Aquilegia pumila præcox canadensis. Corn. canad. 60.
t. 60. Lob. ic. 26.

Aquilegia præcox canadensis, fiore externe rubicundo :
medio luteo. *Moris. hist. 3. p. 457. f. 12. t. 2. f. 4.*
Habitat in Virginia, Canada. ☐

NIGELLA.

* *Pentagynæ.*

- Iamascena.* 1. *NIGELLA* floribus involucro folioso cinctis. *Hort. cliff. 215. Hort. upf. 153. Roy. lugdb. 481.*
Nigella angustifolia, flore majore simplici cæruleo.
Baub. pin. 145.
Melanthium sylvestre. Matth. diosc. 529.
2. *Nigella* flore majore pleno cæruleo. *Baub. pin. 145.*
Habitat inter segetes Europæ australis. ☐
- Sativæ.* 2. *NIGELLA* petalis subtricuspidatis foliis subpilosis.
Hort. upf. 154. Mat. med. 271. Bæhm. lipf. 173.
Nigella flore minore simplici candido. *Baub. pin. 145.*
Melanthium sativum. Cam. epit. 551.
Nigella flore minore pleno & albo. *Baub. pin. 146.*
Habitat in Ægypto, Creta. ☐
- Cornæns.* 3. *NIGELLA* pistillis quinque, petalis integris, capsulis turbinatis.
Nigella fiore foliis nudo, pistillis corollam æquantibus.
Hort. cliff. 215. Roy. lugdb. 481. Hall. helv. 316.
Dalib. parf. 160. Bæhm. lipf. 174.
Nigella arvensis cornuta. Baub. pin. 145.
Melanthium sylvestre alterum. Cam. epit. 553.
Habitat in Germanniæ, Galliæ, Italiae agris. ☐
Hujus Capsula inferno angustior, præcedentis inferne ventricosior; superne utraque contra.
- * *Decagynæ.*
- Hispanica.* 4. *NIGELLA* pistillis denis corollam æquantibus. *Hort. upf. 154. Sauv. monsp. 253.*
Nigella latifolia, flore majore simplici cæruleo. *Baub. pin. 145. prodr. 75. Moris. hist. 3. p. 516. f. 12. t. 18. f. 8.*
Habitat in Hispania, Monspeliæ. ☐
- Orientalis.* 5. *NIGELLA* pistillis denis corolla longioribus. *Hort. cliff. 215. * Hort. upf. 153. Roy. lugdb. 481.*
Nigella chaleensis lutea, corniculis longioribus. Moris. hist. 3. p. 516. f. 12. t. 18. f. 10. Raj. app. 525.
Habitat circum Alepum. ☐

HEXAGYNIA.

STRATIOTES.

1. STRATIOTES foliis ensiformi-triangulis ciliato- α -*Aloides*.
euleatis.

Stratiotes. *Fl. lapp.* 222. *Fl. suec.* 444. *Hort. cliff.* 221.
Roy. lugdb. 10. *Gort. gelr.* 313.

Stratiotes militaris aizoides. *Lob. bist.* 904.

Aloë palustris, *Raub.* *pin.* 286.

Habitat in Europæ septentrionalis aquis pigris. 2

2. STRATIOTES foliis cordatis. *Fl. zeyl.* 223. *Alismoides*.
Oel-ambel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 95. *t.* 46.

Habitat in India. 2

POLYGYNIA.

DILLENTIA.

1. DILLENTIA. *Hort. cliff.* 221. *indica*.
Syalita. *Rheed. mal.* 3. *p.* 39. *t.* 38. 39.
Habitat in Malabarica. 3

LIRIODENDRON.

1. LIRIODENDRON. *Hort. cliff.* 223. *Hort. upf.* 154. *Tulipifera*.
Gron. virg. 60. *Roy. lugdb.* 494.
Tulipifera arbor virginiana. *Herm. lugdb.* 612. *t.* 613.
Tulipifera virginiana, tripartito aceris folio: media lacinia velut abscissa. *Pluk. alm.* 379. *t.* 117. *f.* 5. & *t.* 248. *f.* 7. *Catesb. car.* 1. *p.* 48. *t.* 48.
2. *Tulipifera caroliniana*, foliis productioribus magis angulosis. *Pluk. alm.* 379. *t.* 68. *f.* 3.
Habitat in America septentrionali. 3

MAGNOLIA.

1. MAGNOLIA. *virginiana*.
Magnolia foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 222. *Gron.*
virg. 61. *Ray. lugdb.* 493.
2. Magnolia foliis ovato-lanceolatis subtus glaucois. *Anon. glauca*.
Magnolia lauri folio subtus albicante. *Catesb. car.* 1. *p.* 39. *t.* 39. *Dill. eltb.* 207. *t.* 168. *f.* 205.
Tulipifera virginiana, laurini foliis averba parte torsa
ceruleo ciuctis, coni-baccifera. *Pluk. alm.* 379. *t.* 68.
f. 4.

- fœtida.* Laurus tulipifera, baccis calyculatis. *Raj. hist.* 1690.
B. Magnolia foliis ovato-oblongis subtus viridibus. *Anon.*
. Magnolia altissima, flore ingenti candido. *Catesb. car.*
. 2. p. 61. t. 61. Ehret. pict.
Magnolia amplissimo folio, fructu cœruleo. *Plum. gen.*
38.
Magnolia fiore maximo albo fœtido, foliis decidatis amplis, florum ad ramulorum seriem sphærice cingentibus, fructu majori. *Gron. virg.* 61.
grisea. *γ.* Magnolia foliis ovato-oblongis subtus griseis. *Anon.*
Laurus tulipifera, foliis subtus ex cinereo aut argenteo purpurascenscentibus. *Raj. hist.* 1718.
tripetala. *δ.* Magnolia amplissimo flore albo. fructu coccineo. *Catesb. car.* 2. p. 80. t. 80.
acuminata. *ε.* Magnolia flore albo, folio majore acuminato haud albidente. *Catesb. car.* 2. p. 15. t. 15. *Gron. virg.* 61.
Habitat in Virginia, Carolina. 5
Utrum hæ: α. β. γ. δ. ε. sint distinctæ, determinent autoptæ in solo naturali? harum.
δ. Petalis tribus exterioribus reflexis.
ε. Foliis ovatis acuminatis.
β. Flore maximo & longiore in diametro quam foliorum longitudo & Foliis subtus griseis.

MICHELIA.

Champaca. 1. MICHELIA. *Fl. zeyl.* 144.

Champacam. Rheed. mal. 1. p. 31. t. 19. *Raj. hist.* 1641.
Habitat in India. 5

UVARIA.

zeylanica. 1. UVARIA foliis integerrimis.

Uvaria. Fl. zeyl. 224. *

Narum-panel. Rheed. mal. 2. p. 11. t. 9. *Raj. hist.* 1636.
Habitat in India. 5

japonica. 2. UVARIA foliis serratis.

Frutex viscosus procumbens, folio telephii vulgaris amulo, fructu racemoso. *Kempf. amœn.* 476. t. 477.
Habitat in Japonia. 5

ANNONA.

muricata. v. ANNONA foliis ovali-lanceolatis glabris nitidis planis, pomis muricatis. *Hort. cliff.* 222. * *Gron. virg.* 61. *Roy. lugab.* 494. Anno

POLYANDRIA POLYGYNIA. 531

Anona indica latifolia, fructu squamoso aspero. *Pluk.*
alm. 31. *t.* 134. *f.* 2.

Anona indica fructu conoide viridi squamis veluti aculeato. *Pluk. alm.* 32. *t.* 135. *f.* 2.

Anona maxima, foliis latis splendentibus, fructu maximo viridi conoide: tuberculis s. spinulis innocens aspero. *Sloan. jam.* 203. *hist.* 2. *p.* 196. *t.* 225.

Anona. *Comm. hort.* 1. *p.* 133. *t.* 69.

Guanabanus fructu e viridi lutescente molliter aculeato. *Plum. gen.* 43.

Habitat in America calidiore. 3

2. ANNONA foliis oblongis, fructibus obtuse subsquamatis. *squamosa.*

Anona foliis odoratis minoribus, fructu conoide squamoso parvo dulci. *Sloan. jam.* 205. *hist.* 2. *p.* 168. *t.* 227. *Raj. dendr.* 77.

Habitat in America meridionali. 3

3. ANNONA foliis lanceolatis, fructibus ovatis reticulato-reticulata. lato-areolatis.

Anona maxima foliis oblongis angustis, fructu maximo luteo conoide: cortice glabro in areolas angulares distincto. *Sloan. jam.* 264. *hist.* 2. *p.* 167. *t.* 226. *Catesb. car.* 2. *p.* 62. *t.* 62. *Raj. dendr.* 77.

Habitat in America meridionali. 3

4. ANNONA foliis lanceolato-ovatis, fructibus cono glabra. dibus glabris.

Anona maxima, foliis latis, fructu maximo luteo conoide: cortice glabro. *Catesb. car.* 2. *p.* 64. *t.* 64.

Habitat in Carolina. 3

5. ANNONA foliis lanceolatis, fructibus trifidis. *triloba.*

Anona fructu lutescente levi serotum arietis referente.

Catesb. car. 2. *p.* 85. *t.* 85.

Habitat in Carolina. 3

6. ANNONA foliis lanceolatis glabris nitidis secundum *asatica.* nervos sulcatis. *Hort. cliff.* 222. * *H. zeyl.* 225. *

Roy. lugdb. 494.

Annona sylvestris. *Burm. zeyl.* 2.

Habitat in Zeylona. 3

7. ANNONA foliis lanceolatis pubescens. *Hort. cliff. africana.* 222. *Roy. lugdb.* 494.

Habitat in Æthiopia. 3

- γ. *Anemone alpina alba minor*. Baub. pin. 176. prod. 194. Burs. IX: 81.
Habitat in Alpibus Styriacis, Helveticis. ♀
Confer: Pulsatilla lutea, pastinace sylvestris folio. C. B.
177. quæ vix videtur ab hac diversa.

- hortensis.* 9. **ANEMONE** foliis digitatis.
Pulsatilla foliis digitatis. Hort. cliff. 224.
Anemone, geranii rotundo folio, purpurascens. Baub.
pin. 173.

- Anemone hortensis latifolia* 3. Clas. hist. I. p. 249.
Anemone 1. Dod. pempt. 434.
Habitat ad Rhenum & in Italia. ♀

* *Anemonoide flore nudo, seminibus ecandatis.*

- sylvestris.* 10. **ANEMONE** pedunculo nudo, seminibus subrotundis hirsutis.
Anemone seminibus hirsutis. It. oel. 112. Fl. suec. 449.
Anemone seminibus seta plumosa terminatis. Hort. cliff.
224. Roy. lugdb. 224.
Anemone sylvestris alba major. Baub. pin. 176.
Anemone sylvestris 1. Clas. hist. I. p. 244.
B. Anemone sylvestris alba minor. Baub. pin. 176. prodr.

93.

Habitat in Germania. ♀

- virginiana.* 11. **ANEMONE** pedunculis alternis longissimis, fructibus cylindricis, seminibus hirsutis muticis.
Anemone caule ramoso, petalis lanceolatis. Roy. lugdb.
488. Gron. virg. 165.
Anemone virginiana tertæ similis, flore parvo. Herm.
lugdb. 645. parad. 18. 2. 18.
Habitat in Virginia. ♀
Caulis nudus, terminatus Foliis ternis, ternatis: medio trilobo, acuto, serrato, lateralibus bipartitis, lobato-serratis. Pedunculus exinde centro petiolorum, longus, nudus. Flos parvus petalis ovatis, viridibus, instar calycis cuiusdam. Pistillorum capitulum elongatum, cylindricum, resolvitur in Semina hirsuta. Juxta pedunculi basin exit canalis ulterius, terminatus pedunculo florifero & foliis duobus oppositis & sic ulterius.

- dichotoma.* 12. **ANEMONE** caule dichotomo, foliis sessilibus amplexicaulibus palmatis. Amor. acad. I. p. 155. *
Habitat in Canada, Sibiria. ♀

- trifolia.* 13. **ANEMONE** foliis ternatis ovatis integris serratis.
caule

caule unifloro. *Hort. upf.* 155. *Hort. cliff.* 224. *Roy. lugdb.* 488. *Dalib. parif.* 161.

Anemone trifolia, fiore albo. *Bauh. hist.* 3. p. 412.
Anemone trifolia. *Dod. pempt.* 436.

Habitat in Gallia. 2

14. ANEMONE foliis quinatis ovalibus serratis, caule *quinquefolia* unifloro.

Ranunculus nemorum, fragariæ foliis, virginianus. *Plak. alm.* 310. t. 166. f. 3.

Habitat in Virginia, Canada. Kalm. 2

15. ANEMONE seminibus acutis, foliolis incisis, caule *nemorosa*, le unifloro. *Hort. cliff.* 224. *Fl. suec.* 450. *Roy. lugdb.* 488. *Mat. med.* 275. *Dalib. parif.* 161.

Anemone nemorosa, illore majore. *Bauh. pin.* 176.

Ranunculus sylvarum. *Clsif. hist.* 247.

Habitat in Europæ asperis, duris, nemoribus. 2

16. ANEMONE seminibus acutis, foliolis incisis, petalis *apennina*, lanceolatis numerosis.

Ranunculus nemorosus, flore cæruleo, apennini montis. *Menz. pug.* t. 8. f. 2.

Ranunculus nemorosus, flore purpuro-cæruleo. *Park. theatr.* 325. *Rej. angl.* 3. p. 259.

Anemone, *geranii robertiani* folio, cærulea. *Bauh. pin.* 174?

Habitat in Apenninis, Anglia. 2

17. ANEMONE seminibus acutis, foliolis incisis, petalæ *rannuncolæ* subrotundis, caule sub-bifloro. *Hort. cliff.* 125. *Fl. suec.* 451. *Roy. lugdb.* 488. *Dalib. parif.* 161.

Ranunculus nemorosus luteus. *Bauh. pin.* 178.

Ranunculus phragmites luteus *nemorosus*. *Bauh. hist.* 3. p. 413.

Habitat in Europæ borealis pratis nemorosis. 2

18. ANEMONE caule unifloro, involucro folioso obtuso. *Sibirica*.

Habitat in Sibiria. D. Gmelin. 2

Folia radicalia digitata, multifida, marginibus presertim hirsuta; petiolis pilosis basi vaginantibus. Scapus nudus, pilosus. Involucrum sub flore tripartitum, lobatum: laciniis lanceolatis. Flos patens: petalis 6, subrotundis, fulvis. Staminibus flavis. Pistillorum capitula subrotunda, muricata.

542 POLYANDRIA POLYGYNIA.

- marcissifolia.* 19. ANEMONE floribus umbellatis, seminibus depresso-ovalibus nudis.
Anemone multiflora, semine lævi latissimo, petalis senis ex rotundo-acutis. *Hall. helv.* 330.
Ranunculus montanus hirsutus humilior, *marcissi* flore. *Baeh. pin.* 182.
Ranunculus montani 2 species altera. *Clus. hist.* 1. p. 235.
Habitat in Alpibus Austriae, Helvetiae, Siberiae. 2
- fasciculata.* 20. ANEMONE floribus umbellatis congestis, foliis multifidis. †
Ranunculus orientalis, *aconiti lycoctoni* folio, flore magno albo. *Tournef. cor.* 20. *isin.* 3. p. 92. t. 92.
Habitat in Oriente.
Obscuræ adhuc distinctæ a præcedente, (cui simillima) quādriū hujus semina non descripta sunt.
- Thalictro-* 21. ANEMONE foliis caulinis simplicibus verticillatis, radicalibus duplicato ternatis.
Ranunculus nemorosus, *aquelegia* foliis. *virginianus*, *asphodeli* radice. *Pluk. alm.* 310. t. 106. f. 4.
β. Thalictrum caule unifloro, ex eodem punto foliis quatuor simplicibus instructo. *Gron. virg.* 62.
Habitat in Virginia, Canada.
Canadensis planta ♂, a *D. Kalmio lectæ*, Radix tuberosa. Folia radicalia petiolis longis, duplicato-ternata: foliolis subcordatis, angulatis. Scapus foliis paulo altior, terminatus foliis quatuor simplicibus, foliolis radicalibus similibus, petiolis longis insidentibus. Pedunculi terminales, conferti s. fasciculati 1, 2, 3. s. 5, simplices, uniflori, aequales. Corollæ albae: petalis ovatis, obtusis, patentibus. Stamina flavescens. Pistilli capitulum ovatum, muricatum.

ATRAGENE.

- zeylanica.* 1. ATRAGENE cirrhis diphyllis. *Fl. zeyl.* 226. *
Atragene. *Amon. acad.* 1. p. 405.
Clematis zeylanica, floribus obsoletis parvis. *Herm. zeyl.* 35.
Habitat in Zeylona. 3
- vulpina.* 2. ATRAGENE foliis duplicato-ternatis ferratis.
Clematis foliis cordatis crenatis indivisis trilobis ternisque. *Roy. lugdb.* 437.

Cle-

Clematis alpina geranifolia. *Baub. pin.* 300. *prodr.* 135.

Pluk. alm. 109. *t.* 84. *f.* 7.

Clematis cruciata alpina. *Pon. bald.* 335.

Anemone, *tubis caudatis, tetrapetala, pinnis latissimis.*
Hall. helv. 332.

Habitat in Helvetia, Baldo, Sibiria. 5

3. ATRAGENE foliis ternatis: foliolis tripartitis subser-*Sibirica.*
ratis.

Habitat in Sibiræ subhumidis ubique.

Caulis farmentosus. *Folia opposita, ternata, subferrata;*
foliolis trifidis: lobo exteriore profundiore. *Flores pa-*
niculati, rubri, pleni. Facies Aquilegiae stellatae.

4. ATRAGENE foliis ternatis: foliolis incisis laceris. *capensis.*
Pulsatilla foliis trifidis dentatis, flore incarnato pleno.

Burm. afric. 148.

Pulsatilla apii folio rigido, flore magno. *Herm. afr.* 18.

Habitat ad Cap. b. Spei. 2

CLEMATIS.

* *scandentes.*

1. CLEMATIS foliis compositis decompositisque: folio-*Viticella.*
lis ovatis integerrimis. *Hort. cliff.* 225. *Roy. lug. db.*
486.

Clematitidis cærulea vel purpurea repens. *Baub. pin.* 300.

Clematis altera. *Clus. hist.* 1. *p.* 122.

Clematitidis cærulea, flore pleno. *Baub. pin.* 300.

Habitat in Italiæ, Hispaniæ sepibus.

2. CLEMATIS foliis compositis decompositisque: folio-*Viorna.*
liolis quibusdam trifidis. *Gron. virg.* 62.

Flammula scandens, flore violaceo clauso. *Dill. elth.*
144. *t.* 118. *f.* 444.

Clematis purpurea repens, petalis florum coriaceis. *Raj.*
hist. 1928.

Scandens caroliniana planta, viornæ folio. *Pet. sicc.* 27.

Habitat in Virginia, Carolina.

3. CLEMATIS foliis simplicibus ternatisque: foliolis in-*crispa.*
tegris trilobisve.

Clematis flore crispo. *Dill. elth.* 86. *t.* 73. *f.* 84.

Habitat in Carolina.

4. CLEMATIS foliis compositis: foliolis incisis angu-*orientalis.*
latis lobatis cuneiformibus.

Cle-

Clematis orientalis, apii folio, flore e viridi-flavescente posterius reflexo. *Tournef. cor.* 20.

Flammula scandens, apii folio glauco. *Dill. eltb.* 144
t. 119. f. 145.

Habitat in Oriente.

Vitalba.

5. *CLEMATIS* foliis pinnatis, foliolis cordatis scandentibus. *Hort. cliff.* 225. *Roy. lugdb.* 486. *Hall. helv.* 334. *Gron. virg.* 62. *Sauv. monsp.* 249. *Gort. gelr.* 315

Clematis latifolia integra. *Baub. hist.* 2. p. 125.

Clematis tertia. *Cam. epít.* 697.

β. *Clematis latifolia dentata*. *Baub. hist.* 2. p. 125
Vitalba. *Dod. pempt.* 404.

γ. *Clematis sylvestris latifolia*. *Baub. pin.* 300. *Sloan. jam.* 84.
Habitat in sepiibus Europæ australis, Virginie, Jantraicæ.

tierbata.

6. *CLEMATIS* cirrhis scandens. *Hort. cliff.* 226. *Roy. lugdb.* 487.

Clematis peregrina, foliis pyri incisis. *Baub. pin.* 300.

Clematis altera bætica. *Clas. hist.* 1. p. 123.

Clematis peregrina, foliis pyri incisis: nunc singularibus, nunc ternis. *Tournef. cor.* 20.

Habitat in Bætica, arbores operiens & deprimens.

Flamminia.

7. *CLEMATIS* foliis inferioribus pinnatis laciniatis: summis simplicibus integrerrimis lanceolatis. *Hort. cliff.* 225. *Roy. lugdb.* 486. *Hall. helv.* 334. *Sauv. monsp.* 249.

Clematis f. Flammula repens. *Baub. pin.* 300. *Raj. hist.* 621.

Flammula. *Dod. pempt.* 404. *Dalech. hist.* 1171

β *Clematis maritima repens*. *Baub. pin.* 300. *prod. 135.*
Habitat Monspelii, Jenæ, inque Rhetiæ sepiibus.

* erectæ

8. *CLEMATIS* foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis intererrimis, caule erecto. *Hort. cliff.* 225. *Hort. upf.* 155. *Roy. lugdb.* 486. *Sauv. monsp.* 249.

Flammula recta. *Baub. pin.* 300.

Flammula. *Cam. epít.* 698. *Clas. hist.* 1. p. 124.

Habitat in collibus Austræ, Pannoniæ, Tatariae, Monspelii. 2

• *integrifolia.* 9. *CLEMATIS* foliis simplicibus ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 225. *Hort. upf.* 156. *Roy. lugdb.* 486
Clematis cærulea erecta. *Baub. pin.* 300.

Cle-

Clematis cærulea pannonica. Clus. hist. 1. p. 133.
Habitat in Hungaria, Tataria. 2.

THALICTRUM.

1. THALICTRUM caule simplicissimo subnudo, racemo simplici terminali. Hort. cliff. 227. Fl. suec. 455. Roy. lugdb. 485.
Thalictrum caule subnudo simplici, foliolis obtusis. Fl. lapp. 225. *
- Thalictrum montanum minimum præcox, foliis splendentibus. Moris. hist. 3. p. 325. f. 9. t. 20. f. 14.
Habitat in Alpibus Lapponiæ, Arvoniacæ. 2
Petala 4, Stamina 12, Pistilla 8, Racemus simplex floribus cernuis.
2. THALICTRUM caule paniculato ramosissimo folioso.
*Thalictrum caule filiformi ramosissimo in paniculam disperso subjectis foliis. Hort. cliff. 227. * Roy lugdb. 485. Sauv. monsp. 251.*
Thalictrum minimum fætidissimum. Bauh. pin. 337. prodr. 147. Bauh. hist. 3. p. 488. Moris. hist. 3. p. 325. f. 9. t. 20. f. 13. Plak. alm. 267. t. 65. f. 4..
Habitat Monspelii, inque Valletia, Helvetia. 2
3. THALICTRUM floribus pentapetalis, radice tuberosa.
Thalict. cliff. 227. Roy. lugdb. 486.
Thalictrum minus, asphodeli radice, magno flore. Tour. nef. inst. 271.
Ranunculus thalictri folio, asphodeli radice. Moris. hist. 2. p. 438. f. 4. t. 28. f. 13.
Oenanthæ folio hederæ. Bauh. pin. 163.
Habitat in Hispania. 2
4. THALICTRUM floribus pentapetalis, radice fibrosa.
Roy. lugdb. 486.
Thalictrum canadense. Corn. canad. 186.
Thalictrum americanum. Park. theatr. 265.
Thalictrum majus, foliis aquilegiæ, flore albo. Moris. hist. 3. p. 325.
Habitat in Canada. 2
- THALICTRUM floribus dioicis.
Habitat in Canada. Kalm. dioicum.
Altitudo vix pedalis. Caulis rectus. Flores tetrapetalis, corollis & staminibus 40 albis. Antheræ flavescentes.
M m Folio-

Foliola cernua sunt, qua nota distinētissima evadit
planta ex basi.

minus.

6. THALICTRUM foliis sexpartitis, floribus cernuis.
Thalictrum caule folioso, foliolis caulinis acutis, panicula divaricata, floribus nutantibus. Fl. succ. 454. It. roti. 180. * Dalib. paris. 454.

Thalictrum minus. Baub. pin. 337. Dod. pempt. 58.
Ruta pratensis minor. Tabern. ic. 55.

Habitat in Europæ pratis. ♀

Sibiricum.

7. THALICTRUM foliis tripartitis divaricatis, floribus cernuis.

Habitat in Sibiria D. Gmelin.

Habitus, Semina & omnia antecedentis, at Folia basi tantum tripartita, & foliola tenella, glauca, parva, uti in Fumaria.

purpurascens 8. THALICTRUM foliis tripartitis, caule foliis duplo altiore, floribus cernuis.

Habitat in Canada. ♀

Habitus Thalictri minoris, at vix pedalis evadit, ubi illo tripedalis. Cayces purpurascentes, staminibus interis. Caulis etiam purpurascens.

angustifoli-
um.

9. THALICTRUM foliolis lanceolato-linearibus integrimis. Hort. cliff. 226. Pl. hybrid. 28. Roy. lugd. 487. Hall. helv. 308. Sauv. monsp. 250.

Thalictrum pratense, angustissimo folio. Baub. pin 337. pradr. 146. t. 146. Plak. alm. 364. t. 65. f. 6.

Habitat in Germania rarius. ♀

Petala 4, stamina 16. Pistilla 7.

flavum.

10. THALICTRUM caule folioso sulcato, panicula multiplice erecta. Hort. cliff. 226. Fl. succ. 453. Roy. lugd. 485. Hall. helv. 308. Dalib. paris. 162.

Thalictrum pratense. Fl. lapp. 224.

Thalictrum majus, siliqua anguosa s. striata. Baub. pin. 336.

Thalictrum magnum. Dod. pempt. 58.

speciosum

- β. Thalictrum majus flavum, floribus luteis s. glauco folio. Baub. pin. 336. staminibus fulvis.

Habitat in Europæ septentrionalioris subhumidis; β. in Hispania. ♀

Petala 4, Stamina 24, Pistilla 10--16.

lucidum.

11. THALICTRUM caule folioso sulcato, foliis linearibus carnis. Dalib. paris. 162. †

Thali-

Thalictrum minus lucidum, libanotidis coronariae foliis. Pluk. aim. 363. t. 65. f. 5.

Thalictrum minus alterum parisienium, foliis crassioribus & lucidis. Tournef. inst. 271.

Thalictrum 1, vel pratense 1. Clas. hist. I. p. 234.
Habitat Parisii & in Hispania.

Planta, an satis distincta, a T. flavo? videtur temporis filia.

12. THALICTRUM fructibus pendulis triangulariis *equilegifoliis.* caule tereti.

Thalictrum seminibus triangularibus pendulis, stipulis caulinis. Hort. cliff. 226. Fl. suec. 452. Roy. lugdb. 285. Hall. helv. 309.

Thalictrum majus, flororum staminibus purpurascientibus. Baub. pin. 337.

Thalictrum majus, folliculis angulosis, caule laevi. Baub. hist. 3. p. 487.

Habitat in Scania. Helvetia 2

Petala 4, Stamina 60, Pistilla 16.

13. THALICTRUM fructibus pendulis triangularibus *contortum,* contortis, caule subancipiti.

Thalictrum hybridum seminibus contortis. Fl. hybrid. 27. *

Habitat in Sibiria. G. Demidoff. 2

Petala 4, Stamina 60, Pistilla 8. antecedenti similiis, sed humilior floribus albis.

ADONIS.

1. ADONIS floribus octopetalis, fructibus subcylindricis. *annua.* Hort. upf. 156.

Adonis radice annua. Hort. cliff. 321. Roy. lugdb. 488. Dalib. paris. 162. Sauv. monsp. 253.

2. Adonis sylvestris, flore phœnicco ejusque foliis longioribus. Baub. pin. 178.

Adonis flore pallido. Cam. epit. 648.

3. Adonis hortensis flore minore atro-rubente. Baub. pin. retorubens. 178.

Flos adonis. Clas. hist. I. p. 336.

Habitat inter segetes Europeæ australis. ⊖

Haec & 3. distinctæ persistunt, structura tamen eadem.

4. ADONIS flore dodecapetalo, fructu ovato. *vernalis.*

Adonis radice perenni. Hort. cliff. 231. Fl. suec. 456.

It. cel. 73. Roy. lugdb. 488. Sauv. monsp. 253.

M m 2

Helle-

Helleborus niger tenuifolius, buphtalmi flore. *Baen. pin.* 186.

Buphtalmum. *Dod. pent. 261.*

Habitat in Oelandia, Borussiae, Bohemiæ collibus apud cis. 2

apennina. 3. *ADONIS* floribus pentdecapetalis, fructu ovato.

Helleborus niger ferulaceus, caule geniculato, flore magno tulipæ minoris instar. *Menz. pag. t. 3. f. 1.*

Habitat in Sibiria, Apenninis. 2

Difficillime distinguuntur plantæ 2. 3. simillimæ. Caulis 2 adspersus pilis; 3 punctis farinosis pellucidis. Ramæ 2 ex caulis parte inferiore; 3 ex alis superioribus Pedunculus 2 brevissimus; 3 longior. Folia in 2 minus pinnata; 3 magis divisa. latiora, nitidiora. Calyx in 2 griseus striatus villosus concavus; 3 luteo viridis, glaber, avenius, planus. Petala in 2 lanceolata, sèpius duodecim; 3 ovata, imbricata, sèpius quindecim. Flos in 2 unicus; in 3 plures. Stamina in 3 valde reflexa. Planta 3. diutius aestate durat: vero vernalis est.

capensis. 4. *ADONIS* fructibus depresso-ternatis ovatis serratis.

Aetæa trifoliata hirsuta, foliis scabris, flore sulphureo rariore *Burm. afr. 147. t. 51.*

Christophoriana africana ranunculoides, foliis rigidis. *Boerb. Ingdb. 2. p. 62,*

Ranunculus æthiopicus, foliis rigidis, floribus ex luteo-virescentibus. *Cemm. hort. 1. p. 1. t. 1.*

Imperatoria ranunculoides africana enneaphyllos, laspetii lobatis foliis rigidis margine spinosis. *Pluk. alm. 198. t. 95. f. 2.*

Habitat ad Cap. b. Spei. 2

RANUNCULUS.

* *Folius simplicibus.*

Flammula. 1. *RANUNCULUS* foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Hort. cliff. 228. Fl. suec. 458. Ruy. lugd. 489. Hall. helv. 322. Dalib. paris. 163.*

Ranunculus foliis ovato-oblongis integerrimis, caule procumbente. *Fl. lapp. 325.*

Ranunculus longifolius palustris minor. *Baen. pin. 180. Flammula Ranunculus*. *Dod. pent. 432.*

2. *Ranunculus palustris*, foliis serratis. *Baen. pin. 180.*

Habitat in Europæ paucis udis. 2

2. RA

2. RANUNCULUS foliis linearibus, caule repente. *reptans*
Fl. lapp. 236. t. 3. f. 5. Fl. suec. 459
*Ranunculus flammus minimus, spargulæ folio. Buxb.
 cent 5. app. 41.*
- Ranunculus repens, gramineis foliis, e singulis genicu-
 lis radices agens. *Anm. ruth. 80. t. 13. f. 1.*
*Habitat in Svecia, Russia ad ripas lacuum antecedenti
 valde affinis & forte varietas.*
- 3 RANUNCULUS foliis lanceolatis, caule erecto. *Lingua.*
*Hort. cliff. 228. Fl. suec. 457 Roy. lugdb. 489. Dalib.
 paris. 163.*
Ranunculus longifolius palustris major. Bauh. pin. 34.
Ranunculus lanceolatus major. Tabern. ic. 48.
Habitat in Europa borealioris softis, aquis limosis. 2
- 4 RANUNCULUS foliis ovatis petiolatis, floribus ses- *nodiflorus.*
silibus. Hort. cliff. 229. Dalib. paris. 164.
*Ranunculus patinensis pumilus, plantaginellæ folio.
 Pet. gaz. 40. t. 25. f. 4. Vuit. act. 1719. p. 52. t.
 4. f. 4.*
- β. Ranunculus siculus, folio rotendo vix ferrato. *Pet.
 gaz. 39. t. 24. f. 9.*
Habitat Parisis & in Siciliæ locis paludosis
- 5 RANUNCULUS foliis lanceolato-linearibus sessili- *gramineis*
*bus, caule erecto, radice bulbosa. Hort. cliff. 288.
 Roy. lugdb. 489. Dalib. paris. 163. Sauv. monsp. 75.*
Ranunculus, gramineo folio, bulbosus. Bauh. pin. 180.
*Ranunculus pumilus, gramineis foliis. Bauh. hist. 3. p
 866.*
Hydropiper lanceolatum. Daelch. hist. 1038.
Habitat in Pyrenæis & Galliæ pratis aridis. 2
6. RANUNCULUS foliis subovatis nervosis integer- *parnassifolius*
riinis petiolatis
*Ranunculus montanus, graminis parnassi-folio. Tournef.
 hist. 286.*
Habitat in Europa australi.
7. RANUNCULUS foliis ovatis acuminatis anplexi- *anplexicaulis*
caulibus, caule subunito, radice fasciculata. Hort. cliff. 229. Roy. lugdb. 484. Sauv. monsp. 76.
*Ranunculus montanus, folio plantagineus. Bauh. pin. 180.
 Moris. hist. 2. p. 444. f. 4. t. 30 f. 30.*
*Ranunculus dulcis, foliis latissimis rapistri perfoliatis, flori-
 bus albis. Menz. pug. t. 8. f. 6.*

β . *Ranunculus montanus*, folio gramineo. *Baub. pin.* 181.
Morif. hist. 2, p. 441. f. 4. t. 30. f. 3 $\ddot{\text{E}}$.
Habitat in Pyrenæis, Apenninis. 2

- bullatus*, 8. **RANUNCULUS** foliis ovatis ferratis, scapo nudo unifloro. *Hort. cliff.* 229.
Ranunculus latifolius bullatus, asphodeli radicē. *Baub. pin.* 181.
Ranunculus lusitanicus. *Dod. pempt.* 429.
Ranunculus grumosa radice 1. *Clus. hist.* 1, p. 238.
 β . *Ranunculus latifolius* bulbatus autumnalis, flore pleno & prolifico. *Morif. hist.* 2, p. 447. f. 4. t. 31. f. 49. 50.
51.
Habitat in Lusitania, Creta. 2

- Ficaria*. 9. **RANUNCULUS** foliis cordatis angulatis petiolatis
Fl. suec. 460. *Hort. cliff.* 228. *Mat. med.* 274. *Rey lugdb.* 490. *Dalib. paris.* 167.
Chelidonia rotundifolia minor. *Baub. pin.* 167.
Chelidonium minus. *Fuchs. hist.* 866.
Chelidonia rotundifolia major. *Baub. pin.* 167. *prodr* 137.
Habitat in Europæ ruderatis, umbrosis, spongiosis. 2

- Thora* 10. **RANUNCULUS** foliis reniformibus subtrilobis crenatis, caulinō sessili, floralibus lanceolatis, caule sub-bifloro.
Aconitum pardalianches 1, f. *Thora major*. *Baub. pin.* 184.
Thora major. *Cam. epit.* 825.
Ptora valdensium. *Lob. i.* 604. *Clus. hist.* 1, p. 239.
 β . *Aconitum pardalianches alterum*, f. *Thora minor*. *Baub. pin.* 184.
Thora minor. *Cam. epit.* 826.
Limeum pardalianches genus, uno tantum follo. *Dalech. hist.* 1738.
Ranunculus foliis radicalibus cordato subrotundis, caulinis sessilibus lanceolatis integrerimis. *Hall. helv.* 327. *
Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis. 2

- erectens*, * *Foliis differtis & divisis.*
11. **RANUNCULUS** foliis radicalibus reniformibus crenatis sublobatis, caulinis tripartitis lanceolatis integrerimis, caule multiifloro.
Ranunculus foliis radicalibus cordato-subrotundis, caulinis

linis tripartitis sessilibus lanceolatis integrerimis. Roy.
lugdb. 490.

Ranunculus, asphodeli radice, creticus. Bauh. pin. 181.

Ranunculus creticus latifolius. Clus. hist. 1. p. 239.

Habitat in Creta. ♀

12. RANUNCULUS foliis radicalibus subrotundo-cori-^{cassubicus.}
datis crenatis; caulinis digitatis dentatis, caule multi
floro.

Ranunculus rotundifolius vernus sylvaticus major vel
cassubicus, folio thoræ calthæ. Breyn. prodr. 1. p. 45

Habitat in Cassubia, Sibiria. ♀

13. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus ^{curviformis.}
crenatis incisis; caulinis digitatis linearibus, caule mul-
tifloro. Hort. cliff. 229. Fl. suec. 462. Ray. lugdb.
490. Hall. helv. 327. Dalib. paris. 167.

Ranunculus nemorosus f. sylvaticus, folio subrotundo.
Bauh. pin. 178.

Ranunculus 1. sylvestris. Dalech. hist. 1028.

Habitat in Europæ paucis humidiisculis. ♀

14. RANUNCULUS foliis radicalibus cordatis cren-^{abortionis.}
tis; caulinis ternatis angulatis, caule sub trifloto.

Ranunculus foliis radicalibus crenatis, caulinis digitatis
petiolatis. Roy. lugdb. 490.

Ranunculus foliis radicalibus reniformibus crenatis pe-
tiolatis; caulinis paucis digitatis sessilibus. Gron. virg.
166.

Ranunculus virginianus, flore parvo, molliori folio.

Herm. lugdb. 514.

Habitat in Virginia, Canada.

15. RANUNCULUS foliis inferioribus palmatis; sum-^{seeleratus.}
mis digitatis, fructibus oblongis. Hort. cliff. 230. Fl.
suec. 463. Roy. lugdb. 490. Hall. helv. 323. Gron.
virg. 63. Dalib. paris. 167.

Ranunculus palustris, apii folio, levis. Bauh. pin. 180.

Ranunculus sylvestris 1. Dod. vesp. 425.

Habitat ad Europæ fossas & paludes. ☺

16. RANUNCULUS foliis omnibus quinatis lanceola-^{aconitifolius}
tis inciso-ferratis. Hort. cliff. 229. Hort. ups. 156.
Roy. lugdb. 490. Hall. helv. 325.

Ranunculus montanus, aconiti folio, albus: flore ma-
jore. Bauh. pin. 182.

- G.* Ranunculus montanus, aconiti folio, albus flore minore. *Baub. pin.* 182.
Ranunculus montanus 4. *Clus. hist.* 1. p. 236.
- Y.* Ranunculus folio aconiti, flore albo multiplici. *Baub. pin.* 179.
Ranunculus pleno flore albo. *Clus. hist.* 1. p. 236.
Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis. 2
- illyricus.* 17. RANUNCULUS foliis ternatis integerrimis lanceolatis. *It. vel.* 71. *Fl. suec.* 471.
Ranunculus foliis tripartitis: lacinias linearibus, caule multifloro, radice tuberosa. *Hort. cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 491. *Sauv. monsp.* 181.
Ranunculus lanuginosus angustifolius, grumosa radice, major & minor. *Baub. pin.* 181.
Ranunculus grumosa radice 4. *Clus. hist.* 1. p. 240.
Habitat in Oelandia, Hungaria, Narbona, Italia. 2
- asiaticus.* 18. RANUNCULUS foliis ternatis bitemnatisque, foliis trifidis incisis, caule inferne ramoso.
Ranunculus foliis tripartitis laciniatis, caule inferne ramoso, radice tuberosa. *Hort. cliff.* 230. *Hort. upf.* 156. *Roy. lugdb.* 490.
Ranunculus, grumosa radice, ramosus. *Baub. pin.* 181.
Ranunculus asiaticus polyclonos f. *grumosa radice.* 2. *Clus. hist.* 1. p. 241.
β. *Ranunculus grumosa radice, flore flavo vario.* *Baub. pin.* 181.
γ. *Ranunculus grumosa radice, flore albo.* *Baub. pin.* 181.
δ. *Ranunculus grumosa radice, flore albo leniter crenato.* *Baub. pin.* 181.
ε. *Ranunculus grumosa radice, flore niveo.* *Baub. pin.* 181.
ζ. *Ranunculus grumosa radice, flore phœnicoe minimo simplici.* *Baub. pin.* 181.
η. *Ranunculus asphodeli radice, flore sangvineo.* *Baub. pin.* 181.
θ. *Ranunculus asphodeli radice, flore subphœnicoe rubente.* *Baub. pin.* 181.
ι. *Ranunculus, asphodeli radice, prolifer miniatus.* *Baub. pin.* 181.
Habitat in Asia vel Mauritania. 2
- maefolius.* 19. RANUNCULUS foliis supradecompositis, caule simplicissimo unifolio, radice tuberosa. *Hort. cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 491.

- Ranunculus rutaceo folio, flore suave rubente. Baub. pin. 181. Moris. hist. 2. p. 448. f. 4. t. 31. f. 54.
 Ranunculus præcox 1. rutæ folio. Clus. bijl. 1. p. 232.
Habitat in Alpibus Austriæ, Delphinatus. 2.
20. RANUNCULUS calycibus hirsutis, caule bifloro, *glacialis.*
 foliis multifidis. Fl. suec. 464.
 Ranunculus caule bifloro, calyce hirsuto. Fl. lapp. 233. t. 3. f. 1.
 Ranunculus montanus purpureus, calyce villoso. Baub. hist. 3. p. 868. Schenck. alp. 339. t. 20. f. 1.
Habitat in Alpibus Lapponiaæ, Helvetiaæ. 2.
21. RANUNCULUS calyce hirsuto, caule unifloro, *nivalis.*
 foliis radicalibus palmatis; caulinis multipartitis sessili-
 bus. Fl. lapp. 232. t. 3. f. 2. Fl. suec. 465. Hall.
 helv. 326.
 Ranunculus minimus alpinus luteus. Baub. hist. 3. p.
 861. f. interior.
- β. Ranunculus idem pygmæus. Fl. lapp. 232. t. 3. f. 3.
Habitat in Alpibus Lapponiaæ, Helvetiaæ. 2.
22. RANUNCULUS foliis radicalibus subcordatis obtusis,
 tuis tripartitis: lobis trilobatis; caulinus lanceolatus in-
 tegerrimo, caule unifloro.
 Ranunculus caule aphylo unifloro, foliis subrotundis
 semitrifidis. Hall. helv. 326. Sauv. monsp. 205.
 Ranunculus alpinus humilis rotundifolius, flore majore
 & minore. Baub. pin. 181.
 Ranunculus alpinus humilis albus, folio subrotundo, Segn.
 ver. 1. p. 489. t. 12. f. 1.
 Ranunculi montani 1. species 1. & 2. Clus. hist. 1.
 p. 234.
Habitat in Alpibus Austriacis, Helveticis. 2.
23. RANUNCULUS foliis tripartitis lobatis obtusis, *Lapponicus.*
 caule subnudo unifloro. Fl. suec. 461. *
 Ranunculus caule unifolio unifloro, foliis tripartitis. Fl.
 lapp. 231. t. 3. f. 4. *
Habitat in Alpibus Lapponicis.
24. RANUNCULUS foliis tripartitis crenatis, caule monspeliacus
 simplici villoso subundo unifloro. Sauv. monsp.
 181. †
 Ranunculus saxatilis, magno flore. Baub. pin. 182.
 prodr. 96.
Habitat Monspelii.

bulbosus.

25. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis compositis. *Fl. suec.* 469. *Dalib. paris.* 105.

Ranunculus radice simplici globosa. *Hort. cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 491. *Hall. helv.* 323.

Ranunculus bulbosus. *Lab. ic.* 666. *Fl. lapp.* 229.

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda. *Bauh. pin.* 179.

Habitat in Europæ pratis, pasuis. 2

repens.

26. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis sulcatis, stolonibus repentibus, foliis compositis. *Fl. suec.* 468.

Ranunculus foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidis: medio productiore, caule multifloro. *Hort. cliff.* 230. *Gron. virg.* 166. *Roy. lugdb.* 491.

Ranunculus pratensis repens hirsutus. *Bauh. pin.* 179. *Fl. lapp.* 230.

Ranunculus hortensis 1. *Dod. pempt.* 425.

Habitat in Europæ cultis. 2

polyant-
mios.

27. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. *Fl. suec.* 467.

Ranunculus polyanthemos simplex. *Lab. ic.* 666.

Ranunculus sylvestris. *Tabern. ic.* 42. *bif.* 117.

Habitat in Europæ borealis graminosis. 2

acris.

28. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis: summis linearibus. *Fl. suec.* 466. *Dalib. paris.* 164.

Ranunculus foliis peltatis quiangularibus multipartitis: laciniis linearibus, caule multifloro. *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492.

Ranunculus pratensis erectus acris. *Bauh. pin.* 178. *Fl. lapp.* 228.

Ranunculus hortensis. *Dod. pempt.* 426.

- β. Ranunculus hortensis erectus, flore plena. *Bauh. pin.* 179.

Habitat in Europæ pratis, pasuis. 2

anuginosus.

29. RANUNCULUS foliis tripartitis acute sinuatis tomentosis.

Ranunculus foliis radicalibus pinnatis. *Sauv. monsp.* 227.

Ranunculus montanus lanuginosus, foliis ranunculi pratensis repentis. *Bauh. pin.* 182. *prodr.* 96.

- Ranunculus magnus valde hirsutus, flore luteo Bauh.
bifl. 3. p. 417.
Habitat Monspelii. 2
Caulis altus, erexitus. Folia Aconiti s. Ran. acris, sed
magis incisa. Semina acuta, compressa.
30. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis chærophyllos
falcatis, caule erexitus, foliis compositis, radice gra-
nulosa. Guett. stamp. 275 Dalib. paris. 166.
Ranunculus chærophyllos, alphodeli radice. Bauh. pin.
181. Barr. ic. 58t.
Ranunculus montanus leptophyllum, alphodeli radice.
Col. ecphr. 1. p. 312, t. 311.
Habitat in Gallia, Italia.
31. RANUNCULUS seminibus aculeatis, foliis super- arvensis.
rioribus decompositis linearibus. Hort. cliff. 229.
Fl. suec. 470. It. oel. 104. * Roy. lugd. 491. Da-
lib. paris. 166.
Ranunculus arvensis echinatus. Bauh. pin. 179.
Ranunculus sylvestris 3. Dod. pempt. 427.
Habitat in Europæ australioris agris. ◎
32. RANUNCULUS seminibus aculeatis, foliis sim- muricatus
piicibus palmatis incisis. Hart. cliff. 229. Hort. upsi.
157. Roy. lugd. 491. Sauv. monsp. 204.
Ranunculus palustris echinatus. Bauh. pin. 180. prodr.
95.
- β. Ranunculus rotundifolius repens echinatus. Bauh. pin.
180. prodr. 95.
- γ. Ranunculus stellatus echinatus creticus. Bauh. pin. 180.
- δ. Ranunculus hirsutus annuus, flore minimo. Raj. angl.
3. p. 248. t. 12. f. 1. Pluk. atm. 311. t. 55. f. 1.
Ranunculus arvensis annuus hirsutus, flore omnino
minimo. Moris. bifl. 2. p. 440. f. 4. t. 28. f. 21.
Habitat in Europæ australis fossis & humentibus. ◎
33. RANUNCULUS seminibus spinoso-subulatis re- orientalis
curvis, calycibus reflexis, foliis multidis.
Habitat in Oriente.
34. RANUNCULUS caule erexitio bifolio, foliis mul- grandifloris
tisidis; caulinis alternis sessilibus. Roy. lugd. 492.
Ranunculus orientalis, aconiti folio, flore maximo.
Tournes. cor. 22.
Habitat in Oriente. 2

- falcatus.* 35. **RANUNCULUS** foliis filiformi-ramosis, calycibus appendiculatis. *Hort. upf.* 157. *Sauv. monsp.* 205. *Myosuros* foliis ramosis. *Hort. cliff.* 117. *Roy. lugdb.* 492. *Melampyrum* luteum minimum. *Baub. pin.* 234. *Ranunculus ceratocephalus*, seminibus falcatis in spicam adactis. *Morif. hist.* 2 p. 440. f. 4 t. 28. f. 22. *Habitat inter segetes Europæ australis.* ♂
- hederaceus.* 36. **RANUNCULUS** foliis subrotundis trilobis integrimis, caule repente. *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492. *Dalib. paris.* 167. *Gort. gelr.* 325. *Ranunculus aquaticus hederaceus* luteus. *Baub. pin.* 180. *Morif. hist.* 2 p. 441. f. 4 t. 29. f. 29. *Habitat in aquis vadosis Angliæ, Belgij.*
- aquatilis.* 37. **RANUNCULUS** foliis submersis capillaceis, emergens peltatis. *Ranunculus* foliis inferioribus capillaceis, superioribus peltatis. *Fl. lipp.* 234. *Roy. ingab.* 492. *Hall. helv.* 328. *Ranunculus aquaticus*, folio rotundo & capillaceo. *Baub. pin.* 180. *Ranunculus aquatilis*. *Dod. pent.* 387.
- β. *Ranunculus* foliis submersis capillaceis. *Fl. suec.* 472. *Dalib. paris.* 168. *Ranunculus* foliis omnibus capillaceis circumscriptione rotundis *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492. *Hall. helv.* 328. *Ranunculus aquaticus* albus, circinnatis tenuissime divisus foliis. *Pulk. alm.* 311. t. 52. f. 2. *Millefolium aquaticum cornutum majus*. *Baub. pin.* 141.
- γ. *Ranunculus* foliis capillaceis circumscriptione vaga brevioribus. *Hall. helv.* 328. *Ranunculus aquaticus* capillaceus. *Baub. pin.* 180. *Ranunculus trichophyllum aquaticus* medio luteus. *Col. ecphr.* 1. p. 315. t. 316.
- δ. *Ranunculus* foliis omnibus capillaceis circumscriptione oblongis. *Roy. lugdb.* 492. *Ranunculus* albus fluitans, peucedani foliis. *Herm. lugdb.* 517. *Habitat in Europæ aquis undosis, suffüs, rivulis.*

TROLLIUS.

- europaeus.* 1. **TROLLIUS** corollis conniventibus, nectariis longitudine staminum. *Helleborus* flore clauso erecto petiolato, caule simplicissimo. *Fl. suec.* 474.

Hal-

Helleborus foliis angulatis multisidatis, flore globoso.
Hort. cliff. 227. *Roy. lugdb.* 484.

Helleborus caule simplici, flore pedunculato. *Fl. lapp.* 226.
Ranunculus flore globoso. *Dod. pent.* 430.

Habitat in Alpibus & subalpinis Sueciæ, Germaniæ, Angliae. ♀

2. *TROLLIUS* corollis patentibus, nectariis longitudine *asiaticus*.
petalarum.

Trollius humilis, flore patulo. *Buxb. cent.* I. p. 15. t. 22.

Helleborus niger orientalis, ranunculi folio, flore nequam
quam globoso. *Tournef. tor.* 20.

Helleborus aconiti folio, flore globoso croceo. *Amm. ruth.* 101.

Habitat in Sibiria, Cappadocia. ♀

ISOPYRUM.

1. *ISOPYRUM* stipulis subulatis, petalis acutis. *Hort. umarioides*
upf. 157.

Helleborus fumariæ foliis. *Amm. ruth.* 74. t. 12.

Habitat in nemeribus Sibiria. ☽

2. *ISOPYRUM* stipulis ovatis, petalis obtusis. *thalictroides*
Thalictrum batrachoides, flore albo, italicum. *Bocc.*

muf. 84. t. 79. f. 1. *

Ranunculus nemorosus, *thalictri* folio. *Bauh. pin.* 178.

Raj. hist. 584. *Moris. hist.* 2. p. 437. f. 4. t. 28. f. 12.

Ranunculus præcox 11, *thalictri* folio. *Claus. hist.* 1. p. 233.

*Habitat in Alpibus Italicis, Grationopoli, inque agro Vi-
ennensi.*

3. *ISOPYRUM* stipulis obsoletis.

Aquilegia montana, flore parvo, *thalictri* folio. *Bauh. aquilegioides*
pin. 144. *prodr.* 75. *Bauh. hist.* 3. p. 484. *Raj. hist.*

707. Moris. hist. 3. p. 458. f. 12. t. 11. f. 5. *Hall.*

helv. 310.

Habitat in Alpibus Helveticis, Tridentinis, Apenninis.

HELLEBORUS.

1. *HELLEBORUS* flore folio insidente. *Hort. cliff.* 227. *hyemalis*.

Hort. upf. 158. *Roy. lugdb.* 484.

Helleborus ranunculoides præcox tuberosus, flore luteo.

Moris. hist. 3. p. 459. f. 12. t. 2. f. 4.

Aconitum unifolium bulbosum. *Bauh. pin.* 183.

Habitat in Lombardia, Italia, Apenninis. ♀

2. HELLEBORUS scapo sub-viridoro subnudo, foliis pedatis. *Hort. upf.* 117. *Roy. lugdb.* 484. *Mat. med.* 273. Helleborus scapo florifero subnudo, petiolo communis bipartito. *Hort. cliff.* 227.

Helleborus niger, flore roseo. *Baub. pin.* 186.

Helleborus niger legitimus. *Clas. hist.* 1. p. 275.

Habitat in Austria, Hetruria, Apenninis. 2

viridis.

3. HELLEBORUS caule multifloro folioso, foliis digitatis.

Helleborus caule & equali folioso, foliis radicalibus caulem tandem superantibus. *Hort. cliff.* 227. *Hort. upf.* 158. *Roy. lugdb.* 484.

Helleborus niger hortensis, flore viridi. *Baub. pin.* 185.

Elleborum nigrum alterum. *Cam. epit.* 941.

Habitat in montibus Viennensisbus, Euganeis. 2

fastidius.

4. HELLEBORUS caule multifloro folioso, foliis pedatis.

Helleborus caule inferne angustato multifolio multifloro, foliis caule brevioribus. *Hort. cliff.* 227. *Roy. lugdb.* 484. *Dalib. paris.* 169. *Savv. mons.* 150.

Helleborus niger foetidus. *Baub. pin.* 185.

Heileboraster maximus. *Lob. ic.* 679

Helleborus femina. *Sterb. fung.* 372. t. 36. f. C.

5. Helleborus niger tritoliatus. *Morris. hist.* 3. p. 460. f. 12. t. 4. f. 7.

Habitat in Germania, Helvetia Gallia.

trifolius.

5. HELLEBORUS foliis ternatis, scape unifloro. *Amoen. acad.* 2. p. 356 t. 4 f. 18.

Habitat in Canada, Sibiria. 2

CALTHA.

palustris.

1. CALTHA. *Fl. lapp.* 227. *Fl. suec.* 473. *Hort. cliff.* 228. *Roy. lugdb.* 484. *Gron. virg.* 166. *Dalib. paris.* 169.

Caitha palustris, flore simplici. *Baub. pin.* 276.

Populago major. *Tabern. ic.* 750.

2. Populago minor. *Tabern. ic.* 750.

Caltha palustris, flore pleno. *Baub. pin.* 276.

Habitat in humidincolis Europæ. 2



AD-

ADDENDA.

Pag. 158. post *Gnidiam.*

STELLERA.

1. STELLERA foliis linearibus, floribus quadrifidis. *Passerina.*
Amoen. acad. 1. p. 400. Sauv. monsp. 60.
Passerina. Bauh. hist. 2. p. 456.
Lithospermum, linariae folio, germanicum. Bauh. pin. 259
Linaria altera botryoidea montana. Col. ecphr. 1. p. 82. t. 80.
Habitat in Europæ arvis, campis, apricis, aridis. b
2. STELLERA foliis lanceolatis, corollis quinquefidis. *Chamaea-*
sim.
Amoen. acad. 1. p. 400.
Chamæjasime radice mandragoræ Amm. rush. 16. t. 2.
Habitat in Sibiria. D. Gmelin. 2

PASSERINA.

1. PASSERINA foliis linearibus convexis quadrifariam *filiformis,*
imbricatis, ramis tomentosis.
Patterina foliis linearibus. Hort. cliff. 246. t. 11. Roy.
Iugdb. 208,
Thymelæa æthiopica fruticosa, foliis in longum striatis,
furculis valde tomentosis. Pluk. mant. 180.
Thymelæa æthiopica, passerinae foliis. Breyn. cent. 10. t. 6.
Thymelæa foliis oppositis cruciatis angustis, floribus tu-
bulotis in spicæ modum e foliorum alis erectis. Burm.
afr. 127. t. 47. f. 1.
Habitat in Æthiopia. b
2. PASSERINA foliis carnosis extus glabris, caulis to- *hirsuta.*
mentosis.
Thymelæa tomentosa, foliis sedi minoris. Bauh. pin. 463.
Sanamunda 3. Clus. hist. 1. p. 89.
Sesamoides parvum dalechampii. Bauh. hist. 1. p. 595.
Habitat in Hispania. b
3. PASSERINA foliis lanceolatis tubciliatis erectis, ramis *ciliata.*
nudis.
Passerina foliis lanceolatis. Hort. cliff. 146. Roy Iugdb. 208.
Thymelæa foliis channelæ minoribus hirsutis. Bauh. pin.
463
Thymelæa foliis oblongo-acutis ad oras sumbriatis.
Burm. afr. 129. t. 47. f. 2.
Sanamunda 1. Clus. hist. 1. p. 88.

Erica africana, rufi folio. *Seb. thes.* 2. p. 15. t. 12. f. 9
Habitat in Aethiopia, Hispania. b

- unijuga.* 4. **PASSERINA** foliis linearibus oppositis, floribus terminalibus solitariis, ramis glabris.
Thymelæa foliis triquetris cruciatim oppositis, flore seticeo. *Burm. afr.* 132. t. 48. f. 2.
Thymelæa ramosa, linearibus foliis angustis, flore solitario. *Burm. afr.* 131. t. 48. f. 1.
Habitat in Aethiopia. b

LACHNÆA.

- cricephala.* 1. **LACHNÆA** capitulis solitariis lanatis, foliis quadrifariam imbricatis.
Habitat in Aethiopia. b
Folia trigona, gibba. Capitula terminalia, solitaria, tomentosa, cincta lora candida.
- conglomerata.* LACHNÆA capitulis confertis, foliis laxis.
Thymelæa africana, polii angustioribus foliis, floribus in capitulis summo caule glomeratis. *Pluk. mant.* 179.
Raj. dendr. 54.
Sanamunda 3. clusii affinis, polii folio. *Breyn. cent.* 18. t. 7.
Habitat ad Cap. b. Spei. b

Pag. 35. inter Melothriam & Læflingiam.

ORTEGA.

- bisanica.* 1. **ORTEGA.** *Læst. epist. VIII:* 43.
Rubia linifolia aspera. *Baeh. pin.* 333.
Jencaria salmatica. *Clus. hisp.* 1. p. 174.
Habitat in Castilia Minuart. Bætica Velez, Salmantica. ○
Pag. 79.
- nembranæ sed* 4. **STIPA** pedicellis dilatatis membranaceis.
Habitat in Hispania. *Læfling.*
Gr. vix pedale, habitu Avenæ. Panicula simplex, vix subdivisa, laxa, debilis. Pedicelli membranacei, anticipates, obtusiflexi. Calycis aristæ longitudine aristæ contractæ.
Pag. 84.

- Hystrix.* 6. **ELYMUS** spiculis involucro destitutis.
Gramen avenaceum, loculis aristatis, paniculis echinum referentibus. *Gronov.*
Habitat in - - -
Spica composita ex Spiculis duabus ad singulum dentem. Spiculæ quadrifloræ; aristæ longis. Involucra nulla. sed horum loco Calli duo.







